


12
12
Ca
18





C7.

MATTHIAE DE LOBEL

Medici Insulanj,

RENISS. & INVICTISS. IACOBI. I. MAG-
NAE BRITANNIAE, FRANCIAE, & HYBERNIAE REGIS

Botanographi,

sive Plantarum Historiz Physicæ, tam indigenarum & Britanniz
inquinarum, quàm exoticarum scriptoris,

In G. RONDELLETII *inlyta Monspelienfis Schola Medica Professoris*
quondam Regij & Cancellarij celeberrimi methodicam Pharmaceuticam
OFFICINAM ANIMADVERSIONES,

quibus depravata & mutilata ex authoris mente corriguntur & restituntur.

TEATVR VNITA DEVS.

I.
*manuscripta
ante or die*



R.
*associationem
continuit.*

Accesserunt Auctaria,

In Antidotaria vulgata CENSURAE beneuolæ, & dilucidæ
Simplicium Medicamentorum Explicationes,

ADVERSARIORVM QVÆ Volumin. eorumq; pars altera & Illustramenta,
quibus ambigua emendantur.

Cur. LVDOVICI-MYRES Pharmacopolæ Reginej Paragraphis vitiss.

contenta reliqua suis locis designantur.

LONDINI. 1605.

Excudebat prælum Thomæ Purfootij.

3846

Priuilegium Rēgium.



IACOBI. I. DEI GRATIA MAGNÆ BRITANNIÆ, FRANCIÆ & HYBERNIÆ REGIS auctoritate & Priuilegio sanctū est, (perpenſis assidujs laboribus & non expensu Matthiæ L'Obelij Botanographi nostri, tam Operum iudis in lucem editorum, quā nouissimē in Reipublica utilitatem excudendorum) ne quis Plantarum Historia eius Illustrationes, Rēgiorum Virgum Appendices, & cum Simplicium Medicamentorum, Materia Medica Balsami, Opo-Balsami, Xylo-Balsami, Cinnamomi, Cissia, Xylo-Cassia & ceterarum explicationes; tum compositorum Medicamentorum enodationes, Animaduersionesq; in Pharmaceuticam Regiellianam Officinam & Censuras beneuolas in Antidotaria vulgaria, nec non Colicellanea sua, imr

viginti annos, ipso inscio, inuſtoq; aut hereditibus suis, imprimat, aut Plantarum Icones suas, sine integrā, siue aliquā ex parte, immetur; aut alibi impressa, in ditionis nostræ Regiones deferat, distrahatur; vernaculone idiomate, (ut sordidā Typographorum auctoritate, plerumque fieri solet) pervertat, veritas deperdatq; præter præfati L'Obelij aut suorum heredum voluntatem. Qui secus fecerit, confiscatione Librorum & summā pecuniariā ex arbitrio nostro mulſabitur. Datum in Aula Regia nostra Grynwich secunda Iulij, 1605.

Signatum

Iacobus Rex.



NOBILISSIMO, PRVDEN- TISSIMO & HONORIFICENTISSI-

mo Domino D. *Eduardo Baroni Zouche, S. Maure*

& Cantelupe, Magnæ Britannię Regiæ Maiestati IACOBO I.

a Sanctioribus Consulys, & summo Prasidi Administratoriq;

totius Principatus Cambriae sine Wallia.



V M nihil a summo bono, supremi placidique Numinis verâ cognitio-
ne & cultu, Mecenas Illustrissime & consultissime in vniuersa rerum
Natura nobilissimè sit mente sana, in corpore sano: corporum autem
cum sanorum, tum ægrorum aut neutrorum fomes, alumnus & in-
staurator est Medicinæ rectoris synceriorque vsus, ab insullis credulis
hominibus hodie iniquè spretus. Altissimus siquidè ille rerum omnium Parens & ge-
nitor, vitâ, sanitatem & medelâ aduersus scruissimos morbos nobis largiri dignatur,
& medicamenta ex terra creauit; vt Stirpes herbaeque vegetariuas & Metallica
fossilia, materiae medicæ rudimenta, quæ Vir prudens, vt habet sacra pagina, non
spernit. Voluit enim nos sanari herbis, non verbis, ne eius Diuina Opera irrita fo-
rent. Ex his Compositiones concinnat Pharmacarius; per hæc Pharmaca medetur,
doloresque finit probus, fidelis & fidus expertusque Medicus, & vitam cum morte
penè commutatam, iterum dat, largiturque; & datam, Diuinâ prouidentia tuerur.
His itaque exactissimè perpenſis, labentes longâ inscitie rubigine Medicamento-
rum Compositiones, Reipublicæ vtilitati & ciuium salutis, admodum necessarias, in-
staurate, scriptisque prosequi operæ precium duximus; qui iamdiu arti medendi,
Plantarum insignium, simpliciumue aut Compositorum Medicamentorum ardore
cognitioni, aliudue quidpiam hominibus vtili in peregrinationibus peruestigando
non poenitentiam collocauerimus operam; valere iulſis neglectisque inutilibus &
superfluis Officinarum innumeris onerolis Compositionibus; politioribus & pau-
cis iisque selectioribus tuti, *Rondellij* præceptoris suauissimi & doctissimi exem-
plo; qui merito in prologo Pharmaceutices Officinæ suæ has superfluitates reiecit,
& a communi via siue opinione facile recelsit, addita semper ratione validiore: cu-
ius & Actuarij Graeci recentioris, de Compositione Medicamentorum doctrinâ &
rationibus oblectati & vnicè freti sumus. Has nostras Lucubrationes honorificen-
tissime D. qui nobilissimæ faues arti Medicæ, amplissimo nomini tuo dicare & nun-
cupare æquum fuit; qui humanitate natia non modo indigenas, pios & eruditos
peregrinos, vt pius parens seruas & gremio foues; sed ipse solertior virtutis inda-
gator per egrè Constantinopolim per Germaniam & Italiam profectus es, rariores
munificentissimæ Naturæ opulentias perſcrutaturus: Nec satis hoc; Opo-Balsâ-
mum legitimum, Sigillum Lemnium ex magni Sultani ætario, selectissimorum
quamplurimorum simplicium Medicamentorum copias & specimina pulcherrima
in Anglo-Britanniâ detulisti & insuper Medicum hortum omni genere Plantarum
exoticarum & indigenarum ad vltimas vsque species reſertissimum instrui procu-
raſti, cui me præfecisti, omnique amore, benignitate & munificentia fouisti & erexi-
ſti: Mirum nanque quanta Plantarum feracitate Deus Opt. Max. humanæ salutis
conseruandæ & reparandæ gratiâ hanc amœnissimam Insulam ditauit, quæ prisco-
rum

rum æuo MAGNAE BRITANNIAE nomine terrarum orbi inclaruit, & quam coeli & soli temperie peregrinis & inqtilinis factis Plantis fauceat, earum seminijs à me iamdiu collectis perlustratâ Italiâ, Germaniâ, Galliâ Cisalpinâ, Gallo-Prouinciâ, Narbonensi Galliâ, cæterisque Franciæ tractibus, locupletata.

Si enim nostri hilabores Magnorû Regum & Principum munificentia ac liberalitate, Typographorumque honorâ beneuolentiâ (quæ alijs nonnullis in eadem palestra te exercenibus non defuit) adiuti fuissent, longè locupletiora in lucem prodirent opera nostra: ætate item nostrâ Imperatoris *Caroli Quinti*, Principumque Germaniæ liberalitate, Commentaria *Martialis* in *Dioscoridem* prodierunt, & illa immensi studij Biblia variarum linguarum *Benedicti Ariæ Montani* ex ætario Regis *Philippi* Hispaniarum, Typographiam Plantinianam hæc, non sine ingentis ænore pascim distracla, in eius ætarium redire.

Plantarum equidem nouas Illustrationes nostras, ex ætissimis emodulatâ proportionem deliniendas iconibus ære proprio, tanquâ optimus *Mecænas* Reipublicæ & Posteritatis utilitati, liberaliter promoturûs & collocupletaturûs, nisi chalcographi pusillanimitas, æris auditas & laboris tedium hoc pium & heroicum institutum tuum remorata fuisset. Hanc tuam heroicam propensionem, veræ Nobilitatis decus, admirari & pro dignitate æstimare non satis possum, quæ sanè velim nolim, tuæ me perpeuo obligauit voluntati. Diuina autem Potestas te tuosque conatus & pia consilia augeat honoribus, vitamque ad beatissimam producat senectam.

Tua clientela obsequentissimus
Matthæ de L'Obel.



Ad eximium vsu & arte Medicum
D. *Matthiam L'Obelium.*

Perge bonis ausibus sacrare perennia sæclo
Pignora, flos Medici delictumq; chori.
Si gens hæc hominum sua commoda nosse recusat,
Gratia nec meritis reddisur æqua tuis:
At pia posteritas in flos seruabit honores,
Quodque maligna negant tempora, grata dabit.
Nimirum seros operâ inuisse nepotes
Hic virtutis apex, hoc pietatis opus.

Amoris & obseruantie ergo
scripsi *Dominicus Bandius.*

D. *Matthiæ*

D. Matthiæ L'Obelio Medico celeberrimo

q. 1100.

Post obitus olim meliori ætate labores,
Fessa quibus virtus cederet Herculeæ,
Post studia, & prono vigilas pectore nolles,
Sudatum solitas continuare diem;
Post peragrata soli spatio loca diffusa vasto,
Sine forent aestu torrida, sine gelu;
Tempus erat placide componere membra quieti,
Et dare callosis mollia strata toris.
Vivida sed virtus nullo superabilis ævo,
Et nondum genitum nata iuvare genus
Otia detrectat, impemq; exosa veterum
Egregio vitam claudere sino parat.
Deseras officium capulo damnata senectus,
Quam calor ingenij deserit atq; vigor,
Ne sibi ludibrium sua per deliria quæras,
Intempestiva sedulitate gravas.
At tu, firme senex, ætas cui grandis & usus
Auxit multiplici fœnore mentis opes,
Perge alacris tua pensa manu limare sagaci,
Pensa, quibus probitas stet, percatq; dolus.
Ille tuus quondam Pelusæ de Monte Magister,
Immodicus lucri quem laceravit amor,
Integer arte tua, sparsosq; unitus in artus
(Compositus manes si pia scilicet monent)
Deiçiont amplexus tibi pandis obuius vlnis,
Discipuli lætus de pietate sui.
At vaser ardulo, Medicum & mentitus agryia
Luce tui palam proditus indicij,
Colla retorquetur pressus cœu calcibus anguis,
Inq; tuum tergum tota venena spues.
Sed bene, quod nullis bona mens obnoxia damno
Impavidum telus præbet aperta laus.
Et bene quod nullo tua coepta remissum virges,
(Quicquid mangonum sordida turba fremit)
Vt dubia in certam deducas Pharmaca normam,
In dubium post hac ne cadas vlla salus.
Non alibi gravius peccantur, ne tamen usquam
Librius propria de cute ludit homo.
Absit enim ratio, pro cara sæpe salute
Ancipiti auxilio mors properata venit.
Cautior at monitis fugiet discrimen uterq;
Qui medicata dabit pocula, quicq; bibet.
Quippe doces, generat quicquid Natura salubre,
Naturam & quicquid Ars imitata parit.
Tantum canities annas immittit bonotum
Congerit in nostram & Posteritatis opem!
Fortunate Senex! in commoda nostra vacantem
Ultimate rapiet de statione dies.

Rhaph. Thorius Med. Doct.

PRIOR NUMERVS PAGINAM COMPOSITORVM AVT SIM-
PLICIVS MEDICAMENTORVM DENOTAT: SECVNDVS CRASSIORVM
sphalmatum typographicorum obiter animaduersorum restitutiones, quæ partim oculi aesti se-
menscentis aciem effugerunt; partim operarum dura cervicis oscitatione & fatali supina,
inertia, deprauata sunt. *Littera A. a. Adversariorum alteram par-
tem; & l. lege & lineam significans.*

A	Cariz succedaneum,	77	Calissa,		Dia-Calissa,	59
	Aceti medicati differentie,	16	Cinnamomum 74. eorū genera 530.	Aa.	Dia-Catholicon Nicol.	41
	Perperam,	30	Cassia flos,		Discaitho liquicentum,	41
	Scillanicum,	17.	Cassia extracta, C. fistula & C. siliqua		Discinimum & Dialanga Med.	62
	Rolatum,	16.	purgans,		Ducinamomum,	62
	Sambucinum,	20.	Cassa Poetarum,		Lucadion, Dioscodii rhomboides,	38
Acantha Leuchl.	31		C. siliq; compressa,		Dia-lis simplex, & Salernus.	62
Acorus. 76.	31		C. lignea & fistula,		Diamargaritum frig. N.	65
obf.	39.		Catharticon Hydragogum.	54, 55	Diambaru,	58
Ala Anglo-Britannica. A. a.	472		Centaureum minus.	77. Ad 173	Diaphanicon vtrumque,	43-44
Allium syl. oscarum.	501. A.		Cercubia Martia, 472. Aa. & parandi		Diamoficum,	66
Alpeceorus maximum, Britan: Aa.	469		ratio,	470, 471	Dispendion Nicol.	67, 68
Amara, 77.	Ad 213		Ceratum album Gal.	112	Duriū Pharmaceuticum, 112, 113, 114	
Ambra,	57		Cer. Santalinum, 112. Oespi.	113.	Diarbodon Abb.	62, 64
Amianthus dulcis			C. e pelle Arterica,	113	Diasynon Aduarj alij praesent-	
Anonum,	76. Ad. 444		Cerati Stomachicum Gal,	113	dum,	154
obf.	615		C. Diapente,	113	Diastyrion Mesur.	155
Aenomonum hortensium onium c-			Chalcitis,	76	Dia-Scordium H. Pracr.	82
lenchus,	514, 515. A.		Chamaeleons,	20	Dia-Sebelles,	43
Anchophylli,	56		Chama-Orchis Zelandica maritima	505. Aa-506	Dia-trium Pipercon simp. Ital.	62. 63
Aneidons & Insipero, ad petis (lege)	82		Chylarium Erythimoides,	54	Diatrium Santalon, Nic.	64, 65
coetgia,	82		Chylarium & Radicibus Gramineis.	87	Diatriaganthum fig.	65
Apium,	76		Chylarium siue Ser: Rhodites cum		Disanum,	75. Ad. 214
Apocma,	29		garico,	22	Diospoliticum Gal,	63, 62
Argentum & 2			Chylarium & Scolopendrio, siue		Doronicum,	58
Aurum,	61, 62.		Alpicion Tetrachue Arab.	20	Dulcinarie Morfiancule Regales.	70
Auri solutio, Aa.	139, 130		Chylismata,	2. 19		
Aromaticum Moichatum,	57		Chylisma siue Extractum Catholicum	94	EL Caryocostinum,	52
Aromaticum Rolatum,	55		Theoph. encratatum	94	El. Chologogum Rolatum, 533. 54	
Aromaticum RoC. Caryophyl.	56		Coccus Euphica, 61. & eius succi succa-		El. C. Citro fol. Monfel.	50
Alphatum,	57		daneum.		El. Dia-C. archami,	
Alphodelus minimus,	484. Aa.		Confec. Alkermes Mesur, 58. & Mon-		El. Dianicum cum Citro,	51, 52
Confile, Indicum Adeesurum.			spel.	60, 61	Flec. Indum maius,	45
B	Alami explanationes, 518. & A		Confectiones aromatic.	55	Elect. Lenicium,	43
	Aduerf.	415. Aa.	Confectio Hamech,	45	El. S. Succo Rolatum,	52, 53
Balsamum Buryri & 2			& parandi ratio,	46	Eupatorium Med. 31. 30. & Anicron.	
Balsamum Medias, 120. 121.			Colchicum polyanthes. Aa.	499	Enopl. & Baccis Laui. Lege Med. Myrr.	
Balsamum & Peto,	125		Colchici pleno flore,	499 500. Aa.	Olib. ana. vinci. t. demel. pag. 125.	
Beldij & Myrrhae differentia,	125		Colchici varietates, ibidem tenuissolium,		Emplastrum & Crusta Parisi,	112
Bedeguar,	30. 31.		Corallior: Solutio. Aa.		Emplastrum Dischylon com. ure. 131	
Bellis spinosa Aa.	505, 509		Cortalium triplex,	329	Dischylon parum 131.	
Bon.	154		Crocor Tartari,	92	L. iach. n. agnum,	131
Behem, Behemum album & rub.	154		Croci Maris preparatio,	126	Diach. cum Gummi & Iteatum, 132	
Biera 472. 473. Aa. 470, 71. lin. 3 le-	31		Croci Veneris preparatio,	125	Empl. ad Callos pedum,	126
ge & D. Guil. Coga.			Croci verni lutei, autieque & zutu-		Empl. Ceroneum,	126
	57: 77		malis varietates,	457, 493. Aa.	Empl.	

TABVL A.

Imp. d. Meliolori Mef.	132	Leucaemba,	31	Nardus, 76.	Ad. 42
Imp. Oryzococcum,	133	Leuco-Narciffo Lirion tenuifol. an-	31	Nardus Celtica 76.	Ad. 132
Imp. d. Rami,	133	tumale, 491. Aa.		Nepeta, 75.	Adverf. 219
Imp. d. Marfchb. Monfpcl.	133			O Nychas Bdellij,	59, 100
Imp. d. Marfch. d. Ioubert,	134	Lencioion bulbo 2 autumnale Clufij		Oleum Abfinthites,	106
Imp. d. Dimotio,	134	491. Aa. & caruleum, & pæcox.		Oleum Amygdalinum, & aliorum fru-	
Imp. p. Opodoch Germanorum,	134	Lilij Chalcedonici minuzi varietates,		ctuum,	110
Imp. p. nigramad peronones,	139	511, 512. Aa.		Oleum Anethinum,	104
F Olum,	30	Lilium montanum flore flavo, cujufque		Ol. d. Caftoreo, 116. Perperam,	105
Fritillaria alba, nigra & varietates,		varietates, Aa. 505		Ol. d. Camphorinum,	104
na. 494, 495, 496		Lilium fil. Mofchatum, 504. Aa. & He-		Ol. d. Cofeo, 106,	pro 105
		merocallus mofchata,		Ol. d. Cydonites,	103
		Macedonica,		Ol. d. Ecnaluri, 106,	pro 105
		Liquamorta,		Ol. ex Euphorbio, 106.	pro 105
		Lohoch,		Ol. d. Framenco,	111
		Lob. d. Papauere,		Ol. Irimum,	104, 481. Aa.
		Lohoch d. Pino,		Ol. d. Iunipero,	111
		Lob. d. Pulrone valpis,		Ol. d. Keninum,	104
		Lohoch Samum & expertum,		Ol. Lavininum,	109
		Lob. d. Scilla,		Ol. d. Libaccum,	113
		Luph. planum,		Ol. d. Lumbicicum,	110
		M Agiftera ex Gemmis,		Ol. d. Martis,	135
		Magma Hedicroi,		Ad 129	pro 105
		Malabathrum, 76.		Ol. d. Mufcatinum, 108,	106
		Mandragora,		Ol. d. Mentha,	107
		Manus C. bniti,		Ol. d. Mufcatinum,	108
		Margaritarum diffolatio, & Coral-		& Mifcelinum,	111
		lorum		Ol. d. Myrrha,	101
		Martagon imperiale, 504. Pompon-		Ol. Myrrinum,	106
		um,		Ol. Nardinum,	103
		Mela Melini & Mofcouitarum, 476		Ol. Nenupharinum,	111
		Melica as pegafantima, cadenteque vi-		Ol. Ononidum,	111
		lulima.		Ol. Philolophium,	111
		Medicati fæci,		Ol. d. Pipenbus,	109
		Medicamenta à quibus petuntur, 89		Ol. d. Rof. Ompnaciis, completum,	102
		Medicam. propria virtus Medicum, 15		Ol. R. taceum,	104
		Mel Anthofatum,		Ol. d. Sciminum,	105, 103
		Mel Mercatiale Aduerfariorum, 728		Ol. Sicyonium,	110, 111
		100. lucca 27		Olea fillaria,	113
		Mel. Rofarum, Rhodomel.		Ol. d. Thymelæa,	110
		Perperam,		Ol. ex Torpedine,	100
		Mel Rof. Soignium,		Ol. Viola. cam,	113
		Mel Scillicum,		Ol. Vulpinum,	110
		Meteglin cuiusq. parandi rationes variz		Ophim,	73
		Aa. 473, 474, 475, 476, 477		Onata Anidota,	74
		Mithridatum Danocatus,		Opo. Balfamum,	74
		Molli arboris fionde, 518. Aa. 516		O. yacantha,	31
		Moly luteum latifolium Botanocorum		Oxymellis differtentiz,	17
		501		Oxymel. fimplex Melux,	17
		Morfuor culæ Dulcizæ ad tabulos, 70		Oxymel. diureticum,	18
		Mofelli,		Oxy-facchara Simplex, Composita, 18	
		Mofelum,		P Anacea,	Aa. 477
		Murnia,		Pancratium Indicum autumnale,	501. Aa.
		Myrrha liquida,		Pancrat. Indicum Vemum,	501. Aa.
		Myrrha, 74 Aduerf. 423. Obfct: 177		Pancratium Indicum aut Narcifcus,	501. Aa.
		N Arc. Afrianus duplex, 503. Aa.		Paffilli, quere Trochifci,	73
		Narcif. d'Argiers,		Paffilli Scillicti,	73
		Narc. caruleus,		Paffilli Tbenacales,	73
		Narc. Indicus ruber,		Paffium vinum, Maluaticum, 493. Veq	
		Narcif. Indicus autumnalis, 501. Aa.		Paffi, 499. Pruna Paffa, Ficus, Py-	
		Narc. Ind. alter ibid. Varietates 503		ra Paffa, &c.	ibid. Aa.
		Narc. luteus multiplex Botanocorum e-		Pentaphyllum,	75, Ad 303
		iusque varietates,		Petrolioum, 75. Aduerf.	315
		Narc. luteofolius minor minor Clufij		Obf. 406. Vide Schum;	
		& Venerij,		Phleum, Philonis Anidodus, 70	
		& Narcif. montanis calyce magno		Phleum Roma: fide maius, 70	
		duplex Coocpe.		Eius cæligatio, 71. dele bis Piper	
		Narc. luteus Veneris Lete. 493. Aa.		albus in exemplaribus, quibusdam.	73
		Narcif. medocroci de generatione,		Philon. Perficum,	
		491. Aa.		Phl. non feru. entium lethale. pag. 1	
		N. mediococcus tenuifolius, 490. Aa.			
		N. parvus fl. albus,			
		491. Aa.			

TABVLA.

Philosophica aqua virtusque, 543. Aa.
Phu. 76. Ad. 319
Pil. ex Agarico, 89
Pil. Aggregatum Mef., 86
Pil. Alephangorū siue Aromaticæ, 85
Pil. Succationibus aromaticis, suo loco
omiffi, 93-94
Pil. ante cibum, 86
Pil. ex Aluaret Nicotæ, 86
Pil. Aureæ Nicolæ, 86
Pil. siue Catapocia Aurea ad lueni
Venerem, 540. Aa.
Pil. ex Bello maioris, 91
Pil. Cocci Rhaſis, 86
Pulver. cōtines ſive Peſſantiales, 84
Pulverum chylifera, ſaccharo inclu-
ſationum nobile, 90
Pil. ex Cyng offio, 91
Pil. ex Euphorbio, 90
Pil. Ferriæ, 89
Pil. ex Fumaria, 90
Pil. el ap Armenico, 88
Pil. ex Lapide lazu, 88
Pil. Lacti maris, & minoris, 91
Pil. Muffchinæ Conſhar, 86
Pil. el. georibus Myrabol, 87
Pil. Rhabarbaro, 89
Pil. Sanctæ, 90
Pil. ex atrocolla, 88
Pil. ex Syriacæ, 91
Pecunie radices euellendi tempus, 24,
50. A. a.
Piperi utramque effigis, 63
75. Adverſ. 426
Pir naualis qualis, 123, 114
Pſaſmalum, 57. 77. 509. A. a. ſiue
Butum. 42-43, 44-45, 46, 47-48, 49, 50, 51,
52, 53
Propolis, 123
Pulueres laxatiui, 28
P. Mercurij albus laxatiui, 540. Aa.
Pul. Sanctus, 91
Pul. Senæ Montæ, 92
Pul. albus Stribi vomitorio, 541. Aa.
Pul. aliter vom: ex vino Antimonij. ib.
Pul. ad Diomæ Monſp., 92
Pul. ad ſtrumæ Perſorienſis, 92
Pul. Dia-Turbiſh, 92
Pul. ad ventres Monſpel., 92
R Happonicum & Rhabarbarum, 75
Rhoſia nouellæ N 69-70
Rhoſia aduerſ. 118. Obſeruat. 154
Rhou. borum ſuauiſ. parandi ratio, 57
S Acchar. Roſarum, 70
Sampſonæ, 77
Scaturicellum, 130
Schortanthum 75. Ad. 42
Scordium, 73. Adverſ. 110
Secapal Arabum Adverſ. pag. 317
Sclerum, 75. Adverſ. 314
Scapiani, rhyſanthites, 32
Serap. Adiantum, utrumque, 20
Ser. ex Cinnamon. 534. Aa.
Ser. ex Endulia, ſiue Intubacum, 22
Ser. Glycyrrhizæ utraque, 34-35
Ser. ex Fumaria, utrumque, 31, 22
Syr. ex Arthemifia, 34
Syr. Byzantini, utrumque, 26, 37
Syr. ex Capſis Veni, 20
Syr. ex Cichorio, utrumque, 28, 29
Syr. Endiuæ compoſ., 28
Syr. ex Eupatorio, 20
Syr. Hyſſopis, 38
Syr. Iunibum, 37
Syrupus longus, 19
Ser. ex ſuc. Lupulorum, 22
Syr. utrumque ex Mentha
Nemupharium, 20.
Syr. ex Pſaſuere, utrumque, 37
Syr. ex Prælio, utrumque, 35, 36
Ser. ex Inſuſionibus Roſarum recen-
tium, & de Roſis ficcis, 22
Serap. ſiue Chylarium Rhoedis cum
Agarico, 22
Serapium & Scolopendrio, utrumque, 20
Serap. Aceoſium ſimp., 24
Ser. ex ſuc. Bug. latifoli, 25
Se. ap. ex ſuc. Catti Limonium, 24, 15
Ser. Omphacites, Oxalites, 24
Sericum, Seta. Seiz., 59
Sief. alium Rhaſis, 101. & Mef. ibid.
Spina Arabica, 30
Syr. Roſas Anguſtulus compoſitus, 23
Legumina, & infundantur in lib. 15
infuſi Roſarum.
Alij habent lib. f. Sacchari in ſingulis
Lib. ſiquorij. Huius Syr. omniū
ſupplementum: additum eſt pag.
35
Syr. alius Compoſ. efficaçior, ibid.
Syr. ex Sacclade, 33
Syr. purgatio-Violaceo colore com-
mendatiſſimum, 19
Serap. Zizyphum, 37
Stactæ, 74
Stella marina Iodica, 122, 129
Succationes Medicate, 19, 34. Aa.
Succedanea, ſiue Q. ad pro quo 40, 41,
42-43, 44-45, 46, 47-48, 49, 50, 51,
52, 53
Succaha, 30, 31
Serap. Myrtinum, utrumque, 24
Scapium & Pomus cooipol. Mefui, 33
pag. 24. lib. 1. legeloſo Seſamoidis.
T Erebiching ſubſtitutum, 76
Terra Lemnia, 76
Theriacia Andromachi, 71, 77
Et erus parandi ratio, 78, 79, 80
Theriacia Diateleron, 81
Theriacia Loodineoſis, 81
Leg. Præſid., 81
Thaliſp., 76. Ad. 72, 73
Tipacidi lutei Varietates, 487. Aa.
Trigena ad Anſi laxata, 92
Trigena ad Vermes, 92
Tripharmacum, 130
Triphera Perſica, 47
& Triphercium diſſerens, 47, 48,
49, 50
Troceſſi ex Agarico, & Agaricis tro-
ceſſis, 96
Troc. Albandal, 96
Troc. Aliper Moſc., 100
Troc. Alekeengi, 97
Troc. ex Antipodio, 98
Troc. ex Cappariſbus, 97
Troc. ex Caube, 96
Troc. Cyphi Damo, 99
Troc. de Gallia Moſchata, 100
Troc. Hedycroi, 99
Troc. ex Mino corro dentes, 102
Troc. ex Myrtha, 97
Leg. Tr. : & Rhabar. 96
Troc. de Roſis, 95
Troc. de Scallio, 95
Troc. de Violis, 95
Troc. de Violis Martijs, 95
Troc. de Viperis, 98, 99
Leg. Euphor. 126
Tulpa pumilio alba utraq. 494. Aa.
Turbiſh minerale ſelectum, 541. Aa.
Turbiſ. preparato, 135
V Itrioſi terre preparato, 126
Vinguentum ex Adipibus, 126
Vng. Aegyptiacum, 125
Vng. Agrippæ, 125
Vng. Rhaſis, 127
Vng. Apoſtolorum, 125
Vng. de Anag., 119, 120
Vng. de Arithauſia, ſiue Cyclamine, 123
Vng. de Aſcani 124.
Vng. Baſilium utrumque, 123, 124
Vng. de Bdello, 122
Vng. de Ceuſſa, 127
Vng. Cetrium, 128
Vng. Ceraſco paruum, 125
Vng. contra vermes, 130
Vng. Dnaſtheas, 122
Vng. de Licetacium ruſum, 127
Vng. de Ploricum ſiue Enulatum, 130
Vng. fulſum Nicol., 123
Vng. Martium, 114, 115, 116
Eius enodenda deſcriptio, 116, 117
118, 119
Vng. Nutrinum, 123
Vng. oculis aduſum, 126
Leg. Zancariæ.
Vng. de Roſale, 121, 122
Vng. de Pomato, 129, 108
Vng. Pompholygos, 126. l. 3. a. lege
tenum.
Vng. de Populeum, 130
Vng. de Rhoſiumpum, 121, 122
Vng. de Roſarum Mef., 129
X Yio-Balfamum 77. Aa. 522
Xylo-Caſia, 530
Xylo- & Cinnamonum, 530. Aa.
Y Va, 508, 507. Aa.
Z Erumbet & Zeduria, 484. Aa.
Zingiberis effigis & deſcrip. 67
Zoulapum, Zoulapium, 19
Zebetum, 58
Zythum, 472. Aa.

In Stirpium aduersaria Mathiæ de Lobel & Petri Penæ INDEX.

NE FRVSTRA VOLVMINIS MOLEM AVGERENT ELENICH
IDEM HV.C INCVLCATI & ACERVATI, QVI REPERTV FACILLI-
mi, & multò locupletissimi cuilibet inter euoluendum patebunt, hic duntaxat
Indice summa genera Stirpium completu, visum fuit.

A	<i>Bies</i> , <i>Phloropios Theoph.</i> 450	<i>Anagallides</i> 194. 195.	<i>Asclepias sine Pictotoxiem.</i> 278.
	<i>Abratoni diff. variet.</i> 341. 342.	<i>Anagyris diff. varietates.</i> 388.	<i>Ascyrum sine Asina.</i> 173.
	<i>Abjunctu diff. variet.</i> 335. 337	<i>Anchusa diff. var.</i> 247. 248.	<i>Aspalathi differen.</i> 427.
	<i>Abutylon Asiatica.</i> 294.	<i>Androsachet.</i> 165.	<i>Aspalathus</i> 29. <i>Ad.</i> an <i>Scorpio Theo.</i>
	<i>Acanthi varietates, differen.</i> 365.	<i>Androsenum.</i> 173.	<i>Asparagi & Cornula diff. variet.</i> 353
	<i>Acarna Theoph.</i> 373.	<i>Anemones spec.</i> 112. 113. 114.	<i>Asperula sine aspergula.</i> 357.
	<i>Acatis adiffer. varietates.</i> 409. 410.	<i>Anethum.</i> 451.	<i>Asphodeli genera, varietates.</i> 45. 46.
	<i>Acasia cognata planta.</i> 451.	<i>angelica.</i> 443.	<i>Asphodelus Hesioid.</i> 85.
	<i>Aceris varietates.</i> 443.	<i>anguina sine Dracunculi diff.</i>	<i>Asplenon sine Ceterach Officin.</i> 360.
	<i>Achylla, vide stratiotes.</i>	<i>Anisum.</i> 322.	<i>Asia dulcis & fetida.</i> 311.
	<i>Acon herba varietates.</i> 215.	<i>anoni varietates.</i> 378.	<i>Asione Anguil.</i> 374.
	<i>Aconiti diff. va.</i> 289. 300. 310.	<i>anthemides sine Chamemilla.</i> 342.	<i>Astraria nigra, Elleborus nig.</i> Do. 304
	<i>Aconi differentia.</i> 29. 205.	<i>anthora.</i> 301.	<i>Asteris differe. varietates.</i> 147. 148.
	<i>Acleosia Gaze an Polyac. Th.</i> 374	<i>le. anthyllis Peplios effi.</i> 195. 196.	<i>alt. lege aster Italorum. fruticosus lateus.</i>
	<i>Adonis videtur Phl. Th.</i> 115. 344	<i>anthyllis Chamæpithoides.</i> 164	<i>ibide ast-agallus Monsp. pl.</i> 137
	<i>Adiantum Dios. & Plum.</i> 361.	<i>arcturhi differen. varietates.</i> 175.	<i>astragali persimilis plantula.</i> 404.
	<i>Aegylops. 10. Aegylops Tragi.</i>	<i>asparine.</i> 357.	<i>atractylis.</i> 372.
	<i>Achyropis.</i> 242.	<i>apharca, vicea agrestis, aræus</i>	<i>Dod. crispis differen. varietates.</i> 96. 97.
	<i>Agallochum.</i> 428.	<i>Apharca The. an bourgesine Monsp?</i>	<i>ancillane nucis.</i> 441.
	<i>Agaricum Larignum.</i> 449.	421.	<i>aene differentie.</i> 9.
	<i>Agerati diff. varietates.</i> 207.	208.	<i>aphyllanthos Monspell.</i> 190
	<i>Agros.</i> 423.	<i>apiastrum.</i> 220.	<i>aurea virga, an Leneographus Pl.</i> 125
	<i>Ainga.</i> 164.	<i>apios. 204. differentia.</i> 205.	<i>auricule muris, vide Pileosella.</i> 206
	<i>Aizoon mains & minus.</i> 161.	162.	<i>arums hortense.</i> 314.
	<i>Alabastrus sine Coralloid. Cor.</i> 305	<i>apocyni differentia, variet.</i>	279.
	<i>Alchenna Arabum, vide Ligustrum.</i>	<i>aquifolium sine agrifolium.</i> 431. 430	
	<i>Alcea differen. varietates.</i> 295.	<i>aquilegia an Perbas Theoph.</i>	
	<i>Alchymilla sine stellaria.</i> 298.	<i>arabis, sine Draba.</i>	
	<i>Alisier Gallorum.</i> 441.	<i>arantia in Medico malo.</i>	
	<i>Alisma, an Plantago aquatica?</i> 127	<i>arbutus, sine Vnedo.</i>	
	<i>Alisera. 228.</i>	<i>Allia. 58. 59.</i>	<i>araci sine Cracca differentia.</i>
	<i>Alnus proximi Betulom.</i> 440.	<i>arbor lude Monspell.</i>	
	<i>Alni nigri sine Frægula inscriptiore.</i>	<i>arthon an Persolata Pl.</i>	
	<i>acenda sequenti capite, & dele Nux ememone.</i>		
	<i>Anellana.</i> 440.	<i>argentina sine Potentilla.</i>	
	<i>Alopecurus Th. 17. Pl. in Melapryo Agia.</i>		
	<i>Alnus diff. varietates.</i> 193. 195.	<i>arsari varie. diff.</i> 260. 261.	<i>Pl. aris</i>
	<i>Althea diff. varietates.</i> 293. 294.	<i>aristobebie differe. varie.</i> 264.	<i>265.</i>
	<i>Alpispicus, varietates.</i> 158. 160.	<i>armeniaca mali differen. vari.</i>	<i>436.</i>
	<i>Alyssum.</i> 255.	<i>armenia. 188. varietates.</i>	<i>189.</i>
	<i>amelanchet Galloprovincie.</i> 441.	<i>arnabo.</i> 35. 36.	<i>Becabunga, non est Capca.</i> 195.
	<i>Amaraci varietates.</i> 212. 213.	<i>arnoglossum.</i> 127.	<i>Bechion, vide Tusilago.</i>
	<i>Amaranthi variet.</i> 95. 203. 294.	<i>arum Aegyptiu & arū vulgare.</i>	<i>290</i>
	<i>Ambrosia.</i> 341.	<i>arthemisia.</i> 340. 341.	<i>(260. Ben, vide Glaus vignemaria.</i>
	<i>Ametu Virg. in Aflere.</i>	<i>arundines.</i> 19.	<i>Benzoin nō est succus Cyrenæicus</i> 311
	<i>Amom. diff. an Baboniū Hip.</i> 323.	<i>arundinacea spinosa planta.</i> 452.	<i>Berberis, spina S. quonundam.</i> 439.
	<i>Ammoniacum in Ferulis.</i>	<i>asarū sine Nardus rustica.</i> 261.	<i>262</i>
	<i>Amomum Pl. 444.</i>	<i>alund adrach Asiatica.</i>	<i>416.</i>
	<i>Anura.</i> 422.	<i>asarina.</i>	<i>262.</i>
	<i>Anrydelo.</i> 423.	<i>asclomitidis antiquorum.</i> 58.	<i>Anguil.</i>

<i>Beetula</i> , 440.	<i>Carolina</i> syl. vide <i>Acarna</i> Theopb.	<i>Chamaemysilum</i>	435.
<i>Bifolium</i> , <i>Ophrys</i> Plin.	127.	<i>Carobia</i> , 414.	<i>Chelidonium Majus</i> nū virga tincta
<i>Bipinnell</i> , vide <i>Pimpinella</i> .		<i>Cerotta alba nigra</i> , 323.	rū <i>Auicent</i> <i>Manus</i> , 339.
<i>Bipinel</i> , saxifra. an <i>Phellidriū</i> P. 321		<i>Cerotta laetifolia alba</i> , siue <i>Pastinaca</i> , 418.	<i>Chermai</i> , vide <i>Kequis</i> .
<i>Bipinnella</i> sanguiforba, vide <i>Siderius</i>		an <i>Disicorid</i> , <i>Elaphobosium</i> ?	<i>Chyisti</i> different. varietates, 418.
altera <i>Diosco</i> .		<i>Carposus</i> , 440.	<i>Cisti</i> i folio arbor noui orbis, 452.
<i>Bistorta</i> varietates, differentie, 120.		<i>Carposallamū</i> eiusq; succedaneū, 415	<i>Chrysanthemi</i> different. variet., 237.
<i>Blattaria</i> , an <i>Chrysogonum</i> , 243.		<i>Carni</i> , 323	<i>Chrysophoriana</i> , vide <i>Elleborus niger</i>
<i>Bolbanae</i> , <i>Lunaria</i> <i>Giaca</i> , 136. 137		<i>Caryophylla</i> , 427.	<i>Chrysanthemum litoreum</i> , 171.
<i>Borrys</i> , 80.		<i>Caryophylli</i> florae dif. vari. 188. 189	<i>Crib. tertium</i> <i>Matthi</i> pag. 401.
<i>Bouchayer</i> Belg. <i>Erisymū</i> Th. 395		<i>Caryophyllata</i> differentie, va.	309. <i>Chrysocome</i> est <i>Amaranth</i> , <i>luteus</i> <i>Euf</i> .
<i>Brassicarum</i> diffe. variet. 90. 91. 92.		<i>Grecorum</i> , 425.	<i>Stachas citrina</i> <i>Offici</i> , & <i>Lynaria</i>
<i>Brassica</i> } <i>Mouospermum</i> , 92.		<i>Cassia</i> } <i>poetica</i> & <i>Theo</i> .	184. <i>aurea</i> , 303. <i>Chrysogonos</i> , 243.
<i>marina</i> , } <i>Soldanella</i> , 263.		<i>Purgatrix Arabū</i> , 414.	<i>Chyera</i> , vide <i>Schyna</i> .
<i>Bourgefi</i> , <i>Mis</i> , an <i>Aphaca</i> Th. 421		<i>Castuba</i> Pl.	182. <i>Ciccula</i> altera, 394.
<i>Britannica</i> varietates differ. 121.		<i>Cistanea</i> differentie, 433.	<i>Cicerbita aspera</i> , vide <i>Sonchus</i> .
<i>Brantia</i> , vide <i>symphytum petreum</i> .		<i>Cistanche</i> viraque, 399.	<i>Cichoracearum</i> genera variet., 82. 83.
<i>Bryonia</i> , 275.		<i>Citaputa minor</i> , 153. maior, 306.	<i>Cicliana</i> <i>Itaior</i> , <i>Climenon</i> Pl. <i>Ang</i> .
<i>Briza</i> , 9.		<i>Cattaria</i> , 219. 220.	<i>Cicuta</i> , <i>Cicuta</i> differ. 326. 327
<i>Buglossa</i> & <i>Borrag</i> , dif. va. 246. 247		<i>Cuculides</i> , 224. 225.	<i>Contamomū</i> , 425. <i>Corcea</i> , 104.
<i>Dulba</i> & <i>Bulbina</i> , 49. 52. 56. 58.		<i>Cauda nueris</i> , 187.	<i>Cynofbaton</i> , 446. <i>Corsu</i> diffe. 251.
<i>Duin</i> & <i>Bomadiis</i> <i>discrimen</i> , 57. 71		<i>Caulum</i> varietates different. 90. 92.	<i>Cynoflatum</i> <i>Sequarum</i> , 373
<i>Bupfentri</i> differentia, 191.		<i>Cedrus Libani</i> , <i>phoenicea</i> , <i>Lycia</i> , 448	<i>Cissampelos</i> <i>Helixme</i> dif. 274. 275.
lege <i>Buphtalmus</i> , 343.		<i>Cedrus</i> Theopb. <i>Dioscor</i> , 425.	<i>Citrus</i> , siue <i>Sidromella</i> , 425.
lege <i>Buphtalmum</i> alterum, 343. 345		<i>Centa</i> } <i>Maius</i> , } variet.	<i>Citrus</i> <i>Officinatum</i> , 226.
<i>Bursa Pastoris</i> , 76.		<i>ritum</i> } <i>Minus</i> , } variet.	<i>Clematis peregrina</i> different. 275.
<i>Butomus</i> , vide <i>Sparganium</i> .		<i>Centimorbida</i> , 198.	<i>Clematis daphnoides</i> varietata, 282.
<i>Buxus</i> , 419.		<i>Centonmoda</i> , vide <i>Polygonum</i> .	<i>Clinopodium</i> , 217.
		<i>Centimili</i> , siue <i>Gnapthal</i> , dif. 201. 202	<i>Clymeni</i> differentie, 230. 279.
		<i>Cepe</i> different. varietata, 56. 57. 58.	<i>Cnicus</i> , 374.
		255. <i>Cepa</i> herba, 169.	<i>Cnicus sylue</i> , uterq; , vide <i>carduum</i> .
<i>Cacalia</i> , 77.		<i>Cerasi</i> varietates, differentie, 436.	<i>benedictum</i> & <i>Attractulidum</i> .
<i>Cakile Serapiomis</i> , 104.		<i>Ciraria</i> , 414.	<i>Cocci</i> , siue <i>Ilex eococfera</i> , 430.
<i>Cacubulum</i> Plin.		<i>Cercis</i> Theopb., 441. 431.	<i>Cochlearia</i> differentie, 121.
<i>Calamintha</i> diffe. varietates, 219.		<i>Cersifolium</i> , 324.	<i>colchicum</i> , vide <i>Ephemerum</i> , 53.
<i>Calamus odoratus</i> , 29.		<i>Cernitae</i> Plin., 172.	<i>colocasia</i> , 259.
<i>Calanocornu</i> siue <i>Arundo florida</i> , 28		<i>Cernuaria</i> , siue <i>vulneraria</i> , 138.	<i>colocymthidos</i> , 187.
<i>Calceolus Maria</i> , 127.		<i>Chamecyssos</i> , 268.	<i>colus</i> <i>fovis</i> , siue <i>Galiopsis</i> <i>lutea</i> , 241.
<i>Calceitrapa</i> <i>Ruel</i> , an <i>Coronopus</i> Plin?		<i>Chamedaphne</i> , 155.	<i>colutea</i> differentie, 406. 405.
<i>Calendula</i> , 237.		<i>Chamadryos</i> diffe. variet. 209. 210.	<i>Colycea</i> Theo. an <i>Fragula</i> , 440.
<i>Calthe</i> differentie, 237. 256.		<i>Canuolulus</i> lege <i>Chamaeficus</i> , 442.	<i>Coudrille</i> , 82. 83. 85.
<i>Campanula</i> <i>lufura</i> , vide <i>canuolulus</i>		174. <i>Chamaelte</i> dif. varietates, 157. 158.	<i>consia</i> different. varietates, 145. 146
<i>Hederaceus</i> , 174.		<i>Chamaeleon albus</i> , <i>niger</i> , 367.	<i>consiligo</i> , vide <i>Ellebo</i> , <i>ferula</i> , Th. 351
<i>Caponula</i> differ. varietata, 139. 117.		<i>Chamaeleon lene</i> Theopb., 367.	<i>consolida</i> <i>Aurea</i> <i>memorum</i> , 125.
<i>Caphorata</i> , an <i>Chamaepuce</i> , Plin? 174		<i>Chamaeleonthe</i> <i>Monsp</i> , 366.	<i>consolida</i> , 271. 272. 272.
<i>Carchamon</i> , eiusque succedaneū, 428		<i>Chamaeluce</i> , 208.	lege <i>consolida</i> <i>minores</i> <i>Offi</i> , 199. 200
<i>Carnabie</i> species, varietates 226. 227		<i>Chamaemysilum</i> , 435.	<i>consolida</i> <i>maior</i> <i>Officinat</i> , 251.
<i>Cantabrica</i> Plin., 188.		<i>Chamaemulla</i> , 342.	<i>cor</i> <i>Indicum</i> , an <i>Poppyrum</i> , 228.
<i>Capnos</i> , vide <i>Fumarius</i> , 339.		<i>Chamaepuce</i> Plin. an <i>Caphorata</i> , 174	<i>coris</i> <i>Monspell</i> , & <i>Mat</i> , 174.
<i>Capparis</i> , 281.		<i>Chamaepithis</i> mas lege <i>Auiga</i> , 164.	<i>coriandrum</i> , 314.
<i>Capsicum</i> <i>Aluaurū</i> , 134.		<i>Chamaepitis</i> prima odorator <i>ibidem</i> .	<i>cornu</i> , utraque <i>famina</i> Th. & <i>Dod</i> .
<i>Capet</i> <i>Gilli</i> , an <i>Onobrychis</i> , 402.		71. <i>Chamaepitis</i> altera <i>Dios</i> , an <i>Pernicu</i> .	est <i>virga</i> <i>Sanguinea</i> <i>plumit</i> 436.
<i>Cardamine</i> , 71.		<i>lata</i> <i>frutescens</i> ? 163.	<i>coronops</i> different. varietata, 186. 187.
<i>Cardonouis</i> differ. vari. 444. 445.		<i>Chamaepitis</i> <i>mas</i> <i>hata</i> vide <i>Anthyllus</i>	<i>corpus</i> <i>persimilis</i> <i>Abo</i> , 441.
<i>Cardiaca</i> differentie varietates, 221.		<i>Chamaerhodoedros</i> dif. va. 154. 155	<i>coronops</i> & <i>Sedi</i> <i>media</i> <i>planta</i> , 187.
<i>Carduaria</i> dif. quāplurima, 364. 365		<i>Chameripha</i> , 451.	<i>corruda</i> , 353.
366. 367. 368. 369. 370. 371.		<i>Chamefeye</i> , 154.	<i>costus</i> <i>spurius</i> <i>Ilyricus</i> , 318.
372. 373. 374. 375. 376. 377.		<i>Chamaemelum</i> seu <i>Chamaemalu</i> , 342.	<i>costus</i> <i>albus</i> & <i>buxeus</i> , 24.
<i>Carline</i> varietates, differentie, 367.			

Moluccensis corticosus rugo- 236. *Dryopteris*, aut *Querna Filix*. 363.
sua. 35. *Gydonia mala*. 429-430. *Dalcamara* vide *Cyrea*, *Vari. filu*.
Moluccensis lignosus ferni- 269. *Cymbalaria Italica hedera folio*. 269
dior. 35 *Cymnium regium*, *Aethiopicū*, *Gal-*
Hortensis Gallus Cocq. 136. *latium*, *Basilicum Hippoc.* 330.

lege Catinas Plania & Rhus Allobrogū Sylvestre Gminium
 413. *Diof.* } 330.

Caeonaria vulpi, vide *Gnaphaliū*. 200 *Alterum silicosum*
Cotula vide *Anthemides*. *Cynara* vide *Scolymus Sativus*.

Cotula sine Partheniū maximum mi- *Cynocrambe*. 100.
nimum. 345. *Cynoglossū*. 250. *Echion* sine *Buglossum agreste*. 249.

Coryledon. 164. *Cynobatos*. 374.
Coryledon minus sed folio mōt anū 165 *Cyperus rotundus duplex*. 37.
Coryledon aquatica acris Sepeñ-ionia *Cyperus longus duplex*. 37.

lum. 165 *Cyperus Graminea*, sine *miliacea*. 38. *Elaterii optima nota parā*, mod^o 288
Coryledon maritimum, vide *Androsa-* *Citrus flos Punici*. 387.

ebri. 165. *Cytisus Dioscorid.* & *Galenii*. 387. *Fusch*. 197.
Crategmus. 11. *Cytisus altera minor* & *vulgar*. 388. *θαλασσιος Theo* sine *Agnus castus*. 423.

Cytha Galls recentiorū, *nium alexro-*
esloph & *Pl.* an *nium potius Al-*
liaria recentiorum. 227.

Cytha Galls altera, sine *Pedicularis*
ibidem. 165. *Dactylon gramin Plin.*

Coryfegonū vide *Tormentilla* & *Blar-*
ioria. *Daphnoides* vide *laureola*. 156. *Daucus* *Greticus* versus *Diof.* } 323

Cribbium, seu *Cribhamon*, an *Portu-*
laca Marina? 165. *Daucus nigri Theop.* *Carotta*. } 323

Cribbium tertium Mat. *Alter At-* *Daucus vstator* *Officinariū*, *ibidem*. 329. *femine Libanotidis*, vide *Cribmū*.
ticus Martius. 168. *Delphinion*. 83. *Endivia*, sine *seris satina*. 85.

Cribbium quicquid Mat. 168. *Dent Leonis alter* *Monspel.* 84. *Endiviarum Varietas*. 86.
Major Plinii. 271. *Dent Leonis*, sine *Virinaria*. 84. *Endivia filu*, non *est laetuca syl.* 86.

Cōsol. *Minor purpureus*. 272. *Dentillaria Rōdeltii*, an *Mohidena* *Endivia filu*, non *est laetuca syl.* 86.
ulius. *Minimus foliis Lynaria* 274. *herba Pl.* *Lepidū Pauli* *Mon-* *Ephemerū*, sine *strangulatorium* *Gro-*

Cornelus hederaceus. 174. *spell*. 136. *Cistolū* & *Bulbifolium* *hermodactyl-*
Magnum Aty. } 368. *Diacidium* vide *Scammonium*. 214. *Ephemerū* *Syri-* *cama* & *Alexan-*

Crocodilū *Marantia* & } 368. *Distamus*. 214. *Ephemerū* *Anglicū* *flore candido*, 54.
Fuschii. 53. *Digitalis* *latea*. 145. *Ephemerū* non *venenatum* *Dioscoridi*

Crocus sativus & *silvest.* 53. *Digitalis* *latea*. 145. *Ephemerū* non *venenatum* *Dioscoridi*
Cristata vide *Gentianellas*. 358. *Diosanthos* *Theoph.* *videtur Superba* *Lithisterium*, *Iridifolium*, an *Her-*

Cristata minor. 264. *Germanorum*. 288. *Dispacum* an *spina Selenites* *Theoph?* & *Pauli* *idem*. 54.
Cyclamen folio hedera. 288. *Dispacum* an *spina Selenites* *Theoph?* & *Pauli* *idem*. 54.

Cucumer *Elaterii* *silvest.* 427. *Galedragon* *Senocratis* *Ang.* *Dispacum* *sativum* *fullonū* & *sponte nascentium* *labris veneris* *asceramen*. 373. *Epipatris duplex* *recentiorum*, sine *Elleborine*. 132. 131.

Cubebe. 287. *Doronic Varietates*. 290. *Epithymum*. 181. 183.
Cucumis. *Flexuosus* sine *Angui*. 285. *Dorex* *Norbonensium*, an *Theophr.* 388. *Epithymbra*. 181. 183.

Cucurbita sine *Zuccha*. 287. *Dorex* *Norbonensium*, an *Theophr.* 388. *Epithymbra*. 181. 183.
Varietates, *Lagenaria maior* & *minor*. 287.

Cucumis *silvest.* 288. *Doronic Varietates*. 290. *Epithymum*. 181. 183.
Cucurbita *Sylue*, *amara* apud *Elizeū* *Dorycinon* & *Monspeliense*. 388. *Epithymbra*. 181. 183.

Prophetam 237. *Dorterbloemen* *Germanorum* vide *Equisetum* vide *Hippuris*.
Cenila sine *Origanū* *Heracleoticum*. *Cultra palustris* & *sarfrugū*. 256. *Eranthemum* 344.

Cupressas. 446. *Draba* vide *Arabis*. 78.
Cuticoma. 33. *Draco* aut *potius Tarchon Symeonis* 190. *Erica* } *Vulgarior*.
Gariis vulgaris. 236. *Seti* & *Auicenna*. 190. *Erica* } *leg. Pennilla*.

Gariis { *Major hortensis*. 236. *Dracuncul* *maior*, sine *Dracutia*. 261. } *Minor* *Linperifolia*.
Minimus Spalten. 236. *Dracuncul* { *Aquatica*. } 261. } *Major* *Norbonensi*.
Pteromatus repens capi- } *Minor*. } *Corysanthemum minima*, *Se-*
lego Pl. *quorundam*. 447. }

Gariis { *Major hortensis*. 236. *Dracuncul* *maior*, sine *Dracutia*. 261. } *Minor* *Linperifolia*.
Minimus Spalten. 236. *Dracuncul* { *Aquatica*. } 261. } *Major* *Norbonensi*.
Pteromatus repens capi- } *Minor*. } *Corysanthemum minima*, *Se-*
lego Pl. *quorundam*. 447. }

Gariis { *Major hortensis*. 236. *Dracuncul* *maior*, sine *Dracutia*. 261. } *Minor* *Linperifolia*.
Minimus Spalten. 236. *Dracuncul* { *Aquatica*. } 261. } *Major* *Norbonensi*.
Pteromatus repens capi- } *Minor*. } *Corysanthemum minima*, *Se-*
lego Pl. *quorundam*. 447. }

Gariis { *Major hortensis*. 236. *Dracuncul* *maior*, sine *Dracutia*. 261. } *Minor* *Linperifolia*.
Minimus Spalten. 236. *Dracuncul* { *Aquatica*. } 261. } *Major* *Norbonensi*.
Pteromatus repens capi- } *Minor*. } *Corysanthemum minima*, *Se-*
lego Pl. *quorundam*. 447. }

Gariis { *Major hortensis*. 236. *Dracuncul* *maior*, sine *Dracutia*. 261. } *Minor* *Linperifolia*.
Minimus Spalten. 236. *Dracuncul* { *Aquatica*. } 261. } *Major* *Norbonensi*.
Pteromatus repens capi- } *Minor*. } *Corysanthemum minima*, *Se-*
lego Pl. *quorundam*. 447. }

Gariis { *Major hortensis*. 236. *Dracuncul* *maior*, sine *Dracutia*. 261. } *Minor* *Linperifolia*.
Minimus Spalten. 236. *Dracuncul* { *Aquatica*. } 261. } *Major* *Norbonensi*.
Pteromatus repens capi- } *Minor*. } *Corysanthemum minima*, *Se-*
lego Pl. *quorundam*. 447. }

Gariis { *Major hortensis*. 236. *Dracuncul* *maior*, sine *Dracutia*. 261. } *Minor* *Linperifolia*.
Minimus Spalten. 236. *Dracuncul* { *Aquatica*. } 261. } *Major* *Norbonensi*.
Pteromatus repens capi- } *Minor*. } *Corysanthemum minima*, *Se-*
lego Pl. *quorundam*. 447. }

Gariis { *Major hortensis*. 236. *Dracuncul* *maior*, sine *Dracutia*. 261. } *Minor* *Linperifolia*.
Minimus Spalten. 236. *Dracuncul* { *Aquatica*. } 261. } *Major* *Norbonensi*.
Pteromatus repens capi- } *Minor*. } *Corysanthemum minima*, *Se-*
lego Pl. *quorundam*. 447. }

E

Ebenus vide *Hebenus*.

Ebulus. 434.

Echinus Galeni vide *Erinos*. 216.

Echion sine *Buglossum agreste*. 249.

Echinomelocallos vide *Melocar-*

duus. 374.

Elaterium albū *Dio*, *lucernis admo-*

tum *facile* *accenditur*. 288.

Elaterii optima nota parā, mod^o 288

Elatine *Dioscorid.* *Veronica* *famina*

Fusch. 197.

θαλασσιος Theo sine *Agnus castus*. 423.

θαλασσιος *Chrysanthemum*. 331.

Ellebo, albū, sine *Epipatris*. 132. 131

Ellibor, *Alpina* *Sanicula* *facie*. 298

Elliborum *album*. 131.

Elleborus nigri *Theo* *fol.* *Ferula* 351

Elipho *Hispanica*, vide *Spartium mi-*

nus. 408.

Empetron Rōdeltii, *Batis* *Pl.* *folio*

crasso in *modū* *Porinace*, *flore* *albo*,

femine *Libanotidis*, vide *Cribmū*.

Endivia, sine *seris* *satina*. 85.

Endiviarum Varietas. 86.

Endivia filu, non *est laetuca syl.* 86.

Ephemerū, sine *strangulatorium* *Gro-*

cistolū & *Bulbifolium* *hermodactyl-*

li *vulgares* *Syl.* *Crocum* *vulgi*. 53.

Ephemerum *Syri-* *cama* & *Alexan-*

drinum. 54.

Ephemerū *Anglicū* *flore* *candido*, 54

Ephemerū non *venenatum* *Dioscoridi*

Lithisterium, *Iridifolium*, an *Her-*

modactylū *Officinarium* *Traliani*

& *Pauli* *idem*. 54.

Epimedium an *Epipetrum*, vel *Ep-*

meron *Plinii?* 138.

Epipatris duplex *recentiorum*, sine

Elleborine. 132. 131.

Epipetrum *Pl.* vide *Epimedium*. 138

Epipetrum *Theop.* vide *Acinus*. 215.

Epithymum. 181. 183.

Epithymbra. 181. 183.

Equisetum vide *Hippuris*.

Eranthemum 344.

Eranthemum 344.

Eranthemum 344.

Eranthemum 344.

Eranthemum 344.

Eranthemum 344.

Eranthemum 344.

Eranthemum 344.

Eranthemum 344.

<i>Eriogonum</i>	79.	<i>Faniculi varietates, differentia.</i>	347	<i>Glaux altera.</i>	178.
<i>Eruca</i>	216			<i>Globularia.</i>	200. 199.
<i>Eruca</i> ¹ <i>Tarentia, varietates.</i>	68. 69.	<i>Faniculum</i>		<i>Glycyrrhiza differentia, varietates.</i>	
<i>Eruca</i> ² <i>insigne.</i>	399				405. 406.
<i>Eruca</i>	397.			<i>Gnaphalium.</i>	200. 201. 203
<i>Eriogonum differentia, varietates.</i>	375.	<i>Fenum Foeniculi.</i>	382.	<i>Gnaphalium Tragi, vide luncum Bom-</i>	
<i>Eriogonum Luteum Menfellensium Foenogracum.</i>			387.	<i>bucinum.</i>	
<i>vide Schoymos Theophr. an Eriogonum</i>		<i>Flammula vulgi, vide Clematis albe-</i>		<i>Gossypium, sine indicio.</i>	291.
<i>Arachnidi simile Archigeni.</i>	72.			<i>Gramina.</i>	1. 2. 3. 4.
<i>Ag.</i>		<i>Forsythia</i>		<i>Graminum Regium Mes, vide Rati-</i>	
<i>Erysimum vernum Dioscori.</i>	69.			<i>mus.</i>	
<i>Erysimum Theophr.</i>	395	<i>Folium Indicum: Malebatru.</i>	129.	<i>Gnatia recentiorum, an Spumeum.</i>	
<i>vide Belgarum Bonckwoep. Tra-</i>		<i>Fraga fragaria</i>	308.	<i>Varietates.</i>	<i>Papaver Dioscori,</i>
<i>gotrophou Dodo. Frumentone Ita-</i>		<i>Fraxinella, an Tragio.</i>	410.	<i>Gnatacinum.</i>	439.
<i>lorum.</i>		<i>Fraxinus.</i>	416.	<i>Gnatacinum Fallopij, Patavinu ibide.</i>	
<i>Erisalis, vide Acarna. Cusum lu-</i>		<i>Fraxinus Bubula, Sorbus syl.</i>			
<i>teum: Sequacorum.</i>		<i>Frumentum Triticum.</i>	13.		
<i>Erythrodanum maritimum vide Rubia</i>		<i>Frumentone Italorum, Bonckwoep</i>			
<i>maior & Rubia minor.</i>		<i>Belgarum.</i>	395.		
<i>Erglenine.</i>	446.	<i>Fumaria varietates, differentia.</i>	338		
<i>Esula</i> ¹ <i>Maiores, an su Diosc. pragan-</i>			339.		
<i>dis frutescens Puzos: 151</i>		<i>Furpur-ortum, vide Elpho.</i>	408.		
<i>Minor.</i>	151.				
<i>Esula rara Venetorum.</i>	160.				
<i>Euanimum Theophrast.</i>	435				
<i>Eupatorium Graco. Agrimonia.</i>		<i>Gazel Germanorum.</i>	417.	<i>Halicacabum vide Solanum vesicari-</i>	
	308.	<i>Gilunga maior & minor.</i>	30.	<i>um.</i>	
<i>Eupatorii Mesia varietates.</i>	207.	<i>Gilunga.</i>	392.	<i>Hedera differentia.</i>	169.
<i>Costum minor hortensis Gesleri.</i>		<i>Gilopsis Lutea, vide Colum Jonu</i>	247.	<i>Harmala Syriaca, an su Sesamoides</i>	
<i>Euphrasia, Euphrosyne.</i>	210	<i>Galla.</i>	432.	<i>magnum Dioscori.</i>	390.
<i>Esula dulcis.</i>	216. vide Ernos.	<i>Gallia.</i>		<i>Harindum, sine Cannatu differentia</i>	
<i>Esula Sylvest. Tragi.</i>	216	<i>Gallion, sine Galion luteum.</i>		<i>& varietates.</i>	19. 27. 28.
		<i>Album</i>	358		
		<i>Gariophyllata sine Genm alpinum re-</i>		<i>Hedypnois Plinii, dentis Leonis flore.</i>	
		<i>centiorum.</i>	267.		

F.

<i>Faba Aegyptia, sine Colocasia, an su</i>		<i>Gelseminum flore</i>		<i>Albo &</i>	
<i>Aron Aegyptium?</i>	259.			<i>Luceo.</i>	415.
<i>Faba unguis, vide Telephium.</i>	167.	<i>Genista</i>			
<i>Faba Antiquorum & recentiorum.</i>	407.	<i>Genistella species, varietates</i>			
<i>varietates, differentia.</i>	392. 393.	<i>Genista spartium spinosum.</i>			
<i>Fagus.</i>	433.	<i>Genista rapum. ibidem.</i>			
<i>Fagus Theophr. vide Galla.</i>	432.	<i>Gentiana, Gentianella varietates, dif-</i>			
<i>Farfara.</i>	254. vide Tusilago.	<i>ferentia.</i>	129. 130.	<i>lege Helichrysum, Chrysanthemum, si-</i>	
<i>Farfagum herbariorum, vide Caltha</i>		<i>Geranij varietates, differentia.</i>	296.	<i>ne solis flus. 331. 332.</i>	
<i>palustris.</i>	256.			<i>Helictropium minus, minus, & repens</i>	
<i>Ferula: Ferulago.</i>	348.	<i>Getium, vide Iacca nigra.</i>		<i>100.</i>	
<i>Ficaria, vide Scrophularia.</i>	230.	<i>Gingidu species.</i>		<i>Helictropium tricocon Pl.</i>	100
<i>Ficus & varietates.</i>	442.	<i>Gub, vide Melanthium.</i>		<i>Helleborus foeniculaceus, vide Buph-</i>	
<i>Ficus Indica varietates.</i>	454.	<i>Gladialis.</i>		<i>thamum Dod.</i>	351.
<i>Filago, vide Gnaphalium.</i>	201.	<i>Glenis vinguetaria.</i>		<i>Helleborastri & Consiliginis.</i>	303.
<i>Filipendula, an Molon Plinii, vide Glaucium, vide Isatis.</i>		<i>Oenanthe.</i>	325	<i>Helleborus niger.</i>	304.
<i>Fibipendula altera montana ibidem.</i>		<i>Glaucium.</i>		<i>Helixine parietaria, sine vitriola.</i>	98.
<i>Fibices.</i>	362.			<i>Helvine Cissampelos.</i>	274.
<i>Fibula vide Polyadum.</i>				<i>est Scammonium tenue Plinii Ang.</i>	
<i>Flix Tragi, vide Holostium.</i>		<i>Glaucium Venetorum.</i>		<i>Cissampelos altera, Atriplicis effigie,</i>	
<i>Flos Cuchis est Armeniaca syl. pra-</i>		<i>Glaux maior vulgaris.</i>	402.	<i>inter volubiles.</i>	
<i>tensis, 189.</i>		<i>Glaux vel Glaux quadam legumina-</i>		<i>Hemerocallis inter Lilia.</i>	
		<i>sa herbariorum.</i>	402.	<i>Hemennus sine sterulis.</i>	359.

H.

G.

<i>Heranthemum</i> , Dodo. an. <i>Phlora</i> , <i>Hypsoelinum</i> Mat. <i>Leuciscum</i> Of-	<i>Laburnum</i> Ph. an <i>Cytisus</i> 2. Theop.
sive <i>viola flammula</i> Theophr. <i>Adonis</i> Marb.	312. <i>Lacca Arabum</i> . 428.
<i>Herba Doris</i> . 124.	<i>Hysopus</i> <i>Dioscoridis</i> <i>Origanifolius</i> . <i>Lachryma</i> Job. 16.
<i>Herba Iudaica</i> sive <i>Tetralix</i> , vide <i>Sideritis</i> <i>Heraclia</i> . 224.	<i>Lactuca differentia & varietates</i> . 89.90.
<i>Herba Paradisi</i> , vide <i>Phlomis</i> .	<i>Lagopi differentia, varietates</i> . 383.
<i>Herba Paris</i> , seu <i>tetraphyllon</i> <i>Solanum</i> . 105.	<i>Hysopus candida</i> <i>Anglorum</i> . 185. 384.
<i>Herba sancta</i> <i>Indorum & Herba</i> <i>Regia</i> . 251.	<i>Lamium</i> <i>Plinis</i> , <i>Milfascella</i> <i>Italorum</i> ; vide <i>Gahopfi</i> . 222.
<i>Herba tunica</i> <i>Gordo</i> . 143.	<i>Lamium</i> , sive <i>Archangelica</i> , alba flore. 223.
<i>Herba turca</i> , <i>Herniaria</i> . 180.	<i>Lamium lucidum</i> . 223.
<i>Herba stellaria</i> , vide <i>sanicula</i> .	<i>Lampfana</i> . 70.
<i>Herba Vemi</i> <i>Rondel</i> , an. <i>Othomana</i> 229.	<i>Lampfana</i> <i>Dod. ibidem</i> .
<i>Hermodyteli</i> <i>Officinarius</i> . 54.	<i>Lapathi genera</i> . 115. & varietates. 119.117.
<i>Hermodyteli</i> albi & rubri <i>Nicolsi</i> , <i>Aquari</i> & <i>aborum</i> , non cathartici, sed cordi, venerique amici, an sint <i>Beben album & rubrum</i> ? 55.	<i>Lappa maior</i> . 253.
<i>Herniaria</i> . 180.	<i>Minor</i> , vide <i>Xanthium</i> . 254.
<i>Hieracium</i> varietates. 88.	<i>Lapsana</i> , vide <i>Lampfana</i> .
<i>Hippia</i> , <i>Alfione</i> . 193.	<i>Larve</i> . 449.
<i>Hippia minor & minima</i> 193.	<i>Laseris</i> , sive <i>Laserpitii</i> differentia. 312.
<i>Hippoglosson</i> . 283.	<i>Lathyrus</i> , sive <i>Cataputia minor</i> . 153.
<i>Hippolapathi</i> , varietates, differentia. 118.	<i>Lauro-dulcis</i> <i>fruticosa</i> . 184.
<i>Hippomastrium</i> , in <i>sanicula</i> .	<i>Lauri differentia</i> . 424.
<i>Hippophaes</i> . 375.	<i>Laurus</i> <i>Tinnus & Regia</i> . 424.
<i>Hippophastion</i> . 376.	<i>Lauri</i> <i>Alexandrea</i> <i>Dioscori</i> & <i>Hippioglossi</i> <i>discrimen</i> . 283.
<i>Hypsoelinum</i> , sive <i>Olusatrum</i> . 315.	<i>Laurcula</i> , vide <i>Chamedaphne</i> .
<i>Hippopartium</i> , vel <i>Rapum</i> <i>Genista</i> . 407.	<i>Laurete</i> , vide <i>Medica</i> .
<i>Hippopurum</i> una videtur <i>Caucum</i> , & <i>Ephedra</i> <i>Plinii</i> , minus tamen insensibus apta est. 355.	<i>Ledon</i> . 418.
<i>Hortulus</i> . 233.	<i>Lens</i> , sive <i>Phasolus</i> . 401.
<i>Hirundinaria</i> utraque. 256.	<i>Lentifolius</i> . 411.
<i>Holostis</i> varietates, differentia. 17.	<i>Leontopetalon</i> . 305.
18.	<i>Leontopodium</i> , sive <i>Pes Lemni</i> . 202.
<i>Hordei</i> varietates. 7.10.	<i>Lepidi</i> <i>Diosc.</i> <i>Aginetia</i> , <i>Etiop.</i> <i>Mā</i> <i>bellens</i> , varietates, differentia. 77.
<i>Hormoni</i> differentia. 240.	136.135.
<i>Hyacinthi</i> varietates. 46.47.48.	<i>Leucas</i> <i>Pentaphylli</i> <i>facie</i> , an <i>Diosc.</i> ? 307.
49.	<i>Leucacantha</i> . 371.
<i>Theocriti & Poetarum</i> <i>Hyacinthus</i> flore <i>Iridis</i> . 47.	<i>Leucanthemi</i> odorati varietates. 343.
<i>Hydrolapathum</i> <i>magnum & pusillum</i> 117.	<i>Leucanthemi</i> , vide <i>Anthemi</i> .
<i>Hydrociper</i> . 134.	<i>Leucoi</i> varietates, & differentia. 141.
<i>Hysocyami</i> differentia, varietates. 107.	lego <i>Leucoum</i> dupli floribus. 141.
<i>Hypocoon</i> <i>falsum</i> <i>Mathioli</i> , <i>Argemone</i> altera <i>Fusch.</i> <i>Alcea</i> <i>Venerorum</i> .	142.
<i>Hyperici</i> differentia, varietates. 173.	<i>Leuciscum</i> <i>Offici</i> , vide <i>Laserpitium</i> .
<i>Hypocistis</i> . 418.	<i>Labanotis</i> , vide <i>Rosmarini</i> <i>ferulacei</i> .
	<i>Libanotis</i> <i>Theophr.</i> <i>Sefela</i> <i>Aethiopis</i> cum <i>Mat.</i> 313.
	<i>Libanotis</i> notior <i>Herbariorum</i> <i>Septem</i> <i>trionalium</i> 351.
	<i>Lignistrum</i> <i>Diosc.</i> 420.
	<i>Lilac</i> <i>Mat.</i> non est <i>Ben</i> . 414.
	<i>Lilioracissus</i> <i>luteus</i> . 52.
	<i>Lilioracissus</i> <i>sanguineus</i> . 52.
	<i>Lili</i> differentia, varietates. 60. 61.

I.

K.

L.

<i>Calium luteum.</i>	45.	<i>Malum asyrium, vulgo Pontices.</i>	<i>pyrum Dod. vide trifolium.</i>
<i>Lilium corniculatum, vel vernum.</i>	425.		<i>Mentha quadruplex.</i> 218.
<i>Theoph.</i>	61.	<i>Mala Cotenca.</i>	430. <i>Mentha sifymbria aquatica.</i> 218.
<i>Limonium.</i> 425. <i>Lima, ibidem.</i>		<i>Alia genera, & varietates.</i> 292.	<i>Mentha Cati.</i> 219. 220. non est
<i>Limonium.</i> 122	293. 295.		<i>Nepeta antiquorum.</i>
<i>Limonium germanicum, seu pyrola.</i> 122.		<i>Mammula.</i>	36. <i>Mentastrum.</i> 218.
<i>Patrum Limonium Norbontense olea</i>		<i>Mandragoras Theophr.</i> an.	<i>Mentastrum muscum Anglicum.</i> 219
<i>folium.</i> 123.		<i>longena.</i>	<i>Mevn, sine men. perperam.</i> Libano
<i>Limonium secundum Matth. ibidem.</i>		<i>Mandragoras.</i>	106. <i>tu prima Dod. foli.</i> 197
<i>Linosyris, vide Mercenialis.</i>		<i>Mandragoras semina ibidem.</i>	<i>Mercenialis mas semina.</i> 100
<i>Linum sativum.</i> 176.		<i>Manna, Manlia.</i> 23. 24.	<i>Mai sylvest. vide Cynecrambe.</i>
<i>Linum maritimum luteum, an. Offici</i>		<i>Manna Israelicum quantum?</i> 26.	<i>Mispilus.</i> 434.
<i>Dioscorid.</i> 178.		<i>Manna varietates.</i> 26.	<i>Mispilus aronia.</i> 443. <i>lege Italorum</i>
<i>Lupolia Campanula lutea.</i> 177.		<i>Marathi differentia, varietates.</i>	<i>Ararollis non asafides.</i>
<i>Linaria purpurea & lutea.</i> 233. <i>nam</i>			<i>Melegia, sine Melegior.</i> 22.
<i>antyrhoides P. vide Offici</i> 175. 176		<i>Mariana viola, vide Medium.</i>	<i>Milium.</i>
<i>Lanopartium.</i> 408.		137.	<i>Milium Indicum Plinianum.</i> 113.
<i>Labispermum maius & minus.</i> 192.		<i>Marrubii, differentia, varie.</i> 222.	<i>Milium Soli utrumque.</i> 193. 192.
<i>Labispermum Plinii, sine Lachryma</i>		<i>Marrubium aquaticum vulg.</i> Side-	<i>Milfoli, sine Malabar, differen-</i>
<i>Job.</i> 16.		<i>rais Mat.</i>	224. <i>na varietates.</i> 333.
<i>Loli variet. differ.</i> 10.		<i>Matagon, vide Lilia.</i>	<i>mil. Theophr. vide Taxus.</i> 450.
<i>Lanchitis utraque.</i> 383. 384.		<i>Marum, sine Maltic Gallor.</i> 213.	<i>Mullembria sine Scrophularia maior.</i>
<i>Lotus arbor D. & Theo.</i> 439.		<i>Marum Syriacum.</i> 213.	230.
<i>Lotus Aegyptia, vel Nilotica.</i> 385.		<i>Matricaria nostras, non. respondet</i>	<i>Mullegrana Cordi, vide Herniaria.</i>
<i>Lotus hortorum odora, urbana.</i> 384.		<i>Parthenio Pauli & Plinii.</i> 335.	180.
<i>Lotus trifolia pratensis Monsp.</i> 384.		<i>Matronalis Viola, an. Damascena.</i>	<i>Mulletralla Anguilera, Lamium.</i>
<i>Lotus fil. Diosc.</i> 384.		137.	<i>Dioscor.</i>
<i>Lunaria Græca Recentiorum non est</i>		<i>Matutina Septentrionalium.</i>	7. <i>Mezeron Arrabum verum.</i> 157.
<i>armoracia Dioscori. neque Thlaspi.</i>		<i>Meconium.</i>	111. <i>Mezeron Germanicum, vide Chama-</i>
<i>Cræna.</i> 137.		<i>Mede Moscoitarum.</i> 22.	<i>daphne.</i> 213.
<i>Lunaria Racemosa Cetrachii foliis ra-</i>		<i>Medica herba, vide sanum Bar-</i>	<i>Moly Dioscorideum putatum.</i> 59.
<i>cemulis Ophoglossi.</i> 360.		<i>gndiacum.</i>	<i>Moly Liliflorum Homericū fortē.</i> 60.
<i>Lunaria an Nitzegretum Plinii.</i>		<i>Medica tres in semine variet.</i> 383.	<i>Moly Hippocraticum est allium vrsi-</i>
<i>Lupinus sativus & sylvest.</i> 396.		<i>Medicamarina.</i> 383.	<i>num.</i> 59. 60.
<i>Lupulus salutaris.</i> 277.		<i>Medium, an. Viola Mariana.</i>	<i>Moly Pl.</i> 18.
<i>Luteola.</i> 149.		137.	<i>moibdena Plin.</i> 135.
<i>Lychmidis differen. varie.</i> 142. 143.		<i>μλκων πόας papaver.</i>	111. <i>monorica, vide Balsimi, cucumerina</i>
<i>Lycium Nerbo, seu Pyxatiba.</i> 419.		<i>Melissacharum.</i>	25. <i>μολισχυλιν recentiorum.</i> 127.
<i>Lycopus.</i> 249.		<i>Mel apum commune.</i>	22. <i>monus Gallina folio Hederula.</i> 194.
<i>Lysistichum.</i> 316.		<i>Mel Cedreum Hipp. & Syriacum.</i>	<i>monus Dianthi.</i> 235.
<i>Lysimachia lutea, cerulea vari.</i> 144.		24.	<i>monus Rana.</i> 258
145.		<i>Melampyron Dodo. an Alopccaros</i>	<i>monus varietates, differentie.</i> 442.
<i>Lysimachia cerulea hortensis Veroni-</i>		<i>Plinut</i> 11	<i>mulsa.</i> 22.
<i>careica quoniamdam.</i>		<i>Melampyrum alterū Neotericorū.</i> 11	<i>mulsa.</i> 451.
M.		<i>Melampyrum per pusillum luteū.</i> 11.	<i>muscipula, sine Piscaria.</i> 189.
<i>Macalee, vide Phytorea arbor.</i>		<i>Melanthia, sine Nigella.</i> 329.	<i>Altera muscosa flore.</i> 190.
421.		<i>Melanthi differentia, varietat.</i> 306.	<i>myagros.</i> 78.
<i>Macer.</i> 426.		<i>Melegetta, vide Cardamomin.</i>	<i>myosoides.</i> 193.
<i>Mais Occidentaliū.</i> 13.		<i>Melissophylli varietates, differentia.</i>	<i>myrica, vide Thamariscus.</i>
<i>Malabatri folium.</i> 129.		220. 221.	<i>myrobalem Arabum omnes.</i> 439.
<i>Malorum genera.</i> 434.		<i>Melomema, vel mala insana.</i> 106	<i>myriophyllum, vel maratryphyllum pal-</i>
<i>Mala Medica.</i> 425.		<i>Melo vngi.</i> 285.	<i>lustre.</i> 354.
<i>Mala panica, sine Granata.</i> 419.		<i>Melonis varietates ibidem.</i>	<i>Myrioph. equisetifolium fluviatile.</i>
<i>Mala Persica.</i> 423.		<i>Melocardus, seu Echimomelocac-</i>	354.
<i>Mala aurea Lycopersicum quibusdam</i>		105.	<i>myrrhida P. Rostrū Ciconia.</i> 296.
<i>vide Glaucium.</i>		<i>Melocopo, sine Batecha</i>	<i>Aucenna myrrha.</i> 428.
		<i>semine nigro.</i> 230.	<i>myrrhis diff. varietates.</i> 327.
		<i>Menianthes Palustris Theophr.</i> 150.	<i>Myrrachantha sine Ruscu.</i> 283.

<i>Asyrtillus</i>	419	<i>Oelcomeli.</i>	25.	<i>Panicum fibroft.</i>	15.
<i>Asyrtus minor</i> , 'maior', candida.		<i>Oenanthe herba varietates & gene-</i>		<i>Panicum caralium Indicum</i> , unde	
419.		ra.	325.326.	forte Indum <i>Dioscori.</i>	
<i>Myrtacantha</i> , vide <i>Ruscus</i> .		<i>Oenanthe labrusca</i> , vide <i>tutis</i>	unste-	<i>Papaveris</i> differenc. variet. 110.	109
<i>Myxa</i> <i>Egnete.</i>	437.	ra.	277.	111.	
N.		<i>Olea arctifolia</i> sine <i>Oleaster.</i>	422.	<i>Papaver Spachium</i> , an <i>Gratiola recta</i>	
<i>Napelli</i> varietates differenc.	301.	<i>Olea & varietates.</i>	422.	tiorum.	185.
<i>Nicotiana glabrum</i> , sine Indorum.		<i>Oleatum</i> , vide <i>Holostium</i> .		<i>spumum eruorum.</i>	143.
<i>Sanafanta.</i>	251.	<i>Oleatum</i> , vide <i>Hippocelatum.</i>		<i>Pappus Nilotica.</i>	38.
<i>Napellus masca.</i>	302.	<i>Olyra.</i>		<i>Pappus latifolia Brasilia.</i>	39.
<i>Napus</i> , sine <i>Bunias</i> , a <i>Bunio</i> diversus		<i>Onagra</i> , sine <i>Alulebruta.</i>	423.	<i>Papyracea arundo.</i>	40.
67.		<i>Onobrichis</i> , vide <i>polygala.</i>	179.	<i>Parietaria</i> , vide <i>Helxine mararia.</i>	
<i>Napus</i> , sine <i>Bunias</i> sylvest.	67.	<i>Ononis</i> , aut <i>Axonis</i> varietates.	378.	<i>Paronychia</i> , <i>Alinesfolia.</i>	196.
<i>Narcophthon.</i>	36.	<i>Ophisma.</i>	249.	<i>Paronychia altera folio rutaceo.</i>	196
<i>Narcissi</i> genera, varietates.	50.	<i>lego Ophioglossum</i> sine <i>Henophyll.</i>	360	<i>Parthenium non est matricaria.</i>	344
51.52.		<i>Ophioscorodon.</i>	59.	<i>Parthenii</i> varietas.	344-
<i>Nardi</i> differentia varietates.	42.43	<i>Opium.</i>	111	<i>parthen. marinum minimu</i> , vide <i>Cotula</i>	
<i>Nardi celtica</i> differentia.	132.133	<i>Opobalsamum.</i>	415.	<i>Passerina unicaulis herbariorum</i>	
<i>Nardus</i> } <i>Montana.</i>	320.	<i>Orchis</i> , vide <i>Tefliculus.</i>		<i>naria</i> , aut <i>luteola figura.</i>	328.
} <i>Italica.</i>	184.	<i>Orizoni</i> varietates, differentia.	211	<i>Paralatica alpina fanicula</i> , vrsi auri-	
<i>Nardus Rustica</i> , vide <i>Asara.</i>	262.	<i>Ornithum</i> , satium, vide <i>Hormi-</i>		<i>culum recentiorum</i> , figura <i>primula</i> sed	
<i>Nasturtium.</i>	72.	num.		floribus purpureis.	244.
<i>Nasturtium Babyloniu</i> , vide		<i>Orinthogeli</i> varietates.	56.	<i>Pastinaca</i> varietates, differentia.	316
<i>ba.</i>		<i>Dracopis</i> <i>opodium</i> sine <i>po anis.</i>	403.	317.	
<i>Natrix Pl?</i>	378.	<i>Orobis</i> herbariorum.	400.	<i>Pecten veneris</i> , vide <i>Scandix.</i>	
<i>Nepa Theoph.</i>	353.	<i>Oryza.</i>		<i>Pedicularis Alethorolophos.</i>	334.
<i>Nepeta</i> , vide <i>Calamintha.</i>		<i>Oryza Plinii</i> , ibidem.		<i>Tentaphylla</i> , vide <i>Quinquifolia.</i>	
<i>Nerion purpureum & album.</i>	154.	<i>Osmunda Recentiorum Filix florida</i> , pepus.			153.
<i>Neris ficut arbor.</i>	452.	<i>Ostrya Pl.</i> <i>Antirrhinum.</i>	175.	pepus.	153.
<i>Nigella</i> , vide <i>Melanthia.</i>		<i>Ostrya purpurea.</i>	176.	<i>pepulum</i> genera, varietates.	280.
<i>Noli tangere</i> , sine <i>Perficaria</i> filiquosa.		<i>Ostrya purpurea cerula repens.</i>	176.	<i>percheper Angeloru</i> , an sit <i>scandix?</i>	
135.		<i>Othboma</i> <i>italorum</i> , aut <i>flos Aprorica</i> .			
<i>Norbonensium dorea.</i>	124.	perfoliatum vulgariu flore luteo folio			
<i>Nux Acellana.</i>	441.	nnu.	318.	umbilicatus.	1714
<i>Nux Indica.</i>	451.	<i>Othboma</i> , an herba <i>Venti Moßi</i> .	229	<i>perfoliata filiquosa.</i>	172.
<i>Nucula Indica.</i>	451.	<i>Oxalida.</i>	119.110.	<i>peryclimenum.</i>	
<i>Nux ingians & earam conditura.</i>		<i>Oxyacantha.</i>	443.	<i>peryclimeni duplex varietas</i> .	
416.		<i>Oxyacanthus Theo.</i> an <i>Iuniperus prima</i>		ibidem.	280.
<i>Nucula terrestris Septentrionalium.</i>		<i>Dioscorid.</i>		<i>peryclimeni alteru incertum</i>	
an sit <i>Bunio</i> <i>Dioscoridis</i> & bulbo-		<i>Oxis Pliniana</i> , vide <i>trifolium.</i>		<i>periplocia repens.</i>	100.
castanum <i>Trallueni?</i>	331.	<i>Oxytrichyllis</i> <i>Scribonii</i> varietates, vi-		<i>persica malus.</i>	423
<i>Nux peregrina Indica non biforis.</i>		de <i>Trifolium.</i>		<i>perficaria filiquosa</i> , sine <i>noli tangere.</i>	
416.		P.		135.	
<i>Nux Metel Auicenna</i> , <i>Hyppoma-</i>		<i>Paeonia</i> differentia.		<i>perficaria</i> <i>Hidropiper.</i>	1344
<i>no Crataea.</i>		<i>Paluri</i> differentia.		<i>perfoliata plinii</i> , vide <i>arction.</i>	253.
<i>Nux Moscata</i> sine <i>Myrsica.</i>	424.	<i>Palma.</i>	437.	<i>personata</i> , vide <i>lappa maior.</i>	253.
<i>Nymphaea</i> via centimorbia, num <i>Ere-</i>		<i>Palmae reptatrices</i> <i>Theo.</i>	451.	<i>pes Anserinus</i> , sine <i>Atriplex.</i>	97.
<i>stedarum</i> <i>Theoph.</i>	198.	<i>Cefagioni tal.</i>		<i>pes Locusta</i> <i>Auicenna</i> , vide <i>Rapum-</i>	
<i>Nymphaea lutea</i> <i>Nenuphar</i> Offi.	257	<i>Palma pinus</i> , sine <i>Canifera</i> <i>Guinee.</i>		culu.	
<i>Alba.</i>		450.		<i>per Columbinus</i> , seu <i>Dioscoridis</i> alte-	
<i>Alba minor.</i>		<i>Palma Christi</i> , vide <i>Ricinus.</i>		<i>rum Granatum.</i>	296.
<i>Lutea minor</i> <i>Septentrionaliu</i> , 258.		<i>Palma Sancta.</i>	440.	<i>petasites.</i>	254
O.		<i>Palma sancta similibus arbor.</i>	440.	<i>petasites noni orbis.</i>	453.
<i>Ocimsistri</i> , sine <i>Ocimoidis</i> differen-		<i>Palum sanctum</i> ibidem.		<i>petrofolium</i> , sine <i>Oreofelinum.</i>	315
tia, varietates.	143 144.	<i>Panaces.</i>	312.112.114.	<i>petrofolium Macedonicum</i> ibidem.	
<i>Ocimi</i> varietates, differentia.	215.	<i>Pancratii</i> varietates.	57.49.	<i>peucedani facie poffila planta</i> an <i>psina</i>	
		<i>Panicu</i> , 14. <i>Mel frugiu</i> <i>Dioclis</i> <i>Ang</i>		<i>peucedani</i> <i>Dioscori</i>	3314
				<i>peucedani</i> <i>fasciculum</i> <i>porcinu</i> .	350.

<i>Phaces, vide Lens.</i>		<i>pisum vulgare maius.</i>	396.	<i>portulaca Marina, vide Crithmum</i>	
<i>Phalangium an Moly Plin.</i>	18.	<i>pisum Angulosum hortorū, an qua-</i>			168.
<i>Phalangium differentia, varietates, ubi-</i>		<i>dratum plinu?</i>	396.	<i>populus pumilla, vide Chamaeleuce.</i>	
<i>Phalaris herba.</i>	16.	<i>Pnyusa, sine panea, Officinatum Esu-</i>		<i>potades, sine Batades.</i>	317.
<i>Phalaris pratensis minor.</i>	16	<i>la minor.</i>	151.	<i>potamogeton, sine Fontalis.</i>	129.
<i>Phalaris asabii & Phasolis discri-</i>		<i>pnysa pregrandis frutescens Diosco-</i>		<i>poterion.</i>	377.
<i>men.</i>	394.	<i>an Esula maior Germanica? 151</i>		<i>primula veris, an antiquorum phlo-</i>	
<i>Phascolus vulgaris, Turcicave multi-</i>		<i>plantagina.</i>	127. 128.	<i>mides, sine verbasculi? 243. Eari-</i>	
<i>color faba, est simlax Hortensis</i>		<i>plantago aquatica, est ne Limonium</i>		<i>dem differentia & varietates.</i>	
<i>Dioscorid. 394. an Logos Gal. &</i>		<i>aut potius Asina?</i>	126.	<i>prunus syl. utraque</i>	436.
<i>Phalcos Theoph?</i>		<i>platanus.</i>	442.	<i>varietates</i>	
<i>Phellandrium Plin., vide Saxifraga</i>		<i>plumbago plin. herba, an Lepidium</i>		<i>lege prunepelches, sine prunepessi-</i>	
<i>utraque.</i>		<i>Pauli Monspell.</i>		<i>cus.</i>	
<i>Phellodius Theopbra.</i>	432	<i>pneumante Cordi, vide Gentiana</i>		<i>prunella. 199. Symphytum petreum.</i>	
<i>Phylarea duplex.</i>	420.	<i>minima.</i>	130	<i>pseudo apios, vide Apios. 204. 205.</i>	
<i>Phylarea arbor. an Macalch?</i>	421.	<i>Podagrarica germanica</i>	311	<i>pseudobunus potius quāvis pseudobu-</i>	
<i>Phleor Theoph.</i>	41.	<i>paonia femina.</i>	305.	<i>nion.</i>	70.
		<i>paonia mas.</i>		<i>pseudodictamn.</i>	215.
		<i>paonia promiscua.</i>		<i>pseudomclanthum.</i>	12.
<i>Phlomis sine</i>	243.	<i>polemonium.</i>	389.	<i>psylli varietas.</i>	186.
<i>Phlomis sine</i>		<i>Poli Montani & Marini varietates</i>		<i>psyllum marinum.</i>	186.
<i>Prunula variflora.</i>		<i>206. 207.</i>		<i>psyllum plinianum.</i>	386.
<i>Phoenix herba.</i>	10.	<i>podum Laeundula folio flosculis pal-</i>		<i>piarmica folio Taraconis.</i>	191.
<i>Phlora Valdensium & Thora.</i>	263	<i>ludi, Faemina Recentiorum.</i>	207	<i>piarmica altera Gallorum.</i>	191.
<i>Phn, vide Valerianas.</i>	319.	<i>polyacantha Theop. Aculeosa Grae.</i>		<i>phlora Valdensium, vide Thora.</i>	
<i>Phyllitis & Hemionitis.</i>	359.	<i>polynemon quasi multisibia, an Ca-</i>		<i>pulegium Regium fa?</i>	213. 214.
<i>Phyllon Theligonium famisiparium.</i>		<i>lamintha aquatica Belgarum?</i>		<i>mina & mas plinu</i>	
<i>Arrhenogonium mariparium.</i>	99.			<i>floribus albis.</i>	
<i>Phyllon Theophrast.</i>	100.		127.	<i>pulegium Cerium Norbonensium</i>	
<i>Phytosma Norbonensium.</i>	320.	<i>polycnemon alterum.</i>	217.	<i>odoratum.</i>	214.
<i>Picea, sine Pitys.</i>	450.	<i>polygalon Dod. num Onobrichis vera</i>		<i>pulcaris herba.</i>	186.
<i>Picnemos Creta Salonenfis Gallopro-</i>		<i>Dioscor.</i>		<i>pulmonaria maculosa folio Borraginis</i>	
<i>vincia.</i>	373.	<i>polygae varietates differentia.</i>	178.	<i>252.</i>	
<i>Timpanella aut Bipinnella, Anglorum.</i>			179.	<i>pulmonaria Gallorum flore Hierarii.</i>	
<i>Butriet.</i>	320	<i>polygala vera est vicia syl. 2. Dodo:</i>		<i>253.</i>	
<i>Timpanella utraque.</i>	321.	<i>polygonium Monspellensium.</i>	389.	<i>pulsatilla, vide Anemone.</i>	114.
<i>Pimpinella minor. Dancus Selinodis</i>		<i>polygoni maris femina differentia &</i>		<i>pyncocomos Creta Salonenfis.</i>	373.
<i>Cordi.</i>	321.	<i>varietates.</i>	179. 389. 354. 180.	<i>pyrethrum Officinatum, flore Belli-</i>	
<i>Pini & Pinastri varietates.</i>	449.	<i>polygonium Herniaria folijs & facie</i>		<i>dis folio Anthemidis.</i>	346.
<i>pignolat.</i>	23.		404.	<i>pyrethrum alterum.</i>	346.
<i>Pilosella.</i>	200	<i>polygonatum maius.</i>	283.	<i>pyrola à pyris folio, Limonium Germa-</i>	
<i>Piper marinum, vide Illecebra.</i>		<i>polygonatum minus Rubia folijs.</i>		<i>nicum.</i>	122.
<i>Piper Calecutium</i>	139.		358.	<i>pyrum.</i>	434.
<i>piper rotundum duplex.</i>	426. 427.	<i>polypodium.</i>	363	<i>pyracantha.</i>	438.
<i>piper longum</i>	445.	<i>polytrichum, vide Tricometes.</i>		<i>pyracantha.</i>	419.
<i>piperitis, vide persicaria.</i>		<i>poma aucta, sine poma amoris, an,</i>			
<i>Pistana Magonis, aut plinii f. gitta-</i>		<i>Glancium?</i>	108.		
<i>ria, an strabe femina?</i>	126.	<i>populus alba.</i>	441.		
<i>pyra.</i>	434.	<i>nigra.</i>			
<i>Pyrethrum Officinatum, flore Bel-</i>		<i>Lybica.</i>			
<i>Indis maioris.</i>	346.	<i>populus novi orbis pregrandis folio.</i>			
<i>Pyrethrum alterum.</i>	346	<i>porrum scitile.</i>	58.		
<i>Pyracantha.</i>	438.	<i>porrum capitatum</i>			
<i>Pistachia, an Terebinthus Indianus</i>		<i>γελαν? Græcorum, cepe genus con-</i>			
<i>Theoph?</i>	413.	<i>dimentarū, nullo penē capite, ra-</i>			
<i>pistolochus Euseb. in Aristoloc. &</i>		<i>dice tantum oblonga.</i>			
<i>sumara.</i>		<i>portula</i>	Domestica		
<i>pisum sylvestre segetum.</i>	396. ca	<i>Sylvestris.</i>			

Q.

Quadrifolium fuscum hortorum 382
Quercus. 431.
Quinquifolium 306, eiusdem varietates, differentia. 307.

R.

Ranunculi genera & varietates. 299
 298. 300.

<i>Rapum maius orbiculatum.</i>	66.	<i>rid. sine Arabum Conditi, de quo in</i>	240.
<i>Rapi gemina varietas.</i>	66	<i>Hippophates & Hippophello.</i>	133.
<i>Rapum fyl. non bulbosum.</i>	66.	<i>Sancta sana Indorum, sine Nicotia.</i>	Endivia
<i>Rapistrum arvenum.</i>	66. 69.	<i>na Gallorum.</i>	251.
<i>Rapuntium parvum, sine Pes lucus & Satyrion</i>			
<i>Auicet.</i>	139.	<i>Satyrion Generose Eritbronon</i>	136.
<i>Rapuntium maius Alopecori flore.</i>		<i>Satyrion Erubro, Syriacum.</i>	
140.		<i>Sebesten.</i>	437.
<i>Raphanus magnus & parvus purpu-</i>		<i>Securidaca, vide Hedysarum.</i>	
<i>reus.</i>	77.	<i>Sal Indum.</i>	
<i>Raphani varietas.</i>	67.	<i>Salix.</i>	
<i>Raphanus fyl. sine Rusticanus, vide-</i>		<i>platiphyllus.</i>	
<i>tur Molibdena Plinii.</i>	135	<i>Salix humilis repens.</i>	
<i>Raphanus fyl. Officinarius, Francus lege</i>		<i>Salsapilla & similacis aspera</i>	
<i>& Belgii, Lepidum Aegmeta, fo-</i>		<i>figure, & nature discrimen.</i>	270.
<i>hy Laxi maioribus.</i>	135.	<i>Salvia</i>	
<i>Rhamni varietates, differentie.</i>	438.	<i>Major.</i>	239.
		<i>Minor.</i>	211.
		<i>Salvia coccifera.</i>	240.
	437.	<i>Salvia coccifera.</i>	239.
<i>Rba capitatum Cissauri maioris facie</i>		<i>Salvia agrestis Sybarum, vulgo</i>	
<i>Enula folia.</i>	118.	<i>Scordium alterum plinu</i>	
<i>Rhaponticum.</i>	118.	<i>Scorodiana Cordi.</i>	
<i>Rhefeda Plinii.</i>	76.	<i>Salvia viia herbariorum, sine Ruta</i>	
<i>Rhodia radix, Rosea.</i>	177.	<i>mararia, an Theophras aduentum</i>	
<i>Rhus obfcurum, coriariorum, & Tb</i>		<i>album? Mathiolo falso paronochia</i>	
<i>nu duplex.</i>	412. 413.		230.
<i>Ricinus.</i>	306.	<i>Sambuci vulgaris, Montana, racemo-</i>	
<i>Ritrium Theoph.</i>	308.	<i>se.</i>	
<i>Robus.</i>	5.	<i>Aquatica, differentia & varietates.</i>	
<i>Robur.</i>	432.	444.	
<i>Rorida, sine ros Solis.</i>	454.	<i>Samplicum, Dioscori sine Amaranus</i>	
<i>Ros celestis.</i>	26.	<i>serpens.</i>	
<i>Rosa, eiusdem differentia, Nerfin.</i>		<i>Sanguisferba altera maior, sine pimpi-</i>	
<i>Theoph.</i>	446.	<i>nella.</i>	
<i>Rosmarinum ferulaceum.</i>	351.	<i>Sanicula, sine Diapensia.</i>	
<i>Rubia differentia, varietates.</i>	357.	<i>Sanicula, sine paralistica Alpina</i>	
<i>Rubi varietates, differentia.</i>	446	<i>auricula, eiusdem varietates.</i>	
<i>Rubus canis, Cinamorus Galeni.</i>	244. 245.		
446.		<i>Santal albi, Citrini rubri.</i>	
<i>Rubifacie senticosa planta.</i>	452.	<i>Satureia sine Tymbra vera spicata S.</i>	
<i>Remex, vide Lapathum.</i>		<i>Juliani.</i>	
<i>Ruscus, vide Myrtacantha.</i>	283.	<i>Satureia, sine Tymbra altera.</i>	
<i>Ruta, Rutula varietates, differentia</i>		<i>Satureia hortensis.</i>	
390. 391.		<i>Satyrion Erythronium.</i>	
		<i>Satyrion alterum.</i>	
		<i>Saxifraga, sine Saxifragia antiquorum</i>	
		<i>Serpentina Mai.</i>	
		<i>Serpillum vitruque.</i>	
		<i>Saxifraga Diofcorid. & Italorum</i>	
		<i>Scriphium Diofcoridis; Abrotani fac-</i>	
		<i>eadem.</i>	
		<i>Saxifraga Anglica perfoliata.</i>	
		<i>Saxifraga varietates, differentia.</i>	
		<i>Saxifraga violati parati.</i>	
		<i>Saxifraga varietates, differentia.</i>	
		<i>Saxifraga varietates, differentia.</i>	
		<i>Saxifraga aquatica Plinii.</i>	
		<i>Saxifraga minor.</i>	
		<i>Salicaria, vide Lyfsmachia lutea</i>	
		<i>Salicornia.</i>	
		<i>Saponaria, non est struthium Diofco-</i>	
		<i>trum Galli, an Aleutrolaphus</i>	
		<i>rid. sine Arabum Conditi, de quo in</i>	
		<i>Hippophates & Hippophello.</i>	
		<i>Sancta sana Indorum, sine Nicotia.</i>	
		<i>na Gallorum.</i>	
		<i>Satyrion Generose Eritbronon</i>	
		<i>Satyrion Erubro, Syriacum.</i>	
		<i>Sebesten.</i>	
		<i>Securidaca, vide Hedysarum.</i>	
		<i>Sal Indum.</i>	
		<i>Salix.</i>	
		<i>platiphyllus.</i>	
		<i>Salix humilis repens.</i>	
		<i>Salsapilla & similacis aspera</i>	
		<i>figure, & nature discrimen.</i>	
		<i>Salvia</i>	
		<i>Major.</i>	
		<i>Minor.</i>	
		<i>Salvia coccifera.</i>	
		<i>Salvia agrestis Sybarum, vulgo</i>	
		<i>Scordium alterum plinu</i>	
		<i>Scorodiana Cordi.</i>	
		<i>Salvia viia herbariorum, sine Ruta</i>	
		<i>mararia, an Theophras aduentum</i>	
		<i>album? Mathiolo falso paronochia</i>	
		<i>Sambuci vulgaris, Montana, racemo-</i>	
		<i>se.</i>	
		<i>Aquatica, differentia & varietates.</i>	
		<i>Samplicum, Dioscori sine Amaranus</i>	
		<i>serpens.</i>	
		<i>Sanguisferba altera maior, sine pimpi-</i>	
		<i>nella.</i>	
		<i>Sanicula, sine Diapensia.</i>	
		<i>Sanicula, sine paralistica Alpina</i>	
		<i>auricula, eiusdem varietates.</i>	
		<i>Santal albi, Citrini rubri.</i>	
		<i>Satureia sine Tymbra vera spicata S.</i>	
		<i>Juliani.</i>	
		<i>Satureia, sine Tymbra altera.</i>	
		<i>Satureia hortensis.</i>	
		<i>Satyrion Erythronium.</i>	
		<i>Satyrion alterum.</i>	
		<i>Saxifraga, sine Saxifragia antiquorum</i>	
		<i>Serpentina Mai.</i>	
		<i>Serpillum vitruque.</i>	
		<i>Saxifraga Diofcorid. & Italorum</i>	
		<i>Scriphium Diofcoridis; Abrotani fac-</i>	
		<i>eadem.</i>	
		<i>Saxifraga Anglica perfoliata.</i>	
		<i>Saxifraga varietates, differentia.</i>	
		<i>Saxifraga violati parati.</i>	
		<i>Saxifraga varietates, differentia.</i>	
		<i>Saxifraga varietates, differentia.</i>	
		<i>Saxifraga aquatica Plinii.</i>	
		<i>Saxifraga minor.</i>	
		<i>Salicaria, vide Lyfsmachia lutea</i>	
		<i>Salicornia.</i>	
		<i>Saponaria, non est struthium Diofco-</i>	
		<i>trum Galli, an Aleutrolaphus</i>	

S.

Seseli Peloponense.	327.	Spina Arabica, Suecaba & Mauri-Tarchon.	Simeo. feti & Auicena.
Setanum.	6	tamis.	370. 190.
Sida Thro.	294.	Spina infectoria.	838. Taxis arbor μίλος Theophr.
Sferro Canalla ferrum.	Equinum.	Spina infectoria, vide Rhamnes.	450. Telephon Crataea ibidem, an scorpioides?
403.		Spina foliata, auricola prouincialis.	168.
Sideritis fecunda Matthioli, Tanacetum paruum Dodon.		Splish, vide fumaria latea & alba.	372. Tembul, vide folium.
Sigillum solomonis, vide Polygonatum		num Chelidonium capites Aetii.	Terebinthum } Maior. } 411.
Sigillum Maria, vide Fritus, vel Bryo-		Spondylium, Germanus falso Acanthum	Terebinthas Indica Theophr.
nia nigra.	313.		413.
Siler montanum Officinarium.	328.	Sponium Papaver, an Gratiola recte?	Terebinth.
Siligo.	5.6.	torum.	23.24.
Siligo Tragi.	8.	stachys.	33.
Siligna Carobe.	414.	stachys altera spuria.	Terra merica.
Siligna Cusida.	414.	staphylos agria.	185. Terribilis herba, vide Ahyum.
Sulphur in Lase.		staphylocladum Plinii, arbor vicia.	228. Testiculi canis, vulpus, hirci, differentie, varietates.
Sulphur, Carduus Maria & Laetens.	414.	stache Dioseori. Cerinthe Pun. φλος	229. Tetrastix, vide sideritis heraclea.
366.		Theophr.	224.
Sinapi Persicum, vide Raphanus Ru-		stache Dioseori. Cerinthe Pun. φλος	Tenacium.
sianum.	135.	stachus Arabica.	208.
Sinapi differentia, varietates.	68.	stachydis Curma, sine Chrysocoma	Tenacium pratense 1. Chamedrys spu-
Sinapi & Thilissi media Provincia-		differentia, varietates.	ria Officinarium
lis planta.	72.	staphylos Ph.	209.
Sisarium.	317.	stramonium peregrinum, an solanum	Talictum, vide sophia.
Sissymbrium alterum Dioscoridis, vide		maneuum Licopersicum Gal.	Thamirindi.
Cardamine.	71.	styrax eiusque lacryma.	439.
Sissymbrium Mentha.	218.	stratiotes aquatica aizoides Diose-	Thapsia, Turbulus gallicus, & Thier-
Sium, sine Lauer Dioseori: Olusari-		ridis, vide militaris sine Multifolia.	bus eunetium Officinarium.
folio, sine aquatica Pastinaca.	71.	334.	Thapsia herbariorum vulgaris.
Sium Crataea Erica folium.	71.	strumaria, vide Xanthium.	350.
Sinilicia aspera & Salsaparilla disiri-		struthion Dioseori, non est saponaria	Thlaspi Draba & Chamelina folia.
men.	270	vulgaria. 133. an Cunder Auicena?	73.
Smilax lenis vel tenuis, vide Convol-			Thlaspi differentia, varietates. 72.73
nulus maior Plinii.		Malaeciso strychnodendron.	74.75.76.
Cassia Bassi Anguil.		suber duplex.	Thora, vide pebora.
Smilax horrensis, vide Phaeobus.		suberiquerus ibidem.	263.
Smirnum.	316.	suecisa, vide Morsus Diaboli.	Thuris differentia.
Solani genera, varietates.	102. 103.	superba Recentiorum.	439.
Solaocella.	263.	sycomorus.	Tymbra.
Soldanella montana.	262.	syda Theophr. vide Alnus.	182.
Solidago saxatilis.	125.	silbum, vide Carduus Maria.	
Sonchus aspera, an Dioscoridis arbo-		syphion, vide Laspisium.	
rescens.	87.	sympitum Albom.	
Sonchus levis.	87.	sympitum petreum.	
Sophia Chiriacorum, sine Thlaspi		sympitum Pelton, vide sympitum.	
Dioseori?	328.	251.	
Sorbus domestica & syl. Alpina	416.		
Sorbus torminalis.	443		
Sorci.	14.		
Sporagium Theophr. Butomos.	40.	Tamarix Norbonica, vel Italica.	
Sparti differentia, varietates.	407. 408.	Germanica minor.	
409.		Tanacetum minus Dod. vide Abid-	
Spergula, sine spary Belgicum &		lea M. effigie.	
Anglorum.	357	Tanacetum floribus Abrotani fami-	
Spica Laxandria.	184.	na.	
Spina alba, sine Bedeguard		Trabibus Tanacetii varietas.	
369.		Tartoryre Massiliensium.	
Spina Aetiae Diose.	409.	Tapfia, vide verbascum.	

T.

Tragoriganum vulgare. } 211.
Venetorum alitum.

An Racemosa Equiseti facie plan-
 asis. 355. Verbena communis siue recta sacra,
 leg. Triagon improbat. Mar. 356. 231.
 Trafi Recentiorum, siue esculenti Cy-
 peri. 37. Veronica vera minor. 197.
 Tribulus } Terrestrius. 403. & Minor Serpilli folia. 197.
 } Aquaticus. 258. Fiburum Purguli. 436.
 Tribomaces, siue Polytricum. 361. Victoricum, vide Asclepias.
 Tridaces, siue lactuca. 81. 82. 89. Vicia, siue Ficus 401 Vicia filystis Ustilago. 11.
 Trifolia differentia, varietates. 380. vide Aracus, siue Aracca & Cra-
 381. 382. 387. cia maior.
 Tripulum litoreum. 123. Vicia Dod, an aphaca Matth.
 Trunci genera. 5. Vicia Sylue prima Dod, aracus Dios.
 Truncospectrum. 8. Vicia syl. secunda. Polygala vera.
 Truticum Vaccinum Dodo. 11 Vinca peruviana, vide Clematis.
 Trixago } 209. 210. Viola Damascena & matronalis. 137
 Trixago maior. }
 Trixago palustris. 210. }
 Typha Turcica purpurea }
 Latum. } 125. Viola varietates ibidem.
 Turroni Norbomenfium, Italia A-
 mordaleto. 23. 275. Viola stemmata, coloria calida. 266.
 Turbithumne. 159. Unga aurea, an Lencographis P. 125. Uirna Vulgi forte Vitis filie. }
 Tusilago, siue Farsara. 254. Unga pastoris. 374. Xylodactylus. }
 Typha 40. Virginia, vel Parthenium est Coula Xyllo, vide Gossypium. }
 Typha minor. 41. fetida non Matricaria, vide Par-
 Typha carealis. 8. thenum. Xyru. 32.
 Typha, an Speltza? 9. Viscum Carlina. 367.
 V. Viscum. 282.
 Vaccaria Dod. Glasti species filiste. Viscum Indicum geminum. 452.
 148. Altera flore muscosa. 189.
 Vaccinium rubrum, an Idea Radix Urtex, vide Agnus castus. 190.
 nigrum 417. Vitis alba, Bryonia. 423.
 Vaccinia palliustra. 417 Vitis, vel Bryonia nigra. 275.
 Valeriana nostrates, an sine Dyscori-
 vidus? 318. Vitis Umfere spontanea vel Onaibe
 Valeriana differ. varietates. 319. Vitis Corinthia. 277.
 Veris umbilicus, vide Coryledon. Vitis domestica. 278.
 Veratrum album nigrum, vide Eleborus. Vitis, vide parietaria. 278.
 Verbasculi genera & va. 242. 241. Vitis vulgo Gallorum. 436.
 Pagi. 242. Lincea. 1. lege Purpureum Umus. 440.
 Erucefolium, & deme Syll. Salusfo-
 bu fruticosum lignosum. Umbilici, vide Coryledones.
 Verbenaca Columbaria, siue Peri-
 ntheron, an nostra Scabiosa minima Volubilis, vide volubilis maior vulgi;





CLARISS. ET HONORABILIBVS INCLYTI COLLEGII

MEDICI LONDINENSIS D.D. PRÆSIDI,

PROFESSORIBVS ET PRÆFECTIS

BENEMERITIS,

Proæmium & operis utilitas.

Aliquot MEDICAMENTA COMPOSITA

habere in promptu operæpretium.



OLUM esse si quis Compositis vratur, Villanovanus dixit, vbi in promptu habentur Simplicita: Varijs tamen de causis nonnulla Composita pharmiaca nou minus vtilia quàm necessaria sunt. Prima & potissima, quotiescunque præcipites implicati morbi, eorundemque sæuissima symptomata adeo vrgent, vt noua Medicamenta, Magistralia vocata, repente per otium concinnare non liceat. Secunda & aliz; quia multa comprobata & vsu & ratione receptæ Compositiones maximè efficax, vt Theriacæ Andromachi Antidotus, Mithridatica Damocratis (qui primi Medicamentorum Compositiones methodicè instituerunt) Philonis item Antidotus & consimilia Opiata pharmaca, quæ fermentatione egent, vt cuiusque Medicamenti simplicis qualitas persusio, refractioque accedat, vnde noua & optata exoritur facultas; quorum aliqui nonnulla periculosissima & læthifera sunt. Quamobrem multis optimè constitutis aut moratis ciuitatibus, vt Patauij, Venetijs, Veronæ & alibi à primatibus & archipharmpocopeis ciuem seruauitibus, oculis vatis hæc nobilissima & antiquissima pharmaca sigillantur, ne quis ante fermentationem sex mentium abutatur, indeque pex repente subsequatur; vt elapsis paucis annis malè cessit cuidam mercatori extraneo robustæ naturæ, assumpto Philonio non fermentato, recentioreque, non sine tædio Medici doctis, qui præscripserat, quem iniquus, & ignarus aromatopola illufit. Huiusmodi funestissima exempla nemini quàmplura, suprà agyrtarum audaciâ, de quibus alibi.

Quandoquidem Simplicita quouis loco, solo, tempore & cali catidine ad manum esse nequeunt; ideo quo tempore maximè vident, in annum vsu, ex his nonnulla Medicamenta Composita præparari, permisceri & asseruati operæpretium est. Adde quod vix repetes Simplex ætuum Medicamentum, simplicium possè profligare morbum, nisi fortis opesceat Naturæ beneficium morbus expellatur; Hac tamen procacior temerariâ & inspectu atate raro in hisco aquilonicis plagis, multisque aljs regionibus Medici peritones in morborum principijs accedunt; quia anas & læthali lue a fatuo & insulso sagarum certu, sagacium inquam marronarum concilio credito, excluduntur & in illorum locum mulierculæ clinicæ, obfetrices, metetrices, lenæ, profugi sacrificuli vastri, leucs pagani popularesque concionatores famelici, templorum custodes, grammaticastri, Medicastri, Medicamentastri, Pharmacopœastri Medicorum, simiz, aromatopolæ, sagasariæque indocti aut sordidi salgamatij potius quam nitidiores Pharmacopœi, Toniores, Lippi, Hippochirurgi insautè chirurgiam facitantes lithotomi, periclitatores, circumsortane rapaces lucro iuhiantes; Pseudochymistæ (quos nobiles agyrtas scitè Angliæ protomedici dicere) harioli, mini, præstigiatores, caupones, coqui, naetini idiomatis nugiuenduli radicifera, herbarumque collectores aut euulsores, congerones & sordidi vulgi fedentarij opifices, irrespiciunt; ad xgros tanquam vultur ad cadaues accurrentes, prædas & prandia

Principijs accedunt.

captantes, per hominum strages experimenta facitantes, nullâ Medicinæ parte illis probè peruectigatâ (inquit Syluius) hos curandos suscipiunt, sæpe pro salute, necem; post bellum aut turnera auxilium pollicentes; & afflictionem pro auxilio inspirantes; deleteria Medicamenta, Scammoniam purum, Colocyinthidena, Stybium & huiusmodi nullius delectus, pro antidotis porrigentes & propinantes; vnde mutatis leuioribus & simplicibus quotidianis morbis (grauissimos enim, & luem Veneream iniquè, emungendis auro & argento crumenis esse asserunt) in lætissimos & implicatos immedicabiles affectus; quos alioqui natura initio facillè curasset, creberrima mors plerumque; humido radicali, nativo calore, animæ, animalibusque facultatibus iniquâ & audaci ignorantia expurgatis, propulsis & extinctis. Sed demirari desine, cum Diuinus ipse quæbundus Hippocrates scriptorum suorum exordio, *Medicinam animum artium præclarissimam esse dixerit* (â luptemo enim oriundam, vt habet sacra pagina, qui Medicamenta, viro prudenti minimè despiciabilia, ex terra creauit, quique homines hac scientia donauit, vt suis miraculis gloriâ consequeretur.) *Verum propter ignorantiam eorum qui eam exercent, & vulgi ruditiatem, quod tales pro medicis indicat & habet, iam eo res deuenisse, vt omnium artium vilissima censeatur.* At verò hoc peccatum ob hanc potissimam causam committi videtur; soli namque *Medicina nullapænâ in rebus publicis statuta est, præterquam ignominia; Verum hac ipsa non efficit, neq; contingit eos qui ex composito personam ipsius induerunt; similes enim huiusmodi Medici sunt personis quæ in tragædijs introducuntur: quemadmodum enim illi figuram quidem & habitum ac personam eorum quos referunt habent, illi ipsi autem verè non sunt.* Sic & Medici sanè à quidem & nomine multi, * re autem & opere valde pauci.

* Multi maluit videri quam esse.

In huiusmodi Medicorum abusus, celebre illud & protritum non illepidum carmen quadrans, iure subnectere æquum est.

*Fingit se Medicum quisquis Idiotæ, Prophanus,
Indeus, Monachus, Histrio, Raser, Anus.*

Quamobrem his deploratissimis ærascatorum temporibus consultò datâque operâ eatenus & parcius attingere visum fuit, imò prætermittere (tanquam nefas plagiumque profanare & perdere nobilissimam artem, iam penè, pro dolor, toto orbe deformitatis exemplis extinctam) istos *Medicatos Succes*, siue nobilissima *Chylismata Cathartica*, veterum Græcorum imitatione absolutissima, cuiuscunque simplicis Medicamenti energiâ asseruat, idoneoque menstruo extracta aut eliquata; quæ cum delectu longè minori noxâ & mole; maiori cum efficacâ in corporibus nostris mirè & egregiè operantur; tamdiu vsque dum leges cessabunt (vt Syluij dictum vsurpem) in hos indoctos, noxios & inexpertos carnifices, qui sese medicos profiteantur, animaduertet; quos tamen plerumque plei que, violatis artis legibus, nostræ ætatis ignobiles sordideque auarj Medici sectantur; quia illis supradictis ærascatoribus & periculatoribus quandoque æquè bene cedunt omnia illusionibus suis, superficialijsque parietum dealbationibus stupefacientium Medicamentorum recidijs & irritis curationibus palliatius à medicis vocatis, ac nouissimis his inexercitatis histriionibus Hippocratis famelicis, læuipedibus alipedibusve ad ægros non accersitis sponianis cursoribus, suilitatis plenis, scientissimis ardelionibus, obsequiosissimis sopulstis *raynyus* siue verbis tenuis Physicis & Medicis, verborum non rerum callentissimis (non est enim linguæ lecnocinijs hæc peculiaris medendi ars acquirenda; sed assiduo, rationi & longæ experientiz & vsu coniuncto labori nititur) quorum pas Hippocratis, Galeni & antiquorum Græcorum doctrinâ & præceptis magni cædiosis & assidui laboris valere iussis, contra ex Arabum monumentis, methodo & rei dubiz demonstratione orbatis * aut Neotericorum leuidentissimis

* I. a Spina aduersus curiostates. lib. 6. pag. 334.

•• Clariss. V. D. Eero V. Willoughby pseudochymicarum & medicamentorum turba, quæ vnicuique delectabatur, perit; educeant alii.

•• pseudochymicis, cachochymicis cinisum verbosis histricis illisouibus; & quorū turbidissimis haurire maluit, quam ex limpidissimis Græcorum Hippocraticis, Galenicis & Priscis fontium scauriginibus, singularibusque experimentis, nec non Dioscorideis euporistis facillè parabilibus ipsis ignobilissimis euestiglo, vt aiunt, pedibus & manibus, ad præxim properat & illis ab initio (vt lepide Gueuarus in Epistolis aureis) morborum implicationibus & signis; differentijsque adhuc latentibus; & per vniuersam curationem ægros cornucopiâ Medicamentorum molestissimâ, Officinâ autem gratissimâ, ingurgitat, & necat eodem modo quò nullæ erulæ sæpe capones suffocare solent; & hoc quidem faciunt vt multa præstissimè remedia videantur; Crisum interea interrumpitur aut neglectum, contra artis leges, nescia. Huiusmodi præstigiatores non solum fouet & tutatur plebis fex, magno rusticæ tibiæ & ignaræ rudis gentis applausu, sed & quod maxime dolendum, Magnatum nonnulli satui & insulsi, quibus foret sordidis (similis enim similem, vt sescur, sibi quærit, similique gaudet, aut similes habent

labra

labra laſucas) laceratur & malè auditur Medica Diuina, nobiliſſima & antiquiſſima, ſuntimo ægrotantium diſpendio, non ſine proborum Medicorum, Pharmaceuticæ, Chirurgicæque potiſſimum tædio, cum vniuerſarum Medicatricis artis partium, nec non Academiarum, ſtudioſorum & plorum virorum laborum, æriſque parentum euerſione peruerſione & deperditione maximoque cum Reipublicæ naufragio: qui quidem erudiſſimi Medici morborum & ſymptomatum differentiis, ex experiẽtiſſimi Hippocratis, Galeni & antiquorum decretis cognitæ, nobiliſſima pharmacæ corporibus præuè affectis & conformatis, ** implicatiſque morbis, euanique* ex diametro inter ſe pugnantibus, de quibus pauca prodita, vnicuique morbiſicæ cauſæ, vrgenti- ** De morbi implicati aut compoſiti & hereditarijs pauca antequam.* que neceſſitati, concinnant & aptant ex ſelectiſſimis conuenientibus ſimplicibus medicamentis, perboni & induſtrij ſartoris exemplo, qui gibboſis, luxatis, miancis mutilatiſque veſtes ſarcis, & quaſi nouam formam reſarciendo, Naturæque vitia regendo, inſtaurandoque inducit.

Quandoquidem Medicum peritum ſolentiſque ingeniij, priſcorum exemplo, conſultò oporteat proprijs ſuis Medicamentis Compoſitis, temperaturæ, morborum cauſis alijsque accide-
ntibus, vſui ipſius conuenientiſſimis vti, cum Pharmacopolarum communes compoſitiones, ad ſubito & bene curandos archanos abdiſſimè laesentes & implicatos morbos, magna ex parte tales non ſint, ipſo etiam docente Rondelletio, de Compoſitionibus quibus munus eſſe debet Pharmacopola agens, dicat præſtantiſſimum Medicorum vulgus, populareſque Medici, quales ſæpe Pharmacopocatri eſſe ſolent, ſericata vndulataque ſaſtu ſargida, auræ & ſanæ popularis Medicæſtrorum fallax quidiſſima, ſiticolioſer hiſtica torquata cohors, audacter incentiæ & ne-
care ſoliſta, quæ mutata veſte, decore & optimi Medici ſplendidiore ſimili quotidie ornata, huius Medicatricis artis, Materixque medicæ ignara, ipſiſque tamen Officinarij aculis notiſ-
ſima; quid his triualibus priuata medicamentis, cum eadem ignauia aſſequi nequeat, quamque laboris tæder pudetque doceri, in curationum ſuarum irritis pollicitationibus agat? quibus laboris oibata, manca & mutila illorum ars ſcientiaque deſijt, deperditaque eſt, artois leuidenti-
bus ad proſtigandos morbos omnino deſtituta.

Rationi itaque conſentaneum eſt probum peritumque medicum, ſæuientibus morborum ſymptomatibus occuſandi gratiæ, priſcorum heroum, Mithridatis Poſui Regis, Hippocratis, Lyſimachi, Galeni, Nuperorumque Syluij, Fernelij, Rondelletij & aliorum exemplo, cum Sim-
plicium, tum Compoſitorum medicamentorum notitiam habere, & neutiſquam manus proprias inquinare, in ſelectioribus quibuſdam parandis remedijs deſignari, cui ſæpe videntur, vbi Phar-
macopœi fides & induſtria ſuſpecta eſt, artis ſuz & linguæ latinæ ignorantie, medicamenta al-
lias optima ſutura, delectria fieri, vt in Opiatis Antidotis & aliis diximus: Tum etiam experi-
mur Pharmacopœos pleroſque lucro inhiantes medicorum ſimias eſſe, artemque cum ægris inſectiâ perdere; eoque Rondelletium necdicis conſultare ſolentiora eximix doſis ſectiora quæ-
dam propria medicamenta parare, exhibere, ſibi que piè ob abuſum, artis profanationem & ca-
lumniam, ſeruare. Medici igitur dignitati, authoritati & diligentiæ, benè agendo, neſcioſque do-
cendo, Reipublicæ vilisati quidnam derogari poterit? Sed poſtquam claro ſupercilio & deſidiâ
medicus medicamentorum vſui ipſius parandorum officio deſſe cepit; ea que paranda ſecordij
ſanulo commiſit; tanta reum paulatim barbaries & inſcitia irrepreſſa, vt medicamentorum, me-
dicorum medicamentariorumque ſui obliuioni rectior vſus, valetudinis corporeæ obſoluerit.

Nobiles priſci medici ſuorum medicamentorum præparationes non deſignati ſunt, neque
eorum puduit, neque ſeruos ſuis medicamentis prædicere, qui hodie vicem medici ſupplere,
& pro medicis a ruſtica populari turba haberi ſolent; ſæpiſſime pro antidoto & ſalute craſſâ
ignorantiâ, nocem potorigenes, artis & virtutis conſumptione, euerſionemque: Proinde meriti
quidam docti virtutis amantiffimi lamentantes & eius contemptum deplorantes, loco huius
celebris elogij,

*Exerit ipſe ſauor ſtudij, laudatæque viri
Crefcit, & immenſum gloria calor habet;*

Virtus laudatur & alget, dicere: Virtutem laudari quidem, ſed algere.

¶ Veterum medicamentorum parandorum rationem Remediorumque Formulas & Re-
gulas, quibus quotidie medici & medicamentarij vbi que locorum paſſim in ſumma opinio-
nem peruerſitate vtuntur, quamplures præclari doctiſſimique noſtri ſeculi viri, certatim ſummo
ludus ſuo iuri reſtituere contendeſunt, & niſſigam non contemnendæ utilitatis operam in
ſimplicibus & compoſitis medicamentis illuſtrandis explanandiſque, quibus & quomodo illa
concinnantur, maxima cum laude dederunt, indeque apud poſteros nomina ſua nobilitarunt &
ab obliuione vindicarunt. Inter illos claruiſſimus Valerius Cordis, queni Germani omnes, Belgæ,
Gallorum

*Affect Medi-
cum ſuis præ-
paratis conueni-
entibus reſui
ipſius.
Eſt ſiſt. 38.*

Gallorum & Anglorum maxima pars sequuntur, à nostro Coudenbergio doctissimis Scholijs illustratus & plus quadringentis erroribus liberatus. Iacobus Syluius in hac palestra præ cæteris maximam laudem meritis, qui de pharvacorum compositione, præparatione discretè doctèque censuit, atque multa barbarie vocum vindicauit, præparationisque modum accuratius explicuit. Andernaco item gloria immortalis debetur; quemadmodum Amurio, Fœcio Syluij discipulo; Cronenbergio, Placotomo, Adolpho Occoni Augustano, medicamentorum formulae Florentinis Italicè scriptis, vernaculè *Ricettario di Firenze*, & alijs, Fernelio de Compositis medicamentis, Guilielmo Planeto a doctioribus, quia tanti Fernelij eruditionem vix lapsiunt, ascripsit: Laurentio Iouberto, Bricio Bauderio, Melichio & Weckeri laboriosè Remediorum Syluiæ, cornucopiæ alienæ; Joachimi item Camerarij doctissimo Norico Dispensatorio; summoque philosopho & medico Victori Trincauello, qui omnium doctissimè Compositiones, quibus passim vbique terrarum Medici & Officinæ vtuntur, enodauit: Necnon Guilielmo RONDLETIO a teneris inter optimos Medicos & Pharmaceuticos callentissimos Monspelienfies educato; quique inter opera sua Pharmaceuticam artem quam hic corréctiorem datus, in suæcunctam, compendiosam contraxit OFFICINAM; spretis meritis superfluis, inuilibus, inuisitatis, quibus commodissimè carere fas est, vndique magni precij, carissæ, cariosisque diutius asseruatis putrilaginosis, sæpe adulteratis Compositis medicamentis, Pharmacopœis danuosis, onerosisque; melioribus, paucioribus & rationi cõsentaneis, Vallanouani Itatini initio proœmij memorati exemplo; artis legibus inuiolatis, innixus, & plus quam reliqui omnes, qui scire sequuntur, nec a comuni viâ desistere ausi sunt; vt qui in Galeni & doctissimorum præcorum verba non iuravit, docet: fuerunt enim illi summi viri & mortales; nos verò tanquam pygmaï supra gigantum humeros (qui nobis glaciem secuerunt) sumus; inuentis autem addere facillimum. Sed dicat aliquis cur Rondelletiana Pharmaceutices Officina tamdiu latebrosè delituit? liquidò constat Rondelletij Methodum curandorum morborum mancari esse & mendosissimè editam, ac proinde (suspectam, iniurijsque prædicantium periculosa; veterioribus senioribusque tamen doctioribus plerisque practicis & eius disciplinæ adiectis, vtilissimam; non recedit namque a communi opinione, nisi opuma rationè addita. Quidquid dicat Maceus quoue effugio vrasur, suo primæ editionis Lutetianæ prologo anno suppresso excusæ, & deinde Weckeri heredes, qui omnia nunc, id est in secunda editione Francofurtiua aium, castigatius in locum edita, hoc est, infelix & mendosus anno 1592. vt statim ab initio Pharmaceutices Officinæ liquidò constabit. Longè aliter Rondelletium censuisse certò scio; nam ex Italia tunc nuperimè in Belgium reuersus, per Lutetiam Monspelium secundò, iter perorando rediens; à Maceo opera Rondelletij eni, & quamprimum appuli D. Rondelletio presente D. Iouberto, dedi; quæ quidem quia nondum viderat gratissimè accepit (audierat enim opera sua inuita & mendosa se inficio, futurum in lucem edita, suorum quorundam egenorum discipulorum operâ & studio, coque Regias literas impetrarat, vt edictò Regio reuocarentur interdicerenturque) sed postquam animaduertit opera sua adeo inculcata, & studioforum insecutâ mutilata, typographicisque mendis repleta; eadem cum veller erratis liberare, in Hispaniam ad praxim in qua felicissimus & incomparabilis fuit, a nobilissimis viris vocatus, & in reditu à Tholosanis tumultuosus ob religionem perturbacionibus timore percussus, Castris Albigeniis, vulgò *Albigeis* liencenâ correptus, morte omnibus medicinæ studiosis funestissima 30 Julij 1566. vitam mutauit. Constituerat enim, vt inceperat praxim suam emendare, in pristinumque nitorem & optimum ordinem redigere, multaque præclara in lucem edere. Hoc negotium suscepit D. Ioubertus & Librum de compositione medicamentis seu Formulæ Remediorum, tam Internorum, quam Externorum, iam Rondelletij tempore inchoat, cum Libello suo de Concnibus impedimentis & morbis hereditarijs; quid interfectum actum sit inter heredes D. Rondelletij Ioubertum & typographum prius ignorò: si hæc perire, dolendum.

Sed cum hæcenus nihil elaborati aut emendati in lucem prodierit; quidquid D. Rondelletio doctente Officinam suam Pharmaceuticam obiter annotare potui, vbique apposito, quo semper nostris plus accedat authoritatis eius orationis inflaturato iexto sue similium stylo, candidè Reipublicæ commodò studiosis & posteritatè insipertire non minus verebor, quam ille studiosos sincerè Medendi artem, nihil penitus celando aut occultando, docere dignatus est: Hæc ab obfisione & iniuriâ tanti peripæ memoriz præceptoris, amoris ergo, vindicare libuit, quia sphalmatum typographicorum, studioforumque incuriæ & ignorantie nescij, in hæc vsque diem, authoris dignitati derogant. Vtinam heredes hæc opera non neglexissent, aut saltem tandem quandam exercitissimum doctissimumque vitum constituisent, qui tanti candoris nostri

seculi prædici euigillatos diuulgaret labores; ne quis alienis pennis ornatus, ut plerumque fieri solet, suppresso auctoris nomine, Rondelletij labores sibi vendicat.

Cum itaque multi in componendorum Medicamentorum ratione multum diuque defudera- rint, & ex laboribus suis magnam consequuti sint gloriam: tamen cum in re tam ardua, multa posteriorum diligentie inquirenda reliquissent, cum huic studio à iuuentute non penitentiam operam impendissent, dedi operam ut reni succindere pertrachem, additis aliquot selectioribus & vtilissimis Catharticis alijsque Medicamentis, eorumque emendandis descriptionibus, alioqui vbiq; passim Officinarum peruersis. Ex duabus aut tribus compositionibus, imitatione Rondelletij, sæpe vnam fecimus, Pharmacopœorum commodo, ne mole & copiâ Medicamento- rum obruantur, quæ diutius in Officinis seruiata, putrent, aut deprauantur: examinatis Simplicibus Medicamentis, quia sæpe videmus celeberrimos Medicos & Pharmacopœos senio conse- ctos nescire quid in parandis triuialibus vtilissimis compositionibus, barbarie vocum impli- catus sint accepturi, eoque sine noticia, contra mentem authorum pro arbitrio medicamenta pa- rare, ut scitè Rondelletius in prologo huius libri sui inscriptionis Pharmacopolarum Officinæ, monet.

Interca itaque præstantissimi viri, has nostras lucubrationes suscipite, expendite, emendate, concinnate, fouete & augete, donec amplissimi Collegij Doctorum expectatissimum perfectum Acidotarium omnibus Medicis & Medicamentarijs proponatur, cuius normam in parandis me- dicamentis sequatur omnis Britannia.

Sed ne mihi placere videar, aliosque carpere, ipse maximè carpendus, veritati tamen & rebus non verbis nixus præstantiora quæuis & maximè necessaria quæ Syluius, Cordus, Rondelletius & alij in hoc studio præcellentes consueverunt, indicare non verebor: quia verò nemo melius aut elegantius possit, eorum verbis, auctoritatis ergo, pro prologomacho vti.

SYLVIVS.

VT rectè est veterum sermone celebrata sententia, Quam quisque nouit artem, hanc exerceat v- nam atq; excolas, & totum in ea versetur: sic rectè nunc pronuntiari posse mihi per suadeo, quâ quis- que exercere artem constituit: hanc accuratè primò persciet. Id quod si hodie diligentius obseruarent homines, non tam multis repente fierent medici, nulladum medicina parte illis probè peruestigata, nullus adhuc morbi curatione apud præceptores obse- uata. Cum tamen esset è re ipsorum, sed magis etiã agrotum: si nullum omnino affectum susceperant curandum, quem non antè obseruasset à præceptoribus curatum. Quàm rectè cum agrius ageretur, si hac atate qui medicinam saltitant, sic essent antè sub præceptoribus instituti affectuum cognoscere, illis occurrere, sua vtrâ prænunciare. Non mediis fidem per hominum meritis, experimenta sic agerent imperiti adhuc, & verum omnium suorum rudes medicum quæstus amidi, ut quid eos deceat ignorent, quid sanam perstringat nesciant, ut interim anima deri- mentum faciam. Vbi enim medicus nescio quas præceptiuiculas memoria didicerint, ac medicamen- torum certas quisdam scripturas, se medicos profitentur. Illi est satis scire antidotum, catholicum verbis gratia, humorum omnium redundantiam vacuare, cum ignorent, quibus, & quanta singulorum mensura caritet, qua singulorum sit facultas, qua horum cum illis sic misceantur: eademq; in cæteris medicamentis compositis videntur, ignorantia impositura. Quid per Deum immortalem hoc hominis portento, se medicum mentiente, est reipublica peccilentius? quod nota censoria dignum magis est faci- nus? Cur leges cessatis in his carnis vitæ, ut meritis sumi animaduertere? An nondum extant quæ hanc capitalem infestiam puniant, & nono vindictæ exemplo coercerent? aut si hac peccandi licentia im- punitè permittitur, cur non modo ex typographorum præis, sed omni omnium hominum ordine in medi- cinam non conuolatur? Sed Deus optimè maximè nobis largire meliora, & indolere hic catholicum ignorantia sua conscientiam oppone, ut fasinum tam indignorum præmitentia consuli, in ordinem suum redigantur. Iam ab hac arena explosi circulatoribus istis, rem medicam sincere tractantur non soli pharmacopœo necessariam esse hanc medicina partem qua simplicia deligit, ad compositionem præ- parat, & denique salutaris commisceet, docere agere diu. si enim pharmacopœi fides tibi suspecta est, velisne ob id ipsi simplicia diligenti, præparanti, miscenti, adesse, quid ex hoc studio emolumentum conse- quere, nisi hac tu ut ille persciet? imò quam tibi infamia notam imprudens inuris, dum ignarus bo- rum simplicum medicamentorum, tanquam asinus quidam ad omnia eius rogata auribus motis velut annuis. Quid quod tibi sæpe etiam volens pharmacopœus illudat, & mea sententia instillat, dum co- rryli nucamentum pro pipere longo ostentat, dum centaury magni radicem pro Rha Pénico, dum aco- rum palustrem uistrum pro Indico & vero porrigit, sed vitia hæc tolerabilia sunt. Pro elæboro autem nigro, Arabum napellum, aconiti genus quibusdam, hodie propè ab omnibus pharmacopœis subiecti ni

quis ferat? an non communis est utrique medicorum & arenaicorum ordini ignorantia & culpa? Penia dignior est impostura, cum aristolachiam clematitem nobis frequentem pro duabus alijs variioribus supponens: indignior cum scammonisum crudum pro cocto miscens, aut largius quam scriptura medicamenti postulet, medicamentis immiscere, aut etiam cum alicuius ex tribus malis hac nuscant pro scammonio. Quæ errata cateraque omnia in medicamentorum militione committi solita si vellem persequi, longior illade nostra procederet oratio. At ut docemus medico ad componendum nihil opus esse diligenti nisi in simplicibus medicamentis deligendis, parandis, & miscendis exercitatione, iam pharmacopæo commissa: ad pernoscentium autem compositi vires, omnia, hæc illi ad unguem suvi pernoscentia, si enim vnius simplicis improbitas totam sape compositionem vitiat, ut abunde in metodo medicamentæ componendi docuimus, an parus esse tibi debet singularum simpliciorum delictus: si item præparationis ratio simplicium vires auget, minuit, abolet, novas acquirit, ut libro secundo explicauimus, quam in horum ignarus facultatem toti medicamento tribues? Si denique militiis modus ex eadem materia in vnguentum, ceratum, emplastrum efficiat, an tibi est neglegendus? Credo mihi absurdissimus est, ac sape ridiculus, qui medicum facit, harum rerum ignarus: non dico quoties medici imperiti enumerata simplicium turba subscribant, fiat emplastrum, vel aliud, cum tamen ad hanc medicamenti formam scripta illa simplicia nunquam veniant. Quæ res medicum pharmacopæo ignorantia suspensum merito reddi. Prætere multos me vidisse tam harum rerum imperitos, ut cum in officinas diuertissent pharmacopæorum non modo simplicia usu ipsi quotidiano celebrata non agnouisse, sed neque composita medicamenta illis præcò continenter in ore & calamo versuta nonisse mollia ne essent, an solida: an non id est ignorantia rerum maximè necessarium crassissima? Quam ne exuant plarique à medici dignitate alienum putant in medicamentariis officinas diuertere, ibi aliquando si dære, quæ componuntur obsequare, quæ consuetudo, ut in Galia Narbonensi est antiquissima, utinam hic saltem nunc inciperet ac procederet: spectarent medici quàm sædè frequenter labuntur ob compositorum iniquitatem, & fortasse sua dignitate, si scientia id minime possent sua, in doctos, aut improbos pharmacopæos à praua compositione detertere. Hac prolixius à me scripta quàm rei natura postulet, fortasse ineptus aliquis calumnietur: cum tamen res ipsa longissimam i flagitet orationem, quæ pristigata multorum ignorantia, omnes medicos nomine dignandos in id studium impellere posset, ne post hæc esset accusatoris locus. Faxit Deus, ut quisque quam exerceat artem, pernoscat, & medicus nihil eorum ignoret, quæ ad morbos eius & tuos curandos utilia, vel necessaria esse consueverunt. Porro medicum omnia hæc intelligere oportet, non ut in opus pharmacopæorum enadat (nisi si quando hominè desiderio cogatur aliquid vniuersi moliri) sed ut componenti pharmacopæo possit non modo adesse, sed etiam præesse: nec huius disciplina ignarus quotidie describit simplicia quæ in emplastrum cogi iubeat, cum ex his quidvis potius quàm emplastrum perfici queat, quomodo cum amphora capsi formari, cunctis tota cur virens exit?

Vive, vale lector, si quid seis rectius istis,
Candidus imperti: si non, his vttere gratus.

SYLVIVS

DE PHARMACOPOEI OFFICIO.

QUANQVAM plurima cum medico habet communia pharmacopæus, prudentiam naturæ insitam, medicamentorum absolutam cognitionem, diligentiam in his omnibus quæ suarum sunt partium maxiam, probitatem: tamen non pauca ipsi propemodum propria videntur, quæ tamen aliquando & medicorum fuerunt cum ipsi medicamentum parabant, id quod Galenum fecisse passim scripta ipsius loquuntur. Eius generis sunt medicamentorum delectus, ratione & experientia summa quæsitus: deinde seruandi hæc modus, & tempus quo vigent, aut iam viribus efficta sunt ac exanimata. Item qua ratione vnumquodque sit vitandum, siue illud ipsum per se, siue cum alijs coquendo & terendo, vel alia ratione præparando. Sit præterea doctus grammaticam, ut compositiones veterum, & scripturas medicorum quotidianas intelligat, in quibus si quid interdum hi scripserint largius, aut parcius, aut ingratius quàm ægro huic competere coniecerit pharmacopæus, medicum amice admoneat. Vultum præterea pharmacopæum artem omnem medicamenta deligendi, præparandi, & componendi callere, cultu mediocri contentum, hilarem, facetum, diligentem in rem ægorum: non auarum, non libidinosum, non ebriosum, non contentiosum. Quæ iterum illi cum medico sunt communia, ut Hippocrates docuit libro de medici officio. Quibus animi & corporis, & fortunæ diotibus

fi

idem scri
cordus.

Eadem Cordus

si præditus erit pharmacopœus, nihil in consilio medico perito, cuiquam propinabit, præsertim magnarum virium, sed neque quantumvis paruarum, cum horum vires nesciat: & plerumque auxilia hæc quauis, ut videtur, imbecilla, tamen quantitate, qualitate, et tempore insalubria, magnorum sæpe morborum sunt occasio, & legitimam curandi rationem pervertunt, dum sub his curatum corpus remedia iam miora, sed idonea non feret. Nihil etiam vel amore, vel odio, vel metu, vel pretio, vel ignorantia peccabit: neque venena, abortum facientia, exoleta, adulterina, aut suppositicia vnquam exhibebit: sed medicum doctum consulit quodnam simplex, aut compositum illius penuria volet substitui. Non augebit medicamenti alicuius valentis quantitatem, ut vacuatione hinc largiore sequuta dicatur medicamenta habere præstantiora. Quam vellem huius ætatis pharmacopœos ad hunc se velut canonem conformare, & medicos ad suum: non esset cur hodie tam neglecta iaceret medicina, etiam multorum probis lacerata. Deum optimum maximum supplico, & obtestor, ut aliquando id studium in mentes medicorum & pharmacopœorum immutetur, ut esse quisque quam videri aut dici malit optimus, vel medicus, vel pharmacopœus. Quod si diuinam illam gratiam neglexerint, faxit Deus, ut regia censura in eos aliquando animaduertatur, qui artem prius exercent quam pernouerint, hominum corpori tam salubrem, cum rectè obitur: tam insalubrem & perniciosam, cum insclementer tradatur.

Eadem Cordus.

Subdit Valerius Cordus, de Pharmacopœi comdescensia.

HABEAT etiam sedes salubri loco sitas, ac varijs reponendis et conseruandisque accommodatas. nonnulla enim humido, pleraque calido, quædam siccò, quædam etiam frigido loco rectius conseruantur: quam varietatem non qualibet domus præstare potest.

Diuitiæ quoque saltem mediocres adsint oportet, in primis autem animus liberalis, ab auaritia sordibusque alienus. Diuitiæ enim hoc præstare poterunt, ut commodè habitet, & medicinas quæ emendæ sunt, suo tempore quam optimas cõernat. Animus autem liberalis, minimeque auarus; cauebit, ne compendij, aut lucri sui causa, detiores vili pretio libentius, quam præstantissimas, paulo largiore comparet.

Iam simplicibus medicinis omnibus diligenter collectis, eõemptis & repositis, succedit industria compositarum ritè dispensandarum, vbi eum in primis vigilantem & circumspectum esse oportet. Hoc obseruare conuenit, ne sit alæ aut similibus ludis deditus, ne computationibus gaudet, aut alioqui vinosus vel ebriosus, neque foedis amoribus implicatus teneatur. Alea enim negligentiam parit: ebrietas, errores, obliuionem & stuporem inducit: turpis verò amor, etiam veneficia illi extorquere possit.

Quod si accesserit vera pietas, hoc est, timor Dei, & fides in Christum, charitas erga proximum, & spes futuræ vitæ, omnia erunt tutiora, illustriora & feliciora. Tum enim cogitabit: Si quid per negligentiam in vitam aut valetudinem proximi peccauero, iudicium Dei non effugiam: quanto minus effugiam, si sciens ac prudens venenum dederò, abortum procurauero, aut aliquod aliud ingens atque insigne flagitium designauero? Et si humanitas eorum qui infirmos & ægros tantum visitare solent, Christo adeò grata est, ut illud beneficium in seipsum collatum esse asseruerit; quanto gravior erit illi mea cura & sollicitudo, dum studeo illis Medicinas rectè componere tempestiuè exhibere, & non propter lucrum tantum, verum etiam humanitatis respectu operam dare, ut melius habeant & conualescant.

L'Obelij explanatio.

DOCTVS sit Grammaticam.) Hoc optatissimum V. Cordi, I. Syblij & aliorum præceptum, quamuis adiuuandis dignissimum; hodie tamen negligitur, quia lucri cupiditas & castitas valde peccant: sed et illiberalesque Pharmacopœi nonnulli decoris ætatis suæ obiti, nullius delectus impetis famulos cæculasque Officinarum artem quam ipsi sæpe non carent instructos, latine lingua omnino rudet & ignaros, suscipientes; quos hodie docti Medici plerumque cum censoribus instruere vernaculo admodum conuenit, quo impune, sine noxa infectis supina negligentia tuæ & iuuenis ægris præsumit medicanturque.

GVILI-

GVILIELMI RONDELLETII

in schola MONSPELENSI professoris

Regij & Cancellarij celeberrimi PHARMACEVTI-

CIS OFFICINA longe correctior Remediorumq;

quorundam symbolo auctior, opetrâ L'obelij,

Procurum.

CVM agrotantium causa, Lutetia, Antuerpia, Lugduni, Roma, Monspeluli, Tholosa, alijsque multis locis versaret: multa superflua & inutilia, multa autem necessaria & vitia, ad bene agros curandos desiderari cognoui, & vnumquemque Pharmacopolam pro arbitrio medicamenta parare, nullamque certam medicamentorum componendorum, medicorum semper regulam: quosdam imperitis rei medicae, aut barbaros Arabes imitantes. Huius ob causam toti Reip. vtile fore putant, si Officinam methodicam parare breuissimè indicarem: in qua neque vascula aurea, neque pyxides pilla viderentur; sed ex qua, remedia, ex non adulteratis, sed optimis quibusdam rebus, composita, paruo arte comparare quisque posset, plus in recessu habitura, quam in fronte promittat; quod longè aliter hoc tempore in Officiis solet fieri: Nam qui Officinam Pharmacopola parant, in hoc tantum incumbunt, vt vascula aurea, & pilla sibi habeant, quae plus ad ostentationem faciant, quam ad necessitatem, vt vulgus illas Officinas admittitur. Quod si illam superfluum, & inutilem impensam in componendis optimis medicamentis infunderent; & sibi, & agrotis longè melius consultum esset. Sed ea est ferè omnium communis insania, vt malint videri, quàm esse. Huius insanix fautores sunt magistratus, qui in hos inopulentes deberent animaduertere. Item artium Professores, quibus à Principibus demandata est prouincia, vt eorum officinas inuisent, & inspiciant, si bene instructae sint rebus omnibus; & si, quae parantur auxilia ad morbos propulsandos, talia sint, qualia esse debent. Qui autem hanc commissam prouinciam, vel ob questum, vel ob amorem contemnunt, grauiter peccant in Remp. digni scire, qui summa cum ignominia à bonorum consuetudine expellantur qui, vt suo officio fungantur, tantum abest, vt Pharmacopola refragentur, vt sepe ad id solliciti ac inuitent. Nam, vt qui malè agunt, lucem fugiunt; sic, qui bene hanc lucem amplectuntur, sibi & ornamentis, & utilitati futuram intelligunt. Confidentius enim illi agroti sese committent, & liberalius medicamenta persoluent, cum nos diligentia eorum & fidelitatis testes habebimus. Hoc potissimum Pharmacopole curandum, diligenterque obseruandum est.

Instructurus officinam, ante omnia curet, vt simplicia optima, & selectissima sibi vndiqueque comparat; & comparata singula diligenter à putredine conseruet: Ita ordine disponat, vt omnia ad manum sint, & ex his composita medicamenta certis temporibus parat; & parata seruet. Sed quae illa sint, & quemodo conseruanda, aut in ordinem digerenda, paucis docebimus.

§ A quibus petantur Medicamenta.

MEDICAMENTA petuntur ab Aëre, Igne, Aqua, Terra; Lapidibus, Plantis, Animalibus. Quae ab Aëre, vt Manna quod Mel aëreum dicitur à Galeno, quod in aëre & arboribus colligatur.

Ab Aqua petuntur medicamenta; dulci medicamentoſa, vt Pluuiiali, fontana, fluuiiali, ex qua herbae nascuntur, vt Lentigo aquatica, Acorus vulgaris, Nymphaea, Stratiotes aquatica, Hippuris scemina, Lauer, Syimbrium.

Ab animalibus aquatilibus, vt Crocodylus, Piscis, Testudo pallustris, Ranæ, Cancræ fluuiatiles, Ostachi fluuiatiles, Anguilla, & multi alij pisces. Ex aqua salſa, vt Alcyonium, Sal, Flos salis, Spongiae, Corallus veterque.

Ab aqua mixta ex dulci & salſa, vt Adarce: reperiturque in illis locis, vbi dulcis aqua miscetur cum mari, vt in ostijs Nilij, Anguillæ; Asphakum & in mari mortuo etiam reperitur, & in quam plurimis alijs locis, vt in eo fonte, qui vulgò fons (de la Pega) dicitur & non procul à Beauregard in Auernia. A terra, Herbae, Arborea, Animalia, Metallica, Lapides, Terræ variae species.

Ex herbis, vt Radices, Caules, Folia, Flores, fructus, semina.

Ex animalibus integris parantur medicamenta, vt Cicadis, Vermibus, Asellis, Cantharidibus, Cancris, Scillis, Locustis, Vulpecula, Galerita, Troglotidibus, Hirundinibus, Cuculis, Pipionibus, Ranis, Rubetis, Torpedine, Lupo, Cane, Talpis, Lepore marino, & terrestri, & alijs multis similibus. Ex parubus animalium & primum à capite toto, vt Smardis, Lacertæ, Leporis, Muris.

Ab igne
Cauticia,
Ignis ferri,
auri, chaly-
bis, silicij
& aliorum.

Silina.

A partibus capitis, vt ex cerebro Leporum, Passetis, Cranio hominis, & Dentibus Apri, Equi, Asini, Lamæ, Elephantis, Lupi, Vnicornu.

A partibus animalium, Apri, ex carne Porci, pulmone Vulpis, hepate Lupi, Vulpis, Capræ, Hirci, Canis rabidi, Anferis, Echini terrestris, Echinaceæ, Ranæ, Hyæne, Equi syluestris, pulli Onagri, Asini, Rubetæ: ventriculo toro vel interna pellicula ventriculi Anferis, & Gallinæ: Intestini Lupi, Gallinæ, Anferis, Leporis: Renibus Vulpis, Scincorum, Testicula Gallorum, Castoria, Luthæ, Vulpis: vesica Cattoris, Leporis, Elephantis, Hirci: cute Serpentis, Viperæ, Vrsi, Vituli marini, Echinaceæ terrestris, & marini, Ovis, Leonis, Ichthyocolæ. Ab humoribus, sanguine Hominis, Porci, Columbarum, Leporum, Anatium, Anferum, Hirci, Vespertilionum, Tunnorum, Testudium terrestrium, marinarum, & pallustrium.

A Bile, vt Piscium, Vranoscopi, Pastinacæ: Auium, vt Aquilæ, Milui, perdici, Gallinæ: Quadrupedum, vt Tauri, Vacæ, Vulpis, Hirci, Lupi: Insectorum, vt Serpentis, Lacerti.

A lacte animalium, vt Mulieris, Chameli, Caniculæ, Vacæ, Capræ, Asinæ, Ovis.

A coagulo, Hedi, Leporis, Vituli marini.

Ab ouis, Gallinarum, Phasianorum, Formicarum.

Ab extremitatibus particularium animalium, Vnionæ. quæ sunt in Ostreis, Moschus, Cueta, Orisopus, pili Equorum, Vrsæ, Hominis, Talpæ, Leporis, Canis: Ungula Asini syluestris, Equi, Lychenæ equorum: Cutis Viperarum, Serpentis, Vrsi, Vituli marini, Erinacei terrestris, & marini, Leonis.

Ex Balneis, & Athletis. vrina pueri, Apri, Multæ: Stercore, Gallinarum, Hirundinum, Columbarum, Lupi, Cania ossa rodentis, Hominum, Capræ, Vacæ, Muris, Lacerti, Porci, Asini.

Ab adibus, Adipe hominis, Porci, Gallinæ, Anferis, Ovis, Anatidis, Vrsæ, Taxi, Leonis, Asini, Equi, Tauri, Capræ, Hirci, Serpentis, Viperarum, Vmbæ piscis, Vituli marini, Angullæ: Cotinibus, Cerui, Vnicornu, Asini Indici, Capræ.

Ab arboribus, vt Radicibus, folijs, Caulibus, Corticibus, Lignis, Floribus, Fructibus, Seminibus, Succis, Lacrymis, Nucanentis.

Radicum aliquæ sunt aperientes, calfacientes, mollientes, extenuantes, digerentes, relaxantes, purgantes, astringentes, temperatæ.

Rad. Aperientes, vt Granis, Asparagi, Ruscæ, Fomiculi, Aprij, Olusarii, Smyrni, Petroselinæ, Spicæ nardi, Asari, Rubiæ maioris, Quinque folij, Cypeti, Capparis, Phu, Filicis.

Rad. Extenuantes digerentes, vt Ail, Serpentariæ, Zinzibetis, Costi, Enulæ campanæ, Galangæ crassæ & tenuis, Calami aromatici, Gentianæ, & Cucumeris agrestis, Sambuci, Caprarum, Sellæ, Peoniar, Tapfæ, Mei, Pancratij, Xiphij, Iudæ, Pyretri, Ebuli, Alij, Porri, Raphani.

Purgantes radices, Centaurij maioris, Rhabarbari, Brionis, Lapathi acuti, Hipolapathi, vtriusque Veratri, omnium Titymalorum, Alypi, Polypodij, Turbith, Rhapontici.

Temperatæ & cordiales, vt Satyrionis, Chinos, Orchia, Botaginis, Doronici romani, Eryngij, Pastinacæ domesticæ, Ben albi, & rubri, quorum loco supponuntur radices Botaginis, & Buglossi.

Radices malacicæ, vt Liliorum omnium, omnium Maluæ specierum, Acaulij, Gerardij maioris.

Radices constringentes, Tappi barbatu, Tormentulæ, Bisfortæ.

Follia & caules, calfacientis cum astringente, vt Absynthij omnes species, Mentæ, Balsamitæ, Saluicæ.

Calfacientia sine magna astringente, vt Chamedryoa, Chamephoros, Scordij, Marrubij, Hyssopi, Betonicæ, Melissæ, Anthos, Scabiosæ, Pulegij Regalis & Ceruini, Calaminthæ omnia species, Thlaspi, Iberis, Rutæ, Stecados, Lauandulæ, Nasturtij, Erucæ, Erysimi, Bechij, Anagallidis, Anethi, Porri capitati, Lauri, Maioranz, Parthenij, Arcequifæ, Abrotoni, Sabina, Ormini, Fomiculi.

Media & minua calfacientia, vt Buglossi, Borag. Agrimonis, Capillorum Ven. Adianti vulgaris, Gallierici, omnium Maluarum.

Refrigerantia, Lactucæ domestice & agrestis, Portulacæ, Cucubitz, Solani, Plantaginis, Semperui, Umbilici Veneris, Hepaticæ, Lensiculæ aquæ, Polemonis, Telepinij, Polygonatæ.

Minus refrigerantia, Cnicorij, Intybi, Sonchi leuis, Rostri porci alij speti, Endiuæ agrestis.

Laxantia, Titymalorum, Thymelæ, Brassicæ, siluestris coquantur, Chamelocæ, Mercurialis vtriusque, Brassicæ marinz, Scammonij, Lapathi acuti, Betæ, Spinacij, lubricando.

* An ex rema
tu legatum.

Qua methodo debeat sibi simplicium promptuaria parare
Pharmacopola.

HERBAS in officinis habere debet, quæ vel cassaciunt, vel exiccant, & servari possunt autem græa viribus: Quæ autem humida sunt, in hortis sunt conservanda: aut observandum, quibus in locis inveniri possunt, cum eorum usus erit necessarius. Quare diligenter montes, præta, littora, aliæq. loca considerare debet, & quæ herba in sua regione facilius proveniant, & quibus careat, ut aliunde adhiberi curet, vel si aliquæ non habeat, quæ in locum substitui possunt quædam à medicis, nam quæ unam ex tribus speciebus Calamenti habet, vel montanum vel Pulegium regale, vel Nepetam (vulgè herba cati) potest aliqua istarum carere: Quæ quæ similes vires habent, noceat oportet, de quibus suo loco.

Herbæ in hortis conservari possunt, Betonica, Calamentum, Pulegium utramque Origani, Sampsuci, Paribemini, Sæchæ, Menæ, Satureia, Hyssopus, Salvia, Thymus, Chamæpitys, Chamædry, Pollum, Centaureum minus, Absinthium, Eupaterium Mesua. Herbæ in hortis conservari debent, ut Apium, Olusatrum, Smyrnium, & similia, Violaria, Lætuca, Ithybus domesticus. * Nympha: Semper vinum utrumque, Telephium, Portulaca, * Capillares amni, Chibotium, Eumaria, Buglossa agrestis, Plantago, Malva, Solanum. Semina & fructus reponuntur in usus multos: ob id illa habere oportet, quæ sunt in frequenti usu. Hæc in vase siccis conservari debent, ne propter caliditatem rancescant.

Enumeratis his, quæ Pharmacopola sunt necessaria sequitur, ut quando eorum sese offert usus, ut promptè habeantur, & quomodo id fieri possit, dicamus. Cum herbarum omnium natura similibus nusquam sit, aliæq. sint substantiarum & qualitatum magis constantium, ita ut extra natale solum viribus integris ad unum annum vel plures servari possint, modo recte præparantur & recondantur, ut hæc, quæ cassaciunt refrigerant & exiccant: Alia autem, ut humida, vix obis diuturno spatio sine putrefactione, & vix, nisi defer dita sua humectandi vi, servari possint: opus est, ut his optime consideratis omnem operam diligens Pharmacopola conferat, ut ea in officinis suo tempore collecta, & conservantur sapè præparata, in totum annum asseruet, quæ domi annuam custodiam ferre poterunt. Si quæ è sua regione, vel qualia opus est, non possit colligere, ea aliunde sibi adhiberi curet potissimumq. ex his regionibus, in quibus naturæ à doctis celebrata esse scriptoribus. Quod si non possit, vel sibi imponi timeat, alius noceat ac perquirat, quæ aptè in locum poterunt substitui: idque non suo arbitrio faciendum, sed à præcipiente medico indicare quod penes se habeat, & de substituendo eum religiose interrogare possit. Quæ autem illa sit, ut scias, ne idem mihi bis veniat repetendum, in sequens caput rejicite in quo de horticis, quæ in officinis servandæ sunt, loco commodo, & ordine dispositis, ex ordine dicere est æquum, succedentium tractatum particularem aliis deturum. Quæ autem partitionis secundum locum obtinent, vel in hortis servabuntur, vel quibus in locis ruti nascantur, accuratè notabis, vel si nunquam eb eali inclementiam, vel corruptionis facilitatem servari possint post dicemus.

Rari, Umbilicus Veneris, Nymphae utraq. utrumque Scempervivum, Telephium, Capillares amni, Chibotium, Eumaria, Buglossum vulgare: eaq. præcipi, quæ in usum frequentium veniunt, ut Plantago, Solanum, Malva.

Reliquorum omnium simplicium, quæ ab arboribus vel animalibus eruntur, quacquam exsiccare poterunt, & si ac potius conservari, primæ conditionem subibunt, ut etiam terra, & mineralium tum maiorum qualibet genera, hæc est, in officinis commodè servari poterunt. Reliquorum autem quæ tale munus ferre non poterunt, perquisitio diligens fiat, quando eorum necessarius sese offeret usus.


Fructus in loco minus siccato reponi debent, & in vasis siccilibus, potius quam ligneis, ut eorum humiditas, nimia siccitate, non resoluatur. Simul reponi debent Pruna, Tomarindi, Oxycardi, Juniperi matris, quam Cedron exillimo, Bacca Lauri, Hædæra, Thymela, Chamælea: Bacca Myrti cum fructu Sumach & Berberis, Mespila & Fabæ, Pyrafilueitria, Mala cetecea per medium dissilla, file trahita, superiore parte Officina * suspendenda. Cornu siccari possunt, & cum Myrtillis conservantur Piper album, longum, nigrum, Cubeba, grana Paradisi, Cardamomum minus & minus. Alio loco reponi debent Hardum mundatum, & integrum; Oriza & feruæ ibarum sem. Limy, Fæmugreci, & Sezamini. Radices odorata servanda sunt in loco minus calido, superiores tamen, ut

* In regionibus humidis cibicus facienda.

Enula campan. Ireo; Veneta, & Florentina, Bechij, sine Vngula Cabalina, Calanga maioris & minoris, Cyperi, Calami aromatici. Radicem Boben albi & rubri si quis velit habere, colliget cum radicibus Buglossi, borag. Glycyrrhizæ radix, Consolida, Narcissi, Squilla, Pancreatij, Zinziberis, Melchin, quem puto Secacul verum. Item Cyperus Babylonens, quam Terram Adversam putabant, Gemiana, Azarum, Valeriana, Caryophyllata, Cucumer agrestis, Bryonia, Iarna, Serpentaria, Arum, Asphodelus.

Radices Apij, Petroselinæ, Graminis, Runci, non Fœ nigrelli, Asparagi, in regionibus frigidis colligi debent. Pro hyeme autem servantur in subterraneo loco, vel in arena, quemadmodum in quibusdam locis parare solent, & in caucis sepelire, ne frigore gementur. In alijs regionibus sufficit colligere pro hebdomada, quo tempore syræ parant, vel apocimare videntur Medici, ne quotidie cogatur extra urbem querere. Quid si quis habeat in horto, vel in vinea, vel in loco vicino urbi, optimum erit.

Radices Lapsathi acuti recentes, meliores sunt & possunt semper inveniri, maxime apud nos etiam media hyeme, & eo tempore frequenter vituntur. Asarum servetur cum alijs odoratis, & Spica Celtica; Spica Nardi, Schenantho; (flores violarum, Nempfaris :) In eodem ordine Buglossi, Borag :) Chamomila, Melilotz) flores Anthus, Stechadis :) Salvia, Lauandula : (Centaurij minoris, Hyperici, Androseni :) flores Balanitidum, Citinorum cum rosi. Ligna, Cinamomum tenue & acre, cum Cinamomo crasso & astringente, quod est Cassia : (Sandalum albu) citrinus (& ruber.



DIARIUM PHARMACEVTICVM,

sive Pharmacorum Parandorum, & simplicium

legendorum ex Rondelletij fragmentis & documentis, Dios-

coride, Galeno, Aegineta, Syluio alijsque classicis & per-

bonis authoribus sætè decerpia, opetâ &

studio Matthiz de L'Obel.

IN vniuersum annum optimi instructum effi-
cinarum in Atyropola per dies & menses opera-
rijs, famellis & officina cæculis iniungis qua
facienda sunt; quia nonnulla medicamenta
omni tempore parari nequeunt: quorum quidem
aliqua si concitari possent; tamen non debent,
quia omnia simplicia suo tempore & in summo

virium vigore (vt scitè Diosc. & Galen. do-
cuere) colligenda, recondenda, præparanda, &
alijs miscenda. Nonnulla verò quoniam anni car-
dine, solo & calo, vel minori sumptu præpa-
rantur, & miscentur. Exemplo igitur sumpto
ab his qui opera locarunt; exordium sume-
mus.

IANVARIO.

MENSE primo & anni primis diebus per-
lustranda quæ superiunt valida & integra in
officina; vt vitiosa, canosa, antiquara, depraui-

ta & putrefacta abiciantur; vt & quæ desi-
detantur inueniantur, & absumpta restituan-
tur.

FEBRVARIO.

QUAE CVM QVÆ imperata sunt mense Iau-
uario, fieri possunt hoc & sequenti mense. Et
circa finem in regionibus calidis, in quibus
omnia præcocia sunt, collige Violas ad syrapi
præparationem, Conseruationem siue Condi-

tum, ad Oleum, & ad pulueres cordiales sic-
catas seruandas; quas & cardius colligere po-
tes vt sicciore sint, & calor maior adit ad sic-
candas eas.

Collige item Keyri.

RADICES COLLIGENDI TEMPVS.

Circa finem Februarij, initio Martij, & pri-
mo Vere collige radices in varios vsus, prius-
quam vis in solia erumpat.

Censuit tamen Dioscorides omnes incipi-

ente foliorum de fluuio esse legendas, & calo
serend, cui in quibusdam Galen. Auicenna &
Mesues consentiunt, in alijs diuersa senti-
unt.

MARTIO.

MARTIO.

RADICES quouis anni tempore colligi possunt quæ hominum cultu & satione crebra

in omnem anni partem vegetæ incidunt: quales ferè sunt hortenses alimentosæ, vt,

Apij vulgaris.

Buglossi vtriusque.

Betz.

Lactucz.

Intubi.

Oxalidis.

Raphani.

Napi.

Pastinacz.

Sisari.

Cepz.

Porri.

Allij.

Et præter
has erra-
ticæ,

Dauci.

Gingidij.

Caucalidis.

Ari.

Dracunculi.

Cyclaminis.

Periclymeni.

Coryledonis.

Nam hæ quinque vt bulbosæ quædam, aliz etiam æstate siccatis folijs plenæ sunt, & frequenter Autumno regerminant, alimenti pinguis & crassi copia.

Quæ verò folius naturæ sponte crescunt, aut semel à nobis tempestiuè feruntur aut plantantur; ferè sunt optimæ, solo aut vere, aut (vt dixi) autumno, paucissimæ æstate aut

hyeme. Quin & hæ quas multis anni partibus communes diximus, sunt præstantiores, cum tempestiuè satæ adoleuerunt & vigent; alijs verò temporibus ignauiores; quando vi quadam & holitoris opera & irrigatione coguntur adollescere sub cælo sibi parum propitio; quale æstiuum est ac autumnale & hyemale. Sic vere ipso quando primum germinare incipiunt, nobis leguntur in annuæ:

Enula.

Althæa.

Iris.

Acorus.

Symphytum.

Rufcus.

Asparagus.

Petroselinum.

Apium palustre.

Feniculum.

Bryonia.

Agrimonia.

Meum.

Phu.

Cyperus.

Rubia quæ po-

tius autumnino.

Saxifraga.

Eryngium.

Tormentilla.

Pentaphragylon.

Pæona vtræque.

Polypodium.

Gramen.

Lilium.

Alni nigre radi-

cis cortex.

Hyoscyani.

Angelica vtræque.

Anonis.

Afarum.

Atclepias.

Bistorta.

Betonica.

Buglossum.

Carlina.

Garyophyllata.

Centaurium ma-

ius.

Chelidonium v-

trumque.

Cotyledon.

Cynoglossum.

Diſtamus, al-

bus.

Elleborus ni-

ger.

Esula maior.

Farfara.

Filipendula.

Filix.

Filix florida.

Gentiana.

Iarus.

Aron.

Imperatoria.

Lepidium.

Mandragoras.

Narcissus.

Nympha.

Radix cana.

Capnos Plin.

Rubus.

Scrophularia.

Petasites.

Petrosel. Mace-

doh.

Peucedanum.

Pimpinella.

Pistlochchia.

Pityusa.

Cortex rad. Po-

puli.

Sigillum Matris.

Orchides.

Raphanus syl. &

Ruticanus.

Muscus arbo-

rum.

Cort. rad. fam-

buci.

Rad. Ebuli.

Cortex rad. Fra-

xini.

Cortex rad. Lau-

ri.

Cortices arborū.

HERBÆ ET FLORES.

Viola Martia ad

Syrupum.

Conseruam. } in regione
Oleum. } temperata.

& cordiales confectiones.

Keyri.

Aquæ destillantur ex vio-

lis & herbis hyeme vege-

tis, vt

Aqua Vmbilici Veneris,

Mandragoræ,

Semperviuui,

Capill. Veneris.

Adiantum omne,

Asplenium, Philicis.

In regionibus calidis Syr.

ex herbis recentibus pa-

rari possunt, vt:

Capillorum Veneris sim-

plex & compositus,

Grana hederæ arboreæ.

Oculi Populi.

APRIL I.

A P R I L L

Quæcunque omiffa Martio mense, initio Aprilis parari & colligi poffunt.

Keyri. Primula Veris.

Narciffi flores ad oleum.

Cochlearia. Orchides. Salvia vita.

M A I O.

Quæ prætermiffa funt mense Aprilis, fiant initio Maij.

Diffillenrur herbæ quæ ad ftatum pervenerunt.

Herbæ quæ iam caulem producunt, & fermen edunt illo mense, conferuantur ad Theriacam vel aliam compositionem. Reponantur in altiori parte domus.

Vnguenta ex succis fiunt.

Emplastra ex succis herbarum parantur.

Conferuationes ex plantis.

Colliguntur

Abfinthij coma ad confer.

Eupatorium ad succum.

Paludapium,

Daphnoides,

Cichorium,

Fumaria,

Geniftæ flores,

Lactuca fyl.

Serides,

Lens palustris,

Leucoia,

Lichen,

Mizerton,

Napi fermen,

Plantago,

Lupulus,

Tamarifcus,

Thlafpi fermen,

Vinea peruinca,

Bogula,

Atplenium,

Phyllitis,

Borago,

Bugloffum,

Burfa pafforis fuccus,

Limoniu Germanicu,

fue Pyrola,

Ophiogloffum,

Pulmonaria vtraque,

Rofæ,

Rofmarini flores,

Flor. Sambuci.

I V N I O, & initio I V L I I.

Abrotonum,

Agrimonia,

Alchymilla,

Altercum, fue Hyof-

cyamus,

Althææ flores & folia,

Anethum,

Anthemis vtraque,

Artemifia,

Afari folia,

Ballotæ,

Calamintha montana,

Calendulæ stillatitia,

Carduus benedictus,

Caffytha,

Centaureum minus,

Chamazdrys,

Chamazpitys,

Rofæ in regionibus

temperatis,

Syr. Rof. confer. ole-

um, vnguētum, fuc-

cus,

Betonica,

Brassica marina,

Botrys,

Branca vrfina,

Cari fermen,

Coriandrum,

Epithymum & Epi-

thymbra,

Equisetum,

Euphrasia,

Galega,

Geniftæ fermen,

Gratiola,

Hypericum,

Hyllopus,

Jacobæa,

Labrum Veneris,

Laurus,

Lyfimachia lutea,

Maiorana,

Marrubium,

Marum,

Matricaria,

Meliffophyllum,

Mentha,

Mentastrum,

Mercurialis fuc.

Millegrana,

Nepita,

Nummularia,

Origanum.

Papauer Rheas,

Opium,

Parietaria,

Parthenij fue Cotulæ

floræ,

Periclymini flores,

& fructus, & fo-

lia,

Petrofelini Macedo-

nici fermen,

Phlomos,

Pilofella,

Polium,

Polygoni aqua & fuc-

cus,

Portulacæ succus &	Sabina,	Serpyllum,
Stillaicia,	Saluiâ,	Scordium,
Ros solis,	Sanicula,	Verbena,
Ruta utraq̃ue,	Satureia,	Veronica.

I V L I O.

In regionibus temperatis quæ prætermiffa sunt Iunio, faciendâ.

Quæcumque Solis seruitutem requirunt, paranda, ut Theriaca, quæ in calidioribus regionibus parari solet Iunio mense, ubi omnia sunt præcoccia.

Parantur Trochisci Aliptæ moschatæ, quia mollescunt Ladanû & Styraç, si Soli exponantur.

Quod si quis eo tempore hæc neglexerit aut prætermiserit, licebit aquam rosaceam addere calidè; & vi caloris liquefcent; (sicuri Balneo) quod melius est, quia illa longa insolatio exsoluit vires odoratorum.

Apud nos quia semina seriùs maturefcunt, insolatio & fermentatio Theriaces potest iuuari & accelerari in balneo vel hypocausto.

Colligenda in regionibus calidis.

Abfinthium,	Ligustici semen.	Morus,
Abrotonum,	Sem. Sefeli Massiliensis,	Orobis,
Ageraton,	Sem. Lithospermatis,	Capita & Sem.
Coriandrum,	Lupinus,	Papaueris virtusque,
Dauci Cretici semen,	Sem. Malug,	Psyllium,
Sem. Petroselinii,	Flores Meliloti,	Ribes,
Hydropiper,	Sem. Anethi,	Sophiæ semen,
Pulegium utrumque,		Tanacetum,
Lauendulæ flores,		

A V G V S T O.

Quæcumque neglecta aut omiffa sunt præcedente mense, fiunt Augusto.

Collig.

Althææ semen,	Fraxini semen,
Sem. Cataputæ,	Milium,
Cnici semen,	Flos Nymphææ,
Cornus,	Petum. Mel peti,
Cynosbatos fructus,	Oniphacium,
Dauci vulgaris semen,	Prunus syl.
Cucumis Elaterij,	Sem. Sambuci & Ebuli,
Rhamni Cathartici sem.	Momordica,
Polium,	Scordium,
Ricinus,	Sefeli Æthiopici semen,
Spica Lauendulæ,	Sem. Hyoscyami,
Tribulus aquaticus,	

S E P T E M B R I E T O C T O B R I.

Antipodium è Myrto & Cydonio.

Cottices Castaneorum.

Cotonea mala Halicacabum Mespilus

Rhamni cathartici semen.

Radices nonnullæ omiffæ Vere nouo. vt, Iridum, Pæoniæ Acotl,

N O V E M B R I E T D E C E M B R I.

His duobus mensibus, Nouembri videlicet ac Decembri, eadè erit ratio, si modò in eis contingit eiusmodi calitèperes, ut radices adhuc validæ nulla vel frigoris vel niuù tempestate

concutiantur. nam sæpe ijsdem mēfibus contingit, ut sine vlla æali iniuria Pharmacopœis quod reliquum est radicû in hortis remanentiu, æquè ac in præcedentibus, colligere liceat.

De

De collocacione Medicamentorum in Officiis; & in quibus vasis seruandum fit vnumquodque.

NON sufficit suo tempore optima simplicia collegisse, & ad conseruationem parasse; sed sic conseruanda sunt, ne putrescant loci humiditate, vnde resciccat nimium, resolutione suam virtutem deperdant. Verum inter medicamenta sunt que negligentiam Pharmacopola ferre possunt: que dura & densa sunt, quæ à consus precararidie non multum laeduntur: At que tenui sunt substantia, non solum iniuriæ externi aëris; omnium minus odorata & flores: ob id vnumquodque in loco magis apto oportet disponere.

De Medicamentorum collocacione, & ordine, & ratione.

VT omnia in officinis ad compositiones faciendas magis sint in promptu, & ut uacant, ad manum, erde in collocacione sollicitus est obseruandus. Quod si fiat, quantum per praecedentis capitis canones licet locum in classes diuidetur, ita ut vnam humida, aliam secca, tum etiam aliam frigida, aliam etiam & calida, tam simplicia, quam composita obtineant. Rerum classis alia nobis propinquiora sunt, quæ usu sunt frequentioris: alia secundo, tertio, & sic deinceps ordine pro ratione usus illorum: ita vltimum, ea, quæ fortiora sunt & minus consueta, occupant, non omissis præterea titulis, immo singulis impositis, qui nobis quid in ea recharrepositum sit, significet; nec diu vos anxios per officinam errare sinat. Hac eo modo parabantur, ut in plures diuisa arculas, omnia eiusdem ferè facultatis contineant. Liquida omnia vasis argenteis, vitreis, corceis, siliilibus, vitreatis, conseruanda sunt, ut Olea, Resina, liquida vnguenta: quæ autem vnguenta ad refrigerationem parantur, in plumbis. Resina, Symplicia, & alia, quæ iniui sunt, neque in vasis autis, neque in plumbis conseruanda sunt; Nam si Gal. aqum cisternæ reijcet, propterea quod per tubos plumbeos, & canales in cisternam deflunt; quæuis magis reijciendæ medicamenta conseruata in talibus vasis, à quibus abraditur vel ardeat, vel censet? Ob id sunt conseruanda in vasis vitreis, vel siliilibus vitreatis, maxime si diu quiescere debent, & in his conseruari, ut solent Pharmacopola. Alipes & vnguenta ex adipibus parata, in vasis plumbeis, vel argenteis conseruanda sunt, ut a rancore conseruentur. Semina & fructus in vasis ligneis, ut Tiliaceis, Buxeis, aliisque lignis, quæ nullo odore sint prædita, & medicamentorum substantiam tenuem conseruare possunt. In

eisdem folia & flores recondi possunt, aut etiam in sacculis caribaceis. Quæ distillationem desiderant & exsiccationem, in sacculis lineis conseruantur, ut radices aliquæ, quæ ærem ferre possunt ob densitatem, ut Aristolochia rotunda, longa, Asphodelus, Hermodactylus, Bistorta, & similes radices. Arcula sint hoc modo parata, ut tres, aut quatuor, vel quinque arculas contineant, ut earum qualibet, medicamenta, quæ similem naturam & facultatem habent, reposita habeat, imposito cuiuslibet suo titulo ea parata, quæ à nobis detecta est. In prima & secunda reponantur ea, quibus frequentius vtiuntur: in vltima vtrè, quæ fortiora sunt, & minus consueta, ut videre est in tabula sequenti.

L'Obel. Succedaneorum tabulas deleuit quia deprauatæ admodum & mutilæ, quas dedimus inter succedanea.

Quas compositiones paratas habere debeat Pharmacopola.

Simplicia medicamenta, quæ plura & meliora habebit Pharmacopola, eo melior & diutius, munus erit Officina ad morbum expugnandum remedia præparanda. Compositiones neg, tot, neque tantas habere oportet; nam corruptum, & multum mellis, vel sacchari, vel aliorum simplicium assumitur, nulla necessitate postulante. Illas igitur tantum habebit, quibus nemis medicos illius regionis frequentius vti, quæ fidelissimè parat: deinde vasis conuenientibus & aptissimis conseruet, ut dictum fuit & dicitur. Per multa compositiones sunt, quæ omni tempore parari possunt, ob id non sunt paranda, aut in parua quantitate propter subites morbos. Item aliqua sunt compositiones, quæ frequentius sunt paranda, ut habeamus & recentes & antiquas, qualia sunt omnia, quæ ex Opio parantur, ut Theriaca, Anaca Alexandrina, Asyncritum, Philonium, Triphera magna, & cetera huiusmodi medicamenta. Illa tamen commemorabo ex syrup, confectiionibus, aliisque sermis medicamentorum quibus intrinsecus esse debet, & quibus contentis esse potest medicus in morbis curandis. Nam oportet medicum peritum vii proprijs medicamentis temperatur, morborum causis, aliisque accidentibus, & communes compositiones magna ex parte tales non sunt: ob id melius est nouas compositiones pro rei necessitate componere: sed propter hyemis tempus & morbos repentinos, cogitur aliquas paratas habere. Et quia aliquæ sunt compositiones, quibus statim non est vsendum, ut Theriaca, aliisque ex Opio, ut Pill. de Cynoglossa, ob id illas paratas habere debet. Præterea sunt ali-

Notata dignissimum.

Placet peritum medicus proprijs medicamentis.

*MEL VIOLATVM
sic paratur.*

Rec. Mel. optimi, non antiqui nec cocti,
lib. iij.

Florum Violarum leuiter exsiccatarum,
lib. j.

Ponantur in vase ad solem, vt supra de melle rosato ostensum est.

In affectibus thoracis, Peripneumonia,
Pleuritide, & similibus conuenit.

Mel Anthosatum.

Rec. Mellis optimi tirannis, quadriennis
aut antiquissimi, lb. iij.

Florum Anthos semisiccatorum, lb. j.
Misceantur, & vt prius dictum est, in sole
paretur.

Ex floribus autem parari debet, aut si quis
velit eos prætermittere, saltem conseruam
Anthos paratam habeat. * Habet enim mel,
cum conserua, easdem facultates: quare al-
terutro carete possumus.

Mel Scilliticum ex Gal.

EX Melle antiquo, aut prius decocto fit,
cui melle Scillæ siccæ in vmbra, mani-
bus contritæ, quantum volueris. Immitatur in
vas ex quo fuerit extractum mel: Deinde an-
gusto cooperculo operiens, & extrinsecus cho-
rium vniuerso corpori vas circumdans, & di-
ligenter ligans, in locum omnino ad meridi-
em expositum reponere, Aquilonijs statibus nul-
la tenus obuium, vt ab ipsis periculi possit, &
frequenter moueatur, vt vndique in inca-
lescat.

Hoc idem fieri potest in alijs medicamen-
tis, quæ ad solem parantur, debetque Mel Scil-
liticum ex Melle antiquo, aut prius decocto
fieri. Vbi summè detergendum est, vt ex pec-
tore, pulmonibus, alijsque partibus, ad at-
tenuandum, ex-ectorandum & detergendum
hoc vtuntur.

Mel Passulatum, quere capite de sapa.

De Oxy mellis differentijs.

EX Melle simplici & Aceto Oxy mel simpli.
& multa alia medicamenta parantur, vt
Oxy mel ex duabus radicibus, Oxy mel ex
quinque rad. Oxy mel diureticum, Oxy mel ex
Ligustro, ex Calamynthia, Iulianum, Scilliti-
cum: Sed medicus tantum parabit Oxy mel
simplex & Diureticum: nam hæc sufficient:
qui enim diureticum habet, potest carete Oxy-

melle ex quinque aut duabus rad. Oxy mel
ex Ligustro & Calamynthia ex tempore parari
possunt; neque frequenter illis medici vtun-
tur. Sed quia Dioscor. & alij antiqui herbas
decoquebant in Hydromellite, vel Oxy melli-
te, hinc nã sunt tot Oxy mellitis differentiæ.
Oxy mel Iuliani parari non debet, quia laxan-
tia medicamenta recipit, multatque alla vene-
nosa: Præterea Acetum potius astringit, quàm
laxat: Adde quòd Oxy mel Iuliani, & simile,
tentat nervos, & alias partes, quæ Acetum per-
timefcit. Acetum Scilliticum parari debet ad
conficiendum Oxy mel Scilliticum, & ad ali-
quos vsus, vt ad dealbandos dentes: est au-
tem acerrimum medicamentum. Oxy mel au-
tem scilliticum mitius est, & minus lædit par-
tes nervosas, vt ait Gal. in consilio pro Epi-
leptico.

Oxy mel simplex D. Mesua.

Rec. Mellis optimi despumati, lib. iij.
Aceti vini optimi acerrimi, } ana
Aque clarissimæ, lib. iij.

Mel cum aqua despumetur iterum diligen-
ter, & cum aqua fuerit consumpta, tunc af-
funde paulatim Acetum, & coque secundum
artem in vase lapideo vel terreo plumbato ne
Acetum ex ære ætuginem eliciat.

Humores crassos, lentos pituitososque in-
cidit, extenuat & abstergit, eoque obstructio-
nes reseruat, phlegma crassum eliciendo, anhe-
landi siue spirandi facilitatem promouet.

*Parabitur hoc modo Acetum
Scilliticum.*

Rec. Laminas scillæ inter externam coti-
ticem & medias cortices lino consuta-
tas, tanto in ætuo, vt non se contangant, sic-
cabis in vmbra per dies quadringenta (non
enim facillè siccantur ob viscidum succum, quò
habent, & firum facillè contrahunt, si se con-
tangant) lb. j. sed ligno cultello conscin-
des: alios quadraginta dies in aceti boni
lb. viij. in vase vitreato oris angustis bene ob-
turato insolabis. Mouere oportet, vt in Mello
scillitico dictum est. Acetum postea colabis,
& vsui seruabis. Initio æstatis præparabis, an-
tequam scilla floreat. Scilla, quæ diu seruata
est, melior est ea, quæ recentè extrahitur, quia
sicior redditæ est. Oxy mel scilliticum pa-
randum non est nisi quis multum vtatur.
Qui enim Mel, & Acetum scilliticum ha-
bet, Oxy mel scilliticum in promptu parare po-
test, si partes Mellis tres, Aceti duas capiat.

Quòd si pertimescas, ne acrius sit ob scillam, temperato exymellite simplici, vel minorem quantitatem vsuipa.

Oxymel scilliticum vel Scillites.

Eius compositio est ex lib. duabus aceti scillitici, & mell. despumati lib. iij. simul decoctis; quod nihil aliud est, quam commixtio saporum, & ne tot vasa habere oporteat, hoc catere possumus.

Oxymel Diureticum, quod communiter paratur & pro syrupo à quinque Radicibus vsui esse potest.

Niclauius exemplar habet singulorum apu ana vncij. alii amnes habet apu, fœniculi ana vnc. j. Syllini addit vncij. Anisi ex descriptione syr. acetosi compositi.

Aliis legitur, in aqua fontana & aceti albi ana lib. 5.

Rec. Radicum sequentium viridum mundatarum & incisarum, scilicet

Radicum Apij, } ana lib. j.
Fœniculi,
Rad. Petroselinij, }
Rufci, } ana vncij. ij.
Asparagi,
Seminis Apij, } ana vncij. j.
Fœniculi,

Radices infundantur in Aquæ fontanæ lib. v. & in Aceti albi, lib. j. per diem naturalem, & in eadem aqua decoquantur radices primum; postea adde semina apij & fœnic. quibus adde Mell. lib. ij. Decoquantur omnia lento igne ad consumptionem tertie partis, fiat vt syrupus. Vide infra Chylarium Gramineam & Radicib.

De Oxysacchara.

ARabes ex Aceto, saccharo, & Aqua compositæ syrupum Acetosum simplicem, queni Oxysaccharum vocauerunt. Meseue etiam vocat & syrupum acetosum, de quo suo loco dicemus inter syropos: Sed Nicolaus Oxysaccharum composuit, quo vti debet medicus in morbis biliosis: magis enim conuenit, quam Oxymel, propter succum Granatorum. Hæc medicamenta in frequenti vsu habenda sunt, quia efficacia sunt & faciliè parantur.

Oxy-Saccharum.

Syr. acetosus.

Oxymel pituitosus conuenit, Oxysaccharum biliosus.

Est multum in vsu.

tur. Oxymel pro pituita & obstructionibus; Oxysacchara pro biliosis morbis, qui sunt cum obstructione. Syrupus Acetosus simplex inter alios medius erit, conuenietque vti que descriptioni, sed minus, quam Oxymel in pituita: minus quam Oxysaccharum, in morbis biliosis. Cuius descriptio talis erit.

Rec. succi Granatorum acidorum vnei viij. (quidam addit aceti vncij. iij.) sacchar. lib. j. Coquantur, donec ad formam syrapi veniant, molliissimo igne.

Hanc malim cum succo Granatorum, vt aliquantulum differat à syrupo Acetoso simplici nam quod ex Aqua Aceto & sacch. paratur, non differt ab Oxymellite. Arabes ex Aceto & saccharo fecerunt simpliciter Syrupum acetosum simplicem, & magis compositum: sed differunt, quia magis conueniunt morbis biliosis, quam Oxymel, & minus pituitosis.

Oxysacchara composita D. Nicol. Praeposita sic paratur.

Rec. Rad. Fœniculi,
Rufci,
Asparagi,
Graminis,
Capill. Veneris,
Asplenij siue Ceterach,
Phyllidis, id est, Lingue Cernuæ,
Trichomanes, siue Polytrichij,
Hepaticæ,
Violarum, ——— ana lib. f.

Succi malorum Granatorum acetosorum, q. f. Infundantur loco calido radices mundatæ & incisæ in succo, addendo parum aquæ: sequenti die coquantur secundum artis leges in vase terreo vitrato operto, addendo sub finem herbas. Sequenti die colentur & exprimantur, Syrupizentur addita. f. q. Zacehari albi.

Hic Syrupus est multum in vsu in febribus ex sanguinis & bilis feruore cum obstructionibus, in Belgio & Gallia: miror oxysaccharum negligi ab Anglo-Britannis.



DE SYRVPIS,

Syruporum alij sunt simplices, alij compositi. Simplices possunt fieri ex omnibus herbis cum saccharo: sed sufficit paratos habere ex communioribus, & ex his, quæ omni tempore parari non possunt.

Paratur Syrupus Violarum, Nymphaeæ, Adianthinus, Endiuiæ simplicis, & Papauere, &c.

L'Obel.

**L'Obel. SYRVPI aut
SERAPIA.**

SRa: *ῥῶν* Arabibus potum portionem. Sue & *ῥῶν* vinum vel Syrupum, id est portionem medicatam, latine vertit Clariss. vir & philosophus Lancelotus Brunus, medicus Regineus Angliæ, Arabicæ linguæ peritissimus. Hallucinatur igitur qui Syrupum, quasi Syrix Opon, id est liquorem dictum esse interpretatur. Actuarius & Simeon Setus scriptores Græci Serapion & Serapia dicere, Arabumque inuenta credunt; quemadmodum priscorum Græcorum Theophrasti de causis Plantarum, & Dioscoridis de Simplicibus siue mæretia Medica *CHYLISMATA*, à Ruellio *LIQUAMENTA*, & à Gaza, Theophrasti interprete, *SUCCATIONES*, transuersa; & ut vis Simplicium Medicamentorum Plantarumque citò euascelens, diu in virium vigore & efficacia conseruetur; dum succus vel Infusum, vel Decoctum earum ex Saccharo aut Melle, aut utroque simul condiumur & asseruantur: Si enim rectè ritèque parantur, vltra annum durant. *APOSEMA* autem, id est, *DECOCTVM* Herbarum & radicum, Seminum & Florum à Syrupo differt duratione, suauitate & consilientia: Vix enim quatuor, quinque aut sex dies durant, aut seruant viribus herbarum virentium Decoctum integris, æstare possissimum ob Sacchari aut Mellis minorem quauitatem, lenioremque ebullitionem.

SYRVPI longis aquis suis decoctis præcessoribus nostris vocatis & descriptis, minusque durabilibus & Zulapijs, *CHYLARIA* ab Actuario dicta, id est *SUCCATIONES* & *LIQUAMENTA* diminutiue ut vt conuenire videntur, Chylarium enim a Chylos vocatum Actuario & Nicolao Alexandrino, Herbarum est leuis Succatio aut Decoctum, adiecto Melle mediocri, aut Saccharo. *ῥῶν* enim Succum significat, & *ῥῶν* Succum expressum, eliquatum, aut Liquamentum. *ῥῶν*, Succu confectio aut Succo. Succ enim Medicati, Sapæ, Sytupi & Chylismata assimilitudinem & inter se alimnitatem habent.

Chylismata autem, seu Succationes Medicatæ, cum purgatrices, æum Concoctrices, siue humores præparantes; (quas concoctiones cinisfiones ipsarum; Hippocratem ridet; qui iussit Concocta medicata) siue vilo Saccharo aut Melle, modo artificiose cuiuscunque simplicis medicamenti energia asseruetur, vitæisque commodioribus vasis ocludantur, per

multos annos durant, vt Theriacæ, Methridatica & alia antidota. Maiori enim hodie cum delectu & industria concinnari possunt, quam prisus proditæ luere Succationes medicatæ, quorum inuentis facillimè longè plura meditata & assequura posteritatis, iudicessis laboris quorundam diligentiâ.

IN *LEP*, distinctio Arabica videtur, à posterioribus Græcis & multis alijs vsitata. Actuarius & Simeon Setus *ῥῶν* vel Zoulapore dicere. Alij Iulapium vel Zulebon vocauerunt.

Melues Sytupos diuidit in simplices & compositos; & simplices appellat Iulepos, qui ex florum infusionibus & aquis stillatijs & Saccharo constant. Hodie etiam Iulepos vocare consueuerunt quosvis Syrupos aqua tripla vel dupla dilutos. Veteribus Græcis Iulapia incognita fuere, cum stillatijs liquores & Sacchari vltimè nesciuerint. Primus inter Græcos Actuarius stillatiam Rosaceam nouisse videtur. Ex Arabibus Melues (sublimationis aquæ Absynthij neminit; quem sequuti Rhalæ, Serapio, & Auicennas, qui mysticæ & Chymicæ artis callentissimi varios in medicos vsus introducere Stillatios liquores. Ipsumque Alchymicæ vocabulum re verà Arabicum videtur, vt testatur ipsa præpositio vocabuli alij quam vocem ipsi Arabes varijs præponunt nominibus, vt Alhasce, Alkermes, Alkali, Alhandal, &c.

*Syrupus Violaceus communis
sic fit.*

Rec. Aquæ infusionis viol. lib. v. sacch. albi lib. iij. misce, decoquantur cum facilitate, & seruetur vsui. Item potest parari ex multis infusionibus, quæ leniendo aluum laxabunt, qui distinguendus erit ab alio.

Serapium Violaceum, odore, sapore & purpureo-violaceo carnale colore commendatissimum.

L'Obel.

Serapium Violaceum siue Succatuncula præstantissima etiam cum coloris, æum suauissimi saporis fit ex infusionibus selectissimorum florum Violarum purpureo-Violacearum, abiectionis viridibus eius partibus cum pediculis, in Balnei calore maceratarum, affusa aquæ fontanæ limpidissimæ parua sufficienti quantitate. Colanem addito Saccharo candidissimo in puluerem sicciorem redacto quantum sufficit, insolatur, aut balneo digeritur & sepe leniter agitur, ne vehementi motuque coloris violacei gratiæ deperatur.

Viola

*Viola Martia delectus ex Sylva
& Mefuco.*

Laudatur quæ prima floruit, neq; vim suam calore solis resolutam perdidit, nec pluuia obtudit, vel diluit, & dissipauit. Quæ iam diu aperta est, aut pluuiam sensit, aut in syluestribus nascitur, odoris gratia caret & viribus.

Syrupus Violatus communis contemptus & neglectus est hodie.

LVDOVICI MYREI apud Londonenses Pharmacopœi Reginei Paragraphe.

Cauendum à Saccharo Barbarico, siue à Barbaria adueto: tale solet esse pingue, & graue olens; quod coloris gratiam spoliat.

Syrupus Nephtharimus sic fit.

Rec. Florum Nymphetæ lib. ij. decoque, & expressioni adde Sacchari lib. ij. clarificentur, & decoquantur ad Syrupi consistentiam.

Syrupus è Nympha fransicæ Pedemont: non est in vsu, ideo superfluous.

Syr. e Capillis Veneris simplicissimus, sic fit.

Rec. Aquæ decoctionis Capillorum Veneris lib. iij. Sacchari clarificati lib. iij. fiat Syrupus vt artis est.

L'Obel. Serapium Adiantinum, siue è Capillis Veneris Monspeliensum.

Medicorum monitis, seduli politioresque Monspelienfes pharmacopœci Adianton verum recens & viride, siue Glycyrrhiza macerabant, mollissimoque igne, meo tempore decoquebant in vase angustî oris & exprimebant; deinde cum Saccharo clarificabant & in Syrupum percoquebant, à Lutetianis ob efficaciam ad pulmonis, hepatis & viscerum effectus maximè cõmendatum, expetitumq;: viribus comprobatisque dotibus cum odore, tum sapore, recens virideq; Adianton pollet; contra improbatum siccum; quemadmodum omnes congenères Capillares herbæ, Polytrichon, Rntula muralis, Matthiolo Paronychia eredita, Adianton vtunque Plinianum; quibus vulgus Pharmacopœorum virentibus, Adiantu veri penurî, Syrupos suos Adiantino parât cum viridibus, tum siccis, tum etiam Narbonensi vero siccò Adianto; Italis, Pedemontanis, transalpinis Celticisque Gallis minus frequens obuiò: quale siccatum ab aro-

matopolis botanologisue Lugdunensibus, Venetis, Antuerpianis & Londinensibus Materialistis (vulgo *Drogustis*) vocatis, distrahitur per vniuersam Germaniam, Belicam, Galliam & Angliam.

*Communis Serapij Adiantini
paranda ratio.*

Rec. Glycyrrhizæ rasæ vnc. ij. Adianti albi vnc. v.

Temperantur cum aquæ fontis lib. iij. 24. horis; coquantur ad dimidias: & exprimuntur & addita Sacchari sesquialibra aut q. s. percoquantur in Syrupum.

Capillares herbæ partem sustinent decoctionem.

Syluæ.

Aliu ex lib. j. Adiantis fici, penuria viridis & vncis duabus Glycyrrhizæ purgatæ & tute decollu in Aqua lib. sex ad consumptionem tertiam partem cum Sacchari lib. tribus parare, vult.

L'Obel.

Alius modus præstanti Adiantini Serapij frigida tum regionum.

In Germania, Belgia, Gallo-Belgia, Anglo-Britannia, Francia, & omnibus Galliz præfecturis quæ Adianto vero viridique carent; suaderem, & comprobarem Serapium, Adiantinum ex multiplici (vti Rosarum) forti præcisioque calore Balnei Maris infuso Polytrichi siue Trichomanis viridis eliquato, regionibus illis satis familiari; eiusdenique, Dioscoride teste, cum Narbonensi & Gallo-Prouinciali Adianto legitimo efficaciz, paratum; addita Sacchari quantitate sufficiente instar Peneditarum penè excocti.

Hoc frequentissimi & quotidiani vsu Serapium à Corda amissum miror.

Adiantum siccum quia magis astringit & siccât, defluxionibus quidem vtile, sed obstructionibus viscerum referendis, sardis pulmonibus expurgandis pleuriticisque affectibus inutile.

*Chylarium aut Serapium e Scolopendria
siue Asplenio, Ceterachæ Arabum,
& Officinarum simplex.*

L'Obelij.

Eadem artis lege, modo & ratione, qua Adiantinum aut Violaceum multiplici iteratæ Infusionis Serapium, ex Asplenij repetitis infusis macerationibusue suffert, uel factis leuissimisque ebullitionibus à Balnei calore concinnari potest Chylarium aut Serapium

pium ad affectus Splenis efficacissimum. Asplenium autem apud Græcos nomen inuenit, quod splenem intrum in modum inuenit, imminuatque. Scolopendrium isdem, Arabibus & Officinis Ceterach vocatum, à similitudine Scolopendri animalis siue insecti pilosi multâ donati pedibus, centipedis & millepedis, nomine insignitur; quibus, non aliter ac à Chariâ nauis biremis aut triremis, remigijs subigitur, progreditur. Scolopendrium maiores nostri & pharmacopœorum vulgus cum Lingua Ceuina confundunt, quia isti antiquiores Phyllitium Scolopendrium appellauerunt; eandem rem esse Scolopendrium & Lingua Ceuina opinantes, quæ verâ est Dioscoridis & priscorum Phyllitis, folijs Rumicis, senis aut septenis, anteriore parte læuibus, aversa autem pensiles quasi verruculos ostendencibus, gustu acerbis, in vino potis serpentium icibus aduersantibus; quadiupedibus per os infusus auxilantibus, nec non resoluus aluis & dysentericis potui datus, Diosc. & Galieno authoribus; qui adstrictoriam Phyllitis vim tribuere ad diarrhas siue profluvia & dysenterias, acerbæ qualitatæ cum sit: Hemionitis vtrò Dioscoridi aultero sapore est, hoc est minus constringenti quam acerbis: quamobrem ea ex aceto pota licem absument. Galenus si- mul & adstrictiorem & amaritudinem possidere ait; eoque ex aceto potam licenosis auxilia esse. vnde conijcere licebit Phyllitium & Hemionitium (quæ minus adstringit quam Phyllitis) secundum plus & minus inter se tantum differre: sed quia Hemionitis minus adstringit, ex aceto pota licem absument Dioscoridi, & licenosis auxilio est Galeno non secus ac Asplenion quod in aceto fetuescunt, & quadragesima diebus epotum licenosis absument Dioscoridi & calculus in vesica committit. Galieno quidem tenuium est parrium; non tantam calida est herbâ; qua virique ratione & lapides frangit & lienem liquat. Scolopendrium igitur siue Asplenium & Hemionitis æquæ splenem minuunt, aut lienis auxilio sunt ex Dioscoridis & Galeni sententiâ; Phyllitis autem Linguaue Ceuina perperâ Scolopendrium auit, stans & vulgi insulso pharmacopœis credita, tanto minus Asplenio & Hemionitis splenetica; quanto tenuitate patium vineitur. & adstrictoria vi vtrumque superat: Cum isti tamen & Capillaribus herbis conuenit, quod neque semen, neque flores, neque caulem edat: eoq; præferem vsum Asplenij Phyllitidis. Procurabit sibi Pharmacopœæ Asplenium recens ex octiduz Anglo-Britannicæ Briololo, Bridgewater, Alijque vicinis saxo-

sis muris, saxisque; etiamque ex Narbonensi Gallia, Hispania, Italia, & cauitibus Leonten-sibus.

Cum itaq; à Scolopendrio siue Asplenio sibi nomē adiecit Chylarium Asplenium ad Splenis affectus efficacissimum; proculdubio nobilis erit hæc Serapij è viridi recentique copioso, aceto albo prius asperso, deinde multa infuso Scolopendrio preparatio; abrecto, profuso contemptoq; lordido, vieto, mucido & ignobili Asplenio, cuiusmodi sæpe memini in Veteratorum aromatorijj hocanopolij suæ, in quo forices, mures, vestes & insecta nidulantur. Huius laudatissimi Serapij vnciaz pluriæ sic quam vnciæ tres, quatuor uè vulgati.

Serapium & Scolopendrio compositum, incerti authoris, descriptum apud Adolphum Osceum Austriacum.

Recipit pauxillum Scolopendrij, à quo tamen nomen habet, &

Phyllitidis, id est	Calisizæ p. f.
Linguz Ceuinæ,	Seminum communium
Endiuæ,	maiorum frigido, ana
Hepaticæ,	drach. ij.
Abfinthij,	Florû Buglossi versisq;
Cichoriij ana M. f.	Capill. venen. ana M. f.

Radiciâ farniculi, Petroselinij, Ruscij, ana M. j. Cuius q; aquæ & sacchari lacti tyr. ex arte, aromatizatus Spice Indicz, Laccæ, Calisizæ lignæ, Matris pro folio ana drach. ij. modico exceptis. Debilis admodum est hæc Sympus, viæque vitibus Apofeniz æquat ob paruas ingredientium & Scolopendrij, à quo nomen sumpsit, copiolas siue tenuissimam parsimoniam. Videtur respondere quodammodo Sympo è Cichorio & Oxyfackiario composito. Prestabit simplicem parare & commiscere Chylaria è radicibus cum vsu postulat.

Syrupus è Scolopendrio compositus apud Plantium.

Alium è Scolopendrio Syrupum compositum exhibet Plantius Femelio ascriptum, quem apprinè vilem quarrarijs diurnisq; febre laborantibus ait. constat

Radiciâ Filiculæ,	
Viciusque Buglossi,	
Coricis rad. Capparis	
Cort. Thamariscij ana vnciæ. ij.	
Scolopendrij M. ij.	
Lupi salutarij,	
Calisizæ,	
Capillorum Venen,	

Melysio



rut servato ordine. Pœoniz radix lima dera-
sa, cum filipendulæ & Angelicæ radicibus in
liquoribus præscriptis primo loco artificiale
infunduntur ternæ factis moderato Balnei Ma-
rix calore: Deinde Cortices Citri, Euphrasia,
Verbena, Melysphyllum, Maiorana; Mor-
illico flores & Agaricus; denique atomata ad-
ijciuntur. Infusus omnibus, legitimo ordine ef-
fectus molliſſimo igne, nitide argutior
manu, ex artis præceptis, & circulatoris (vt artis
vocabulary vſurpanti) 24. horis in eodem Bal-
neo. Deinde omnibus expressis & per albu-
mina clarificatis, adde Sacchari. vnci. xxiij.

Moderato Balnei calore, alembico vitreo,
capitello suo optime ocluso, Syrupiz entur, ſu-
persuſi humidè exillando facta exhalatione, ne
vis odoratorum expiret.

Nitidioribus medicamentarijs hæc cecini;
Sordidis, nescijs, nec ſcire audentibus dormi-
turi.

Liberum cuique erit addere Rhabarbarum
& alia Cathartica valdiora pro ratione compli-
catorum morborum & optimi Medici præ-
ſcripto.

Non est spernendæ utilitaris Sydereæ fausta
ſugum, Plantarum, Radicum, ſorum aut fructuum
collectio, modo exlum & complutum ſolu-
m non diſſuadeant. Pſeudochymistarum il-
luſionibus multi falluntur, dum plantas Con-
stellatione aut Sydetatione, vt ipſi loquuntur,
colligunt in communis Horti ſoro aut vico
Londinenſi à botanolegiſiſue herbarum col-
lectoribus, ſapiffimè euanidas, aut frequen-
t irrigatione putrefcentis Syderationis ſanè no-
men conueniunt, quia morbos Plantarum, hu-
more zeli nimio ſub ortu canis abſumpto, pe-
ſſiferouè ſidere percuſſo, marceſcentium ſig-
nificat. In primis item humido, frequentiſſimis
que in tribus plantæ & eius partes frugem
non perſiciunt, in Septentrionalibus regioni-
bus, ſed putrefcunt.

*Serapium Roſarum ſolium compoſi-
tum Montani apud Occidentem
Auguſtiani.*

*Hoc Serapium ſubiunxi, quia in frequenti
uſu eſt Londini, non nomenclaturæ
Auguſtiani.*

Rec. Omnium Myrobalarum ana. vnci.
ij. fixarum & præparatarum, vt dicitur.
Radicum Polypodij, vnci. ij. l.
Epithymi, }
Seminis Cinci, } ana. vnci. l. l. }
Foliorum & }
Folliculorum Sennæ. }

Corticis Citri, vnci. j.
S. Anisi, Fœniculi, ana. drach. vj.
Caryophyllorum, vnci. l.
Nucis Moſchalæ, drach. iij.

Efferueant meliſſimo igne, & infundenda ex
arte infunduntur & ſynapiſcentur, addendo
ſacchari æquali Inſuſo expreſſo pondere.

*Syrupus alius compoſitus Montani efficiatur
apud eundem D. Occidentem, uſu com-
mendatiſſimus in affeſtibus melanco-
licis, ſue Venerea, pſora, lepra im-
petigine, hebetudine, can-
cro & elephantia.*

Rec. corticum omnium Myrobalarum,
ana, vnci. iij. contundantur, ſiccen-
tur rhanibus oleo Amygdalino dulei; deinde
Infundantur in lib. 12. Inſuſionis multiplicis
Roſarum pallidarum, horis 24. Addendo
Foliorum Sennæ, }
Epithymi, } ana. vnci. vj.
Polypodij, }
Seminis Citri, } ana. vnci. iij.
Glycyrrhizæ, }
Caryophyllorum, vnci. j.
Corticum radicum Helleborti nigri, drach. vj.
Decoquantur omnia lento igne ad quartæ partis
conſumptionem. Adde poſtea
Sacchari clarificati, lb. v.
Rhabarbari electi in nodulo ligati. drach. xvj.
Fiat Syrupus ſecundum artem.

*Serapium è Pomis compoſitum præſeci Ca-
pire de ſola à Melancholia deſcriptum:
quia eo Rondellietius & plerique
deſcripſ. alij in morborum pro-
greſſu, non initio vtrun-
que, ſed ſubdere vi-
ſum ſunt.*

Rec. Adiani, }
a Aſplenij, }
Radiciſ vtriuſque Bugloſſi,
Filiculæ,
Epithymi, ana. vnci. i.
Senz, }
b Fumaniz, } ana. drach. viij.
Horii Chamæmeli, }
Scythiadis,
Chamaedryos, }
Schoenanthi, } ana. drach. liij.
Ellebori nigri, }
c Florii Amaranthi, }

a Rondellietius Aſplenium addidit, quod minimè impro-
bitum.
b Rondel. habet Sacci ſumaria & Agriemonia, ana,
vnci. ij. qui ſi opoſitis conueniant.

Vel Nymphaea, ut Rondellius placet Sesamoidem Ellebori nigri. obligatorem.

Succi pomorum dilicium, vnci. viij.

Rondel. lb. j. habet quod si lib. vna additur, augeturq; Filiculæ quæritas efficacius erit; succis fumariz & Agrimoniz ad vnci. ij. singulorum affusus, auſtaque duplo Senz doſi.

Coquantur omnia secundum artis leges, in Stillatiz secundæ notz Anisi libris duabus & ſeniſſe, aquæ Cinnamomi niediz, vnci. vj.

Epithymum, Adianthum, Schænanthum, Stachas, Sena, Elleborus, Amaranthus, aut Nymphaea flos, cum succis, sub ſinem vt vnica tantum ebullitione efferueant occluſo vaſe. Horum ſanè, vti aliorum plerumq; omnium, vtiliſſima fiet coctura in duplici vaſe, ad autotem & ſimplicium vires melius conſeruandas.

Rondellius aromatizat hoc Serapium, drach. j. Croci; & Helleborum album pro nigro præſcripſit; quia ſolebant pharmaceoporum vulgus ſimplicium ignorantione, Elleborum aut Aconiti radices ſubſtituere: Sed hodie, vt alibi diximus legitiſſimus Helleborus niger ſatis innotuit & reperitur: *Rondellius* tamen monuit capite de Mel. Melcholia, Helleborum nigrum non adeo eſſe formidandum, vt ab eo omnino abſtineamus: nam cum *Hippocrates* (inquit) veratrum excitare conuulſionè dixerit, & lethale eſſe; intelligendum id eſt, ſi exhibeatur in ſubſtancia, (non caſtigatum.) cuius frequens exhibitur ſuccatio ſive Extractum, ſcelici ſucceſſu; modo bene præparatum ſit, & bene quis vtatur ex Hippocratis placitis.

Stillatiz Anisi, Cinnamonio aromatizata, aquæ communis loco, decoctum parandum iuſſi, tanquam vero Ellebori nigri alexipharmaco: eius quoque pondus rationè aliorum augeri poteſt: aut cum vſus requirit addenda aliquot Extracti grana. Aſplenium addidit *Rondel.* quod ſcopo apprime conuenit, vti Splenetica omnia, & Amaranthus aut Nymphaea flores, loco ſeſamoidis, antiquorum excipulo.

Syrupus Myrtinus.

Rec. Succi Myrtillorum lb. xij. Decoque in vaſe vitreato lento igne, ad conſumptionem tertie partis: deinde coeantur & accipe de colatura lb. viij. & affuſa Sacchari clarificati lb. vi. Fiat Syrupus.

L'Ob.

Serapium Myrtinum vtrumque.

E Adem præſtat Serapiû de copia ſoli Myrtillorum ſucci excocti, quæ Myrtinum compoſitum: quare non erit necèſſe onerare pharmacopolam duplici Serapio, vno ſufficiente. Compoſitum Myrtinus Serapium, aptius Rhætes vocari poſſet; quia doſis ſucci Granatorum lib. duarum cum pari menſura,

Succi Pomorum & greſtium longè alia omnia ſuperat. Myrtillorum autem drachmarum xx. tantum.

Rofarum verò, Santali albi, Rhois, Balauſtiorum, Berberis, Meſpilorum, drach. l. } ana. drach. xv.

& Sacchari librarum trium.

Pro: urandus Myrtillorum ſuccus ex Italia & Norbonenſi Gallia (inquit *Cordus*) aut Gallo-Prouincia & Hiſpauia ad Serapij Myrtinus ſive è Myrtillorum ſucco præparationem; quo quidem ſucco carent Germania, Belgium, algidioresque Galliz regiones, Francia, Normania, Britannia vtraque, Anglo-Britannia & Scotia. Quibus in regionibus ſumi poteſt lb. vna Myrtillorum recens ſecorû contuſorum & coqui in lb. quatuor, aut q. ſ. Succi Cydoniorum: Quem ſuccum limpidum nonnulli Germani, Galli, & Belgæ in auſis Principum, nullo addito Saccharo aut Melle, cum ad cordialia antidota, vſuſq; multifarios internos tû externos oculorû affectus, penis aliarûq; partiû, coquere ſolent, vti Sapa, ut Deſtrum Columellæ, donec Chylarij, Succatiunculæ aut Serapij craſſitudo fiat.

Hoc modo denſatus Balnei aut ignis lentore ſuccus ſerupulorû duorum pondere aut drach. vnus, quâ vnciz integræ alterius, modò dextere nitidèque ex arte pareitur, præſtantiôr eſt. Si medicamento magis compoſito opus fuerit, licbit ſimplici Syrupo addere ſuccum aut Serapium Rhætes ſive è Granatis, è Roſis ſiccis, è ſucco Berberis & huiusmodi quamplura, pro ratione implicatorum morborum & docti Medici ſcopo.

L'Ob.

Sera- } è Limonum } Acetoſû ſimp. } can-
pia. } ſucco, } Omphacites, } dida.
 } è ſucco Citri, } & Oxalites, }
 } } Serapia

Rhazes
Scrapia { Berberis & limpidi, rubicunda.
Ribes,

Scrapia è Limonium & Citrei inali succis; Accetum item simplex, Omplicates, Oxalytes hodie purissima, candidissima; rubicunda tamen aut rubentia & gratissima Rhazes fuit è succo Puniti mali, Berberis & Ribes, parantur ex Saccharo albidissimo, pauxilla aqua, ne latiore coctura staret, in Electarium solidum, aut ad Penidiatum consistentiam percocta, affusis deinde succis phyltratis limpidissimis, optimèque permixtis & tribulatis, nulla aut leuissima coctura, ve fieri solet in supra scripto Syrupo Violato exiij carulei coloris gratia commendatissimo, suavisissimo, sapidissimo, efficacissimo; tenuitate partium attenuata. Rhazes autem, Berberis & Ribes, cum debeant rubri esse, minus debent tribulari, ne coloris sulgratiam amittant. Sylius hæc etiam notavit.

Hæc paradorum Scapiorum ratio accuratissima è Succis odoratis, aromatis, aut acidis, tenuisque partium præferenda longiori ad terras decoctioni, quia illorum vis integrior suaviorque renanet: Longiore contra coctura, aciora euadunt, uti Actum Stillarium, quod plus intus penetrando, ventriculū altissime nervosas partes (quibus Actum est finitissimum) maxime lædit, dum in eam substantiam altè subit; unde sæpe convulsio fit.

Succi acetosissimi Citri aut Limoni minimè vi elidendi, aliqui viscidu euadunt, & Serapiam corrumpunt.

Syrupus è Buglosso lasifolio, siue Borrachine duplex.

Rec. Succi Buglosi depurati lb. iij. Sacchari lb. iij. l. fiat Syrtus. Buglossum vtrumque; intertundendum aceto viscidum certis temporibus fir vt corum succus sæpe prælo elici nequeat, nisi igni admoueanrur, aut sequenti die exprimantur. Suavisissimum è Buglosso siue Borrachine suaderem parandum Scapium ad cordis melancholicos affectus in Succis Borrachinis & Pomorum, q. f. ex multiplici florum Borrachinis recentium infusione.

Syrupus Acetosus simplex.

A Cetois simplex parandus in parva quantitate, quia temper omni hora multoque negotio parari potest, & qui Oximel habet curare potest Acetoso simplicis, quia ad pluviam atenuationem præscribi solet: quare capere possumus. Sed quia nobiles Mellis saporem vel odorem ferre non possunt, ob id parantur pro ipsis hoc modo. Cuius multæ sunt descriptio-

nes apud Serap. Auic. & alios. Nos verò Mesuz descriptionem apposuimus, quæ talis est.

Rec. Aqua fontis, lib. v. Sacchari, lib. iij. coquantur in vase fictili, vitreato, igne sine fumo ad consumptionem dimidia partis, semper desumendo: quibus addit Acetoli. 2. Si autem imbecillum parare velis, vel si Acerum sit acerrimum lib. j. f. Si vero debile sit Acerum lib. ij. Et quando fortissimum parare volueris lib. iij. Aceti fortissimi, coquito ad Syrupi consistentiam. Si hoc Syrupum statim ut volueris, minus, insipidibus decoquendis: si vera diutius ferare, de coquendis eris magis. Hic Syrupus Oxymelli simpliciter spondet; medicus inter Oximel & Oxifaccharum. Quod si aqua fontis non superet, aqua fluvij, aut pluvie uti speranda est, & cum diutius ferandus est, consulerem ac aqua pluvie parare, ut Lorum rustici parant, qui melius & diutius conservatur, nec timenda est astrictio, quam Acetum habet.

Syrupus acetosus { debilis } ex lb. { duobus } Aceti fi.
 { medius } ex lb. { tribus }
 { osus simplex } ex lb. { quatuor }

Quod si Acetum acerrimum sit, lib. pro iij. & iij. pro iij. poni debent, aut plus aut minus aqua, quod gustu indicari debet, ut de Posca dicitur, quæ tunc bene temperata est, cum sine molestia bibi potest. Sed quia cellura & saccharo Aceti aciditas temperatur, fortius esse debet, quàm in Posca.

Parina. 17. linea 7) Proportiones nimis sequentia omnia sunt in Syrtis, fol. Mosani apud Angellianum.

Infundantur in lib. i. infusi Rosarum.

Fortior habet lib. i. Sacchari pro lib. duobus infusi extracti sic tulin de Magis probarent singulorum aequale pondus, etiam magis p. æquum, aucta & repetita simpliciter medicamentorum dosi, ne longiore coctura, contra aia leges, vis aromatis & laxantium laugeat, & omnia altè generantur vigetis plan facta.

Le Melle Rosato foli Aug. illant, idem indicum est.

DE SYRVPIS Compositis, & quibus

consensus esse debet Pharmacopola

Syrupi compositi debent etiam parari aliqui, quia in declinationibus morborum pro Apozemate videntur Medici raro in principijs morborum maxime silantes sint vi debent, qualis est de Fumo terræ, de Epithimo, de Culthores cum Rhob. Alii non laxantibus utendum est in principijs, in magnis causis, ut in febribus ardentibus & spuris, ut Syrupus de rad. de Bizantiis, posca

Syr. Ros. foli. Sine Helleboro.

17. 17. 17.

Postea Syrup. de Endivia compositus ad bilis
Preparationem, Syrup. de Stachade ad pitui-
ris preparationem post Oxymel & Syru-
pum Acetosum Compositum, Syrup. de In-
iubis, de Papauere ad incrassandum, de Li-
quirisia de Marrubio ad expectorandum &
dilatandum. Sunt autem hoc ordine collo-
candi in officinu.

Syrup. e duabus rad.
Syrup. Endivia compositus.
Syrup. e Chicorio.
Syrup. e Fumaria compositus.
Syrup. de Eupatorio.
Syrup. de Absinthio.
Syrup. e Mentha.
Syrup. e Citro.
Syrup. e Glycirrhizis.
Syrup. Hyssopii.
Syrup. Stachaditis.
Syrup. de Artemisia.
Syrup. e Prasio.
Syrup. e Iuiubis.
Syrup. e Papauere.

Istis contentus esse debes: Syrup. e quin-
que Rad. non differt ab Oxymeli com-
posito: quare cum est attenuanda & ape-
rienda obstructio, Oxymel magis conuenit, vel
si cum aquis aperientibus miscueris. Syrupo
de Hyssopo carere possumus, quia medius est
inter eos, qui extenuant & incrassant:
Quod si Syrupi de Iuiubis parti vni addan-
tur dua partes Serapij Glycirrhizitis, erit
idem Syrupus, cum Syrup. de Hyssopo. sy-
rupum item de Epithymo carere potest, qui-
cumque Syrupum de Fumaria compositum
habebis. Hoc tantum differunt quod de Epi-
thymo calidior sit, & magis idoneus ad ich-
tes salsores & pituitosos euacuandos: sed fac-
ile talis reddetur, insundendo Acetici vnc.
i. pro lib. i. Syrupi: quare sufficit unum ha-
bere paratum. Quibus autem differant fa-
cile cognoscet, qui vult vtriusque conferre
descriptions, Syrup. e Chicorio simplex, &
e Scolopendria non multum differunt, si
Rhab. excipias: Qui enim de Chicorio est,
sine Rhab. potest parari, & quando utendum
erit, addetur ea portio Rhab. quae videbitur:

quia etiam minor quantitas est, vel etiam
cum Rhabarbaro emanescit eius vis & facul-
tas soluentis constringens vero, nimium vire-
sus imprimis. Cum ultius dare erit neces-
se, Syrupum ex infusione Rosarum recentem
vel succum Ros. addere poteris. Parandum
est recte & in parua quantitate, quia pauca
vix solent Syrupus e Chicorio composito. Syr.
viol. & Capilli Ven. non sunt dissensandi
compositi, sed potius simplices: nam Capilli,
Ven: compositus cum Iuiubis paratus, fit de-
terminatus pectori: sed minus aperit, vel
disscutit, vel attenuat. Hocigitur est facien-
dum, cum usus postulat. Syr. Viol: compositus
non multum differt a Syrupis de Iuiubis.
Relinquendi vero sunt hi, & simplices paran-
di, quia ex simplicibus compositi, non contra
facere possumus. De Eupatorio addimus, quia
ad hepatis imbecillitatem & refrigerationem,
obstructionemque facere cognouimus, nec
vllum inueni huic respondentem. Syru-
pum etiam de duabus Rad. & Syrup. de By-
zantijs cum Aceto paratum, alio nomine a
praxio dictum Dinarij a Barbaris. Hunc pa-
rari volumus sine Aceto: multo magis vi-
ris, mulieribus, & morbus, qui usum Aceti
respuunt, conuenit: tum etiam, quia libe-
rum est vram partem Acetosi simpl. vel
parum Aceti, cum usus postulat, addere. Est
utilis ad obstructiones hepatis & lienis ape-
riendas, & bilis crassa extenuationem citra
magnam calfactionem. Sequi solet Aceto-
sum simplicem, & potest accommodari om-
nibus partibus obstructis a bile crassa.

Syrupus Byzantium simplex Mes.

Rec. Succu Intybi siue Endiuiz domesticæ,
& lucci Apij ana. lib. ij.

* Apij nomen in Officina Paludapum intelligunt.

Succi Lupuli,
Succ. Buglossi latifolij, siue Borræ. } ana. lib. j.
Succi purgentur & desumpuntur lento igne,
additisque
Sacchari. lib. ij. f. igni lento percoquantur in
Syrupum.

Syrup

Syrup. Byzantinus composus.

IN pari prædicta succorum defæcatorum
mensura infunduntur Rosarum vnc. ij.
cum

Spicz Nardi contusæ drachmis duabus, in coc-
tis prius

Glycyrrhizæ rasæ. drach. iiij.

Seminis Anisi, }
Feniculi, } ana. drach. tribus;
Apij, }

Serapinum e duabus Radicibus.

Rec. radicem Petroselinæ }
hortensis } ana. vnc. iiij.
Feniculi, }

Aquæ q. s. fiat decoctio. Colaturæ adde
Sacchari clarificati. lib. ij. percoquantur in Sy-
rupum.

*Sunt, qui addunt radices Intybi, vel semen.
Sed cum nomen acceperis à radicum numero, vi-
sum fuit illa prætermittere, cum dicere possimus
nomen accipere, non ab aperientibus, quæ sunt due
tantum: sed ut deint eam decoctione aliarum
rad. & fiat syr. d. v. radice. si quis velit uti Oxy-
melis diuretico.*

*Serapinum e quinque Radicibus, in
certis antheris, Syllio.*

Rec. { Radicem Apij, } Asparagi, } ana.
Feniculi, } vncis
Petroselinæ, } Rusel, } iiij.

Aquæ q. s. coquantur secundum artem. In co-
latura adde Sacchari. lib. iiij. *U. Cordus, &
P. Condenser gnu* sumendas tunc singulorum
radicum vnc. iiij. censent.

*Serapinum Acetosum composum
Mesua.*

Rec. { Radicem Apij, }
Feniculi, } ana. vnc. iiij.
Endiuizæ, }

{ Seminis Anisi, }
Feniculi, } ana. vnc. j.
Apij, }

Sem: Intybi sine Scariozæ, vnc. s.

Facta per sex horas maceratione, Radices
coquantur prius; deinde adde semina; in s. q.

aquæ fontanæ, ad consumptionem dimidiæ
partis. Colaturæ adde
Sacchari. lib. ij.

Aceti optimi lib. i. s. vel lib. ij. pro ratione bo-
niratis.

Reducantur ad Syrupi consistentiam.

L'Ob.

*Chylarium e Radicibus Gramineum
nus Selinites diureticum.*

Rec. • Rad. Graminis viridum, vnc. xij.

Rad. Selini hortensis, }
Paludapij, } ana. vnc. viij.

Radicum Chicorij, }
Dentis Leonis, } ana. vnc. vj.

Rad. Rusci, }
Asparagi, } ana. vnc. iiij.
Selini Macedonici, }
Feniculi, }

Glycyrrhizæ rasæ, vnc. iiij.

Endiuizæ hortensis cum radicibus M. liii.

s. Anisi, vnc. i.

s. Paludapij, } ana. vnc. s.
& Feniculi, }

* Te tantum exemplar in ista Typographi dra. h. xli
habet pro vnc. x. s. si alibi non sine dolo & male.

Incisis mētem & contusis omnibus, affunde
aquæ fontanæ vel pluuiæ, lib. lii.

Vini albi tenuis oligophori, vnc. xviii.

Efferveant in Balneo, vase optimè occluso ex
arte.

Deinde fiat fortis expressio.

Vni parti per albuminæ defæcatæ adde Sac-
chari albi vnc. xvj. aut q. s. Altera pars
condiri poterit

Aceti nulli siue Oxymellis. s. q. sufficiente;

Tertia pars Syrupo Acetoso simplici, eritq;
vsi magno pro Syrupi & quinque Radicibus
diureticis in morbis biliosis?

Et addendo mediam partem Syrupi é Gra-
natis; pro Oxysaccharo composito. Cum
Oxymelle simplici; pro Oxymelle composito
in morbis pituitosis.

Debet parari ex viridibus radicibus, quæ
hinc calefaciunt, quam sicca. Ruscus in
Anglia magna gessit copia; In regionibus ubi
iædens non reperitur, eius pòdus minuendum;
Parus dosi hoc medicamentum efficax est.

Syrupus

Syrupus Endiuiz compositus de- scriptione Gentilis.

Syrupus Endiuiz patitur ex herbis aperientibus & refrigerantibus modici, quia ubi aperientium & magis refrigerandum, utilis est, ut in tertiana exquisita, ordine tantum mutato.

Rec. Hordei integri,
Quatuor seminum frigidorum ma-
iorum.

Capillorum Veneris ana. vnci. j.

Polytrici,

Lenticulæ aquaticæ,

Violarum,

Rosarum rubearum recentium,

* Dispensarium Florentinum addit tantundem florum
Nymphae, quos copio non aduersatur.

Seminis Berberis siue Oxyacanthæ Arabum,
drach. ij.

Decoquatur hordeum perse in f. q. aquæ ad
molliorem & aquæ serè consumptionem, cui
affunde succorum defæccatorum

Endiuiz,

& Hepaticæ, } ana. lb. iii.

In quibus decoque ex arte suo ordine her-
bas capillares, Lenticulam aquaticam,
Semina frigida & flores cum semine Oxy-
acanthæ Arabum,

In colatura adde Sacchari albi, lb. iii.

Fiat Syrupus aromatizatus,

Santalorum } Rubrorum,
Alborum,

Xyloaloes.

Cinnamomi.

Corticis Citri, ana. drach. j.

Hic Syr. sine methodo compositus esse videtur,
nulloque ordine, in quo hordeum non mundatum,
sed integrum esse legendum duximus, quia deter-
get, & aperit; quod magis facit hordeum sua ex-
terna cute, quam interna parte, quia obstruit. Pri-
mo loco illud posuimus, ut interea dum semina
quaruntur, decoquatur; & suam fluentiam perdat,
longiore collatura: deinde herbas, post flores
ne in disturnere collisione eorum vis in funum
evanescent. Illud forsitan novum videbitur, quod
succos non decoquimus cum hordeo, sed in fine
tantum apponimus. Hoc autem fit, quia succi
collatura vim suam amittunt. Ob id in fine ponun-
tur una cum herbis, floribus & seminibus Semen
Cytioniarum, quod nullum odorem inspirat, &
mucagine sua inhiisset, cum extenuare potius sit
opus, regimus sem. enq; Berberis posuimus in de-
collione, quia in clarificatione nihil praestat, ut da-

celtio refrigerandi & attenuandi vim habeat. Cin-
namomi omnium humorum vitia castigat & emen-
dat. Sandali non nocent. Oxyfaccbarum compo-
situm huic respondet Serapio.

* Multum odorem inspirat. Hic legendum videtur, an-
tum edo: quoniam multi legat Andernacum qui buxo de-
scriptionem observatio rem, verum pro verbo reddens: dep-
uante ex Rondellio transcripsit. Alio tantum usum hoc
non animadversum fuisse.

Syrupus e Chicorio sine Rhabarbaro.

Dva sunt descriptiones, quarum altera est
Placentini, qua est facilior: altera Nice-
lasi Florentini, qua magis est efficax ad obstru-
tiones hepatis & refrigerationem; sed difficulte para-
tur ob vocum ambiguitatem. Nec mirum, si
Pharmacopola non conveniant in huiusmodi Sy-
rupi preparatione, cum nec ipse Nicolum sibi
consentias in interpretatione Taraxacomi Cicerbi-
ta, Endiuiz, Scariola. Ipse enim dicit, Endiuiz
virisque, per Endi. Scariolam seu Luctum do-
mesticum intelligens. Quod si id est verum; cur
addidit Scariolam? Quare neglectis interpretati-
onibus Barbarorum, nos sumus intentionem se-
quuti. Hoc autem modo parabimus, & in hunc
ordinem reducemus: est enim sine methodo de-
scriptus. Noverat enim tantum barbarum nomen
facilitatemque & figuram ex commentis vijs, pra-
que magis ad congregandum, quam ad digerendum
maius.

Rec. Hordei integri vnci. iij. Rad. Asparagi,
Fenic. & Apq. ana. vnci. j. Glycyrrhiza vnci. i.
Iuris domestici & sylvestris, & Dentis leonis
(quem Taraxaconem vocant, nos Condryllam
Disc.) an. M. ij. Cicerbita siue Rostri porcini,
siue Sonchi levis, Hepatica siue Lichenis, Laiti-
ca sativa & sylvestris, Fumaria, Lupulorum ana.
M. i. Halycaabi vnci. iij. Capill. Ven. Scolop.
Polytrici, Cuscuta ana. drach. vi. fiat decoctio in
sufficienti quantitate aquæ, & coquatur ad Sy-
rupi consistentiam, & clarificetur, addita Saccha-
ri. q. s.

Cum Syrupus e
Chicoreo cum Rhab. praescribitur, tunc in singulis
libris syrupi adduntur Rhab. drach. viij. specu-
Nardi serup. iij. pulverizantur in pannu raro liga-
ta, & decoquantur leniter, & exprimantur: vel
si infundantur in calido Syrupu, exprimanturq;
leniter, melior erit. In hoc syr. postiora, priora
fecimus, ut distinctius coquantur. Pro End. domestica
scariolam, & sylvestri, Chicorium sativum, quod
Picris ob amarorem Discardi dicitur, posuimus.
Nihil refert, si accipias illam speciem, qua est foli-
o latiore, vel illam, qua est angustioris folij.
Nam eandem habent facultatem. Taraxaconem
interpretati

interpretati sumus Dentem Leonis ex Nicolao Florentino. Putarem Chondryla speciem. Cicerbitam legimus, non Cucurbitam, quia Cicerbita est, quam Græci Sonchum leuon appellauit; nostri Rostrum porcinum. Sonchi duo sunt genera: alterum asperum vocatum, quod nostri Lactucam agrestem folio putant: alterum, quod nostri Cicerbitam asperam vocant. Dicitur tamen Sonchus laxis ad differentiam prioris: cum erumpit, tenuitate quadam molefcit, ob id dicitur laxis: cum senescit, durior redditur. Quid autem rostrum Porcinum sit, species Sonchi, est manifestum ex Diosc. descriptione. Alter tenuitate quadam molefcit, in cibo appetitur, anguloso caule ac tenui, interdum rubefcente, folijs in ambitu per intervalla diffectis. In Rostrum Porcino omnia ista reperiuntur. Est caule vacuus, pubente & tenerescit: Denium cum inueterescit, asperum fit: ob id Cicerbitam asperam vocant, ut Hermodani monituras. Lichenè dicimus Hepaticam; Diosc. videat interpretatipem, qui vult. Hic Symplicium Lactucam satiuam & syluestrem desiderat. Quod si Endiuia vulgaris sit Lactuca syluestris, quid accipiet pro Lactuca agresti? Iam monstratum est Endiuiam vulgarem dictam Sonchum asperum esse, quia similitudo syluestris est, & magis spinis horret, quod neque Lactuca neque aliter potest conuenire. Lactuca agrestis, herba est lauiore folio, quam Endiuia, & molliore. Ad Lactucam in hortis neglectam accedit; nisi quod crispior est. Hanc vulgus aromam ararum non nouit ob id permittit, ut pro ea Lactuca amara accipiant, qua proximè ad earum naturam accedunt. Summitates Lupulorum duximus, ne postea legatur Lupinorum. Summitates Lupulorum sunt accipienda, quia folia secca sunt, & caules lignosi & parum succi continent. Hordeum integrum, quia magis deteret. Sine rhabarb. parari iussimus ut Symplicium de Cichoreo simplex, cum Symp. de Cichoreo cum Rhabarb. differret. Erat autem liberum desin Rhabarb. angere, vel pro pauperibus cum succo ros. vel cum Symp. infusione ros. parare. Valet hic Symplicium in astuantibus stomacho & hepate, & in febribus aut inflammationibus hepatis, splenis, & aliorum viscerum; quia refrigerat & aperit sine calfactione: bilem purgat leniter: Quare in declinationibus febrium dari debet cum emulsionem quatuor seminum frigid. mai. vel cum decoctione Cicerum rub.

SYMPPLICIUM CICHORIO NICOL.
Florent. castigatio. L'Obel.

EST quorundam popularium medicamentum, pharmaceutium ac medicalitro-
rum fatalis infectio fallere solita, nulla

monita in distinctè cognoscendis, non contemnendæ utilitatis. Sendis sine Intubacci generis cunctis famalijs audierit, ut non tantum medicos doctissimos & pharmacopæos probos eluserit, sed etiam multis ansum dederit in hunc vsque diem magno ægotantium dispendio, parandi Symplicium de Cichoreo D. N. Florentini cum Rhabarbato è solo succo Cichorei satiu, vel aliquot hortorum refrigerantibus temperatis herbis, quæ sanè insititum Nicolai Florentini minime respondebunt (prescribitur enim eius Symplicium non modo ad refrigerandum hepatis & viscera; sed etiam cum ad hepatis, stomachi, splenis, aliorumque viscerum æstuationes ac inflammationes, tum ad reserandas obstructions in febribus biliosis & ad somnum conciliandum) veruntamen amicis quorundam petitionibus. (quia multi & quotidiani vsus huc utilissimus Symplicium) neglectus herbarum confusus, ambiguus, & barbaris nominibus, eius secundum intentionem Nicolai, descriptionem sic castigamus, secuti ordinis seriem Rondelletij:

Rec. Hordei integri vnc. iij.
Radicum Asparagi

Fœniculi

Paludapij [.i. apij Palustris] ana vnc. ij.

Glycyrrhizæ vnc. j.

Intybi domesticij vel satiu [id est, Endiuizæ vulgaris] sim. r. latifoliz, officinis vulgò Scariotæ vocatæ.]

Intybi syluestris [.i. Endiuizæ syluestris officinarum, peiperam recentioribus Lactucæ syluest.

Cichorei

Taraxaci [.i. Dentis leonis.] ana M. ij.

Cicerbitæ sine Sonchi lenis.

Hepaticæ siue Lichenis, Lactucæ satiuæ

Lactucæ syluestris soporiferæ, Fustis terreæ

Lupulorum ana m. j.

Adianthi [siue Capillorum Veneris.]

Polytrichi,

Asplenis [siue Ceterach.

Callytæ ana vnci. vi.

Seminis Halicacabæ [siue Alkekengi] vnc. iij. si recens fuerit; alioqui sufficit media quantitas.

Coquantur in aqua & succi Cichorei æquis partibus in balneo aperto: deinde exprimantur, clarificentur, & syrupizentur in eodem balneo & vase lapideo aut vitreo, additis lib. iij. paulo plus, minus, sacchari albi.

Sub finem ebullitionis adduntur Rhabarbati electi drach. iij. & Spicz nardi scrup. iij. nodulo exceptorum & ligatorum in singulas libras.

Rondelletius cum Nicolao scrup. iiii. Spicæ addit: Coudenbergius scrup. ii. iussit: air: venintamen cum delicatulus ingrata & tridiosa sit Spica, malim æquas Cinnamomi & Schizantii partes substituere.

Quidam hodierni Medici Belgæ, Rhabarbarum, Agaricum & Senam leuiter ebulliunt, sine infusione aut semihoræ tantum maceratione, non infelici successu; quemadmodum plerique Senam in Lugdunensi Gallia in clarificatione Apofematum effluere, ne vis adstrictoria eliciatur. Sola infuso sine ebullitione tormina ventris proritat. Eadem ratione quibuldam placet, excocto iani Scrapio è Chichorio Nicol, Rhabarbari nodulo excepti infusum ex paucis decocto predicti syrupi, affundere cum ipso nodulo inter coquendum leniter, spatulâ lignea pressio.

* *curiositati.*

Præparantur quæ diutius coquenda.

Vner. iij.] ex veteri exemplari cū Rondel. legitur.

Palud.] *magis aperit quàm Apium hortense.*
Intubi dom.] *omnia exemplaria inferunt Scariolum; quæ tamen eadem est cum Endiuia aut Intubo domestica.*

* *curiositati.*

Lacluc. syl.] *Laclucum agrestem officina Belgica Antuerpia facile sibi procurabunt; ubi semel facta maximo & importuno prouentu luxuriaz; paucissimum in hortis nostris & optimorum pharmacopolarum, Olinenij Driesch, & pia memoria P. Coudenbergij;*

Officina hodie solum notior. Gallia & Anglia multis locis agrorumq; marginibus ubia, lactico, Orij odoris, succo prægnans, vix Lactuca sylvestris Officinarum.

Syrupus de Eupatorio Mesf.

Rondel. Rec. Radicum Apij, Fœnic. Intybi ana vnc. ij. Glycyrrhizæ rasæ, Schoenanth,

Nostris sedulitate per aslari non potuit, ut operarum pertinet labarum; Rondel. elletiana lictis, chara. Ele. ibi aut la. tuis, italici vocatis ederet, feceretur. que a nostris.

Cuscutæ, Absynthij, Rosæ ana dra. vi. Capillorum Venetis, Bedegar, id est, Spinæ albæ; Suchahæ, id est, Spinæ Arabicæ, florum Buglossi aut radicum eius, Anisi, Fœniculi, Eupatorii Mesuræ ana dra. v. Rhabar. electi, Mastiches ana dra. iij. Spicæ Nardi, Asari, Folij ana dra. ii. coque in lib. viii. aquæ ad tertiam partem consumptionem. Col. adde Sacch. lib. iiii. succorum Apij & Intybi ana lib. iiii. coquantur ad syrup. consistentiam. Coquantur autem primùm radices cum herbis, in sine odorata, & succi clarificati addantur, ne eorum vis exoluitur. Hic ponere debemus Eupatorium Mesuræ, non Dioscoridis aut Auicennæ. Formani refert Centaurii minoris, & excisum flavesceat, & valde amarum est, cum leui qua-

dam astrictione: calida est herba in primo, & sicca in secundo, quæ dicitur Herba Sandæ Mariæ. Pharmacopolarum Eupatorium est Canabis agrestis, vel Eupatorium Auicennæ: eius penuria Absynthij & Asari ana pondus dimidium substituius. Spica Celtica, vel Schoenanthum substitui potest: quare non erit difficile ratione Eupatorii parare hunc syrupum. Syrupus de Eupatorio. Mesuræ non multum differt à Syr. è Chicorio, nisi quod fortius aperit, & magis calefacit, & ad hepatis imbecillitatem aptior est. Et quanquam sit difficilis paratu ob Bedegar & Suchahæ, id est, Spinæ Arabicæ cognitionem: parari tamen volo ob cachexias & malas intemperaturas humidas hepatis & aliorum viscerum. Vexat Pharmacopolas Bedegar & Suchahæ, quia hoc nomen bedegar, **ambrosij* significauerunt, vel malè interpretati sunt. Ex ea excrementum quoddam simile spongiæ, quod Spongiam Bedegaris vocant, usurpant, fortè quod astringit & siccit asphigiter; vi vocauerunt Arab. vt patet ex Ser. & Dioscorides Spinam albam; nostri Chamæleontem appellant falso. Multò magis conuenire videtur Suchahæ, id est, Spinæ Arabicæ, quæ est similis superiori, nisi quod valentius astringit & siccit. Pro Spina, alba substitui potest **ambrosij*, siue Bedegaris excrementum pharmacopolarum quia astringit insigniter citra calorem.

Si quis Folio vulgar. vtatur (quia verum antiquorum Folij non habemus, sed arboris odoratz solij) nihil erit incommodi: vi potest Spica Nardi pro Folio, vt quidam putant, augendo illius quitatem. Sed hoc Folium non est omnino reiiciendum; habet enim odorem & acrimoniam, ob id potest prestare, quod olim præstabat Folium Indicum, & palustre, quod aquis natabat, sine caule & rad. vt Diosc. scribit. Nos succi Apij & End. ana lib. iiii. addidimus, quia erit certa iustaque quantitas. In cachexia & hydropo optimus est hic Syrupus, quia ex aperientibus & siccantibus, calfacientibus & roborantibus hepar paratur. Habet aliqua astringentia & laxantia, vt Rhab. quod dicitur anima hepatis, & astringit ac amarum est, unde bilem trahit, quæ maxime in hepate redundat. Conuenit aucto hab. in febribus compositis diuturnis, & in locum syl. è Chicoreo substitui potest, si datur cum decoctione Chicorei, vel End. vel cum aquis earundem.

L'Obel.

Bedegar & Suchahæ.] Multæ aculeatæ a Beanaceæ herbæ Arabum Bedegar aut Bede-

Bedeguar, Græcorum *μουκάνθη*, & Arabicus Suchaham vocatus, id est, Dioscoridis Arabicam Spinam, facie adumbrare videntur, nullę tamen omnino facultatibus explere.

Bedeguar seu Leuchachantha, herba est ex Carduorum genere, non frutex, neque Oxycantha, Gallis Alba Spina, Vernacule *Aubespine*, Arthesiis cæteriſq; Gallo-Belgis *Nobleſpine* vocata, neque Chynofrodi 1. toſe ſylveſtris Caninæ phragmitis, nou Chynosbau, vt quidā perperam volunt 1. Canis Rubi Spongioſum illud excrementum, quod pharmacarij Spongiam Bedeguaris appellant, & pro Bedeguarē vtrūq; quorū errorem Nicolaus Florentinus reſutauit: totis fortē occaſio fuit cum Spinam albam ſeu Bedeguar Carduum eſſe ignorarent, eiſque tamen altringentis facultatem expetitam, ſpongioſum Chynofrodi excrementum aſſingens, eius loco ſubſtitui poſſe autumarunt, & pro legitima Leuchachantha tutati ſunt. Nobis tamen hodie vera Achanthaleuchi ignota. Sunt qui putent eſſe Botanicoꝝ Carlinam ſeu Chamæleontem album: Matthiolus Acanthii ſpeciem proponit: Putauimus medicus hortus aliam Leuchachantham ſeu aculeatum album Carduum, nobis in Aduerſarij icone & oratione exhibitum, alebar noſtro tempore. Cum igitur vtroque Carduo Suchaha, & Bedeguarē deſignauimus, antiballomene opus eſt. Sunt qui excremento ſpongioſo Roſæ Caninæ dictæ, quia ſtringit, potius pro Arabica Spina vtiatur, quam pro Leuchachantha. Chamæleon albus (rad x videlicet) proximè ad Leuchachanthæ vires & deſcriptionem accedere Cordo & alijs videtur, ac proinde non ineptè eius loco ſubſtitui poſſe, Cordus enim pro Bedeguarē & Suchahæ Cardium Benedictini & Carlinam accipit. Non ineptè ſuaderem Agrimoniam ſive Græcorum Eupatorium, cum Carlinæ radicibus & Triſagine addendum; hepatoborabunt, & obſtruccionibus vindicabunt, ſcopoque auihoris conuenient.

Eupatorii Meſuz] In pilulis Aggregatiuis Meſuz abundè diximus Gratiolam non eſſe Eupatorium, eoq; Cordi de Eupatorio ſciētia vbique teniēda.

Syrupus ē Fumariæ Compoſitus.

D. Meſ. Rondel.

Syrupus ē Fumaria cum Syrupo de Epithymo conuenit adeo, vt alterum eorum ſufficit habere in officina, vt iam dictum eſt. Qui ex Fumaria conficitur, frequētiſſimè eſt eius vſus, & viſum eſt illum retinere; alterum verò

prætermittre, quanquam de Epithymo efficacior eſt ad omnes ichores vacuandos, iam ſerofos, quam melancholicos: Sed quę huic oporteat adiungere, quo ſimilis priorus reddatur, docebimus. Hic autem ex his componitur.

Rec. Polypodij Quercini drach. vii. Glycyrrhizæ drach. iiii. Prunorum numero 1. centum Paſſ. mundarum lib. ſemis. Abſynthij dra. vi. Cuscutæ, florum Boraginis, Viol. ana vnc. i. Roſ. recentium vnc. i. ſemi. Epithymi dra. vi. Aniſ. vnc. ſemis. Omnia Myrobolanorum vnc. i. ſem. fiat decoctio in lib. x. aquæ pluuialis, vel fontis, vel optimi fluminis ad conſumptionem dimidi. In vna parte infunde Tamarindorum, Caſſiæ extractæ ana vnc. ii. coquilo igne molliſſimo ad conſiſcutiam Syr. Col. adde Sacch. diſſoluti clarificati in vna parte decoctionis, & ſucci fumarizæ ata lib. iii. coquantur ad Syr. conſiſcentiam ſenſum. Aniſ. vnc. ſemis addidimus, quia Polypodium & alia medicamenta dulcia illud expoſcunt ob flatu; quos gignit, quod Meſues docet frequētiſſimè faciendum, in caſſiæ de Polypodio. Hic ſyrupus nullo ordine deſcriptus fuit. Ob id, quo ordine ſimplicia ſini decoquenda, diſpoſuimus. Omnes Myrobolanos eſſe iniiciendos colligimus, ex interpretatione Meſues, qui dicit ſummam eorum, quæ hunc componunt, ad decem & ſeptem peruenire, quamuis in aliquibus Citrini & Chebuli tantum ponantur pondere drach. xx. aut, vt alij ponunt, ana vnc. ii. ſem. Quod idem eſt pondus. Roſas noſtrius expungere; nam ſi recenties poſſent, ichores bilis ſoluant cum alijs, & etiam per ſe, quare tempore Roſarum eſt diſpenſandus. Quod ſi non licebit eo tempore, ſuccum Roſarum addere ad vnc. iii. imperabimus. Doſim auximus, vt efficacior eſſet Syr. ad ichores euacuandos, quorū cauſa factus eſt, & in lib. x. aquæ pluuiæ decoquendus: quia hæc medicamēta putreſcere prohibet magis, quod in hoc Syrup. eſt maxime neceſſariū; nam propter Pruna & Tamarindos facile contrahit ſicem. Ad dimidium tantum aquam conſumere volumus, aut minnenda eſt aquæ quantitas, ſi ad lib. iii. abſumenda. Nam ſi lib. x. ad lib. iiii. reducere oportet, duo ſequitur mala. Primum, quod aliqua medicamenta diutius decoquendo, vires perdant; Alterum, quod iſic Syru. ſuapte natura ſpiſſus; ſpiſſior reddatur. Quod ſi ad dimidionem tantum; vires medicamentorum ſeruabuntur, & minus ſpiſſus erit; quādoquidem ſpiſſitudo hunc ingratum facit. Tamarindos nec Caſſiam, neque diu decoqui neque ſine decoctione miſcere volumus.

* Cordus 1. b. f. tantum legi.

Diſſoluantur vires laxantiū medicamentorum in ſem. quæ decocti. q. ne.

Lentes leniter decocti. laxat.

voluimus. Quod si hic Syrup. partim ex succo Fumarij. partim ex succo Mercurialis paretur, efficacior erit, quod hæc medicamenta mitiora sint, neque possint mediocri quantitate purgare: quod erit si (vt prælici imperant) detur in minori quantitate cum aquis vel decoctis laxantibus: Quare dandus erit cum decoctione Mercurial. vel ex decoctione Agarici vel simul, vt efficacior reddatur, Syrup. de Epithymo, si detur cum decoctione thymi, calamentæ, Stechad. Agarici scemic. & anisi. Sic paratus hic Syrupus non inferior erit Syrup. ex Epithymo.

* Licebit Succum Rosæ addere ad drach. iij. vel iijj. quod si adduntur, vnc. iij. aut quatuor Syrup. efficacior erit: Rosæ sicce roborant; recentes serosa euacuant roborando.

Serapium Absinthites.

Rec. *Absynthij Romani*, drach. 100.
idest, vnc. 12. s.
Aque lib. 3. Coquantur ad tertias.

Fricentur manibus & coquantur. Col. adde Vini albi antiqui & clari Mell. antiqui ana lib. 3. coquantur in Syrup. Hanc descriptionem elegimus, quia quæ prescribitur apud eundem auctorem Mesuem, recipit Rosas, Cydoniorum succum, quæ multum asfringunt. Sed cum hic Syrup. sit non solum ad ventriculorum roborandum, sed etiam ad purgandum per ventrem biliosa cretenta, & per urinas, non possit hoc modo paratus conuenire, nequæ in declinatione febrium tertianarum ad bilis euacuationem, vt Gal. inbet dicitur Quare, vt communior esset ad omnia, hanc descriptionem retinebimus: illam rejicimus.

Coquantur ad tertias, [L'Ob.] Absinthium recens intelligendum videtur, quia tanta quantitas Absynthij sicci in lib. iij. aquæ decoqui non poterit ad tertias; aut vinum addendum sub finem & in Balneo leuiter decoquendum Absinthium, vt vis illa quæ in externis partibus existit, colligatur: detergens namque est & apertens, quæ in viridi præstantior, minusque calida: quantitas viridis Absynthij augeri potest vt proportioni aquæ respondeat, omisso vino quia in declinatione febrium tertianarum exhibetur à doctis medicis, Galeni autoritate, & magis commune est medicamentum.

Quod si quis Spicam Nardis, aut Colicem ad. iungere velit, non repugnat: quia per hæc eius alio corroboratur, & fortior fit. Hic non aliam speciem Absynthij inieci volumus, quam vulgare illud. Tale est verum Romanum, vt videre est

in antiquis ruinis Romæ, in quibus tam frequens est, vt nulla frequentior videatur herba. Manifestum est ergo esse illud Absinthium Ponticum: non enim Serapianum, non Xantonium. Quare primam speciem esse oportet.

Absinthium Romanum Ponticum alio loco demonstrauimus, cui similitudinem scribit Dioscorides. Consule Sürpiani Aduersaria pag. 335.

Si quis velit magis asfringere, addat cocleam vnam succi Cydoniorum, cum vti volueris.

Syrupus de Mentha, Mesuz minor.

Rec. *Succi Mentha lib. 1.*
Succi Granatorum dulcium, & acidorum ad dimidium colli ana. lib. 2.
Sacch. lib. 4. in Syrupum decoquantur.

Hic Syrup. semper parari potest, si seruetur succus Granatorum sed commodius vere ob Mentha succum, vel Autumnus, ob Granatorum succum. Quod si non reperitur Mentha bene humida, in eo succo Granatorum (non Menthe) macera per 24. horas, Mentha sicca q. s. vt in Absynthite Serapio diximus augenda succorum quantitatem, vel minuenda dosim Mentha ad lb. 1. fiat Syrupus cum Sacchari lib. 2. Utiles est ad vomitiores & ventris subuersiones, ad singulas, stomachique relaxationem, & apertentiam magnam dejectionem. Malumus hanc descriptionem, quia simplicior & facilius, & cum erit opus asfrictione licebit Syrupum à Cydoniis accipere, aut addere, & aromatizare cum Gallia moschata.

Frequentius hodiè paratur ex Mentha Romana odoratissima sicca, quia herba odorata calidæ odoratioris & suauioris sicce & efficacioris quam virentes sunt ad corroborandum, non abstergendum.

Appendix Rondellesij ante obitum.

Syrupus e Mentha maior Mesuz.

Syrupus e Mentha duplex est alius minor modo descriptus, alius compositus maior eiusdem authoris.

Rec. *Succi Cydoniorum,*
Succi Granatorum acidorum,
Succi Granatorum vinosorum dulcium singulorum lib. 2.
In quibus macera 24. horas Mentha Ro-

mana

mana sicca suavisissimi odoris. lib. 1. f.
Ref: rubearum, unci. 2.

Coquantur ad medietatis consumptionem lento igne in vase lapideo & colentur.

Colatura adde mellis suavisissimi, opt. mi
aut Sacchari lib. 2.

Ictum coquantur in Syrupum. Aromatizetur drach. 2.

Gallia moschata.

Singulus & vomitus sistit cum succo Granatorum, ut Democritus demonstrat, Pl. 10. l. cap. 14.

Syrupus e Stachade.

Ad partes refrigeratas, humoresque crassos. attenuandos utilis est, & in affectibus cerebri, qui hic ordine describendus & parandus est.

Rec. Vuarum passarum enucleatarum, unci. 4.

Rad. Pyretri, drach. 7.

(Pyretum in nullo Syrup. potius praeferatur quam in illo.)

Chalamintha, }
Origanum, } ana, drach. 10.

Thymi, }

Anisi, drach. 6.

Zingiberis, drach. 2.

Piperis longi, drach. 3.

Florum Stachadis, drach. 30.

Fiat decoctio (facta maceratione per 12. horas) in lib. 10. Aqua, & Mellis lib. 5. & reducantur ad 5. lib. fiat q3 Syrup.

In hoc suspende Cinnamomi, }
Calami aromatici, } ana, drach.
Spica Nardi, }
Zingiberis, } 1. f.
Piperis nigri, & }
Longi, }

li. aiorum in panno raro. Aqua quantitas minor sufficere videtur.

Communis Syrupi e Stachade descriptio.

Rec. Florum Stachadis, dra. b. 30.

Thymi, }
Calamintha montana, } ana, drach. 10.

Origanum, }
Pyretri, } ana, drach. 7.

Anisi, }

Piperis longi, drach. 3.

Zingiberis, drach. 2.

Passularum enucleatarum, unci. 4.

Mellis, lib. 5.

Condias Cinnamomi, }
Calami aromatici, } ana, drach. 1. f.
Spica Nardi, }
Croci, }
Zingiberis, }
Piperis nigri, }
Longi, }

nodulo exceptorum: suspendantur in Syrupo.

Dant citius aqua decoctionis Spica vel Rorism. vel cum aquis Hiss. Betib. Salvia, & similia. Hic Syr. debet fieri cum Melle, quia Mel magis deterget lentos humores, ad quos coquendos fuit institutus. Et quo de spumatur melius, à principio Mel ponendum diximus. Nam & quae hunc spumum complent, non ferunt magnam decoctionem, non etiam quia macerata fuerunt. Sunt enim odorata & tenuium partium. Possumus pratermittere Piper & Zingiber in decoctione, quia in clarificatione ponentur: sed non multum coquantur. Forasan aliquis mirabitur, quod Crocum omiserimus; quod non sine ratione factum intelligere oportet: nam hic Syrup. in dolore capitis, scotomase, epilepsiaque praescribi debet, non potest Crocum sine noxa recipere. Crocus enim tentat caput & laedit cerebrum, dolorem inferendo, ut ait Gal. de compositione hyera agentis, lib. uat. 1. 1. Ob id igitur Crocum pratermissimus. Nos tamen non late vim habere colicariam, si capitis dolorem non adferret, multumque ad cerebrum effumaret. Sufficiens odorata alia, quae in clarificatione, & post suspensa feruntur, & in Syrup. ligata reponantur. In hunc Syrup. Pyretum inijcitur, quo raro videbatur in internis affectibus antiqui sed in externis tantum, vel ad pituita per eos solutionem, vel ad dentium dolores: ob id visum fuit pratermittere, & pro Pyretro rad. Emula Campana, quae ad pituitam detergendam & alterandam utilis est, vel crassam Galangam, quae ab omnibus in affectibus nervorum accommodata existimatur. Calamyntha tres sunt species: sed parum refert, quam accipias. Secunda

tamen

tamen, quæ pulegium Regale vulgo dicitur, ex-
ternas & incisivas potenter pituitam. Quare pule-
gem præferendam & usurpandam. Notandum
Cervinum possum esse ab Auicenna pro
Diatanno. Dioscorides, Diatannum vocat
Sylvestre Pulegium. De Pulegio Ceruino
Monspeliensium consulè Stirpium Aduersaria,
pag. 214.

Fit cum aromatibus & completus dicitur:
sine aromatibus, incompletus: sed completus
fieri debet, quo frequentius vltimur.

Syrupus de Artemisia.

Possit Syrupus de Stachade syr. de Artemisia
poni debet.

Rec. Radic. Emula camp. } ana. unc. i.

Rubia maioris,

Feniculi,

Petros.

Apii,

Paonia,

Cypri,

Mercutial.

Pulegii virinisque, a

Calamintha,

Nepeta,

Organi,

Melissa,

Betonica,

Stachad.

Chamadriol,

Camepith.

Samplici,

Sabine,

Marrubii,

Matricarie,

Hyperici,

Centauri minoris,

Artemisia,

Persicaria virinisque,

Seminis Iuniperi,

Nigilla Romana,

Libistici,

Petroselin,

Anisi,

Costi,

Cubeborum,

Calami,

ana. M. i.

ana. M. 2.

ana. unc. f.

Pyrethri,

Asari,

Cardam.

Valeriane,

Cimini,

Iridis florentine,

a Id est Regalis & Ceruini, pro quo potest poni Di-
atannu Creticum in regionibus Pulegio Cer-
uino carentibus.

Radices infundantur in aqua pluvia & paucis
vino albo. Coquantur in eadem infusione radi-
ces primum & herbe, postea semina: odorata
sub finem, cum volueris auferre ab igne, & sint vlti-
ma: cum Melle fiat syr. Darsi debet cum de-
coctione Glycyrrhyza vel Pissulæ, ut addatur a-
liqua vis deterfiva. Quid si in decoctione parum
sem. fennug. vel rad. bismal. vel Consolida mat.
addideris, ut viscositas horum minuat asperita-
tem aperientium, quæ exulcerare solent eos, qui
frequenter ipso videntur, tunc erit huius Syrupi
usus. Diuersa apud diuersos reperiuntur discrep-
ationes. Aliæ aliquæ huc admittunt, quæ cum syr.
hoc pugnant, ut illa vulgaris, quæ Timocritum
recipit: & alia, alia, quæ parum faciunt. Nos
verò ex omnibus collegimus hanc, in qua pro solis
Rubia maioris, rad. possumus, quia sunt efficacia-
ores. Persicariam viramque addidimus, quæ &
Cratægonum dicta est, & multum adinstitutum
facit. Deinde in ordinem reducimur, quo debet
parari. Sequitur Syrupus de Stachade, quia fur-
tior est ad extenuandum & ad exsiccandum pi-
tuitam, & ad partium vernosarum veterique ex-
siccationem, & in catharris antiquis. Si cum de-
coctione Glycyrrhyza, & quatuor sem. frig. ma.
& Pissi. administratur, idem præstabit, quod Syr.
de Præssio pollicetur.

Serapium Glycyrrhyzites Mesuz.

Ad expellatorem & expurgatorem pal-
monum valet, & hoc modo paratur.

Rec. Glycyrrhyza rase confusa, & pa-
rum re succata, unci. 2.

Capill. Veneris, unci. i.

Hyssopi viridis unci. i. drach. 6. pro unc.
f. succa.

Marceretur in lib. 4. aqua fontana per
24. horas, coque ad dimidias. Expres-
sum percoque cum

Mellis,

Mellis, & } ana. unci. 10.
Sacchari, }
quia Penidias expunximus.
Sapa, unci. 2.
Aqua viol. unci. 6. fiat Syrup.

Nota penidias non debere ingredi Syrupos pectorales, quia inefficaces; nisi cum Syropo taceo volumus Eclegma.

Hæc Syrup. docent præparandum multa, ut ea, ex quibus suam potissimum accipit facultatem, & effectus, quos præstat scribit Mesue. Valere enim ad iussum antiquam, ad expectorationem, non in principio pleuritidis (nam qua constringunt & dilatationem thoracis impediunt, non conveniunt, sed qua incrassando sistunt defluxionem, ut Syrup. Violaceus, Syrup. Lini, de Papavere in tenuissima defluxione;) sed, ut Mesue docet, ad iussum antiquam; quia attenuantia & detergentia desiderat, & incidentia, qualia hæc Syrup. habet. Dicitur de Glycirrhiza, & vires suas assumit ab Hyssopo & Adiano, Capillum Veneris vocato; quia omnia attenuant. Recipit Mel & Saccharum; ob id Penidias expunximus, quia Syrupum incrassant. In Eclegmaticis, ratione optimæ ponuntur, quia medicamenta diu in gula adhaerendo, aliquam partem in tracheam arteriam transsumunt. Sed in Syrupis, qui non solum transglutendo sensim, sed libendo assumuntur, ut ad pulmonem veniant, & detergant partes, oportet aliquam tenuitatem parvum inesse, saltem non esse crassos, ut qui per angustissimas vias ad pulmonem pervenire debeant: ob id in nullo Syrup. addi debent, sed cum modo Elegmaticis vti volumus, oportet admiscere Tragacanthum, & alia viscidâ. Aquam Violatam ponimus, non autem Rosarum, quia hæc spiritum retinet sua astringitione: illa refrigerat, citra astringitionem, & laxat pulmones. Item temperat siccitatem: Nam sicca non debuit esse namque quia ad expectorationem instituantur, ne spiritum & pituitam resiccent & retineant; quod Gal. docuit observandum, secundum locos, de remedij pulmonis agens. Loco Pedinariarum Sapa potius adimimus, quia deterget & leniter cõstringit, si detur ad defluxiones, & imbecis detergerendo. Id Gal. secundum locos docuit, inbet Dyacodium componere cum Melle, cum detergere volueris: cum Sapa, ad sistendum fluxiones; nam qua detergent, ut Mel, fluxiones movent. Hæc lenis astringitio sufficit ad partium corroborationem, quia partes dilari potius, quam constringi volumus ob suam astringentem. Ceterum aqua Stillatitia additur decoctionibus, cum herba earum non habentur, & cum volumus, ut medicamentum penitus penetret.

Syrapi Glycirrhizæ descriptio vulgaris.

Rec. Glycirrh. unci. 2.
Capill. veneris, unci. 1.
Hyssopi sicci, unci. 1.
Macerentur per 24. horas, in lib. 4. Aquæ.
Coquantur ad medias.
Colaturæ adde
Mellis despumati, } ana. unci. 8.
Sacchari penidiarum, }
Aquæ Rosarum, unci. 6.
Fiat Syrupus.

Syrupus e Prasio.

Syrupus à Marrubio paratur ad pituita attenuandam & expectorationem in hunc modum.

Rec. Rad. Apij, } ana. drach. 5.
Fanculi, }
Glycirrhizæ, unci. 1.
Ireos, drach. 3.
Prasij, }
Hyssopi recentis, } ana. drach. 6.
Capilli Veneris, }
Calamintha, drach. 5.
Passul. enu. leatarum, unci. 5.
Ficuum pingue succarum num. 15.
Decoque in lib. 8. aqua ad consumptionem tertie partis, Col. adde Mel. & Sapa ana. lib. 2. fiat Syrup.

Hic Syrup. non est valde necessarius, & si velint medici, possunt carere; nam si Syrupus de Glycirrhiza detur cum decoctione Ireos, & Calaminthæ, vel Hyssopi, vel Prasij, vel si Syrupus de Glycirrhiza addatur Syripi de Stachide tertie parti, certis idem præstabit, quod Syrup. de Prasio: vel si Syrupus de Hyssopo cum prædictis detur. Preterea non est admodum gravis ob semen lini & fauonigraci. Recipit etiam musciclaginem cydoniarum, quæ non multum inuat. Hic oportet Marrubium & Hyssopum recentem ponere, ne nimium exsiccando, spiritum retineant. Adde quod Marrubium viride probatur in hac cõpositione. Penidias expunximus, & Sapa addidimus, quia magis convenit: sed etiam doloribus renum & coli potest convenire. Detergit enim, & lenit partes exasperatas, & modicè calefacit. Ventrem leniendo & incidendo laxat, maxime si cum decoctione Prasij & barbarum emollientium detur, &

cum decoctione Malua. Alio modo capite de Tussi describitur à Mesue, & amygdalarum & pinearum nucleos, mastichem, & cinnamomum recipit: sed hanc magis probamus; Magis probaretur ad expectorationem si semina illa in crassantia expuncta essent, nam illa transitum ad pulmones impediunt: quod si ad elegantis modum utendum; Semina illa si aqua mace- rantur mucaginē faciunt, quæ omni tempore Syrupo addi possunt. Ego Radices Apij, for- niculi expungerem, quæ attenuant & ineidunt fluxiones suscitant. Hic Syrupus similis est Syrupo Hyssopiri, & æque rejiciendus vter- que, ut qui ex incrassantibus & incidentibus componantur. Illæ contrariæ actiones simul eodem tempore fieri non possunt. Sati- us erit seorsim habere Syrup. incidentes & incrassantes, qui ambo miscendo efficiant tales Syrupos.

Communis Syrupi Praesio-
scriptio. Mef. quam ap-
posuit Rondel.

Rec. Prassij, vncij. 2.
Capill. Veneris.
Hyssopi, ana. vnc. 1. alij drach. 6. legunt.
Glycyrrhiza, vncij. 1.
Calamintha, }
Anisi, } ana. drach. 5.
Rad. Apij, }
Fæniculi, }
Sem. Malua, }
Fænigraei, } ana. drach. 3.
Rad. Iridis, }
Sem. Lini, } ana. drach. 2.
Cydopiarum, }
2 Passularum nuculeatarum, vncij. 5.
Ficuum secarum pinguium, Num. 15.
Penidiarum,
Mellis despumati, ana. lib. 2.
Cordus, vncij. 2. tantum: legendum 5.
Cordus habet lb. 1. Penidiarum tantum.
Coquantur primum radices in lib. 8. aquæ.
Deinde herbæ, postremo Hyssopus, Capil. Ve-
neris, Anisum edesum & semina mucagino-
sa, quæ semper nodulo extipi debent, in deco-
ctis Syruporum ob lentorem, alioqui potius fiet
Gelatina quam Serapium.

Chylarium Erysimoides, Botryset, Bechi-
cum efficax, Orsophnicis uti-
lissimum. L'Obel.

Rec. Erysimi, M. 10.
Succi eiusdem lib. 1. *Fiat Suecatorium
ex arte.

* Tempore mellis semina eius colligi poteris & drach. 2. v-
sibus addenda erunt.

Botryos, } ana. M. 7.
Bechij eum radicibus, }
Glycyrrhizæ rasæ, }
Radicum Helenij recentium } ana. vncij. 1.
Succo prægnantium, }
Radici Iridis recentis floris candidi vel alteri-
us odoratiore in tenues partes prærasæ,
vncij. 3.
Polytrici recentis vel Adianti, } ana. M. 6.
Hyssopi viridis, }
vel Hyssopi sicci, sicut æte hyeme M. 1. P. 1.
Endiuiz, }
Borraginis, } ana. M. 4.
Melissophylli, }
Marrubij viridis, }
Scabiosæ, } ana. M. 2.
Cardui S. }
Chamædryos, }
Betonix, } ana. M. 1. f.
Folium violarum, }
Florum Cordialium, ana. P. 4.
Florum } Anthos, }
Stachadit, } ana. M. 1.
Thyrni, }
Florum Saluiz, P. 2.
Passularum Cornthiarum con- }
tufarum, } ana. vncij. 6.
Ficuum,
Cimini, }
Batchiarum Lauri, }
Sem. Anisi, } ana. vncij. 1.
Sem. Fæniculi, }
Sem. Carui, }

Decoquantur in f. q. aquæ Hordei integri
ex arte in duplici vase. Expressioni per albumi-
na purgatæ dissolue,
Mellis despumati, lib. 3.
Sacchari, lib. 8. fiat Serapium, addendo sub fi-
nem Acceti albi optimi, lib. 1. Aromati-
zetur pulueris Santali rubri, vncij. f. & drach.
3. Radici incisæ Iridis Florentinz.

Syrupus

Syrupus Iuinivinus, sive Serapium
Zazyphites Mes.

Syrupus e Papauere.

HIC Syrupus, quia mediocriter insissat de-
fluxione tenues quæ sunt: & iam factas in-
sissat, & deterget aliquantulum, asperitacis sive
aspera arteria emendat, in frequenti usu est, Idcirco
in officinis retinemus qui si rectè paratur, medius
est inter violaceum & Syrup, ex capitibus papa-
veris.

Rec. Iuinb. numero sexaginta.
Hordei mundati, }
Glycyrrhizæ, } ana. vnci. x.
Capillo Veneris, }
Florum Viol. } ana. drac. 5. alij vnc. 5.
Seminis malvæ, } sed male.
Seminis Cyoniorum, }
Seminis Papaveris albi, }
Seminis Melonum, } ana. drac. 3.
Lactuce, }
Tragacanthi, }
Decoquantur in libris 4. aque pluvia, vel
fontis ad consumptionem dimidia partis.
In col. dissolue Sacch. clarificati lib. 2. fiat
Syrupus.

In hoc Syrupo nihil immutamus præter ordi-
nem, ut illi simplicia ordine, & secundum artem
collocarentur, atque fructus radices, ac Hordeum
decoquerentur densius. Tragacanthum in fine
ponitur, ne longa coctura totum in mucaginem
vertatur. Aqua lib. 4. ponimus, ut in simplici legi-
mus, quæ quantitas sufficit legendum iudicamus,
Iuinb. unus num. 60. qui dem inepti legunt lib. 1.
non adhaerentes, illud lib. 30. significare, non lib.
Sufficerent aqua lib. 4. sed hæc, quæ viscosa sunt,
& Syrup. insissant, non debent multum decoqui,
quod vis illa in externa parte sita sit, neque Tra-
gacanthum sustinet longam cocturam: quare densius
decoquendum est Hordeum: deinde Iuinbe fracta.
Capil. ven. & floris Viol. in fine inijci debent, &
hoc fuit in causa, cur minor quantitas aquæ adita
sit. Sed qui non norunt usuram verum non possunt
bene parare, & conueruntur de viscositate. Si
capita Papaveris cum seminibus ponantur, effica-
cior reddetur. Lenis enim insissatio est in sole se-
mine. Saccharum clarificatum additur.

Syrupus e Papauere, quia utilis est in insissan-
tione: Syrupum de Iuinb. sequitur; cuius de-
scriptionem post Syrup. de Iuinb. collocavimus, ut
etiam Pharmacopole eo ordine dissonant in offi-
ciniis. Ex Papauere parantur duo Syrupi, quorum
alter simplex, quia minus compositus: alter verd
compositus dicitur: sed horum duorum eadem est
facultas. Compositum prætermittimus, simis sive
còtècti simplici: nam si catharrus sit incrassandus,
de Iuinb. aptior erit. Quid si non sufficiat, addo
vnc. 8. Syrup. de Iuinb. vnc. 1. Syrup. de Pappave.
multumque incrassabit. Compositus tamen ad in-
crassandum catharrum, & sistendum valebit ma-
gis: sed ad stuporem inducendum minus. Ob id
multa sunt addita, quæ nihil faciunt ad consilieu-
dum seminum. His de causis minus compositum
consulimus, qui parabitur cum Sapa & Saccharo.
Qui autem cum Sapa paratur, vocabitur Dyaco-
dum: Cum sacchar. verè Syr. e Papauere.

Rec. Capita Papaveris albi numero 80.
Seminis Lactucæ drach. 10.

Fiat decoctio in lib. 4. aqua pluvia ad
consumptionem dimidia partis. Col. adde
Sacch. vnc. 8. fiat Syrup.

• Mediæ parti decocti. vnci. 8. Sacchari ad-
dendæ videntur, & alteræ parti, vaci. 8. Sapæ.

Hunc Syrup. parant ex cap. Papaveris albi &
nigri, æquali pondere & numero: sed cum ** Pa-
paver nigrum sit periculosum, & stuporem indu-
cat, vel seminum profundum, idcirco visum fuit
albi quantitatem augere, & ad capita octoginta
numerus reducere, & pro dra. 10. quæ restabant,
seminis Lactucæ totidem addimus, ut sequamur
Aucien. qui iubet non esse tertransendum, quod
pre nigro Pap. seminis Lactucæ drach. 10. som-
num conciliant, ob cuius occasionem factus est.

** Papaver nigrum à me statum in Angliæ Sommerlesii
præfectura, Naturæ Iusu & metamorphosi, in album
mutatum est, virtusque albi aut nigri seminis latini misti-
us est opio aut Meconio, quia vopainosum aut oleagi-
nosum: vñs igitur nigri seminis non adeo verendus.

L'Obel.) Serapium Papaverinum simplex
& Compositum D. Mesua communis
descriptio.

Serapium e Papauere compositum Mesuæ
Non est dispensandum ex Rondelleij consi-
lio.

filio quia, respondet Syrupo Iuiubino & Papauerino simpliciter. Simpliciter autem

Rec. Caput Papaueris albi, } ana.
& Papaueris nigri, } 60. N.

Coquantur in lib. 4. aquæ pluuiæ ad consumptionem librarum duarum & dimidiet: colantur, in Serapium percoquantur, additis

ad lib. 6.
Syl. Sacchari albi, } ana. vnci. 6.
& Sa: Penid., } ana. vnci. 6.

Syl. Capita cum seminibus magnorum & parvorum flicorum, & humidorum media macerantur 24. horis; & si sint ficiora, pluribus; deinde coquantur donec tabescant; exprimentur; cum Saccharo aut Melle vt Diacodion, pro varijs Medici scopis percoquantur in Serapium lento igne.

L'Obel. Diacodium Rhomboides, aut orbiculatum.

Imitatione Manus Christi in forma solida orbiculata aut tabellata, addita Glycyrrhizæ sufficienti quantitati decocti Papauerini præscripti & Saccharo cum margaritis, aut speciebus Diatragacanthi frig. & huiusmodi pro morborum varietate, parvo Saccharatos orbiculos aut rhombos non inliuæ neque ægris molestos vti Serapia ad Catarrhos sistendos, fomnumque conciliandum.

Serapium Hyssopites.

Diu ego dubitavi, in qua serie hic Syrupus reponendus, vel in numerum eorum, qui incrementum, vel eorum, qui attenuant: Nam Rad. Apij, Fœnic. & Petroselin. recipiunt cum multis alijs detergentibus, etiamque Hordeum mundatum, Myxa, Zizipha, semen Cydoniorum, Tragac. & semen Maluarum; que omnia inspissant: Sed cum incidentia & detergentia incrementum reponunt: putavi satius esse, in detergentium & incrementum reponi: eritque nobis vsui, cum nondum erimus certi, incrementum, an attenuare oporteat, eaque de causa dissensandum curavi: cuius exemplar erit tale.

Rec. His. mediocris sicca,
Rad. Apij, } ana. drach. 10.
Fœniculi, }
Glycyrrhizæ }

Hordei mundati, vnci. f.

Dactylorum à filiis mundatorum, & sicum pinguium succorum, ana. nume. 10.
Pass. mundatarum, drach. 12.

Zizipharum, } ana. nume. 30.
Mixarum, }
Capilli Veneris, drach. 6.
Seminis Mal. }
Tragacanth. } ana. drach. 3.
Sem. Cydonio: }
Coque in lib. 8. aquæ ad dimidium.
Expressioni adde Sapa, } ana. lib. 2.
& Sacchari, }
Et fiat Symp.

a Alij omnes habent Sacchari Penidiarum lib. 2. Sive Sapa. quæ tamen commodè lib. addi possit cum Penidijs, ad singulorum lib. 1. vel vnci. 12 vel 15.

Apud Mesf. dua alia descriptiones reperiuntur cap. de tussis, quarum prior parum distat a Sympo de Iuiub: Altera hinc tradita non valde dissimilis: differunt tamen, quia hæc recipit semen Apij & Fœnic. non rad. & Anisum: illa semina Cucum. Citrulli vltra habet, neque Dactylos neque Penidiarum recipit: ob id eam descriptionem volumus relinquere, ac tantum indicare semina potius, quam rad. esse viscipanda: nam rad. non sunt necessaria ad incisionem: et semina sufficienter id præstant, & statim dissolunt, qui putitam chymum faciunt iussim, & spirandi difficultatem inducunt, quia spacia pulmonum magis replent. Præterea hic Sympus ex Hordeo & fructibus componitur statim gignensibus, quia dactyla relaxando ventrem, multorum statum gignendorum sunt causa: quare non rad. sed semina Fœniculi & Apij viciemus. Quod si Anisum adde-re volueris, erit melior & efficacior: Nam Anisum præterquam quod fletus dissentit, aliquid dulcedinis habet: quare poterit ad expectorationem nonnihil facere.

Hic Syrupus videtur paratus ad contrarios affectus; vt in excretionem sanguinis à venis ruptis, vi tussis.

Coque in lib. 8. vel 6. ad dimidium.]

Hordeum diu decoquendum: cætera minus & pro eiusque naturæ. Tragacantha, Semina Cydoniorum & Maluz leniter confusa & nodulo laxo excepta, valde parum coquenda, ne loco Syrupi Gelatina fiat: vt cuidam crassæ Mineræ Pharmacario apud Lutetianos malè cessit.

DE DECOCTIONIBUS.

Decocta multa in Mesfnei dispensario descripta sunt, quarum aliqua hic inseremus, &

& alia quibus prætermittimus, tanquam superflua: nam talia non purantur, ut seruentur, quia sequari non possunt, & à Syryp. non differunt. Quod si in usum trahantur à medicis, immutata præscribuntur. Nos hic decoctionem communem Chylis, & Medicinæ, & Pectoralem tantum describemus.

Decoctione communis Chylis.

Rec. Beta, }
Malua, }
Farietaria } ana. M. i.
Brancha, }
Vrsine, }
Mercurial. }
Fuss. p. i.

Fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ.

Quod si à plantis drach. 2. Anisi & Fæniculi melior erit Decoctio. Omnia Cercalis in parte externa vim habent detergendi. Item quæ easdem vires habent medicamenta in equali portione poni possunt, aliqui minime.

Decoctione communis Medicinæ.

Decoctionum commune medicinarum, quod hodie ad dissolvenda solamina usurpatur, sine arte & cepte descriptum est. Fiat autem in hunc modum.

Rec. Herd. integri, P. i.
Prunorum & } ana. P. o.
P. ss.

Glycirrhiza rasa, drach. 2.

Viol. P. i.

Anisi, drach. i. fiat decoctio.

Dicitur autem communis, quod nulli parti aut humori sit destinata, ut est Pectoralis, quæ utitur in affectibus Pectoris, requiritur tamen bilem, vel melancholicam, sed tantum lenient, ad omnia excrementa: Ideo Tamarindos expauimus; quia laedunt ventriculum, & ad bilem præscribuntur: sed cum Communis præterit, non est necesse addere Tamarindos. Anisum prætermisimus addidimus, quia odorata similia cum medicamentis laxantibus sunt aduiscenda, ut Hipp. lib. de viis acut. imperat. Adde quod Pruna & Hordeum stitui giungunt, quos discutere oportet.

Decoctione Pectoralis.

Decoctionum Pectoralis dicitur, quod magis ad partes pectoris destinatum sit, quam com-

mune, nihilque habeat, quod parti non conueniat. Sed fuit hoc non minus inepte descriptum, quam prius.

Rec. Hordei integri P. i.
Glycirrhiza, vni. ss.
Capill. Veneris, } ana. M. i.
Hiss.

Ficuum, }
Dactylorum mundatorum, } ana. P. o.
Pass. enucleatarum, }
Florum viol. } ana. P. i.
Euglossi,
Anisi, drach. 2.

fiat decoctio, quæ usui erit ad medicamenta laxantia pituitosa dissolvenda, utilis ad detersionem & expellatorem in pleuritide. Istud duci potest decoctionum fructuum, quo utendum est, ut vult Mesue, ante concoctionem. In ordinem reducimur hanc decoctionem, & addidimus Anisum ob rationem superius ab Hipp. adductam. Apposimus sicut, quia parti magis conueniunt, & flores cordiales, ut Borrage & Buglossi.

DE
LAXANTIBVS
MEDICAMENTIS.

Laxantia medicamenta vel sunt molliora, vel dura. Molliora sunt ut confectiones, Diacassia, Catholicon, Diaphenicum, Incensum maius, Confectio Hamech, Hiera picra, vel Hiera Colocynthidos. Dura sunt, ut Electuaria, Electuarium Diacarth. e Succo Ros. & Citro solutivum. Vel sunt pilula. Hac sufficiens ad morbos curandos: Plura ergo habere, superfluum est. Nos vero à communioribus incipiemus.

LENITIVA à CASSIA
medicamenta.

Castorei & Egyptice filiquis à diuersis auctoribus multa & varia medicamenta lenitiua descripta; minime paranda aut dispensanda censentur, quia vel accescunt vel exiccantur, & eorum laxandi vis perditur.

Diacassia

EX Cassia multa componuntur remedia. Hoc autem à Cassia nomen accepit, tanquam a nobiliori

biliori & precipuo. Fiant autem duobus modis, vel ex decocto herb. recentium, vel ex succis. Quare succorum tempore paranda erunt. Quod si ex decocto parare velis, id omni tempore poteris, si herba sint ad manum. Hac decoctio pro clysteribus & pro pauperibus commune medicamentum fit ad leniendum ventrem, sic.

Rec. Succorum Violariæ, }
 Maluæ, } ana. quatuor. s.
 Betæ, }
 Mercurialis, }
 Parietariæ, }
 Succus Absynthij communis, unci. 2.
 Mellis, lib. 3.

fiat decoctio donec ad consistentiam aliquam, ut Mellis reducantur: cui addæ Cassiæ recentier extracta lib. 1. misce, & seruetur vsui. Quod si ex decoctione parare volueris, fiat hoc modo.

Rec. Violariæ, }
 Maluæ, } ana. M. 1.
 Mercurialis, }
 Betæ, }
 Parietariæ, }
 Absynthij communis, M. 3.

fiat decoctio in sufficiente quantitate aquæ, & facta forti expressione, addæ Mellis lib. 1. s. misce, fiat decoctio ad consensionem dimidia partis. Cui addæ Cassiæ lib. 1. commisceantur. Hac compositio debet plus Mell. habere propter aquam decoctionis. Expunxitur succum florum Viol. sufficit succum habere herba in priore: in ista aciem sufficit herba. Quod si quis velit in decoctione apponere, nolo pro Viol. à communi opinione dissentire.

FLOS CASSIÆ.

E Cassiæ recentibus & pregnantibus fistularibus siliquis pulpa elicitur, quam florem Cassiæ & Cassiam extractam vocant: Sed cum Cassiæ siliques siue fistularis recens pulpa melius assuetur in sua theca, quam excreta: quid extractione ante vsu opus esset? Triplex Cassiæ extracta in officinis prostrare solet. Cassiæ extracta sine Sena & cum Sena; Cassiæ cum Manna: Cassiæ cum saccharo & cum Melle pro clysteribus & pauperibus. Si præscribatur à medicis, paratur hoc sequenti modo.

CASSIÆ EXTRACTA COMMUNIS NITROSA.

Rec. Florum Violarum,
 Violariæ siue foliorum violarum,

Maluæ,
 Mercurialis,
 Et æ,
 Parietariæ, ana. M. 1.
 Absynthij pontici siue vulgaris, M. 1.
Herbæ istæ virides coquantur artificialiter in 12 q. aquæ: è cuius colato ablue siliquas Cassiæ, & dilue in eius portuncula pulpæ Cassiæ lib. 1 Mellis ex reliqua colati parie despumati lib. 1. percoquantur lento admodum igne ad electarij formam.

DIACASSIÆ cum MANNA non multum differt à Diacatholico, nisi Sena, Rhabarbaro & Polypodio:

CASSIÆ FISTULÆ, & CASSIÆ SILIQUÆ PURGATRICES.

A Cuiusmodi & Græci recentiores, Arabes imitati, Cassiæ fistulæ aut fistularis nomine fructus longos, atros, teretes sesquipedales, ubique notissimos, medulla nigra molliorque farctos, siliquas verius quam fistulas nobis designarunt: cuius lignosior cortex à vulgo Medicantiū inueterato rancido errore pro Cassiæ legitima Priscorum ad fetus & secundinas accelerandas & excludendas, addita Myrrha & Croco in puluerem redactis, præscribitur.

Fistularis aut fistula dicta Cassiæ siue Cannella, quia eius flagella in frustra dissecta chorio bubulo recenti anriquitus inuoluebantur etiam Plinio & Theoph. testibus, ut vermiculis aut tinea inde natis, liguosa interior pars atroderetur, cortice illæso, integro, à vermiculis non flegmatato aut eroso præ acrimonia: eoque fistulæ figurâ remanente syringem dixeret. Plures Xylo-Cinnamomi aut Pseudo Cassiæ produntur differentiæ, de quibus quia nullus aut exigui, commodi, superfedendum duximus.


Cassia Pectorum.

Cassia per simplex s. Melissophyllum & Cneoium, herbæ sunt foliis iuxta aluearia seti, etiam Maronis ævo, ut satis liquet hinc suis versibus.

Vix humiles apibus Cassias, roremque ministrat.] è alibi, cætera.

Tu insos asperge liquorer,
Trita Melissophylla & Cerinthes ignobile Gramen,
Pluta in Stirpium Aduersarijs require Pagina, 134, & 185.

CASSIA siliqua Brasiliæna purgatrix compressa.



M Esopoli Mattiacorum à naucleris sedulis inuestigatoribus compressæ Cassiæ siliquæ verius quam fistularis Cassiæ aut fistulæ vocatæ genus nouum ex Brasiliâ aduehi incepit, cuius pulpæ nigriæ vnciæ vna plus purgat quam vaciæ dæ alterius Cassiæ Egyptiæ Caytiqæ, quarum vna Venetias deferri solet, foris subtuffa est, tenui cortice, sardiior & pouot: Altera nigra, cortice crasso, lignosiore duritioreque multo, & rugoso. Hispani similitam aut eandem ex Aphrica, Antuerpiam deuehere solebāt. Hæc autē Brasiliæna noua siliqua pedes duos aut vnciæ 24. longa est, duas aut paulò plus lata, & scisqui vnciam crassa; cortice foris cassianæ sulciore, rugis, & venis crassioribus admodum transuersis exarata, vtrique oris secundum longitudinem cacinata vnâ paræ concaua aut carinulâ conflatâ: alterâ verò cacinatim prominula, medijs naui imi dorsii siue trabis instar: lignoso admodum cortice, vulgarissimæ nigriæ Cassiæ durior. Hæc mihi missa duobus iam annis elapsis ab amicissimo & peritissimo viro Thoma de la Fosse apud Medioburgenses Mattiacorum Pharmacopoco, munere docti & egregij viri Doct. Francisci Halei Medici & Chirurgi Classici belli Mattiacorum, qui huius

Cassiæ periculum fecit. Semen non dissimile alterius, sed longè rariius & longius. Pulpa admodum dulcis. Effigiem affabrè delineatam a filio nro Mattheo L'Obelio damus.

De Catholico siue Electuario Catholico Nicolai.

Catholicum medicis in omnibus compositionibus laxantibus in frequentissimo usu est. Non multum à Diacassia differt, nisi quia recipit, quæ magis laxant, ut Polyp. Senam, & Rhab. Eiacuat communia excrementa ventris, partim lubrificando, partim astrabendo. Dicitur ob id Catholicum, quasi dicat vniuersale, quod non sit vni humori destinatum & determinatum medicamentum, sed quod in ventra, siue sit bilis, siue

feces, expellit citra calfactionem. Componitur autem hoc modo; Fit decoctio ex Polyp. lib. 1. & postea addito Saccharo, coquantur in Syrupum, qui inspersisset sequenti puluere & Cassia, & Tamarindis. Pulvis autem hæc recipit.

Rec. Folliculorum Senæ, vnci. 8.
Rhabarb. }
Violarum, } ans. vnci. 4.
Polyp. }
Anisi, }

D 3 Glycyrrizæ

Glycyrrhiza, }
 Penid. } ana. drach. 4. quart.
 Saccha. Candi, }
 quatuor Se: Frig. } ana. vnci. 1.
 maiorum, }

Cassia & Tamarindi in prædicto Sympo dissolvantur; Postremo pulvis. Hac compositio delicatior & efficacior, & minori sumptu fit, faciliusque hoc modo paratur. Decognatur Polypod. lib. 1. & vnci. 4. quia Polyp. Crassamentum constringit plus, quam laxat, & multos status gignit, ventremque laedit: quare melius erit decognere. Decolitioni addes quatuor semi: Frig. maiorum, ana. vnci. 1. Anisi Viol. recentium aut viridum, ana. drach. 4. fiat decoctio in lib. 12. aquæ ad consumptionem lib. 4. dissolve Sacch. lib. 8. Coquantur in Sympo. In quo dissolve Cassia, Tamarind. succi Rosarum, ana. vnci. 6. Ligniritia rasa, vnci. 5. folio: sena pulveris. vnci. 8. Sacchari Candi, & Penid. ana. vnci. 5. fiat confectio. Alij habent, Violarum recentium, vnci. 4. Anisi, vnci. 1. In dissolutione verò Cassia, Tamarind. ana. vnci. 8. Anisi triti, vnci. 3. Hac Confectio sine Rhab. imperatur, quia Pharmacopola non apponere solent, nisi vel antequam, vel corticem, vel frustula, quæ afferunt cum infusiones ex Rhab. parant. Quare satius erit non ingerere, quam tale: magis cum comstringit, quam laxat, maximè in substantia. Quare nos succum Rosarum substituiimus, quia laxat ventrem trahitq. biliosa & aquosa, ut Rhab. Dosis auximus, ut efficacior reprobationem, & in minori quantitate laxaret, ne hac compositio molesta sit ob eius molem. Quod si succus ponatur, erit minoris sumptus, & pro pauperibus etiam sic parari poterit. Nisi veterer reprobationem, pulpam Prunorum pro Tamarindis apponerem, tum quia si sint acida, maximè bilem extingunt & ventrem laxant, ut Tamarindi, tum quia paratu erit facilius.

Frustula enim quaruntur exotica, cum ex nostris medicamenta parari possunt. Penidias & Saccharum candum addimus, ad vnci. 8.

L'Obel.

Pro pulpæ Cassiæ, Thamarindorum & Senæ mundatæ singulorum vnci. duabus; semina frigida maiora ad singulorum drach. duas immiscuntur: & Rhabarbari, Violarum, Polypodij, Anisi, ad vnci. 1. singulorum inferuntur. Igitur vncijs octo singulorum pulparum

quatuor seminum frigidorum maiorum singulorum drach. 8. immiscendæ erunt & Rhabarbari, Violarum, Polypodij, Anisi, ana. vnci. 4. inferendæ: non drachmæ duæ singulorum prioris classis; & singulorum vnci. una secundæ, ut Andernacus sui oblitus se. it. Cordus & Rondellietius mentem Nicolai sequuti sunt.

Huius vniuersalis medicamenti varia & variata est descriptio. Exemplaria vulgata habent pro pulpæ Cassiæ, & Thamarindorum singulorum vncijs duabus, Sacchari, lib. 2. siue vnc. 24. Andernacus autem, pro lib. 2. Sacch. perperam addit Cassiæ, Thamarindorum & Senæ mundatæ singulorum vnci. 8. Miror tam doctum virum ita hallucinatum, cum in Sacchari quantitate, tum in his quæ præcesserunt. Rodellietius autem mediocritate fretus vncias 6. habet pro lib. 8. Sacchari, quamvis vinctæ octo pulparum, libris octo sacchari respondeat descriptioni Nicolai.

Hoc Eleætarium Catholicum lene siue mite in sua vniuersam & lenissimam, cum Cassiæ operatione maximè conuenientem compositionem, redequimus, quum & Diacatholico Liquamentum siue Extractum diximus, neglecto Diacatholico maiore Fernelio à Plantio ascripto, quod recipit Turbith & Diagridium, ab his benignis medicamentis & intentione Nicolai multum aliena.

Paratur ergo in hunc modum.

Rec. Radicum Filiculæ sine Polypodij recentium, fol. Senæ mundatorum, ana. vnci. 16.

Glycyrrhizæ 12.

Anisi, ana. vnci. 2.

Seminis Fœniculi, vnci. 1.

Foliorum Violarum, M. 4.

Florum Violarum, M. 1. f.

Quatuor seminum frigidorum maiorum, ana. vnci. 1.

Contusa omnia dempta Sena & seminibus frigidis, floribusq. Violarum, 24. horas vel biduo aquæ pluuiæ lib. 5. vel q. f. mactata, decoquantur leniter ex arte balneo Mariæ: mox paulo antequam ab igne depouantur, Senam adijciunt cum seminibus frigidis & floribus Violarum, niaceranturque calidè aliquot horas in balneo. Vbi tantisper refrigerint, lintheo excolantur & leuiter exprimuntur, ne Polypodij & Senæ vis astringentia eliciatur, Colatum iterum decoquitur, dum mellis crassitudo fiat, adiectis Sacchari boni subrubri, perdulcis vel albi pinguis, lib. 4. Postea ab igne remotis adde floris Cassiæ vapore decocti præscripti extractæ

extra. & Thamar Indorum, ana. vnc. 6. Sacchari, candi, & Penidiarum, ana. vnc. 1. f. succi vel infusi Ros. vnc. 4. zttate addi poterit decocto libra vna. succi Mercurialis defecati & purificati, & pro diuitibus in singulas vnc. scrupulus, vel drach. f. Rhubarbari teleutissimi.

Polypodij magma aut crassamentum, quia copiosus status gignit, ventrem lædit, cumque magis obstruit quam referat, leuiter Polypodium decoquendū iussimus, vt efficacius suas vires, easque suauiores, exuat. Decoctionem enim mediocrem sustinet, quemadmodum Sena & Turbit. vti monuimus in nostris Scirpium. Obseruationibus Latinis: Pondus eius etiam adauxi, quia vili emitur pauperum conamoris, longeque minori pondere in decoctis, vt Sena, & alia permulta, quam in substantia, vt vulgus loquitur, assumitur.

Al. qui omittunt Saccharum Penidiarum leui incommodo, quia Penidix parantur ex Saccharo pingui, leniente.

Electarium Lenitium.

Electarium Lenitium conuenit cum Diacatholico & Diacalsia, quare eo carere possumus. Hæc de Electariis lenioribus sufficiant, pluribus humoribus, exulsi potissimum expurgandis idoneis.

Dia-sebestem.

Dia-sebestem Montagnanæ bilem tenuem euacuat. In Italia & regionibus calidis magis vitarum quam in frigidis tractibus, vbi raro dispensatur, quemadmodum Elect. è Psyllio Mesicæ, quo etiam carere possumus. Recipe copiose Scammonij cum Trochis, è Spodio vel Antispodio, ex Oxyacantha, Troch. Diarhodon, quo Scammonij vires remissiores sint, & alui fluores dispendiosæ vitentur. Pro hisce inusitatis electarijs medicus doctus facile cholagogum Rosarum decocto conuenienti siue è myxarijs siue è Psyllo, Fumaria, Epithymo, Eupatorio, Rhubarbaro, & huiusmodi pro ratione & naturâ morborum, diluit.

De Diaphanico, id est, Antidoto e Palmulis.

Diaphanicum à Dactylis nomen accepit, vt Empl. Diapalma, Diaphanæm, Dicalchæos. Hæc autem compositio ad euacuandos crassos humores facta est, quia in frequentissimo

usu est, erit hoc modo paranda.

Rec. Dactylorum mundatorum à filis, & infusorum cum vino albo per triduum lib. 1. drach. 4. Pincatum cum aqua Herdei decocturum, drach. 40, Turbit. drach. 35.

Amygd. dulcium mundatarum, drach. 30.

Scammonij, drach. 12.

Zinziberis,

Piperis longi,

Cinnamomi,

Macis,

Galangæ.

Fol. Ruta siccerum;

Anisi,

Feniculi,

Seminis Pastinacæ agrestis, vel domesticæ, ana.

drac. 2. f. fiat Pul. qui excipiatur Sympox

Melle & infusione Dactylorum parato ex

arte. Cinnamomum omnium humorum vitia emendat.

Hæc Compositio paucis immutatis optima erit ad pituitam crassam & lentam euacuandam. Dies poterat ex Turbit, vt melius intelligatur. Dactyli sunt eligendi recentiores, qui non sunt immaturi: nam maturi habent etiam astrictionem sufficientem ad Scammonij correctionem, & immaturi nimium constringunt pro compositione pituitosa: Nam, vt docet Gal. 1. ad Glauc. Absinth. quod calidum & sicum, non conuenit in pituitosis affectibus ob astrictionem. Aliud enim est medicamentum ad crassos crudosque humores, aliud ad tenues parare. Scammonium, vt dictum est, castigari debet in biliosis medicamentis. In pituitosis verò satis est, si aliqua sint lenta, vel crassa, quæ eius tenuitatem castigent, & ob id maturos Dactylos volumus, quamquam Mesia aliter videatur imprare secundum interpretationem aliquorum, (a) per stans intelligentes immaturos. Nam immaturi ebolicum dolorem auerent, non euarent, neque etiam ob morbum ebolicum quem curare duxit, in Aceto macerare oportet: Acetum namque constringit, & morsu suo iustitiam laedit dolentia: Quare in Vino albo macerandos Dactylos iubemus triduo, & in vase vitreato, ne ex arte, aut alia quapiam materia aliquid mali contrahant. Si autem molles sint satis, non erit opus tanta maceratione. Si duriores, diutius macerentur, Quod si in aqua & Vino cadu macerentur, citius mollescunt. Contunde diligenter, & per cribrum medicum, cum amygdalibus transmiste. Postea accipe Mellis lib. 6. Aqua & Vini infusis Dactylorum lib. 12. Decoquantur & desuperentur, donec reliquantur lib. 3. & ad consistentiam mellis. Reliqua rasa & puluerisat

*Mundata -
rum & infusa -
rum.

Rond.

pituitisata misce, (b) fiat confectio.

*“Daucus Cre-
tus hedysa-
lis reperitur.”*
(a) L'Obel.] Phœnicon Cirrhon]. legen-
dum Cheyron, id est, ē Chayero oppido, non
Cirrhon siue siluionum, vti male ē Cizco ver-
tit Syluius, nonnullas officinas sequūtur.

(b) Antuerpiani quidam auari & tordidi
Pharmacopij infusores Materialitruē. sole-
bant diu infundere aceto putres Dactylorum ple-
nis vreis ad præparationem vilis & sordidi, à
quo cauendum, Diaphœnici; viliq; distrahe-
bant Pharmacopeis exieris, vti pleraque alia
medicamenta, additis Turbith fragmentis, &
sordibus cultello incisib; & abrafis. Hac itaq;
ratione artem perdidierunt.

L'Obel.

Postea accipe Mellis lib. 6. decoquantur &
despumantur, donec remaneant aut relinquantur
libræ tres.] Longa illa codura resoluunt
Mellis & infusionis Dactylorum vires.
Præstaret exparçiose, præcisioque magis Da-
ctylorum infuso, vt non multum iugis super-
sit, nūius Mellis in duplici vase decoquere, &
purgare, deinde percolare; alioqui Mel in spu-
riam, & auras abir. Pharmacopœi Insulani
plerique Gallobelgæ, & alij nonnulli infusi-
tā & tenebricose errore solent lib. 6. Mellis des-
pumati, pro tribus libris ponere; non ani-
maduertentes libras sex à Meseo præscriptas,
despumando & coquendo ad libras tres reda-
ctas esse: id quod Medicis nescijs importit, qui
Medicaminis duplo cuncta mole, integras vn-
cias, pro semuncia in singula purgationes præ-
scribere coguntur. Quidam verò Scammonij
pondus variant & augment, Alij vncij. ij. alij vncij.
ij. imponunt, non sine ægorum læsione:
cauendum enim à nimium Diagrediatris aut
Scammoniaris: quamuis Scammoni malignitas
Amygdalis & aromatibus mitefcatur.

*In hac compositione non conueniunt auctores:
Alij enim Penidas ex aqua Hordei paratas, alij
verò Pineas legere volunt, id est nucleos Pineæ.
Legendum tamen videtur, Pinearum, quia magis
conueniunt adpituita preparatoria: detergant
& expellorant. Et quemadmodum Amygd. in-
iugere insit, sic censeo nucleos * Pini intellexisse.
Auger suspensorem, quod in quibusdam exempla-
ribus legitur, ciliolum in aqua Hordei, melini*,
infusurum in aqua Hordei. Amygdala & nuclei,
ne friguescant, in aqua frigida macerantur: sed
hic, vt magis detergant, in aqua Hordei mace-
rantur. Quod si quis Penidas velit admiscere,
non multum peccabit: nam Penidia, si addita fa-
rina, vel decoctione parentur, detergant leniter.
Lignum alec, quia verum non affertur, habetque*

*saporem ingratum, visum est illud asserere. Quod
si quis Santalum Citrinum, vel Cinnamonum ve-
lit substituere, magis gratum reddetur. Pro* Da-
co, semen Pistinaca agrasiis, vel domestica; qui-
mus, quia succedaneis sunt. Alit despinam, dum
& decoquendum, in ea aqua & Vino, in quo Lo-
stylli fuerunt macerati, vt si quid virium depa-
uerint in infusione, restituantur, efficaciorque erit
hoc modo paratum, eritque medicamentum pitui-
tisum, & cholicum dolorem sedans, quia pituitam
soluit, & non habet ea astringentia, neque Cassi-
am, qua terminare excitare posset, & in diuturnis
morbis officia-ssimum medicamentum. De Tur-
bith hoc tantum dicam, quod radix est cineritia,
& alba, pituitam soluens crassam, neque amara,
vt Agaricus. Quod si quis vero & bono Turbith
destinatur, Agaricum infusum in Melle substi-
tuit potest: nam ob Cinnamonum, Galangam, Aai-
sum, Piper, Fanic. & Daucum, pituitam crassam
soluet, & à longinquo purgebit. Nulla compositio
est in Meseo, quæ sit cum ista comparanda, immo
quia nulla medicamentata, quæ molem augent, reci-
pit, & qua recipit, odorata sunt, ventricque & oris
non ingrata. Respondet quodammodo Iodo ma-
iori, sed in alia forma, Arabico more descripta,
pituitosis medicamentis astringentia, addita sunt.
Recipi enim succum Arj, Fænc. Cotoacorum,
Graanatorum, & multa odorata astringentia, vt
Rosas, Santales, & alia multa, quibus posset ca-
uere. Hæc medicina ad pituitosis morbos contem-
ni esse potest; nam ipsæ medicamentis laxan-
tibus constat, Scammonio, scilicet, & Turbith.
Quod si quis velit vti in articularibus morbis, ita
meatque nunciam humorum conturbationem, ad-
dat Myrabalan. vel Rhabarbarum in substantia.
Illa laxabunt, & constringent. Sed in articulari
morbo cum materia defluit, non oportet medica-
mentis fortioribus mouere. Idcirco hæc vsui erit
tempore, quo consistit fluxio. Tota composito
esset lib. 5. & vncij. 11. Dosis ab vncij. ad
diach. 6.*

L'Obel.

V Sitati Diaphœnici in forma solida, incerti
auctoris, Dactylorum dosis longè mi-
nor est ad inhibendam Scammonij effrenatam
vini, & robur ventriculi fovendum; Diagridum
ideo auctor pro Scammonio posuit.

Eius descriptio apud Cordum.

Rec. Dactylorum infusorum vt diximus
modo N.º 6.

Seminis Liguistici, drach. 2,
Nucleorum Pineorum, siue Strobiliorum,
Anydalarum dulcium, ana. drach. 15.
Turbitich. drach. 12,

Diagredij,

* Causa i. ran-
cidit.

Diagredij, drach. 1.
Sacchari candi, vnc. 2.
Piperis longi,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Macis,
Galangæ tenuis,
Xylo aloes,
Foliorum Rutæ,
Anisi,
Fœniculi,
Dauci, ana. drach. 1.

Sacchari, lib. 1. Fiat confectio in tessellis vel rotulis aut morsellis. Huius dosi minor erit liquido Diaphenico, ob Sacchari minorem quantitatem.

Quid hic sibi velit Coudebergius nescio, quandoquidem minori sacchari basi, delicatioribus morosisq; hominibus, minima dosi hz. cathartica exhiberi possunt.

De Indo maiore.

Indum minus subiunximus, non ut dispensetur, sed ut videant non multum differre à Diaphenico: & quibus abundot potius deteriorem confectioem faciant quam meliorem, nempe illis astringentibus additis, & copia attenuantibus, quæ augent molam, & calorem eius.

Cuius permixtio talis erit.

Rec. Cinnamomi
Caryophyl.

Spica Nardi,
Ros.
Cassia lignea,
Macis,
Cyp. ana. drach. 4.
Santal citrin, drach. 2. f.
Lingus Aloë,
Nucis Moscibata, ana. drach. 2.
Turbut electi, drach. 30.

Lignum aloës & succus Cydoniorum non conveniunt compositi ont Indi maioris:
Sacch. pensidari, drach. 20.

Galanga,
* Heylid est Cardamomi, Asari,
Mastichis, ana. drach. 1. f.
Diagredij drach. 12.

Omnia cum oleo Amigd. fricentur, deinde accipe,
Succi Cydoniorum,
Succi Granatorum,
Apy.
Fœnic. defacatorum, ana. lib. f.

Cognoscendum est ad spissitudinem, & consuetudinem speciebus. Pro Indo maiore & minore Diaphenico etiam utendum consue. Quod si velis magis attenuare, dissolvit in aqua petrosi vel adde dissolutum syr. & Stachydis, vnc. 1. f. pro dosi, & omnino similis erit, & eadem præstabit.

* In minore Elect Indo Heyl semel additus: In maiore autem Heyl quod Cardamomum significat; Heyl & Cardamomum tanquam varia coniungunt: eoque Cordis habet utriusque Cardamomi, id est maioris & minoris, sed alterum sufficit.

Confectio hamech.

Confectio Hamech non est prætermittenda, utilissimum enim est Medicamentum, ad icheres humorum praves evacuandos. Sed ratio est componendi docenda: non enim sine magna molestita & difficultate paratur.

Rec. Myrobalarum Citrinarum vnc. 4.

Myrob. Kebablarum,
Nigrarum, ana. vnc. 2.
Rhabubarum,

Agarici,
Colocynthidis, } ana. drach. 13.

Polypodij,
Abieschij, } ana. vnc. 1.
Thymi,

Sena.
Violarum dra. h. 15.

Epithymi vnc. 2.

Anisi.

Res. resenter sicca: ad odorem, apertionem & corroboracionem,

Fœniculi ana. drach. 6.

Succi sumaria lib. 1.

Prunorum N° 60.

Passul. mundat. trum vnc. 6.

Macerato dies quinque in Serri lactis sufficienti quantitate in vase vitreo strili oris, & obliquo. deinde serviant, una aut altera obulsiōe: fricentur & colentur.

Col. adde Ciss. fist. purgata vnc. 4.

Tamarind. vnc. 5.

Manna vnc. 2.

Peroque ana. Mell. spissitudinem cum lib. 1. f. Sacch. & vnc. 1. f. Scamory. Poliremo adde Myrob. Citrinarum, Chebul. & Ind. ana. vnc. f. Bellericarium Emblicarium, Rhab. Seminis sumarie ana. drach. 3.

Anisi, spica Nardi ana. drach. 2.

Hec compositio videtur nulla arte composita, & contraheremata à Gal. Mesue, & alijs tradita: Nam insimulantur dentius & concoquantur,

Omnia ista
sin plura re-
dicamenta ex-
plicentur in
Aduersariis
Stirpium

itur, maximè inæqualia, ut Polyp. Myrob. Agaricus, Colocythis, firci Viol. Ref. Epith. Thymus, Rhab. Polypodium quoddam coquendum & macerandum, Epith. Rhab. non diu, ne vires resoluantur, ut neque flore. Quare videntur illa infundenda diutius aut coquenda solum, quia duras ut facilius eorum vis & succus eliciatur: ea verò quæ asstringunt magis quam laxant, ut in Myrob. & Rhab. experimur, nam facultas laxans, quæ sita in igniori parte, evanescit longa coctura, & asstringens magis adaugetur, quare minus diu infundenda aut coquenda. Quamobrem nos hoc modò parabimus. Polypodium in sero lactis Capra, vel Asina maceretur per 24. horas, cum Passulis & Abfruthio, ac decoquantur: Nam diutius servatum serum putrescit. Deinde miscantur semina Ficuntli, Agaricus, Colocynthis, Thymus, Epith. Sena, Viola, Rosa, insufficienti quantitate firi, id est, in tribus lib. bulliant leuissimè, fricentur manibus, & coentur. Colatura adde lib. 1. s. sacch. Coque se à ad ipsitudinem Mellis, postea adde Succum fumaris lib. 1. Deinde dissolve Cassia, vi. 4. Tam. maceratorum in una decoctionis parte vnei. 5. Mell. Viol. vnc. 2. Reliqua omnia in pulverem redacta incorporentur. fiat decoctio hoc modo. Succus non decoquitur, neque alia, quia paucam aut nullam sustinent decoctionem. Quod si quis Myrob. conficatas in succo Rosæ & Tamarindos coquere velit, modo non diu cognantur, non repugno. Sunt enim laxantes: si decoquantur, inutiles redantur. Hac compositio efficacissima est, quare in minori quantitate danda est. Quod si cum decoctione Mercurialis detur, serosa magis purgat. Colocythis & Agaricus in pannu liganda, vel per colam colanda, ne Agarici aliquid & colocynthis descendat. Aliud animaduersione dignum de Seri decoctione. Serum ad purgationem cûgi debet quod magis est acre vel aquesum. Utile est Chameleum, ut & Asinicum. Multum feri habent, & laxant, & detergent magis. In horum penuria caprinum, quod acre est (omne serum minus laxat) & bene separandum est à lacte: nam caseus substantia sistit, & non leuat, idq; citius coctione longa, quam stiribus Chameleontis separare oportebit, & vter dum postea, Prohibemus ut per quinque dies macerentur: nam Passul. & serum ipsam confectionem acidam redderent, & putresceret. tandem que med. camenta captrumperentur. Sufficit igitur macerare 20. horis & diutius coquere.

Antidotus sine Confectione Hammech apud Mesuem.

EX veterum antidotus resistent hanc compositione neoterici ob insignes vires ad omnes morbos ex pituita salsa, flaua bile, adustis, que humoribus ortos, & prauos eorum ichores; scabiem, impetiginem, elephantiasim, Iulæm Veneream & quævis cutis & endothæ vicia. Inprobandi tamen sunt qui hæc compositione vtuntur in pituita crassa euacuanda ob Myrob. balanos, quæ niagis impingunt materiam lentam, ex Galeni & antiquorum sententia. Sed quia hæc compositio, ut scitè monet Rondelletius, sine arte composita videtur: & contra theorematia a Galeno, Mesueo & alijs tradita: nam infunduntur diutius & coquuntur maximè inæqualia, ut Polypodium, Myrob. balani, Agaricus, Colocynthis, Rhabarbarum, &c. lubentius parandi rationem. cum Rondelletio explicare. Quid enim opus quinque diebus in macerando Polypodio ex sero lactis? cum nostra atas ipsi Guaiacum lignum durissimum, eiusque cortices & lirusescendi 24. horis aqua tantum feliciter macerat. Scitum autem diutius asseruatum faciliè accessit, situm ducit & putret. Ocho vel 10. horarum Rhabarbari infusum præterquam in alui fluoribus ventriculi & intestinorum imbecillitatibus, lubrificatibus & leuitantibus à bile alimentis permixta, vbi solemus exhibere fortiori Rhabarbari expressionem & ipsum Rhabarbarum in tota substantia commendatur à perbonis medicis, ne vis astringentia eliciatur. Hæc monuimus, ut nonnulli & nostri Pharmacopœis sint paulò diligentiores in parandis pharmaceis ediscantque rationem componendorum medicamentorum, quam ipsi modum faciendi vocant.

Rec. Myrob. balanorum flauarum, vnc. 4.

Cepularum Indarum.
Rhabarbari,
Epithymi, ana. vnc. 2.
Agarici,
Colocynthis,
Polypodij quermi, ana. drach. 18.
Absynthij,
Thymi,
Sena, ana. vnc. 1.
Violarum, drach. 15.
Anisi,
Rosarum,
Fœniculi, ana. drach. 6.
Succi fumaris,
Mercurialis, ana. vnc. 10.

Pruna

Prima numero sexaginta

Vuarum passarum à vinaceis purgatarum, vnci. 6.

Polypodium leuiter contusum, cum passulis, Absinthio, Prunis, Fomiculo, & Aniso 24. horas madefactum ex feri lactis Asinini vel caprini q. s. in vase oris angustii obturato, serueta aliquot leuionibus ebullitionibus: deinde addatur Colocynthis, contusa & forficibus incisa cum Agarico nodulo laxo excepta; Thymum, Epythium, Myrobalani, Sena, Viola, Rosa & Rhabarbarum macerentur 1. horas, & vnica seruetaione parumper decoquantur, addito suc. defixato Fuma. & Mercurial. quia pauci aut serè nulli subsistunt decoctione. Cola lenitet exprimendo. In colati portiuncula dissolue Mannę vnci. 2. & coletur. Coque igne tantillo colati reliquam portionem, addita leuilibra Sacchari boni vsque dum Mellis crassitudinem habeat. Mox vbi retrixit, repenti adhuc Syrupo misce pulpę Cassię vnci. 4. & pulpę Thamat Indorum, vnci. 5. eodem decocto extractorum, Mannam & Scammonij præparati vnci. 1. s. paulatim inspergendo puluerem hunc, Myrobalanorum fluatum, Cepularum, Indarum, ana. vnci. f. Bellericarum, Eniblicarum, Rhabarbari, Seminis fumariz, ana. drach. 3. Seminis Anisi, Spicz Nardi, ana. drach. 2.

Pulueris Myrobalanor. & Rhabarbari, &c.] Improbatur merito Plantius duplicem Myrobalanorum & Rhabarbari vsum; decoctorum & infusorum, videlicet: Deinde tritorum imixtionemque. Mesuz attamen ob maiorem efficaciam, ad ichores melancholicos exustosq; humores euacuandos, Myrobalanos omnes cum Rhabarbaro in puluerem redacta aut substantia, infusioni coniunxit; quamvis ex Rondellij authoritatibus & rationibus, plus satis sola Myrobalanorum sufficiat infusio. Experimenta autem docet Rhabarbari, Senę, Myrobalanorum, Mechioacę, & quamplurimorum puluisculum mulieribusq; etiã notissimum, plus aut æque purgare, drachmę vnus ponderis, ac triplicis & quadruplicis ponderis Infusorum, decoctionumq; Tanien vbj penetrabilibus obstructionsque referantibus medicamentis opus est; plus iuuant Infusa aut leuia decocta, pro cuiuslibet simplicis medicamenti natura, partium tenuitate, crassitie; quia sæpe experimur decoctum vnus aut sesquial-

ciz Senę ex Mesuei præscripto, & optima artis lege, plus iuuare, mitiusque sine vllis torminibus à remotis lotis purgare quàm drach. 1. & sesquidrachmę pulueris aut vncię semissis infusi, plus minus, Senę siue decoctura, quę ventris & Stomachi torsiones & erosiones gignit, ob eius crudum flatulentumque crassum succum, & crassamentum, visceribus noxia. In huiusmodi infusis sine perneccellaria artificialique coctura, scoli quidam Pharmacopœi, medicis insciji, imponunt & peccant imprudentia, Senę parcimonia, leuifusile Senam & similia medicamenta simplicia aut composita macerantes, agrorum iactura pernicioia. Myrobalani quia vehementius coctę insigniter obstruunt; aliquot horis unacrantur & oleo Amigdalino illinuntur.

Triphera Persica, ib est, delicata.

Tripheram Persicam post confessionem Hamech collocauimus, propterea quod non multum sunt dissimiles in euacuando, nisi quod confessio Hamech ventrem laedit ob Diagre dum, & Colocynthidem; Triphera vero ventrem refrigerat, relaxatum confirmat, iurgat serè omnes humores cum astrictione & refrigeratione. Tryphera multa sunt species, sed hæc inter alias vsurpamus, quam utile est paratam habere: Laxat cum & constringit. Hec tamen mutati, vt confricentur Myrobalani oleo Amigdalino dulci, si timeatur astrictio: & Antispodium vocatum, non Spodium pessi. Antispodium autem ex fructu aut arbore constringente paratur, vt ex ramulis Myrthi, Olæ vel Olenstri, vel Malis Cydoncis. Videtur hæc compositio nimium resiccare; sed medicamentum ad humidos intestinorum affectus institutum est: hæc tamen siccitas Cassiã & floribus Violarum temperatur, castigaturque si sufficiat quatuor seminibus frigidis maioribus, si quis Saccharum rubrum vel Mel pro Manna in illa decoctione ponat, medicamentum non minus efficax erit; sic nec si quis pro Rhabarbaro, Sacrum Rosarum ponat: pro vniuersa quantitas nihil potest, vel nihil aliud quam Mel prestare potest. Detergit e nim leuiter, quod Mel violarum vel Rbodamel simplex potest, maiore pondere.

Tryphetarum differentia.

Tryphetarum variz sunt descriptiones. Quę Galeno ascribitur apud Mesuem, recipit multa quibus Galenus nunquã vus est, vt Moschum, Ambar, Cayophylli, Nux myristica,

rística, Macis & Santala.

Tryphera magna Nicolai cum Opio paratur & sine opio, sed cum opium aufertur, adimenda Hyoscyamus & Mandragoras, cum non minus sterilibus mulieribus aduersentur quam Opium.

Ett & alia Tryphera minor ad differentiam maioris ex arte Phenonis. Item Tryphera moschata Mesuz &

Saracenicæ duplex } Mesuz
& Nicolai,

Tryphera Persica.

Trypheram Persicam Mesuz, quia apud multos vñ recepta & à medicis Rhotomagensibus & Rondelleto comprobatur in refrigerando ventre, eodemq; relaxato confirmando roborando; omnesq; humores ferè euacuando cum astrictione & refrigeratione, sine vlla ventris lésione, retinimus; delicatis & imbecillis tutiorem futuram quam Antidotus Hamech ob Diagredium & Colocynthida: quamvis validiora medicamenta misceant cum cum alijs in pauca quantitate exhibita. Sic enimpatur.

Rec. Succorum Solani,
Endiuiz satiaz,
Apiz defæcatorum, ana. lb. 2. aut q. f.

Succi Lupulorum. lib. 1.

Prunorum Damasceborum numero 50.

Violarum recentium,

& Ros. recentium, ana. vnci. 3.

vel drach. 6. Succi penuria Rosarum recentium siccarum,

Foliorum Senz,

Myrobalanorum Citrearum, Cepularum,

Indarum confri. atarum in oleo amygdalino dulei. ana. vnci. 2.

Agarici, vnci. 1.

Castiaz, vnci. f.

*Epithymi vnci: 5. id est, drach. 40.

Spicz Nardi Indicz, drac. 3.

Feruefac paulisper,

cola & incolati dimidio dissolue pulpæ

Thamar-Indorum. vnci. 3.

Pulpæ Castiaz, vnci. 4.

Mannæ, vnci. 1. f.

Io-sacchari siue sacchari violati, vnci. 2.

Alteri colati parti adde sacchari optimi, vnci. 36.

Aceti boni, lib. 1.

Coquantur igne leuissimo, & supradictis commisceantur.

Deinde adde sequentia in puluerem redacta,

Rhabarbari selecti, vnci. 2.

Myrobal. Citrinarum. vnci. 1. f.

Indarum,

Chebularum, ana. vnci. 1.

Bellericarum,

& Emblicarum, ana. vnci. f.

Seminis fumariz,

Trochiscotû Diarhodon,

Macis,

Mastiches,

Cubebarum,

Spodij vel Antispodij & Myrto vel Cydonio,

Santalî citrini, ana. drach. 2.

Seminum Cucurbitæ,

Citrulli,

Melonum,

Cucumetis mundatorum, ana. dra. 2. f.

Anisi, vnci. f.

Spicz Nardî, drach. 2.

Tenuissimè trita inuoluantur oleo violato, & fiat omnibus mixtis electuarium artificiosè.

* Pro drach. 4. Epithymi, ut in veteri exemplari legitur Cordus autem Antidotarum Florentinum & alij vñ nulli drach. 40. legunt. Succorum autem præscriptorum, lib. 1. Quæ quantitas Succi large minor est & superatur ab omnibus huius medicamenti simplicibus: adde quod calidior faciet eius operatio, & si c. ingredièntia vix caperent una infundendi debent, eoque quidam decoquant & transfundunt in balneo occluso. Syrupus ex Epithymo Mesuz carum ex Epithymo tanquam præcipuo agente drach. 20. tantum Epithymi primo loco habet: & eoque si carum. 4. pro drach. 4. sufficere videbitur, per nos locat.

Tanta multisaride est huius Tryphera Persicæ plerisque Galliz, Germaniz, Belgij, Angliz, & Italiz locis vñtatissimæ, in ponderibus & mensuris varietas & summa opinionum ambiguitas, ut sæpe nesciant perboni Medicamentarij quid sint æchri in concinnando, parandoq; hoc medicamine. Nicolaus Præpositus in initio & Antidotarium Florentinum, Succorum Solani, Endiuiz, Apiz, ana. lib. 1. habent. Lupulifugum omisit Præpositus, quem Florentinus non neglexit. Alij melius Succorum Solani,

Endiuiz,

Apiz, ana. lib. 1.

Succi Lupulorum, lib. 1. legunt.

Nicolaus Præpositus, Antidotarium Florentinum, Adolphus Occonus & Ioubertus drachmas tres tantum facilius errore, pro vñci vñcijs tribus Violarum siccarum aut viridium apposuerunt. Præpositus & Florentinus, Rosas neglexere. Deinde post vnci. 2. Folliculorum Senz, vñciam vñam Agarici,

Quinquaginta

Quinquaginta Pruna Damascena, (in: er-
posita vncia umidia Cassia,)

Myrobalanorum cutearum,
Kebularum

& Indarum, fricarum

oleo Amygdalino dulci singulorum vnc. 2.
aut Violato,

subiunxerunt. *Corduran tanc, Rondelletius*, &
Antidotarium suè Dispensarium Florentini
Medicorum Collegij, dracl. 2. solum habent,
eum Spicæ Indicæ drach. tribus. At *Oscornus*
vnc. 2. esse legendas asserit, & Succorum om-
nium ana. lib. 2. legit.

Quidam Epithymū, drach. 4 tantum: Sed
plenq; omnes drach. 40. siue vnc. 5. addidere.

In re diffusionis plena, quid agendum? vti-
lis memor sub pectore reconditi *Rondelletia-
ni* consilij, in suis Antidotarium prælectioni-
bus publicis; eius hic vestigia, sequenda omni-
nino si uiderem, investigatis perscrutisq; qui-
bus hæc Triphera & huiusmodi medicamina
opitulerent morbis, ex pollicitationum in-
scriptionibus: Solebat siquidem *Rondelletius*
peritæpæ expositione sui medicamenti compo-
siti à facultatibus, in confusa adeò plurifaria o-
pinionum diuersitate, initiari; deinde perpen-
dere num ingredientia suppleia medicamenta
possint explere, satisfacere & stare promissis.

Hæc Compositio tota ferè Myrobalanorum
generibus constat & Rhabarbaro, eademq; le-
ge qua Hamech Antidorum, duplici Myroba-
lanorum pondere, infuso nimirum & puluis-
culo, dotata.

Tripheram paruan eongenerem statuit
Athariis libro de Medicamentorum com-
positione, quam in tres pluresq; differentias,
pro morborum causis & essentijs diuisit: cuius
verba usurpare auctoritatis & exempli causâ,
lubuit; quæ sic habent:

Parua Triphera diuisa, prodest interaneo-
rum doloribus, ac stomachi, imbecillitatib;
eiusdem ab humore contactæ sanitatem tue-
tur: estque ad multa alia perquam utilis.

Corticum Myrobal. Cebul.

& eius vice, si velis, singulorum
Indici, partem v-
& Bellefizis, nam.

& Embelezis,

Tusa & cinis, misceto cum Rosaceo o-
leo, & cum Melle despumato conditum ser-
uato. Potionis modus, duella ad tres vsq; Sex-
tuas, exegit aqua.

Qui voluent perfectè interancorum villi-
tati consulere, ut ea à nox & deiectionum asse-
rat. & ab iniurijs earundem vindicet, Bdellij
& casij portionem addat.

Si sanguine euacuando, auxilium adferro
placet; Guinnis totrefactæ partem adijcias.
Cæterum ad commoditatem imbecilli Sto-
machi, & inferuarum partium correctionem;
Rosarum & Mastiches portionem vnam; A-
misi & Caryophyllorū dimidiatas portiones
adiunges. Contra Cordis micationes & vi-
bratus, Xylaloon adhibebis. Aduersus fe-
nistræ valetudinem, quam atra bilis creauit;
pars Epithymi adponitur. Si Pituitæ de-
iectionem moliri instituis; Alypum, id est
album Turpetum adhibeas. Aduersus statui-
umurgentium molem, cruditatesque ut in-
teant confortiam, adhibeto Zingiberis & Ga-
langæ singulas portiones: ieni sitæzium In-
dicum, Capficum, Pip. longum, teuue Cinnä-
momum, singula instar dimidiæ portionis, &
communem redditur. Non desunt Medici,
qui, ut venustorem exhibeant colorem, Cro-
cum adijciant.

Delicam quandoquidem Tripheram Per-
ficam dixere, quantitas tamen illa Myroba-
lanorum pulueris singulis exhibita dosibus,
nulle excepta; grata ori, palatoque in delicijs
esse nequit: imò potius mole molesta molli-
cellis delicatisque hominibus erit: quoniam
modum omnis ferè Officiaria, pinguis *Mi-
nerue*, Medicaminum vulgarissimorum com-
positorum Cornucopia. Quapropter hanc
Tryphera Perficæ antidotum, hoc qui sequi-
tur modo, Chylarij siue succationisculæ instar
paratam, longè præferendam censuerim: E-
adem, parua dosi, præstabit, neque stomacho
aut visceribus iniecta erit, aut negotij facessere
quantitate sine mole poterit.

Præstantior probabiliorq; Tryphera
Perficæ parandi ratio.

Rec. Myrobalanorum Flauarum, vnc. 3. si
Kebularum,
Indarum, ana. vnc. 3.
Bellericarum,
Emblicarum, ana. vnc. 5.

Trita aspergantur oleo Amygdalino, aut
violaceo dulci, deficcanturq; & ligantur, ad-
ditis Rhabarbari, vncis duabus,

Spicæ Indicæ, drach. 5.
Agatici selectissimi lima detasi, vncia vna.
Epithymū vnc. quinque, siue drach. quadra-
ginta.

Quatuor seminum frigidorum maiorum con-
tutorum, singulorum vncia vna.

Maes,

E

Trociscorum

Troiscorum Diarhodon,
Cubeborum,
Santal albi aut rubri, ana.drach.2.
Succi Cydoniorum, (pro Antispodio) vncij
duabus.

Infundantur omnia in balneo Mariæ & circulentur, ex artis præceptis, oclusa duobus organis vitreis, quibus auiifabri aquam fortem asseruant; vno vase aromatibus dicato, altero verò, cæteris; affuso infra scripto decocto.

* *Diachartamum efficitur: acui est in Podagra.*

Rec. Succorum Solani
Endiuiz, } defæcatorum singulorum, lb.2.
Paludapij }
Lupulorum } aut q.s.

In quibus decoque ad molliem lento igne Pruna Damascena N°. quinquaginta,

Adde poltea folliculorum Senæ, vnci.2. vel vnc.3. aut vnc.4. foliorum Senæ confusorum,

ana. vnci.3. vel vnci.4. aut violarum recentium, }
& Rosarum recentium, }
Cassiaz, }
Anisi, } ana. vnci.1.

* *Elec. de Citro, febribus pituitosis magis accommodatum est.*

Effrueant vnica aut duabus ebullitionibus.

Infusa calidè peritent diem & noctem; deinde colentur & exprimentur. Expressio affundatur vna pars liquoris cum Myrobalanorum generibus, & cæteris supra scriptis Epithymo, Agatice, spica & seminibus frigidis maioribus. Circulentur, addendo, circulatione vtriusque; vitrei vasis peractâ, colaturæ & expressioni Aceti vini peroptimi, vnci.12. Deinde in vna huius liquoris per colum purgati parte, infunde,

Thamar-Indorum. vnci.3.

Cassiz & siliquis situlifuz extractæ, vnc.4.

Hic & siliquis extra. dæ legendum, quia dicitur postea; colentur & a grauis muuentur.

Mannæ vnci.1. per cribrum cernentur.

In alia colati parte. dissolue Sacchari optimi vnc.16.

Sacchari violati, vnc.12. Condiuntur & vniuntur omnia simul vase lapideo aut fictili, in cineribus calidis, vel molliissimo igne. Refrigeratis omnibus, quia adureretur & in vnum coiret, inperge pulueris.

Mastiche Chiz.drach.2. Instat Elec. uarij aut concreti mellis redigantur.

Docbo aliàs maiora, cum hæc grata fore intellexero: ingratis enim inferuire nefas: sciretamen non indignum Medicamina, & materiam medicam, agnitis morbis, morbificis; causis (quicquid multi effutiant) medicatricis artis arma esse, nonsecus ac Nervus belli, vtfestur, Pecunia.

Elec. de Citro solutini Monspeliensium & Rondelletij emendata descriptio.

In nostris offic. dispensatur Elec. uarium in forma tabellarum quod efficitur respondet * Diachartamo, vocaturq; el. el. e Citro solutinum, ad differentiationem non solentis. A Diachartamo non multum differt, nisi quod hoc pituitam crassam magis attrahit ob Turbitib. Aliero illorum carere possumus: sed quia est apud nos in maxime usu, & castigata à Domino Falcone, nolui ego prætermittere. Substitui post in locum Diaturbitib. essig. medicamentum purgans ex cortice Citri, Scamoniæ, & Turbitib. compositum à recentioribus. Elec. u. de Citro compositum ad euacuandam pituitam bile permixtam, non recipit multum crassæ & adstringentiæ: quare in pituitosis * febribus non erit reijciendū. Recipit pul. diatragacanthi frigidi cum diachartamo, & carnem Citoniorum, & alia, que pituitam detergent; alia, que attenuant, & adiuncturas deducunt, quare in morbo ariculari Diachartamum erit ex usu: hæc verò in morbo pituitosis, si sine affluxu sint. In eductione pituitæ crassæ semper aliqua humida sunt permiscenda, ne nimium desiccata pituita educi nequeat. Compositio talis erit.

Rec. Conferuz Corticum
Citri Melle conditi
Violarum,
Boraginis,
Turbitib.,
pul. Senæ.
Pulueris Diagredij,
Pul. sp. Diatragacanthi frig. ana. vnc.12.
Zingiberis, scrup.3.
Anisi, drach.1.1.
Sacchari, vnc.24.
Misce fiat Elec. uarium ex arte.

*Hoc Medicamentum * Citri corticem recipit pro materia, & medicamento ventriculum rescitente, & quia nimis astringit, cum Turbitib. magis conuenit, & in Morbis magis pituitosis non esset reijciendum, sed potius eligendum: quia hæc compositio ad pituitosam est, ad qua detergenda Mel est optimum & magis aptum. Conferua Bug. Borag. & Viol. magna visitate ponuntur, quia humida cum sint, siccitatem & calorem Turbitib. & Diagredij sua humiditate temperant, & prohibent, ne pituita exsiccatâ difficiliter expellatur. Nam, vi Gal. ait de pleuritide medicamentis, aliquod miscendum est medicamentum humidum,*

* *Cogit is Citro melle conditi in hac composit. aut magis accommodatum est de-tergendum.*

humidum, ne pituita exsicceetur in thorace. Pituitam eductentia profunt magis in forma pilulidg, propter longam moram, qua est necessaria ad pituita crassum, Turbith & Diagrid. ponuntur aquali pondera, quod nunc proba: Mitius esset, si Diagridum minori quantitate poneretur, ut potius inuaret operationem Turbith, quam suam, nisi bilem traheret. Hoc Medicamentum magis pituitosum est, quia si biliosum esset, non adderetur Turbith, quod crassam pituitam trahit. Sed quando trahenda est pituita crassa oportet inuaro actionem illam minima quantitate Diagridi, quod accelerat Turbith operationem: quare optimum erit, ut Diagridi vnc. s. tantum ponatur. Nonnulli Sacch. lib. 3. nos autem lib. 2. adiungi volumus, ne augeatur mole. Medicamentum efficacius erit, cum Diagridi dosim minuerimus. Repertur & alia descriptio, qua in hoc tantum ab hac differt, quod Conseruam Viol. non recipiunt, qua magis refrigerat & humectat, sed Buglossi. Sed hac differentia non est magna.

Ex hac compositione fieri potest Liqueamentum, quemadmodum ex Diacarthami Elettario sequenti Cnico-Liquamentum. Dosis erit drachmæ & vnius, quatuor scrupulorum, sesqui drachmæ, & robustioribus drachmarum duarum.

De Diacarthamo Elettuario.

IN forma secca sit Elettarium hoc, quod pituita purgat satis potenter, & recipit detergentia & pituita eductentia, & ad accelerationem, alia. quid Diagridi. Vis medicamenti nonnunquam tanta est, ut & inuictis trahat. Preparatur autem hoc modo.

Rec. Diatragacanthi. frig. vnci. s.
Carnium Cyoniorum vnci. 2.

Medula carib. vnci. 4.
Ginziberti albi, drach. 2.

Diagridi, drach. 3.

Turbith albi, drach. 6.

Manne graua.

Mellis Ros. collati, ana. vnci. 2.

Saccha. candi, drach. 6.

Hermodyllorum, drach. 4.

Sacch. in aqua dissoluti, q. s. fiat Elettarium in tabulis.

Hac compositio est Arabum, quia solent semper ad corroborationem ventriculi & hepatis aliqua astrigentia addere, vel ad impetum Diagridi & Turbith compescendum. Si Penidia ponerentur loco Tragacanthi, vel loco carniuum Cyoniorum, compositio magis communis esset ad omnes affectiones pituitosas. Hanc Compositio-

nem aliqui non intelligentes componendirationem vituperant, sed nullaratione, quod efficitur sit, soludigne mirantur. Sed istis respondebimus, Medicamenta fortia in minori quantitate assumpta esse debilia: Præterea non ammaducunt hanc compositionem factam esse ad pituita enacuationem, qua si a medicamentis sicioribus trahatur, propter exiccationem tenuioris partis, difficilimè enacuat. Ut igitur temperetur siccitas medicamentorum, adiuucent Diatragacanthum frigidum, & ut facilius purgetur, Mel & Saccharum ad deterfionem. Et quia hac compositio vultur in morbo articulari, addiderunt carniuum Cyoniorum. Sed multo melius esset Corticem Citri conditi aproposse, vel Daßylorum carnem collam & confusam, ut in Diaphanica. Desideratur in hac compositio parum Ausi ad flatuum dissolutionem: Nam hac laxantia & dulcia silent situs gignere, quantum Zingiber inciendo pituitam & calfaciendo id facere potest sed non sufficienter: Quare si Anisum, & Fœnic. addideris, solues cum minori molestia & lesione. Valer hac compositio in pituitosis, biliosis, & melancholicis est. Vbius: sed in melancholicis detur cum decoctione melancholicis purgante. Minus conuenit in biliosis. Chortami medulla pituitam purgat, & reddit corpus inuicem omnium obstruendum. Diagridum purgat bilem. Ponitur autem in medicamentis articularum ob duplicem rationem, tum quia facit medicamentum penetrare & operationem accelerat, tum quia morbus articularis ex sola pituita non fit, sed bili admixta. Quomodo enim possit pituita in articulo penetrare ac peruenire, nisi opem ferente bile? Quod si Diagridum penetret purgetque bilem, ideo morbus articularum conuenit. Prodest ad enacuationem cholera & phlegmatis: Purgat enim pituitam propter Turbith, & medullam feminis Caribami: bilem verò, propter Diagridum. Ad hec purgat humorem melancholicum, & ego multas febres quartanas curavi usu diacarthami potius, quam confessionis Hamechi, aut alio modo.

* Daßylorum melior erit.

Diacnicum cum Citro Solutum Phlegmagogum & Hydragogum, quartana febre affectis, ut si quid aliud, vtilissimum. Respondet Diacarthamo & Elettario Citro solutio Montpellierensium. Quia cecutius omnes in varia & confusa lesione Diacnici & Elettarij Citro solutini Montpellierensium; ex his duobus Elettarijs, unam fecimus, mentē sine intentionem, scopum & normam Rndelletij sequenti.

Hæc Compositio à Cnico siue Cathamo nomen accepit, tanquam præcipuo agente:

gente: merito igitur vnci. 4. Medullæ seminis Cnici. cum Rondelletio legendum, pro dra. 4. (vt depravatè habent omnia exemplaria) censemus. Ad hæc Cnici semen omnium viscerum obstructions reterat; colluviem præpellit, & pituitam purgat egregiè.

Rec. autem Medullæ seminis Cnici vnci. 4. vel eius loco fume seminis Cnici boni & pleni vnci. 13. drach. 6. scrup. 2. (ex scrup. autem seminis habetis G. 6. Medullæ) Contundantur, & fiat emulsiō ex aqua mulsâ, vel iure Gallinacel, vt docet Dioscor.

Confer. Coruscis Citri Melle conditi vnci. 1. f.

Confer. Violarum &

Florum Borrâginiis, ana. drach. 10.

Carnis Dactylorum vino albo niaceratōrum, vnci. 1.

Pul. specierūni Diatrâgacanthi frig. drac. 6.

Turbich. vnci. 1. drach. 6.

Diagredij vel Scamonij, vnci. f. scrup. 2.

Zingiberis albi, drach. 1. f.

Hermodaçyllorum &

Senæ, ana. drach. 5.

Spiritus Anisi, vel

Foeniculi Cocleariaria tria Mastiches, scrup. 4.

Mellis optimi despumati, vnci. 12.

Sacchari albi, vnci. 15. Dissoluatur in vnci. 1. f. succi Cythioniorum & f. q. aquæ mulsæ.

Terenda terantur & permisceantur.

Caryocostinum.

Diacnico subiunximus Caryocostinum, quia in frequentissimo vsu est apud quosdam Londinenses ad articulares affectus podagricosque dolores: materiâ tamen defluente; præstaret vti Rhabarbaro & Myrobalanis; aut saltem permixtis Hermodaçyllis, Scammonio, aut Diagredio & sequentibus.

Rec. Hermodaçyllorum, Diagredij, ana. drach. 6.

Caryophyllorum,

Cōlli,

Cumini,

Zingiberis, ana. drach. 3.

Mellis despumati ex vino albo aromatico triplum, id est, vnci. 9. Misceantur & fiat Conditum.

Vini vis, vti Mellis longa coctura resolutur præstaret vti duabus partibus Mellis despumati.

ti thollissimo igne affuso pauco liquore & Vini Passi aut Sapæ parte vna.

Electuarium e Succo Rosarum.

E Succo Rosarum paratur Electuarium bilem statim euacuant fortiter neq; admodum calfaciens, quod in forma Opiata parari potest, vel in forma dura & sicca. Et quia aliqui sicca libentius, quam humida accipiunt; optimum erit in formam tabellarum reducere, vt maiores consueuerunt. Huius medicamenti multa sunt descriptiones, etiam in eodem antidotario, ita vt in dubio sis Pharmacopola, quam debeat eligere: quare non erit præter institutum indicare, quæ omnium magis probanda sit. Alia enim est Nicolai, alia Mesue, alia Syluij, quæ est secunda Nicolai parum mutata. Sed nos illum secundam magis probamus: Alia Trallianij, sed euz descriptionem Nicolai petimus, quam aliorum prælegerimus & retinuerimus, danda est ratio, ne temere aut malo animo id falsum esse existimetur. Nicollis compositio, quia efficacior & parata facilius, ideoque à nobis eligitur: Illa vero Mesue maiorem quantitatem Trochiscorū recipit, qui nimium astringunt & simul alia talia habet, vt Galliam & Crocū, quæ nihil aliud efficiunt, quam corpus calfaciendo, febrem ac bilem accendere, neque hoc impedire possant Trochisci Oxycantha, id est, Berberis. Molem etiam augendo medicamentum reddunt imbecilius, vt maior quantitas danda sit aegro magno cum eius fastidio & sumptu. Altera quæ ad Syluium refertur, quæ parum ab illa Mesue differt, media est inter Mesue & Nicollis compositionem; ob id paulo melior, quod expinxerit Trochiscos de Spodio, & trium Sandalorū genera substituerit ana. drach. 6. ex Nicolai compositione minus accipiens. Crocum abiecit, Galliam Mesueam reliquit, sed eum Melle & Sacch. parandum docet, quod fieri non potest; Nam parum conuenire videtur Mel, quia hæc compositio ad bilem, non pituitam paratur: Adde quod Mel biliosis aduersum est. Præterea humidius redderet Electuarium nec posset in modum in formam siccam reduci. Denique moles eius aucta est multis medicamentis castigatoribus & corroborantibus, quibus non grauius opus: Nam Scammonij callosi, tenuisai & maltisai sitis ex succo Rosarum. Sandalis & Antispodis castigator: quare non est opus plura addere: molem enim augent, Nicolai descriptio talis est.

Rec. Sacchari solidi, Succi Rosæ ana. lib. 1. & vnci. 4. Omnium Santalorum, ana. drach. 6.

Spodij,

Spodij, drach. 3.

Diagredij, drach. 12.

Caphura, scrup. 1.

Caphura calida est & tenuium partium, quæ si pura est species est Asphalti: si spuria, sublimatio Mastiches. Nos vero hanc descriptionem sic castigamus. Pro Spodio Canna, vel Eboris, ponatur Antispodium ex malis Cotoneis, vel Myrtho paratum, ut docet Dioscorius capite de Antispodio: nam malum Cydonium aliquam habet societatem cum Diagredio, & illud Antispodium aliquam servat astrictionem, ad Scammoneij præparationem & ventriculi corroboracionem. Et quando illud ponitur, pro Diagr. Scammoneum ponere sufficit & effectuius erit. Caphuram expungendam censuimus, quia nimis tenuium est partium, & calfacit potius, quam refrigerat, quod inutile est ad bilem. Ingrato enim odore suo Caphura hic non convenit. Tenuitas verò partium in medicamentis siluentibus est fugienda: nam deducti ad cor, & per abditissimas ventriculi partes purgans mediocritatem, quod est ex genere viciuosorum. Præterea hac compositio plura rescicantia recipit, quæ ex accidentis rescindunt. Caphura loco Mastichem reposuimus, quia plus habet astrictionis, & minus est tenuium partium, & ventriculum inuadit. Quod si quis Gummi tragacanthi, scrup. 1. velis substituere, melius erit. Apud Trallianum reperitur etiam descriptio, ut docet Syl. in com. Mel. quæ non ad bilem, sed bilem & pituitam euacuandam, & articulare morbum facta est. propter Succum Ros. & Scammoneum. Recipe Piperis drach. 1. Agarici, drach. f. paraturque cum Melle hoc medicamentum, quod propter Mel, & Piper calidius est, quam oportet esse medicamentum laxans bilem, quæ calidissima est, & tenuissima, ut quæ diffusa in articulos. Hoc prudenter factum est, quod drach. f. Agar. addita, si ponetur drach. 2. bilem traheret, sine Piperis oportet esse. Quod si ad pituita attenuationem, oportet aliquid ut Zingiber cum Agarico esse, & in minori quantitas poni debet. Adde quod Zingib. magis quam Piper cum Agarico conueniet. Hac Compositio Rhodomet Alinarij est si Piper aseratur. In eodem Alexandro reperitur alia huius compositio descriptio, quæ ita sit:

Rec. Succ. Viol. vnc. 3. aut 4.

Scammoneij, vnc. 1.

Lactis Tithymali, drach. 2. (Scammoneum semper ponitur in compositioe, in qua sunt astringentia, non autem Diagredium)

Mellis astuci, drach. 1.

Hæc Compositio officinar est, & propter Lac Tithymali magis venenosa. Mel additur, quo ventriculus roborari possit, vel impetum & acrimo-

niam obtundere. Quare alla Nicolai omnia præponenda, quam correctimus, ut sequitur.

Rec. Sacch. solidi,

Succi Ros. ana. lib. 1. & vnc. 4.

Omnium Sandalorum, ana. drach. 6.

Antispodij ex Cotoneis, vel Myrtho, drach. 3.

Scammoneij, drach. 12.

Mastiches vel Gummi Tragacanthi, scrup. 1. f. vel vtriusq. gr. 15. aut 18, fiat Electuarium in tabulis. Seruetur in arca lignea, & loco seco. Est cholagogum forte, quo videntur in biliosis asfictibus, qui non sunt cum deflexione: nam si cum deflexione essent, tunc Rhob. adungere deberemus vel Myrob. & hoc in morbo articuli à bile falso. Paranda est hæc Compositio, dum adhuc Succus Ros. est recens: Antiquatus enim redidit minus laxans. Antispodium abluendum est, aqua Endiuia, vel Cithorij, ut empyreuma deponat. Sandali dicuntur refrigerare, quod de Citrino, non rubro dubitandum est. Sed nihil impedit ex diuersis substantiis lignæ, Sandalenni scilicet calida & terrea constare. Nux Mescata omissa est in hac compositioe, quod vomitum* moneat, nisi fuerit omphacina, ob abundantiam oleum.

* Hoc nolunt credere morosi censors citici.

Cholagogum Rosatum Clemens, omni ætati vtili, ori, ventriculo & visceribus gratum febribus & affectibus omnibus biliosis aptum.

Respondei Electuario Rosato, Elect.

e Prunis scintino & Elect.

e Psyllis.

Hæc & quamplurima huiusmodi purgatio Medicamentis in Chylismata redigere operæpretium.

Rec. Succ. Rosarum rub. vnc. 15.

Sacchari albi, vnc. 36.

Succi Borriginis,

Endiuiz, ana. vnc. 10.

Prunorum, vnc. 20. quæ exhibent pulpâ solidiusculâ, vnc. 16.

Passularum à stipitibus mundatarum, vnc. 6. quarum pulpâ solidiuscula est vnciarum 3. Pruna & Passulæ coquantur separatim ad molliem ex decocto sequenti, & per setaceum cernantur.

Rec. Cichorei totius;

Acetoiz,

Polytrichi, vel Adianthi, ana. m. 3.

Hordei integri, m. 1.

Glycythizæ mundæ, vnc. 1.

E 3 Florum

Florum violarum,
Borraginis, ana. M. 1.
Anisi, vnc. 1. f.

Fiat omnium decoctio in f. q. aquæ ad lib. 4.
In cuius colatura coque in vase occluso Pruna
& Passulas. In residuo infunde, coque leniter
Seminis * Psyllij, vnc. 1. drach. 4. addendo
Succum Endiuiz & Borraginis.

Quatuor seminum frigid, maiorum,
Semi: Lactucz,
Oxalidis, &
Portulacæ contusorum, ana. vnc. f.
Cassiaz, M. 1.
Epithymi, P. 1.

* Psyllium non decoquendum, quia vis refrigerandi in
superficie est: Capitis partes calidissimas elicit, omnium
sententia & suffragio.

Dissolve G. Trahacanthi, drach. 1. f.
Saccharum, & Succus Rosarum coquantur
ad Electuarij solidiusculi consistentiam dein
de pulpæ & emulsionis seminum addantur, ite-
rumque coquantur lento admodum igni; tum
demum insperge puluerum
Cinnamomi electi, vnc. f.
Santalorum rub. vnc. 1. f.
Santal. alborum, drach. 6.
Caryophyllorum, scrup. 2.
Scurulorum vel Foliorum Lentisci, drach. 1. f.
vel Caryophyllorum, scrup. 2. penuria foli-
orum & scurulorum Lentisci.
Macis, scrup. 4.
Nardi.

Afari, ana. scrup. 1. f.

Adde denique singulis lib. siue vnc. 1. 2, hu-
ius Electuarij, Scammonij optimi vnc. 1. cocti
in vnc. 2. Succus Rosarum lento igne vel cine-
ribus calidis, quemadmodum coquitur à Me-
sue in suo Elect. Rosato: ab igne remotis adde
Mastiches, drach. 1.

Si velis minus purgare, vtere minori dosi.
medicamenta enim validiora minori dosi as-
sumpta, debila sunt, vt docet *Rondellietius* de
Diacarthamo agens.

*Chylarium Melanagogum sanguinem
defecans, & serosa excrementa euacuans,
omnibus curis & curicula vitiiis, supra & elephan-
tias conueniens, siue à bile, siue à pituita
salsa. Splenetico & Hepatico
medicamentum efficax.*

Rec. Succorum Rosarum rub. defecato-
rum,
Succi Fumariæ,

Lupulorum,
Borraginis,
Pomorum dulcium,
Mercurialis,
Endiuiz vel Cichorei, Vini albi, ana. lib. 1.
Quibus decoque sequentia in balneo oper-
culo occlusa, vasis idoneis excepta, secundum
artis leges.

Rec. Polypodij recentis, & adhuc viridis
è quercu vel fraxino, vnc. 6.
Foliorum Senæ mundatorum, vnc. 9.
Summitatum & florum Thymi,
Cassiaz, &
Absynthij, ana. drach. 6.

Radicum Lapathij acuti virentium,
Helenij,
Ebuli vel Corticis radicum Sambuci,
Corticis rad. Fraxini, &
Populi nigri, ana. vnc. 1. f.
Capillorum Veneris vel Polytrici,
Asplenij
Chamaedryos,
Chamaepityos, ana. m. 1. f.
Florum Chamæmeli Romani,
& Corticis fortidæ siue Parthenij, ana. m. 2.
Seminis Cnici, vnc. 3.

Semi: Anisi,
Foeniculi,
Carui, ana. drach. 6.
Contusis, infusus decoctis, expressis & trans-
colatis, infunde

Agarici candidissimi & leuissimi,
Hermodytylorum, &
Pulpæ Colocynthis ana. vnc. 1.
Omnium Myrobalanorum ana. drach. 2.
Zingiberis Cinnamomi }
Schoenanthi Macis } ana. drac. 1.
Galangæ Caryophyllorum }

Iterum expressis & defæcatis percoquantur
lento admodum igni cum mellis candidi de-
spumati lib. 1. ad mellis vel Electarij liquidi
crassitudinem: Addendo singulis lib. Scam-
monij præparati vel cocti in succo Rosarum, vt
ante diximus dra. 5. pul. Gummi Arab. scrup. 1.
Extremis morbis adijciuntur vniuersæ com-
positioni

Hellebori albi
& nigri ana. vnc. f. fiat *Chylarium*, dosis à
drach. 1. ad duas.

Catharticum Hydragogum.

Rec. Radicum Graminis vnc. 6.
Rad. Afari vnc. 1.

Corymborum Hederæ arboreæ vnc. 4.
Caryophyllorum

Garyophyllorum, Galangæ tenuis ana. dr. 2.
Cinnamomi drach. 4.

Coquantur ex arte, vt dixi modò in f. q. 2.
quæ mulsæ, & lib. t. vini albi, ad lib. 1. Cola-
turæ adde Succorum rad. Iridis & Brassicæ
marinz, ana. lib. f.

Succorum Chamælzæ } densatorû, vt docui-
& Thymelæz, } mus capite de Cha-
malæza in Aduerfa-
riis, ana. vnci. 3.

Vel eorundem vice in regionibus frigidis
quæ carent, vel non abundant Chamælca &
vt Thymelæza sume Extra-di Laureolæ vel Gra-
tiolæ præparatz, vnci. 2. f.

Percoquantur igni lento cum Sacchari, lib.
1. Ab igne, vbi absterleris, adde palueris radicis
Mechioacæ, vnci. 2.

Tarrari albi, &
Spic. Aromatici Ros, ana. vnci. f.
Macis drach. 2.

Olei Stillati Cinnamomi,
Caryophyl, &
Anisi, ana. scrup. f.

Datur ex aqua Graminis & Mulsæ à drach,
3. ad drach. 4. cum parua quantitate Mela-
nogogi & Alani decocto.

DE CONFECTIOIBVS AROMATICIS.

Aromaticum Rosatum.

Rondel.

IN officina, vt bene instructa sit, Confectio-
lues, vt vocant, aromaticas esse oportet, & in
forma pul. & in forma opiæ. In forma Con-
fectiõis parantur, quæ vulgò Aromaticæ vo-
cantur, ab eo, quod vincit; vt Caryophyllatum
à Caryophyllis, Aromaticum Rosatum, à Ros-
is. Et quia à diuersis fuerunt hæc, varijs de-
scripta sunt modis: Idcirco delectus est ha-
bendus, vt in Aromaticis est Aromaticum
Ros. descriptione *Gabrielis*, receptû à maiori-
bus nostris: quanquam illud *Mes.* non minus
laudandum sit. Est & aliud Nardinum, & ali-
ud Moscatunifed quia vsus recipit, illud etiam
retinendum censemus, & Aromaticum Mos-
catum, de quo suo loco dicemus. Possunt hæc
omnia Antidota vocari, quia ad morbos lon-
gos, & ad venenata valent talia medicamenta.
Anidorus Aromatica ex *Ioanne Damasceno*
descriptione *Gabrielis*, recipit varia medica-
menta præciõsa, vt

Rec. Ros. rub. amotis vnguibz drac. i. f.
Glycirhizæ rase drach. 7.
Cinnamomi electi drach. 5.
Sandali Moscatelini (pro ligno aloës, quia

amarum) Sandali Citrini, ana. drach. 3.

Macis Caryophyl. ana. drach. 2. f.

Gummi Arab. Tragacanthi leuiter assato-
rum ana. drach. 2. & scrup. 2.

Nucis Moscatæ, Cardamomi, Galangæ
parue ana. drach. 1.

Anibz, Spicæ Nardi ana. scrup. 2.

Moschi scrup. 1.

Syrup. Conseruationis Corticis Citri q. f.
pro faciendâ confectiõne, vel Sacch. dissoluti
in aqua Mentæ, vel Absynthij stillaticia. Fiat
ex eo Electuarium siccum, vel cum vino &
pauco Sacch. excipiantur, & fiant Trochisci.
Hanc compositionem retinendam ad affectus
intestinatorum, ventris, hepatis, & splenis, fri-
gidos & humidos censemus. Nos in ordinẽ
redegitur, quod debent simplicia collocari, &
nullorum pondus immutauimus. • Lignum

Aloës, tanquam adulterinum, & rarò inuen-
tum, expunximus. Sandali partem internam
(quæ muscatelina, ab odore grato est, non mi-
nus siccâ, non minus odoratâ, neque à ca-
lore multum discedit: Esti Sandalum vulgò
frigidum ex stimetur, est tamen cal. vt sapor a-
cri post masticationem, & odor indicant
(Sed de eius viribus plura suo loco) In eius
locum posuimus, quod in alijs omnibus com-
positionibus, vbi similiter occurrat, substituen-
dum putamus. Sed ne quis miretur, quod ali-
quando Citrinum, loco ligni Aloës ponamus,
huic sic respondemus, hoc à nobis fieri, quan-
do Citrinum aliqui non recipit compositor
Perpetuò enim magis placet Moscatelinum.
Quod si desit Moscatelinum; optimum & ve-
rum Citrinum odoratissimum eius loco sume-
tur. Gummi Tragacanthi, & Arabicum expun-
gere nolumus, quanquam sint emplasti ca vis-
cosa; sed quia siccant parum, iniunguntur, vt
etiam alia aliquando hærete faciant in tunicis
ventris: quam viscositatem, vt quod animo
dimitterent, assari inperauimus. Quod cum
Syr. conseruationis Citri excipiantur, præter-
misso Syr. Ros. *simplici (non laxat.)* vel Viol. id
fecimus, vt medicamentum hoc esset magis
acconimodatam scopo, cuius gratia paratur
Fitenim ad ventris actionem tuendam, cal-
faciendo & siccando. Redderetur autem minus
cal. & minus astringens. Et quia ad tabellas
parandas opus est pul. in pul. etiam iussimus
fieri. Et quoniam, vt cap. de Trochiscis doc-
ebimus; hæc forma medicamentorum conue-
nientissima est ad odorem conseruationem
imperauimus, vt vino exiperetur, & in Tro-
chiscos redigerentur: Cum ta bellas parare vo-
lent, Sacch. dissoluant, & decoquant in aqua
Menthæ vel Absynth. Hoc Arom. Ros. suffi-
cit habere paratum præ Aromatico Ros. Mes.

*X, lo aloës
hodie satis
& frequens.
Aduersa. 440.
Obferuat. 376.

Aromaticum
Ros. Mesue.
Aromat. Cary-
ophyllat.
Confectio Dia-
cinnamomum.

& Arom. Caryophyllato, pro Confectione Dia-
Cinamomum, pro Diatrium piperum, Diaca-
lamenteo, Diaspolitico, & est gratissimum, ob
odoris & saporis suauitate.

L'Obel.) *Aromaticum Rosatum &*
Caryophyllatum.

Caryophyllatum similes habet vires Aro-
matico Rosato *Gabrielis*, ideo non dispe-
sandum: plus tamen siccat & calefacit. Si-
quando opus fuerit Aromatico Caryophyllato,
licebit tabellas siue rhombos singulos guttula
olei Stillarij Caryophylli, leniter aut irrogare.

Validè Aromaticæ confectiones, non mo-
do stomachicæ, hepaticæ, cephalicæ, aut visce-
ribus dicatæ, sed cordi amicæ sunt, spiritus re-
creant, & cor corroborant.

Syrupi Conseruationis Corticis Citri vel
Sacchari, q. s. Officinæ omnes cum Cordo,
vnc. duodecimi Syrupi aut Sacchari, miscent
vnc. vnam specierum,

Caryophylli hodie nostrissimi: omnium in-
tegerissimi, optimi & selectissimi sunt, quales
in his aromaticis & omnibus medicamentis co-
ligi debent, quos fœminas fecit Auicenna, &
Anthophyllos, id est flores & fructus maceu-
los, qui cum pediculis Fellicis siue Fullis vo-
catis deterioris notæ sunt, minorique effica-
ciæ. Omnino improbandi & reijciendi Ca-
ryophylli, suppressa naue, aquamarina perfusi,
aut chymicè extracto oleo, efferti, aqua mace-
rati, iterumque exsiccati, & mangoziati, alijs-
que optimis Caryophyllis permixti vaserrimo
Hebreorum, Semi-hebreorum, (vulgò Marna-
norum) seplasiarumque quorundam lucro in-
hiantium, dolo malo.

In Aromatico Caryophyllaro, primario loco
Caryophylli præponuntur, & maiore pondere,
à quibus nomen contraxit Concoctio, præco-
rum exemplo: vti in proximè subsequenti A-
romatico Rosato, animaduertere licebit, in
quo Rosæ cætera prævalent.

CARYOPHYLLORYM Ramusculus
reddendus Adversar. pag. 427.

Caryophylli
albi Indici.



Antiphyll.

Caryophyllorum meminimus in Stirpium
Adversarijs, pag. 427. & folia Arantij
mali diximus; Citrij tamen ad Laurinis
proximiora, minime pinnata: ramulum adhuc
habemus foliorum cum Caryophyllis, mune-
re amicissimi & honestissimi viri *Jacobi Canini*
Medlo-Castr. Zelendorum pharmacopolæ
peritissimi & htidissimi, acceptum à diligen-
tissimis naueleris Zelandis renaugantibus ex
Indijs Orientalibus; cuius iconem ad viuam
delineari procuravi, cum Caryophyllis nouis
Indicis albis nuncupatis, Veronâ missis a præ-
stantissimo amico *D. I. Panâ* pharmacopola
Veronensi callentissimo, cum alijs nonnullis
exoticis, rarissimisq; fructibus, seminibus &
rotundis Caryophyllis Plinianis creditis, de
quibus plura in nostris Stirpium illustrationi-
bus,

Albos vocatos Caryophyllos diceres flo-
culos albidos conuolutos esse cuiusdam ig-
notæ Indicæ Plantæ, Caryophyllorū aut ala-
bastriculi aut radimenti cuiusdam floris Ma-
lux aut Solani (cuius sententiæ est etiâ *D. Cla-*
sim) oclusi, instar effigatos, qui diu in hunc
diem odoris fragrantem Caryophylleam ser-
uant aromaticam.

Scitè admodum monet *Clusius* noster, quâ parum fidei sit adhibendam authoribus, qui ve-
ritatis assertores se gloriantur, & plantas ad viuam expressas asserunt: cum tamen ipsorum ico-
nes nullius Stirpis viuam imitentur effigiem, culus farraginis (qui sua tamen transcrip-
sit ex *Garcia* ab *Orta*) *Christophorus à Costa* fuit, dum fiditiam Caryophyllorum iconem exhibu-
it, in qua Ficuum modo ex ligno inter folia Caryophyllos nasci ait. Caryophyllos, *Clusius* con-
tra

tra ex inspectione, uti nos muria confidos, petiolis brachiatis aut festuéis, vulgò, *Fufes* inhaerentes expreffit.

Linscoto Caryophyllorum arbor Lauro similis est: flores initio albenr, deinde virefcunt, tandem rubent, & duiriores euadunt, noſtriq; Cariophylli fiunt. Proueniunt in Moluccæ inſulis, quæ quinque funr, ſub æquatore ſitæ.

*Rhomborum ſuauiſſimorum concinior
blandaq; magis paranda ratio.*

Quidam ubiſſima parant Eleſtaria Aromaticæ inſuſis ſpeciebus Roſaceæ parua quantitate, deinde tranſcolatæ & nulla aut pauca illa coſtūra, ne vis aromatum expiret, excocto artificioſe hiſtæ Penidiarum ſaccharo, rhombosq; efformant.

Huiusmodi multæ aromaticæ conſtantur & concinnantur, ſcilicet elegantæ & ſuauiſſimæ blanditiæ, ex ſtillatitijs Cinnamoni, Caryophyllorum, Aniſi, Carrij mali corticum, Meſſicophylli, Moſcho & Ambra conditorum & Sîccharo.

Rec. Roſarum rubrarum amotis vnguib;] Roſatum vngues excidi ſolent, anquam partes Roſæ humidiores corruptelæ obnoxie, tum etiam ut Roſel conciliati eolois compoſitioni nihil derogetur.

Loco Santali Machozij ſive Citrini; albo aut rubro Santalo uti licebit. Aliqui tamen, ſitrima Santala, eſſe calidiuſcula, in compoſitionibus reliq; ærantibus, rectè addita opinantur; ut caliditate multis frigidis admixta, altius refrigerent.

Aromaticum Moſcatum.

Rondel.

Aromaticum Moſcatum à Moſcho dictum, quia ethiciſſimum eſt ad ſyncopas & alios affectus, in quibus vtilia ſunt odorata. Præterea in multis alijs cenſeretur odorata autem, quia in multis morbis non conueniunt ut in affectibus veri, qui per conſenſum ſiunt; ut in dolore capitis, epilepſia, vertigine, & ſcotoniare, nec in vreis in affectibus omnibus, neque ægris omnibus, vel quia offenduntur odoratis, vel quia hæc faciunt remedia multum præcioſa & cara. Quod ſi Diamargaritum frigidum, vel calidum, vel Arom. Roſarum, vel alia medicamenta, quæ hæc omnia recipiunt, ſine iſtis parentur; liberum eſſet Medicis ea addere, & Pharmacopole, cum Medici impe-

rarent faciendum, grana aliquot iniicerent, Hoc non eſſet moleſtum, neq; Medicis imperare, neq; Pharmacoſeis facere, & nè deciperentur, admonere illos oporteret, ut pararent etiam pul. alios ſine Moſco & Ambra, & ſine Auro & Argento; neque etiam exiſtinandum iſta eſſe tam neceſſaria, ut his catere non poſſimus: Nam & *Gal.* & *Hipp.* ſine iſtis curarunt, & feliciffimè. Nos tamen illud apponemus.

Rec. *Cinna. drach. 10.*
Sandali Moſcatelini (pro ligno alui)
drach. 7.

Ambra drach. 3.

Moſci ſcrup. 2.

In aqua Roſar. in qua maceratum ſit Gummi Tragach. ſiunt Trochiſci, ſeruentur uſui in vaſe vitreo & loco minus calido. Odoratus eſt, & paratuſ facilius, ſi Moſcin poneretur ad drach. 2. & Ambra ad ſcrup. 2.

Nam plus Moſci non adulterati reperitur, quàm Ambra, & frequentius minori precio venditur, & cum ſint euſdem facultatis, non mutatur via medicamenti. Hoc faciendum docebat Dominus Falco in compoſitione illa nobiliſſima Alkermes, ſive ex Cocco. Duplanda eris quantitas huius compoſitionis, ſi ad alium finem præparetur.

Ambra] De veterioribus Græcis, Hippocrati, Theophrasto, Dioſcoridi, Galeno & alijs ignoti gemini Ambari, fulci, & ex leucophæo muſtellino colore cinerej fragrantiffimi exiniæ ſuauiſſimæ odoris, cariſſimi commendatiſſimi; (materna vernacula lingua *Griſet* ſive *Ambregris* vocati, ad differentiam tripli- cis coloris ſulci, citrini & albi *Succini* ſive *Officinarum Ambre & Arabium Carabes*) or- ta, inter varios Scriptores, varia vaniloquenda diſſidentia eſt: nonnulli ſiquidem Fucum, Muſcam marinam quò Inſectores vtuntur, alij i- dem Pungum marinũ, quem Balenæ beluoſue marini piſces vorant & excernunt eſſe contendunt; alij Ceti Sperma eſſe aiunt. Veriſſi- miſſior tamen eſt illorum ſententia, qui Bitu- minis ſpeciem eſſe opinantur, & non ſecus ac Gagates, Ambra citrina, ſulua & alba ex Mar- tis Orientalis Germanici, Anglo-betanniciq; aluei, viſceribuſq; (quemadmodum etiam in fluuiorum & fontium ſcaturiginibus ſub- terraneisq; viſceribus Asphaltum ſive Bitu- men & Pix asphaltum, exemplo erit ſource de la pèze vocata in Auvergina; uti in Conſectis a- boribus, Pix & Refinæ eſſiunt) emanare. V- trumq; autem cinereum & fuluſcui Amba- rum, pingua ſunt; & Bituminis aut Ceræ in- ſtar lucernarum luminibus obiecta facile li- queſcunt,

quescent, & filum ducunt, vt viscum aucupatorium aut glutem.

Ambarum cinereum præfertur nigro siue fusco etsi etis suauitate odoris commendatissimo, cariusq; distrahitur.

Ementicum Ambarum concolor terræ aut Boliglobæ, à pictoribus *Teria umbra*, vocata, admixtum, mangones sæpe vendunt.

Moschum est sanis abscessus ex phlegmone cuiusdam animalis, vt rentur, Capræ Syluestris Indicæ similis, iuxta umbilicum è pelliculis excisis collecta, suauissimum spirans odorem qualis ad nos in marsupiolis, mollioribus pilis caprinis similibus obductis, desertur.

Adulteratur Londini & albi, sanguine vitulinò, agnino aut veruecino admixto torrefacto, & lima abraso aut climato plumbo, ponderis ergo. Quidam marsupiola implent ipsi minimum incilis pelliculis quibus Moschum continetur.

Menini Moschum defraudatum Antwerpiz venale ab Italis, Hispanis, & Iussitoribus admixto celsipitum Bartanorum à flagarando & incendio notissimorum confimilimi coloris puluere, sed vtriusque dolus, odoris ignauia deprehenditur.

Zybeto vulgò *Ciuette*, est veluti sanies quedam excrementitia quæ statutis temporibus colligitur iuxta loculos & verenda cuiusdam animalis Instici magnitudine serè & parilitate Taxi aut vulpeculæ, Martis seræ aut Mustellæ coloris, aliquando notulis albis maculatis, felis duplo maiore, capite & maxilla longiore: Belgæ *Sparsche catte*, Angli *Ciuette catte* vocant. Carnibus vescitur pullorum: Antwerpiz Lódini & alibi Eurdpeis sæpe alitur, verius quidam naucleri Angli, Anno 1600. Londini *Zybeto* sapone molli, nigro, permixto multos seclerunt.

Doronici *Doronicum* non *Demonicum* neque *Ciao Demonicum* sœuissimamque pestem, aut hominum noxiam radicem, vt *Matthiolus* diis suis imaginatur, plus satis disseruiamus, Siergium Aduersatorum nostrorum pagina, 291.

De Pulueribus qui Conditis Cordi dicitis miscentur, & primum de Diambaru.

Officina habere debent in forma puluerum *Diamargaritum frigidum*, *Diarrhedon*, *Triastralon*, *Diambram*, *Diamoscam*, *Diambra nobis antidotum parari potest, vt Diamoscam: qui vtrumque habebit, altero potest emere.*

re. Diambra hec,

Rec. Cinnamomi,
Doronici,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Mosch.
* Folij, ana. drach. 3.

Santalicirini,
Xylo-aloes,
Piperis longi, ana. drach. 2.
Zingiberis, drach. 1. f.
Spicz Nardi,
Cardamomi maioris & minoris,*
Ambaru, ana. drach. 1.
Moschi, drach. f.
Sacch. q. f. fiat in formulis aut tabellis vel cum aqua florum Citranguli ex infusione Tragacanthi fiant Trochisci parui. Seruentur vsui.

*In hac compositione situm medicamentorum restitui, Sandalum substitui potest locotigni aloes. Folium quancquam non sit illud antiquum, pro quo Gal. *Spicam Nardi sustitui vult, cum sit eiusdem facultatis, & nihil refert, etiam si ingreditur in Trochiscos redigi vellem.*

* Quis ingratiss: substituat Cinnamomum tenet.

Confectio Alkermes Mesue.

Nobilissimam celebratissimamque Bombycinam Confectionem omnium Cor Vegetantium Alkermes tegimam hic omisam Diambaro subnectere operæpretium duxi: Paratur autem è crudo Ianicio Bombycino, Cocco baphico tincto, Arabibus Chermes siue Kermes vocato, summissque laudibus à Mesueo celebrata, ad cordis palpitacionem, lypothymias, & desipientiam.

Confectio Alkermes, inquit, & sunt Grana tinctorum maximi iuuamenti ad pulsura cordis & sincopiam & alguesgues, & tristitiam sine casu: & est ex rebus confortantibus animam confortatione mirabili.

Confectionem hanc iamdiu Monspelienses parate soliti sunt; & in hunc vsque diem quotannis ex recenti, cruoris iustar, viuio Cocci succo magnificè & apparatè præparant, distrahuntque per vniuersam Galliam & Germaniam; neglectis & valere iussis doctissimi Manardi quibusdà huius Confectionis Alkermes censuris: In hac quoque inquiring, nunquam iactarem pecunias: Nam neque Serico vocato, neque in Cocco, vel Baphico, vel Chermes

nies nuncupato, agnosco vim nisi constringentem: colorisque rubri ratione, lædere potius videtur cot quam iuvare, spiritus & sanguinem trahendo propter similitudinem, (*vis tamen astringit spiritus & vires coarctando fuses & remoratur*) Cyanei verò ratione vomitum & secessum citabit, quæ præ exigua eius quantitate perficere non valens, lædet magis quam iuvabit.

Algae [genus] desipientiam vocant *Arabes*.

Huius sententiæ & hæresis Doctissimi *Marnardi* sectatus est vestigia eruditissimus & perbonus auctor *Dodoneus* nostras ut mox dicetur.

*Quia in Serice, Seta, & Bombycis pen-
so, huius Compositi Medicamenti nobilis-
simi basi, sepe hallucinantur Pharmaco-
pæi & alij, pauca dicere visum fuit.*

Sericum est Lanæ pretiosissimum genus, quod apud Indicæ populos ex arborum frondibus decerpi dicitur, ut etiam ex his *Maronis* verbis liquet. Velleraque ut folijs de-stant mollia Seres. Ex quo icidemi puluilli fiebant, ut hodiè è *Xylini* fruticis lanugine mollissima.

Seta setarum.

Setæ setarum plurali numero, pili crassiores stricti rigidiq; quales suilli & equinæ ceruicis aut caudæ sunt. Sordidæ Seta singulari numero, latinè pro Serico dicitur, sumpto fortè vocabulo Seta, à vernaculo Italico, degenerate latinitate, quæ vûlgu Pharmacopolarum & tonforum medicastorumq; vtuntur, & significare uolunt Sericæ bombycis vellus. Miror hæc non obseruata à candidissimo *Dodoneo*, qui Setam pro Serico in Confectione *Alkeræ*, legit, & perperam nobilissimam *Prisco* Antidotum cum *Marnardo* de quo supra) rejicit; eoq; occasionem erroris absurdissimi dedit Domino Doctoti *Trist*, qui eius historiam latinam Plantarum, impensis *D. J. Norton* Anglo-Britanno vernaculo vertit, & hoc loco, verbis *Dodonei* fretus, & Setæ vocabulo illusit, ait: *Non est expediens ut in hac compositione addatur Seta tincta in Cheshmes* (Kermes legendum, quia magis receptum puto) *ut Officina loquuntur nam Seta hæc &c.* (It is not expedient that the Bristle be with Coches nele called Cheshmes, as the Apothecaries tearme it &c. Setam in *Suilla* setas peruerit.

Condonandum illi & eius scriptori, herbarum collectori & Botanographo, qui in eundem impiegit lapidem. Sic enim sunt huius æui res humanæ: Huiusmodi exempla copiosissima, monumenta sunt reuerentitatis.

Setæ autem *Suillæ* Germanico Teutonico & Anglo-Britanno vernaculo *Bristle*, *Burstele*, & *Bristle* vocantur.

Hæ versiones Grammaticis etiamq; Grammaticastris tyronibus, Medicinæ candidatis, & logodædalis, ut plurimum committuntur, qui etiamsi vocabulorum valdè periti sint; veruntamen, cum dictiones varias habeant significationes, frequentissimè hallucinantur, rerum ipsarum inscitia: Medicina autem circa res veritatur, non verba: non enim est hæc peculiaris philosophia verborum, sed rerum solers cogitatio. Rerum ignoratio, *Molæus* vir aliqui doctissimus, & philosophus & physicus, perdidit egregium illud opus elegantissimè à *D. Guiljelmo Ruyssio*, liberaliter, maximeq; inopesis excusum, clarissimi, eruditissimiq; & amicissimi viri *D. Jacobi Dalechampij*, doctissimè audum operà & studio *D. D. Iohannis Bauhini* Ducis Wirtenbergenfis Medici clarissimi, collegæ quondam & conuictoris Montispessuli suauissimi. Quale fuerit iudicium *Molæi* in cognitione Plantarum, omnibus notum est ex Animadversionibus & Catalogo Plantarum in generalem Historiam illâ Ludwigensem, bis æter, quæ tunc positarum, auctore *C. V. Caspare Bauhino* Anatomico & Botanico professore doctissimo Basiliensis Academiæ.

Taceo huius æui scriptorum vernaculo idiomate, nec non *Taberna-Montani* & Typographi sui subreptitia, qui icones laboribus nostris & ære Plantiniano pictas & sculptas, tacite, catè & cum cautela, insalutato hospite aut auctore, scriptis suis inseruerunt, & propria, maximâ impudentiâ fecerunt.

Nonne proculdubio ita sentiendum ex sola huius Rondeletianæ Pharmacœutices Officinæ recensione & inuestigatione? Conferenti enim eius documenta & scripta cum archetypis, quot mille mendis vindicata fuere, manifestissimè apparebit. Non modo mille modis peccarunt in ponderibus, verum etiam in ipsis rebus, quemadmodum in *Hiera Archigenis* apud *Paulum Æginetam* apparebit, ubi ait, de *Hiera* scriberis: *Quod si vehementiores ad purgandum voles efficere; quibus Scammonium non inest, inijciatur & his singulis ex illo ebolus.* Hoc loco verba *Rondeletij* iant; Cùm efficaciorum facere volueris Medicus ad purgandum, Scammonij aliquam quantitatem ponas. Ili omnes qui

qui sese sequuntur vt Grues, hoc non animad-
vertentes, torridè admodum Cinnamomi pro
Scanmonij posuere. Infinitè huiusmodi
mendæ occurrent, non modo in Composito-
rum Medicamentorum mutilatis descriptioni-
bus, sed etiam in ponderibus, quibus iuniorum
Medicorum fallax pars labitur. Pondera &
eorum quantitates libro de Ponderibus do-
ctiss. docuit *Rondelatus*. Longa observatio-
ne, Medicamentorum quantitates solentiores
Pharmacopœj apprimè norunt, qui sæpe in-
experitos & nouitios ident.

Omnino & prætereò *Rondel*. Methodi me-
dendi librorum ter repetitas a varijs Typogra-
phis æquè mendosè & perniciosisimè, contra
mentem auctoris, editiones, vt in Prologo
diximus.

Bombyx, insectum est partim terrestre è ge-
nere Erucarum, Mori arboris frondes e-
rodens; partim volatile è Papilionis aut Biat-
rarum genere, crassioris tamen & grauioris
corporaturæ, quod antequam volatile fiat te-
nuissimè molissimisque ductis filis, sese ob lon-
gate rectè glomeramine obuoluit. Tale glome-
ramen coloris albi aut lutei, est Bombyeis
pensum siue Scri. eum textum vellus, Euro-
pæis hodie notissimum, Sericum crudum vul-
go vocatum, quo utitur ante ablutionem in
hac nobilissima & alijs cor rescipientibus Me-
dicorum medicamentis.

Huius Bombycini pensum, Ambari, Moschi,
Magaritarum & Lapidis Lazuli facultates ex-
perientissimo *Mesueo* huius Confectionis au-
thori exploratæ fuere; qui quidem ait Lapidè
Lazuli non modo abluendum, sed & præpa-
randum. In pilulis receptus, lapis Cyaneus ad
melancholicos affectus varios si exactissimè
teratur super marmor frequenter vicissim stilla-
etia Borræginis initio, deinde è floribus Vio-
latum aut Borræginis effusa, donec nihil peni-
tus intam nata limpidior sinceraque omnisq;
saporis expers effluat. Experientia enim certa
scio, inquit *Manardus*, si bene tribuatur, mul-
tum iuuat, & vel nihil aut parum lædit: igitur
non vt venenum formidandus. Maxime etiã
commendatur ab *Actio* libr. de Simplicibus
Pharmacis cap. 46. & inter purgantia cap. 32.
Ab *Astuario* libr. de Simplicibus purganti-
bus. A *Traleno* autem ad eandem libri 12.

Lapis Armeniacus, inquit, siue lotus, siue
lillotus off. rat, quatuor siliquarum pon-
dere; mirabiliter ad omnem quartanæ speci-
em valetipam humorem melancholicum, vt nul-
lum aliud præsidium euacuat: Sed locus qui-

dem aqua, per inferiora purgat illoctus autem
per vomitiones citra calorem, non quemad-
modum alia. Per inferiora eius purgatricem
vim non agnoscere videntur *Discaueris* & *Pla-*
nus, qui eius non meminere. Eadem quæ
Chrysocolia natia sed inefficacius præstare
ait, vomitionesque concitare & necesse inferre
posse Chrysocoliam natiam scriptum reli-
quit.

Armenius lapis & Cyaneus, eiusdem sunt
naturæ: & sæpe in eodem lapidis frusto repe-
riuntur, quemadmodum Mithi & Calchylis. Ex
Armeno lapide metallicis sedimis inuentio fieri
asserant illud *Carulo viride*, quæ d Gallis *verd*
d'Asur & Germanis *Berck green* vocatur.

Deformidabili purgatrice Lapidis Armenij
vi hac Antidotus Alkermes non est vercen-
dum: Qui Cyaneus lapis non modo lauatur,
(vt supra diximus) sed præparatur, hoc est,
primum torritur, & in Crucibulo fusorio vitur,
vt laxandi vim exuat.

Ad hæc Monspelienfes textum siue formu-
lam *Nicoli Præpositi*, vt in veteri codice *Mss*,
drach. 12. pro drach. 2. adduntur, minime se-
quuntur, vt ex mox subdita descriptione con-
stabit.

Hic exactissimè & examatissimè perpenfis, non
est quod boni *Dodonæi* & *Manardi* tradita
persuasione, ab alijs quibusdani doctiss. Me-
dicis hoc nobile Medicamentum despiciatur
quia nesciunt, inscindi Sericum Coccineo
sucro, & parandi rationem, Cyanej Lapidis &
Confectionis Alkermes Melux, in nobilissi-
ma & antiquissima Monspelienfi Academia, in
cuius Nitiobrigensi agro Coccus frequentissi-
mus. Sæpe nugivendi sunt, qui aliena nuga-
menta transcribunt: à lymphidissimis fontium
scaturiginibus hauriendum, non a persuasioni-
bus: Experientia, & vni oculo testi plus fidei
adhibenda, quam auritis decem.

Hic Antidotus a Pigmentarijs & Myropo-
dis hodie viliori pretio distrahitur solito, quia
Ambaro Moschum subluere, & Cocco ig-
nobiliori nullius delectus statur

Confectio Alkermes Monspeliensum ex Mesuei mente.

Rec. Bombycini velleris crudi, albi aut
lutei, sæpius mersi, sincti, & imbuti
Cocci Sucro recenti, & vicissim prosequendo
siccati vnc. 12.

Aquæ Rosacæ,

Succi Pomorum odoriferorum, aa. vnc. 18.

Insundantur calidè d. em naturalè deinde
effrueant

effrueant molliſſimo igne, donec Pomorum ſuccus & Roſacea rubeant.

Expreſſioni decenti adde Sacchari albi, vnci. 18.

Coquantur lento admodum igne donec Mellis craſſitudo fiat. Abigne remotis, diſſolve ſenſim

Ambari ſelectiſſimi fruſtillaz incidi, vnci. 4. quo liquefacto adde ſequentes pulveres.

Rec. Cinnamomi primæ notæ, & Xylo-aloes, ana. drach. 6.
Lapidis Cyanei præparati,
Margaritarum præparatar, ana. drach. 2.
Auri puriſſimi diſſoluti, drach. 1.
Moſchi optimi, ſcrup. 1.
Miſceantur omnia exactiſſimè & fiat conditura.

Diſſolu.) Maniſeſtes & plerique omnes ſalia miſcentur quæ niliſe ſunt.

De Cocco abunde in Stirpium Adverſarij diſſeruntis.

SEd quid aſſument Cocci Baphicæ loco Aſtomatarij & pigmentarij frigidarum regionum luero inhabitantes, qui hanc inſelicitèr Confectionem parant? Quidam euanidas, aut vacuas Granorum tinctorum ſive Cocci tunicas accipiunt; alij paulò conſultius pulverem ruberrimum Cocci vino albo inter ſiccandum Infectorum vſibus intorati, ne ſuccus eructus ille dum ſiccatur, in niuſcas abeat, ſumunt; quem macerant vñ cum Lanicio Bombycino, ſucco Pomorum & Roſacea; addito Santalo rubio loco Aluminis, Arſenici, & Agarici ad inſciendū ſtrictum, iuvandam & conciliandam èoloris Coccinei imenſi gratiam quandam, ſualem videmus in Confectione Alkermes Moriſpeſuli compoſita.

Cum itaque Bombycinum penſum Arabibus commendatiſſimum fuiſſe conſpicuum ſit, & quæ nullis fere Cordi dicaris medicaminibus prætermiſſum aut neglectum; minime ſpernendæ utilitatis, rationique conſentaneum videretur, ſi quis ſucco Mori maturi in quo Coctilneus pulvis maceratus fuerit, loco Coccei ſucci Bombycinum vellus Balnei modè raro calore maſuerit & effrueverit, iterata ſæpe Velleis infuſione, ex ſiccato aliquoties ſucto, denuò macerando; Bombycis enim alimonia & viſ à Mori arboris folijs eſt, quibus ferè croſis proſolum & verè viſitat. Huic noſtrę ſententię non refragabitur Reguleſtini præceptor noſter; in regionibus poſſimiſſimæ quæ

ſucco recenti carent, Cauendum a Muſcis Indiciſ, vulgò *Cochemille*, vocatis & Bombycis penſo aut filo, eodem ferè thodo quo Coccus tinctorio, addito ab infectioribus Arſenico & Agarico. Hæc loquor expertus; quia ſenem Pharmacarium memini in Italia Syrupum è Cotticibus Citri *Mefua* ex huiusmodi tinctorio Bombycino filo compoſuiſſe.

Solectius ſarvineum gentis creditum, & nonnullæ obſtetrices hoc item filum perpetuè diſſile parturientibus, minutim inciuſum ex ovo ſorbili Nucis Ponticę quantitatè exhibent, & tanquam arcantui, (vñ pleræque muliebria) celant; ſed ignorantis peccant, Arſenicum cum Agarico ab infectioribus admiſſum neſciat.

Ludouici Mytei Paragraphe.

Hoc nobile Eſſentiarum præ cæteris omnibus ob oximias cordi amicæ dotes eſt præſtandum, modò fideliter paratum ſit: ſed cum Pharmacopœi ſucco Kermei careant, hanc Confectionem parare nequeunt: Coguntur igitur ſi dem adhibere illis qui Lugduno Viciniſq; locis itambuc important: cum tamen in præparando non pauci cõmittuntur errores & ſophiſmata, cū omit-tendo ſuccum Grani Cocci, tum detrabendo pondus Ambari; qua ratione chariſſimus Vir Dom: Michael Iouhannus Groninger Pfortæbernica urbiſ Marchienatus Badenſis Pharmacopœus doctiſſimus, (cui tunc infernicum, & multum debet) Granorum Cocci tinctorum ex conuenienti liquore ad præparationem huius Confectionis extrahere ſolebat. Erat enim, ut omnibus Pharmacopœis Germanis ſuis notum, in compoſendis ſuis medicamentis ſelectiſſis, niſiſſimis, & in Extractis Chymicis parandis, tam metallis quàm Vegetatiuis calentiſſimis, omneſq; alios longè excellēbat.

Paragraphe Lüd. Mytei de Margar.

Complures nimis affectuè ſolutionem Margaritarum in hac Confectione permuſceri volunt, & hoc quidem bene; ſed quia vulgò diſſoluntur in Aceto Stillantio, etiamſi edulcata ſint, deguſtanti tamen calorem & empyreuma aſtrictioni permixtum, caloris inſtar, exprimunt: In iſſis igitur Compoſitis Medicamentis non eſt conſultum rei. Gloriantur, quidã ſe Margaritas exſtrictum vini aut Betula ſucco diſſoluiſſe ſed adhuc cum fecerim nullum periculum, ſua fruuantur opinione; expertus tamen ſum diſſiliſſimū liquorem ligni Sauti & rectiſicatum, quæcumq; Margaritas,

tari, etiam si maximam, tantilla temporis momento eas dissoluit; sed quia emphyreuma, nullo modo deleri potest inuitis eius usus est: Malina iocitur & magis commendat Margaritas in Porphyrio lapide tenuissime lavatas, ut ferri soler, ad huiusmodi Cerdantia Compositiones.

De Auro & Argento.

IN multis nobilissimis Aurum & Argentum recipiuntur compositionibus. Posset parari mixtura ex Auro & Argento, vel haberi limitata utrinque & quando opus est, ditorum medicamentis addere.

De solutione auri & Margaritarum In Aduersariorum Appendice siue Ephemeridis Scripsum altera parte satis superque disseruimus, ad nobilissima Pharmaca concinnanda.

Diamoscum.

Diamoscum pratermittendum puto, tum quia eo carere possumus ob paratam Diambra confellionem, quae facultati similis est, tum quia huius medicamenti varia est apud eundem auctorem, & apud diversos descriptio. Antic. septem descriptiues ponit Fen. 5. summa. 1. trac. 3. Rbas ad Almans. unam; Serapio aliam; Almarini aliam. Ob multitudinem huius descriptionis satius est relinquere: Adde quod multa recipit, quae parum probanda sunt, ut vitrumq. Beben. Quod si tantopere desiderare, ob Mosivum; augeant quantitates Mosci In Diambra, & plura praestabis, quam illud incertum & dubium medicamentum.

Dia Galanga Mesua & Diaciminum.

Qui Dia galangam Mesuz habet; utroq. Nicolai & Mesuz Dia-cimino, quia cuiusdani sunt fere efficacit, carere potest. Calidior est Aromatico utroque. Si quis addere velit Mesu. Cimini aceto optimo infusi & preparati, non ictuor. Quia ubique in frequentu usu est ad flatus potenter discutiendos, omittam descriptionem subdere visum fuit, quia

Rec Galanga recens, ana. drach. 6.

Xylo-aloes, ana. drach. 6.

Cimini, aceto optimo infusi & preparati, drach. 4.

Caryophyllum, ana. drach. 6.

Madu. ana. drach. 6.

Semi Ligustici, ana. drach. 3.

Zingiberis,

Piperis longi, albi,

Cinnamomi,

Calami odorati, ana. drach. 1. 1/2

Calamintha sicca;

Menthz sicca;

Cardamomi;

Spice Nardij;

Semini Apij

Feniculi,

Anisi,

Carui, ana. drach. 1

fiat omnium Pulvis,

Et ex Sacchari, s. q. fiat Electuarium solidum.

Ventriculi & viscerum concoctionem in causa frigida roborat, acidos reclus discutit.

Galanga, a qua nomen sumpsit, est praecipua agens huius compositionis, & primum locum sibi vendicat; per se omnia expleere posse constat, quae compositio pollicetur: Cetera vero eius actionem augent; quaedam plus, quaedam vero minus, ut ad partes remotiores medicamentum penetraret, sine quibus non perficeretur actio.

Diacinnamomum, Diaciminum, Diagalanga, Diatrium Piperis & Diospolicum.

Diaciminum a Diagalanga non multum differt; si addatur vinci. si Cimini Diagalangae, pro utraque compositione utilis erit, ne medicamentorum copia Officinae obtineatur; quae alioqui diutius assertuata viribus languent, situm ducunt, putrent, onere & iadura Pharmacopoeorum: adde quod non; nisi raro boni practici vtuntur, Galenus & plerique alij classici auctores, hos & similes pulueres aromaticos in tenuissimum polleum recedunt; ardioresque citro cernendos iubent; attente tamen a diuturniore frequentioreque horum usu cauendum; visceribus & primis venis per morborum initia materiam crudam, viscidam, crassam, fardis, ne horum vi, caliditate & partium tenuitate eliquata materia in tenuissimas venas, & tandem in corporis remotissimas partes deducatur, etoniconum morborum, maioremque obstructionum somes & incrementum. Quamuis haec leuiores videantur; prudens, tamen & pius Pharmacopoeus, haec non exhibebit; neque sul mali conscius ager alimur; nisi consulto perito medico: Consecta enim medicacanda dicit Hippocrates. Si haec sepe nocent, quon-

to deleteria perniciosissimaud Cathartica, nullius delectus medicamenta, quotidie a quouis mediastro & circumforaneo exhibita nocentiora futura.

Galanga viraque.

Liquidò itidem constare diximus vtriusque Galangæ neutram esse Acorum: plerique attamen indocti hæsitatores Pharmacarij, supinâ negligentia & pertinaciâ, in qua penitus consenserunt, opinionem suam adeo fouent

Galangam Acorum esse, vt non minus quæat deleri, quam laridi rancor.

Diatrium Pipercon simplex Italarum.

Consulè itaque Italarum pericissimî, doctè atque astutè cauendo, commendant Diatrium Pipercon paratum in rotulis è Piperibus tantillum contusis aut incisis, vt in ventriculo & intestinis cunctarentur, concoctionemque iuuarent; feruore faucibus, hepate, remotioribusque venis & visceribus ileitis.

Piper vtrumque.

Batauorum & Zelandorum ad Orientales Indos accurato, sagacissimo & splendidissimo nauigio illustrata & patefacta Pipèris nec non quamplurimorum Aromaticum historia fuit, quam dubiè & obscurè Dioscorides & Priscî posteris prodidere. Non modo iam multis elapsis

Piperis nigri legitima effigies.



annis Autuerpiæ Piperis grana muia condita longiusculos palmares pediculos racematiim è petiolis Piperis granis muia conditis circumdatos, habuimus; sed etiam hodie Batauorum & Zelandorum diligentia Amsterlodamunt folia cum fructu condita deferuntur, quorum nobis copiam fecit amiciss. & liberalis vir D. *Cornelius Coorne* Mesopoli Martiacorum simplicium rariorum studiosissimus. Folia, Laurinis æmula, nervosa, obsoleti (ob muriam fortè coloris viridis. Copiam Piperis cum aliquot libris Piperis albi legitimi attulit indica inhabitans illa navis magna oneraria anno salutis 1603. quæ inuitis naucleris Hispanis Medicacultrum Martiacorum velificauit, reuerentissima omnisque generis mercemionij ditissima, non modo Piper nigrum attulit, sed etiam album legitimum descriptum Aduersationum paginâ 427. Cuius Copiam nobis olim fecit præceptor *Rondelletius*, de quo plura in Stirp. Illustrationibus.

Dioscoriticum Galeni lb. 4. sanietatis ruen. 2.

Rec. Cumini,
Piperis longi, vtriusque,
Fol. Ruræ hccorum
Nitri, ana, partes æquales.

Diarhodan Abbatis.

EX Ros. multa colliria, & alia medicamenta Diarhodan vocantur. Sed cum nos Diarhodan dicimus, neque de Elethario solutino ex succo Ros. intelligimus, sed pul. graissimum & efficacissimum medicamentum ad corroboracionem viscerum cum aliqua laui apertione, circa cale-

Cuminum torrefiat modicè prius aceto, & extrinso maceratum. Alfas pars Nitri dimidia aut quarta adueitur.

Flatus potenter discutit.

Non debet dispensari, nisi imperetur quia pauci hodie vtuntur; Paratu enim omnihola facile.

faciliorem, cum laui refrigeratione. Quia verò multa sunt descriptiones, magis mihi placet illa Abb. ob id illam retinimus: nam communis Mesuei plura astringentia recipit, sed verò plura calida. Mihi non placent illa compositiones, quæ discedant à facultate illius medicamenti, quod nomen indidit compositioni, ut in Symp. de Hyss. factum est, & alijs multis. Illa descriptio non in omnibus eadem est, sed quæ sola desit in aliquibus, vel quando aliqua, quæ aliquid medicriter faciunt, auferuntur, vel adduntur, non debemus descriptionem reicere. Vix enim est vltimum medicamentum, diuersis in locis traditum, in quo non liceat aliquid discriminis inuenire, ut de Hyera Gal. videre est, de Magmate Hedicrai, Theriaca. Nobis autem descriptio hæc magis placet.

Rec. Ros. rub. amois vnguibus
Sacchari Candi, ana. vnci. 1. drac. 3.
Santal. Albi,
Rubri, ana. drach. 2. f.
Gummi Tragacanthi, &
Arabici, leuiter torrefacti.
Spodij ex Eboze, aut
Cornu Ceruino, vel
Antispodij de Myrtho, ana. scrup. 2.

Asari,
Mastiches,
Spicz Nardi,
Cardamomi,
Suc: Glycyrrhizæ,
Croci,
Xylo-Aloes primæ noræ,
Caryophyllorum,
Galliz Moschatz Nicol.
Anisi,
Foeniculi,
Cinnamomi,
S. Ocimi,
Berberis, siue aciuorum eius,
Setiolæ,
Portulacæ,
Quatuor Seminum frig. maiorum,
Papaueris albi,
Margaritarum, ana. scrup. 1.
Ossis de Corde Cerul. scrup. f.
Caphuræ,

Moschi, ana. G. 3: aut 4. fiat Puluis, ex quo tabellæ conficiantur, vel Trochisci, ut de alijs dictum est, cum aqua Rosarū vel Violarū,

* Rondel. continuatio.

* Sint qui quat. semina frig. maiora admovent. Ego certe in illorum sententiam veni-rem, quæ est Asuarij, ut expungerentur aut adderentur, eum est utendum, quia faciliè ran-

cescunt, & compositionem corrumpunt. Sunt, qui Cotallum addunt, & Cristallum, Mandragoram, & flores Nymphææ. Verum cum est apetiendum, non sunt illa tam insigniter sicantia, & refrigerantia recipienda: Vtræque enim solent obstructionem consummare. Hæc compositio quædam recipit ad sufficientem corroboratorem: quare illa prætermitti possunt. Papauer appolui, quia aliquam familiaritatem habet cum corpore nostro. Rhab. mihi non placet, quare expungendum censeo, quia altringit & laxat: Neutrum verò præstare potest in medicamentis corroborantibus, quale est hoc. Non melatet Auic. lib. de viribus cord. Rhab. & alia inter cordialia annumerasse, sed non consuebat, ut cordialia alterantibus miscerentur. Quod si in illis asseclibus sit laxandum, illa esse usurpanda, quia vires illorum principalium partium minus deiciunt. Quod dictum volo in vniuersum de omnibus medicamentis laxantibus. Caphuram non deleui, quia parua quantitas inter alia odorata non sentitur, vel minuat dosi ad gr. 3. tantum. Hæc facit penetrare medicamenta sua tenuitate, quæ insignis est.

L'Obel.

Diarrhodon Abbatis nomen sibi a Rosis, quia maiori pondere, tanquam basi præcipuoque agente in hoc composito medicamine recipiuntur, asciuit; eoque primum locum meritis, præcorum exemplo à Rondelle in hac compositione & Aromatico Rosato præponuntur. Pulcherrimum hunc Rondelleianum dispositionis ordinem D. Ioubertus, Bauderonus, & alij tacite consequuntur; quod ego ipse maxime oblectatus sum; nihil enim ad docendum, memorizque tradendum, ordine pulchro commodius.

Saccharum Candum, non ad conseruandum vires huius compositionis additum; ut Cordus ait, sed quia vim detergendi habet.

Triasandalon ex descriptione Nicolai.

Valeat eadem, ad quæ Diarrhodon Abb. sed magis refrigerat, & minus aperis obstruunt, & recipit hæc.

Rec. Santali Albi,
Rubri, &
Citri, ana. drach. 3.
Ros. rub.
Violarum,

Sacchari

Sacchari Candi,
Antisphag. ex *Myrtillo,*
Succi Glycyrrhizæ,
Seminis Porulacæ, ana. drach. 2. & scrup. f.
Gummi Arabici,
Tragacanthi leuiter assatorum,
Seminis Melonum,
Cucumeris Cucur.
Citruli mundatorum & minutim incisorum,
Sem: Intybi, seu Scariola,
Berberis, ana. drach. 2. f. Spica Celtica
scrup. f. loco Capbura.

* *Nardus Celtica Adusuorum pag 131.*

gariæ, quæ huic compositioni nomen dede-
 ruit. Prætermittit descriptionem *Serapioris &*
Aricemæ; illam *Nicolaï* hic ascripsimus, quæ
 habet pauciora Simplicia calida.

Rec. *Margaritarum præparatarum drach. 3.*
Nucleorum seminum Citrulli,

Cucubitzæ,
Melonis,
Cucumeris,
Seminis Porulacæ
Papaueris albi,
Santal albi
molchatellini, (quæ pars est interior odora-
tior albi)
Xyloalocis, (aut eius loco, Santalis rubri, quia
reddit compositionem nimis amara & ingrata.
Zingiberis,
Rolarum cubrarum,
Florum Nymphææ albæ,
Florum Borraginis,
Myrtillorum, ana. drach. 2.
Coralli albi & rubri, ana. drach. f.
Sacchari, q. s.

Consuetudo est, in hac compositione & a-
 lijs, usurpare medullas seminum frigidorum,
 & externas cortices abijcere; sed in ijs retri-
 geratio tantum est necessaria. Vbi verò retri-
 gerandum & siendum vel detergendum, se-
 ni in integra usurpamus, ut semen *Papaueris*,
Lactis &c. quia magis siccant & refrigerant
 sua lignosa substantia, quam interna parte. V-
 bi verò pulvis ad expectorationem, ut in *Dia-*
tragacantho frigido, & *Dia-Iride*, interna pars
 tantum expetitur.

Diatragacanthum frigidum.

Et *Tragacantho* due sunt denominata com-
 positiones. Altera calfacit, & à caliditate
Diatragacanthum calidum dicitur: altera re-
 frigerat, & à frigiditate, siigidum vocatur. Hac
 enarrat fluxiones, frequentiusq; usopatur. Ob
 id paranda est sola, prætermittit calida.

Rec. *Penidiarum unc. 3.*
Tragacantha alba unc. 2.

Gummi Arabici drach. 10.
Amyli unc. f.
Glycyrrhizæ rasæ quatuor sem. frig. ma. munda-
torum ana. drach. 2.

Semen Papaueris drach. 3.
 Hac compositio ad infestationem catberri va-
 let: quare oportet illa omnia conspiciare ad inera-
 sitionem: Ob id quæ sunt minimum detergentia,
 & tenuissima partium, vel calida, in hac recipi non
 debent.

Huic descriptioni vix reperies similem. Nam
 in dispensario Hispano *Capbura*, *Amalum*, ne-
 que si men *Cucumeris* reperitur. Habet violas,
 quas habemus *Sacch.* scripsit *Nicolaus*. Ego
Rhab. expunxi, propter rationem dictam: *Amy-*
lum quoque, quia obstruit & pugnat cum seque,
 non refrigerat, neque aperit. Rosas reliquimus,
 sed in secunda doli: ne maior quantitas vasorum
 apertionem impediat, & s. f. f. illa quantitas
 sine *Rhab.* vel alio astringente ad viscerum cor-
 roboracionem *Sacch.* non expunximus, quia de-
 terget, & satis magna est quantitas. commixto-
 rium *Glycyrr.* succo, quia leniter deterget. *Lac-*
chrymas oportet asse, *Tragacanthum* in *Hispa-*
nica ponitur; nisi uideretur, aliterum cerere expun-
 gendum. Quod si leniter assantur, ut deponant
 leniter, nihil impediunt. *Capbura* expungenda
 censet, quia suo odore ingratisima est, maxi-
 me in hac compositione, in qua odorata ante re-
 peritur, quia talem odorem & s. f. f. castigare, ne-
 que illius loco aliquid ponendum censet. Quod si
 contentas aliquid substituendum, nam nihil *Spica*
Celtica concedam ad aliorum penetrationem.
 Quidam flores *Nempharis* apponendos existi-
 mant, non ob refrigerationem, sed ob tenuitatem
 suam, quod mihi non placet, cum *Spica Celtica*,
scrup. f. ad hoc sufficiat. Hac compositio debet
 frequenter dispensari, & conservari in vase ter-
 reo vitreato ne rancefcat ob sem. frig. ma. qui-
 bus rancidis, nihil ingratisimo esse potest.

Diamargariton frigidum Nicolaj;
 quia suo loco emissum fuit; a
Rondel. postea additum
 fuit his verbis.

Quia in frequenti usu est, parari potest, sed
 in parua quantitate, quia omni tempore
 parari facile. Constat seminibus frigidis, quæ
 facile & citò rancefunt. Reperitur descriptio
Plucwig, sed imperfecta: Desiderantur Ma-

debet. Consilio igitur quibusdam & semen Rynæ, & Caputratum praetermissum. Semen Papaveris non est amittendum, quia ob frigiditatem efficacissimum est in hoc remedio. Semen Rynæ in quibusdam veteribus exemplaribus Nicol. legebatur, sed ingratum est, & calidum neque valde ratio, quæ confirmant prædicti, in talibus Semen Nasturtij, alij Spicam, Cinnamomum addenda esse ad penetrationem: nam partes, in quibus incrasationem his remedij molimur, non admodum profunda sunt: Adde quod illa sem. fri. ma. ad hoc sufficere possunt: Hac medicamenta ex detergentibus & incidentibus parata, non præstant id opus, ad quod præscripta sunt.

* Caputratum Spica ob odorem ægrii inuisa.

Dia-Iris simplex.

AB Iris duæ compositiones nomen habent. Altera dicitur simplex, altera à Salomone dicta. Hæ compositiones sunt arteriæ. Utraq; parari potest. Prior, scilicet simplex sic conficitur.

Rec. Iris Veneta vel Florentina unc. 1. f. Sacch. Cand. Diatragacanthi frigid. ana. drach. 2.

Fiat pulvis, vel cum Sach. dissolutus, non succo Limonium, neq; albumine oui ad adedum, ut quidam vult, sed aqua Hysopi, fiat Electarium. Hac compositio potius ex Veneta, quæ Iris est Illyrica, & melior paranda, quàm ex Florentina, est candidior videtur. At Veneta quidem sturior est, & magis ab antiquis probata. Diatragacanthum hic ponitur optima ratione, quia us habent nostra exemplaria antiqua Nicolai Pizopoliti. Ne me laet aliquos legere simpliciter, Tragacanthum frigid. sic cum sit calidum, nullum hoc epitheto reiiciendum puto, & injiciendum pul. Diatragacanthi. Hic pul. Diatragacanthi ab humida recipi ad prohibendum exsiccationem pizopoli in iura. Aliqui volunt excipere albumine ouium, quod mihi non placet, quia nimis auerisset, & irrisisset. Idem Author cum succo Limonium parari concedit. At id minus convenire videtur propter suam aciditatem. Sed si vellet in Eclegma servare, cum Symp. Capil. vel excipiat, vel cum Sacch. fiant formula. Hanc frequenter dispensare ob Diatragacanthum frigid. oportet, quia citò & facillè rancescit.

* Aliqui Pharmacopoeia Gallia, albumen & succum Limonium addunt, ad candorem agitando conciliandum. sed in alij.

Diairis Salomonis, descriptione

Nicol. Myreseri.

EX Iris arteriæ cum dictum Dia-Iris Salomonis, quæ compositio ab alijs in forma, &

neris, ab alijs in forma Eclegmatis præscribitur. Varia forma est, si in Eclegma referatur, conveniens erit: tam aliqua sunt, quæ respondent formam pul. ut caro Ficuum pinguium, caro Passul. & Datylorum, in qua forma etiam ardens rancescit nuclei Pinearum, & amygdal. & quare & nos in Eclegmatis formam servandum censuimus.

Rec. Iris. unc. 1.

Puleg. hysopi sicci, Glycyrrhizæ ana. drach. 6. (* Passul. mundatarum ab acinis, Caricarum pinguium, Carnum Datylorum à filis mundatarum, ana. drach. 3. f. Tragacanthi, Amig. d. mundatarum, Pinearum, Cinnamomi, Zinziberis, Pip. nigri ana. drach. 3. Syracis rubr. drach. 2. & scrup. 1. Moll. q. f. fiat in formam Lynctus vel Eclegmatis.

Hac compositio, ut supra monstravimus, in forma humida debet parari, & scopus idem docet. Hoc tamen mihi videtur immutandum, quod Syracem Calomitam, potius quàm rubram immitti debere videatur: Nostra rubra tota arida est, quia ex ea hodie Syrax liquida extrahitur. Aduarius Syracem ponit sine epitheto, Quare de Calumina Syrace intelligendum est citius, per illam & coeruleam regulam, quia cum simpliciter aliquid pronuncietur, præ præstantiore est intelligendum.

* Quæ parentesi includitur, non ab Aduario ponitur: 1. In ponderibus variat leuciscopulata; additur quæ in tercio ordine sunt Syracis drach. 5.

Zinziberis descriptio.

EX argutè fallacibus picturis aut iconibus, et si a probis amicissimisque viris munere missis) oratione plantas delineare, quàm dubium sit, norunt harum petitione. Annis triginta & plures elapsis, antequam nostra Stirpium Aduersaria in lucem prodirent, Antuerpia Londinū ad me misit Zingiberis effigiem *Guilielmus Dreisch* pizæ memoræ, ut petitioni meæ satisfaceret, quàm legitimam esse assecebat; facillè enim fidem illi adhibui, quia sciebam Zingiberis radices adedè recentes, virides & succo adhuc pregnante, Antuerpiam sæpè ex India deuehi, ac proinde Zingiber legiti-

um

nam in hortis prædicti boni viri pullulasse : sed paucis post annis , cùm pictura mihi suspecta foret, perspicuè percrepi Zingiberis iconem , munere missam , commentitiam & effigiatam é quodam veteri Botanico Germano esse. Dolum hunc cuni diutius latere nolyerim (quoniam nec dum elapso aucto , nouus variarum rerum , rariorùmque Indicarum Styrpium author Ioannes

Hugo Linscottus Batavus, non nisi illegitimam Zingiberis effigiem dederit , qui tamen verè inter nonnulla aromata Zingiber describit) posteritatem ab obliuione vindicaturus huic commendatissimæ Plantæ, dedi operâ vt infereretur in nostra *Balsami explanatione*. Detegimus quippe hanc elapsi annis Flisselingæ Zelendorum in hortu illustissimi Principis *Mauritij à Nassau* apud egregium virum Dominum *Adrianum Menlenaere*, qui plures eius Plantas nobis communicauit, quas alebat solo leui, lateritijs fragmentis rubris, quo gaudet, tenuibus permixto. Laxauit autem & emisit ibidem primas suas, non ante , circa finem æstatis pullulationes (quæ é longinqua Prouincia delata, diuque à terra euulsa fuerat) folijs & calamo sesqui spirhamto aut pedali, nouellam siue nuper enatam Arundinis vallatoris præ se ferentes. Natiuo solo non translata radices, caules tripedales edere produntur. Eodem anno 1595. persimilis aut eiusdem Zingiberis radices alebant Flisselingæ amicissimi viri *Ruherus Vander Putte*, & *Thomas de la Fosse* Middleburgi Zelendorum Pharmacopæj non modo peritissimi, sed pharmaco parando fide fidelissimi, quas ob soli & cœli inclementiâ perijisse scio, quemadmodum interire elapsi annis insignes recentissj, Zingiberis radices hyemis iniuria, in pensilibus hortis nobilissimi Baronis *Zodche*.

Zingiber nasci plerissj, India locis tradit *Linscottus*, instar Arundinis Vallateris, binos aut ternes dodrantes, binosj cubitos raro excidere.

Zingiberis siliqua credita cum grains suis :

P'ro solita humanitate sua siliquans perelegantem ex occiduis Indijs delatam, mihi quondam largius est, vir egregius & vetus amicus D. *Hugo Morgannus*, S. Elizabethæ Angliæ Britannorum Reginae Pharmacopæcus peritissimus, corticofosam, triquetram, duriusculam, villis quibusdam & eris obductam, perisilijs siliquæ Chantæ Iridis per eâ parem, albidam, semine lucido fardâ Melegettz quadrantenus ; sed albo, gratioreq; guttu multo, Zingiber profumè testasse, eoq; Zingiberis

ZINGIBERIS legitima effigies : Britannij Ginger.
Gal. Zingebre. Reddenda Aduer. pag. 33.



siliquam dixere , qui Zingiber Iridis speciem sanxere : quate omnes illas Cardamomi siliquas triquetras consimilium esse Plantarum non abs re quidantentur, vt in Styrpium Aduersarijs monuimus.

Diapenidion Nicol. Alexandrini.

EX *Pemidij* paratur medicamentum, quod constat ex detergentibus & incidentibus : sed vulgus medicorum quod vti illa compositione ignorabat : prorsus ex vna duas fecit, separando odorata & incidentia. Illam vocant Diapenidion

an sine speciebus. Nos primum integram, deinde illam truncatam sine speciebus distillam ponemus, qua ferè in omnibus duces est. Vulgatam malimus sequi, quam illam Almaini, qua mutila est. & recipit qua non debet, ut semen Perulace, Nos verò sic parabimus.

Rec. Penidiarum lib. 1.

Pinearum,

Amygd. mundatarum,

Sem: Papaveris albi, ana. drach. 20.

Cinamomi,

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Succi Glycyrrhizæ,

Gummi Tragacantæ.

Arabici,

Amyli,

Quatuor Sem. frig. ma. mundatarum,

ana. drach. 10.

Camph. drach. 1.

Rondel.

Hæc Compositio à nobis posita est, non ut dispenseretur, sed ut videatur, quale sit illud Diapendion sine speciebus. Ferè omnes dissentiant in ponderibus. Alij verò drach. 3 s. Consentit cum illis Actuarius, drach. 16. præscribat. Alij Licij, drach. s. addunt. Item in pondere Pap. Amygd. & Pinearum, alij drach. 20. ut nos posuimus: Alij verò drach. 3 s. Consentit cum illis Actuarius: sequentium scilicet, Cinamomi, Caryophyll. ana. drachl. 10. Nicot. ponit, & alij ponunt drach. 1 s. Camphoræ. Alij legunt tertiam partem scrup. vnius: Alij Amygd. Amar. addunt quas prætermisi, quia nullibi leguntur. Hoc modo, quo nos apponimus, confectio dispensandum si quis velit ut quia proportio melior est: & erit cum erit efficacissimum, tum ob illam quantitatem Amygdalarum & Pinearum. Neque repugnat Papaver, quod sua vi narcotica rursus minuere potest. Quod in illo magno pondere reperiantur aliqua, cerè Camphoræ quantitas erit seruanda, in quo sunt omnia integra magis. Syr. Violato omnes excipiunt, lento igne decoquendo Penidias, deinò Pul. subijciunt. Diapendion sine speciebus erit, separatis odoratis, quæ species vocantur, scilicet ablato Cinamomo, Caryoph. Zingib. Constabit igitur sequentibus.

Rec. Penidiarum lib. 1.

Pinearum,

Amygdal. dulc. sem. pap. albi succi Gly.

Tragacantib.

Gummi Arab.

Amyli quatuor sem. frig. ma. ana. drach. 10.

Camphora scrup. 3. cum syr. viol. fiat ad for-

mam Elegantis. Quia hodie omnes volunt in pul. ut ex eo conficiantur tabula, dissolue Sacch. in aqua Viol. & fiat tabula. Parva quantitas dispensanda est, quia diu non servantur pulveres, nisi sacco coriaceo reponentur, vel vase vitreo. Loco minus calido & sicco seruandum erit hoc medicamentum arteriacum.

LOHOCH SIVE ECLEGMATA.

Lohoch sanum & expertum D. Mesua.

Rec. Cinamomi,

Hyssopi,

Glycyrrhizæ, ana. drach. 4.

Junibarum,

Scheffen ana. numero 30.

Passularum enucleatarum

Ficuum ficarum

Dactylorum pinguium, ana. vnc. 2.

Famugraci, drach. 5.

Capilli Veneris m. 1.

Anisi, Foeniculi, Ireos, Seminis Lini, Calamintha, ana. drach. 4.

Coquantur secundum artem in aqua clarissima lib. 4. ad consumptionem lib. 2.

Colatura expressa adde,

Penidiarum lib. 2.

Coquantur ad perfectionem, postea inferge subsequentiā minutissimè inersa & tusa.

Rec. Pinearum mundatarum, drach. 5.

Amygdalarum dulcium mundatarum,

Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici,

Amyli, ana. drach. 3.

Ireos drach. 2.

Agitentur omnia simul celerrimè, donec albescant.

TVSSI vocis sive asperitatis à frigidityte usque auxilio est, crassus in thorace & pulmone humores externas.

Eclegma sive Lohoch de Pino D. Mesua.

Rec. Pinearum drach. 20.

Amygdalarum dulcium

Antillarum assatarum,

Tragacanthæ,

Gummi Arabici

Glycyrrhizæ

Succi Glycyrrhizæ

Amyli Capilli Veneris

Ireos ana. drach. 3.

Cornium dactylorum drach. 35.

Amygdalarum ana. orum drach. 3.

Mellis passularum,

Butyri recentis,

Sacchari Tabarzath ana. drach. 4.

Mellis

Asellus Tabarzech, lib. 3. vnc. 1. drach. 4.

Conterenda contundantur, & incidenda inciduntur minutissime, & cum melle excipiantur.

* *Mel Tabarzech est optimum, sincerissimum atque odoratissimum uel quale ex Danisco affertur.*

P. C. SCHOL.

Amigdam. drach. 3. Cum Cordus hic peruersi vici, 3. posuisti, drach. 3. tantum legendas esse, Fuschio quique asipulante, dico.

T V S S I diuturne, difficultati spiritus, & Asthmaci succurrit humores in thorace crassos incidit, & extenuat.

Lohoch è Papauere D. Mesua,

Rec. Papaueris albi drach. 35.
Amygdalorum dulcium,

Pinearum,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Succi Glycyrrhizæ, ana. drach. 10.

* Amyli, drach. 3.
Seminis Portulacæ, Seminis Lactucæ,
Seminis Cytoniorum, ana. drach. 4.
* Croci drach. 1.

Penidiorum albarum vnc. 4.

Syrupi de Papauere lib. 3.

Omnia contundantur & incidantur atque cum Syropo excipiantur secundum artem. Porro iste Syrupus de Papauere sic fieri debet.

Rec. Capitum Papaueris albi recentium,
Capitum Papaueris nigri recentium,

ana. vnci 6.
Seminis Lactucæ
Florum Violarum, ana. vnc. 1.

Aquæ quantum sufficit, aut lib. 8.
Coquantur, & colaturæ adde

Sacchari lib. 4.

Coquantur ad spissitudinem.

Hoc Lohoch de Papauere appellatur etiam alio nomine Dispapauer.

Iuuat rufum, & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui (quem spumum liquidum indicat) eum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

Lohoch è Scylla D. Mesua.

Rec. Succi Scyllæ
Mellis despumati ana. lib. 1.
Coquantur secundum artem.

SCYLLA propriè succum non habet, sed mucilaginem; quæ sic est colligenda:

Rec. Scyllas crudas tres aut quatuor, eius laminas priores, plenas & moidas, in partes incidito cultello eburneo: deinde in pila sine mortario fictili aut lapideo sine marmoreo asterito cum agitato ex ligno Gaiaco sine sancto facta, & deinde exprime & utere.

ECLEGMA è Scylla, materiam crassam, lentam, coctum difficilem, in partibus respiratorijs, expelli facilius strenuè reddit, & notam inde spiritus audi difficultatem, & thoracis dolorem leuat.

Eclegma sine Lohoch è Pulmone vulpini D. Mesua.

Rec. Pulmonis vulpini siccati
Succi Glycyrrhizæ
Seminis Anisi
Seminis Foeniculi
Capilli Veneris, ana. vnc. 1.
Sacchari clarificati, vnc. 15.

Conterantur omnia tenuissime, & cum Saccharo excipiantur.

Abstergit & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, & præ ferendum est alijs remedijs in phthisi.

Lohoch ad Asthma D. Mesua.

Rec. Scyllæ assatæ drach. 3.
Radicum Irtidis drach. 2.

Hysopi
Prælij, ana. drach. 1.
Myrrhæ ruberæ,
Croci, ana. drach. 1.

Cum mellis quantitate sufficiens fiat Lohoch.

Ad Asthma & tussim antiquam valet: humorem enim crassum tenuat.

Rosæ nonella Nicolaj Alexandrini.

Rondel.

HAc compositione carere possumus, quia viribus non differt ab Aromatico Rosato. Sed quia hac frequentissime vtuntur noslii; nos eam apponemus, non ex Præposito, sed ex Nicolao Alexandrini. Receptaculi, immutatis ponderibus.

Rec. Rosæ rubræ } ana. vnc. 1. drach. 1.
Glycyrrh. } scrup. 2. f.
Sacch. Candi, }
Cinnamomi drach. 2. scrup. 2. gran. 2.
Caryophil.
Spicæ Nardi,

Galangz

Galangæ
Zingiberis
Nucis Mosch.
Zedoariæ,
Seyracis Cal.
Cardamomi
Apij. ana. scrup. 1. gran. 8.
Fiat pulvis.

Hic est prætermittendum Sacchar. & Candum ponendum, quia Sacch. ad deterfionem ponitur, & ad temperandum simplicium acrimoniam. Quid si in forma Confectionis, ut solebant antiqui, paratur addatur Mel, vel Sac. dissolutum, & fiat Electuarium. Sudores nimis arces, & viscera roboret.

Saccharum Rosatum, Manus Christi cum Perlis.

EX Sacch. dissoluto fit Sacchar. Ros. tabulaturn, ad differentiam Sach. Rosat. quod est Conferua Ros. Ex eodem fit Manus Christi simpliciter dicta; fortè differunt figura, quod nunc in frusta, nunc in tabulas dividatur. Fit cum Perlis & manus Christi perlata dicitur; additis Margaritis tenuissimè tritis, ad vnc. 5. pro lib. 1. sacch. id est vnc. 12.

Dulciariæ Morfiumculæ Regales, quæ vulgò Morjelli dicuntur & Massa Regalis euclyma (sordidè Officinarum latinitate, Fausta.)

Rec. Pulpæ Capi Veru inassatæ vnc. 2. f.
Pulpæ Perdicis aut Phazani affi,
Strobilorum Rosacea infusorum & concalfactorum & mundatorum, ana. vnc. 1. f.
Amygdalorū dulcium mundatorum, vnc. 2.
Fistulorum Rosacea item infusorum & calfactorum, vnc. 1.
Pul. Cinnamomi selectissimæ drach. 6.
Sacchari albi, vnc. 18.
Aquæ Ros. q. s. Fiant ex arte Morfiumculæ.
Adduntur Margaritæ preparatæ, species cordiales, & alia pro ratione implicationis morbosum, & scopo doctissimi Medicorum.

Ad tabidos Morfiumculæ dulciariæ.

EAdem artis lege, & paritione concinnantur tabidis Morfiumculæ ex carne Testudinis nemoralis.

Calculosis, ex decocto Herniariz, radicum Anonidis, Altheæ, Glycyrrhizæ, Simphiti, Succino preparato, & huiusmodi.

Elephantiacis vetò, ex Esmacci terrestribus & Viperarum carne. *Disse.*

CONFECTIONES OPIATÆ vel NARCOTICÆ.

PHILONIVM.

Philonis Autidotus carmine scriptus dicitur: A Galeno soluta oratione traditur, quæ ordine sic disponemus, quo etiam transcribitur à Mesuo.

Rec. Piperis albi,
Hyoscyami, ana. drach. 2. 00
Opj. drach. 10.
Croci, drach. 5.
Pyrethri,
Euphorbiæ,
Spicæ Nardi,
Castorei,

Mellis q. s.

* Adversariorum pag. 427.
De Sac. catonibus Opiatis & LAUDARI Opiati differunt in Adversariorum a vera parte, inter Solcos Medicatos.

Philonium Romanum, siue manus Nicol.

Rec. Pip. albi,
Hyoscyami albi, ana. drach. 5.
Opj. drach. 2. f.
Cinnam. drach. 1. f.
Sem. Apij. drach. 1.
Sem. Petro, Fœnic. Past. silvestris, vel Dauis
Cretici, ana. scrup. 2. & gr. 5.
Croci drach. f.
Spicæ Nardi, Pyretri, Zedoariæ ana. scrup. 1.
& gran. 5.

Euphorbiæ, Castorei, ana. drach. 1.

Mel diffundatur ad triplum pondus.

* Hac compositio ad eandem valet, ad quæ Assine criton, ad dolores cholicos omnes & nephriticos, ut Philonium Mesues. Quare si quis vult dispensare, dispensetur hoc modo. Id solutum mutandum videtur, quod Hyoscyami drach. 2. f. ponere oportet, & opj. drach. 2. f. pro drach. 4. quia secularius est vti Opio, quam & hyoscyamo. Hac parari debet, quia secularius & iam a vulgo receptus. Has ob causas hanc compositionem retinimus: quia cholicum est medicamentum, dolores suspensando, & morbi dispositionem tollendo sedans. Accommodatus erit ad nephriticos, arthriticos difficili respirantes sunt discutiendo. Ad eandem scopum valet Regulus Nicholus, nisi quod maior valet ad vlcera, & sanantis fluxus, ob res.

* Quia prop-
ter oporem
infusum
gignit.

quoniam ob causam, lector optime, te ad meliora quod-

dammmodo revocare videmur, dum pro viribus admi-
nistrare veterem illam Andromachi traditionem ad genui-
nam Graecorum lectionem emendare. Et ne ex illis
tibi a nobis imponi, consilium fuit quibidam annota-
tionibus reddere rationem cui a iam vulgata illa de-
scriptione recedamus, idque addendo aliqua quae nova
fortan tibi videri poterunt, ac eripiendo quae nunquam
ab Andromacho excogitata fuerit. Sed vno ab his peto
ut ne veteri rubigine adductus huc sine ratione improba-
veris, ne prius apud te probe examinaueris, quae pro-
desse & iuvare soleant.

Varia Theri-
aces composui-
mus.

Alii morfus.
Serpentis ge-
nus.

Cum igitur variae sint Theriaces descriptiones a di-
versis Antonibus traditae, in tanta rerum varietate di-
cilius erat electio: omnes tamen ad veram illam Galeni
lectionem conuertimus, cum easdem omnes truncatas &
vitasas offendissent: hancque veram ex Antidoton li-
bro secundo famus: quae est perfectior videtur; aliqua
tamen desiderabantur innotia temporis et illa, quae nos
pro virili sectamur ex Galeni, Pauli, Aetii, Auerrois,
Aetiani, quae locis, ut postea in Annotationibus declara-
bimus.

Nos itaque temperatis doctissimum in possibiles
quodammodo emittimus hanc Theriaces consuetu-
dinem absque posse, his moti rationibus; tuas quod Vi-
peras non habemus, quae sine hoc in negotio primas
tenent, praeterea Balsamum, Alaphum, Cinnamo-
num, Myrrham, Rhaponticum, Calamum aromaticum,
Thu, Nardi Spicam, Pentaphyllum, Schorobanum, Di-
ctamnus Cretense, Sigilum Lemnium, Thapsi, tum
quod omnibus in cognatum dicunt e cordium. Miror
eos non addidisse Malabathrum Aegyptium, Accutum, Bi-
tumen Iudaeum, Opopanax, Galbanum, quod non
nisi adulterata adhaerant, ut quibusdam placet. Sed
nos eorum rationibus faciemus satis: a. huiusmodi enim
est illa medicamenta in illa existimare quae a Galeno in
veteri traduntur, et tunc omnia adfuit. Multa si quidem
ipset Gal. suo tempore desiderabat, in quorum locum
ut Galenus proponat. Nunc Gal. pro Cinnamo-
mo, Cal & duplum ponendum iussit ino & Phut
& pro oleo Sabino, oleum antiquissimum pro Ompha-
cio, oleum paratum cum folijs oleae? quod prohibet
Acorum poni pro Amomo, quoniam Acorus cum Amo-
mo, similes facultatem obineat? pro Distam no Pule-
gioni? quod est virei paulo inferiores habet, augmen-
tum dosin: pro Opobalsamo, Syriacum liquidum: pro
Rheoponno Rhubarbarum: pro Terebinthina, Masti-
chen: pro Viperis, Flopes, Ophias? Sed quid moror?
Clarius sunt quam ut de demonstratione aliqua egeant.

Passilla Sci-
llicia.

Atter habet
Ophias.

Consilium itaque ab his causationibus factum esset,
sitatum oportet collocare in Invenientes succedant,
quantum in causandis aliorum inventa. Cessant igitur,
preco, bona medicamina infamare, & quam pra-
viam opinionem solent imperitiae multitudine iradere,
omitte.

Alias mihi,
Alias perve-
nire.

Scilla dele-
bilis, Advers.
97.

Alii legunt
carripia.

Tempestivum? nunc videmus ad Simplicium decla-
rationem venimus, hoc vnum prononcent, pondera non
respondere ponderibus Andromachi iunioris vel Leo-
nocrati: nam Democritus drachmas duas tantum Po-
lij, Scilicet, Thapsi, & aliorum vsque ad Cardamomum
ponebat, iuberatque illos qui constitueret quatuor
quod tamen se et omnes qui de Theriaca scripserunt, fa-
ciunt; quoniam modum Gal. Paulus, Aetius & Anticenus,
quos secuti sumus. At de differentiis ponderum vide Gal.
de Theriaca ad Piletem.

Theiaca ve-
dis dila.

Theriaca nobilissimum medicamentum dicta
est quod valeat aduersus Sypha, id est, bestias venenosas,

non autem, ut quidam existimant quod viperas (ita simpli-
ter nomine ob excellentiam, sed lata in propriis) recipere
nam antequam addidit essent Viperae, etiam Theriaca
dicebatur: huc accedit quod multae sint Theriaces de-
scriptiones, ut iam diximus, apud Gal. in Antidotis q. &
Viperas non habent. Non igitur a Viperis, sed ob ef-
fectum ita fuit appellata. Pollicentem defendi. Theriaca
enim etiam dicta fuisse a Viperis, iam videmus. Ceterum
haec Theriaca Galeni, non Galeni non innotuit, aut si in-
notuit, iussit id est tranquillam, vel tranquillitatem afferens,
non Galeni, auctor enim huius non fuit Gal. sed Rex
Ponti Mithridates, qui, ut erat exercitissimus in gri-
phebus, omnia ea collegit Antiphrasica, flores scilicet
semina, herbas, radices, gumma, & cetera quae valeant
aduersus? virus ferarum, Viperaum, Caneum rabido-
rum, Scorpionum, & Didam, & cetera nec non ad asceras
venenum medicamentum quorundam, ut Mandagora-
tam, Cicutam, & cetera ad morbos alios complures & an-
quos. Ex his omnibus collectis scilicet & efficacissi-
ma selegit, ex quibus paravit compositionem suo nomi-
ne nuncupandam: ea est Mithridaticum: Andromachi
postea (qui videtur inter omnes tractissimum calluisse
norma componendi medicamina) cum contextit & emen-
davit: addiditque Viperas, & aliamque vocavit, id est,
Tranquillam, quod tranquillitatem inducit: & merito
quidem: quid enim magis meretur tranquillitatis no-
men quam quod laedit dolorem? Qui a Cane rabi-
do morsus sunt, ut Vipera, aut alia fere venenata, nullum
torquentur morboque de morte sunt soluti: hanc com-
positio illis curat: magnam igitur tranquillitatem in-
ducit. Ut in summa dicam, nulla est praestantior Anti-
dotus ad antiquos & diuinos morbos, ut iam diximus
est. Ad defensiones nullum est genus remedij efficacius
quam haec Theriaca, si quidem fuerit recte. Febres
quantum solo vix Theriace vix sunt curatae, quid
non facit Theriaca inexpressibiles morbos, & quorum cau-
sa ignota est, curat; ex omnibus enim medicamentis ef-
ficacissimum constat, symptomata iuuat.

Passilla Scillicet & Scillicet aliter prepara-
mus quam antea facere solebant: nam sine delecta
Pharmacopole Scillam vel Pancratium accipiant, quod
habeant eandem facultatem. Sed quoniam Pancratium
vix habet imbecillitatem, melius est conficere eos & Scil-
la, praesertim cum nobis facultas sit. Si Scilla careamus,
Pancratium vti possumus eius loco, sed in maiore do-
si, Scilla pro Cinnamomo: eum vero adest Scilla, fametur
Scilla. Ceterum passilla hi fieri debent ex carne Scillae
& spissam farina Ophi, quae valet aduersus venena,
& conferunt Scillam a putredine suo amare, Pharmacopo-
peri eos solebant pitare cum pane alio, aut cum Vicia,
cum non noissent Eruium, et nec adhuc videretur. Eruium
enim nuper Auenionem fletum, & medicamentum
praescriptum Nobili a Moolan, in quo Eruium delecta-
deratur, iussit Pharmacopolam adferre Eruium, asque
is Vicam attulit & Phacem; cum neutra illarum sit
Eruium, quod a naru n est & tenuium partium & Vicia re-
do daleis & emphrasticis. Porro Eruii duas constituit
species: Alam enim eadem omnino faciem, alam ruffam.
Eruium est quod vulgo des R. vocant; io Gallia Narbo-
nensis Epus. Quod ad Scillae delectum attinet, ex fungen-
da est citare, praesertim tunc initio, ad parandos hos pas-
sillos: nam enim multum fucci habet: si hyeme legatur
non valet, f. b. Caulis vero venenum est: habet enim
tantam acrimoniā, ut affus? corrupta in venenum de-
bitur. Sumenda itaque est? ere aut aliamque. Haec le-
da inciditur inustulatum more coparum, non quidem
cultero aut instrumento ferreo, sed arundinaceo, aut
Oleo.

* Maiores nostri soliti erant parare **PASTILLOS** **THERIACALES** ex Serpentibus communibus, cum Viperas non haberent. Nec omnino certe vituperandi sunt: idem enim præstant reliqui Serpentes: sed Viperarum vis est efficacior. *Depla* Græci animalia appellant (ratione significatone accepto vocabulo) quæ cunctari non possunt: Medici vero *Depla* quæ moribus venenato vel puncta venenosa iaculantur, hominibus nocent, appellant, sub quo nomine & *Aspidæ*, *Elopes*, & *Cerastes* comprehendunt; quamobrem non erit absurdum Trochiscos Theriacales dicere, cum ex feris consiciantur, quæ & facultate sua iuvant quemadmodum Viperæ, & si ausim dicere, convenienciores sunt, præter enim id quod calefaciendi & exsiccandi vim habent, aduersus angues nostros peculiariter iuvant? Nam Theriaca, ut auctor est Gal. ad Priscum, olim citra ferarum commixtionem confectum medicum eorum similem ad eummodum mirifici faciebat. Sed postquam Andromachus Viperas commisit ad morbum Viperarum, medicamentum fuit efficacious: imò si credamus Gal. lib. 2. de Antidotis, Mithridatica composio aduersus plurima venena valet, præter Viperarum iusculum. Nihil igitur habuit Theriaca adeitis Viperis, quam quod ad Viperarum morbum sit efficacior: Sic nostrum nec carent in efficacius erit ad morbum Serpentum, cum nullam nobis periculum immineat à Viperis. Adde quod pinguedinem Serpentum in quibus exiguatur plurimum valere, & cames non plures veneni in se continere quam olim habebant Viperas, si debito modo exhibeantur, & quales oportet capiuntur? Nam & in capiendis delectus seruandus est, quemadmodum & in Viperis: Vt quæ prope mare degunt, *Aspidæ* sunt & quæ in aquis excrementolæ, & quæ vitem gerunt repudiandæ. Quæ æstare veniunt, vel hyeme nos *Elopes* vel Angues bene nobiles in vincti degentes, vere capros eligimus, non diu assecuratos (ut solent loquere Pharmacopoli) & preparatos, ut ars iubet, cum pane asso Trochiscos conformabimus: si feruor & exsiccatos; ut neque sium redolent, neque carenti senserint. Quod si videatur Venenis Doctoribus dosim augendam esse, quia imbecilliores sint, non improbo: quod si quis Viperas nancisci possit, ut iam facimus; eas capiat, & angues omittat. Paulus Ægineta etiam de Viperis loquens sic dicit: Ea autem locuto esse videtur per excellentiam, quo commune aliquod vocabulum est singulari attributum, unde & *opis* Viperas vocit. Cum autem simpliciter legitur *opis* de Viperis intelligendum quia præstantissima inter serpentes est. Unde & in Theriaca assumenda; oon quoddam remedium egerimus aduersus illarum morbos, si qui sem in nostris Regionibus non reperiantur, sed ob alias viperæ facultates: deficiant enim vehementer, calefaciendi, & visum acutem. Viperas nihilominus veras tum in Italia, tum apud Pictones habemus, quicquid dicant qui id negant: Certissimum enim signum est Viperæ & nota certissima, si vivum animal pariat, ut Galeus; unde & nomen habet, ut scribit Aristoteles, & expecti sumus in nostris siliis: Adhuc Viperarum de capite tam exasid illis enouentur ut nihil magis; & maxime ea quæ tradita est Acto viro perquam diligentissimo in describendis Viperis. Ut vnum de multis notam ad feramus, statim in cradum deficiunt, quam trasissimam habent inter reliquos serpentes (præter Amphibegnam, quæ adeo exasim habet ut bina putetur habere capita): omnes denique noxæ felicitate reperiuntur in ea. At dicit aliquis, Elephanthus non curat, ut scribit Gal. Ego si mentiri voluit Gal. quid tam? neque enim verisimile est te nupte Gal. curari potuisse Lepam iam confirmatam. Sin autem quis dicat, id non ideo præ-

stare quia ex Italia adferantur, quæ regio non sit satis calida: Nugæ; si enim venenosi retinent, curneo & aliiis facultates: Nemo igitur dubitet quin veræ Viperæ nostris temporibus reperiuntur.

Porrò ut consiciantur Passilli Theriacales, præparatione omitta, hoc tantum ex Gal. addam, melius esse paulò ante capras sumere, quam diu retentas; nam quæ diutius retentæ fuerunt, venenosi sunt magis, ut ex hominibus ieiunis consuevit licet.

Andromachus *MAOMA HANYCHROON* ita à *Magma* Hedycoloris iaculantur appellatum, oon Trochiscos de Cortallo, ut Nicolaus Pizopinus saltò putauit, desiderat. Multo satius fuisset si Trochiscos Alindacarum Anticennæ posuisset, vel Trochiscos Hedychroi, quos anno tantum in Asolatorio, qui est Tamaricem recipiant, Aspalathum desiderant; oongus tamen accedunt ad Hedychroi composioem quam hic constituimus ex Gal. lib. ad Pampulianum. Hæc enim parata facilius est & clatior & melior. Nam in lib. de Antidotis pedestri oratio scripta est quæ Maron & Amatacum desiderat. At Maron nobis prioris incognitum est, nisi illa sit quæ vulgo *Marialum* francie appellant; quam ob causam consulo Amatacum addidimus, & illam pro Maro: quod si per Amatacum intelligat aliquis dampnificum pro Maro poni potest Sisyphium; sunt enim eiusdem facultatis, ut Dioscorides docuit. Quoniam vero differant Hedychroon magna à Trochiscis Duacoralis, fidem facit veriorum quæ collatio: hi eorum Papaver, Pedem columbianum, & alia oriunt, recipiunt, quæ non sunt in Hedychroo: non itaque ponenda.

PIPER NIGRUM oon tam vakt ad *antipodum* atque Piper longum & album: sed quia omnes si habent morbum immutare, & drach. 24. indidimus, quamuis aliqui sex tantum; & Paulus tamen, Aetius & reliqui 24. censent ponenda; & nigrum non longum, ut in quibusdam Exemplaribus legitur, & in cæmentibus Andromachi, neque tamen improbare in si quis Longum sinat; tum quia in catu imbus longum est, tum quia Aristodora, si Dioscor. codimus, apertum. Tu verò tuda.

OPRYM vel *MANDRACORRA* vel *HYOSCAMA* addi solent in Antidotis, quia incrassanda constitunt meatum, ne venenum ferri possit ad Cor: & sic iuuat operationem Antidoti. Eodem planè modo bolus Armena & Terra sigillata leniore suo & crassitie prohibent vim Veneni ad Cor deferri, non autem propriate occulta, sed incrassando: quare quæ tenuissimarum sunt patrum, ut Moschas Ambra, non enouentur quia faciunt cito penetrare venenum ad Cor: sic Cicuta cum vno abforbita occidit citissimè & per se verò tardius.

ROSA RUM, remotis vnguibz, drachmas 22. ponimus. Auicenna 24. ponit.

SCORDIUM, quod Buchsius præter omnibus incognitum, namque in antea in aliqua Antidotis positum, ponendum certissimum (quamquam tamen opera & diligentia docti viri D. Guiljelm. Pellicieri), Mompeliani Episcopi vigiliantissimi, primum in Gallia iam à decem annis cognitus: & non Allium sylvæstre, ut vulgo Pharmacopoli facere solebat. Solum enim esse *scordium* & *scordium*, id est, Allium sylvæstre, ut Auicenna docuit, collocare, cum tam frequens apud nos sit Scordium herba. Exe grandi fuerant Maiores nostri quibus incognitus fuit, neq; grauius peccarunt in hoc simplicio, est enim Allium sylvæstre Theriaci Ruscicorum. Primum in alijs succedimus tam bene iudicant: Non est tamen conferendum Allium cum Scordio Scordium enim maiorem habet vim aduersus putredinem quam vel Myrrha ipsa, ut videtur est apud Gal. lib. de Antidotis,

* Passilli seu Trochisci Theriacales.

Passilli Theriacales.

Magma Hedycoloris.

Piper nigrum.

Opium Hyoscamae Mandragora.

Scordium Adner, 210.

qui etiam inuentionem declarat. Quis autem nisi stultus dicat succedanea esse vendendum, cum propria habeantur? Secundum enim copiosissime per totam Galliam nascitur: reiciendum itaque Alium.

SEMINIS NAPI, & recte, quoniam nonnulli, Seminis Rape, legunt.

ITS ILLIRYCA ea debet apponi quæ Venetijs affertur.

Advers. 449.

Cinnamomum

Alij ledium.

Alij 354.

AGARICVM sumatur candidum leue, &c.

CINNAMOMVM à viris doctissimis in discrimen vocatum est, cum dicant nos vero Cinnamomo carere, ac id quod pro Cinnamomo ostenditur, potius esse verâ Cassiam: nos tamen putamus esse Cinnamomum; et si non sit illa species tamenper ab Antiquis laudata: quoniam ob causam nos istum Cinnamomi drachm. 24. posuimus (etiam si nonnulli drachm. 12. tantum ponant) duplici nomine: tum quia in quibusdam exemplaribus 24. drachmarum Cassia scriptum legitur, ut etiam in secunda descriptione Auicennæ, tum vt omnibus fieret satis: nam si Cinnamomum esse negent, non possunt improbare consilium nostrum, cum Gal. de Compos. Pharmacorum doceat his verbis: Necessarium nobis est, vbi Cinnamomo casemus, Cassiam optimam coniciamus, aut plurius duplo Cinnamomi pondere, aut omnino non minus. Sed Cinnamomum verum habemus. Si cineritium illud colorem non habet, in causa sunt mercatores, qui eius superficiem abradere solent, colorem naturalem auferentes. At odorem Ruz non habet: nec habere debet: Error enim est in Diosc. nam pro *ννγνίζωρα* legendum est, *εργαριεσσα* quod facile probari potest ex eodem Dioscoridis alio loco, vbi ait Amomum habere Orogani odorem. Hinc enim luce clarius colligere licet, Cinnamomum Origani odorem referre, aliudque textum corruptum esse. Et quoniam Diosc. dicit diuersas esse arbores Cinnamomi & Cassie; Gal. tamen dixerit esse opinionis, asseritque se vidisse in capsulis cuiusdam mercatoris satum vnum cuius altera pars Cassia esset, altera Cinnamomum.

Clystrix.

GLYCYRRHIZÆ SYCEVM apposuiamus, quia efficacior est quam radix ipsa; et si Auicenna in tertia descriptione radicem ponat, & verè poni potest succus, nec timendum est de succi adulteratione: Nam tanta est copia dulci radice, vt parum requeat: Et etiam cum Theriacam compingere volumus, expressit succum extrahere debemus.

Opobalsamum

OPOBALSAMVM sincerum ad nos non adfertur, sed multis modis adulteratum: quod etiam si adulteratum non esset, recens non est, sed antiquum: nam cum ex regione longinqua petatur, non potest non esse antiquum; si quidem antiquum, si annum excesserit, si que ruit. Et si nonnulli dicant in nouo O. be reperiri, incertum est an verum sit: succedaneo itaq; vitandum. Quid vero substituamus, cum succedaneo opus sit? alioqui nemo esset Compositio & corrupta. Non sequemur hac in te consilium Maiorum uoluntatem, qui Oleum Laurinum pro Opobalsamo poni docuerunt: Oportet enim succedanea & vinibus & temperamentis respondere, vt doctissime à Gal. monstratum est. Sed oleum Laurinum calidius multo est Opobalsamo, cuius oleum Laurinum inter calidiora adnumeratur, quod ex fructu potest cognosci: solet enim oleum expellere eiusdem esse temperamenti cum fructu ex quo exprimitur: At folia & fructus Lauri deficiunt & calefaciunt vehementer, plus etiam fructus: ergo & Oleum. Opobalsamum verò deficiat & calefaciat in secundo excessu tantum: Igitur non respondent. Adhuc Opobalsamum tenuius est pastinum, Oleum verò Laurinum etassarum: Opobalsamum ventriculum roborat, Laurinum autem oleum, vt ait Diosc.

εργαριεσσα rubra, id est, potum nauseam facit, & ledie ventriculum non alia ratione, quam quod ventriculo illi ventis: idem autem efficit Opobalsamum negandum est. Non enim est oleum, sed succus Balsami. Vnde autem id natum sit vt Oleum Laurinum in Antidotis ponatur? Puto hinc esse natum, quod olim Oleum parabant cum Myrrha & Staete, vt Diosc. docet. Extra adhiberi non prohiberem, vt etiam Oleum Irimum: quoniam in versuone Vallæ & multis exemplaribus Græcis (salutem tamen) Laurinum legitur. Balsamum arte compositionis reijciunt. Errorem indicauit ante 114, annos Sanctus de Andronis de Pisastro Medicus in hac parte Alexapharmacos diligentissimus & probatissimus. Post eum Nicolaus Præpositus, qui Medicorum Mompelanorum mentionem facit tanquam auctoris huius hereseda. Alij ex semine Citri & Corallo *εργαριεσσα* officio habet, sed inopie: nam quibus semine citri valet aduersus venena, repetendum alia multo efficaciora. Alij addebant fieri debere substitutum ex Myrrha destillata: quod expectatum fuit; & ex destillatione oleum excepti, sed vbi; adeo scitulum vt nemo ferre possit. Omnis itaq; electio, substituta Staeten, ex prescripto antiquorum, Gal. scilicet, Pauli, Aetii, qui asserunt eadem Staeten viret & Opobalsamum. Est autem Staete nihil aliud quàm Myrrha liquida, & si Diosc. erudimus est pinguius Myrrhe recentis cum aqua exigua tuly & prælo expressæ, proportionem respondent Myrrhe. Myrrha autem secunda est ordinis exaltationem & exaltationem, sicut & Balsamum. Adhuc vulnera consolida, quod facere Balsamum creditur à nootetica Medicis, quoniam Gal. nullam eius mentionem facit: Idcirco autem hic positum fuit quod aduersus venena animalia valet, quod ex eo colligere licet, quod vbi nascitur Balsamum nequeant habitare Serpentes aut alia venenata animalia. Qui de omnibus dubitare solent Myrham istam reijciunt, quia parum respondet descriptioni, tum maxime quod *εργαριεσσα*, id est, odorata non sit, vt Diosc. & Gal. dixerunt. Nos autem Myrrham diuersam esse, non Trogloditicam vel Amineam. Et quod non sit odorata, in causa est quod ab ea expressa sit nobilissima Staete. Nam vt Diosc. docet ex pinguis exprimitur pingue & odoratum. Mitis etiam odorata est quia ex calidioribus & aridis locis adfertur. Neg. tamen dicendum est talem esse *εργαριεσσα*, id est, infirmam & ignauam, vt in quibusdam exemplaribus legitur: vbi legendum *εργαριεσσα* id est, sine odore, illamque mittens suam commendationem, non ad sanitatem sed ad voluptatem. At hi qui dicunt quod non habere veram Myrrham, falluntur, aut in hoc quiddam cum Diosc. diuersas notas diuersis speciebus assignari omnes eas in sua specie reperiri velior, alioqui verè negent esse Myrrham: aut quod dicant *εργαριεσσα* non esse, vt vult Diosc. Sed id plane negamus. Summus autem vos *εργαριεσσα* pro eo quod bonum spirat odorem: In hoc autem error est: Nam Diosc. & alij plerique scriptores *εργαριεσσα* sumit pro eo quod multum olet, siue bonum spiritum odorem siue malum. Significatio autem vocabulorum non aliunde petenda est quam ab eo auctore qui rem ipsam defenit; quemadmodum Diosc. vt dixi, hoc modo sumit *εργαριεσσα*, vt dicere licet cap. de pice arida, vbi ait debere esse purum, pinguem *εργαριεσσα*. Nemo autem interpretabitur intelligi de suauis odore, sed forti & grani, quia quo igne eliciuntur nō possunt non sumi sed olere & verum odorem spirare. Idem etiam iudicium de Blatta Byzantia, quod dicunt esse *εργαριεσσα*. Sin hac ratio non placeat, dicemus veritas non adeo delectatis fuisse atque sumis: & quod nobis male olet, vt Myrrha, illis bene & suauiter oluisse, quod inde probari potest, quod in suis vnguentis ad debitas paratis, Galbanum aduiscabant; quod haud dubie fortis admodum est odoris.

* De CROCO & GEMISIBUS nulli dubitare.

Reclamare Sceptici Medici quod pro RHAPONTICO Khababarum sequi Auiennam posuimus. Non autem tenent id factum esse. Nam cum Rhapsonticum hoc Pharmacopolarum nullo modo respondeat prout Rheopontici; satis est Khababarum vocatum conijcere, quoniam illud Centaurium maius à variis doctissimis iudicetur esse, nec ineptè. Khabaponticum enim & Centaurium hoc maius eandem ferè habeat facultates. Componitur Rhapsonticum ex diversis partibus ex terrea videlicet & frigida substantia, quod indicat adstrictio habet etiam admodum caliditatem & sobrietas enim reperitur si plussculum mandatur, quia facultate potest alium ducere; quinetiam aëreë causam est substantia particeps, quod indicat laxitas & dulcedo. Coniunctis, nuptis, dysentericis, sanguinem expuentibus vile est & orthopneæ. Centaurium maius rari gustu contrarias qualitates habet: ita in visu contrarios effectus præstat: gustu itaq; ac si mul & astringens apparet cum leuissimâ dulcedine, quæ omnia in Rhapsontico esse monstramus. Prodest istdem reijciensbus sanguinem, rupas, conuulsis, dympneæ, orthopneæ; quomobrem medicamentum imbecillis non erit, si pro Rhapsontico Centaurium maius posuerimus. Nam Rhapsonticum & Khababarum quia regionè differunt & leuitate: ut Raps quæ apud Lemouicis nascitur, & quæ solo sterili, distant solum dulcedine aut crassitie, aut alia differentia à solo desumpta. At dices alterum magis rarum est: alterum densius. Respondet id facere copiam vel inopiam alimenti: aut dicendum, Mercatores qui aduehant Khababarum illud comprimeere cum teneat esse, ut minus loci occupet, & densius reddatur, quod sciant deorum laudabiliter esse, quod facile fieri potest: si etiam compressam radicem desicces, minus erit minuique spiritum occupabit, nec diminuetur quantitas. Si verò Khababarum nostrum non sit veterum Rhapsonticum, quid erit? Quodam autem esse radicem Centaurij maioris & Gal. in radicè eandè facultates habere quæ Rhapsontici.

* Male negat Manardus nos verum PENTAPHYLLOM habere: nam passim nascitur, & omnino descriptioni respondet. Est præterea alia nota à Theophrasto tradita, quæ nobis est certissimum indicio nos Pentaphyllo habere: scilicet quod Pentaphylli radix exsiccatione ita quadrata. quod sancti illi proprium est: conuenit enim sola Pentaphyllo quadratam fieri exsiccata radicem, quæ nota fallere nos nequit. Sunt ex Prædici qui putant Tormentillam esse Pentaphyllon, quod non improbo: cum Diosc. det illi radicem oblongam, Vetus autem nigro crassior, & propius accedat ad veram Pentaphylli descriptionem. Sunt qui Heptaphyllon vocent à numero foliorum, quod & in vulgari etiam inueniet, Dioscor. etiam ait habere quinque folia, aliquando plura. Verum quacumque assumpseris, hanc ne Diosc. an illam Theophrasti, non errabis: ut hæc enim valent aduersus venena. Potest itaque sumi Tormentilla pro Pentaphyllo, & Pentaphyllon pro Tormentilla.

* NESTAM Latini Calamintham appellant, quæ de causa Galenus miratur quod Andromæchus, cum Græcè scripsisset, hoc tantum nomen Latini addiderit. At hoc τριφυλλιον dicitur sit.

* MARRUBIUM Hippis & tonforibus notum est, eam ob causam prudens prætere.

* Danda est opera ut SILENON quod in petris nascitur nec perimus: non quod ob eam causam Petroselinum dist. melius, sed quia maioris est efficacie, & propius accedit ad Macedoniam, ob amarorem, Nec ob eam causam dari nuda erit hæc compositio. Nam, ut Gal. de Petroselino scripsit, Quod si Etræcum deside-

res Petroselinum, nihil tibi deterius fore putato Theriaces medicamentum, si alterum inuicias: Cuius res subdit rationem, Non enim, inquit si non sit venena, si venenatorum moribus aliud ab Etræscis Petroselinum minus congruit. Proprieque reliquis etiam moribus, vt torminibus, ventriculo debili, hydropis, & ad genus aliis segnis optinetur, quos in primis sanare Theriaca promittit. Aliam quævis causam assignat, cum inquit Adhuc Etræscum lictoselinon amarum etiam plus Theriacam facit, præsertim cum recens adhuc imponitur: nam vt acrimonia, sic amaritudo hæc alia superat, vt alibi de cicut, insueta in medicamentis quæ degummatum est spectanda, cum in se habeat multa amara. Ascendit semen Apij montani posuit in tertia desciptione Petroselinum verum nascitur in montibus Delphinatus, & apud fontem Pamelusæ.

* STACHAS latini nota est, agroque Moepelianos frequentissime prouincit.

COSTVM nonnulli in diserim vocant. Certissimum autem est, non duas habere Cossi species: primam scilicet (quam Zedosarium vocant vulgo) & secundam quæ neo negabit eam esse quæ ad nos adierit, præsertim cum acerrima sit.

De PIPERIS abo tantum sciendum est, Galenum ibi piper albi legere, ubi Auienna nigrum, & e contra Piper album & longum magis medicamentis: & At pharmacis conueniunt: Nigrum vero eduli & aliternis condidit. Ipse longum facilius adulteratur, Adulteratum autem cognoscitur, si aqua inspersum dissoluitur. Non reperitur hoc Piper longum in descriptione ad Pampaliamum.

DICTAMNVM in Creta tantum crescere, & inde CRATVS dici existit aut Auhores, quod sic depictum sit à Diosc. Cretensis herba est, aeris, leuis, Pullegio similis, det maioribus foliis, quæ tomento quodam spissa lingue pubescent. Floem nullam aut semel: prodest (est apud Papiam falsò legatur dictamnvm à Diosc.) Pharmacopolarum in dictamnvm & flore & semen prodest: quam ob causam malum succedat, quæ in cognita illa radice quæ pro Dictamno vtiuntur Pharmacopoli Pullegium itaq; e pro Dictamno iniecit, quia nulla est herba quæ propius accedat ad Dictamni facultatem ipso Pullegio, docente ipso Diosc. Præstat omnia quæ sanum Pullegio, det efficacia multo: Gal. Vistat enim, tenuiore essentia constat quam Pullegium, cetera illi simile. Quid si per omnia simile, laudiquam male pro Dictamno recipitur, cum ipse Auienna in omnibus descriptionibus pro Dictamno Pullegium posuit. Præterea à Nicandro in iure Theriacis, Diosc. de apone, Paulo & Actio ad morbus venenatorum comit edantur.

Non mireris candide lictosini pro FLORE LYNCI ODORETI, quem uno vocabulo Siphonanthos vulgius appellat, herbam ipsam moulesens. Audi Gal. Adhuc quævis ex Arabia petunt imponere præcipit, nescio quæ de causa, Ichthanthum, id est, in ci florem à vulgaribus appellatum, Nos siquidem, cum Borum copia non adfit, iuncto vitæ ex Arabia compositato, enim summatem Cameli palestrum secus vias ibi plurimum nascens. Ex his disc. nolta fuisse simplicia tempore Galeni: quia nunc sunt. Non itaque peccant qui iunctum ipsam huc compositi in ponunt, ut et Gal. In eo iam erat parit & Dioscor. qui ait radicem & herbam eiusdem esse facultatis cum flore & efficacie.

Imò si flores adferretur, abueniendi essent & postponenda iuncto ipsi, nam cum simi admodum tenuium partium, eorum vi facile euascerit, & prorsum ad eos peruenissent plantis in eo redderetur.

* De quibus in Aduersariis & appendice Rhapsonticum.

Stachas.

Cossas.

Piper album, & longum, & nigrum.

D'Alamum.

Pentaphyllum.

Sebanthum.

Nepeta.

Aduers. pag. 221.

Sclenon & Petroselinum.

Tōus.
Terebinthus.

De Terebinthi alii in praefationibus dicimus. Quamquam Terebinthus in hoc agro Pompeiano frequens sit, non tamen Terebinthiam habemus & quae admodum Lennica, hic alioque frequens, Lennica non stillat, ob solis inaequalitatem; sic nec Terebinthus Terebinthiam. Sed Galeni doctrinam secuti pro Terebinthia Abietinam conseruimus, nam quare lanatus ruenet sic scriptum: Quod si copia Abietinae non adsit, eius loco Terebinthia. Cum pro Abietina Terebinthiam ponendum doceat: sic e contra pro Terebinthia Abietinam recipimus. Quod evidenter monstrat alio in loco his verbis: Quinque in penuria Terebinthiae tum ea *regula* *regula* *regula* tum frictam commode adhibere, non minus etiam ipsa Abietina immittas. Quod si forte quis hanc resinas Abietinam esse neget, Mastichea potius, quae inter resinas principatum obtinet, teste Gal. vel ut Dioscor. Tebeinthia respondet viuis. Fidem furnam augere quod in Paulo legatur, *regula* *regula* *regula* quasi vellet dicere Rasinę Mastiche, vel Mastichen & Terebinthiam imponi velit, Tu iudica.

Calis ligna
& Filisia.

CASSIA FISTULARIS vocat Cassiam Ligneam, aut Cinnamomum cassium; ne qui errassent eum intelligere Cassiam illi fistularem Arabiam quae vinum habet lavandi ventris. Est enim Cinnamomum cassium efficax, ut odori & sapori monstrant. Nec absurdum est diuidimus Cinnamomum pro Cassia constituere, cum pro Cinnamomo duplicem Gal. ponendum sit.

Syrax.
Nardus.

SYRAX eligenda optima. NARDUM neque debet damnare quod Spica non sit, sed potius radix. Nam Gal. his verbis docet esse radicem. Iubet deinde Andromachius Nardum Indicam imponere, quam ex eo quia Spica figuram imitetur, Nardi spicam nominant, quoniam radix sit. Rursum Damocritas *regula* *regula* *regula* scriptum non speciem. Indica autem dicitur, non quod in India nascatur, sed quod in aliquo monte nascatur India spectante, quemadmodum Syriaca quae in monte Syriam spectante, Eode modo & Britannica dicitur (ea est Balthica vulgaris) non quod in Britannia solam nascatur, sed quod in regione Britannia spectante. Ceterum Nardus Indica ceteris efficacior est.

Thilapi.

Nunc ad THIASPI veniendum, quod omnibus incognitum putat Manassis, eo fortasse quod nunquam videtur. Ut autem verum fatear, non omnibus cognatum fuit Thilapi, sed ipse duratque qui de re herbaria bene meriti sunt. Eius descriptionem requirere in Dioscor. Frequens est in semita Tolosani agri, & alijs plenisque locis.

Verum Androm.
Nardus.

Temperamento calido est ut Nasuturum. Auicenna pro Thilapi, Sesehi legit, at in Arabico Thilapi legitur. vulgus Pharmacopolarum, quod Sinapi species quendam sit, album appellat.

Asiam.

SEMIN APIJ restitimus ex descriptione ad Pamphilianum. In Paulo enim & Auicenna idem scriptum reperimus, tum etiam in Theriaca Andromachi Philometeros, in medicamento anodino *regula* *regula* dicto: iursum in Zetonia, Actij, Theriaci: quod est ut Petroselinam adhaerens venena parum aut nihil prodest, ad alios morbos non parum iuvat.

Malobathrum

Pro MALABATHRO, ut bene & Maioribus nostris visum est, ponendum censuimus Spicam. Habet enim Folium eadem cum Spica facultatem, teste Gal. lib. 6. de simplic. Mem. scriptum Paul. in succedaneis. Quod si equalem vel similem habet facultatem, frustra additur Macc, cum neque addiderit quicquam dicat, neque detrahendum. Auicenna post Malabathrum addit Epithymum, quia ratione necio; quemadmodum & Moscham post Piper longum.

Carpobalsamum.

Hypocistis.

HYPOCISTIS etiam sub Ledo reperitur, quod

Cisti species est, longiora habens folia & glutinosa.

NARDUS nostra CELTICA cavere est quam antiqui Celicam vocaverunt: non igitur rejicienda: neque audiendus Marcellus, qui negat Spicam nostram esse Celicam. Raro autem visitur, quia in summis montibus nascitur quod perpetua aere obdit. Radix femina.

Pro TERRA LEMNIA fumum Bolam preparatum, ut Gal. docuit, neque tam ob causam vituperanda est haec terra, quod & Lemno non adhaeretur. Est enim haec terra medicamentosa, lutoque cum aqua ex ea sit quod habet desiccandam facultatem, & astringentem non contemnenda, quia catarrhos sistit: prodest tempore pestis. Ut in fumina dicam, mallem hac rei quam Terra sigillata egregie adulterata. Rubrica Lenoia & Gal. vocatur.

Dulcibus fuit iudicare quod pro CHALCITHIA accipiendum esset, cum Antientium Sutorum quod *regula* *regula* *regula* parum ab invice n. distere videntur. Et quantum non gravis esset error, si *regula* *regula* *regula* vel *regula* *regula* *regula* pro Chalceide posuissimus (sunt enim facultates eisdem) tamen Chalcitia veram malum accipere, quam (ut praecipit) assari duravimus, & quod magis spirituosum erat acceptum. Chalceide Vitaeolum Romanum non est, quamvis eadem habet facultates, sed Chalceanthi videtur species; quae vinda est donec nihil viridis appareat esset; *regula* *regula* *regula* id est, similis ari. Vnum Pharmacopoei Chalceum donec rubra fiat: sed inesse illi: non enim quae addit esse addenda. Ait enim Gal. vreadam donec fiat cineritia & amittat viride, ut ostendat quantitatem adustionis. Non itaque legimus *regula* *regula* *regula*, & non, *regula* *regula* *regula*, ut est apud Gal.

Quid sit AMOMUM, ut ingenuus fateor ignoro: malo enim meam fateri ignorantiam, quam studiosius haec re aliquomodo imponere. Non me latet multos fuisse in Gallia & in Hispania qui se invenisse gloriantur: cum nihil minus fecerint. Nam semel illud quod pro Amomo monstrant inodoratum, nigrum, lenne, gultu neque acie neque erodens est, cum debeat esse candidum, modicofum, semine plenum, vuarum racemum simile, ponderosum, odoratissimum, acie gustu & erodens. Nos pro Amomo Acorum posuimus, Amomum, ut inquit Gal. Acoro similem facultatem obtrahit. Ergo Acorum pro Amomo nefas non est ponere. Sicut qui Amomum Nafam Herichonitis dicit, quod careat admodum reductum ob id quod mulieres fabularentur conducere ad partum. In Alexandria frequens; & ad nos adhibetur, si praemoniti essent mercatores.

Malobathrum aliqui quod Acorum in omnibus locis Galangam erant, non vulgarem illam tadecan posuerunt. Sed ne id temere factum visum esset, scidum est, hanc vulgare radicem Acorum non posse esse, tum quia rubra est, & ingrato odore: cum vera Acorus alba habeat radice, gustu acie, odore non infusum, ut ait Dioscor. Cum autem haec omnia in Galanga manifestissime inveniuntur, & ut Masi testatur, flos in eorum & folia indolis angustiora habeat, Acorum dicamus esse.

Eli Fuchsius Valerianam neget esse PHRYGIANAM pro Phu posuimus: non enim valet eius ratio. Phu caulibus *regula* *regula* *regula*, id est, lenis & tractat. Fuchsius Valerianae caulibus angulosus: cum herba & lenis & quadrato caule possit esse. Quod de floribus dicit similem Narcisso non esse, verum nile videtur: flores tamen habet pulchros, sicut & Narcissus: quod sufficit, cum omnes aloe nox nullo pacto discerpent.

CARPOBALSAMUM vulgare nullum aut praequam vim habere videtur, & puro seculo esse Terebinthi. Eam ob causam Cubebas vulgo vocatas ponendas dixerim quae forsitan verius sint Carpopalsamum, quia Carpephus, nisi

aisi exclamet ⁴ Quærit. At Gal. lib. de Antidota Car-
pæsum dicit esse herbam huius appellato genere similem,
validiorē tamen, atq; aromaticum quiddam plus oleu-
sero. Et eodem loco: Tenuia quidam Carpæij lar-
gentia Cinnamomi virgultis similia sunt; non semen
ignota potest esse, Cubeæ autem non multum viri-
bus & temperamento differunt à Carpebalsamo. Di-
osc. ait Carpebalsamum adulterari semine Hyperico
simili, quod Terebinthi semen esse videtur, vt ex The-
ophrasto patet

⁵ Pro ACACIA Penellorum succum ponere non est
absurdum. Potest & Rhus pro Acacia poni quæ ait
Diosc. Folia Acaciæ effectus præbent, vt in succedaneis
reperitur succus Lentisci.

⁶ BITUMEN IVONIS Græcis ἔσφαλτον Calu-
mniator laudatur quod putat modo splendet. Ni-
grum adulteratum est. Sed cum aliud non aduehatur ni-
si pice imbutum, dosis augeat oportet. Eisdem facili-
tatis est cum Passiphlo, quod vulgo Mumiam appel-
lant. Passiphalon autem mediam facultatem habet
inter Piceam & Asphaltum: eam ob causam Agerenna &
quidam alij pro Bitumine Mumiam ponunt. Asphaltum
deprendens ex odore Trisulij fertur quod à Bituminali
odore ἀσφαλτον dictum est. Quod ad nos adferunt
Passiphalon est. Cùm Diosc. ait probari si purpure
modo splendet, non ita intelligendum est quasi velit ha-
bere purpure colorem, sed quod in sua nigredine splen-
deat: ut supra in suo colore, ut quod simile sit purpure
exaltatur, quæ quodammodo ad nigredinem tendit.
In istis locis prouenit, vt in Aegæa, &c.

⁷ CANTARIJ TERNITIS folia & flores panibus
non radices, quas usquam terribiles reicit Gal. & Diosc.
cuius Lumen illud Pharmaco-polarum aliter sentit.
Ne quis nos reprehendat quod ARISTOLOCHIAM
reueni, non Clematium aut Rotundum vt in lib. ad
Panphylum scriptum est, adiceremus: non enim id
tenere istum est: Nam in carminibus scriptum inme-
dumus ⁸ ἄστυλον & ἀπὸ κατὰ γὰρ & ad Pisonem re-
ueni dicit: hoc accedit quod Clematium aut Gal. Quæ
Clematium appellat: si agrestior est vt ait vng. & vng.
Vnguentum si ad sanationem infirmior. Hic autem non
ad volupratem sed ad sanitatem ponitur: tenui spiritus pondus
edictum iudicij: est locus ille, ne parci cuncti fallantur. In-
terpres C. entomoliam vertit: Centunculum autem in li-
bris appellant Gnaphalicu. Si autem addatur Gnaphalio
id est præter Andromachi aliorumq; mentem. Ne in-
terpresibus semper fides est addibenda, etiam si Græce &
Latine: potius sint. Malum enim illud minus a fertis esse,
& vt. nam bene peritosis si quidem sole istum in nomi-
bus duntaxat committunt, illi autem in rebus & sapie-
ntia. Hæc itaque neque rotundum Aristolochiam neq;
Clematium aut Pissolochiam, quæ vnguentis parandis
apocionibus imponemus: sed longam duntaxat Arist-
olochiam, siue tenorem, quæ ad n. edicamenta conue-
nit. Proueniunt autem omnes Aristolochiæ species, quæ
quoniam sunt, frequentissimè agro Mompeliano quoniam
pro longa pingit Feculsiar, Clematidis est.

⁹ Qui Cornicum oc.los confingunt hunc CALAMUM
ODORETYM reiciunt, non quia inefficax sit, sed
quia Calamus araneis non est plenus. Fieri autem po-
test vt Calamus dicatur. Eius autem radix tantum est id
vulg. vt de Spica admonuimus. Sin tibi hæc ratio non
placeat, aliam accipe. Duæ sunt species Calami odorati:
Alterum quid à Gal. describitur: Alterum in Morotide
nascens, radice subalbidâ, sine calami iunctis plena & a-
mara, specie acori: quem Calamum falsum quiddam Aco-
rum esse putauerunt, in quorum ramore fuit Matur-
dus qui pro Acoro Calamum aromaticum semper po-

uit. Asperumque genus Acorum odore superat, non
ignitur respicienda hæc radix, cum Calami sit radix.

¹⁰ XYLOBALSAMUM hoc cominitur, verum sit nec
ne, incerti planè sumus: eam quicunque de Balsamò
scribere sones se dissentiant. Quod inefficax sit, facile qui-
libet iudicare potest ex odore, sapore & crassitie partib.
Sin autem pro co ligno incognito & adulterato Zedoria
vulgo dicta quis vt voluerit, sine nota poterit. Zedo-
ria eum cal. & sic. est in secundo ordine, vt Xylobals-
amum valet aduersus venena, & pestem. Commode itaque
illa vi possumus, quandoquidem temperamento & vi-
ribus respondeat Xylobalsamum. Non item in omni-
bus iudicanda pro Xylobalsamum: sed hic, quia iam fe-
mel in hac compositione posita sunt succedanea eius,
malamus hac radice vi.

De AMARACO si Nicolaus Præpositus dubitet,
non mirum est, cum res admodum, obscura sit, & ad
iudicandum difficilis. Nam Diosc. Pinn. Columella,
Lucet. Virgil. Diosdes medicus, vno ore Amaracum
san psumum appellant. Gal. tamen & Paulus diuersas
herbas tradunt. nam in tertio ordine calef. & ex sic.
Sampsum collocant, Amaratum verò in secundo sic-
caz & tertio calcarese volunt. Amarae & Gal. Paulo
Murticaria vulgaris est, & Parthenon Diosc. atque
vtramque posuimus: quamquam non vultum i referret si
ne tra poneretur, nam vt Gal. testatur, multi suo tem-
pore & Marum & Amaracum senescebant.

Hæc sunt, Camille Lecter, quæ cum festinatione quæ-
dam annotauimus. Et hoc est Exemplar eius quod ex
Consilio Doctorum Mompelienium dispensauimus.

Theriaca Andromachi quæ γαρύνη, id
est, Tranquilla cognominatur.

Rec. Passilorum S. Illinorum, drach. 98.
Passilorum Theriacorum
Mazmatu sedychre
Piperis le-gi
Ozi singl. drach. 24.
Koso umficarum
Sic di Crentis
Semenis Napi
Bridis Illin
Aga vi Pontici
Cinnamomi
Glycyrrhiza ci
Opobalsam Singul. drach. 12.
Myrrha
Croci
Gingibris
Abopentici, non Rimburbari vt habet Codex: consule
Aerfaria nostra
Radix Quinæ pulch
Nepite, siue Calamitæ montane
Marrubij
Petræsi à Maccedoni
Strebades
Colli
Piperis albi
Piperis nigri,
Dilamni Crentis
Iunci odorati
Tburis
Trebantins
Cassa
Nardi Indicæ sing. drach. 6.

Xylobalsamum

Acacia.

Bitumen lu-
dicum.

Amaracus.

Centaurium
maria.

Gramma-
ni.

Calamus O-
doratus.

Alis nigra.

Polij Cretenis

Sessions

Synvalis

¹⁰ Семіміл Арій

Table

Armenia 01

Chemistry

Chemotypes

Succa Hysterocephala

Malabar

Nard's Gallies

Radix, Gentiana

Summary

Mrs. Atamanovic

Seminole Furniture Co.

Terra Lemina

Chalcitula telfordii

Amami

400

1914

РБН ГИИ
Смешанная

Carroll
Eugene

Hyperkalemia

1. *Alfred*
 2. *Alfred*

GUMMI
condemni sine dolo.

Cardamomum juv.
Euphorbia Drucei

Seminar Catholics

6. 1995
 7. 1996

Sagapwá
Sagapwá

Орораласи

2001年12月17日

Call 8761

Centauri forms
a "Machian" system. The

Arachnoides tenuis Jng. drach 2.

Agellus Artici asplumatis vms. * C. L. hoc est lab. 12. vms.

6. also: Kopiel. 115. 10. f. 87v. 115. 10. f. 87v. 115. 10. f. 87v.

உரை: 1. 2. 30: ஏழாம்

* Aphj ferren in alijs exemplaribus deest : Quidam pro Petroselino vtuntur.

ADMONITUM autem hic velim Lectorem, ut huius Compositionis ordinem exactè contempletur, quæ illi plurimum prodesse poterit in alijs Medicamentis dijudicandis. Omnes enim hic serè traduntur Canones qui in huiusmodi compositionibus tui solent. E quorum numero paucos colligimus, ut memoria suppetat.

Primum itaque in omni Compositione notandum est observandum, ut principia & veluti totius medicamenti fundamenta primo loco ponantur, quod hic etiam observandum est in Passillis Scilliois & Theriacalibus, licet cum plurimum non in Compositionibus solum, sed in teliquis omnibus, factus ordo servetur. Patranus igitur medicamentum in fumis digitis habere debet quicunque illud ingredi debeat, & ex his considerare quod decoctionem ferre possint, quæ minui de: Ex his rursus quæ decoctionem ferunt, ea primo loco imponit quæ duntaxat decoctionem ferunt, ut radices dentas & inodoratas: Odoratas enim: raris decoctionem non ferunt: L'ende ea iurijca quæ in eis decoctionem ferunt, ut herbas: Postea: id quæ nullam omnino, Præterea quæ simpli. majorem quantitate alimuntur, ea primo loco imponenda: quæ minores, & secundo loco, sique ita deinceps gradatim: Vt in hac Compositione etiam observatur. Enus enim prima dosi est drachmarum 48. Altera 14. tertia 12. quarta 6, quinta 4. vltima (melle dempto) drachmarum 2. Sed & alius Canon observandus est, & hic observatur, nempe: Ea quæ ad alterationem ponantur, majores debent

esse quantitate: quæ verò ad castigationem, minor. His annexæ sunt regulæ generales ad maiorem institutionem.

THEOREMATA SIVE PROE-

cepta duo ordinis aut dispositionis Simplicium Medicamentorum desumpta ex libro de

Panderinus Dom. Bonellii

Conductors Dem. Konduktij
51. 1. 5

fol. 46. facie 2. a.

THORMATA duo sunt in hac respectanda, quorum unum & magis necessarium in aspergendo internum Pharmacopolarum subieciatur, à bene parandi ratione defumitur: Alterum à quantitate vel dignitate medicamentorum tam simplicium, quam compositiorum, quæ ratione compositiorum facienda, simplicium conditumque præ se ferunt. Ad primum venimus, illudque ita constituimus. Quicunque accuratiori & longiori præparatione egerit, ea prior est locum debent obtemere, hoc est si quid difficultatis trahatur, infundatur, coquatur, aut miscetur, prius tunc ratio, infusionis, coctionis, mixtionis esse mandandum: quod ut induceret inter trinitandam, infundenda, coquenda, miscenda, prius scribatur. Si autem infundendorum, vel coquendorum vel miscendorum unum aliquod, breviori infusione, vel coctione, vel mixtione egerit, & præterea trinitandam, hoc possit poni duplici de causa, vna quia ista dicta est, altera, ut dum alia infundatur, vel coquatur, vel miscetur, hoc trinitari possit: sique nulla fiat temporis æquitas, cum mensu perueniret Pharmacopolæ, tanto cum sceleris, omnia preterbant, ut eorum quæ minus coquenda sunt, sæpe vix profus deperdati sumus coctione: contra ea quæ longissima coctione egent, cum eo ut vis, à medicis etiam erui non possit, quantitas necessaria est non extrahatur. Quod idem si quis preparata formis euenit. Quorum rationem hodie etiam plurimum, docem, Empiricus negligi apparet, qui infundendum solum, & decoquum galeæ rasilam, lantalis, cinamomum, fenicam, & alia multa, quorū vel ea quæ sunt odorata, & laxantia viam suam amittunt, vel alia non satis decoquuntur, vel vtrunque contingit. Secundum Thormata est, ut ea, quæ maiorem sui quantitatem toti compositioni tribuunt, & nobiliora sunt, priorem sedem occupent: quod est etiam ex præscriptis antiquorum, qui in componendis medicamentis hoc solum præstant, tantum excipientes ea quæ maserunt vix, aliquando in sine colloquantur. Vnde est in descriptione Philularum de hermodactylis, apud Mescen: recipiunt enim p. lino ordio hermodactylorum drach. 5. deinceps alia in medicis sedibus sequuntur, pro maiori, & minori quantitate: tandem alie, quia maseruntque gerit, ad drach. 10. ponitur. Idem factum est in Philulr bellidinii, in quibus dicta Nardi positum in prima sede, ob quantitatem, & nobilitatem. In Aromatico rolato oratione est descriptio Gabriellæ, tota in prima lege posita, reliqua copia superant. Idem in Antidoto Philonis, apud Mescen, præpar alibi, & hyocyami, obinet, in qua compositio et manifeste apparet ordo medicamentorum seruandus secundum maiorem & minorem quantitatem, ita ut maxima quantitas primo loco ponatur, minima vero vltimo, cum pipere alibi, & hyocyami hoc recipiantur alia, drach. 10. Opii, drach. 10. Croci, drach. 5. Spicæ, ʒ. i. Theriac, Calistore, ana, drach. 5. In Theriacis deseriptione hoc paleam fit: sed quia est longior, vix modo antiquorum melius interpretat, non me debet separatum, cum transcribere.

maiores, & crassa Menera excurrere dolos, exacte-
tius castigatiorem, & rectum componendi modum, pro-
prio opusculo tradidi. Animadvertendum igitur est, an-
tiquos, posteaquam se ita collocacioni petenda sola
quantitate addixerunt, vidisse demum, rationem prepa-
randi, & in hac re ordinem esse apprimè necessarium,
quo doctus fuisse multa verborum congerie explicare,
quod ipse in scribendo osido indicare potuisset: & in mos
eos excelsant in magis compositionibus faciendis, cum
neque forsan solus ordo satis id indicasset. Sed cum in
illa, quæ ad horas præsentibus, hoc fieri non liceat,
neque etiam ipsi fecerunt in illis, quæ nobis scripta reli-
querunt, nisi addidimus pauca: in eo, quod mox di-
cturus sum, totus collocacionis cardo verietur, ubi an-
tiquorum, antiquos minus bene, & compè fecisse
qui aliquando dosim medicamentorum, quorum idem
ordo erat, diversiter: ut in Theriaca videlicet, rosarium
siccatum drach. 12. iris idem drach. 12. cum per ana,
quod se notatur, ana. vno numeratore designare potu-
issent. Nec mihi minus videndi, qui idem hodie faciunt,
nisi id præparationis ratione fiat, videntur. Igitur, se-
cundum Theophrastum prior adiuungentes, hunc ordinem
in præscribendo constantissimè observent, ut in primo or-
dine collocemus ea, quæ longiori egent præparatione, in
hoc autem rursus id considerent, ut eandem præpara-
tionem postulatam ea primam ponant, quæ ratio-
nem copiam requirunt. Eandem præparationem, &
quantitatem requirunt, & mensuram modum ut li,
vel reci. vel M. vel P. ea omnia collocentur, quæ com-
moditate, aut nobilitate aliqua præstant. Sicque fiet ut
maximæ præscriptionibus adnoctent, nullo pacto hæ-
reamus mente, ab hoc, vel illo ordinem sit: sed
cognito scopo, medicamentique proprietate, &
nobilitate, statim ab eo quod opus est, incipiam faciemus
id quod erit vice materie. Et vnum, siue plura id faci-
ant, si in eo vel sentio, vel infuso, vel mixto si faci-
enda totius compositionis. Primum omnium: si autem
infusum, vel decoctum, vel tota mixtura facta, ei sit
adiungenda, vitiumque quantitate sit copie, & quan-
titate collocemus. Quod ut exemplum aliquantulum il-
lustremus, id per nos ad re quæ est frequentior, videlicet
plantarum partibus: ut cum earum radices duriores sint
substantia, & magis cruda, longiori decoctione, &
trituratione egent, primò in prima sede ponantur,
præcipue quæ asperius, & incidunt, tum ligas non odo-
rata, & cortices: deinde folia herbarum: tertio loco
fructus: quarto semina: vltimo flores, & quæque
sunt odorata, vel laxantia, quod si radices inde par-
tiantur exceptionem, laxantes enim primo loco non po-
nuntur. Denique ratio præparationis tantum potest, ut
nihil tam generale afferri possit, quod frequenter non
pariat aliquid peculiaris, & singularis doctrinæ: ut si
quid ad aliquam medicinam meliorem, vel faciliorem
actionem faciendam, vel castigandam adhibeatur, conu-
lesque sit quantitate, id quod habet castigandum illo-
co sequitur necesse est, ut eius vis non nisi castigata, &
et melior facta, de tanillum quidem extrahatur, ut Zin-
giber, & sal gemmæ mox post aquam et spica, & cin-
na-momum post Rhabbarum: castoreum crocus, &
myrrha post opium, & sic de similibus.

* Primum, id animadvertendum est quod in prima acie
descriptions Theriacis est possum, esse in maxima
quantitate: ad autem factam fuit forte, quod medica-
mentum ex Scilla, scopis magis convenit, facta enim est
hæc compositio primario ad venena, & morbos con-
tumaces, & dampnos, sed Trochisci de scilla venenis fri-

gidis manifesta qualitate aduersantur, item puncturis,
& moribus venenatorum animalium. Nec minus valet
ad humorum contumaciam: tales enim morbi sunt: a
crassis, frigidis, & viscidis humoribus, vel in remotis, &
profundis partibus sitis, ad quas causas valet potissimum
scilla incidendo, attenuando, & ad altas partes penetran-
do, digerendoque humores crassos. In secundo ordi-
ne, Trochisci theriacales, & Magna belychrois cin-
namomum, piper nigrum, vel longum, sed lon-
gum magis convenit, & descriptio quæ legitur apud
Galenum ad Pisor em, & apud Avicennam longum ha-
bet: tum descriptio carmine scripta, convenit enim ma-
gis antidotis longum, si l. iscoridis credimus. Hæc om-
nia cum Trochiscis de scilla, & ad venena, & ad morbos
contumaces, conveniunt. Opium autem in hac descriptio-
ne, ut præcedentia ad drach. 24. ponitur, quia hæc com-
positio ad dolores de sanctorum parata est, vnde nomen sibi
yacham quod transibunt Latini Galene, comparant,
quia tranquillitatem adferat: & propter vim Opij, &
veneni præcautionem, & curationem facit, ut ex Galeno
colligimus. * Valet enim Theriaca, eodem teste, cum
recens est ad venena: cum vero antiqua ad morbos dia-

sternit. Quid si recens valeat & venena, id fiet propter
vim Opij, quæ maior est in recenti quam in antiqua. Et
nihil placet Iohanni Schriobro ratio nostræ quondam
Academæ Causellari crudelissimi, qui dicebat opium
additum istis magnis compositionibus, magis esse ad vi-
res calidiorum medicamentorum conservandas. Calida
enim, & quæ tenuium partium sunt, continuo exolu-
untur ab aëre ambiente, quæ semper agit in medica-
menta. Quare cum tot sint in hac compositione calida,
& anodyna fortissima esse debeant: nemini n-um esse
debet, quod ad drach. 24. opium posuerim. Hanc ratio-
nem non noverunt, qui ex Typhica magna opium ex-
pungunt, etiam si ad affectus vires præstetur. Nam si
tantopere narcotica veniuntur, prædiagnosis corticem
non expungerent: non enim minus vicio lra frigilitate
adversatur, quam opium. Sed hæc missa faciamus, &
ad reliqua veniamus. Itra illinea, & glycyrrhiza, ope-
balsamum, rois aide, foetidum, semen napi, vel fæpe
agrestis quod magis convenit, vel quia minus aduer-
sat venenis, vel minus conveniunt quam supradicta, vel
ad meliorem actionem tantum, adhibeatur, dosim ha-
bent dimidiam secundæ dosios, ut secundæ prius item
est dimidia, scilicet drach. 12. Quæ sequuntur drach. 6.
recipiunt, hoc est dimidium præcedentis dosios. Quæ
sequuntur habent, eadem quantitate ponuntur: sed censeo
omnia iungenda, quæ eiusdem sunt quantitate, alioqui
sunt duæ classes cui idem ponderis in eodem medica-
mento, quod ridiculum, vixam dixi. Quinti vero ordi-
nis pondus est drach. 4. quia quæ ponuntur in hac classe,
partim ingrata, partim cara, partim efficacissima sunt:
quare si præcedentium copiam esse secuta, maior eor-
um quantitas fuisset quam par erat. Chalcitis enim suo
odore, sive ad adhesionem periculosam est, alia autem fuit
efficacia valde consolidando, vel adstringendo, quare mi-
nori quantitate posita fuit. Quod si præcedentem pro-
grediendi modum secutus fuisset, prioris dosi dimidi-
um sumendo, minori rursus fuisset assumpta, ob id non drach. 3. sed drach. 4. posuit. Quæ sequun-
tur, vel quia ferida, vel sua sapore, vel consistentia in-
grata ad drach. 3. ponuntur, dimidium scilicet proxi-
mè præcedentium: sunt autem semen danci, bisium,
opopapum, castoreum, centaureum minus, & aristo-
lochia: hæc efficacissima sunt, & ingrata: quare mini-
ma quantitate, & vltima deponuntur. Vnde apparet
illius theophrasti veritas, quod docebamus efficacissi-

* Antiquarum
mot.

2495

* Quæ pri-
mi ordinis
sunt quanti-
tates.

* Alias 10.

ura, & ingratis, & cara, & scopo minus conuenientia, in parua quantitate esse imponenda. Quod autem Mellis li. 12. ponat, ostendit illud theorematum verum esse, quod de materia remedium diximus, nempe materiam vel quæ naturæ vires gerunt, quantitate reliqua medicamentis superare debere. Quod vinum addideris sine quorū tate, id factum fuit, quia quantitas indicari non potest: poenula proia de ea erit quæ necessaria est ad dulcedinem medicamenti ipsitudinem. Mel enim insipissimum, conferuat, & dulcorat tantum: & quia aliquando crassius, aliquando liquidius, aliquando etiam plus vini, aliquando minus imponimus. Quare nemini mirum esse debet, si semper vini, mellis, syrupi, sacchari, olei, & ceræ, quantitates non annotemus, sed quod sufficere dicamus. Hæ præterea notare oportet, herbas pondere mensurari: quia sicæ viuantur: item radices, fructus, flores, semina & lachrymas etiam pondere. Chalcitis semivivis hoc re: edio ponitur, quoniam inter venenosa annuere, valde eum ad fungos. Multa etiam alia hic annotare possem, quæ in castigatione huius nobilis compositionis docemus, sed quia hæc præter institutum sunt, silentio prætereo.

Sed de his hæcenus: nunc Theriaces facultates breuiter persequamur.

Facultates.

THERIACA MAIOR ad eadem valet ad quæ Alyscatum: efficacior tamen est ad omnia: sed eadem hic obstruunt limitationes quæ illicitant; an scilicet recens aut antiqua. Recens enim, refrigeratior est, sic ad morbos calidos conuenit: Antiqua frigida estipulatur: quæ mediæ ætatis est, morbis medio modo se habentibus conuenit. Sed neque id nouisse sufficit: nam propriis cuiuslibet affectus medicamentis commiseri debet: ita enim quatuor: si ad fluxum sanguinis, cum aqua bullæ palloris miscetur, & sic de reliquis.

Apoplectæ prodest siualde antiqua decem: quia in tali affectu egerunt attenuatione humorum crassorum Apoplexiam committunt.

Epileptici conuenit recens: etiam si Epilepsia sit à nimio sensu, nam recens obtundat sensum illi exactum, si verò fiat ab humore crasso (quod scio rarissime accideret) exhibenda antiqua.

Racemuli vocis si a c. alius humoribus fiat, conuenit antiqua: sin à defluxione tenui recens.

Asthmatici recens, si à recens est calidiorum: sin à crassis humoribus, antiqua. Catarrhis & Hydroptici antiqua.

Peripneumonici & Pleuritici recens datur in principio cum tales affectus: si aut per defluxum: idem, quod cum aqua hordei.

Illosi recens, quia inflammatio est. Dysenterici recens cum succo aliquo refrigerante. Spasmodici recens ad sedandum dolorem.

Menstrua educit antiquissima, neque solum educit & prouocat menstrua: sed & immodicis mensum fluxionem sistit, ut inquit Gal lib. de Theriaca ad Pisonem. Miram variamque facultatem, inquit, habet. ideo alia diffundens extenuansque cogit ex cerni, alia quæ ob naturæ virtutis inbecillitatem superflua excrementa, viribus partium confirmari solet inhibere.

Lepas & Variolas emendat antiqua. Recipit contra omnia venena recens, quia venenum est resimilium partium: Toti itaque curæ consistere debet in conferuando corde, ne ad illud scilicet penetret vis veneni. Intraflanda sunt ergo meatibus: hoc autem medicamentum recens non modo intrafluit, sed & refri-

gerat, verumque est Alexipharmacum.

Omnem defectu sensum leuat antiqua: Recens enim magis sensu suspiceret. Retardat senectutem, inquit Gal quia excrementa corporis abluunt, & euacuat.

Quantis febribus & consumacibus soluendis apta est Theriaca antiqua (quod experientia comprobaturum est Mompeij 1551.) ubi iam apparuit signa corroboratio. Cum enim Pharmacopoeus quidam iuxta libellum quartanæ insepugnabili ea solutus est media hyeme solo viâ triduo Theriaca nobis p. scripto.

Espeius lani præterea dysentericæ conuenire.

Accipebat enim Scriba quidam suis inconsulto drach. 2. Colocynthidis, vnde in Dysentericæ incidit. Præbui illi drach. 1. Theriaca supæ paratæ, & conualuit eo solo remedio adhibito.

Russum edebat quidam falsamentis putida, & quibus duo obierat, testum me consulto, remissione facta Theriacam sumptis, & curatus est.

Vt autem siem dicens facili recens valet aduersus venena: antiqua vero aduersus non omnes diuturnos & inueteratos.

Reicio enim sententiam qui Theriacam pueris recens nata p. xebent, ne sint obnoxii (ut auit mulculæ) venenis.

Lata enim pueris iam primum in lucem editis calorem natuum obire potest recens, cum frigida admodum sit. Antiqua verò sua caliditate euaculare faceret eundem calorem.

Varia autem eius est dosisque à multis indicationibus sumitur. Si enim affectu pars sit remota, ratione optima dabitur maiori quantitate, quam si sit propinqua: ut si ad Podagris dari debet maiori quantitate quàm si ad Venericis. Recens item minori quantitate danda est quàm antiqua. Recens enim periculo non vacat: at antiqua ratione caliditatis naturæ amicus est. Calidum enim quoddam modo secundum naturam est.

Hæc sunt Theriacæ commoda quæ persequi nobis libuit. Plura requirit apud Gal. de Theriaca ad Pisonem, qui sigillatim eius facultates describit.

Theriaces & Methridatij miscendi proandig ratio.

Primarij huius nobilissimi Antidoti cinnamomatos Veneti, terenda duriora & crassiora, ordine contundunt; atq; in lebetem iustæ magnitudinis indunt, permiscunt; quæ deinde in varijs pilis æneis siue thoriarijs, exactè & operose ab operarijs tunduntur; humidis sicis immixtis distibuit; & pilis inter tundendum Opobalsamum succedaneo inunctis, ne pilis & pistillis adhæreant, & pollinis instar exhalent.

Olibanum, Gummi, lachrymas per se terunt; ne cum alijs trita coeant, aut coherendo in grumos coalescant, cinnamomemque impediant.

Agaricum prius derafum, teritur & cribatur, aut Ceruicæ modo ad Emplastra, fricando per setaceum traiecitur.

Trochisci per se teruntur Sagapenum, Galbanum & huiusmodi lachrymæ.

chrymæ vino passio siue Cretico solvantur, & per ciibruni fricando cernuntur.

Syracis dosim quidam auatè sordidj augent, qui Syrace putissima, in guttis vocata (reperit sedulis tamen hodie facilis) carenti quam exactissimè tetunt, mortario & pillillo clesatis, æquali affuso mellis defæcati pondere; Per setacum traiciunt, cui deinde Terebinthinam felicius miscent, quam Galbano, ex Galeni tamen præcepto.

Quidam Bitumen hodie, si liquidum sit quale est illud Gallicum Auerniense miscent cum Terebinthina & præparata siue transcolata Syrace. Si vero durum aut aridum sit, cum Calchitide in marmoreo lapide laugant.

Theriaca Diateseron Mesua.

Rec. Rad. Gentianæ,
Baccarum Lauri,

Myrrhæ,

Aristolochiæ rotundæ vetæ, ana. vnc. 2.

Mellis despumati opt. vnc. 24.

Indyctio collegij Medici Londinensium
Theriaces formula.

Annectere etiam vltum fuit vtilissimum alexipharmacum, ab indycto Medicorum Londinensium collegio, epidemici contagiosisq; febribus grassantibus, ciuem etiamq; eorum feruandj gratiâ, scitè excogitatum. Eadem ferè recipit, ipsèdemque pollet, quibus Fracastorij Diacordium, & solennè receptumque celeberrimum quorundam practican- tium Belgij, & Dodonej ad Pestem Elechuarij, Carliæ radice addita, siue tamen Opio:

Huius autem descriptio, fauore clarissimi doctissimi & perhumani V. Doct. Ricb. Faust- ri, Præsidij & Professoris præfati Collegij Me- dici, nec non veteris amicissimi vici D. Hugonis Morgani, S. ELIZABETHÆ sum- maz memoriz quondam Pharmacopej Regi- nej, artis suæ peritiss. & fidelissim. accepta est. Ab effectu Theriaca vocata, quia nullas vene- natas bestias recipit.

Rec. Cornu Ceruini lima detasi, vnc. 2.

Senninum { Citri,
Oxalydis, } ana. vnc. 2.
Pzoniz,
Ocini, }

Scordij,

Corallinz, ana. drach. 6.

Radicum { Angelicæ,
Tormentaliz
Pzoniz, }

Foliorum Dictami,

Baccarum { Juniperi,
Lauri, }

Florum { Calendulæ,
Caryophyl.
Anchos, }

Summatum Hyperici,
Nucis Moschæ,
Crocij,

Radicum { Gentianæ,
Zedoariæ,
Zingiberis; }

Macis,
Myrrhæ,
Scabiolæ, Succisæ,
Carduj benedicti,

Caryophyllorum,
Opij, ana. drach. 1.

Omphacij &
Mellis optimi, ana. q. s.

Misbridatum Damocratis.

Rec. Myrrhæ se-
lectissimæ,

Crocij

Agatici

Zingiberis

Cinnamomi,

Spicæ Natdi

Olibani

Thlaspios, ana. dr. 10.

Sesleos Matfilienis
aut Aethiopici,

Opobalsami

Schænanthi

Stæchadis

Terebinthinæ

Galbani

Costi

Piperis longi

Castorij

Succi Hypocistidis

Syracis Calamitzæ,

Opopanax

Folij ana. drach. 8.

Xyllocassiz,

Polij

Piperis albi

Scordij

Seminis Dauci Cretici

Carpobalsami

Cypheos

Bdellii, ana. drach. 2.

Nardi Celticæ

Gummi

Sem. Petroselin

Opij

Cardamomi

Gentianæ

Dictamni Cretici

Seminis fomiculi

Foliorum Rosarum

rubr. ana. drac. 5.

Anisi

* Asaj

Acori

Phu

Sagapeni, an. drach. 3.

Mej

Mej Hyperici, an. dt. 2. f.
 Ventris Scinci Vini, q. f.
 Acatiz Mellis q. f. hoc est
 Seminis & floctum triplum.

* (Omnes alij Ari legunt) Sed cum Coudenbergo pro Ari, Afari legendum conserem: Afari autem radix magis aromatica & medicata, cum quadam odoris grauitate. Nardum emulente, & antidotis infusetur, & odoris quadam gratia perditur est Dioscoride testis.

Pondus specierum cum lachrymis, est vnciarum triginta octo, & drachmarum sex. Igitur mellis lib. 9. vnciarum octo & drachmarum sex addendz

Mithridatica Antidotus

Paratur eodem modo quo Theriaca & omnibus ferè morbis quibus Theriaca auxilio est. Sed inferior ad venenatos serpentium, rabidiq; canis morsus est.

Hanc descriptionem sequuntur Pataviui Veneti & pleriq; omnes Itali Doctores, qui Damocratis Mithridatium & Theriacam Andromachi, magnificentia, dignitate, laude, apparatus, diligentia & maximo assentante populo applausu, publicè parari iubent.

L'Obel. Antidotus à Junipero ad Pestis Contagio.

Rec. Radicum Angelicz,
 Vicetoxici

Valerianæ
 Tormentillæ
 Tapfi barbati, ana. vnc. i.

Rad. Carlinæ,

Zedoariz

Gentianæ

Inperatoriz

Petasitis

Helenij, in succo Limonũ & Cydoniorum
 infusarum ana. vnc. f.

Pulegij Ceruini, aut foliorum Di&amni

Cretici,

Melissophylli

Maiozanæ

Menthæ Romanæ siccæ

Corticis Cieri

Foliorum Ruizæ

Scordij vtriusq; ana. drach. 6.

Seminis Citri excorticati,

Seminis Cardui sancti,

.Ocymi,

.Oxalidis,

.Portulacæ,

Aquilegiz,

Cinnamoni electi,

Caryophyllorum,

Myrrhæ,

Rasuræ Eboris, & Conuæ Ceruini,

Succini,

Boli Orientalis,

Terræ Lemniæ selesiffi.

Santal Rubri, Moschatelini,

Xylo-Aloes primæ notæ,

Florum Anthos

Saluiz, ana. drach. 3. f.

Fiat omnium puluis tenuissimus.

Deindè accipe Granorum Iuniperi pocula decem, Ficuum pingulum, lib. 1. f.

Contundantur, coquantur in f. q. aquæ Regiæ Pratenfis, vel Cardui sancti & Oxalidis. Deindè coeuntur limpidissimè per manicam Hippocraticam. Colamen lento igne coquantur, donec Mellis crassitudo fiat, quo pulueres supradicti excipiantur, addendo

• Methridatij Damocratis vnc. 6.

Conf. Rosæ antiquæ, vnc. 12.

Confer. flor. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Anthos,} \\ \text{Borraginis,} \\ \text{Violarum,} \\ \text{Nymphetæ,} \end{array} \right\} \text{ana. vnc. 4.}$

Succi Glycyrrhizæ dissoluti pauca Rosacea vnc. 1. f.

Racchari albi f. vnc. 18. ad mitigandam amaritudinem ingratam.

Alto durioribus & minus morosis additur Aloes succotrina se&gm vncia.

Pro diuinitibus admisceo Bezar, speciem Diambari, Diamargariton frig. & Confessionem Alkermes. Rondelletus dicit deducere ad cur, resicinus tamen cordialis permixta alexipharmacis.

Quidam singulis dosibus addunt aliquot guttulas olei Sulphuris.

DIASCORDIVM Hieronimi Fracastorij.

Quamuis plus satis grauentur compositis Medicamentis Pharmaceutices Officinæ, & pleraq; Europæ certissimè nobis comprobati sunt, iniquè conscientiz stimulo, Medicis & ægris, suppositis imponendo, artis Medendi, pro dolor euerfione, non solum medicaminibus illis vulgarioribus ad curandos morbos populariter orbatas; sed omnium necessariorum, cum compositorum, tum Materiz Medicæ abiectionum viliissimorumq; Simplicium, Præsidiorum, morborumque propugnaculorum, etiamque lachrymarum, summa Reipublicæ ruinâ & perniciosissima peste, viduitate tenet: Id quod sæpe pios & doctos Medicos

Medicos coegit propriâ sua Medicamenta parare, aut sibi fidos Pharmacarios eligere; subiungemus tamen Opiatis Medicamentis Londinensium alexiteria, & Fracastorij Diascordium, quo Belgæ & Itali sæpe vtuntur, sed nulli magis aut frequentius quam Londini. Laudabilis est Antidotus, & commendatur in ijs, quibus Theriaca locum non habet: vt pueris, grauidis, & peste correptis, deploratilque malignis febribus.

Rec. Boli Armeni, vnc. i. f.
Scordii veri, vnc. i.
Syracis Calamitæ drach. 4. f.
Cinnamomi,
Cassie lignæ,
Diatami Cretici,
Tormentillæ
Gentianæ
Bistortæ
Galbani
Terræ Lemniz, ana. vnc. f.
Piperis longi,
Zingiberis, ana. drach. 2.
Opj,
Seminis Acetosæ, ana. drach. i. f.
Mellis albi despumati, lb. 2. f.
Conseruz Ros. lib. i.
Vini aromatici, lb. f.

DE HIERIS.

Chara Teribus literis nê Romanis, Rondelletiana qua sequuntur, Chalcographi commodo cuiuntur; L'Obelij autem Italici: nulla autem blindiloquentia aut sedulitate nostra, vquam præsari potuit, vt operarum fatalis & persipax, rei tam necessaria, tanta incuria, non multis auctorum varias authoritates characteribus, velim nolim, confuderis.

DE HIERIS.

Aliud Medicamentorum genus est inter laxantia, quod **HIERA PICTRA** dicitur, id est **Sacra**. Confititur ex amaris; ob id **Picta**, id est, amara vocata. Excipiuntur amara in puluerem redacta, & Melle & Vino, vt Antidota: sunt autem huius Medicamenti permultæ Compositiones, quæ ab inuatore, vel à materia, vel à sapore, vel ab eo qui castigauit & meliores reddit nomen fortitæ. Ab inuatore, vt **Hiera Hermeticæ**, ab **Hermete**, & **Ar-**

chigenis, ab **Archigene**. A materia, **Hiera Colocynthidos**: à sapore **Picta**; eadem **Galenus** dicitur, quod illam castigare, ac immutare. Illam paratam ex Colocynthide habere oportet: hæ enim quæ sufficere possunt; verum ea, quæ **Picta** dicitur, variis modis apud varios paratur; & a **Galeno** etiam ad ventris corroboracionem; ex Aloe lota fit, aliquando ex non lota. Varia item est ob Aloes dosim: nam aliquando ex drach. centum, & aliorum Simplicium ana. drach. 6. fit: aliquando ex 80. idcirco differunt. Aliquando cum Croci drach. 6. & quandoque drach. 5. tantum; vt quando ad dolores capitis, vertiginem & suffocationem paratur. Differt, quod aliquando Asarum, aliquando Carpesium recipit. Expedit ergo (vt **Gal.** docet lib. 7. Method.) dupliciter paratam habere, scilicet ex Aloe lota & non lota: quod si triplicem habeant; tanto melius est. Tertia drach. C. Aloes & singulorum drach. 6. Cinnamomi, Xilobalsami, Asari, Spicæ Nardi, Croci & Mastiches, siue ex Aloe lota, siue non lota fiat. Sed ex Croci drach. 5. paratam habere, ad dolores qui sunt a fumis caput ferientibus, opimum est. Hæc descriptio ante **Galenum**, ab **Andromacho** tradita est, & à **Gal.** probatur. Hanc Hieram posteriores **Galenus** ascribere, **Galenus** dixere, quam magis probandam cenfeo, si laxare sit animus: si verò ventrem magis exsiccare & corroborare, illam quæ ex drach. 80. Aloes lotæ paratur. Tunc minus laxat, quia minorem quantitatem Aloes recipit, quæ sola vim laxandi habet. Carere possumus ea quæ conficitur ex Aloe lota, quia pilulæ vulgo dicuntur **DE AROMATIBVS** in eius locum substitui possunt, vel augere aromatorum vim vna aut altera drachmâ, & fiet medicamen ventriculum roborans magis, & minus laxans.

Hiera efficaciores.

Inter Hieras fortiores, magis probata est ab antiquis ea, quæ à Scribonio largo descripta est, nomine Pagnini Antiocheni, quam compositionem vocari dia-Colocynthidem ipse testatur. Dicitur enim **Picta** à quibusdam, quia amara est. Ab alijs dia-Colocynthidos. Quæ descriptio eadem est apud Paulum nomine **Archigenis**. Non me latet compositionem dia-Colocynthid. descriptam à **Gal.** lib. de paratu facilibus, quæ non nihil euariet, accipere & Cassiani & Cinnamomum, cum alij tantum Cinnamomum. Gentianam pro Aristolochiâ, Chanepitym, pro Chamedri, Folium vel Pulegium prætermisit. Adde quod maiorem quantitatem

Addis. Rem. titatem Colocyntid. recipit. Habet enim Colocyntid. drach. xvi. aliorum vnci. 4. aliquorum vnc. 5. quare cum manifestissime appareat hæc compositio valde corrupta, & de libro studiosi dubitent, an genuinus sit Gal. hæc multum conuenit cum Hiera illa dia-Colochin. descripta à Mesue, quam Ruso tribuit sed nonnulla sunt mutata, quæ multum variant compositionem, vt dosis Colocynt. Cassiæ & Cinnamonom. Illa Pauli siue Scribonii integerrima est, & paratu facilis. Cuius descriptio talis est.

Hiera Archigenis apud Aegin. cap. 8.

Rondel.

Rec. Marrubii,
Agarici,
Chamedryos,
Carnis Colocynt.
Suxchadana. drac. 10.
Opoponac.
Sagap.
Petrosel.
Aristoloch. rotundæ,
Pip. albi, ana. drach. 5.
Cinnamonomi,
Spicæ Nardi,
Myrrhæ,
Poliū, 7
Croci, ana. drach. 4.

Opoponax, Sagapenum, & Mirra confusa in aqua Mulla macerentur per nocte, & contundantur. Si festucæ sint, calefiant & colentur, acida in pul. redigantur, excipiantur melle q. s. & reponantur in vase vitreo. Cum verd efficaciorē facere voveris Medicus ad purgandum, * Scammonij aliquam quantitatem ponat, & talis est paranda, quod sit efficacissima ad morbos contumaces, & à materia frigida. Hæc enim conuenit cum illa Ruffi, Pauli, Iusti, & Antiochi facultate. Non est alia querenda nec paranda, ne Pharmacopola oneretur multis medicamentis inutilibus, in quibus parandis multa sumuntur simplicia. Nos hic Polium pro Folio ponimus, quia Folium verum non habemus, & vt Stechas ac Marub. in hac compositione ad extenuationem ponuntur, non malè conuenit hoc loco. Non melacet, Scribonium largum habere & Paulum, in Hieris Antiochi, Ruffi & Archig. Polium: Quod si magis placet Folium, pro Folio pone Spicæ Nardi tantundē. Nam vt Gal. lib. simpl. docet) eandem facultatem habent. Et hæc de Hieris sufficiant. Nunc ad alia veniamus, quibus instructum Pharmacopolam esse oportet.

* Hic incepti Cinnamonum pro Scammonia legit, neque erratum animaduertit Veseli erroris.

De PILVLIS.

Rondel.

Pilulas paratas in officinis habere oportet, tum quia sicca non tam cito niscuntur & vniuntur, ac in vna contemperacione veniunt, vt illa, quæ xel decoquantur, vel liquida sunt. Ideirco parare per otium, & paratas habere oportet, vt longa illa mora caligetur & vniantur, cum propter morborū celeritatem, tum simplicium saporem ingratum, & odoris insuauitatem, quæ si in pilulas referantur, deuorantur sine sensu saporis, minusque odorem inspirant ingratum.

Pilularum multæ sunt differentię, de quibus omnibus non dicemus, sed de magis necessarijs ad morborum curationem, vel de his, quæ Medicis communi consensu receptæ sunt. Erunt igitur pilulæ communes de Hiera simplici, de Aromatibus, seu Alephanginæ, Assaieret, Masticlinæ, Ante Cibum, Coccix de quinque generibus Myrobalanorum, Aggregatiuæ, Aureæ, & Sarcocolla, Fritidæ, de Agar & Rhab. & Fumo ter. & Lapide lazuli, Lucis, de Euphorbig. Hæc sufficere debent. Multæ enim sunt earundem virium, vt apparebit his, qui diligentius expendere volent facultates simplicium, & illa ad inuicem conferre. Quid opus habere pilulas Sebelinas, si quis pilulæ ante cibum habeat? Quid opus est pilul. Indas parare, cum è Lapide Lazuli paratæ sint? Eadem serè & Pilul. Fritidæ maiores. Pilulis de Euphobio carere potest, qui Pilul. ex Agarico paratas habet. Ad euitandam infinitam illam pilul. Syluam, nos ad hunc numerum contrahimus reduci ad sex, si Medicorum Collegium voluerit.

De Pilulis Communibus, siue Pestilentibus.

Rondel.

Omnes Pil. sunt variæ apud varios auctores, sed nos hæc Communes pillul. appellamus, quas aliqui Pestilentiales, quod ad pestis præseruationem valeant. Has Rasis ad Almauforem, lib. 4 tradit. Non desunt, qui putant esse Ruffi, sed toto cælo aberrant. Nam Ruffus magis potionem, quàm pil. tradidit, vt ex Paulo cognoscere licet. Quare cum sint pil. non debemus pro Croco Ammoniacum ponere, vt quidam magni nominis vir annotauit. Dubitamus diu, quam descriptionem retinere deberemus. Sunt enim apud Auic. Rasis, & in vulgatis dispensarijs diuersæ. Illam Aulcen. descriptionem non probamus, quia citra pondus aliquod descripta est: quam

quam intelligat in æquali pondete ponenda esse omnia : Verùm illa rerum proportio non potest probari, quia tantum Croci & Myrrhæ ponere, quantum Aloes, est contra componendorum medicamentorum rationem : scilicet, quòd quæ vincunt, & castigant, ut in istis apparet, sint æqualia his, quæ potissimum agunt; qualis est Aloe. Eadem ratione reiicienda est ratio Dispensariorum, quæ in dupla proportionē Aloem ponunt, & Myrrhæ & Croci; quam tollerari potest, Aloes vnc. 2. Myrrhæ, Croci, ana. vnc. 1. Magis mihi arrisit illa, quæ Aloes vnc. 1. Myrrhæ, Ciociana. drach. 1. accipiebat. Illa est vera proportio, ut minus calfaciant, magis moveant alui excrementa. Nos igitur sic parabimus.

Rec. Aloes bonæ, vnc. 1.
Myrrhæ electæ, Croci, ana. drach. 1.
cuni vino odorato, fiant pilulæ vel cum succo Limonium tempore pestis conveniunt; quia propter siccitatem venenis magis resiliunt, & minus calfaciunt; movendo alium. Non probò illorum præparationem, qui Aloem abluunt in *Aceto, (ad colorandam Aloem) quia vires laxandi perdit: nec illius Christophori additionem. Addit enim Bolum atmenâ tempore pestis: Verùm quæ astringunt, sua attractione, vel proprietate venenis resiliunt, vel lentore modico; purgantibus medicamentis misceri non debent, quia eorum vim extinguendo, purgatiæ faciilitatem impediunt: Satius erit illa dare post, vel per se accipere. Non novit vir ille, an pugnent inter se.

De Pilulis à Hiera simplici.

Pilulæ à Hiera dicuntur, quæ ex pulvere Hieræ parantur, & paucò melle Rosato colato. Quare talis est earum descriptio.

Rec. Pul. Hieræ Gal. vnc. 1. cum paucò Melle Rosato colato fingantur Pilulæ. Aliqui, ut Brasavola, Agarici tantum, quantum Aloes ponunt: sed illæ non erunt ex Hiera simplici, sicut nec illæ, quæ in quibusdam locis parantur, ex Hieræ Agutici trochiscis, ana. vnc. 1. Aloes vnc. 1. Hæ sunt ex Hiera compositæ, non simplici. Quæ autem sit Hiera simplex, & quæ composita, quære cap. de Hieris. Nota in pil. sumi species hieræ sinipi. In opiatibus autem, compositæ.

Pilule de Aromatibus, seu Alephanigna.

Pilulæ, quæ abluuntur in decoctione similitonum aromatum odoratorum, nomen Aro-

maticarum acceperunt. Conveniunt cum Pil. de Hieræ, ex Aloe lota, in corroborando & minus laxando: quare sufficit habere ex Hieræ simplici, ex Aloe lota. Si pilulæ de Aromaticis paraverimus, seic eadem descriptio pilulæ apud omnes est, paucis immutatis. Myrrhæ Lignum Aloes prætermisit, expunxit Ros. & Absynth. & ante ablationem Ciocum miscet: cum alij omnes cum Myrrhæ & Massiche, Croci adjiciant. Cubebæ interpretantur Cardamomum: quæ interpretatio mihi non placet, quia semen continuax ad frangendum non est; quare omnes aliorum compositiones magis probò, quia Cubebæ & Cardamomum habent, Absynth. & Ros. Improbanda est ratio, quæ tepugnatur, quæ a Mesue in usum ducta sunt; quod non differant decoctione odorata. Hic autem diu decoquitur scilicet, doceb. lib. 12. aquæ ad consumptionem duarum lib. veniant, & tertia remaneat. Aliqui huic errori succurrere volentes, tertiam partem odoratorum pulvisulorum decoquendum volunt; alij eam infundunt, tertiam miscent, & incorporant. Nos verò, ne longius recedamus ab eo, qui illas duas instituit, reticimus, propterea quòd in prima paucas vires recipit, & multas perdit in solatione: Ultima verò plus vitium recipit ab odoratis. Nos hoc modo commode parabimus.

Rec. Cinnamomi
Cubeb.

Ligni Aloes, vel Santali Cistini,
Calami aromatici,
Macis,
Nucis Moscæ,
Cardamomi, Caryophyl. Asiri, Massiches, Schænanthi, Spicæ Nardi, Carpopalsami, ana. vnc. 1.

Absynthij siccij,
Ros. rubr. ana. diach. 5. terantur crassiusculè, & infundantur in lib. 6. aquæ bullientis.

Post infusionem 6. aut 10. horarum, stricentur maribus, & exprimentur, & colentur. In col. lib. 4. injice Aloes exquisitissimè trix, in aqua pluviz diligenter lotæ in vase terreo vitæato lib. 1. qua probè exiccata, adde infusionis atomatum lib. 2. In sole æstivo vel hypocausto semis affundendo residuum aquæ ex infusione aromatum, & ex massa formentur pil. vel si absumpta sit tota aqua, ex aqua Absynthij, vel vino odorato, formabuntur. Has oportet habere paratas, quæ omni tempore non possunt parari: etiam si in hypocausto paremur, vel in furno tepido: conjunctor tamen præparatio est æstate, sub cane, ut in Diario docebitur.

Pilula assaieret ex Auienna.

Rec. Hieræ picæ, vnc. 1.
Mastiches, Myrob. citrinorum, ana. vnc. 6.

Aloes optimæ, vnc. 2. fiant Pil. cum Syr. & Stachade. Hæ pil. dispensandæ sunt propter affectus, qui sunt cum defluxione, vel cum ventriculi remolitione, vel relaxatione: quamquam omni tempore parari possint; qui carent eis, addita aliqua myrob. quantitate & Mastiche similes sibi parabit.

Pilula Mastiche Consiliatoris.

Pilula Mastichinæ à Mastiche appellatur, facile, citò & semper parari possunt: quare sufficit, earum nouisse descriptionem, & cum imperabuntur, parari poterunt. Harum tres descriptiones reperiuntur, quarum duæ similes sunt; tertia, quæ ad Nicolaum refertur, Diagredium recipit; multum à facultate Mastiches distat; quare sunt reiiciendæ, & illa Consiliatoris viurpanda, quæ magis probatur, & ventriculo magis accommodata, in cuius gratiam instituta sunt. Dantur in ventriculi nimia laxatione à pituita aqua, & tenuitate Agaric. infundere non oportet, neque in aceto, neque in oxymelite.

Rec. Aloes electæ drach. 10.
Agarici albi friabilis, drach. 2.
Mastiches, drach. 4. cum syr. de Sizehade, fiant pilulæ.

Pilula ante Cibum.

Pilulæ ante Cibum dicuntur, quæ ante prastum assumi possunt, ad ventris corroboracionem; sed tales multæ sunt, quæ hoc modo dari possunt, vt pil. de Hiera, Alephanginæ, Mastichinæ, & similes, quæ odorata recipiunt, & leuiter purgantia cum astrictione, vt Rhubarb. Verùm cum illis sint similes de Hiera, vel de Aromatibus, nisi quòd Rha. & Seseleos montani semen non habent, idcirco non sunt dispensandæ: nam & qualis proportio Rhab. addita pil. de Hiera, similes reddet, & maxime, si grana aliquot Seseleos addas, vel Anisi, vel Apij, citra damnum carere possumus.

Pilula Coccia Rhafis.

Pilulæ Cocciz, à grano, quod Coccois dicitur, nomen habent, quia fieri debent ad magnitudinem eius grani, quarum descriptiones sunt Præpositi, ex Galen. & Rhafis. Verùm Rhafis magis probandæ sunt, vt quæ hæc recipiant.

Rec. Specierum Hieræ, drach. 10.
Colochint. drach. 3. & scrup. 1.

Scamm. drach. 2. & 1.
Turbit. & Stachad. ana. drach. 5. fiant pil. parulæ. Sed quia Rhafis imperat Hieram picam, ob id censent secundum illius descriptionem parandas. Pro Pilulis illis consiciendis, hoc vnum est supersticiosum, quod Ros. addit tantum, quas si placet, potes ponere: sed cum hæc ad purgationem pilulæ crassæ, & ad ea, quæ sunt multum infixa ventriculo, instituuntur, non est necesse rosas apponere, sed potius delere oportet, quia adstringentia impingunt magis, vt Galen. de Absynth. scribens docet: quare ex Hiera Gal. parari debent. Cocciz Mesue minus sunt probandæ, hoc nomine, quòd myrob. recipiant, & alia calidiora.

Pil. Aureæ Nicolai.

AVræ Pilulæ ab aureo effectu, ac nobili, quem præstant, dictæ sunt à Nicolao, descriptæ & Præposito, Alexand. & Myrepsico. Verùm quia illa iam vulgata nihil reprehensione in se dignum continet, retineudam censuimus.

Rec. Aloes, Diagredij, ana. drach. 5.
Ros. sem. Apij, ana. drach. 2. 1.

Anisi, Fœnic. ana. drach. 1. 1.
Mastiches, Croci, Interioris Colocynthidis, ana. drach. 1. cum aqua infusionis Tragacanthi formentur pil. Aliqui addunt Hieræ picæ, drach. 1. Ego non suadeo addendum. Quòd si addatur, augeatur moles Medicamenti, & minus efficax redditur. Adde quòd hæc pil. crocum, sem. odorata, Rosasque recipiunt, ad fortiorum medicamentorum moderationem. Colocynthis forcipibus incidatur ante contusionem, & per se teratur, vt Diagredium.

Pil. Aggregatiua Mesue.

AGgregatiuarum descriptiones variz sunt, aliz maiores, aliz minores dicuntur apud Mesuem: & præter has duas, tertia reperitur, quæ ex intentione sua vocatur; quibus carere possumus, & debemus; sunt enim compositæ ex omni genere medicamentorum dissimilium: quod Galen. lib. quæ purgare oportet, & quibus medicamentis, supra modum improbat miscere, quæ secum pugnent. Sed quia hæc Pilulæ sunt ad omnes humores euacuandos, retinentur, & comparantur * Catholico illa descriptio prima Mesue ex sua intentione,

* Polychrestæ.

ne, sic habet, si exemplaribus antiquis magis credendum sit.

Rec. Myrob. citrinorum, Rhab. ana. dr. 4.
Succi Eupatorii Mesue, id est, Aggerati Diose. siue herbæ sanctæ marie, Abiynthij, ana. drach. 3.

Scam. in pomo Cytonio leniter in furno cocti, Turbith Aloes ana. drach. 6.

Myrob. Chebul, Ind. Agarici, Colocynth. Popy. ana. drach. 2.

Mastiche, Ros. sal. gemme, Epith. Anisi zinziberis, ana. drach. 1.

Elect. Ros. Mes. q. s. In forma opiæ præstant pil. Has Pil. ad veritatē exemplarium veterum imperavimus præparandas, & ne fortiores sint, & facillius parentur, formentur cum Electua. è succo ros. quod recipit scammonium. Quod fit, vt ad idem recurrat, & non erunt fortiores solito.

* Videtur velle dicere Rondelium succo Ros. quod non recipit Scammonium.

Pil. è quinque generibus Myrobalarum.
Nicolai Prappositi.

Rondel.

Pilul. de lapide Lazuli vituperantur non sine ratione. Sed si ob lapidē Lazuli vituperantur, debent pil. Indis, Lucis minores, de quinque generibus Myrob. & de Lapide Armeno daminari. Omnes quippe istz lapidem Lazuli recipiunt, & præter lapidem illū Cyaneum, Veratrum nigrum; pro quo Officinæ Aconitum ponere solent, non sine magno ægrotantium periculo. Inter omnes illas, securiores sunt, quæ è quinque generibus Myrob. iactæ Medicis receptæ sunt; & sine hæsitatione & formidine ab omnibus præscribuntur. Recipiunt autem, quæ violentius purgant; sed ad articulare morbum Insistuntur earum agitationem verentes, Myrob. addiderunt. Illarum verò descriptio talis est.

Rec. *Quinque generum Myrobalarum,*
Agarici,

Diagredij,

Colocynthis,

Seca, ana. drach. 2. s.

Epithymi

Turbith

Anisi

Marabri

Mastiche

Lapidis Cyanei præparati, ana. drach. 3.

Aloes selectissima vno. 1.

Ex succo Abiynthij fiat massa,

In prima classe Rondellinus, Cordus & Andernacus, ana. drach. s. legunt. Goudembachius, vno. s. legendum putat. Vno. exemplar Nicol. Prappositi habet drach. 1. s.

Nos exq. Iouberro, Fuchs, Bauderono, ex Nicolao Alexandrino, mediocritate freti, drac. 2. s.

In secunda verò classis, cum Cordus & Andernacus drach. 2. legimus. Occomus & Augustinus, Iouberro & Bauderono ex Nicolao Alexandrino, drac. 1. grana 16 habent; Nicol. Prappos. drac. 2. s. grana 5.

Admodum variant in ponderibus harum pilularum auctores, sine tamen nexa, pondere nobis præscripto, in vsu præparanda videntur. In tam varia lēssione, temerè ne dam Pharnacopis, vix etiam Medicis optimis, nisi, vt Rondellius placet versati sint in cognitione simplicium, & præparatione & compositione medicamentorum; cum videremus ipsum Andernacum, virum doctissimum transcripsisse, & ex Rondellio mendacè legisse Myrobalarum omnium, ana. drach. s. quemadmodum in Observationibus suis in Syrapum Insybaccum compositum, isidem impugnat scopulis, vt suo loco diximus. Vnicum tamen vnum Aloes commo dissin. è cum Nicolao Prapposito huius compositionis auctore, pro drachma legit, vt habet Rondellinus, Ty. graphi incuria.

Propterea nobis obsecrata, melius respondere videtur.

Iouberro, Occomus & alij ex Nicolao Alexandrino, Aloes drach. 4. legunt; & tantumdem Rhabarb. ex eodem coniungunt.

Rondel.

Quidam mediocriter eruditus, non intelligens rationem componendorum medicamentorum, in hac addendum esse Zinziber, colligit, quia hæ Pil. Aga. ad expurgandam pituitam crassam acceperunt. Turbith enim & Agar. non perpetuò desiderant Zinziber; sed cum picuita crassa euacuanda est: Vtrum si ichores pituitæ aut aliorum humorum excrementa, quæ in articulos fluunt, trahenda sunt, & à particulis auertenda, ob id sine ipso & alijs in multis compositionibus iniiciuntur, quia illa pugnant, Myrob. omnes recipere, atque Zinziber. Hoc enim attenuat & incidit: Myrob. verò astringunt. Illa enim est ratio Atarbum, vt alijs medicamentis agitantibus humores addantur astringentia, vt temperentur. Qui has pil. habent, Lucis minoribus caretè possunt, & pilul. Indis, & de lapide Cyaneo. Quod si quis vult aliquos tales habere sine Myrob. pil. de lapide Lazuli habet. Quorum descriptio similis est pil. Indis, nisi quod Colocynth. recipiant. Quare si quis illis magis fidat, Colocynth. gran. aliquot addat vel Trochisc.

Alindal. Sed cum Agaz. Veratrum, & lapidem Lazuli recipient; non est quod Colocynthidem recipientur.

Pil. de lapide Lazuli seu Cyaneo.

Rondel.

Pillul. è lapide Lazuli à Mes. sunt institutæ, quod medicamentum minus convenienter & rursò in forma illa datur, quia cum sit medicamentum quod crustas faciat, diu retineri in ventriculo non debet. In formata igitur pil. reduci non debet, cum neque sapor ingratus, neq; odor gravis illi suadeat. Multo magis probarem Alex. Tralliani pil. de lapide Armenio: Nos tamen descriptimus, in eorum gratiam, qui non noverunt dexterè uti medicamentis, vel non nisi in forma confusa, vel qua vti sunt eorum præceptores. Si igitur ex Cyaneo pil. potius vis, quam pulp. parentur sic.

Rec. *Lapidis Lazuli tenuissimè tritis. & decius latis in aqua Buglossi vel Viol. dr. 6.*

Epithymi,

Polyp. Agarici, ana. drach. 8.

Scammoneij,

• Hellebori albi,

Sacch. Candis, sine Salis Indi, ana. drach. 2. f.

Caryophyl.

Arif. ana. drach. 4.

Hiera picra, drach. 15.

Cum succo Endivia fiant pil.

In hac compositione sufficit ablucere lapidem Lazuli tritum in tenues partes, & ablucere quidem sufficienter in aqua Violat. vel Buglossi, ut aliqua ex parte remittatur acrimonia lapidis, quia in Ventriculo crustas inducit. Præterea, pro Veratro nigro, album posuimus, quod etiam si non sit securius nigro, securius saltem est Aconito, quo Veratri nigri vice utuntur, similitudine fol. & radic. decepti. Pro sale Indo, Saccharum Candum posuimus. Quod si naturale esset Sal Indum, esset antiquiorum: sed cum Sacch. Candum arte fiat, cum illa Sacch. lachryma indurata sponte, affinitatis multum habet. Nihil præterea Inmutauimus à descriptione Mes.

* Radix Helleboris niger, Botanicoarum diligentia innotuit quo vitandum.

Catapotia ex lapide Armeniaco

• Alexandri Tralliani.

Si cui ariserit Tralliani descriptio Catapotiorum ex lapide Armeniaco,

Rec. *Picra & Epithymi, ana. semunciam. Agarici, & lapidis Armeniati, ana.*

semip. 4.

Scammoneij, unc. 1.

Caryophyllorum, gran. 20.

Confusa excipiuntur Rhodiocelo, aut succo Citrij aut Rhodometisc. Dosis semip. 2, plurimum quatuor.

*Notandum verò est, adlus Trallianum, hæc, præterquam stomachum corroborant, simul etiã variis humores, præsertim terrestrem & meloc. cholicum citra molestiam purgare posse. Idem igitur lapis, ut diximus, & potus, & in catapotia redactus, ad purgandum est efficax. Nec amplius querendum est, nãm sufficatio quadam, aut sinecepe subsessitura sit, quemadmodum id ex albo Veratro fieri contingit. Hinc colligere est, Trallianum fidem adhibere castigationis Lapidis Armeniati, beneficio Hiera aromatica & Caryophyllorum. Scammoneum præterea (in Cydolio coctum præsertim, aut ex succo Cydoniarum, additis Mastiche & Cinnamomo ex descriptione nostra) statim expulsi ex corpore Lapidem Armeniati, quemadmodum Hellebicum, ne longa mora corrodat, & vrendo ex Arabum & Græcorum sententia noxia sint, sanioraq; inducant symptomata, ut cananitioni &c. quemadmodum monet Rondeletius in Pilulis suis Benz. arab. De lapide Armeno & Cyaneo parumq; purgatione, vitio & ablutione, in Confusione Alkermes plura require.

Pilu'a e Sarcocolla.

Pil. de Sarcocolla similes sunt vitibus Coccijs: hac tantum ratione differunt, quod Scammoneum non recipiunt: quare qui has pil. habet, pil. Coccijs catere potest. Nam addendo parum Scammoneij, eadem erit compositio: Sunt apud Mes. cap. de Sarcocolla.

Rec. *Turbit, drach. 4.*

Sarcocolla dissoluta in aqua Ros. dr. 3.

Colocyn. Zinzib. ana. drach. 1. f.

Salis Gemma drach. 1, incorporentur pulueres cum Sarcocolla infusa in aqua Ros. & dissoluta, fiant pil.

In hac compositione nihil desideratur: hoc tamen dignum reprehensione, quod in aqua Ros. dissoluatur Sarcocolla: debet potius in aqua Hyssopi & Melissæ, vel si calorem temperare velis, in aqua Viol. quæ sine astrictione refrigerat. Sed hoc leue est, & dissimulari potest, ne pro re minima videamur à communi sententia discedere.

Pilul.

Pilula de Agaricò.

Pilul. de Agarico à Mes. describuntur, & alijs multis: Omnes descriptiones ferè in idem recidunt; quare consuetam illam in offic. dispensandam censéo, quæ optima est, in eaque nihil reprehendendum. Recipit autem quæ sequuntur.

Rec. *Turbit. drach. 9.*

Specierum Hiern. Pietræ, drach. 4.

Agarici, drach. 3.

Colocynt. Sarcocollæ, ana. drach. 2.

Radix Icos, Prassij, Myrrhe, ana. drach. 1.
cum Sappa fiat massa Pil.

Eisdem vires habent, cum Pil. de Sarcocolla: & pro pil. de Sarcocolla uti possumus, & contra; modò cum syrupo pectorali deterfuo formentur, vel cum Sappa. Eædem pil. imperari poterunt, pro pil. de Euphorbio, addito paucò Euphorbio: & pro Fortidis maioribus, addendo Opoponacis vel Ammoniæ parum.

Pilula s; tida.

Fœtidæ dicuntur, quòd scetidis componantur, ut Sagapeno, Ammoniaco, Opop. Castoreo, & alijs multis. Sunt autem valentes in affectibus articulorù frigidis, & pituosis morbis. Et quia viles sunt, visum suit eas non præternittere. Erunt pro pil. de Euphor. Fortidis minoribus, de Hermodactylis maioribus, & de Sagapeno. Sunt efficacissimæ in alterendo & laxando.

Rec. *Sagapeni,*

Ammoniæ,

Opoponacis,

Bdely vel Myrrhe,

Colocyntidis,

Seminis Rutæ aggregatæ,

Alœi,

Epithymi,

Turbit. drach. 4.

Scammonij præparat. drach. 3.

Hermodactylorum,

Essulæ, ana. drach. 2.

Cinnamon,

Spicæ,

Cruci,

Castorei,

Euphorbij, scrup. 2.

Cum succo Porti fiant pilulæ.

Hæ pil. multum habent difficultatis, quia Bdelyum molle non faciliè invenitur, ne dicam

aliud. Magna est contentio inter Interpretes an legendum sit (Harnel) id est, semen Cicutæ, vel potius (Harnela) id est, id est, semen Rutæ aggregatæ. Item ob Hermodactylorum & Esulæ dubitationem. Nos tamen has dispensandas imperamus ob eorum efficaciam, & frequentem usum. Sanè minores facilius patantur, & paucis additis, omnino simile redduntur. Nos tamen præmeditata & bene pensata difficultate, remedium obtinuimus, ut pro Bdelyo, Myrrham iniecerimus, vel Propolym veram, & pro harnel) legendum (harnela) quia ad morbos articulates à Dioscorido. commendatur. Semen verò Cicutæ, tanquam venenum ab omnibus internis remedijs expungitur. Hermodactylorum vox vagæ est, & incerta. Non desunt, qui dicunt. Hermodactyli. apud Græcos, radices esse Quinquæ solij: Apud Arab. radices; quarum Mesue tres differentias ponit, nigras, albas, & rubras. Fuschius putat apud Nicolaum in Antidoto Alexandrina esse Behen album & rubrû, propterea quòd dicitur Hermodactylus albus & ruber. Sed hic locus non est sufficiens: quia ex Mesue sunt Hermodactyli albi optimi; rubri non optimi; nigri deterrimi. Nos in omnibus compositionibus Arabum, Hermodactylos vulgares accipimus. In Græcorum descriptionibus, rad. Pentaphylli. Nec sunt audiendi, qui dicunt esse Ephemerum Colchicum, cum differat ab Ephemerio flore. Nostri Hermodact. flos est luteus: Colchicum flores Croci habet. Sed de his alijs. Maiores dicuntur, quia plura, quàm minores, simplicia obtinent.

* *Alexandrina antidotus non est per a-da, quando habemus Thieriam: videtur enim Thieriam argere.*

Pil. de Rhabarbaro.

Ex Rhab. siue, ut Mes. vocat, Raueteni, præparantur pil. quarum duæ extant descriptiones: ad cachexiam vna: ad hydropem altera magis. Sed quia illa recipit multas lachrymas calidiores; illas præternittendas censéo, tum quia paucæ Medici illis utuntur. Dispensantur ad cachexiam sequentes.

Rec. *Rhab. drach. 3.*

Myrob. citrinarum conficatarum in oleo Amygd. amararum, Trochiscorum Diarrhodon, ana. drach. 3. f.

Succi Gly Absynthij, Mastichæ, ana. dr. 1.

Sem. Arij, Fœnic. ana. drach. f.

Hieræ Pietræ, drach. 10. confice cum aqua Fœnic.

Hæ pilul. si sine Myrob. parentur, meliores sunt, quia aptiores ad obstructions tollendas, vel si cum oleo Amygd. conficiuntur, ut deponant attractionem & asperitatem. Efficaciores erunt, si pro Myrob. Agarici, drach. 2. recipiuntur, & magis accommodatæ erunt tollendis obstructions, pueritæq; euacuandæ, Hydropi, antiquis febribus spurjijs, & compositis. Pauca recipiunt laxantia, multa quæ aperiant & detergant. Si quis pil. alterius descriptionis ad anasarcham requirat; addat tertiam partem pil. de Euphorb. vel Agarico: sed de Euphorb. sunt efficaciores, & paratæ faciliores.

Pilulæ Sanctæ vocatæ apud Venetos & plerisque Italos in frequentissimo usu ad Luem Venercam.

Rec. Troisc. Albandel, }
Scammonijs, } ana. aequales part.
Salsæ Gemmæ, }
Sagapeni, }
Cum Rhodomelle fiat massa. Dosis drac. 5. vnicuique pilula. Ob Sal. Gemmæ humidam massâ est. Quidam ex succo Porri parandam iubent.

Chylisma Pilularum Saccharo conditarum nobile, apud L. Myrcum.

Inter eximias Pilularum Succationes, mollioris & vorosis nobilibus accommodatæ & Saccharo incrustatæ, hæc mihi præferenda videtur, cuius descriptionem, stemmate & eruditione clariss. V. D. Doct. Thoma Placero debemus.

Rec. Spectrum Diamban vel Diamargar. frig. unc. 5.

Cinnamomi selectissimi, unc. 1.

Spiritus Vini, lib. 3.

Mace. entur per dies aliquot in vase vitreo, probe obli-
to, & quid expirat: Vas quotidie agitari debet; deinde rel. his in fundo vasis facibus Adde Troiscernum Albandel. Rhab. elect. ana. drach. 7.

Seca mundata & Gratiola præpar. confusarum ana. drach. 6. f.

Turbub & Diacridij, Italico more parati, ana. drach. 6.

Agarici candidissimi, drach. 4.

Veratri nigri legitimi, drach. 3.

Omnia iuxta macerentur in eodem lignore per dies 14. Colentur & deinde destillantur in Balneo Mari: ad consistentiam, secundum artis præcepta. Tunc adde Aloes Succotrina selectissima.

in puluerem redact. & præparat. drach. 10. Fermentur pil. obvolvuntur pul. Cinnamomi aut Glycyrrhizæ, & exal. siccentur per se in umbra: Deinde accipe albumen vini oui vel q. s. & in eo dissolue Gummi Tragacanthæ drach. 1. pul. Sacch. albissimi, q. s. ex lib. operiantur primo tegumentum involucre: Denique conditura absoluantur, & ceterarum tragamentum. Dosis a serup. 1. ad drach. 1. vel drach. 1.

Si Extractum vulneris conservare in forma Opiatæ, tunc adde Troisc. Albandel, quos vltimè misere potuisti: Aufer item Aloem & addere eorum loco Catholicon commune eodem pondere. Datur in ea forma ad drach. 1. vel drach. 1. f.

Hæc artis lege plerq; alia Casapetia & Medicamentum a nitr. d. constat Ludo: Myrcum: Anisum item laxantimum, Cari semen & similia, vti Semen contra vermes descriptum inter piluere à prædicto Myreo.

Pilule quævis inersantur, quò facilius sine nausea deglutiantur. Saccharum aquâ conueniente soluitur, admisceturq; Amylum, ut fiat molli massa & ea inducuntur Pilule, & Soli exponuntur, aut igne lento ad exsiccandum, & c.

Hæc & alia V. Doct. Jacob. Cargilus, Medic. Doct. Scottus humanissimus & amicissimus, Simplicium Medicamentorum si quis alius, peritissimus, Ludo: Myreo communicauit Londini.

Pil. de Euphorbio.

Pil. parantur ex Euphorb. efficacissimæ, ad aquas & frigidus morbos, descriptione Mel. quæ recipiunt hæc,

Rec. Euphorb. Colocynt. Agar. Bdell. vel Myrrhæ, Sagap. ana. drach. 2.

Aloes, daach. 5. fiant pil. cum succo Porri. Quòd non reperitur frequenter Bdellium, pro eo Myrrham substituiimus, quia in internis est arrius, nisi in pil. de Bdellio, & externo remedio, in quibus Propolyni vetam vel Ladanium usurpamus.

Pil. è Fumaria.

Decuntur sic, quia Myrob. infunduntur succo Fumariæ, ut maiorem vim purgandi accipiant, arque talis est illarum descriptio.

Rec. Myrob. Citrinorum, Chebul. Ind. Scammonijs ana. drach. 5.

Aloes drach. 7. infundantur Myrob. & Aloes, & ter exciseantur succo Fumariæ. Deinde infusentur, & incorporentur, & ex omnibus fiant pilule.

In hac descriptione, nihil est dignum immutatione, & animaduersione, nisi quòd hæ parandæ sunt initio ætatis, vel alio tempore parentur ex succo Mercurialis, vel Cielæ, vel cum sero caprino, vel cum succo Rosæ, vel aqua Fumariæ.

Pilula Lucis maiores & minores.

Pil. Lucis dicuntur, quòd ad oculos instituantur. Harum duz sunt descriptiones, quibus facile carere possumus: Maioribus priuim, quæ pil. de lap. Lazuli his substitui possunt: neq; sequitur; non accipiant Licium; ergo non sunt pro oculis. Ceterò hoc nomine vituperandæ maiores & minores, quia quæ detergendo extrinsecus profunt, in illis nulla necessitate recipiuntur, vt Licium. Lucis maiores non ea recipiunt, sed tantum multa incidentia, & attenuantia. Quòd si media pars ablata esset, vel dimidiam partem ponderis detraxeris; efficaciores forent ad euacuationem. Quare si quis pilul. de Sarcocolla, vel de Aganço pro illis accipiat, erunt utiles. Quòd si minores magis placeant, ob Myrob. & lap. Lazuli, pilulæ de Quinque generibus Myrob. erunt usurpandæ, quæ & lapidem recipiunt & Myrob. Colocynt. & Agar. & quæcunque videntur facere ad instanti euacuationem, & a longinquo. Adde quòd Pil. Lucis maiores, quia recepta sunt à vulgò, recipiunt plura odorata, quæ augent molem, & vires minuunt. Sic apud Melietem.

Rec. Ros. Viol. Absynth. Coloc. Cubeb. Turbith. Calami arom. nucis Moscatæ, Silex, Epith. Carpobalsami, Xylobalsami, Sileris montani, sem. Rutæ, Schizani. Malthicæ, Asari, Caryophyl. Cinna. Anisi, fenic. Apij, Cinna-crassi, Croci, Macis, ana. drach. 2.

Myrob. omniū, Rhab. ana. drach. 4.

Agarici, Senæ, ana. drach. 3.

Eufraf. x, vel Chelidoniz, drach. 6.

Aloes ad pondus omnium, cum succo Fœnic. fiat pilul. Quia in omnibus locis Eufrafia non reperitur, neque multum certa sunt, quæ de ea scribuntur, visum fuit Chelidonium in eius locum substituere, quia deterget, & oculis determinatur. Adde quòd illa in pil. Lucis minoribus ab eodem autore imponitur.

Pilula Edellio maiores, descriptione

Mesua.

Pilulæ & Bdelio parantur ad vlcera sedis & vteri, & ad fluxum sanguinis. Quare non

erit inutile eas paratas habere. Descriptio talis est.

Rec. Bdelij vel Ladani puri, drach. 12.

Ames, drach. 3.

Myrob. Cheb. Emblic. Ind. Concharum Venerarum, sive Porcellinarum, Chirabæ, ana. drach. 2. f. cum succo Porri, vel Cydoniorum fiant pil.

In his pil. parandis frequenter erratur. Primum quia Myrrha pro Bdelio ponitur, vnde mouent hæmorrhoidas potius, quàm cohibeant, vel siccent. Quare nos Ladanium substituiimus, quia vt Bdelium lentum est & emplasticum, ad formam pil. inducendum; non aperit neque mouet sanguinem; sed continet, vt Hippocyllidis succus, vel Acatia. Amittorrefacere oportet, vt Nasturtium, quo sanguinem sistant. Codcharum Venerarum legimus, non Auellanarum adustarum. Sunt autem quæ vulgò vocantur Porcellanæ. Id videtur quodammodo absurdum, quòd cum succo porri formam pil. intret; Sed hoc factū videtur, quia vt Dioscorid. scribit, veteres sanguinis reiectiones cohibet, si binis dragmis & æquali pondere Baccharum Myrrhi bibatur. Quòd si quis parat eum succo Cydoniorum, efficaciores erunt ad constrictionem, & minus suspectæ ijs, qui in operationibus ab oculis accidentibus nimis sunt exercitati.

Pilula è Syrace.

Ad cathartos inspissandos, & sistendos parantur pil. de Cynoglossa, & Syrace: Sed quia nostrum Cynoglossum non est verum, sed potius Gladium agreile (non enim caulem nec que florem gerit Cynoglossum, vt docet Dioscorid.) ob id mihi videntur parandæ pilul. de Syrace, quarum descriptio hæc est castigata à Rondel. ante obitum: alia est delenda.

Rec. Syrac. Calam. Olybani, Myrrhæ, succi Glyc. Olij, ana. drach. 4. f. cum Pil. urbinæ. Dosis, dua aut tres.

Pilula è Cynoglossa.

Rec. Cynogloss. Olij, sem. Hyoscy. ana. drach. 4.

Myrrhæ Trogloditæ, drach. 6.

Thuris maseuli, ana. drach. 5.

Caryophyl. Cinna. Syracis rubr. ana. drach. 2. cum aqua Ros. conficiatur massa.

Hodie negliguntur istæ pilulæ, quia Laudanū Opium longè præferunt.

De PVLVERIBVS laxat: &
alijs Officinarum.

Non modo Prælicantiũ & Medicastroꝝum
sordido vulgo, verum etiam sagacissimo
venefico famineo sermigenere, Lippi & ioso-
ribus crasse Mineræ purgatrices pulueres, no-
tissimi; quorum primas tenent Pulvis Dia-Tur-
bitũ, & Pul. Dia-Senæ Montagnini, & sus Bra-
banis quotidiani, sub nomine Elgen poyer, id
est, Helena quondam celeberrimi obitricis auicula,
cuius rustica physica gaudet sordida plebecula
& sordet matronale nobile satum decus. V-
terq; pulvis, Diaturbith nimirum, cum Rheo &
Diasenæ Montagnanæ apud Cordum describi-
tur. Dia-Turbith cum Rhab. D. Montagnani
recipit Turbitũ, Hermodactyl. singulorum vnc.
vnam; Rhab. drach. x. Diagredij, vnc. f. San-
tali utriusque, storum Violarum, Zingiberis,
singulorum drach. i. f. Mastiches, Anisi, Cin-
namomi, Croci, ana. drach. f. fiat pul. Commu-
niter sine Saccharo paratur: quidam ex triplo
Sacchari rotulas parant.

P. Diaturbith
Mont:

Pul. Senæ Mont:

Pulvis autem Senæ preparata Montagne con-
stat drachmis 12, fol. Senæ mundatorum,
Zingiberis & Macis, singulorum drachmis tri-
bus; Cinnamomi, Tartari ana. drach. i. f. Dosis,
drachma. Hanc exhibent Puertperis, & pueris
sine noxa, quia nihil maligni recipitur. Sed longè
delicatus foret, si prepararetur ex Tartaro pu-
rificato ab impuro, quod Tartari cremorem vo-
cant Spagyrics Germani. Gener huius artis pe-
ritissimas ut sequitur, parat:

Ludo: Myre] Paragraphe.

Cremor Tartari.

Cremor Tartari per se exhibitus blandè pur-
gat: fit autè Tartari subtilissimè triti, lib. i.
superflua aqua decoquatur terreo vase; inter
coquendum spumam colligito, & seccato, quam
Tartari Cremorem appellant: sunt, qui pro archa-
no magno, calculosis cum Diacrido exhibent.

L'Obel.

Tartarum aut Virifex Dioscorid. vasilis in
lavideam formam cruceia, non cremata ex
insulis sumpta ventrem soluit. Iuas & acco-
lerat allionem Senæ, Epithymi & laxantium.

Præferunt ex vino albo veteri & tenui cremor ad
penetrandum & repurgandos meatos vrinarios.
Vini naturâ sequuntur: E vino rubro astringente,
viscerum fluxores, ex Myrio, Cydonijs & alijs a-
stringentibus fisti.

Ludo: Myrens.

Pulvis Sanctus celeberrimi Collegij
Londinensis: pauperibus
utilis.

L'Obel.

Rec. Fol. Seræ, vnc. 4.
Tartari albi, vnc. 1.
Caryophyl.
Cinnamomi
Galangæ
Seminis Anisi, ana. drach. 2.
Diacyridij, drach. 3. fiat pulvis.

Ludo: Myrens.

Tragema, infantibus & verminosis
pueris utilissima, quâ necantur
& eijciuntur vermes.

Rec. Seminis Contra, siue Sancti integeri-
rimi, habitissimi & selecti, vnc. 2.
Incrustetur & condatur pulueribus sequen-
tibus exceptis Sacchari mediâ parte ex aquis
infra scriptis in Serapium costâ, operosâ arti-
cis manu, ne in glebas coalescant, in lebere
ansato, quia difficilior ob puluerum quantita-
tem parantur.

Pulueris rasuræ Cornu Ceruini,
Corallinæ, ana. vnci. 1.
Mechioacæ opt. vnc. 2.

Sacchari albi summi ex aqua Portulacæ & ra-
dicum Graminis soluti, vnc. 18.

Altera Sacchari mediâ pars paulatim inter
versandum affundatur ad super-incrustandum
& denticulatim, ut fieri solet, operiendam con-
dituram, pueris gratiorem, quam anasati & in-
grati pulueres.

Dosis drach. 2. aut tres, mane & sero.

Ludo: Myrens.

Tragema Anisilaxans.

Rec. Anisi mundati, vnc. 4. Sacch. lib. 2.
Obducatur Anisum Saccharo,
prædictæ artis lege, sequentibus aspersis pul-
ueribus & affusis paulatim.

Diacyridij, vnc. 2. f.
Turbethij, vnc. 1. f.
Mechioacæ, vnc. 1.
Mastiches, drach. 2.
Cinnamomi

Zingiberis

Zingiberis
Caryophyllorum
Galangæ tenuis, ana. drach. 1.
Sacchar decoquendum leniter ex aquis Cin-
namomi, Galangæ & Rosarum.

*Rad. ad Serumas sine Branchiolem, Rondel.
& Monspeliensium.* L'Obel.

Rec. Spongiz vltz, vnc. 8.
Offis Sepiz, vnc. 4.

Fabrærum excorticatarum,
Serici Cotco rindi vlti,
Cineris corticû fabrarum, ana. vnc. 2.
Salis Gemmiz, vnc. 1.
Rad. Scrophulariz
Macropiperis
Gran. Paradisi, ana. vnc. 1.

Bryoniz,
Rad. Pyrethri
Phu } ana. drach. 10.
Serpilli,
Bdellij,
Cornu Cerui vlti
Omnium Myrobalanorum,
Ossium Dactyl. ana. drach. 1. li
Caryophyl.
Cinnamomi, ana. drach. 1. Fiat pul.

Ludi Myreus.
Pulvis ad Strumas Pforensis.

Rec. Spongiarum vltatum
Lapidis pumicis, ana. vnc. 12.
Lap. Calaminaris, vnc. 4.
Lapidis Spongiz, vnc. 6.
Sacchari vnc. 8. miscet.
Dosis Cochlear 1. ex vini albi Cyatho, Lu-
na decrefcente sumenda & continuandum.

Hic pulvis cum clarissimo amiccilimoci viro
Michaelis Iachimo Groninger apud Pfor-
centes Pharmacopæo fidelissimo inservie-
bam, magni vius erat. Rustici enim absq;
consilio Medici hoc pulvere utuntur, ad
Strumas, quæbo illis familiari, vocatur
Kropf puluer.

Pul. ad vermes Monspeliensium.
L'Obel.

Rec. Seminis Contra, vnc. 2.
Abynthij Sanctonici, vnc. 2. f.
S. Amœri,
Portulacæ
Lupinorum

Citri
Rad. Filicis maris, ana. vnc. 1.
Cornu Cerui vlti,
Rasuræ Eboris,
Corallij rubr.
Rad. Zeduariz,
Rad. Diastamni albi,
Athanaziz, siue Tanycedi, ana. vnc. 1.
Fiat pulvis.

Ludi Myreus.

Cydonati forma sine molestia purgans, ac-
cepta humanitate & benivolentia ami-
cissimi & clarissimi doctissimiq; viri
Malachiz Bernardi, Doctoris Medici,
& quondam Professoris Regij in Aca-
demia Biturigenfi.

L'Obel.

Rec. Pulpæ Passul. & Vyatum Corinthia-
rum in aqua Violarum lotarum, &
extractarum cum succo Rosarum,
Conferuz Prunorum dulcium ana. vnc. 2.
Pulpæ Dactyl. ext. cum Syr. Ros. fol. vnc. 1.
Subigantur omnia & coquantur ex Sacch.
lib. 1. in decocto pechorali, in quo efferbuerint
fol. Senz mund. vnc. 2. f.
Agarici albiss. vnc. 1.
Anisi, vnc. 1.
Caryophyl. drach. 1.
Masticiz, drach. 1.
Addendo sub finem, sent. Cnici mund : &
contusi vnc. 1.
Rhabarb. electi, drach. 2.
Cinnamomi, scrup. 2.
Diarydij optimè præparati, vnc. 1. fiat Cy-
doniari forma : cuius dosis à drach. 1. ad 2. per
horam ante pastum, sine custodia : exhibendo
iufculum.

Geleniam Cydonit em laxativam inter Succationes per-
dicato altera partis Adversariorum opposuimus.

Pilula Succationis aromatica, siue artificia-
fior & rationi magis consentanea, suavis
& mitis & Pilulis Aromaticis cum A-
garico, Succatiuncula, Chylarimue
L'Obelij. omisum suo loco proxime Pil.
Aromaticas.

Cum Pilulas Alepanginas siue Aromati-
cas quotidianè & frequentissimè usus, tam
infectè descriptas à Mesue contra artis
leges ubiq; passim præparatas perciperim:
dum valde & diutius percipiuntur aromata: quæ
quidam

quidem si effarbutur, panis resoluuntur; eorumque vires tuanes, inanimata & irrita sunt. Quam ob rem non abs re me facturum duxi, si aliam commodiorem parandi rationem mihi eligerem in Succatimacula sine Chylorij modum; quo possum Ventriculum, Cor, Cerebrū, facultatesque animales, vitales & naturales sanandis viscera rescire, fovere, & gule irritamenta instaurare, tueri, nec non leniter solvendo excrementis, purilaginosis, niderosisque superfluitatibus vundicare, beneficio infrascripta Pilularum Aromaticarū Succatimacula, omni aetate utilisissima, offerantur corroborantia Aromatum energia & efficacia. Sic enim habes.

Rec. Agarici selectissimi, unc. 2.
Caryophyllorum

Florum Anisi

Florum Siacchadis,

Salvia,

Betonica,

Melissophylli

Corticis Citri

Contunduntur tenuis

Nucis Moschata, ana. drach. 1.

Mentha Romana sicca

Maiorana nobilis

Abundantij siccij apud loco collecti,

Epirhymi, vel florum & succinatam Thy-
mi, ana. scrup. 2.

Radixem Asari

Schananthi

Galanga tenuis,

Santalū Citrini,

Xyloloeis prima

nota,

Cardamomi

Phu tenuis

Acori,

Myrobalanar. Regularium, ana. drach. 5.

Contunduntur; insunduntur in succi & infusi Rosarum & succi Betonice aequalium partium q. s. varijs vitreis commodioribus vasculis optime clausis, debito ordine, ex artificij industria conservantur cunctislibet simplicia medicamenti energia & digerantur balnei moderato calore. Expressioni & colaturae dissolvit pulveris

Aloes Succotrina purissimū defecata, unc. 18.

Excecuntur lapida Balnei vapore aut ethano artificiali ne vis odoratorum expiraret, aliquoties venter agitando,

Omnibus penit refrigeratis, adde Massiches tenuissimū trita drac. 6. Croci scrup. 4. fiat. massa formandae Cataplasij idemae.

Ethylismaris Catholici Trochiscis
tionibus minus infestis, accursata
magis emendat ag. descriptio
tis nostra.

Rec. Trocisci Alhandal, drach. 17. scrup. 1.
Vorticij nigri beltrini, drach. 1.
Diastidij Italico more crogis pra-
parat. ana. drach. 1.

Agarici optimi, unc. 1. f.

Aloes selecti. defecata & preparata unc. 2.

Specierum Diarhod. Abbatis drach. 12.

Cinnamonī de ach. 4.

Massiches scrup. 4.

Spec. Aromat. Ros. vel spec. Diarhod. dr. 3.

Spiritus vini alcoholizati, q. singula: materia species praelatas aliquot diebus secundum artis precepta, in Sole vel Balneo. Deinde facibus retellit, Spiritus super purgantia medicamenta interisa & confusa fundatur, (descriptio Aloe preparata Diarhod. & Massiches quia sub finem commiscuntur) & in Sole aut Balneo feruido digerantur, & ut loquantur, circulantur, per ostiolum: postea exprimuntur & demum humor elicitur per Balneum donec crassitudo fiat formandae Cataplasij idemae.

De TROCHISCIS.

Trochisci à figura rotunda dicti sunt. Patantur autem ad medicamentorum conservationem. Nam melius conservantur simplicia medicamenta in ea forma solida, quam in pul. redacta. Multi sunt, quibus carere non possumus, quia alias compositiones ingrediuntur, ut Trochisci de Violis, de Rosis; in pul. cordialibus, ut Diarhodon, Trochisci Squillidi & de Viperis, in Theriaca. Aliqui in fumigijs recipiuntur, ut Alipez Moscatz, Gallia Moscatz. Quo tempore preparari possint, ut Squilla, Viperarum, parentur: qui vero quovis tempore parari possunt, cum otio abundant, ferius parabunt, ut hyeme. Parentur tantum, qui sequuntur, Trochisci Dyarhodon, de Viol. Scillitici, Theriacales; & Camph. Trochisci Alkekengi, & Myrrha, & Gallia Moscatz, de Aipta Moscatz, & Rhab. & Spodio, & Carabe, Alhandal, & Capparisbus, de Agar de Eupatorio, Ablynthio.

TROCHISCI

TROCHISCI DE ROSIS.

Trochisci è Rosis, descriptione Rafis Mesuzo. Diarrhodon dièti Trochisci à Rosis. Hoc nomine etiam pul. apud Arabes, & collyrium apud Gal. dicitur. Horum Trochiscorum multæ sunt descriptiones, sed Rhafis magis probatur, quæ sic habet.

Rec. Ros. rubr. amotis vnguibus drach. 4. Santal. Moschatelini, vel Citrini, pro ligno Aloes drach. 2.

Mastich. drach. 1. f.

Absynthij,

Cinnam.

Spicæ Nardi,

Cin. crassi, siue Cassiæ,

Scharnan. ana. drach. 1. fiat pul. tenuissimus, qui vino exceptus reducat in Trochiscos, & seruentur in vase vitreo. Hic pro ligno Aloes raro iuvenit, Santalum substituimus. Cassiam, Cinnamomum erassum interpretari sumus. Hæc descriptio aptissima est, nec tamen rejicienda illa Mes. quia est paratu facilior. Recipit tamen, quæ sequuntur.

Rec. * Florum Ros. drach. 10.

Glycyrrhiz. drach. 5.

Spicæ Nardi, drach. 2. f. excipiantur vino albo, fiat Trochisci.

*Nihil habent quod agglutinet, * Ex Nicolo Præposito.*

Trochisci de Violis.

Hoc nomen vagum est apud Græcos, sed magis apud Latinos, vñ Græcis, Violam significat, quam simpliciter in officinis Violam Martij vocant. Græci tamen Violam appellant *ῥοζάνη*, cuius tres sunt species, luteæ, quas vulgus vocabulo Arabico Clæti vocat: albas, seu rubras, seu purpureas, Græci, nomine *ῥοζέων* significant. Quare incertum est, à quibus nomen habeant hi Trochisci. Puto tamen à Leucoto. Et quia nomen sonat Albam Violam, vertunt violas albas. Qui trochiscos in officinis parant, ex martialibus Violis componunt contra authoris voluntatem, qui potius ex Cherino flore, quia inter Violas est efficacissimus. Dispenlabimus ergo ex illis, & secundum hanc descriptionem fiant, quia hi Trochisci recipiuntur in pul. cordialibus. Si enim parentur secundum aliquas descriptiones Mesuz, quæ Turbich drach. 3, re-

cipiunt, destrueretur pul. cordialis. Fiat ergo in hunc modum.

Rec. Florum Leucoij viridum, drach. 5.

Amyli drach. 3.

Sem. Pap. albi, drach. 2. & scrup. 1.

Rhab. scrup. 5.

Sem. Plantag. drach. 1.

Succi Myrrhæ pro Opobalsamo, scrup. 1.

Aquæ Ros. q. s.

Fiant Trochisci, & reponantur in vase vitreato.

Parari possunt ex albis purpureisque: sed quia Lutearum præcipue in medicina usus est, ex luteis parabuntur, quæ Cheiri vocantur. Reciebant Balsanum, quod de Opobalsamo intelligendum est, tanquam de præstatio-

re. Nostuccum Myrrhæ substituimus, ut in Theriaca, & omnibus alijs internis remedijs faciendum censuimus. * Extrahitur sic. Eli-

gitur purissima Myrrha, qualis illa, quæ venditur multis in locis pro Edellio. Est autem flava, amara, odorata, & partes habet velut vngues. In tenues partes ponatur, & in cavitate albuminum Ovorum coctorum ad duritiem, & supra discum staneum reponatur in loco frigido subterraneo. Sic dissolvetur, & in verissimum Siccacem reducet, & illa licet vi pro Siccacem prelo expressa, & pro Opobalsamo. Hos Trochiscos dispensandos suadeo, quia in pulueribus quibusdā recipiuntur: nam alio modo non utimur: Est etiam medicamentum incerti effectus; componitur enim ex pugnantibus calidis, frigidis, & adstringentibus: quare quantitatem habere oporteret, quam putamus sufficere ad pul. conficiendos. Parabitur Vere & Estare in locis frigidis: Apud nos toto serè anni tempore reperitur, præterquam in fine ætatis, quando defloruerunt, & semina producant.

Trochisci è Violis Martiis purpureis purgatives.

Venetis in frequentissimo & quotidiano usu sunt Trochisci magistrale 1, descripti in Florentino Antidotario; quibus Itali medici vinunt, ad purgandam & bilem blandè euacuandam: acnendosq. bolos lenientes à Cassia, Diacatholico, Elect. Lenitivo & similibus, paratos.

Rec. *antem, violarum purpureo-violacearum flaccidarum siue passerum, aut superfluum humido orbatarum, drach. 6.*

Pulueris Turbich. drach. 3.

Suc. i Glycyrrhizæ,

Alauna

Manna,

Diagredij, ana. drach. 2.

Viole purgata à suis viridibus partibus & pediculis, tenduntur exactè, addendo Mannam secundum in pila marmorea aut lignea: tandem adduntur reliqua; quibus commixtis, Trochisci lupinates formantur, servanturq; in usus medicos.

Trochisci ex Agarico, & Agaricum trochiscatum.

EX Agarico, sine magna impensa parantur duo Trochiscorum genera Mesuae. Secundum unam preparationem dicuntur Trochisci de Agarico: secundum verò alteram, Agaricus Trochiscatus. Communiter autem in officinis sic parantur.

Rec. Agarici feminej boni, & albi lima in renues partes derafi, vnc. 4. vini infusionis Zinzib. q. s. fiant Trochisc. Hoc Agaricum Trochiscatum vocant. Trochisci verò de Agarico videntur magis apti ad pituitæ educationem; sed varijs modis parantur. Alij ex Agarici vnc. 3.

Zinzib. & Salis Gemmæ, drach. 1. cum Oxy-melite & Syrup. Acetoso, formant pastillos. Id enim parum refert, siue ex Oxy-melite, siue ex Syrup. Acetoso fiant: nultum vero, si fiant secundum illam descriptionem uel secundum aliam, in qua vnc. 1. Salis Gemmæ, & Zinzib. drach. 1. legitur. Ego magis probo vltimam: & secundum hanc parari suadeo: quia in prima Dosis est minima ad drach. 1. Salis gemmæ, & Zinzib. vnc. 1. In secunda verò minor est, quàm conuenit dosis ad drach. 1. Sed liberum est addere vt libet. Decoquunt Zinzib. in aqua Buglossi. in decocto Zinziberis infundunt Sal benè tritum, & miscent: sed hoc modo parantur, non multum differunt ab Agarico Trochiscato.

Trochisci Alandal.

Trochisci ex Colochintidis interna parte parantur, qui Arabieum nomen seruant apud omnes; quod ego quoque seruare volui, vt vulgus nesciret ex Colochintide eos parari, (timere enim solent Diagredium, Colochintidem & alia fortiora remedia, sine quibus tamen morbos contumaces curare non possumus.) Parandi autem sunt ad picuitæ euacuationem in hunc modum.

Rec. Pulpæ Colochintidis albæ & levis purgatæ seminibus, vnc. 10. oleo Ros. vnc. 1.

Gummi Trag. & Arab. ana. drach. 2.

Bdellij & Myrrhæ, drach. 1. macerentur lachrymæ in aqua Ros. triduum, & formentur Trochisc. ex Colochyntide. Oleo Ros. confriceatur Colochyntis fercipibus minutim incisa: deinde cum mucagine fiant Trochisc. quos siccant, & siccatos rursus in Trochiscos reducant. Hoc autem faciunt, vt in tuiiores partes tedigatur Colochyntis. Quòd si non sit tunc factum, diligentiùs in puluerem redigantur, cum his erit vtendum.

* Hæc vnc. 10. pro drach. 10. elliit nimis: & vnc. 1. Oleo Ros. p. 0 drach. 1.

Trochiscorum Rhabbarbari Mesuæ emendata descriptio Rondellesiana.

Tres sunt Trochisci, qui sunt similes: Ob id sufficet vnum ex his retinere in officinis. Retinebimus eos, qui ad hunc modum sunt parandi.

Rec. Rhab. drach. 10.

Succi Eupatorii Mesuæ, id est Agerati, non Gratiolæ, vt vbiq; perperam Cordus annotauit, drach. 4.

Ros. drach. 3.

Spicæ Nardi,

Amygd. amar. ana. a. drac. 2. s.

Anis. Rubiæ tinctorum, seminis Apij,

Ab-synth.

Azari, ana. drach. 1.

Cum vino formentur, si succi inspissati & siccati sint: Si verò ex succo recenti, sine b. vino; sed cum succis parandi sunt. In hac descriptione restitui mus pondus, & ordinem Amygd. amararum. Nam antiqua exemplaria & ordo hoc docent, vt post drach. 3. sequantur drach. 2. vel drac. 2. s. Quòd si desiderasset Amygdalar. amar. drach. 4. cum Eupatorio coniunxisset, vt conianxit, quæ pondere tantum drach. 1. ponuntur.

Succum Eupator. Mes. vel succum Ab-synth. ipse subliituit aliquando: Sic e. Troch. de Ab-synth. & Eupatorio carere possumus, cum istos habemus, qui valent ad liberandas obstructions hepatis,

a. Hæc auxit Spicæ pondus ad maiorem efficaciam.

b. Cum aqua Cassiæ format Antidotarium Florentinum; & conuenit quæ de habetur.

c. Troch. ex Eupatorio & Ab-synth. carere possumus.

Trochif.

Trochisci à Capparibus. Mesf.

Nucleorum Pinearum, ana. drac. 6.
Seminis Apij
Succini, siue Carabz,
Hyoscyami
Opij, ana. drach. 2.

Trochiscel è Capparibus parantur ad splenis affectus, & obstructiones aufferendas. Recipiunt aperientia siue lachrymis, & hoc nomine differunt à Trochiscis hæpaticis, qui Rhab. omnes recipiunt, ut illi qui nomine Rhabarb. appellantur & de Absynth. & Eupatorio.

Cum aqua Mellis compingantur Trochisci. Aliqui addunt Teeram Sigillatam: sed in optimis exemplaribus Mesf. non legitur. Aliqui dubitarunt, quòd interpres legant (peponis Indi) sed aliqui intelligunt de Techa alba, quæ est peponis species. Qui habent, ponant: qui non habent, feminare possunt: Sin minus, feruen Peponum, vel Cucumeris. Omnia ista semina idem præstent humiditate aquea, qua abundant.

Rec. Corticis rad. Cappar. seminis Agni Casti, ana. drach. 6.

Melanth.
Calaminth.
Acoti
Amygd. amar.
Nalurtij
Ammoniaci
Foliorum Ruta,
Aristolocundæ,
Succi Eupat. ana. drach. 2,
Cyperi
Scolopendriæ siue Ceterach, ana. drach. 1.
Dissoluatur Ammoniacum Aceto acro, & cum dissolutione formantur Trochisci. Vera Scolopendria est Ceterach; quanquam lingua Ceruina easdem vires habeat ad splenem absumendum. Melanthium, Nigella Romana dicitur, non vulgaris, quæ Melampycon est.

a. Alii Gibanum habent.
b. Capia addit Rordel.

Trochisci à Myrrha, Rhafis, quia omisi, à nobis additi ob frequentem usum.

Rec. Lupinorum, drach. 5.
Myrrha, drach. 3.
Foliorum Ruta:
Mentastri,
Pulegiij * Ceruini
Radice Rubia similit, ana. drach. 2.
Asa fatida,
Sagapeni
Opepanactis,

Lachryma si recentes & selectæ, pistillo & mortario calidis facile assoluntur, assundendo succum Ruta aut Arthemisæ, aut Pulegiij, aut eandem decocta ex Vino, non aceto; commixtis omnibus formantur Pastilli. Menses mouent, Partum accelerant, & statum mortuum expellunt, quemadmodum Myrrha, qua Dioscoride teste, valuum emollit, & præclusum aperit; menses & partus celeriter extrahit, cum Absinthio, Lupinorum cremore, vel succo Ruta, non solum sumpta sed etiam adnota; quia Succus Ruta aëterrimus, & ad id efficiendum efficacissimus.

Trochisci Alkekengi, siue à Solano vesicario. Mesf.

Ex bacis Alkekengi sunt Trochisci, qui corrupto vocabulo Trochisci Alkekengi vocantur, & parati debent ob summam eorum necessitatem in affectibus renum & vesicæ ad dolores & vlcera eorum. Recipiunt autem hæc.

Rec. Baccatum Alkekengi, drach. 3.
Seminis Citruli,
Melonum pro semine albæ Techæ,
Cucurbitæ, ana. drach. 3. f.

Boli Armeni,
Gummi Arabici,
a. Corticis Thuris,
Sanguinis Draconis,
b. Papaueris albi
Amygdalarum amarar.
Succi Glycyrrhyæ
Tragacanthi
Amyli

Cordus, Florentinus de Remediorum formulis, & Bauderonus Cuminum addere (quibus ut opinor, non fuit notum illud Narbonense Monspelienfium Pulegium Ceruinum, cuius mensibus efficacissimum: contra verò Cuminum, Discoride auctore, mensium abundantiam inhibet; & contritum, natibusque obiectum ex Aceto, sanguinis profuua sit. Huius non uenit Syl.

1 Trochif.

Trochisci de Carabe sine Succino.

EX Succino parantur Trochisci efficacissimi, quos retinere visum est ex Melueo.

Rec. Carabz, aureos 6.
Cornu Cerui viß,
Coralli adusti,
Tragacanthi
Acaciz
Hypocystidos
Balauflorum
Maltic.
Laccz lotz,

Pap. nigri affi leuiter, ana. aureos duos.

Thuris,

Croci

Opij, ana. aureum vnum, c. cum mucagine Psyllij, extrahä cum aqua Ros. hiant Trochisci.

Hos transcripsimus ex Mef. & pondere, quo ipse vsus est, nos quoque vsi sumus, auro, scilicet, quod pendet drach. 1. s. apud eum, & alios. Nihil est periculi, si quis pro aureo, drach. legat; quia omnia simplicia eodem pondere notantur: quare semper eadem proportio seruatur; non autem pondus idem compositionis totius, quod parum refert, quando tota quantitas vna dosi non sumitur. Pro (Heimphlistidis) reddidimus (Hypocistidis) ne nomen Arabicum remoueretur Pharmacopolam, Adieciimus mucaginē extrahendā cum aqua Ros. quia constringit, & odoris suauitate aliorum factorem emendat. In Mef. quia non legitur (gummi affi) pratermissi. Quod si placeat, expunge; Lacca lota, quia nostra si esset Cancamon, non conuenit, vel pro Lacca, Sang. Draconis ponendum suademus.

Trochisci de Antispodio, cum semine Acetosæ Mesuæ.

Trochisci ex Spodio Atabum, id est, Antispodio Dioscoridis, parantur duobus modis sine semine Acetosæ, & dicuntur simpliciter de Spodio: Alij cum semine Acetosæ: ob id de Spodio cum sem. Acetosæ dicuntur, qui magis probantur à practicis; ob id illos retinemus; quia efficaciores ad constringendū sunt, & recipiunt hæc.

Rec. Ros. rub. drach. 12.
Antispodij ex Myrrho, vel * Oliuæ, vel Cotoneis, drach. 10.

Sem. Acetosæ drach. 6.

Sem. Portulacæ, granorum Coriandri infusorum in Aceto, deinde torrefactorum pulpæ Sumach, ana. drach. 2. s.

Amlyli affi,

Balauflorum

Berberis, ana. drach. 2.

Gummi Arab. drach. 1. s. cum succo Acetosæ hiant Trochisci.

* Vel Oliuæ, sunt ex ramis Oleæ, sive ex Olmarum immaturarum carere fiat Antispodium, peris. de opt.

*Trochisci Scillini, sive de * Scilla.*

* De Scilla & Poneratio consule Adnosaria Stirpium pag. 17.

Ad Theriacæ præparationem ex Scilla parari debent, in fine Veris. Ex Galen. sic parantur.

Rec. Carni S. illz decoctæ, vnc. 4.

Farinæ Otobi leuiter torrefactæ, vel micæ panis candidissimi, vnc. 1.

Formetur Trochisci, & seruentur in domo spectante ad meridiem, non tamen in sole, & moueantur frequenter, ne situm contrahant.

Scilla bonæ habitudinis, id est, mediæ magnitudinis est eligenda recens. Illam massä ex optima farina subacta inuoluæ, & in furno vel sub cineribus coquito, donec moleseat, abiectionis prius primis tunicis & duriore infima parte, cui radicis fibræ pendulæ subitus adherent; mediam in mortario in lutozem coque, & addita sufficienti quantitate farinæ Otobi torrefactæ, vel micæ panis, hiant Trochisci. Farina Otobi vsurpatur, quia apta est ad formandos Trochiscos, & pugnat aduersus venena: Et quoniam Eruium aliud est albū, aliud flavum, eligitur albū, quo deficiente, vsurpatur flavum, vel mica panis candida. Sunt qui volunt æqualem portionem: alij dimidiam: alij tertiam tantum: Alij duas farinæ, tres carnis Scillz. Hæc melior est proportio, & secundum hanc parabimus.

Trochisci de Viperis.

EX Viperarum carne parantur in officinis Trochisci initio æstatis ad Theriacæ præparationem, quæ æstate media & seruida paranda est, & cum herbæ, flores, & fructus habent serè maturos. Parantur ex carne Viperarum, & pane tantum, varia portione apud diuersos. Sunt enim, qui dimidiam, qui tertiam, Galenus quateram, vel quintam micæ. Nam panis ad excipiendam carnem, & seruandam ponitur. De præparatione pauca, plura in Diario, seu Ephemeridibus Pharmacopolarum. Caro Viperarum tantum vsurpatur, quia caput, cauda, & pellis, & spinæ, & interna abijcienda

abijcienda sunt, eoq; tempore magis, quo plus carnis habent, vt paulo post quàm è terra ex-
eant venandæ, & illæ, quæ ventrem non ge-
runt. Caro decoquatur in sufficiente quantita-
te aquæ, vt Anguillæ solent decoqui.

L'Obel.

Vespera in Eugæa montibus maritimis, Veneta
hodie dotionis non procul à Parauia, & in
Gallia Pittæ agro, iuxta paganum S. Benediicti vi-
cum, saxosis ardua via, Pasticloudin vocata,
miliari à Pristano Metropoli diffusa, venatur
à medio Aprili in finem Maij, & paulo tardius
locis à mare diffisis ad æstatis initium, pastillis
Theriacalibus Pisanorum Venetorum, Prista-
nensium & Mesepeliensium commendatissima.
Delectus Vipere recentis venatus, esto femella
sulus coloris, capite latiusculo & compresso; g-
acilis longiusculaq; collo; ventre ampliore omis ca-
rente minimeq; pregnantis; minore cauda mini-
mèq; collata aut conuoluta, sed exarsa; pigro repe-
tari posteriora caudæ proxima promouentis; atro-
cissimæ vultus. Cauda & caput amputantur qua-
tur digitorum virring; interstitio. Vinacet, vt
Aequilla sanguinem fundentes à sectione præfe-
runtur. Coquantur ex Anebis coma, addito sili
momento ad dissolutionem & separationem carnis
ab arstis, aculeis & spina. Caro excipiantur pane
biscollo in pollinem redactis, & addita insculi de-
coctionis q. s. formantur Trochisci, qui inuigila-
tur Opobalsamo, vt diutius conservari possint.
Multa carne & paucis pane biscollo parati sat-
urioris coloris Pastilli transferendi: improbandi ve-
rò delibutores, paucilla carne, multo pane & insculo
corrosi parati; cuiusmodi quotannis ex Italia
Aurivergiam deferre solent improbi, auri, &
luci rapaces Myropola siue Materia Medica,
barbarum & simplicium medicamentorum insu-
tores. Hac a'monendi gratia scribimus, quo
quisque sibi caveat.

Hedycroon Andromachis, siue Magna
Hedycroij ex Galeno:

Rec. Ammoni, drach. 24.
Folij, Myrrhe, }
Nardi Indicæ, } ana. drach. 6.
Croci, }
Cassie, }

Schæna thi,
Calami odorati,
Plin. Pontici,
Xylobalfami, } ana. drach. 2;
Opobalsami,
Cinnamomi,
Costi,
Nari,
Asni, }
Amiraci, siue } ana. drach. 2.
Majorana.
2. Aspalathi,

Massiches, drach. 2.

Vini Phaleri q. s. fiant Trochisci ad The-
riaces compositionem. Hedicroi Pastillos, quid
hic omisso fuere, & in Theriaces antidoto recipi-
untur, necessarii subnectere visum fuit. Agri-
meta ponderibus multum variat.

2. Aduocatio. pag. 427.

Trochisci Cyphi Damocratis.

Trochisci Cyphi dicti, odorati suffimento.
Compositio hæc erat dicata Dijs, qua ute-
bantur Aegyptij Sacerdotes, teste Dioscoride.
Sed quia in Mithridatica vera compositione
ponitur, & per se usurpari potest, eius descrip-
tionem prætermittere nolumus. Multæ sunt
componendi rationes, quarum vnam tradit
Diosc. alteram Democrites apud Gal. carmine,
quæ variari non potest, ob versus rationem.
Ob id eam retinimus cum Galeno.

Trochisci, siue Pastilli Cyphi
Damocratis.

Rec. Carnium viva passæ,
præpinguis & recentis }
purgata à pelle & vigantiis. }
Terbinthina Cypria purissi- } ana. drach. 24;
ma collecta in aqua donec duref- }
cat,

Myrrhe
Schenanthi, ana. drach. 12.
2. Calami odorati, drach. 9.
Cinnamomi, drach. 4.

Bleidi b. Onchis, id est, }
vngui similis. }
Spica Nardi, }
Cassie optime } ana. drach. 3.
c. Cyperi rotundi, non lon- }
gi, purgati, }
d. Baccarum maximarum }
Imperi, }
1 2 c. Aspalathi,

c. *Alphalathi*, drach. x s.

Croc., drach. x.

Mellis optimi & Vini, ana. q. s. ad *forman-*
dos Trochiscos.

a. Pro quo *sumentur Rondelletini & Itali*
sestucci Iunci odoratiss. & pro Sebanantbo, eius-
dem Iunci odorati flores vigentes.

b. Onichis est nota bonitatis, *Dioscoride* au-
sbore: hoc est, aliquas partes habens, veluti un-
guet squamatum compactas.

c. *Cyperii Rotundi Itali* scilicet *Cypere rotun-*
do Syriaco in Theriacis compositione videntur, ut
docuimus in nostris Stirpium Adversarijs; Cy-
perum longum reijcimus.

d. *Baccarum Iuniperi maxiniarum?* *Itali*
& Mespelienses Iuniperi maioris Baccas mag-
nas phoeniceas coloris in hac compositione recipere.
Resinatota, & pulpa saccha, qua cum Passula-
rum carne minutim incisae teruntur: Myrrha &
Bdellium affuso vino posso diluuntur, cetera in
pollinem redacta, cum pauco melle despumato co-
miscentur & in Trochiscos rediguntur.

Iuniperus maior in Narbonensi Gallia & Gal-
lo provincia vulgarissima est, uti in Stirpium Ad-
versarijs diximus: Eius igitur bacca ad Theria-
ces nobiliss. antitadum, ex Gallia Narbonensi aut
Italia procuranda.

e. *Triplitem Alphalatum in Adversarijs re-*
ensuimus: Hoc non differentias requirit, pag. 427.

Trochisci & Gallia Moscata.

Non tam ad voluptatem Trochisci isti pa-
riantur in officinis, quam ad sanitatem;
vtitur enim in affectibus cerebri, vteri, & cor-
dis: Quare parare oportet, sed in pauca copia,
quia semper licebit, potissimum descriptionem
Mes. parare. Hisce tribus parantur.

Rec. *Ligni Aloes* (pro quo *Santali Citri-*
ni, drach. 6.

Ambra, drach. 3.

Moschi, drach. 1.

Muscilagine Gummi Tragacanthi ex aqua
Ros. excipiantur Trochisci. Non desunt, qui
ambra dissoluere velint in oleo de Ben, vel
Amygd. ex eoque confingere. Hoc faciunt, ut
magis effument; sed si quis velit suffumigia
parari, ex his, postea quam exsiccati sunt, oleo
irungantur, & seruantur vsui in vase plumbeo,

vel terreo vitreato, vel vitreo, ut odor seruetur.

Alipta Moscat. a descriptione Nicolai.

Plueribus constat *Alipta Nicol.* in vsum
communem recepta; Cuius descriptiones
in quibusdam desiderantur. Hæc sufficit &
probari potest: Constat autem sequentibus.

Rec. *Ladani puri*, vnc. 3.

Syrac. calamiz, voc. 1 s.

Syracis rub. vnc. 1.

Sandali Citrini, drach. 2.

Ambiz, drac. 1.

Camph. scrup. 1. s.

Mosci, scrup. 1.

Aqua Ros. excipiantur, & fortentur Tro-
chisci. In his formandis murego non recipi-
tur, quia hæc omnia ferè emplastica sunt, & ferè
coniunguntur in vnum.

L'Obel.

Æstiuo tempore parari debent, quia in cani-
culisibus, Ladanium & vitrag; Syrac Soli expo-
nuntur donec molescant, postea coniunguntur; pul-
ueris facta sensim misceantur.

Ambra & Caphura seorsim trituantur.

Moschus aqua Rosacea dissolvitur, & omnia
commixta in Trochisco conformantur.

Bonum est aliquod grana Piperis in mixtionem
Moschi addere. Caliditate sua fundit odorem
Moschi.

Syracem Calamitam & rubram res easdem
esse volunt, & bonitatis notas à Dioscoride desig-
natæ; cui præsertim pinguis, flammis, resinosis,
albicantibus grumis, qua vetustate resercentur aut
rubeſcant.

TROCHISCI siue COLLYRIA
sicca, Arabibus & Officinis
SIEF vocata.

Operæ precium saltem sum, si vñtissima
Collyria Sief Arabib. dicta suo loco in Phar-
macœutices mutila Rondelletiana Officina omissa,
quorum tamen docti scripsit, meminist; libro suo
de compositione externorum medicamentorum,
quibus etiam vñtur, quemadmodum Medici per-
sæ & Chirurgi Galli, Germani, Belgæ, Angli
& Itali in oculorum morbis, pndendorumq; ve-
sica, intestinarum, anfractuuumq; flexuosorum ul-
cerum insectationibus.

SIEF

SIEF album, siue Trochisci
albi Rhasis.

Rec. *Cerasif. lota, drach. 10.*
Sarcocolla, drach. 3.
Amyli, drach. 2.
Tragacantha, drach. 1.
Opij, drach. f.
Aqua Ros. q. s. ad dissoluendum G.
Tragacanthum. Fiant Trochisci
parui.

SIEF album Mesuz.

Rec. *Cersa lota, drach. 10.*
Sarcocolla infusa in lacte
afumino.
Amyli, unc. f.
Tragacantha, drach. 3.
Opiani, drach. 1. f.
Opij, drach. 1.
Aqua pluvialis q. s. Fiat Sief.
Ets etiam sine Opij.

SIEF è Plumbo Mesuz.

Rec. *Plumbi vsti & lati,*
Aris viti,
Antimonij,
Tutia lota,
G. Arabici,
Tragacantha,
Opij, drach. f.
Aqua pluvialis, q. s. Fiat Sief.
ana, drach. 8.

Trochisci è Mimio corrodente,
Iohannis de Vigo, quibus fre-
quentissime Chirugi
vtuntur.

Rec. *Medula panis aridi, bene fermenta-*
tati, drach. 4.
Sublimarij electi, drach. 2.
Miny, drach. f.
Aqua Ros. q. s. Fiant Trochisci : piceatur
calore clobani tepidi.

Sief, siue Collyrijs non plures descriptiones non
est opus adinvenire, neque Pharmacopoeis molestare,
quia Medici & Chirurgi industrij, pro variis
ne affectionum & implicatarum morborum sibi,
nulla negotio, necessaria medicamenta continuari
procurabunt ; hæc tamen nescimus Medicorum
& Chirurgorum vulgati.

Capitellum D. Iord. de Vigo.

Rec. *Calcis vina optima, lib. 4.*
Aqua feruidissima, q. f.
Fiat Liximum, Gallici Capitellum
Addendo Cineri Piceæ aut Pinastri, (vulgo
Potassiben, lib. 1.

Rec. *Huius Capitelli, lib. 4.*
Vitrioli Romani, drach. 6.
Coquantur in vase teneo ad duritiem salis, ad-
dendo sub finem in media parte Capitell,
Oij in succo aut aqua Solani dissoluti, scr. 4.
Confermentur in vase teneo rubro aut vitreo.

DE OLEIS.

Olea oportet habere, quæ ipsa citra aliana
mixturem, vitia sunt ad dolores, aspi-
ricates, & alios multos affectus curandos. Pi-
xterea ex ipsis Cerata, Linimenta, Vnguenta,
Emplastra, & Itilgationes fiunt : quare de his
dicemus, de quæ his, quæ ex Oleis parantur.
Oleorum alia simplicia sunt, alia composita :
Simplicia, quæ nihil accipiunt a compositione,
piæter separationem, vel extractionem, vt
Oleum Oliuarum, Amygd. Nucum, ex lenia-
ne Sinapi, Asini, Lini, & alijs seminibus simi-
libus, vel semine, vel fructu aliquo pingui.
Composita verò sunt, quæ ex Oliuarum ex-
presso oleo cum floribus, herbis, vel odoratis
parantur : Et hæc sunt, quæ in officina habere
debet Pharmacopola. Oleum Omphaciolum
(vel eius loco paratum cum solijs oleæ) Oliuæ
immaturæ paratur statim post collectionem.
Oleum antiquissimum, euadet si ex oliuis na-
tis loco saxolo, & ex cocto, paratur post mul-
tos menses à collectione oliuarum : tale enim
acre fit, quale est antiquum ; vel din coquen-
dum, vt antiquo respondeat.

Oleum Sesaminum.

Oleum Sesaminum vile est in Scicilia, vbi
ingens copla nascitur Sesami, sed no-
bis charū : quare quæ ex Sesamo olea paratur,
ex oleo dulci esse debent, & maxime pingui &
crasso : quæ sunt olea, quæ in campetribus
locis, humidis, & feracibus terris, colliguntur ;
Laurinum, Nardinum, Rutaceum, Mattichi-
num, Irinum, Chamæmelinum, Liliorum, de
Abjunct. Massichinum, Lentiscinum, Myr-
thinum, Omphaciolum, Rosatum, & complu-
rum, de Cotoneis, de Menta, Violaceum, de
Euphorb. de Piperibus, de Papauere, de Man-
dragora, de Collo.

Quam mutilata, depravata & sensu obscura sint hac de Oleis & Sesamino Oleo scripta; fides & iudicium penes lectorem esto. Sic autem restituere visum fuit, ratione & rerum cognitione docente, clarioris doctrinae erga; salua tamen meliori iudicio.

Quae ex Sesamo olea parantur dulcia & pingua id est, vnguinea sunt aut esse debent: qualia sunt Olivarum expressa olea quae in campetribus, humidis, feracibus sacunda sub terris, colliguntur: cuiusmodi sunt Amigdalinum dulce, Papaverinum, Laurinum, Lentiscinum & huiusmodi olea expressa: quemadmodum & saltitina ex Olivarum oleo dulci, Absinthites, & Meniba (ex Sesamino autem Nardinum paratur) Anethinum, Rutaceum, Irinum, Chamamelinum, Lilaceum, Rosatum item Omphacites flauentis virentisque Olina ante Olivarum tempus collecta uti Cydonites, Myrrhinum & Mastichinum: Rosatum verò completum suscitans mannae, Olina, violaceum, Nephurinum, Mandragoras, Costumum, ex Euphorbio & Piperibus. Videtur tamen hac calidiora olea consultius paranda ex oleo Veteri, claro & tenui: media vero ex media atque oleo, aut recentiore, uti frigida. Hae nomen vbi Pharmacopaei miscibile per se inuenta non liberalitati additi, deservant prorsus ex oleis tantis omne genus olei compositi parare.

Ignoscere quae lectoris candidi, si audent hac mihi in restauranda vasa: quia sensum neque constare, neque auctoribus mentem exprimere videntur: quamvis malum propria edere, quam aliena obscura & mutilata documenta aut fragmenta interrumpi, scripta ex pralectionibus Rondelletianis raptim sepe collecta explanare: Similima senè difficultatum filula in Succedaneorum reparacionibus, me iudicem ratione, quantum potui diligentia & fide restituta, me monuit, ne bono vi delectissimi per se memoria praeceptis derogaretur, tanta immutatio mendosissima scripta, imitationis Rondelletiana verbo vi: honoris tamen ergo, & quò scriptis nostris plus ponderis & auctoritatis accedat, unicuique quod summi est reddendo, eius nomen suppressere non ingenuum foret, ut aliqui tam Galli quam Germani aut Angli. botanici vernaculis suis scriptores, alienis ornati permixtis, Aescopae Comemula modo fecerunt; quos non in bono quodque erubescere miror: quando integris alienis voluminibus, nostrisque peregrinationibus, & erigatis laboribus, fastu praetextatis planissimis plebecula, ignorisque, eodices suos peruersos aut de latinalingua in vernaculum enotatos, furere vident. Ingenuè verò fateri per quos proficimus, perhominum est. De his satis plura in Balsami ex plantatione diximus.

Oleum Rosatum Omphacinum.

Hoc duplex est. Aliud rude, quod Omphacinum Ros. dicitur: aliud verò compositum. Oleum rude ad refrigerandum & repellendum conficitur ex oleo Omphacino, & Rosis non expansis. Ratio parandi talis est. Accipe eam quantitatem olei Omphacini, quā voles; In qua infunde Ros. parum contusarum quantitatem ei respondentem. Pone in vase vitreo, vel vitreato, & diligenter obtura. Expone soli per dies vij. & quondie volue vas, ut undique intalescat. Deinde leuiter decoque in duplici vase. Postea exprime, & illas Rosas abijce, & secundo alias Rosas infunde, & ut prius, repone in sole per vij. dies. Rursum decoque, imponendo atque Rosatum, vel infusoris Ros. q. s. Decoquatur leuiter, & reponatur oleum, & vsui seruetur. Simile fieri potest ex Rosis siccis, & aqua Ros. quod magis constringit & non multò minus refrigerat, & oleo abluto aqua frigida, & cum succo Palmæ, vel Cytoniorum, quod magis constringet, & non multò minus refrigerabit.

* In regionibus frigidis Oleo Omphacino & basis.

Regiones quae carent Oleo Omphacino, addere possunt Omphacinum & Plantaginem, vel succum Ros. in infusione Rosarum, vel literatis infusionibus adstrictiorum vim oleo conciliare: aut tempore Vux acerbae coquere in oleo dulci quantitatem sufficientem praedictae Vux cum acinis ad adstrictionem.

De oleo rosato completo.

Oleum completum ex oleo dulci, & maturo, & Rosis expansis, contusis, & soli expositis, & leuiter decoctis in duplici vase, ut Ros. Omphacinum componitur. Hoc ad dolores conuenit. Post annum valet adhuc ad confortationem & doloris mitigationem. Omphacinum verò post annum inuile est ad refrigerandum & repellendum. Quare pro completo, secundo & tertio anno vsurpari potest.

De oleo Myrsillorum.

Oleum Myrsillorum, prope Rosaceum Omphacinum rude collocari debet, Refrigerat enim, repellit, & adstringit. Si pa-

Rec. Olei Omphacini, lib. 3.

Baccharum immaturum. Myrthi confecturam lib. 1.

Aqua, lib. 2.*

Bulliant ad aquæ consumptionem. Si aqua decoctionis, vel aqua Myrthi apponeretur, efficacius esset. Hoc Oleum parari debet hoc modo, ut præter quæ pollicetur, & possit refrigerare & repellere. Quare sine Vino, sed cum aqua decoctionis vel destillationis Myrthi parari debet. Succus ponitur vel decoctionis, utatur oleum coctione, Vinum autem apponendum non est, nisi forte tempore applicationis, necessitate exposulante, ad punctionem. Non enim semper Vinum convenit, vel Accetum: quare cum convenit, addatur; nam parare cum vino, est medicamenti vim impedire.

* Minor quantitas sufficit, si decoquantur in vase duplici.

De oleo Cydoniorum.

Oleum Cydoniorum parare debemus, quia est efficax ad refrigerandum, repellendum & constringendum, & in quibus regionibus Myrtus non reperitur, hoc substitui potest. Paratur autem hoc modo.

Rec. Carnium Cydoniorum maturationis mediz cum cortice, sed sine semine quia muccaginem habet: succi Cydoniorum ana partes æquales, Olei Omphacini q. s. reponantur in vase vitreo ad solem per 15 dies; deinde diutius decoquantur, quàm Rosatum, & in duplici vase: coctum reponatur in vsum. Quod si efficacius efficere volueris, abiectis primis ponantur alia Cydonia, & rursus infusa, incoque, ut prius, cum succo: Vel 40 dies infusa, & eoque minus. Igne Paulus non coquit, sed infusa per 40 dies. Sed cum hoc oleum paretur ex carne & succo Cydoniorum, quæ substantia est dura, melius est parare, ut prius. Meliore est illa præparatio Mes. ut in sole macerentur prius, deinde decoquantur in duplici vase. Illud Diosc. non est parandum.

Omphacinum) Pharmacopœia totius fere Europæ hoc requirit & igitur antea sperant.

De oleo Nympharum.

Oleum ex floribus Nymphæ parari debet, quia est efficax ad refrigerandum, & constringendum, & Venereos impetus extinguendos. Paratur autem, ut Rosaceum, ex

Omphacino, in hunc modum.

Rec. Olei Omphac. lib. 3.

Flosum Nymphæ alba, voc. 4 contundantur, macerentur, & insolentur, & in duplici vase leviter coquantur, exprimantur, vsuque servantur. Quia habet multum aqueæ substantiæ hoc Oleum, multum decoqui debet, vel flores per duos dies servandi, ut marcescant aliquantulum, & tunc minus decoquere oportet, absumpta nimirum aquea substantia.

De Oleo Violæ.

Oleum Violaecum parandum est Vere, ex floribus Viol. & oleo dulci, non antiquo, neque salito hoc modo.

Rec. Olei oliivarum maturar. lib. 2.
Viol. recentium. vnc. 4. aut q. oleum ebibere potest.

Infundantur, & insolentur per dies 7. Postea bulliant leviter, duplici vase, per horam. Hoc Oleum cum sit ex floribus, sufficit leviter decoquere, ne longa coctione vis resoluantur; & Oleum calidius reddatur. Non sunt ponendæ Violæ sicæ in fine, quia nullius sunt efficaciz, nisi parum admodum exciccatæ. Magis enim ob humiditatem vsurpantur, quàm aliud. Refrigerant etiam magis recentes ob humiditatem, quàm sicæ. Est enim aliquid in eis, quod linguam pungit, cum masticantur. Vtile est ad refrigerandum, & leniendum dolores, & per

De oleo Liliorum.

Oleum Liliorum simplex, & compositum olim erat, ut ex Diosc. oride videre est. Compositum hebat ex oleo, Myrtha, Calamo aromatico, Cardamomo. Olei inspissamentum servabant, quo utebantur in affectibus veruorum, ut vteri. Inspissamentum & faciem appellabant Magna illud, unde Bachari pro Magmate accipiunt faciem Olei de Lilio simp. quæ contrariam facultatem habet. Quare si quis prescribat faciem olei Liliorum, non faciem simp. sed compositum intelligere oportet. Cuius descriptionem apud Dioscoridem reperies. Simplex conficiebatur ex oleo Balanino, id est, ex oleo de sem. Bcn, quod scien antiquis, & Balanus Myrep. vel Myrob. Plinio dicitur. Et quia istud oleum rarum est, erit parandum ex alio simili, ut oleo Amygdal. vel oleo dulci. Sed si ex oleo Amygd. fiat, efficacius erit, & ad sedandos dolores, & relaxandas partes frigore contractas, & potissimum Vulvæ, & ad rure faciendum.

Rec. Olei Oliuarum maturarum, vel Amygd. dulcium lib. 1.

Florum Liliorum alborum, autem parte interna crocea, vnc. 4.

Hi flores satis humidi sunt: quare extra aquæ admixtionem infolandis, & in vase duplici diutius coquendi, donec humiditas absumpta sit, quæ solent oleum corrumpere, ut de Nympha-rino dictum. Seruandi flores post collectionem, ut marcescant.

De Chamemelino.

Hoc Oleum semper paratum habere oportet, quod ad multa utilissimum sit, ut ad sedationem doloris, ad febres, ad resolutionem & conspersionem partium.

Rec. Olei dulcis lib. 2. & vnc. 4.

Florum Chamomilæ vnc. 2. infundendo, & soli expone. Deinde leuiter decoque, & rursum flores adde, & soli tantum appone, & vsui serua.

Dosis: si animum augenda, & respondere debet proportio- ni Olei, ut est, quam Oleum commodè recipere possit.

De Anethino Oleo.

Quamquam non moleum facultate differunt hæc duo olea, cum tamen hoc facile parari possit, & sine magna impensa, parandum consueo: Est magis calidum, & in doloribus frigidis & flatulentis magis conuenit, paraturque, ut Chamemelinum.

Rec. Olei dulcis communis lib. 2.

Florum Anethi vnc. 4. vel q. 6. Infundantur, & insolentur, & leuiter decoquantur. Rursum alij flores addantur, & insolentur tantum: Nam insolutio sufficit ad mixtionem in florum odoratorum, & tenuium partium. Ob id sufficit humidos primos decoquere, & in oleo calido secundos parum exsiccatos iniicere, & insolare. Nam qui secundis adduntur, ipsi hoc & in oleo calido semiseci poni debent: eadem sunt in altera aut tertia expressione. Propter oleum Chamemelinum colloca- ti deesse, & post hoc Rutacium. Anethinum inter utrumque medium.

Paulus proportionem Olei in oleo Anethino vnc. 1. At- que per se aut.

De Rutaceo Oleo.

Oleum Rutaceum vbique parari potest, & debet, quod sit efficacissimum, ad calidum tendendum, resolendum, & discutendum. Fit autem hoc modo.

Rec. Olei Oliuarum antiqui lib. 3.

Foliorum Rutæ, & succi eius ana. vnc. 4. infundantur, & insolentur, decoquantur leuiter, coaleant, & vsui seruentur. In hoc non est faciendus secunda infusio, quia herba & succi posuimus, ana. vnc. 4. pro lib. 3. Ea enim quantitas minor erat: Non tunc latet hoc factum ob herbae efficaciam maximam, & scitorem. Verum hoc oleum efficacissimum esse dicitur: quare sic non parandum: nam in magnis & extremis morbis minus solliciti sumus de scetore: Erit etiam ob scetorem vsui in morbis vterinis, appositum naibus, & vmbelico. *Ter igitur Ruta renouanda erit.*

Si deest Oleum rutæ, recens duo cognatur.

De Oleo Irino.

Irinum ab Iride dictum est. Conficitur ex oleo antiquo, floribus Iridis, & radicibus, & decoctione radicum. Parabitur autem in hunc modum.

Rec. Olei Oliuarum antiqui dulcis lib. 2.

Succi radic. Iridis vnc. 2. infundantur, & insolentur, & coquantur ad consumptionem succi. In fine adde flores in d. vnc. 4. & rursum decoquatur cum floribus leuiter. Non enim sufficit macerare flores ob crassum & succi copiam. Oleum deinde cola, & in vsu serua. Valet contra flatus & affectiones nervorum frigidas.

Si efficacius velis ter repetende infusiones, aut saltem bis.

De oleo Kerino.

Oleum kerî, dicitur oleum de Leucoio lacteo, quo possumus carere, si irinum habeamus. Si quis velit parare, faciat hoc modo.

Rec. Florum kerî vnc. 1. 2.

Olei antiqui non salit lib. 2. insolentur per tres dies, & leui igne coquantur in balneo Mariæ. Seruietur vsui. Idem præstat, atque Irinum.

Si diutius flores infundantur, fatent & parantur.

De Oleo Enulæ.

Oleum Enulatum dispensari non debet, quia easdem vires habet, cum Irino. Quod si quis requirat, omni tempore & facile parabitur ex radicibus contusis, & succo enulæ coctis, vt Irinum.

De Oleo Castorei.

Ex Castoreo paratur oleum, quod omni tempore, & nullo negotio fieri potest. Sed quia in Apoplexia, caro, lethargo, & alijs capitis, & neruorum morbis est vtile, præstat paratum habere.

Rec. Olei antiquissimi lib. 1. Saniei Castoris, vel illius solidæ substantiæ, vnc. 1. leuiter decoquantur. In Castoreo reperitur sanies quædam ad instar Butyri rancidi liquefacti, quæ ob similitudinem, quam habet cum oleo, facile miscetur. Ob id nulla decoctione eget, sed potius agitatione, & calefactione. Si verò substantia interna Castoris sicca sit reducenda est in pul. & leuiter calfacienda: ob substantiæ tenuitatem, & acrimoniam facile oleum afficit. Nolui saniei illius causam exortumque tradere, cum alijs locis distulset & ex profecto tradiderim.

Oleum de Euphorbia.

Hoc oleum facile, & omni tempore paratur, & sufficit vel oleum Castorei, vel Euphorbiæ paratum habere. Paratur autem ex Euphorbio, oleo & vino. Cuius descriptio duplex est. Alia olei simpl. alia compositi. Sed simplex parandum. Nam compositum natura cum oleo de piperibus conuenit. Præterea vix parari potest ob defectum Struthij, quo caremus. Quare sufficit simplex, quod in hunc modum parabimus.

Rec. Euphorb. albi & loti vnci. 1. Olei Keyrini, lib. 1. vini parum. Leuiter coquatur, vel potius incalescat in balneo. Vtuli seruetur. Est enim tenuissime substantiæ, quæ, vt de Castoreo dictum est, facile permiscetur.

Oleum de Costo Mes. siue Costinum.

Rec. Costi amari, vnci. 3. Cinnamomi crassij, vnci. 1. Ex: remittatur Sampfuci, vnci. 8.

Vini odoriferi q. s. Olei antiqui, lib. 3.

Macerentur simul per tres dies, & leuiter coquantur ad consumptionem vini. Colla, & vtuli serua. Hoc omni tempore parari potest. Carere possumus, ne multitudine vasorum perturbemus.

Alii habent Olei Sesamini, lib. 3. Cordus lib. 2. & Sampfuci vnci. 2. Oleum tamen vetus Amacinum, aut Anthosatum non erit inuitis, præstatum ex f. q. Amari aut Rosmarini Coronarij floribus.

Oleum Mastichinum.

Omni tempore parari potest. Carere possumus. Sed quia frequenter eo vtuntur Medici, aliquam quantitatem præstat habere. Sic paratur.

Rec. Mastiches vnci. 3. Olei dulcis vnci. 12. vlti optimi parum. Decoquatur leuiter. Paratur duobus modis apud Mes. cum oleo Ros. vel Sesamino. Et quia Mes. vsurpat ad ventriculi & iuncturarum corroboracionem & sedacionem dolorum, & ad apostemata dura; ob id illam priorem descriptionem apposiuius, quod paratur ex oleo dulci, loco Sesami. Quod si quis velit magis constringere, oleum Ros. ol. Cydoniorum, vel Myrthill. addere poterit. Sic paratum, vt diximus, magis ad dolores leniendos, & abscessus conuenit: nam Mastiche emollit, & contrahit, si prædictis credimus: quare magis emolliet & concoquet, si cum oleo dulci, vel Sesamino paratur.

Fit hodie ex oleo vulgari Oluarum, cum tamen vt senè annotat Sylius, ex Rosato, aut Omphacino; aut saltem loto confici debeat in vase duplici; ad robur ventriculi & viscerum: At Rondelletij rationes non sunt contemnenda vtilitatis ad emolliendum & sedationem dolorum, quando paratur ex oleo dulci: porandis autem ratio Sylij optima est, quia nullo modo decoctionem sustinet Mastiche; inquit, Consumptus propemodum vino, decocto leuiter ex oleo Mastiche perstrita paulatim affunditur, continenter mouenda, donec erit liquata & permixta: Coctione longiore exanimatur.

Qui Mastiches naturam norunt, nullo modo ignem ferre sciunt: igitur qui decoquendum ad vini consumptionem iubent, non experti sunt Mastichen ignis calore statim in grammas, coalescere, duri & separari ab oleo si coquatur auidius igni admouetur, vt Pix, in vnguento Basilico; minusq; ad formam præscripti me dicamini aut olei Mastichini exactam præparationem efficaciamq;

quidem si effarbuturini, panem resoluuntur; eorumque vires iuuant, inanimata & trita sunt, Quam ob rem non abs re hoc solitum duxi, si aliam commodiorem parandi rationem mihi eligerem in Succatiuncula sine Chylorij modum, quo possim Ventriculam, Cor, Cerebrum, facultatesque animales, vitales & naturales largiri idaque viscera reficere, fovere, & gula irritamenta instaurare, tueri, nec non leniter soluendo extremumque, putrilaginosi, nidrosi, superfluitatibus vindicare, beneficio infra scripta Pilularum Aromaticarum Succatiuncula, cum atati visibilia, affermata corroborantia Aromaticum energia & efficacia. Sic enim habet.

Rec. Agarici selectissimi, unc. 2.

Caryophyllorum

Florum Anthis

Florum Stachadis,

Salvia,

Betonica,

Melissophylli

Corticis Cetri

Quantitati tenuis

Nucis Moschata, ana. drach. 1.

Merula Romanae sicca

Minorana nobilis

Absinthij sicci apicaloco collecti,

Epithymi, vel florum & summitatum Thymi, ana, scrup. 2.

Radicum Asari

Schamanti

Galanga tenuis,

Santal Citrini,

Xylaloes prima

nota,

Cardamomi

Plin tenuis

Acori,

Myrobolanar. Popularum, ana. drach. 5.

Commendantur; infundantur in succi & infusi Rosarum & succi Betonicae equalium partium q. s. varijs vitreis commodioribus vasculis optime clausis, debito ordine, ex artificio industria conservantur cunctislibet simplicis medicamenti energia & digerantur balneo moderato calore. Expressioni & colatura dissolue pulveris

Aloes Succotrina purissimè defecata, unc. 18.

Excitentur rapida Balnei vapore aut chyano artificiali ne vis oleratorum exipiat aliquoties vniat agitando.

Omnibus penè refrigeratis, adde Masticheb tenuissimè trita drac. 6. Croci scrup. 4. fiat. massa formandis Catapotijs idonea.

Chylismasis Catholici Theophrastice corruptionibus minus infestis, accurata magis commendatag descriptio nostra.

Rec. Trocise. Alhandal, drach. 12 scrup. 1.
Varyi nigri legitimi, ana.
Diactridij siabco more egregie preparat. ana. vniat.

Agarici optimi, unc. 1. f.

Aloes selecti. defecata & preparata unc. 2.

Specierum Diarhod. Abbasii drach. 12.

Cinnamomi drach. 4.

Masticheb scrup. 4.

Spec. Aromat. Ros. vel spec. Diarhod. dr. 3.

Spiritus vini alcoholizati, q. sanguis macera species pradeltas aliquot diebus secundum artis precepta, in Sole vel Balneo. Deinde facibus relectis, Spiritus super purgantia medicamenta incusa & comusa fundatur, (demptis Aloes preparata Diactridij & Masticheb qua sub finem commiscuntur) & in Sole aut Balneo serendo digerantur, & ut loquuntur, circulantur, per ostium: postea exprimantur: deinde humor elicitur per Balneum domo crassitudo fiat formandis Catapotijs idonea.

De TROCHISCIS.

Trochisci à figura rotunda disti sunt. Patentur autem ad n edicamentorum conseruationem. Nam melius conseruantur simplicia medicamenta in ea forma solida, quam in pul. redacta. Multi sunt, quibus carere non possumus, quia alias compositiones ingrediuntur, vt Trochisci de Violis, de Rosis; in pul. cordialibus, vt Diarhodon, Trochisci Squallitici & de Viperis, in Theriaca. Aliqui in sumigijs recipiuntur, vt Aliptex Moscatz, Galliz Moscatz. Quo tempore preparari possunt, vt Squillz, Viperarum, patentur: qui vero quouis tempore parari possunt, cum otio abundant, serius parabunt, vt hyeme. Patentur tantum, qui sequuntur, Trochisci Dyarhodon, è Viol. Scillitici, Theriacales; è Camph. Trochisci Alkekengi, è Myrrha, è Gallia Moscatz, de Alipta Moscatz, è Rhab. è Spodio, è Carabe, Alhandal, è Capparibus, de Agar de Eupatorio, Absynthio.

TROCHISCI

TROCHISCI DE ROSIS.

Trochisci è Rosis, descriptione Rasis Mesuzo. Diasthodon dicti Trochisci à Rosis. Hoc nomine etiam pul. apud Arabes, & collyrium apud Gal. dicitur. Horum Trochiscorum multe sunt descriptiones, sed Rhafsa magis probatur, quæ sic habet.

Rec. Ros. rubr. amotis vnguibus drach. 4. Santal. Moschatelini, vel Citrini, pro

ligno Aloes drach. 2.

Matlich. drach. 1. f.

Abfynthij,

Cinnam.

Spicæ Nardi,

Cin. crassi, siue Cassiæ,

Schanau. ana. drach. 1. fiat pul. tenuissi-

mus, qui vino exceptus reducatur in Trochiscos, & feruentur in vase vitreo. Hic pro ligno Aloes raro inuenitur, Santalum substituimus. Cassiam, Cinnamomum crassum interpretati sumus. Hæc descriptio aptissima est, nec tamen rejicienda illa Mesi. quia est paratu facilior. Recipit tamen, quæ sequuntur.

Rec. * Florum Ros. drach. 10.

Glycyrrhiz. drach. 5.

Spicæ Nardi, drach. 2. f. excipiantur vino albo, fiant Trochisci.

Nihil habent quod agglutinet. * Ex Nicolo Proposito.

Trochisci de Violis.

Hoc nomen vagum est apud Græcos, sed magis apud Latinos, & Græcis, Violam significat, quam simpliciter in officinis Violam Martij vocant. Græci tamen Violam appellant *adoniam*, seu tres sunt species, luteæ, quas vulgus vocabulo Arabico Clæti vocat: albas, seu rubras, seu purpureas, Græci, nomine, *maion* significant. Quare incertum est, à quibus nomen habeant hi Trochisci. Puto tamen a Leucoio. Et quia nomen sonat Albam Violam, vertunt violas albas. Qui trochiscos in officinis parant, ex martialibus Violis componunt contra authoris voluntatem, qui potius ex Cherino flore, quia inter Violas est efficacissimus. Dispensabimus ergo ex illis, & secundum hanc descriptionem hanc, quia hi Trochisci recipiuntur in pul. cordialibus. Si enim parentur secundum aliquas descriptiones Mesuzæ, quæ Turbich dæch. 3. re-

cipiunt, destrueretur pul. cordialis. Fiat ergo in hunc modum.

Rec. Florum Leucoij viridum, drach. 5. Amyli drach. 3.

Sem. Pap. albi, drach. 2. & scrup. 1.

Rhab. scrup. 5.

Sem. Plantag. drach. 1.

Succi Myrrhæ pro Opobalsamo, scrup. 1.

Aquæ Ros. q. f.

Fiant Trochisci, & teponantur in vase vitreato.

Parari possunt ex albis purpureisque: sed quia Lutearum præcipue in medicina usus est, ex luteis parabuntur, quæ Chæiri vocantur. Recipiebant Balsamum, quod de Opobalsamo intelligendum est, tanquam de præstantiore. Nos succum Myrrhæ substituimus, ut in Theriaca, & omnibus alijs internis remedijs faciendum censuimus. * Extrahitur sic. Eligiuntur purissima Myrrha, qualis illa, quæ venditur multis in locis pro Idellio. Est autem flaua, amata, odorata, & partes habet velut vngues. In tenues partes ponatur, & in cauitate aluminum Ovorum coctorum ad duntaxat, & supra discum stæneum reponatur in loco frigido subterraneo. Sic dissoluetur, & in tenuissimam Stæden reduetur, & illa licebit vri pro Stæde prelo expressa, & pro Opobalsamo. Hos Trochiscos dispensandos tuadeo, quia in pulveribus quibusdã recipiuntur: nam alio modo non videntur. Est certe medicamentum incerti effectus; componitur enim ex pugnantibus calidis, frigidis, & adstringentibus: quare quantitatem habere oporteret, quam putamus sufficere ad pul. conficiendos. Parabitur Vere & Ætate in locis frigidis: Apud nos toto serè anni tempore reperitur, præterquam in fine ætatis, quando deflorent, & semina producant.

Trochisci de Violis Martij purpureis purgatiues.

Ventis in frequentissimo & quotidiano usu sunt Trochisci magistrali, descripti in Florentino Antidotario; quibus Itali medici vtuntur, ad pituitam & bilem blandè euacuandam: ac uentosq; belos lenientes à Cassia, Diacatholico, Elett. Lenitimo & similibus, paratos.

Rec. autem, violarum purpureo-violæ earum succidarum sine possarum, aut superfluo humido orbatarum, drach. 6. Pulueris Turbich. drach. 3.

Suc. i Glycyrrhizæ,

Manna

Manna,

Diagredij, ana. drach. 2.

Viole purgata à suis viridibus partibus & pediculis, insudantur exalio, addendo Mannam secundum in pila marmorea aut lignea: tandem adduntur reliqua; quibus commixtis, Trochisci lupinæ formantur, servanturque in usus medicos.

Trochisci ex Agarico, & Agaricum trochiscatum.

EX Agarico, sine magna impensa parantur duo Trochiscorum genera Mesuz. Secundum unam præparationem dicuntur Trochisci de Agarico: secundum verò alteram, Agaricus Trochiscatus. Communiter autem in officinis sic parantur.

Rec. Agarici feminej boni, & albi lima in tenues partes derasi, vnc. 4. vini infusionis Zinzib. q. s. fiant Trochisci. Hoc Agaricum Trochiscatum vocant. Trochisei verò de Agarico videntur magis apti ad pituitæ educationem; sed varijs modis parantur. Alij ex Agarici vnc. 3.

Zinzib. & Salis Gemmæ, drach. 1. cum Oxy-melite & Syrup. Acetoso, formant pastillos. Id enim parum refert, siue ex Oxy-melite, siue ex Syrup. Acetoso fiant: n ultimum vero, si fiant secundum illam descriptionem vel secundum aliam, in qua vnc. 1. Salis Gemmæ, & Zinzib. drach. 1. legitur. Ego magis probo vltimam: & secundum hanc parari suadeo: quia in prima Dosis est minima ad drach. 1. Salis gemmæ, & Zinzib. vnc. 1. In secunda verò minor est, quam conuenit dosis ad drach. 1. Sed liberum est addere vt libet. Decoquant Zinzib. in aqua Buglossi. in decocto Zinziberis insundunt Sal benè tritum, & miscent: sed hoc modo parantur, non multum differunt ab Agarico Trochiscato.

Trochisci Alandal.

Trochisci ex Colochintidis interna parte parantur, qui Arabicum nomen seruant apud omnes; quod ego quoque seruare volui, vt vulgus nesciret ex Colochintide eos parari, (timere enim solent Diagredium, Colochintidem & alia fortiora remedia, sine quibus tamen morbos contumaces curare non possumus.) Parandi autem sunt ad pituitæ euacuationem in hunc modum.

Rec. Pulpæ Colochintidis albæ & levis purgatæ seminibus, * vnci. 10. oleo Ros. vnc. 1.

Gummi Trag. & Arab. ana. drach. 2.

Bdellij & Myrrhæ, drach. 1. macerentur lachrymæ in aqua Ros. triduum, & formentur Trochisci ex Colochyntide. Oleo Ros. conficeatur Colochyntis fercipibus minutim incisæ: deinde cum mucagine fiant Trochisci. quos siccant, & ficcatis rursus in Trochiscos reducant. Hoc autem faciunt, vt in tenuiores partes redigatur Colochyntis. Quod si uon sit tunc faciunt, diligentius in puluerem rediguntur, cum his erit vtendum.

* Hic vnc. 10. pro drach. 10. efficitur: & vnc. 1. Oleo Ros. pro drach. 1.

Trochiscorum Rhabbarbaro Mesua emendata descriptio Rondelletiana.

Tres sunt Trochisei, qui sunt similes: Ob id sufficet vnum ex his retinere in officinis. Retinebimus eos, qui ad hunc modum sunt parandi.

Rec. Rhab. drach. 10. Succi Eupatorii Mesuz, id est Agerati, non Gratiolæ, vt vbiq; perperam Cordus annotauit, drach. 4.

Ros. drach. 3.

Spicæ Nardi,

Amygd. amar. ana. 4. drac. 2. s.

Anis. Rubiæ tinctorum, seminis Apij,

Abfynth.

Azari, ana. drach. 1.

Cum vino formentur, si succi inspissati & ficcati sint: Si verd ex succo recenti, sine b. vino; sed cum succis parandi sunt. In hac descriptione restituius pondus, & ordinem Amygd. amararum. Nam antiqua exemplaria & ordo hoc docent, vt post drach. 3. sequantur drach. 2. vel drac. 2. s. Quod si desiderasset Amygdalar. amar. drach. 4. cum Eupatorio coniunxisset, vt conianxir, quæ ponderè tantum drach. 1. ponuntur.

Succum Eupatorij, Mes. vel succum Abfynth. ipse substituit aliquando: Sic c. Troch. de Abfynth. & Eupatorio carere possumus, cum istos habemus, qui valent ad liberandas obstructions hepatis,

a Hic auxit Spicæ pondus ad maiorem efficaciam.

b. Cum aqua Cassiæ format Antidotarium Florentinum: & conuulsi quædam habetur.

c. Troch. ex Eupatorio & Abfyntho carere possumus, Trochisci.

Trochisci è Capparibus. Mesf.

Trochisci è Capparibus parantur ad splenis affectus, & obstructions auferendas. Recipiunt apocientia sunt hachrynis, & hoc nomine differunt à Trochiscis hæpaticis, qui Rhab. omnes recipiunt, ut illi qui nomine Rhâbarb. appellantur & de Absynth. & Eupatorio.

Rec. Corticis rad. Cappar. seminis Agni Casti, ana. drach. 6.

Melanth.

Calaminth.

Acori

Amygd. amar.

Nathurij

Ammoniaci

Foliorum Rutæ,

Aristolotundæ,

Succi Eupat. ana. drach. 2.

Cyperij

Scolopendriæ suæ Ceterach, ana. drach. 2.

Dissoluiatur Ammoniacum Aceto acri, & cum dissolutione formentur Trochisci. Vera Scolopendria est Ceterach; quanquam lingua Cetuina easdem vires habeat ad splenem absumendum. Melanthium, Nigella Romana dicitur, non vulgaris, quæ Melampyron est.

Trochisci Alkekengi, suæ è Solano vesicario. Mesf.

Ex bacis Alkekengi fiunt Trochisci, qui corrupto vocabulo Trochisci Alkekengi vocantur, & parari debent ob summam eorum necessitatem in affectibus renum & vesicæ ad dolores & vlcera eorum. Recipiunt autem hæc.

Rec. Baccarum Alkekengi, drach. 3.

Seminis Citrulli,

Melonum pro semine albz Techæ,

Cucurbitæ, ana. drach. 3. l.

Boli Armeni,

Gummi Arabici,

a. Corticis Thuris,

Sanguinis Draconis,

b. Papaueris albi

Amygdalarum amarar.

Succi Glycythyzæ

Tragacanthi

Anilyi

Nucleorum Pinearum, ana. drach. 6.

Seminis Apij

Succini, suæ Carabæ,

Hyoscyami

Opij, ana. drach. 2.

Cum aqua Mellis compingantur Trochisci. Aliqui addunt Terram Sigillatam: sed in optimis exemplaribus Mesf. non legitur. Aliqui dubitant, quod interpretes legant (peponis Indi) sed aliqui intelligunt de Tecta alba, quæ est peponis species. Qui habent, ponant: qui non habent, seminare possunt: Sin minus, seu non Peponum, vel Cucumeris. Omnia ista semina idem præstent humiditate aquea, quæ abundant.

a. Alii Gibbanum habent.

b. Capis addit Rodet.

Trochisci è Myrrha, Rhafis, quia omisi, à nobis additis ob frequentem usum.

Rec. Luviorum, drach. 5.

Myrrhe, drach. 3.

Foliorum Rutæ:

Montastri,

Pulegij

Ceruinij

Radici Rubi tinctorij, ana. drach. 2.

Assæ fatida,

Sagapani

Opoponacis,

Lacryma si recentes & selesio, pistillo & mortario calidis facile dissoluntur, affundendo succum Rutæ aut Artemisicæ, aut Pulegij, aut eandem decoctam ex Vino, non aceto; commixtis omnibus formantur Pastilli. Menses mouent, Partum accellerant, & fatum mortuum expellunt, quemadmodum Myrrha, quæ Dioscoride teste, vuluum emollit, & præclusum aperit; mensis & partus celeriter extrahit, cum Absinthio, Luviorum cremore, vel succo Rutæ, non solum sumpta sed etiam admota; quæ Succus Rutæ abterrimus, & ad id efficiendum efficacissimus.

Cordus Florentinus de Remediorum fortibus, & Bauderous Cuminum addi-

L'Obel.

dere (quibus ut opinor, non fuit notum illud Narbonense Monspelienfium Pulegium Ceruinum, eiendis mensibus efficacissimum: contra verò Cuminum, Discoride auctore, mensium abundantiam inhibet; & contritum, naribusque obiectum ex Aceto, sanguinis profusiva sit. Huius non videntur Syl.

Trochif.

Trochisci ē Carabæ sine Succino.

EX Succino parantur Trochisci efficacissimi, quos retinere visum est ex Melueo.

Rec. Carabæ, aureos 6.

Cornu Cerui vlli,

Coralli adusti,

Tragacanthi

Acatiz

Hypocistidos

Balaustiorum

Mallic.

Laccæ lotæ,

Pap. nigri affi leuiter, ana. aureos duos.

Thuris,

Croci

Opii, ana. aureum vnum, s. cum mucagine Psilli, extracta cum aqua Rosi, hant Trochisci.

Hos transcripsimus ex Mef. & pondere, quo ipse vsus est, nos quoque vsi sumus, aureo, scilicet, quod pendet drach. 3. s. apud eum, & alios. Nihil est periculi, si quis pro aureo, drach. legat; quia omnia simplicia eodem pondere notantur: quare semper eadem proportio seruatur; non autem pondus idem compositionis totius, quod parum refert, quando tota quantitas vna dosi non sumitur. Pro (Hemphistidis) reddidimus (Hypocistidis) ne nonien Arabicum remoraretur Pharmacopolam, Adieciimus mucaginē extrahendā cum aqua Rosi, quia constringit, & odoris suauitate aliorum fastorem emendat. In Mef. quia non legitur (gummi affi) pratermissi. Quod si placeat, expunge; Lacca lota, quia nostra si esset Caneamon, non conuenit, vel pro Lacca, Sang. Draconis ponendum suadet.

Trochisci de Antispodio, cum semine Acetosæ Mefua.

Trochisci ex Spodio Arabum, id est, Antispodio Dioscoridis, parantur duobus modis sine semine Acetosæ, & dicuntur simpliciter de Spodio: Alij enim semine Acetosæ: ob id de Spodio cum semine Acetosæ dicuntur, qui magis probantur à practicis; ob id illos retinemus; quia efficaciora ad constringendū sunt, & recipiunt hæc.

Rec. Ros. rub. drach. 2.

Antispodij ex Myrritho, vel *Oliuæ, vel Cotoneis, drach. 10.

Sem. Acetosæ drach. 6.

Sem. Portulacæ, granorum Coriandri infusorum in Aceto, deinde torrefactorum pulpæ Sumach, ana. drach. 2.

Amyli affi,

Balaustiorum

Berberis, ana. drach. 2.

Gummi Arab. drach. 1. s. cum succo Acetosæ fiant Trochisci.

* Vel Oliuæ, sive ex ramis Oleæ, sive ex Olis arborum immaturarum uicere fiat Antispodium, per. de oji.

*Trochisci Scillini, sine ē * Scilla.*

* De Scilla & Pancretio consule Adnosaria Stirpium pag. 17.

Ad Theriacæ præparationem ex Scilla parari debent, in fine Veris. Ex Galen. sic parantur.

Rec. Carnis S. illæ decoctæ, vnc. 4.

Farinæ Orobi leuiter torrefactæ, vel micæ panis candidissimi, vnc. 2.

Formentur Trochisci, & seruantur in domo spectante ad meridiem, non tamen in sole, & moueantur frequenter, ne situm contrahant.

Scilla bonæ habitudinis, id est, mediæ magnitudinis est eligenda recens. Illam massæ ex optima farina subacta inuolue, & in fumo vel sub cineribus coquito, donec moleseat, ablectis prius primis tunicis & duriore infima parte, cui radicis fibræ pendulæ subtile adhærent, in mortario in leuiorem coege, & additâ sufficienti quantitate farinæ Orobi torrefactæ, vel micæ panis, fiant Trochisci. Farina Orobi vsurpatur, quia apta est ad formandos Trochiscos, & pugnat aduersus venena: Et quoniam Erum aliud est albū, aliud flauum, eligitur albū, quo deficiente, vsurpatur flauum, vel mica panis candida. Sunt qui volunt æqualem portionem: alij dimidiam: alij tertiam tantum: Alij duas farinæ, tres carnis Scillæ. Hæc melior est proportio, & secundum hanc parabimus.

Trochisci ē Viperis.

EX Viperarum carne parantur in officina Trochisci initio æstatis ad Theriacæ præparationem, quæ æstate mediâ & seruida paranda est, & cum herbæ, flores, & fructus habent ferè maturos. Parantur ex carne Viperarum, & pane tantum, varia portione apud diuersos. Sunt enim, qui dimidiam, qui retris, Galenus quartam, vel quintam misceat. Nam panis ad excipiendam carnem, & seruandam poritur. De præparatione pauca, plura in Diario, seu Ephemetidibus Pharmacopolæ, Caro Viperarum tantum vsurpatur, quia caput, cauda, & pellis, & spinæ, & interna abijcienda

abijcienda sunt, eoq; tempore magis, quo plus carnis habent, ut paulo post quam è terra ex-
eant venantèz, & illaz, quæ ventrem non ge-
runt. Caro decoquatur in sufficienti quantita-
te aquæ, ut Anguillæ solent decoqui.

L'Obel.

Visera in Eug. a. montibus maritimis, Veneta
hodie dotronis non procul à Patania, & in
Gallia Pict. agræ, iuxta pagum S. Benedicti vi-
cum, saxosis ardua via, Passielourdin vocata,
miliari à Pictavia Metropoli distia, venantur
à medio Aprilis in finem Maij, & paulo tardi-
us locis à mare distiis ad æstatis initium, pastillis
Theriacalibus Putaninorum Venetorum, Picta-
venensium & Melispheniensium commendatissimæ.
Delectus Viperæ recentis venatus, esto femella
sulis coloris, capite latiusculo & compresso; & a-
culis longiusculis; collo; ventre ampliore ouis ca-
rente mihi ineq; pregnantæ: minore cauda mini-
mèq; collata aut contorta, sed exarsus piger & op-
tatu postiora cauda proxima promouetur; aro-
e ssum vultus. Cauda & caput amputantur qua-
tur digitorum viring; interstitio. Vinacèl, ut
Aquila sanguinem fundentes à seltione præse-
runtur. Coquantur ex Auetis coma, addito s. lis
momento ad dissolutionem & separatorem carnis
ab arsis, aculeis & spina. Caro excipitur panc-
biscolo in pollinem redacto, & addita insculi de-
coctionis q. s. formantur Trochisci, qui ventu un-
tur Opobalsamo, ut duratius conservari possint.
Multa carne & paucio pane bisculo parati sunt
viperis coloris Pastilli referendi: improbandi ve-
rò debiores, paucilla carne, multo pane & inscula
coctos parati; carnosioris quotannis ex Italia
Atterpiam deferre solent improbi, æt. i. &
luci rapace Myropole sine Materia Medica,
herbarum & simplicium medicamentorum insti-
tores. Hæc à monendi gratia scribimus, quo
quisque sibi caueat.

Hedyceron Andromachi, siue Magnia
Hedycroij ex Galeno:

Rec. Ammoni, drach. 21.

Myrrha, }
Folij, }
Nardi Indiæ, } ana. drach. 6.
Ereoi, }
Cassia, }

Sebena thij, }
Calami odorati, }
Pbu Pontici, } ana. drach. 3.
Xylobalsami, }
Opobalsami, }
Cinnamomi, }
Colli, }
Mati, }
Asari, }
Amaraci, siue } ana. drach. 2.
Mazirana. }
2. Aspalathi, }

Masticher, drach. 1.

Vini Phaleri q. s. sunt Trochisci ad The-
riacæ compositionem. Hedicroi Pastillos, quid
hic omisi fuere, & in Theriacis antidoto recipi-
untur, necessario subnectere visum fuit. Exi-
neta ponderibus multum variat.

2. Adversarie. pag. 427.

Trochisci Cyphi Democratis.

Trochisci Cyphi dikli, odorati sulsimento.
Compositio hæc erat dicata Dijs, qua vte-
bantur Aegyptij Sacerdotes, teste Dioscoride.
Sed quia in Mithridatica vera compositione
ponitur, & per se viuari potest, eius descrip-
tionem prætermittere nolumus. Multæ sunt
componendi rationes, quarum vnam tradit
Diosc. alteram Democrates apud Gal. carminè,
quæ variari non potest, ob versus rationem.
Ob id eam retinuimus cum Galeno.

Trochisci, siue Pastilli Cyphi
Democratis.

Rec. Carnium vici passæ,
præpunguis & recentis }
purgata à pelle & gigartii. }
Terebinthine Cyprica purissi- } ana. drach. 24.
ma collata in aqua donec duces- }
cat, }

Myrrha
Sebananthi, ana. drach. 12.
2. Calami odorati, drach. 9.
Cinnamomi, drach. 4.

Bleby b. Onchis, id est, }
vngui similis. }
Spica Nardi, }
Cassie optime, } ana. drach. 3.
c. Cyperi rotundi, non lon- }
gi, purgati, }
d. Baccarum maximarum }
Imiperi, }

1 2

e. Aspalathi,

c. *Aphalathi*, drach. 1 f.

Croci, drach. 1.

Mellis optimi & Vini, ana. q. s. ad formandas *Trochiscos*.

a. Pro quo sumebant *Rondelletius & Itali* festucas *Iunci odoratissimi*, & pro *Sebanantho*, eiusdem *Iunci odorati* flores vigentes.

b. Onic his est nota bonitatis, *Dioscoride* auctore: hoc est, aliquas partes habens, veluti vngues squamatis compatiatis.

c. *Cyperus Rotundi* *Itali* scilicet *Cypero rotundo* *Syraco* in *Theriaceis* compositione videntur, ut docuimus in nostris *Stirpium Aduersariis*; *Cyperum longum* reijcimus.

d. *Baccarum Juniperi maximarum* *Itali* & *Mossellenses Imperii* maioris *Baccas magnas phoenices coloris* in hac compositione recipere. *Resinofatata*, & *pulpa facta*, qua cum *Passularum* carne minutim incisae teritur: *Myrrha* & *Badellium* affuso vino posse diluuntur, cetera in pollinem redacta, cum paucis melle despumato commisceantur & in *Trochiscos* rediguntur.

Juniperi maior in *Narbonensi Gallia* & *Gallogrævincia* vulgarissima est, uti in *Stirpium Aduersariis* diximus: Eius igitur bacca ad *Theriaceis nobiliss. antidotum*, ex *Gallia Narbonensi* aut *Italia* procuranda.

e. *Triplitem Aphalatum* in *Aduersariis* recensuimus: *Hon differētiās require*, pag. 427.

Trochisci à Gallia Moscata.

Non tam ad voluptatem *Trochisci* isti parantur in officinis, quam ad sanitatem: videntur enim in affectibus cerebri, vteri, & cordis: Quare parare oportet, sed in pauca copia, quia semper licebit, potissimum descriptionem *Mel.* parare. Hisce tribus parantur.

Rec. *Ligni Aloes* (pro quo *Santal* *Citri* ni), drach. 6.

Ambix, drach. 3.

Moschi, drach. 1.

Mucilagine Gummi Tragacanthi ex aqua *Ros.* excipiantur *Trochisci*. Non desunt, qui *ambram* dissolvere velint in oleo de *Ben*, vel *Amygd.* ex eoque confingere. Hoc faciunt, ut magis effument; sed si quis velit susumigia parari, ex his, postea quam exsiccati sunt, oleo iungantur, & sequentur vsui in vase plumbeo,

vel terreo vitreato, vel vitreo, ut odor seruetur.

Alipra Moscata, descriptione Nicolai.

Plueribus constat *Alipra Nicol.* in vsu communem recepta; Cuius descriptiones in quibusdam desiderantur. Hæc sufficit & probari potest: Constat autem sequentibus.

Rec. *Ladani puri*, vnc. 3.

Syrac. calamitæ, vnc. 1 f.

Syracis rub. vnc. 1.

Sandali Citrini, drach. 2.

Ambix, drac. 1.

Camph. scrup. 1 f.

Mosci, scrup. 1.

Aqua Ros. excipiantur, & formentur *Trochisci*. In his formandis inuicem non recipitur, quia hæc omnia ferè emplastica sunt, & ferè coniunguntur in vnum.

L'Obel.

Æstivo tempore parari debent, quia in canicularibus, *Ladanum* & vitrag; *Syrax* Solis exponitur donec melleant, postea coniunguntur; pulverisata sensim misceantur.

Ambra & *Cassura* sensim tritantur.

Moschi aqua *Rosacea* dissolvitur, & omnia commixta in *Trochisco* conficiuntur.

Bonum est aliquod grana *Piperis* in mixtione *Moschi* addere. Caliditate sua fundit odorem *Moschi*.

Syracem Calamitam & *rubram* res easdem esse volunt, & bonitatis notas à *Dioscoride* designatas; cui præfertur pinguis, flammis, resinifusus, albicanibus grænuis, qua vetustate refectus aut rubescit.

TROCHISCI siue **COLLYRIA** sicca, Arabibus & Officinis **SIEF** vocata.

Operæ precium facillus sum, si vltimissima *Collyria Sief* Arabibus dicta suo loco in *Pharmacæuticæ* titula *Rondelletiana* Officina omissa, quorum tamen doli scripsit, meminitq; libro suo de compositione externorum medicamentorum, quibus etiam vititur quemadmodum *Medici* per sepe & *Chirurgi Galli, Germani, Belgæ, Angli* & *Itali* in oculorum morbis, pudentorumq; vesicæ, intestinorum, antracumq; frexusorum vlcernum in oculis.

SIEF

SIEF album, siue Trochisci
albi Rhafis.

Rec. *Cernise lota, drach. 10.*
Sarcocolla, drach. 3.
Amygd. drach. 2.
Tragacantha, drach. 1.
Opij, drach. 1.
Aqua Rosæ, q. s. ad dissoluendum q.
Tragacanthum. Fiant Trochisci
parvi.

SIEF album Mesuz.

Rec. *Cernise lota, drach. 10.*
Sarcocolla infusa in lacte
asino.
Amyli, unc. 1.
Tragacantha, drach. 3.
Olibani, drach. 1.
Opij, drach. 1.
Aqua pluvialis q. s. Fiat Sief.
Fit etiam sine Opij.

SIEF è Plumbo Mesuz.

Rec. *Plumbi vsti & lati,*
Arisviti,
Antimony,
Tucia lota,
G. Arabici,
Tragacantha,
Opij, drach. 1.
Aqua pluvialis, q. s. Fiat Sief.

Trochisci è Minio corrodente,
Iohannis de Vigo, quibus fre-
quentissime Chirugi
vutuntur.

Rec. *Mecolla panis arudi, bene fermenta-
ta, drach. 4.*
Sublimaj electi, drach. 1.
Minij, drach. 1.
Aqua Rosæ q. s. Fiant Trochisci: facientur
calore tubani tepidi.

Sief, siue Gallyrrorum potius descriptio: non
est opus adungere, neque Pharmacopoei molestare,
quia Medici & Chirugi industrij, pro antiquo
affectionum & implicatorum morborum sibi
multo negotio, necessaria medicamenta conueniri
prouident: hæc tamen nesciunt Medicorum
& Chirurgorum vulgus.

Capitellum D. Io: de Vigo.

Rec. *Calcei vini optima, lib. 4.*
Aque feruidissima, q. s.
Fiat Liximum, Gallicè Capitellum)
Addendo Cineris Piceæ aut Pinastri, (vulgè
Potafcen, lib. 1.

Rec. *Huius Capitelli, lib. 4.*
Vitrioli Romani, drach. 8.
Coguntur in vase æneo ad duritiam salis, ad-
dendo sub finem in media parte Capitelli,
Opij in succo aut aqua Solani dissoluti, scr. 4.
Conferuntur in vase æneo rubro aut vitreo.

DE OLEIS.

Olea oportet habere, quæ ipsa citra aliam
mixtionem, vtilia sunt ad dolores, aspec-
tantes & alios multos affectus curandos. Pi-
xterea ex ipsis Cerata, Linimenta, Vaguenta,
Emplastra, & Irigaciones fiunt: quare de his
dicemus, de quæ his, quæ ex Oleis parantur.
Oleorum alia simplicia sunt, alia composita:
Simplicia, quæ nihil accipiunt a compositione,
piæter separationem, vel extractionem, vt
Oleum Oliuarum, Amygd. Nucum, ex sen-
sine Sinapi, Asini, Lini, & alijs seminibus simi-
libus, vel semine, vel fructu aliquo pingui.
Composita verò sunt, quæ ex Oliuarum ex-
presso oleo cum floribus, herbis, vel odoratis
parantur: Et hæc sunt, quæ in officina habere
debet Pharmacopoeia. Oleum Omphacinum
(vel eius loco paratum cum solijs oleæ) Olium
immixturæ paratur statim post collectionem.
Oleum antiquissimum, euadet si ex oliuis na-
tis loco saxoso, & ex octo, paratur post multi-
tos menses à collectione oliuarum: tale enim
acrescit, quale est antiquum: vel dia coquen-
dum, vt antiquo respondeat.

Oleum Sesaminum.

Oleum Sesaminum vile est in Sicilia, vbi
ingens copia nascitur Sesami, sed no-
bis charum: quare quæ ex Sesamo olea parantur,
ex oleo dulci esse debent, & maximè pingui &
crasso: quæ sunt olea, quæ in campetribus
locis, humidis, & feracibus terris, colliguntur:
Laurinum, Nardinum, Rutaceum, Mastichi-
num, Irinum, Chamæmelinum, Liliorum, de
Ablynet, Mastichinum, Leniscinum, Myr-
thinum, Omphacinum, Riolarum, & comple-
rum, de Cotoneis, de Menta, Violaceum, de
Euphorb, de Piperibus, de Papanera, de Man-
dragora, de Collo.

Quam mutilata, depravata & sensu obscura
sint hac de Oleis & Sesamino Oleo scripta; fides
& iudicium pones lectorem esto. Sic autem resti-
tuere visum fuit, ratione & verum cognatione
decente, clarioris doctrina ergo; salus tamen me-
liori iudicio.

Quæ ex Sesamo olea parantur dulcia & pingua
id est, vnguiosa sunt aut esse debent: qualia sunt
Olivarum expressa olea quæ in campestribus, hu-
midis, feracibus facundis in terris, colligun-
tur: cuiusmodi sunt Amigdalinum dulce, Papa-
verinum, Laurinum, Lentiscinum & huiusmodi
olea expressa: quemadmodum & siliitia ex Oli-
varum oleo dulci, Absinthites, & Meniba (ex
Sesamino autem Nardinum paratur) Anthi-
num, Rutaceum Irinum, Chamamelinum, Lilia-
ecum, Rosatum item Onychæites fluentis virenti-
busque Oliva ante Olivæ tempus collecta vti
Cydonites, Myrrhinum & Mastichinum: Rosä-
tum verò completum fuscantis maturæ, Oliva,
violaceum, Nympharinum, Mandragorites;
Costinum, ex Euphorbia & Piperibus. Viden-
tur tamen hæc calidiora olea consultius paranda
ex oleo Veteri, claro & tenui: media vero ex me-
die ætatis oleo, aut recentiori, vti frigida. Hæc
mones de Pharmacopæi nusi sibi personam non li-
beralitati additi, de sinu promiscuo ex oleis ran-
cidis omne genus olei compoñiti parare.

Ingenio quæso lectores candidi, si audientis
hæc mihi ita restauranda visa: quia sensum ne-
que constare, neque auctoris mentem exprime-
re videntur: quamvis malum propria edere, quam
aliqua obscura & mutilata documenta aut frag-
menti interrupta, scripta ex prælectionibus Ron-
dellæianis rapim sæpe collecta explanare: Simi-
litas hæc difficultatum sylva in Succedaneorum
reparationibus, mendarum ratione, quantum po-
tuit diligentiâ & fide restituta, me movit, ne hono-
ri dulcissimi perpe memoria præceptoris derogar-
etur, tanta immutatio mendosissima scripta, Imita-
tionis Rondellæiana verbo vti: honoris tamen
ergo, & quò scripsit nostris plus ponderis & au-
thoritatis accedat, unicuique quæ sanum est red-
dende, olus nomen supprime: non ingenuis foret,
ut aliqui tam Galli quam Germani aut Ang-
lii ante vernaculo pseudoscripserit, alienis ornati
penis, Aesopæa Cyrculæ modo fecerunt: quos
non in bonis loquere erubescere morbo: quando
integris alienis voluminibus, nostris quoque peregr-
inationibus, & enigmatibus laboribus, fastu præ-
mido: plausibilibus plectente, ignavisque, eodices
suos perverfos aut de latina lingua in vernaculam
euerfes, facere audent. Ingeniis verò fieri per
quos proficimus, perhinc actum est. De his satis
plura in Balsamo ex plantarum diximus.

Oleum Rosatum Omphacinum.

Hoc duplex est. Aliud rinde, quod Ompha-
cinum Ros. dicitur: aliud verò compo-
siti. Oleum rude ad refrigerandum & re-
pellendum conficitur ex oleo Omphacino, &
Rosis non expansis. Ratio parandi talis est.
Accipe eam quantitatem olei Omphacini, quæ
voles; In qua infunde Ros. parum contusa-
rum quantitatem ei respondentem. Pone in
vase vitreo, vel vitreato, & diligenter obtura.
Expone soli per dies vij. & quotidie volue vas,
ut vndiquaque ithealeat. Deinde leuiter de-
coque in duplici vase. Postea exprime, & illas
Rosas abijce, & secundo alias Rosas infunde,
& ut prius, repone in sole per vij. dies. Rut-
suis decoque, imponendo atque Rosatum, vel
infusionis Ros. q. f. Decoquatur leuiter, & re-
ponatur oleum, & vñi feruetur. Simile fieri
potest ex Rosis siccis, & aqua Ros. quod mag-
is constringit & non multo minus refrigerat,
& oleo abluto aqua aqua frigida, & cum suc-
co Palmæ, vel Cytoniorum, quod magis con-
stringet, & non multo minus refrigerabit.

* In regionibus frigidis Oleo Omphacino & basis.

Regiones quæ carent Oleo Omphacino, ad-
dere possunt Omphacium & Plantaginem, vel
succum Ros. in infusione Rosarum, vel itera-
tis infusionibus adstrictoriam vim oleo concil-
iare: aut tempore Vix acerbæ coquere in oleo
dulci quantitatem sufficientem prædictæ Vix
cum acinis ad strictionem.

De oleo rosato completo.

Oleum completum ex oleo dulci, & ma-
turo, & Rosis expansis, contusis, & soli
expositis, & leuiter decoctis in duplici vase,
ut Ros. Omphacinum componitur. Hoc ad
dolores conuenit. Post annum valet adhuc ad
confortationem & dolotis mitigationem. Om-
phacinum verò post annum iuuile est ad re-
frigerandum & repellendum. Quare pro com-
pleto, secundo & tertio anno usurpari potest.

De oleo Myrsillorum.

Oleum Myrsillorum, prope Rosaceum
Omphacinum rinde collocari debet. Re-
frigerat enim, repellit, & adstringit. Sic pa-
ratur.

Rec. Olei Omphacini, lib. 3.
Baccharum immaturum. Myrthi confectum lib. 2.

Aqua, lib. 2.*

Bulliant ad aquæ consumptionem, Si aqua decoctionis, vel aqua Myrthi apponatur, efficacius erit. Hoc Oleum parari debet hoc modo, ut præter quæ pollicetur, & possit refrigerare & repellere. Quare sine Vino, sed cum aqua decoctionis vel destillationis Myrthi parari debet. Succus ponitur vel decoctionis, utatur oleum coctione. Vinum autem apponendum non est, nisi forte tempore applicationis, necessitate exoptulante, ad penerationem. Non enim semper Vinum conuenit, vel Acetum: quare cum conuenit, addatur; nam parare cum vino, est medicamenti vim impedire.

* Minor quantitas sufficit, si decoquantur in vase duplici.

De oleo Cydoniorum.

Oleum Cydoniorum parare debemus, quia est efficax ad refrigerandum, repellendum & constringendum, & in quibus regionibus Myrtus non reperitur, hoc substitui potest. Paratur autem hoc modo.

Rec. Carnium Cydoniorum maturationis medix cum cortice, sed sine semine quia muceagineum habet: succi Cydoniorum ana partes æquales, Olei Omphacini q. s. reponantur in vase vitreo ad solem per 15. dies; deinde diutius coquantur, quàm Rosatum, & in duplici vase: celarium reponitur in usum. Quod si efficacius efficere volueris, abiectionis primis ponantur alia Cydonia, & rursus insola, incoque, ut prius, cum succo: Vel 40. dies insola, & coque minus. Igne Paulus non coquit, sed insolat per 40. dies. Sed cum hoc oleum paratur ex carne & succo Cydoniorum, quæ substantia est dura, melius est parare, ut prius. Melior est illa præparatio Mes. ut in sole macerentur prius, deinde decoquantur in duplici vase. Illud Diosc. non est parandum.

Omphacinum Pharmacopœi totius fere Europæ habet, & in antiquis scriptis.

De oleo Nymphae.

Oleum ex floribus Nymphae parari debet, quia est efficax ad refrigerandum, & constringendum, & Venereos impetus extinguendos. Paratur autem, ut Rosaceum, ex

Omphacino, in hunc modum,

Rec. Olei Omphac. lib. 3.

florum Nymphae albz, vici. 4. contundantur, macerentur, & in duplici vase leuiter coquantur, exprimantur, vsuque seruentur. Quia habet multum aqueæ substantiæ hoc Oleum, multum decoqui debet, vel flores per duos dies seruandi, ut marcescant aliquantulum, & tunc minus decoquere oportet, absumpta nimirum aquosa substantia.

De oleo Violaceo.

Oleum Violaceum parandum est Vere, ex floribus Viol. & oleo dulci, non antiquo, neque salito hoc modo.

Rec. Olei oliuarum maturar. lib. 2.

Viol recentium. vnc. 4. aut q. oleum ebibere potest.

Infundantur, & insolentur per dies 7. Postea bulliant leuiter, duplici vase, per horam. Hoc Oleum cum sit ex floribus, sufficit leuiter decoquere, ne longa coctione vis resoluatur: & Oleum calidius reddatur. Non sunt ponenda Violæ sicca in fine, quia nullius sunt efficaciar, nisi parum admodum exsiccentur. Magis enim ob humiditatem vsurpantur, quàm aliud. Refrigerant etiam magis recentes ob humiditatem, quàm sicca. Est enim aliquid in eis, quod linguam pungit, cum masticantur. Vtile est ad refrigerandum, & leniendum, dolores artrosos.

De oleo Liliorum.

Oleum Liliorum simplex, & compositum olim erat, ut ex Dioscoride videre est. Compositum habebat ex oleo, Myrrha, Calamo aromatico, Cardamomo. Olei inspissamentum seruabant, quo utebantur in afflicto ueruerum, ut veteri. Inspissamentum & faciem appellabant Magna illud, unde Barbari pro Magmate accipiunt faciem Olei de Lilio simp. quæ contrariam facultatem habet. Quare si quis præscribat faciem olei Liliorum, non faciem simplicem, sed compositam intelligere oportet. Cuius descriptionem apud Dioscoridem reperies. Simplex conficiebatur ex oleo Balaño, id est, ex oleo de semine, quod finem antiquis, & Balaño Myrep. vel Myrob. Plinio dicitur. Et quia illud oleum rarum est, erit parandum ex alio simili, ut oleo Amygdal. vel oleo dulci. Sed si ex oleo Amygd. fiat, efficacius erit, & ad sedandos dolores, & relaxandas partes frigore contrictas, & potissimum Vulux, & ad tere faciendum.

De Oleo Enulato.

Oleum Enulatum dispensari non debet, quia easdem vires habet, cum Irino. Quod si quis requirat, omni tempore & facillè parabitur ex radicibus contusis, & succo enulæ coctis, vt Irinum.

De Oleo Castorei.

EX Castoreo paratur oleum, quod omni tempore, & nullo negotio fieri potest. Sed quia in Apoplexia, caro, lethargo, & alijs capitis, & neruorum morbis est vtile, præstat paratum habere.

Rec. Olei antiquissimi lib. 1. Saniei Castoris, vel illius solidæ substantiæ, vnc. 1. leuiter decoquantur. In Castoreo reperitur sanies quædam ad instar Butyri rancidi liquefacti, quæ ob similitudinem, quam habet cum oleo, facillè miscetur. Ob id nulla decoctione eget, sed potius agitatione, & calefactione. Si verò substantia interna Castoris sicca sit reducenda est in pul. & leuiter calfacienda: ob substantiæ reuocitatem, & acrimoniam facillè oleum afficit. Noli saniei illius causam exortumque tradere, cum alijs locis diffusè & ex professo tradiderim.

Oleum de Euphorbio.

Hoc oleum facillè, & omni tempore paratur, & sufficit vel oleum Castorei, vel Euphorbij paratum habere. Paratur autem ex Euphorbio, oleo & vino. Cuius descriptio duplex est. Alia olei simpl. alia compositi. Sed simplex parandum. Nam compositum natura eum oleo de pipribus conuenit. Præterea vix parari potest ob defectum Struthij, quo caremus. Quare sufficit simplex, quod in huius modum parabimus.

Rec. Euphorb. albi & loti vnci. 1. Olei Keyrini, lib. 1. vini parum. Leuiter coquatur, vel potius incalasciat in balneo. Vini seruetur. Est enim tenuissimæ substantiæ, quæ, vt de Castoreo dictum est, facillè permiscetur.

Oleum de Costo Mes. siue Costimmo.

Rec. Costi amari, vnci. 2. Cinnamonis crassi, vnci. 1. Extrimitatum Samplici, vnci. 8.

Vini odoriferi q. s.

Olei anriqui, lib. 3.

Macerentur simul per tres dies, & leuiter coquantur ad consumptionem vini. Colla, & ului serua. Hoc omni tempore parari potest. Carere possumus, ne multitudine vasorum perturbemur.

Alii habent Olei Sesamini, lib. 3. Cerdus lib. 2. & Samplici vnci. 2. Oleum tamen vetus Amacium, aut Antiochianum non erit inutile, paratum ex f. q. Ameri aut Resmarini Coronarij floribus.

Oleum Mastichinum.

Omni tempore parari potest. Carere possumus. Sed quia frequenter eo vtuntur Medici, aliquam quantitatem præstat habere. Sic paratur.

Rec. Mastiches vnci. 3. Olei dulcis vnci. 2. vini optimi parum. Decoquatur leuiter. Paratur duobus modis apud Mes. cum oleo Ros. vel Sesamino. Et quia Mes. vsurpat ad ventriculi & iuncturarum corroboracionem & sedacionem dolorum, & ad apostemata dura; ob id illam priorem descriptionem apposuius, quod paramus ex oleo dulci, loco Sciam. Quod si quis velit magis constringere, oleum Ros. ol. Cydoniorum, vel Myrthilli. addere poterit. Sic paratum, vt diximus, magis ad dolores leniendos, & abcessus conuenit: nam Mastiche emollit, & contrahit, si prædictis credimus; quare magis emollit & concoquet, si cum oleo dulci, vel Sesamino paratur.

Fit hodie ex oleo vulgari Oliuarum, cum tamen vt scitè annotat Syluius, ex Resata, aut Omphacino; aut saltem late confici debeat in vase duplici; ad robur ventriculi & viscerum: At Rondelletij rationes non sunt contempnenda utilitati ad emolliendum & sedacionem dolorum, quando paratur ex oleo dulci; & parandi autem ratio Syluij optima est, quia nullo modo decoctionem sustinet Mastiche; inquit, Consumpto propemodum vino, decocto leuiter ex oleo Mastiche pertrita paulatim affundatur, continenter monendo, donec erit liquata & permixta: Coctione longiore exanimatur.

Qui Mastiches naturam norunt, nullo modo ignem ferre sciunt: igitur qui decoquendum ad vini consumptionem rubent, non experti sunt Mastichen ignis calore statim in grumos, coalescere, duri & separari ab oleo si coquatur aut diutius igni admoventur, vt Pix, in vnguentis Basilico; minimeq; ad formam præscripti medicamenti aut olei Mastichini ex aliam preparationem efficaciamq;

amq; peruenisse posse. Hac noscitur Medici, risui sunt honoris dignitatisq; contemptu & derogatione, ipsi Officinarum casulis : non secus ac ille qui visus in Pharmacopoli quodam Germanico lapide marmoreo ; profecto, inquit, ecce bonum Scammonium.

Oleum ē Mentha.

Oleum ē Mentha ex succo Mentha parari debet in fine Veris : tunc enim succi extrahi debent, & ad medicamentorum preparationem, & conseruationem. Diosc. colligendi tempus succorum esse vult, cum teneros emittere caules incipiunt, quia tunc plus succi habent, quam cum ad statum peruenerunt, magis coctum, & excrementitium ante caulis eruptionem. Paretur autem sic.

Rec. Foliorum Mentha viridum, & succi eiusdem ana. vnci. 4.

Olei Omphacini. lib. 3. reponantur in vase vitreo per 15. dies. Leuiter coquantur in duplici vase, ad succorum consumptionem. Facta eius expressione, vsui serua. Hoc Oleum alij ex Omphacino, alij ex dulci, alij ex anriquo parant : sed cum ad nauseas, vomitiones, ventriculi corroboracionem, & appetentiam excitandam vtimur ; Oleum Omphacinum magis conuenire videtur ad has actiones : adde quod antequam calidius est, quam oporteat ad vomitiones, quae magna ex parte solent ob bilis in ventriculo effusionem promoueri. Adde etiam quod a Mentha satis caloris habet, & minorem altringendi vim, quam vt vomitum compescere possit. Quod aliqui dicunt ad scirrhum ventriculi valere, stultum est putare scirrhum curari posse in ventriculo. Quod si quis ventriculi scirrhum curare velit, Oleum Maflichinum accipiat, quod ventrem roborat & emollit. Si maiorem emollitionem requiras, habes alia remedia ad id efficacissima. Nos igitur parabimus ex ol. Omphac. vel ex oleo loto aqua Rosarum, vel succo Cydoniorum : quia meliora exemplaria sic habent, & rationi magis conuenit hac lectio.

* Si autem bibulam iterare consultum, ad maiorem efficaciam.

Mentha ligenda Romana vocata, eximia suauitate odoris commendata : Danica cristatis foliorum oris vi sui uisus est, cordi, cerebro, & visceribus amica. Si desis sume aliam odoratiorem Romana Mentha varietatem, quarum meminimus in nostris Stirpium Illustrationibus excudēdie.

Oleum Absinthie.

Oleum de Absynthio eodeni ferē tempore parari debet, quo oleum ē Mentha, quia herba plus succi, minus acrimoniz habet Ex Absynthio Romano, paretur hoc modo.

Rec. Summiatium Absyn. Ro. iani, succi eiusdem ana. vnci. 4.

Olei Oliuarum completarum lib. 2. paretur, vt de Mentha dictum est.

Per Absynthium Romanum intelligere oportet Absynthium nostrum vulgare aprico loco collectum, suauioris odoris.

Oleum Nardinum.

Oleum Nardinum, verius oleum inspissatum, & vnguentum, anriquorum more, dicendum esset, quia ex multis odoratis paratur. Et quauis nullum oleum antiquorum inspissatum retineamus, hoc tamen parandum ad multas affectiones ventriculi, veteri, nervorum suademus. Sed huius descriptiones tres sunt apud Mel. Prima simplex est ex Spica, vnc. 3. Aquae & Vini, vnc. 2. f. Olei Sesamini, lib. 3. coctis & agitatis frequenter. Tertia descriptio est magis composita, quae, vt mihi videtur, magis parari videtur, quam secunda, quia minus est composita, & magis, quam prima. Secunda, quae hodie nostri vtuntur apud nos, haec est.

Rec. Spica Nardi, vnc. 3. Samplici, vnc. 2.

Xylo-aloes, vel eius loco, Sandali moschatelini, vel Citrini, Enulæ campanæ, Folij Indi, vel eius loco Galangæ, vel Calami aromatici, vel Spica, foliorum Lauri, Schenanthi, Cardamomi, ana. vnc. 1. f. Irrigentur aqua & vino permixtis, priusquam conterantur. Deinde adde olei communis pro Sesamino lib. 6. Coquantur leuiter & vsui serua. Huic si addas Moschi drach. f. pro tota quantitate substitui poterit pro Muschatelino. Tertia in hunc modum.

Mafsen.

Rec. Spica Nardi, vnc. 4. Stryacis rubr.

Caryophyl. ana. vnc. 3.

Nucis Moscæ, vnc. 5.

Olei Balsami, vel eius loco, de Spica vnc. 6.

Olei Sesami, vel communis dulcis, lib. 4. infundantur, agitentur, leuiter decoquantur. Hoc non paramus, quia oleo Balsamificamus : Sed oleum de Spica proportionem responderet tenuitati, & temperamento : quare conimodē

commode parari poterit. Hoc aliquando v-
fus sum cum maximo succellu.

Oleum Muscatelinum

Quia Muscatelinum recipitur in vnguento
Aragon, & frequenter vtuntur in affecti-
bus animum, & vter, vifum fuit huic loco de-
fcriptionem apponere, vt, videlicet, quantum
conueniat cum fupradicto in viribus, agnofci
poffit. A Mofcho Muscatelinum dictum eft
quibufdam. Qui dicunt à Galeno compo-
fitum fuffe: inep̃tē fcripferunt; nam Galen.
Mofchum non cognouit. Paratur non nifi à
duobus Pharmacopœis, & difficillimè. Nam
multa funt, quæ non reperiuntur in officinis,
nec componitur in omnibus officinis.

Rec. Olej, lib. 3.

Folij,
Spicæ Nardi,
Coth,
Mafliches, ana. vnc. i. f.
Styracis calaminæ,
Croci,
Myrrhæ,
Cinnamomi,
Calfix lignæ, ana. drach. 6.
Carpobalfami,
Caryophyllorum,
Bdellij, ana. drach. 4.
Mofchi, drach. 2.
a. Nucis Indicæ, drach. 2.

Hoc vnguentum eft corruptum & incer-
tum. Nam defcriptio, quæ in Luminari ma-
iori reperitur, habet lib. ol. 6. & ftatim addit ol.
lib. 3. quod fortitan erat legendum ob varietate
tem lecti. Habet & Bdellium, pro quo
duplum Myrrhæ, vel illam speciem Myrrhæ,
quæ concolor eft, lineas, & vngues non habet,
& Bdellij modo lentefer, ponere licet. Sed
quod fequitur, magis erat incertum: Nam
muscilag, vnc. 3. ponit. Alij, inquit Luminare,
dicunt muscilag, drach. 1. vel 2. Ego legendū
(Mofchi) hinc conijcereim, quod fecundum
eundem authorem Muscatelinum dictum fit,
a Mofcho, quem recipit: Sed cum duo fint
hodie Mofchi genera, Mufcus arboris, & b, a-
nimalis fanies vel caro odoratiflima, nec du-
bito aliquos in ea fententia efle, vt putent
Mofchum animalis ponendum: 1. quod si po-
natur, drach. 1. legendum eft, non vnc. 3. Ego
tamen puro Mufchum arborum efle iniicien-
dum, quia odoratus eft, & olim nūfcebatur
Balanum vnguento, & alijs, quæ vngendo
funt, ob vim inſpiffandi, quam habet, Velie

præterea accommodatumque acoporum con-
fectionibus, & eorum, quæ ad euaporationes
conceduntur a Dioſc. lib. 1. cap. 20. c. Nucem
Indicam ponendam efle omnes Arabicæ lin-
guæ interpretes dicunt. Quamquam aliqui
putauerunt hoc oleum Balanum efle: Quare
non Nucem Indicam, fed Balanum myrteſi-
cam, id eft, glandem, quam nunc vocant ſemen
Ben, accipiendū, & fic efle Balanum Muſte-
linum, ad differentiam ſimplicis olei, quod
Muſcum non recipit. Nos inde colligimus,
duo fuiffe parata genera, quod oleum Balani-
num Dioſcor. Mofchum non recipiat, tamen
cap. de Mofcho recipi ſcribit, vel oleum Bala-
ninum Dioſcorid. eft corruptum: Quare libe-
rum erit, vel Balan. Myrteſie, oleum addere,
vel d. Nucis Indicæ, ſunt enim euſdem ſacu-
latis.

a. *Nucis Indicæ numero duas habent aliqui
ex Nicol. Præpoſiti quatuor deſcribit, in dupli-
catie ponderibus huius Olei: idq; vt conſecra li-
cet adoleum exprimendum.*

b. *Animalis fanies Mofchus dicitur: &
arborum vultu Mufcus.*

c. *Mufcus igitur arborum huius Oleo adden-
dus videtur, idq; pondere vnius aut ſeqſus vnciæ,
qua non carè venditur.*

d. *Vel Caryinum Oleum, quod eandem vim
quam Balaninum habere Dioſcorides teſtatur.*

L'Obel.

*Muscelinum Oleum: Oleum de Ben Ni-
colao in additionibus vnguenti Aragon
votatum.*

perſectis & perpetuis omnibus ambiguis &
confulis opinionum ſcopis diſſolutis de O-
leo Muſcelino, quibufdam a Nuce Mofcha-
ta pro India; aut a Muſco vocato; hand du-
bie plurima rationi contentanea & verifiſima
ſeſe nobis ptodunt & fidem faciunt Rondel-
letij ſententiam de Muſco in Oleo Muſcelino
a Nicolao Alexandrino & Præpoſito deſcrip-
to, nomen a Muſco Græcorum ſine Viſita A-
rabum adeptum; qua in Gloſſa, notanda ait,
"Muſcelinum oleum dupliciter poſſe intelligi:
"vel Muſcelinum, quod in ſui receptione, ſe-
"cipit Muſcum; vt hic: vel quod fit ex Ben,
"quod Arabibus vocatur Muſcelina; & tale
"Oleum ſimiliter vocatur Balaninum. Hinc
patet Muſcelinum Oleum ab Arabibus ante
Nicolauum vtrumque; imitatione fortè Græ-
corum Oleum inuentum & deſcriptum fuiffe:
Nam

L'Obel.

Nam prima diuersorum odoratorum & aromatum Gyzconum parata facilius mistura, addito oleo ad vngenda corpora, cum deliciarum, luxuriæ, voluptatis, Pigmentorumque conciliandi faciei nitoris ergo, (sicut Chrysa palæstris, gymnasticæ & adolescentum prædæribus dictum:) tum valetudini, aut medendi, de functionumque causa inuenta, composita fuit ex Balanin. oleo & Musco odorato, quæ Dioscorides & Græci *Bryon* vocant, Plinio etiam auctore. Dioscorides eius decoctum insidentium vltius vtile; vnguento Balanino, olei; insipissandi gratia inferi tradit, & thymiamatū, acoporumque compositionibus conueniens. Monspeliensibus itidem hodiernis seplafarijs & pigmentarijs hic Muscus, siue Vinea (quia faciliè a prissimæque odoribus imbuatur & perinde ac oleum Balaninum a suffitoribus & vnguentarijs maxinè expeditur, excipiendorum, inscindiendumque odoramentorum dote commendatur,) frequentissimo in vsu est ad delicias commendatissimi per Gallias notissimi suauissimi Cyprij pulueris vocati, Facultates arboreo Musco assignatæ, Oleo Muscelino ascriptis viribus non refragantur: neruoso generi, laxatis articulis aspergendi vi prodest: Eius decocto ex conuenienti liquore, vino aut Rosacea; pro ratione partis affectæ, fouentur incipientes tumores, defluxionesque miro sælicque successu, quas discentiunt, & arcendo, roborandoque reprimunt, Medici cuiusdam experientis, qui hoc tanquam arcanum recondibat.

Huius Muscelini olej permultæ sunt componendi rationes, lectiones, & mensurarum varietates. Quidam Nuces Indicas duas legunt: alij drach. 2. Alij Nuces Moschatas duas iniiciendas esse contendunt: Alij Moschi, drach. 1. Alij vnc. 1. Alij drach. 6. & alij dr. 3. Sic alij alij, sed sua cuique placenti.

Si quis addiderit Nucis Indicæ Oleum, non peccabit: quia supplere vicei Olej Balanini aut ex Ben opinor, & Caryino ipsidem viribus Dioscoride teste prædito præferendum.

Hoc oleum, hac lege, minori sumptu a Pharmacopæis parabitur: & peculiariter, Medici iussi, portiuncula olej, aliquot grana, plus minus, Moschi, vel Galliam Moschatam, in vitro ascensu & suffocatione addere licebit, si consuetum viderur.

Moschus ille saniosus, quamuis eximio quem spirat odore, vt nonnulla odoramenta, cor & spiritus reficiat: non tamen omnibus mulieribus conuenire, experientia quotidiana docet, nam plures videas etiam quæ honestissimas virgines, tantilla leuissimaque Moschi au-

ra, vteri suffocatione aut ascensu corripit: eoque sæpe coactas leuipedes amatos istos Moschatos, armarosque aduersus sædi virosque, Sancti Chrysmis odoris è Mercurio lvi Veneræ dicari rædia, excludere; eoque Moschum, canepicus & angue odio habere.

Athleticus certaminibus valetudini consulentes Prisci vincta nuda corpora acopis linij, inenris, spiramenta cutis reterantibus, tobacco autibus odoramentis insipissatis, qualia esse solebant Nardina, Amaracina, Sampsucina, Balanina & Muscara spissamenta, & hodie Muscelinum oleum. In huiusmodi exercitijs, liberaliter ob frequentem vsum profundebantur hæc spissamenta, quodmodum hodie nostrum Pomatum vocatum, sæminino generi commendatissimum eximie odoris fragrantia, quo vtuntur voluptatis gratia ad faciem decus & splendorem, peccatoris & manuum nitoreni. Hoc quidem Pomatum vnguentum cum suauissimum sit, valde excipendis Moscho et Ambatu accommodatum est: quæ alioqui nullum penè fragrant odorem, rudioribus osticinatum illotis, tancidis oleis, aut vnguentis eomniuxta. Hæc summam de Oleis dicta.

Cyprii Spissamentum Dioscoridis eadem paucis additis præstabit quæ Muscelinum oleum, quoniam admodum et antiquorum nonnulla Nardina quorum vsus exoleuit, negligentia et rerum ignoratione: pauci namque in Dioscoridea, Pliniana et priscorum Græcorum lectione versati; quorum tamen admiranda est diligentia, a quibus onurino nostra fordide avara ætas degenerauit: Tanto enim nitore, tantaque diligentia et fidelitate parabant oleorum Spissamenta, vt non solum externis remedijs, verum etiam intra corpus assumendis, accommodata essent. Nostri hodie plerumque seplafarij adeo negligenter, sine vlla ablutione nulloque olej delectu, Olea, Vnguenta, Cera et Emplastra parant, (opeimorum Medicorum et Chirurgorum tedio) affectis et lauciatibus pro medicamine necem iniustam et inopetantem sæpe adferant: frigidum pro calido, et calidum pro frigido exhibentes: vnde ex leuissimo malo, inueniuntur fit; et ex fauilla incendium ingens. Priscorum autem Græcorum Hippocratis et aliorum literarum limpidissimorum fontes et ritus multisaridè inuitati sunt et seruatur Arabes: nulla tamen linguarum ignoratione et vocum barbarie deprauatum, est magnam laudem metiti, quia plurimarum indigenarum Pantarum, earundemque partium, vsus nos docuerunt agrotantium commodo.

a. Primæ nobilitati. Brion Cedriū Dioscori.

Lib. 13.
cap. 1.a. Musci
delictus.

Cucumeris agrestis, quæ à Græcis, unde Sicyonium dictum est, Duplex est, simplex, & compositum. Simplex ex Elætorio, vel radic. Cucumeris agrestis fiebat, ut ex Paulo cap. 77. lib. 3. colligere licet, & lib. 7. cap. 30. rationem componendi sic docet.

Rec. Cucumeris agrestis radic. refrigeratam, 1^o drach. 2. pondere. In oleæ tartarium Italicum mittitur, atque in lebere coquitur, fitque Sicyonium. Hic radic. refrigeratam vocant siccantam, vel conservatam post eius collectionem, ut humiditas absorpta sit. Sic loquitur Dioscor. aliquando, nisi quis velit dicere, refrigeratam, emortuam, cum è terra prodita sit calore nativo, qui sensim emoritur. Sed melior est prior interpretatio. Hæc parari potest, quia facile componitur. Compositum ol. descriptum est, & à Gal. & à Dioscor. & à Paulo. Sed illa Dioscor. corrupta est. Nam in vulgaris exemplaribus, ol. album est Sicyonium, & Sicyonium est album, quantum viribus differant, & facultate multum.

* Vñc. 2. legendum puta.

* Lib 70.

Oleum è Frumento.

AD impetigines, & cutis affectiones paratur, & quidem omni tempore, nullo negotio. Ob id servandum: minime censeo, quia paratu est facile, & morbi, quibus accommodatur, non sunt acuti: Quare per otium parabitur, idque variis modis. Nam alii superponant Triticum laminis ferreis ignitis, & alia superposita assant, & inde destillens oleum excipiant. Alii exortocatum in alembico distillant, oleumque extrahunt mulo igne. Alii per descensum, ut ex Junipero, extrahunt. Illud efficacius est, quo vter ad impetigines, & morphæas, in ruticæ & minus delicatis. Est magis oleis quam alio modo paratum.

Oleum è Junipero.

Rondel.

NON solum ad animalium morbos, sed ad hominum conducit: quare semper paratum inveniat. Rustici etiam illud parant per descensum: Dissolvunt in frusta lignum, quocumque calore assatur, & effuscat oleum. In vas clausum laminæ ferreæ imponunt, perforatâ cribri modo, ut per illa foramina ol. descendat: cui oppositum vas iungunt, & vterius collocant, in terra fodunt, & ignem circa vas superimponunt, ut tantum calefcat superius, non inferius. Alii supra menses lapideam ponunt vas illud, in quo sunt ramena lini, ut per collum longum in vas aliud sub

mensa positum defluat; hæcque ratione minus crassum & siccum est, & boniam morbis melius est, & magis accommodatum.

Oleum Philosophorum.

Rondel.

OLEUM Philosophorum, vel ex lateribus, quod quod ex lateribus in oleo maceratis extrahitur per alchimistas, qui Philosophorum nomen sibi turpius, & falso arrogat, istud semper paratur. Ab oleo acis, ut summo non differit, nisi quod subtilitate, partium tenuitatem acquiras, & colligat eum lateribus aliquam secunda vim. Quare paratiss. & (2.) ligamentorum laxationi magis convenit, quam in alia causa, ne quis pollicitationibus alchimistarum decipiat, qui plurapossidentur, quâ n. present. Illud paratum habere non oportet, quia semper parari potest, nec eo frequentius vitiumus; Chymistæ tamen quosdam abutuntur.

(1) Melierent, litatibus & Chymistæ, ad intestini ramum frequentissime & tuitur.

Oleum Quorum.

Rondel.

EX Ononem vitellis induratis multum fixis in sartagine, efficacissimum oleum paratur ad maligna ulcera, & vicinos dolores ab ulcere. Quod tamen paratum habere non oportet. Est enim ex eorum numero; quibus frequenter non vitiumus, & quod semper parari potest. Paratur autem multis modis. Vel vitellis induratis in ossis congelati prælo exprimuntur, ut amygdale, unde efficitur oleum, vel in alembico sic dicto distillantur, ut lateres, ad oleum philosophorum parandum. Nihil enim est, à quo distillatione oleum non extrahant, si sit pingue.

Si nimis torrentur in sartagine vitella, oleum multò minus amicum est, sine dolore aufert.

Oleum è Myrrha.

Rondel.

EX myrrha oleum extrahitur, quod vitiumus loco Stalæ in Thierica, & alijs nobilibus aridois, in quibus Stalæ, id est, myrrha liquida desideratur: Nam Syrrax nostra non est illa, quæ à Serapione describitur, quæ eadem est cum Dioscoridis Stalæ. Extrahitur distillatione & subtilitate communi, sed siccitudo. Odoratum, si per aquam distilletur, sed melius cura assationis sic paratur. Incenduntur una, & in duas partes dividuntur: eam, extrahit vitella, Myrrhæ replentur,

Pleatur, & supra difcuffum difponatur, fic ut in yrradi difcuffum tangat, & cui albumine tegatur indurato. Difcuffus huiusmodi in loco fubterraneo ponatur & declinè collocetur, ut ol. quod refudat, in vas aliud infuat: quod collectum vfu ferveatur. Nobile empyrenmatus habet: fed maiore & frigida in Scattem refolvitur, quo tanquam fuffo oleo, fricari poffunt vafa, & omnia inftrumenta, quibus Theriaca parantur.

De Oleis factis per diffillationem.

Novam rationem excogitarunt neoterici extrahendi olej ex herbis, feminibus, lignis & gummi. Oleum fervat odorem rerum, ex quibus extractum eft, & fragrantius expirat, ut olej Anifo, vel Menta, vel Thymo, vel Salvia, adeo redolet, ut fi in aliquo loco fervetur, totam domum impleat odore. Sed quia illa olea parantur magna impensa, funt etiam efficaciora, quam quæ aliquibus corporibus adhiberi debeant. Relinquo illa diutibus, hisq; qui huiusmodi rebus delectantur. Quare hæc de oleis fufficiant, si tantum addidero de omni medulla feminum poffe extrahi oleum, ut ex Amygd. ex semine Pap. Hyofcyami, Cucurbitæ, Melonum, Cierulli, & Lactucæ, Pinearum, Nucibus, Balano myreplica, ex Fisticis alijsq; fructibus. Hæc olea non debent parata fervari, quia rancida fiunt, & humiditatem amittunt, calidiora redduntur: sed fufficit habere extrahendi rationem, ut ex recentioribus vi poffimus, cum opus fuerit.

De CERATIS.

Cerata à Cera nomen habent, quia ex cera & oleo conficiuntur. Pauca in officinis parata habenda, quia omni tempore & citò parari poffunt ex oleo aliquo & cera. Videntur autè effe media inter Vnguenta & Emplastra. Ex illis alia funt verè Cerata: alia minus propriè dicta: tamen à fimilitudine aliqua Cerata dicuntur, quæ herbas & alia præter ceram & oleum recipiunt: ut illa, quæ hodie retinentur in officinis: Ceratum Santalinum, Stomachicum, de Oesippo, de pelle Arietina, Infrigidans Gal. & Emplastrum mollià à consistentia: Nam ut vera cerata vnguenta dicuntur, fic contrà: Sic impropriè appellatur Ceratum album Gal. quod ab antiquis, vnguenti nomine dicitur. Talia enim oportet effe Emplastra viscerum, ut hepatis, lienis, & ventriculi. Si enim dura effent, dilatationem ventris, & ex consequenti refpirationem læderent: ob id Cetata dicuntur, quæ ad hernias, & scythum

hepatis, lienisque curandum valent, ut illud Andromachi, Stomachicum Gal. & Cerata Thesi. Nos verò de his agemus, quæ necessaria funt ad morborum curationem, & consuetata. Quædam verò eorum parata habere oportet, ut quæ antiquitate faciliorem non amittunt, sed eam fervant, ut ea quæ calida funt, ut est Stomachicum Gal. vel quæ certò tantum anni tempore parari poffunt, ut Oesippi, vel quæ difficilius parantur, quæ per otium parare oportet. Alia parata non fervanda, aut pauca quantitate, ut album Gal. Vel si paratum fit, aqua frigida innouandum, & ablucendum, & refrigerandum est.

Ceratum album Gal. sine refrigerans.

Rec. Ol. Ros. vnc. 3. vel 4.
Cera alba, vnc. 1.

Descriptio est apud Sylium & Fuschium. Liquefcent in duplici vase, & postquam refrigeratum fuerit, infunde aq. frigidissimè tantum, quantum recipere poteris, semper miscendo. Postea immittatur in vas plenum aqua frigidissima, ut magis refrigeretur, & in frigidiori loco domus fervandum. Aqua sit pluvia, vel fluvij, vel fontium, tenuium partium, & frigidissima est imponenda. Aceti parum addendum, si altius, & citius refrigerare velis. Melius est enim tempore inunctionis addere. Sine Aceto autem parari debet, ut si parti non conveniat Acetum, ea de causa vnguentum non rejiciatur, ut in doloribus vteri & pectoris, alijsque similibus.

Ceratum Santalinum Mesue.

Dicitur Santalinum, quia etiam Santalorum genera continet. Valet ad refrigerandum, siccandum, & constringendum, ad fluxum sanguinis & alia: quare paratum habere oportet, quia est in frequenti usu, neque citò paratur, fit autem in hunc modum.

Rec. Ros. rubr. drach. 12.
Santal. rubr. drach. 10. vel 11.

Santalorum alborum, vel citrinorum, ana. drach. 6.

Boli Armeni præparati, drach. 7.

Anisodij ex osse Elephantis, vel Myrrho, vel Cydoneis, drach. 4.

Camphoræ, drach. 2.

Cera alba drach. 30. alijs triginta, Ol. Ros. omphacini lib. 1. liquefat Cera in Oleo: Deinde omnia tenuissimè pulverisata infundantur, ut artis est, fiat ceratum. Sunt ta-

men qui imperant, ceram & ol. lauari. Quod non est faciendum, nisi cum oleum antiquum est, vel cera alba non est, sed citrina. Tunc enim ablueret poteris, vel postquam cera liquata est & oleum, aqua frigida oportet ablueret, & frequenter aquam mutare. Sed non post cerati compositionem, propterea quod tenuior pars puluerum, abluione aufertur. Hoc cerato abutuntur plerique hodie, cum in febribus ab obstructione præstibunt, cum vim obstruendi, & densandi habeat.

Ceratum Oesipi seu Oesipatum Galeni.

Multæ sunt huius Cerati descriptiones apud Mesuem, quæ ad viscera indurata emollienda parantur, ut quæ acopa etiam esse possunt. Vnum ad Phlegmum refertur, aliud ad Paulum, aliud ad Galenum. Sed quia ceratum Phylagrij & Pauli Bdellium desiderant, quo caremus, ob id mihi videtur illud Galeno ascriptum dispensandum. Dicitur autem ceratum Gal. à Mes. quod recipit sequentia.

Rec. Cere novæ flauæ, vnc. 3.

Ol. Chamaemeli, Irini, ana. vnci. 6.

Mastiche, vnc. 1.

Spicæ Nardi, drach. 2. f.

Croci, drach. 1. f.

Terebinthinæ Abietis, vnc. 1.

Resinæ, vnc. f.

Oesipi, drach. 80. misce, fiat Ceratum. Si quis fortius velit facere, ad emolliendos tumores duros, addat Ammoniaci, vnc. 1. Styraçis vnc. 1. tumque pistabit quæcunque pollicentur alia Pauli & Phylagrij cerata.

2. *Ceratum à pelle Arietina Arnoldi de Villa-nova, ex 2. cap. de Crepaura.*

Ceratum hoc ab aliquibus Emplastrum dicitur, atque inter Emplastra reponitur, diciturque impropiè Ceratum, quia non habet Ceram. Sed id nomen habet, quia mollius esse debet emplastro, ut mollius partibus accommodetur.

2. *Ceratum à pelle Arietina & Emplastrum à Stella marina descripta sunt proximi Emplastris contra Rupturam ad calcem operis.*

Emplastrum à Crusta Panis Montagnana molle Ceratum verius dici potest, addita Cera alba, quo utuntur Practici ad vomitum.

Rec. Olii Masticchini, Cydonitis, ana. vnc. 1.

Crusta Panis tosta & macerata in Aceto (vinum stomachicum addendum suaderem me.) contusa & cribrata, vnc. 2.

Pulueri Mentha, Mastiche, Cerati albi & rubri, Samali albi & rubri, Spodij, ana. drach. 1. Farina Hordei, q. s. fiat Emplastrum.

Ceratum stomachicum Gal. à Mes. vocatum.

A Stomacho, vel potius ventriculo, cui accommodatur, dicitur, quod Mesue Galeno ascribit, quanquam nunquam tale dedit, forte est compositio illius Cerati, cuius meminit lib. 8. methodi.

Rec. Ros. rub. Mastiche, ana. drach. 20.

Foliorum Absynthij siccorum, drach. 1. f.

Spicæ Nardi, drach. 10.

Cere mundæ albæ, vnc. 4.

Ol. Ros. lib. 1. f. Cera liqueat in Ol. & refrigerata lauetur frequenter; primùm aqua Ros. deinde Vino veteri austero, & succo Cytoniorum, rursus pauco Aceto. Postmodò omnia tenuissimè trita misceantur, & fiat ceratum. Peti Stomachum autem totum ventriculum nostri intelligunt, cum veteres pro gula acceperint. Illud modicè calcascit, & coultin-git: vnde frequentissimè usurpatur in oris ventriculi relaxatione, vomitione, & cruditate.

Ceratum Diapente Mes.

Sic appellatur à numero quinario. Constat enim quinque rebus, excepta Cera, quæ materiz rationem habent. Valet ad emolli-nem tumorem durum, ad convulsionem, vel spasmus nervorum. Illud autem paratum habere non oportet. Sed sufficit eius descrip-tionem habere, ut si quando sit parandum, fa-cilius inueniatur parandi ratio.

Rec. Cere flauæ, vnc. 3.

Styracis liquidæ, drach. 3.

Terebinthinæ abietinæ, vnc. 1.

Mucilaginis Ichthyocollæ,

Gummi Hedera, ana. vnc. f.

Ol. Irini q. s.

In quibusdà exemplaribus legebatur (mucilaginis Ichthyocollæ, vel gummi Hedera) sed puto vtrumque esse legendum: quia gummi Hedera, & si intus lædat nervos, extra tamen iuvat, & glutem etiam sua facultate emplastica iuvat coctionem, seruando calorem in parte; quare vtrumque ponendum censemus.

Castigauimus etiam quod dicebatur (gummi Hedera vel Ichthyocollæ, ol. Irini q. s.) Nam

illud (q. l.) cum duobus prioribus non conuenit, sed cum ol. tantum, quod ad excipendum ponitur: sed aliorum duorum vnc. l. posuimus, vt ordo indicabit. Efficacissimum est vnguentum illud ad iuncturarum tensiones, & durorum tumorum emolliationes. Hæc duo Cerata præcedunt Ceratum Oesifi.

DE VNGVENTIS.

Vnguenta non longè à Ceratis collocari debent, quia non multum differunt, & ob magnam similitudinem sæpe confunduntur, & sunt veluti media inter Cerata, & Emplastra. Vnguenta parari debent, & parata in officinis haberi, ob frequentem & multum eorum usum; tum quia certa anni parte tantum commodè possunt parari, nec in omni loco. Multa tamen sunt in officinis parata, quæ similia sunt, quibus carete possumus: Sed quæ frequentiori vsu, haberi debet, vt quatuor vnguenta calida, quæ primo ponenda sunt, ob multiplicem eorum usum. Vnguenta hic vocamus more vulgi, non, vt antiqui, odorata illa, de quibus Diosc. multa primo libro. Hæc sunt, quæ parata habere oportet in officinis: Martiatum, Aragon, Dialthea, Agrippæ, Resumpleuum, Basilicum, Populeum, Aureum, Apostolorum, Egyptacum, Album Rhafis, Nutritum, Citrinum, de Ceruisa, Desiccatum rubrum.

De Vnguento Martiato.

Pro vnguentum Martiatum vulgo dictum, quanius non desint, qui Martiatum velint appellari. Actius & Nicolaus Martiatum vocant; ob id retinebimus vulgarem, & consuetam appellationem, tum etiam ob Pharmacopæorum insitiam. Alij ab inuentore, alijs à Martio mense dictum volunt, quod eo tempore in regionibus calidis parari debeat, propterea quod herbarum incipiunt erumpere. Alij autem à Marte, quod hoc vnguentum ad Martem bellorum Deum referant antiqui. Constat enim ex rebus omnibus, quæ ad ferum valent, ita vt Vnguentum Syderites appellari possit. Sed quocumque modo dicatur, vel à quo inuentum sit, parum refert, modo res sit parata. Recipit multas herbas efficacissimas; & medicamentum est ad vulnera & vlcera, quæ cum frigidityte sunt, vel in loco frigido, vel in lassitudine & dolore partium detegit accommodatum, valet. Vsurpatur non solum ad hominum morbos, sed brutorum ani-

malium affectus, vt equorum, mulo rum. Dui vero dubitauit, quam descriptionem illi hoc loco apponemus; an vulgarem, in Nicolai Alexandrini, vel aliorum Græcorum, quæ omnes inter se diuersæ sunt, tum in ponderibus, tum in simplicibus, Tandem visa est illa Nicolai Alexandrini minus vitata, quæ est eiusmodi, in Nicolai Præpositi exemplaribus.

Rec.

Cera alba, lib. 2.
Olij, lib. 8.
Roris Marini,
Fol. Lauri, ana. vnc. 8.
Rutæ, vnc. 7.
Tamatis, vnc. 6.
Elbrij,
Ebuli,
Sabinae,
Balsamitæ,
Lelispbaji, id est, Saluæ,
Ocymij,
Polij montani,
Calaminthæ,
Arthemisæ,
Emulæ,
Betonice,
Branchie Vesinæ,
Spargulæ minoris,
Herbæ Venti, id est, Parietariæ,
Pimpinellæ,
Agrimonis,
Absynthij,
Herbæ Paralysis,
Herbæ Sanctæ Mariæ,
Cymarum Sambuci,
Herbæ Crassulæ, id est, Fabæ
grossæ,
Millesolij,
Semperuiui,
Chamedrysos,
Centaurij minoris,
Foliorum Fragulæ,
Quinquefolij,
Herbæ Tetrabit, id est, Iudicæ
ana. vnc. 4. f.
Radic. Altheæ,
Cimini Myrthi,
ana. vnc. 3.
Foenugr. vnc. 1. f.
Butyri recentis, vnc. 1. & drach. 2.
Viticæ,
Violæ albæ,
Papaueris rubri,
Menthæ Saracenicæ, & aliterius Menthe.
Lapatioli,

Polytici,

Polytrici,
Cardui benedicti, quem Carduum
Cœli vocant,
Antyllis, quam Yuam Moscatam vo-
cant,
Oxytriphylli, qui Panis Cuculi vel
Aleluya dicitur,
Crispula,
Camphorata, non Camphora,
Medulla Ceruinæ,
Morellæ, ana. vnci. f.
Adipis Vrsi,
Gallinarum,
Mastiches, ana. vnci. i.
Thuris, vnci. f.
Olij Nardini, vnci. 2. non ut alij ha-
bent, drach. 2.

Quid enim possunt ad tantam quantitatem
alterius Olei, & tantam herbarum congeriem?

a *Herbae in Althea scribuntur explicatur.*
b *Cumam Myrtili.*

*Vnguentum Martiarum magnum Descriptio-
nis Nicolai Alexandrini.*

Rec. Cera albæ, lib. 10.
Ol. communis sextarios 6. id est, lib.
9. vel lib. 7. f.

Rosimarini,
Fol. Lauri, ana. lib. 2. f.
Amarici, id est, Sampsuci, lib. 2.
Esbrij, alias Ebuli,
Sabinæ,
Balsamicæ,
Ocyri,
Eleisphagi, id est, Saluæ,
Polij,
Calaminthæ,
Arthemisæ,
Enulæ,
Betonicæ,
Brachæ vrsinæ,
Herbæ veni,
Pimpinellæ,
Agrimoniæ,
Absinthij,
Herbæ paralyseos,
Herbæ Sanctæ Mariæ,
Cimacum Sambuci,
Herbæ Crassulæ,
Semperui,
Millefolij,
Chamedryos,
Centaurei minoris,

Centum neruæ,
Rubi Indici, aut Phragaræ, ex sen-
tentia Cronbrugeosii,
Fragulæ, Quinque folij,
Herbæ Iudicæ, ana. lib. 1. f.
Radic. Altheæ,
Cinimi, ² *Alij melius legunt Cy-*
Myrtæ, ana. lib. 1. *marum Myrti-*
Fornugæ, lib. f.
Butyri, vnci. 5.
Vrisæ,
Violarum,
Papauer. rubr.
Menthæ Saracenicæ, &
Menthæ communis,
Lapathioli,
Polytrici,
Cardunceli,
Matris syluæ,
Marathri,
Yux Moschatæ,
Aleluya,
Lingue ceruinæ,
Crispula,
Camphorata,
Styracis,
Medulla Ceruinæ,
Adipis Vrsi,
Adipis Gallinacei, ana. vnci. 3.
Thuris, vnci. 2.
Ol. Nardini, vnci. 2. alias vnci. 1.

Herbæ omnes colligantur, quando ad in-
crementum venerunt, ut apud nos principio
Maij, b & hoc vno aut duobus diebus, post-
quam sol radiauerit, & vsque ad meridiem, non
postea. Diuidantur in partes paruas, & in vino
generoso rubro infundantur, per 7. dies in lo-
co calido, & moueantur semel in die. Octauo
die decoquantur lento igne in balneo feræ ad
consumptionem vini. Tunc ol. commune an-
tiquum adde: paulo post butyrum cum arun-
gijs, & medulla: deinde cola, & abiectionibus her-
bis, adde collaturæ Ceram, & liquefacto: de-
inde & Styracem cum oleo Nardino, & pul-
uer. Thuris & Mastiches. Sic omnia confun-
dantur, & feruentur vsui. Hac ratione effica-
cissimum vnguentum acopum comparabitur:
nam: si alio modo pararetur, Styrax recederet.
Oleum Nardinum vires amittit, & Thus &
Mastiche. Sextarius hic pendet vnci. 1. sinam
mensuralis, octodecim continet. Amaracum
in Alexandrino legitur: & Sampsucum, siue
Maioiranam interpretati sumus: nam Parthe-
nium in causa fuit, quod Maioirana scopis
magis conuenit: Factum est hoc vnguentum
ad tumores discutiendos, durities, ad articu-
lorum

lorum dolores? Est enim, ut breuiter dicam, scopum, quibus omnibus magis conuenit Maiorana: nam, ut Dioscor. docet, scopis malagmaticisq; calliaciendi gratia adhiectur. Paulus autem eluxaris tumoribus conuenire scribit: Augere suspicionem, quod Amaracum iniicere in Alex. legitur: quanquam in vulgaris exemplaribus, ite Luminari maiore (Samp-sucum) ponit: quod facit, ut audacius Samp-sucum verterimus: Est enim nomen vagum, & commune Samp-suco, & Parthenio. In Nicolo non legitur (Tamariscum) Luminare malus (Samp-sucum Tamariscum) ponit: nos verò, quia Nicolai Alexandrini lectio praelegimus, nolimus addere, neque Rutam, quamquam in Luminari hispanico legatur, et conuenire possit: non enim propoliticum est omnes herbas, atque omnia medicamenta a-copa hic congregare, sed aliqua, quae auctori magis fuerint grata. Esbrion vario modo interpretati sunt: alij Maioranam ferunt volu- sed quid sit Esbrion, apud Arab. nescio: neque Saluia ponenda, neque Maiorana, nam Eleisphacos, id est, Saluia, ponitur postea, & Maiorana, nomine Amaraci, posita est. quare puto mendum esse in lectione, vel in interpretatione. Quam cum melioribus exemplaribus lego (Ebuli.) Nam Græcus codex legit Ebuli nomine latino, ut sæpe alijs vitur. Esbrion si Saluia significet, non debebat ponere Eleisphacon esse Saluiam syluestrem, quæ est Verbasco syluestre Diosc. Sed Græcus codex ornem hanc dubitandi occasionem aufert, scribens (salua) pro (salua) nomine latino, ut qui frequenter vitur alijs. In hoc vnguento castigauimus, quæ sequuntur: & ne hoc ci- tra rationem quis factum esse putet, rationes subiungemus: Quod autem possumus id facilius monstrare, scopum vel utilitatem, vel usum huius vnguenti proponemus, cuius causa hæc electa fuerunt medicamenta ad id efficiendum. Primum igitur vnguentum hoc ad callu- tionem paratur, ad dolores podagricos, ad paraly- ses, ad tumores, ad vlcera. Quod si sita sit, medicamenta calida & sicca, quæ vim habent digerendi, esse oportet. Primum legitur in ex- plari Nic. Præpositi vnc. 7. Rutæ pro dr. 7. Ru- tæq; quod efficax sit, in maiori quantitate po- neretur. Ordo etiã hoc ostendit: primum fol. Lauri, vnci. 8. deinde Rutæ vnci. 7. & postea Tamarisci, vnci. 6, sic in aliquo manu scripto leguntur: Nec valet, quod possumus dicere, qui omnia errata aucthorum volumus excusare, quod calida sit multum. Nam Rosmarinus & Lau- rus non minus calfaciunt, & ponuntur in ma- iori quantitate,

b In frigidis regionibus circa solisium effusum.

c Efficaciora, colorata magis redduntur Olea aut va- guenta, saluinarum etiam cum herbis coquan- tur.

d Alii Sextarius Olei pedet vni. 18. Vini, vnci. 20.

Vnguenti Martiani descriptio emendata.

Cum huius nobilissimi vnguenti descripti- ones conferrem, tantam inueni difficulta- tem conciliandi illas, ut omnibus prætermittis interpretationibus, & descriptionibus, hanc tradere, quæ magis scopis & utilitati respon- dere videretur, statuerim. Videbunt studiosi, qui rationes nostras expendere voluerint, nec est, quod me reprehendant, cur illam Alexan- drini non receperim: nam non caret mendis, & dubijs. Habet Esbrion & Saluiam, quan- quam vulgus putat easdem esse, & omnes in- terpretantur Conseruam Esbrii, Conseruam florum Saluæ, nisi quis velit dicere flores alio vocabulo, alio herbam appellari.

Rec. Ceræ flauæ, lib. 2.
Olej, lib. 8.
Rosmarini,
Foliorum Lauri, ana. vnci. 8.
Rutæ, vnci. 7.
Amaraci seu Maioranæ, siue Esbrii, vnci. 6. sic legendum, non Tama- risci aut Ammoniaci, ut aliqui: nam Tama- risci nulla ratione conuenit, quamquam iu- uet splenem: neque Ammoniacum, quia in- ter herbas non reposuisset: quare (Amaraci) legendum, quod est Maiorana. Parthenium enim hic exponere non conuenit, & amoto (th) remanet, Amaraci. Esbrii secundum aliquos Idem est cum Maiorana: alius Maioranam ad horum expositionem addiderat. Sic orta est il- la confusio, ut pro vna herba, tres aliqui ponant Tamariscum, Maioranam, & flores Saluæ, pro Esbrio.

Sabinæ, Balsamitæ, sive Menhæ aquaticæ, Sisymbrii.

Sunt qui legendum putant, Balsamitæ, ut ponatur illa herba, quæ poma fert rubra, quæ magnam in consulsionibus vim habent, & neruorum doloribus ob vim Balsamo similem tributam consolidandi. Balsamine dicitur Fru- ctus vero pomum eximium & mirabile, Gallis (Pommes de merueilles) Erit efficacius vnguentum ad vulnera & dolores, si quis ea vil- voluerit. Liberum tamen relinquo.

Eleisphaci) Sic legendum Græci docent, à quibus *eleisphacos*, Saluia vocatur, non, ut vul- go, Lisiphagos. Conuenientissima herba, velis vulneribus, compescendo sanguinem: pur- gatisq;

gandisq; vlectibus tetrīs, vt Dioſc. docet lib. 3. cap. 32.

Ocimi, ſive Baſiliconis maioris. Polij. Sunt qui montanum deſiderant: ſed quod ad mare naſcitur, magis odoratum, & efficacius: ab antiquis Cretium laudatum, quod in inſula naſcitur; quod emplaſtri modo appoſitum, vulnera conglutinat, vel, vt quibuidam placet, vide hoc facit: Siccum maleficis vulneribus medetur.

Calaminthæ, Anthemifæ, Enulæ, Bethonica, Branchæ vſinæ, Spargulæ, Aparinæ, herbæ Ventī.

Anenone, vocatur herba Ventī, cuius multæ ſunt ſpecies apud Græcos, vt videre eſt, cap. de Anenone: Sed præter illas ſpecies Othonna herba apud Dioſcoridem Anemone, idell, herba Ventī, dicitur, quam nos ſuſpicamur eſſe Othonnam, & legitur melius, Menta, pro Eruca, quam alij putant Clymenon. Nos illam ipſam, quam Arabes Mentham maiorem putant: quæ ſi Clymenon eſt, non poteſt nõ conuenire; vt quæ profluua ſanguinis infrenet, & folia vel ſiliquæ vulneribus recedibus impoſita, ad cicatricem perducant. Hanc ego ponendam cenſeo, non Græcorum Anemonem, quia hæc compoſitio multas alias herbas habet, quæ ab antiquis mutatz ſunt, vel incognitæ, vt quæ ſequuntur. Pimpinella, vim aliquam ſiccandi habet, & leuem aſtringendi, tetrigerandic; antiquis incognita. Agrimoniz.] Hanc aliqui prætermiſerunt. Ablynthij, herbæ Paralyſis, ſive Primulæ veris, quæ eſt ex genere Verbaſci, & ad aliorum differentiam odoratū Verbaſcum appellat. Herbæ ſanctæ Mariæ, multæ ſunt herbæ hoc nomine, vt Parietaria, Perſicaria, quæ nimium acris eſt, & mordax. Alia eſt herba, quam aliqui vel Coſtum hortenſem, vel Eupatorium Meſue putant, quæ in vijs vſiginofis creſcit, flore luteo. Cymarum Sambuci, herbæ Craſſulæ, ſive Fabæ inuerſæ, quæ Telephion dicitur, hic vſurpāda: nā Telephion præterquam quod viſiginem albam cutat, medetur vlceribus telephij, id eſt, nialis: ſiccant enim ad tertium gradum, ſi Gal. credimus, & detergit. Semperuiui, Miſſeſolij, Chamedryos, Centaurij minoris, Centum neruiæ, id eſt, Plantag. minoris, ſol. Phragulæ, Quinq; ſolij, herbæ Iudaicæ ſive Syderitis, ana. vncj. 4. radic. Althææ, Cymarum Myrthi ana. vncj. 3. Fœnig. vncj. 1. l. Butyri recentis ſib. 1. & vncj. a. Vrticæ, Viol. albæ, quam Græci Leucoion vocant, quæ magis cōuedit, quam purpurea, quæ refrigerat & humectat, quod in hoc vnguento non eſt neceſſarium: verum lutea, vel viol. Leucoion po-

dagricos iuuat, rimas ſedis curat, maxime flores. Pap. rub. Menthæ Sarafenicæ, vel alterius, Lapatioli, Polytrici, Cardunceli, ſive cardui benedicti, Matris ſyluæ, ſive Capriſolij, ſeu Periclymeni, Valerianæ, quæ maturellam barbari vocant, alij (Maratti) legunt, ſed falſo: Valerianæ, ſive Phu ad dolores & poſſimum lateris valere ſcribit Dioſc. Iuz Moſcatæ pro herba Moſchata legendum: eſt autem Antyllis apud Dioſc. quæ quia vulneribus medetur, hic ponitur. Alleluya ſive Oxytriphylly, Lingue Ceruinæ, Criſpulæ, quam Abrotanum ſeminam dicunt, alij Euphthalmum, alij herbam Cancrī, quæ Heliotropiū minus dicitur, vel vt alijs placet, Ceterach. Sed non multum reſert, vtra ponatur. Heliotropion flures vires habet hinc inſtituto accommodatas. Camphoræ vel, vt alij melius Camphoratæ, Camphoratam autem herbam alij purant Abrotanum eſſe: Verum eſt alia humi ſerpens, folijs minutisſimis, quam noſtrī Canichoratam ab odore vocauerunt. Illa ad naturam Miſſeſolij accedit, & ad vulnera magnā vim habere docet experientia: quare vulgarem Camphoratam, antiquis incognitam, ponendam puto. Camphora vero, quod fit iunium partium, & potenter ſiccet, non videtur conuenire: Auger ſuſpicionem, quod Syrax poſtea ſequitur: Syracis Calaminæ, Medulæ Ceruinæ, Adipis Vſi ana. vncj. ſ. Sed in quibus locis non reperitur Medulla Cerui, Apri ſubſtitui poterit, vel Tauri, Adipis Gallinæ, Maſtiche ana. vncj. 1. Thuris vncj. ſ. Olei, Nardini vncj. 2. Ratio conſiderandi talis eſſe debet, vt ſit efficaciffimum. Colligantur omnia eo tempore, quo perfectæ ſunt, in qualibet regione: nam in calidis Vere parari debet: In frigidioribus non ante ſeſtum diui Iohannis. Colligantur autem vno vel duobus vel tribus diebus; colligendo prius humidiores, vel frigidores, vel quarum ſuecus viſcidus & lenis eſt: quæ vero ſunt odoratæ, & tenuius partium, vltimo loco: quare primum radices, Semperuiuum, Craſſulam vocatam, Matris ſyluam, Papauer rubrum, Centumacruum, cymam Sambuci, Papauer nigrum: deinde quære alias omnes, ſi poſſint vno aut duobus diebus colligi. Parum reſert, modò in coquendo ordo ſeruetur; vt prius coquantur, quæ maiorem coctionem ferre poſſunt, & quæ a nobis ſunt annumeratæ, colligendæ ſunt in prima die. Suſtinent decoctionem rad. & frigida herbæ & craſſæ, & quæ duræ ſunt & aſtringentes. Ob id adijciuntur radices Althææ, Semperuiuum, Telephium, Papauer nigrum, & album, Branca Vſinæ, folia Lauri, Sabinæ, Pimpinella, Centum-

Chymenon, ſive Anemone, ſive Othonna, Anglium vulgare eſt eſſe, ſi acyſ vide. Si primum colligantur.

Colligendū tempus.

neruiæ;

neruia, Quinque folium, folia Myrthi, Iapatholi, cardunceli, Lingua ceruina, Agrimonia, Vrtica. Secundo loco ponantur Rura, Absinthium, Anthemisia, herba Venti, Alleluia, siue Oxytriphylum, Camphorata: Vltimo odorata, vt yua Moschata, Menta Saracenica, Centaurium minus, Chamedrys, Millefol. & alia, Frequenter contundendz, vel cultro diuidendz sunt in paruas. Infunde in diuersis vasis, vt sunt disposita, & diutius, quæ diutius sunt & fiet: * nam infusionis & coctionis eadem est ratio. Infundantur Vino odorato antiquo, rubro, tenui, vel albo dies 8. ab infusione radicum, Coquantur sensim lento igne, semper mouendo. Cum vinum incipit minui, & herbz maiorem locum occupant: Oleum iniiciendum, & coquendum donec vinum quasi absumptum sit: Cui butyrum & axungias adiungere possumus. Colandum & exprimendum exactè: Colaturæ calidæ Cera liquetur; qua liquefacta, misce Masticem, & Olibanum, Syracem, & oleum Nardinum, exagihando semper extra ignem, donec in linimentum coagulatum fuerit, vel vnguentum. Reponatur in vase, & seruetur diligenter. Si in vase æneo reponatur, efficacius erit ad vulnera antiqua & vlcera. Seruetur in parte inferiore officinæ coopertum. Hoc vnguento carere non debet. Durat in tres annos, vel plures, si bene seruetur coopertum. Hoc sufficeret pro vnguento Aragon, & vnguento Agrippæ, pro Dialthea, vel comita. Sed quia sunt in frequenti vsu, apponemus illa quatuor vnguenta calida vocata.

L'Obel) Vnguenti Martiati Rondelletij
& Monipeliensium emendata descriptio alia.

Etsi innumeris typographicorum viciis descriptiones Martiati vnguenti vindicamus: subdidimus tamen aliam à Rondelletio castigatam, quam Pharmacopœi peritiores Monipelienses perare solebant nostro tempore, supersite adhuc Rondelletio, ambagiosis & ambiguis barbaris herbaceis nominibus valere iussit.

Rec. Cera noua, lib. 2.

Olei Olivarum sub q. (requiruntur) lib. 4. Cera & Olei lib. 18)

Sunt mutatum Rosimarini,

Lauri, ana. vnci. 8.

Foliorum Rosæ, vnci. 7.

Maoriana, vnci. 6.

Radicum Iridis recentium,

Bryonia,

Helenij,

Alibea, ana. vnci. 5.

Salua cum flore,

Sabina,

Mentha vtriusq.,

Balsamita sine Sissymbrij,

Mentastri,

Ocimi,

Polij montani vel Marui,

Calaminta montana,

Arthemisia,

Pimpinella Gallica,

Betonica,

Hysopi,

Lauandula cum floribus,

Athanasia maris, id est, Tanacetii Officini.

Millefolij,

Agrostemina,

Absynth. vulgaris apico loco collecti,

Chamedrys,

Chamaepiteos,

Syderitis,

Cymarum Ebuli,

& Sambuci,

Lauris,

Pulegij Ceruini vel Regalis,

Thymi,

Satureia,

Serpilli,

Spergula,

Aparina,

Branca Ursina,

Chymeni,

Centauri minoris,

Hyperici,

Foliorum & rad. Asari,

Foliorum Ciclamini,

Abrotani maris,

& Fœmina,

Costi hortensis, &

Agerati,

Perforata,

Cardui benedicti,

Stachadis citrina, &

Arabica,

Radicum Pbu,

Orivani,

Marulij, ana. vnci. 4.

Vrtica,

* Alij habent Cimini

Cymarum * Myrthi, & Myrthæ, sed

Fenigrati, videtur legendum Myrthi.

Matrifloræ,

Oxytriphylji,

Lingua cernina aut

Ceterach

Abſynthij,
Aſij,
Sem. Melanthij Romi
Plantaginis utrinſque,
Agrimonia,
Bugla,
Pinnelle,
Ruta,
Bellidis,
Vitica,
Hyſſopi,
Centauri minoris,
Tanacetis,
Trifolij acetofi,
Rosarum rubrarum
albarum, ana. M. l.
Nuces Cypreſſi,
Glandes Quercus, ana. 4. N.º.
Butyri recentis, lib. 3.
Coquantur in Balneo ex arte & co-
quantur.
Aligui Admixt Ceram novam,

Vnguentum Dialthea,

DVplex eſt apud Nicol. Vnum compoſi-
tum, aliud minus compoſitum, quod ſim-
plex vocatur. Sed compoſitum communiter
paratur. Ob id tale hic deſcribemus.

Rec. Rad. Albiſſi, lib. 2.

Santonij, lani,

Foeniculi ana. l. i.

Scyllæ lib. ſ.

Olej Olivarum, lib. 4.

Ceræ, lib. 1.

Terebinthinæ,

Croci Hederæ.

Galbanij, ana. vnc. 2.

Colophonæ,

Reſinæ, ana. b. ſ. ſive vnc. 6.

Rad. ſe femina omnia contrahantur, infuſi-
dantur per quatuor dies in ſufficienti parte a-
ltri & vini deinde coquantur, donec increſ-
cat muſco. Coletur. Expreſſe nucagii-
ni ſortidæ, coquantur viſque ad ſucci con-
ſiſtentionem cum illis quibus adde Ceram, qua
lib. i. et adde Terebinthinam, Galbanum, &
Gummi lib. i. x. Vltimo loco ponatur Co-
lophonis, & Reſinæ pulueribus: refrigeratum
uſui ſua.

Galbanum diſſolvatur in mucagine & vino &
ex arte admiſceatur.

Vnguentum Agriſtæ.

VNguentum Agriſtæ, a Nicol. traditum,
eandem facultatem habet, cum Dialthea:

ſed quia in frequenti uſu eſt, a ſemel ſendunt,
& quia minori impenſa parari poſſit ſubiuſxi-
mus, & in officinis parandum cenſuimus.

Rec. Rad. Bryoniz, lib. 2.
Rad. Cucumeris agreſtis, lib. 1.
Scyllæ vnc. 6.
Rad. Idis, vnc. 3.
Rad. Filicis, vnc. 2.
Rad. Ebuli,
Tribuli marini, ana. vnc. 4. ſ.
Olei antiqui, lib. 4.
Ceræ novæ ſauæ, vnc. 15.

Parabile eſt hoc motio. Radices diligenter
deſiccantur à pul. Inciduntur in fiſſura, infuſi-
dantur in ol. per 7. dies, deinde decoquantur,
donec rad. moleſcant, & ſuccum deponant.
Decoctio colitur, & fortiter omnia expriquantur:
Col. adde Ceram ſauam, non albam, ut
vulgatè exemplaria habent, quia minus e-
molliat. Vbi reſ. geratum fuerit, uſui ſerua.
Non eligimus ol. commune, ſed antiquum,
quod ſit magis tenuium partium, & ad dige-
rendum accommodatius, & emollientius,
viſcoſis illis permixtis. Hoc autem ſcire o-
rtes apud Dioſcoridam mentionem fieri de tri-
bulo marino, ſed tantum de aquatico, & ter-
reſtri. Hiſtiſion eſt ex Tribulorum genere,
eſt Eryngiorum & Eryngioſi loco Tribuli
marini peniſſolunt. quare qui procul à mari
ſunt, ſic hoc parari oportuerit: pro Scylla Cæ-
piani, & pro Tribulo marino Eryngiorum ra-
dicem uſurpare poſſunt, pro Scylla Pancrati-
um, & è contra, & pro Scylla Cæpa antiqua.

De Vnguentis Peſtoralibus.

AD Peſtus parantur vnguenta laxantia, le-
nientiſſa, quibus etiam ad laxandas partes
induratas & tenſas emolliendas vel poſſumus.
Poſt illa emollientia & digerentia ſubiunxi-
mus, & propè vnguentum Agrippæ collocari
debent: Sunt autem tria nominibus diſtincta,
quorum vnum Peſtorale dicitur à parte & al-
terum à materia, ut Vnguentum ex adipibus:
tertium quod mihi laudatissimum, magis atheni-
uſurpatur à Meacis, Reſumptium dicitur;
cuius deſcriptionem ponam, & explicabo, ut
intelligant illud minus accom- datum tho-
raci, quam Peſtorale, vel de Adipibus, & quod
de Adipibus melius eſt, & quo vltimi Medi-
cos uti: Sed primum videamus, quale ſit apud
nos Reſumptium, tam frequenter à noſtris
Medicis uſurpatum.

Vnguentum Reſumptum deſcriptione vulgata.

Rec. Axungiz porci recentis ſine
ſale, vnci. 4.

L

Axungiz

Axungia Anferis,
Galinae,
Anatis, ana. vnc. 2.
Oefipihumidæ, vnc. f.
Ol. Cham.
Violati,
Anethi, ana. vnc. 2.
Butyri recentis, lib. 1.
Cera citrinæ, vnc. 6.
Muccag. Tragacanthi,
Cydoniorum,
Seminis Lini,
Bismalug,
Gummi Arabici, ana. vnc. f.

In hoc vnguento multa sunt reprehendenda, ut sit vnguentum Pectorale vel malasticum. Primum quod ex Cera alba parari non debet: sed ex flava: quare si quis parare velit, flavam usurpet: omnia enim relaxantia, emollientia, digerentia, concoquentia, dolores frigidis sedentia, ex cera flava parari debent: quæ vetò ad alitrigendum, refrigerandum, indurandum, & siccandum, ex alba: quæ fridior & magis sicca & alitrigens. Aliud maiore reprehensione dignum, quod muccagines frigidæ & constriquentes recipit cum calidis relaxantibus, ut Gummi Tragacanthi & Arabici, seminis Cytoniorum: Quare putent ego illas esse expungendas, & mullilagines augendas Lini, & rad. Bismalug ad vnc. 1. Quod si mullilaginem Fœnig. adingere vilius sit, ad vnc. f. non erit absurdum, & pro ol. Violol. Amygdal. dulcium ponere. Sic erit ergo veri Vnguenti Resumptivi descriptio castigata. Ex huius Vnguenti castigatione apparet castigatio illius pectoralis vnguenti, quod muccaginem recipit Psyllij, Tragacanthi, & Gummi Arabici. Hæc emplastica digestionem impediunt, obstruunt poros, & potius suppurant, eridit & temperatis permixtis: & parte mentis retinent, quod in doloribus & potissimum pectori adjuverum est, ob respirationis necessitatem.

Rec. Axungia Porci recent. sine sale, vnc. 4.

Axungia Anatis,
Galinae,
Anethi, ana. vnc. 2.
Ol. Amygdal. dulcium,
Chamazmelon,
Anethum, ana. vnc. 2.
Butyri recentis, non saliti, lib. 1.
Cera flava, vnc. 6.
Muccaginis Seminis Lini, &
Fœnig. Bismalug, ana. vnc. 1. f.
Fœnig.
Oefipihumidæ, ana. vnc. f. misce, fiat

Vnguentum Resumptivum,
Talis erit pectoralis vnguenti descriptio.

Vnguentum Pectorale.

Rec. Ol. Amygdal. dulcium, vnc. 4.
Ol. Cham.
Viol. ana. vnc. 3.
Axungia Gallinæ,
Anatis, ana. vnc. 2.
Butyri recentis, vnc. 6.
Ileos pulverisatæ, drach. 2.
Croci, drach. 1.
Cera citrinæ, vnc. 3. misce, fiat vnguentum.

Quamvis in alio vnguento Resumptivo ol. violaceum expunximus, ab isto tamen expungendum non est, quia refrigerat citra astrictionem, & laxat, & dolores lenit. Ob id hoc parandum pro inflammationibus pectoris, & collarum doloribus. Erit medium inter Resumptivum superius, & vnguentum ex Adipibus, quod magis simplex est, ac commodissimum in inflammationibus pectoris, & constrictione, ad concoctionem & expectorationem.

Vnguentum ex Adipibus.

Rec. Adipis Gallinæ,
Anferis,
Anatis, ana. vnc. 6.
Butyri recentis tantundem,
Cera citrinæ, vnc. 4.
Ol. Chamæm.
Amygdal. dulcium, ana. vnc. 3. misce, fiat linimentum, ceratum vel vnguentum. Accommodissimum est hoc vnguentum in inflammationibus pectoris & collarum, & constrictione pectoris, ad concoctionem & expectorationem.

Vnguentum de Bdello.

Vnguenta ad indurationes, in hac parte consequenti, ordine descriptæ, collocabimus, in quorum numero est vnguentum de Bdello, & vnguentum parvum de Cyclamine, seu de Arthanita.

Rec. Bdellij, drach. 6.
Euphorbij,
Sagap. ana. drach. 4.
Castorej, drach. 3.
Cera citrinæ, drach. 15.
Ol. Churini, seu Leucojhetæ, vnc. 10.
Fiat vnguentum: Paretur in hunc modum.
Bdellium

Bdellium & Sagap. dissolvantur in aqua Vitis Agrestis; Castoreum & Euphoibium in aqua calida. Cera liquefcat in oleo. Omnia miscantur, & fiat unguentum. Hoc dispersum potest omni tempore: quare non est dispensandum, nisi quando imperatur. Non solet, nisi in consulsionibus & rigoribus nervorum præscribi, in quibus, oleis & remedijs mitionibus est utendum; interea, dum alia parantur. In hoc maluimus apponere oleum ex Leucoij floribus paratum, quam lalmino, quia raro paratur, neque in omnibus locis reperitur: sed Leucoium in omnibus locis reperiri potest, & sunt similia facultate. Hoc autem unguentum difficile paratur ob penuriam Bdellij, nam quod pro Bdellio ostendunt, est Myrrha vera, quæ vngues habet, & est subtilior, ut Dioscor. describit. Inter Myrrham, aliquando partem Bdellij invenimus. Sed difficillimè discernitur à Myrrhæ a. specie, quæ Bdellij mox lentescit, cum mallicatur, vel digitis tractatur & malaxatur; estque concolor, quasi colore Aloes. Verum cum non multum differat Bdellium à Stryracē, vel Myrrhā, poteris ex illis parare, maxime ex illa, quæ concolor est, & lentescit. Vel vii succedaneo antiquorum, quo in externis remedijs magis, quam internis utebantur. Est autem b. Propolis vera, quæ eodem modo lentescit, si digitis fricetur, odore seimenti: est enim acida, & in rimis & foraminibus alveolarum reperitur. Neque Mel est, necque Cera, sed ex oculis populi, vel Betulæ, vel aliarum arborum, quæ Resinam reddunt ab apibus decerpitur. Sunt nonnulli, qui sordes alveolarum usurpant, sed male, & multo peius antiqui Ceram albanam pro illa usurpabant, quæ frigida est, & secca, inducens potius, quam emolliens. Poterit itaque facilius, & minori impensa parari.

Unguentum parum de Arthanisa; seu de Cyclamine.

Rec. Succ Cyclaminis,
Muecag. rad. Filicis,
Succi Ebuli, ana. vnc. 9.
Succi luminatam Thamariscis, vel
Sambuci, vnc. 2.
Oesipl. a. humidæ, drach. 7.
Ol. lini, lib. 2.
Bdellij,
Ammoniæ, vnc. 1. f.
Cera flauæ, vnc. 6.
Corticis rad. Capparis, vnc. 1. f.
Spicæ Nardi, drach. 3.

In Gallia, & alijs locis, ubi Thamariscis succus haberi non potest, succus Sambuci subli-

rui potest. Hoc enim succedaneo usus est Gal. lib. 9. de compos. phar. secundum locos. Paratur autem hoc modo. Bdellium, & Ammon. dissolvantur cum aceto Scyllitico: Succi cum ol. bulliant ad aliquam consumptionem. Deinde Ceram adijce, quæ liquefacta, Ammoniacum & Bdellium dissolve, in sine Spicam. Fiat unguentum. Hoc in frequentiore usu est, quam magnum, quod paratur ad laxandum ventrem, & ad vermes occidendos: deij. iendosque. De illo postea agemus, si aliqua alia vnguentis, quæ ad horum naturam accedunt, aliqua ex parte tradiderimus.

Unguentum fæsum Nicolai.

Rec. Ol. communis, lib. 1. f.
Cera nouæ, vnc. 4.
Colophoniz,
Picis navalis,
Sagapana. vnc. 2.
Malthæ,
Galbani,
Thuris,
Terebinthinæ, ana. vnc. 1. miscæ, fiat unguentum.

a. Myrrha
& Bdell. i
diffic. avin.

Hoc unguentum semper parari potest; quare iussit habere parvam quantitatem. Utile est ad trahendum, emolliendum, digerendum, concoquendum crassos humores: sed illud animadvertendum est, quod antiqui Colophoniam vocabant à Colophone regione: nostri Colophoniam vocant Resinam, vel Terebinthinam, à qua extractum est ol. Terebinthinæ: Resina est multum fixa, & minus pinguis. Pix navalis, Pix dicitur, quæ est navibus darsa est, quæ ob seuum admixtum, & falsuginem maris, aliam facultatem habet, quam recens, & simplex: hæc mioris naturæ, magis siccæ; quare in vlcetibus, ut Colophonia, magis convenit. Suaderem, ut posthac navale n. aderent è navibus, & hæc tantum a. navalis vocetur, alia, communis Pix tantum ad differentiationem, ut Antiqui solebant. Non enim navalis, quod navibus apponatur, sed quod apposita fuerit, dici debet.

b. Propolis,

Pix navalis
qualis.

Unguentum Balsilicum maius.

a. vnc. 5. pro
drach. 5. mai
legunt.

Balsilicum unguentum, quasi dicas Regale, Magnum ad distinctionem Minoris, recipit concoquentia & digerentia. Vius est in abscessibus detergendis, in quibus aliquid suppurandum, concoquendum, detergendumque & in vlcetibus, quæ sine inflammatione, aut intemperie calida sunt. Hoc carere possumus, si

L 2 aureum

aureum habeamus; nam cum eo conuenit, atque etiam efficacius est.

Kec. Cere flauæ,
Resinæ Pini,
Sæui Vaccini,
Picis naturalis,
Glutinis piscium, quod Ichthyocol-
lam vocant,
Olibani,
Myrrhæ, ana. vnc. 6.
Picis, vnc. 3.

Hoc non est dispensandum, quia non eo fre-
quenter vtuntur Medici, & non immerito, cum
Aureum id præterit, cuiusque descriptio sit ma-
gis efficax, & integra: hæc autem in multis ex-
emplaribus incerta est; nam Picem bis ponit,
& incerta est dosi: quia dicit, Picis vnc. 4. & a-
liorum, ana. vnc. f. quod fortè sic legendum est.
Alij Picis vnc. 3. aliorum verò vnc. f. vt mon-
strat diuersam esse descrip: in facult. decla-
ratione falsum docet: dicit enim conferte vul-
neribus, in quibus est calfactio. Sed id facile
castigare possumus, si negationem addamus.

*Castigationis L'Obelii, Unguentum Basilicum
Minus, Mes. v. s. i. t. u. s. Conuenit cum Te-
trapharm. Galeni, & Pauli Aegineta Lib. 7.
cap. 17.*

Huius descriptio varia est. Paulus enim ex
quatuor rebus; Cera, Colophonia, Pice,
& adipe Taurino aut Vaccino, æquis partibus,
sine oleo componit: Mes. verò ex Resina, Pice,
& Cera, æquis partibus, & oleo a. q. f. Itud pa-
rat, & parandum est. Dicitur & Tetraphar-
macum, quia non computatur Cera, quando
iungitur Steuon Taurinum aut Vaccinum;
Hyme plus Olei, quam æstæ affundendum;
Macedonicum dicitur, thure addito, quo v-
tebatur Galenus & antiqui.

*In Picis delictu sæpe falluntur optimi quique, &
seno confecti Pharmacopæi; Illa namque, vulga-
ria Picis species durior que ad nos ex Orientali
Germania & Noruegia defertur, vocaturq; Ger-
manis & Belgis Pech. Anglis Piche. Gallis du
Brel. Gallobelgis Poix, ou Poye & Harpoye
(deducto serie vocabulo Græco à Harpage, quod
vestibus pertinaciter adhaereat, easq; contamineat,
paleas & quicquid vestiumq; sive briae, uti E-
lestrum à Syris Harpax vocatum, yapias; eo quod
fistulas & paleas confitatum ad se trahat;
Harpage instrumentum aduncum unde Harpies,
Gallobelgæ vocant homines Trapaces; Harpes au-
tem Gallicè est digitis aduensis fidium chordas ob
harmocatum attrahendo & astrahendo pulsare,*

*aut fidibus canere; rapere significat) Notum in
grumos aut grumulos liquata ex oleo, sæuo, aut
vnguinoso latice, aut Resina, concreuit vntate
soluta, segregaturq; quemadmodum Pistifbal-
um illud quod Venetiam picandis manibus defer-
tur, cuius in Arabum Mumia memini, de Lau-
dano Opiato nostro agens: Videtur Picis fex,
que adhaerefcit corticis nimium excocta, aut inter
equeundum ad duritatem, parum exusta, vnguen-
tis & emplastris vsciatissimis, Oxyroceo, Masti-
chino, Cerueo & alijs minimè idonea; picandus
tamen lembis & altuarijs manibus accommoda-
datur.*

*Altera vero limpidior & dura Picis species,
qua Sinteres vtuntur, apertissima est in vsum me-
dico, que cum in mibus attrahitur fuit & pin-
guet & vocaturq; etiam Germ. & Belgis Pech,
& Gallis du Brel; gustanti dulcior & fragrans
or; amara deterior.*

Vnguentum Aureum.

Aureum à colore aureo dicitur, quem à
Croco accipit, vel aureum è præstantia est
enim in vulneribus curandis efficacissimum:
Concoquii, deterget, & carnem gignit. Pro-
portione respondet Bahlico magno, sed magis
deterget, ob Myrrham, quam habet Basilicum
magnum: Hoc verò magis siccet & minus
terget.

Rec. Cere citrinæ, vnc. 6.
Olibani, lib. 2. f.
Terribethiæ, vnc. 2.
Resinæ,
Colophonix, ana. vnc. 1. f.
Olibani,
Mastiche, ana. vnc. 1.
Croc, drach. 1.

In hoc nihil mutauimus, præter Croci do-
sim, quia legitur in nouis dispensarijs (Croc
vnc. 1.) quæ quantitas maior esse videtur,
quàm oporteat: hebet autem facultatem con-
cocturiam: sed cum multa alia sint ad id con-
modius faciendum, non video cur in tanta
quantitate poni debeat: Nos itaq; pro vnc. 1.
drach. 1. Jegimus, tum propter rationem affig-
natam, tum quia in manu scripto antiquo ita
legimus, Augēt suspicionem, quod prius dixe-
rit (Olibani & Mastiche ana. vnc. 1. Si tan-
tundem Croci voluisset, cur ab alijs separasset?
Adde quod semper solemus minorem rerum
similium quantitatem ponere vltimo loco, vt
Andromachus fecit in Theriac dispensatione
& adde quod illa parua quantitas nullum
tingit.

Vnguentum

*a. Vnc. 3.
Resinæ qui-
dam addunt
plus minus,
pro quantitate
vnguenti.*

Vnguentum Aegyptiacum.

AD deterfionem Gangrenæ, & vlcerum putridorum paratur omni tempore: Quare minor quantitas fufficit vel quia iffinima impenfa paratur, habendum. Paratur diuerfa præparatione. Alij ingredi faciunt æqua proportionem fic.

Rec. Floris zris, Aureos quinque, Mell. Aureos 12. Aceti acris aureos 7. Decoquantur, & decocta infpiffentur. Aureus vñ let drach. 1. f. Romana. Sed fi mauis, lege drach. vel vñc. quia eadem feruatur proportio, & Phai macopolæ minis dubitabunt. Et certè ponderum apud Latinos, Græcos & Arab. magna eft diffidentia. Aliqui addunt Thuris aureos 2. f. Sed illud farcoicicum non eft apponendum, nifi cum imperatur, quia magis putrefas ciet, quam reficcaret, & cum imperatur, potius cortex, quàm Thus ponendum eft.

D. Buranus apud Venetæ Chirurgus egregius præbat efficaciff. Aegyptiacum fuum ex aquis portibus omnium fimplicium.

Vnguentum Apoftolorum.

Nomen accipit à numero duodenariò, non quòd vñ fint Apofolli: curabant enim citra medicamentorum vfum, poteflate à Deo conceffa, cum dixit, Super ægros manus imponent, & benè habebunt. Eft autem in frequenti vñ ad vlcusum putridorum, id eft, fordidum deterfionem. Recipit detergentia, cathetetica, & farcotica. Sic paratur.

Rec. Terebinthine, Cera alba, Refina, Ammoniaci, ana. drach. 14. Lithargyri, vñc. 1. drach. 1. 2. Aristolochia longa, Thuris mafculi, Bdellij, ana. drach. 6. Myrrha, Galbani, ana. drach. 4. b. Floris zris, Opoponacis, ana. drach. 2. Olei libra fñt aflate due, hyeme tres.

Parandi ratio apud Sylium. Bdellium fi male eft: Ammoniacum, Opoponacem, cum Aceto macerabis nocte vna, poft ridite calefac, moliffimo igne coque, b. colaterrum & pendo, & ponderi horum legitimo Terebinthinam permifce, qua tam belli hac ac cetera comprehendet, vi vix fñ erraturus: Lithargyrum autem, in oleo aliquandiu fine igni friatum, Poft igni tradet;

vbi calet, Ceram immitte: Hac liquata igni aufer; Inquores, ut dixi paratos mifce, vbi refrigit, reliquorum puluerem paulatim adice, & Bdellij, fi ficcatus eft, quale nobis eft adulterinum. Ob componendi & mifcendi magnam difficultatem, fape ad operis fpecimen probandis Seplafarijs imperatur.

Pro Bdellio vfurpanda eft Propolis, vt alijs monftratum eft. Vnguento Apofolorum refpondet Crafeos magni Mef. Quare non erit neceffe, nifi paratum habere vnguentum Crafeos. Primum potius parandum eft ad vlcera detergenda & implenda carne.

a. Aristolochia Clematiti, quia vnguentis idonea, plerumq; ad eam vñtur.

b. Eius loco hodie omnes rafili viridique & Erygine vñtur.

c. Lachryma fi impatæ, augenda fñt.

Balfamum è Peto efficaciffimum ad omnia vulnera in quauis parte corporis: eorumdū fluxum cohibens calidum impofitum. Fada item vlcera, pertinacia ad cicatricem perducit. Linoribus, percuffis, ex alto prolapsu auxiliatur; fanguinis grumos diffoluit. Ad fifsuras maxillarum, pedum & mamillarum efficac. Puerorum dolorificis cuticula excoriationibus opitulatur. Scabiem, Tineam, equorumq; vlcera curat.

Rec. Peti viridis contufi, M. 6. Olei Hyptici, vñc. 6. decoquantur in Balneo. Olei Amygdal. amari, vñc. 2. Galbani pñi, Olei fñm. Papau. albi recentis, ana. vñc. 1. f. Thuris mafculi, Maftiebei, Terebinthina Veneta, ana. vñc. 1. Eryngini, drach. 2. Cera alba parum. Ergo, Oleum Amygdal. & Papau. eginum fub finem addenda, Quo antiquius ee præftantius.

Vnguentum Crafeos paruum Mef.

HOc potius difpenfandum eft, quàm Magnum, quia Vnguento Apofolorum refpondet: ob id nulla eft eius Apofolorum vñguenti neceffitas: Hoc verò ad vlcera detergenda & implenda confert.

Rec. Aristolochiz,
Iridis,

Sang. drac.
Opoponacis,
Sarcocollæ, ana. vnci. f.
Lytharg. leuigati, vnci. 5.

Olei. lib. 1. coquatur Lythargytum in ol.
vsquedum vnio fiat. Cui adde reliqua in tenui-
em pul. redacta. Fiat vnguentum. Nos autem
pro Ammoniaci Opoponacem substituiimus,
quod magis sit sarcocollæ & conueniens. Ne-
que inulmum repugno, si Ammoniacum ponatur.
Hoc potest esse vsui pro Vnguento Apo-
stolorum.

* *Apostolorum Vng. tamen vsus receptum.*

*Vnguentum Pompholygis Nicol. Propositi,
cuius proportio noster est.*

Accepit nomen à Pompholyge, sed nostri
ex Tuthia, quæ vocant, parare solent, quæ
Spodium est Diofæ. & omnium Græcorum:
Quare dicendum esset Vnguentum ex Tuthia.
Sed cum patrum differat Tuthia, à Pompholy-
ge, non est ab hoc recedendum. Illi autem,
qui nos præcesserunt, facile poterunt excusari,
quod Pompholygem non agnoscerent? At
nos, qui & agnouimus, & haberi ex fornaci-
bus potest, ubi funditur æs ad bombardas pa-
randas, & tintinnabula, vel ubi parantur ex æ-
re vasa culinaria, excusari non possumus. Quare
Pharmacopolas horret, vt ex fornacibus
colligant, cum habere possint, quantum volue-
rint: est enim magis reuini partium, quam
Spodium, siue Tuthia. Sic parabitur.

Rec. Olei Ros. Omphacini, vnci. 10.
Cetæ albæ, vnci. 5.
Succi granatorum Solani, vnci. 5.
Cetusa lotæ, vnci. 4.
Plumbi vili & lori,
Pompholygis, ana. vnci. 2.
Cortic. Thuris, vnci. 1.

Succum fructus solani decoque in Oleo ad
consumptionem, cui adde Ceram. Deinde
omnibus redactis in puluerem tenuissimum, fiat
Vnguentum, quo vtiuntur in cancriis, & gangre-
nolis vlcibus. Quare oportet illud esse be-
ne paratum, ne morsum in parte exitit, neque
eam paret ad putrefactionem, vt illud facit,
quod à nostris dispensatur: quare danda est o-
pera, vt ex Oleo Ros. Omphacino fiat; quod
magis repellit & exsiccat, quam illud Rosace-
um Complectum vocatum. Quod si tale non
reperiant; abluatur Oleum, in aqua Peculi
Ros. vel in aqua Myrthi, vel Ceterach, vel
Plantaginis, vt illa vis ol. laxatiua, & putre-

factiua, ablutione, amittatur: deinde rosas
exsiccatas rubras vna decoque in duplici vase:
& fiat Oleum Omphacino respondens; vel
succo foliorum Oleæ admixto vel decoctis so-
lij Oleæ, ut Gal. imperauit. Cera alba est ab-
luenda, tum ob pul. tum ob Aceti vim, quam
accepit in sua dealbatione. Succus ex fructu
vel folijs Solani extrahitur; neque peccat, si ex
folijs paratur. Cetusa ob Aceti vim est ab-
luenda, & vt amittat aliquam vim emplastice
substantiæ, in aqua pluuie, vel fluminum, vel
Plantag. Plumbum, quia cum sulphure vritur,
abluendū, vt Cersua, vt deponat empyreuma;
vel lixa in tenues partes diuidere oportet, vt
diligenter contritum in partes tenues reducatur:
nam alia ratione non vritur; quam vt faci-
lius in pul. reducatur: Minus enim acre est
quod non vstum, quam quod vstum est. Tuthiam
nostri ponebant, quæ antiquorum est
Spodium, & quia non nouerant Pompholy-
gem; Spodium vsurpabant. Pompholyx ci-
nericula est, quæ in paucibus fornacibus colligitur:
adhæret aliquando vt fuligo: aliquando,
vt quæ proximior flammis, tanquam Pumex,
vel racemus ex multis ampullis: vnde Botry-
tis dicitur: sed id notare oportet, quod in qui-
busdam locis quasi alba colligitur, vt cinis, vt
in fornacibus. In vulgatis exemplaribus (Thuris)
legitur, ubi legendum (cortex Thuris.) Thuris
enim putrefacit: cortex autem vlcibus malis
conuenit, vt docet Diofæ. Quod paratum est
hoc modo, tam differt à communi scopo, vt
homo viuus à mortuo. Hoc Vnguentum vsui
esse potest, pro Vnguento ex Cersua, sed non
contrà, ob Acetum. Quare cum pro vnguen-
to ex Cersua eo vti volueris, adde Aceti albi
q. f.

^a Succedaneum Olei Ros. Omphacini.

^b Simul coctis quo vnguentum aut Oleum viridi-
us enadat.

^c Est candida lenis fuliginis, quæ Germanis. Ni-
hil album vocatur.

Vnguentum oculis dicatum, vtilissimum
& efficax, quo vti solebant Antuer-
piani; & canchis modicum
immitentes.

Rec. *Lepidis Calaminaris decies ex candi-
fatti,*

*Aceto vini albi sepius extincti, cy-ter aqua
Rosacea; deinde in tenuissimum pollinem
redacti vnci. 3.*

*Ac: Suilla ignem non experta & per setace-
um*

um à pelliculis mundata septies aquâ pluvi-
alis terque Rosacea lota, vnc. 26.

Simul in Porphyris aliquot dies laugantur:
tandem adda Capbura trita, drach. 1.

Mellis Hispanici crudi purissimi, vnc. 2.
fiat Vnguentum.

Vnguentum defecatum rubrum Nicol.
Proposui.

Post Vnguentum de Pompholyge, colloca-
ri debet Vnguentum defecatum rubr.
quod frequentissime vsurpatur à Chirurgis in
erysipelatosis & seruidis vlcibus, & ad cicat-
trices faciendas.

Rec. Lapidis Calammaris, siue Cadmix,
Terræ Sigillatæ ana. vnc. 4.
Lycharg. ani,
Cerusæ vñz & loræ, ana. vnc. 3.
Camphoræ, drach. 1.
Cere albæ, vnc. 5.
Olei Ros.
Myrrhini, ana. vnc. 6.
fiat Vnguentum.

In hoc Vnguento tantum hoc mutauimus,
quod Cerulam vñam & lotam imperauimus,
ratione optima, quia magis succa & rubra red-
ditur. Idcirco rub. vnguentum dictum est, &
vt ad cicatrices & herpetas efficacies sit, lauand-
um ad empyreuma auferendum. Viriur vt
Calcythis, donec Sandaracæ vel Minij colorem
acquirit. Ceram albam imperauimus, quia
magis ficeat, & vt magis rub. appareat vngu-
entum, si ex aba fiat. Oleum Myrrhinum pro
Violaceo posuimus, quia Violaceum humidius
est, quoniam vt in vlcetum vnguentis ponend-
um sit, & maxime in eo, vbi omnia refrige-
rant: quare Myrrhinum substituiimus. Lapis
Calammaris est Cadmix species, ex qua æs
rubrum luteum fit. Pro terra Sigillata, vsur-
pandum esse Argillam, vel Cretam aut Ru-
briçam fabrilis, siue Bolum diximus: Nam
terra illa, Spargis, dicta, vel Sigillata, nihil ali-
ud est, quam Argilla collecta in Lemno insu-
la, quæ ob illum lentorem, quem habet, & vim
emplasticam insistentem, valere ad incrassandas
fluxiones, & ad sanguinis fluxus, quæ omnia
præstat nostra. Quod dicunt valere ad pestem;
non ad curationem, vt aliqui putant, sed ad
præcautionem: Nam cum illa & Bolus Ar-
menia vini inspissandi sanguinem habeant, &
conturbationem sanguinis impedire possint;
pestem impediunt; quæ nihil aliud est, quam
cum sanguinis perterritio sit; vt nos docui-
mur in nostro tractatu de Peste, Quare non
est nauigandum in Pontum, vt adulteratam

Argillam sigillo illo notatam habeamus, cum
Creta idem præstet, quod & terra Sancti Pau-
li, quæ vendunt circulatores in Italia, vel Terra
Sigillata: Exsiccent omnes illæ terræ, modi-
cè viscosæ, quod in hoc Vnguento acqui-
mus.

Vnguentum album Rhafis.

Minimo paratur, & eius frequens est vsus,
vnde paratum habere semper oportet.
Rec. Ol. communis loti lib. 2.

Cerusæ, lib. 1.

Cere albæ, vnc. misce, fiat vnguentum. Ole-
um abluendum aqua frigida, nisi recens fuerit,
minimèq; salitum. Cerusa abluatur necne, ni-
hil interest. Sed quia in affectibus palpebra-
rum vsurpatur, non malum est, si semel ablu-
atur.

Vnguentum è Cerussa.

Sunt qui addunt Vnguento è Cerussa Rha-
fis Capbura drach. 1. aut drach. 1. f. & Oni-
rum albumina, quæ refrigerant magis & vngu-
ento albo candorem conciliant.

Cerusæ parandi ratio, & Aeruginis.

Quemadmodum modus parandi rasilis, pri-
ma nota Monspelensium Aeruginem, vi-
na pario rubro, omnium regionum huic artificij
preferendo, laminis æreis rubri coloris aspersis,
variis à Dioscoridis Aerugina rasilis affuso, pro
Vino Aceto; (paratur autem Monspelis fulli;
sistula ventroso vrceis, stratum super stratum,
vt artis vocabulum vsurpans, sparsis laminis ære-
is substratis & interstratis expressis torcularis pe-
tiolis, quibus acini totaq; racemosa vna sulcitur
aut si spenditur) sic hodie Plumbea tortiles lami-
na vrceis sistilibus, Lutoris oris exceptæ, infusis
singulis Aceti acerrimi vncijs octo aut nouem;
decussim bacillis aut fissilibus rasilis ad Ola-
imum subditis; operimento scilicet tabella retilis
acinde fimo equino calente mersis per aliquot (cir-
citer 14. plurimum) dies donec lamina crustis
abducantur: Postquam enim Aceti vapida vis
laminas excedit, vrce coram ora aperiant laminasq;
eximunt, quæ malleolis ligneis tandum siogellan-
tur, donec crustæ laminae excusse sint. Id quod
excussum est; vulgus Album vel albedo Plumbi,
aut Plumbum album vocant, quæ libentius vñunt
tur piores, quâ Cerusa, quia non mistum & pu-
rissimum est. Versatilibus aut Añnerijs molis ex a-
qua seriunt, capis excipiunt, affusa aqua copia,
Subsident album signatis meta in angustum, co-

ni instat, desinentibus vasis conformant pyramides quas Cerasum vocant. Margones Cretam inscunt, sed dolus pondere detegunt: multo enim Plumbo lenior Creta. Plumbee lamina rursus in vices inferuntur, addito nouo Acete, finem, reconduntur. Is labor toties repetitur, donec Plumbum in Cerasum transmutetur. Non est quod medici & Chirurgi sint adeo anxij ablutio- nis Cerasa ob Acetum: quia Cerasa non fit sine larga ablutioe. In ocularibus tamen medicamen- tis ex Rosacea aut similis medicata ablutio non est noxia.

L. Myrcus.

Nonnulli malefici lucri causa Unguentum hoc pessimum parant; Medicos, Chirurgos & agros fallunt: ipsi enim insijs Axungiam. Creta permixtam, pre vnguento albo vendunt: hoc mihi euuissse scio, & tanquam expertus loquor, sed quid dicam; Chirurgi aut petius barbitonores, artis Chyrurgica ignari hac non curant: modo nummos corradsnt fas est.

Vnguentum Citrinum.

ACitro nomen accepit, quo vtuntur mulieres ad fucum, & Chirurgi ad siccandum, & cicatrices faciendas, & dealbandas: habet enim aliquam vim deterfuiam, & insignem exsiccandi. Difficile paratur ob prap- arationis difficultatem, & reliquarum rerum penuriam.

Rec. Borracis, drach. 3.
Caniphoræ, drach. 1.
Cotrali albi, vnc. 5.
Amianthi dulcis, vnc. 1.
Vniblici narinii,
Tragacanthi albi,
Amyli, ana, drach. 3.
Marmoris albi,
Crystalli,
Dentalis,
Entalis,
Olibani albi,
Nitri, ana. drach. 3.
Gersæ Serpentariæ, vnc. 3.
Cerusæ, vnc. 6.

Borracis Quia Fuchius legit in exemplari- bus Græcis ἀβραχάου, id est, lapidis Borrachij, est aut lapis Crapaudine vocatus, quem putant aliqui reperiri, in Buffone, quæ Crapau, vocant Galli, Græci quæ Rubeta à vespertinis rubris dicta à quibusdā Borax, & ab ea Borrachia gem- ma d. Hac Gēma alba non est sed aliquando ver- ficoler, viridis, cineritia maculis notata, signa

Rubetam representat. Illā inciscendum putant ad deterfionem quam forte habet, quod tamen falsum esse vniuersique experiri potest. Quare Borax & nitrum illū induratum album detergens impo- nit, quod duplex est. Nigrum & album: al- bum depuratur ex nigro, pinguis, & raris, natu- rali, & artificiosum aut falsum vocatur.

Amianthus dulcis Dulce expurgandum, nul- lum tale reperitur dulce; sine Gypsum acceptis ut Cordo visum fuit, sine Alumen de flama voca- tum, quod magis conuenit, petinde est.

Borax est duplex, Aliud, quod pingue dici- tur, quia nigrum & ad Saponis molis quasi colorem & consistētiā accedit. Aliud est, album, & ad formam Salis vel Aluminis con- cretum, & diaphanum, quod arte tale reddi- tur. Est huic arte paratum simile ex sale Al- cali & vrina, quod ferrumiant aurum, à quo effectu aliqui medicorū crudiri Chrysocolæ nomen indiderunt, non animaduertentes, Chrysocolam antiquorum colore viridi esse, siue illa sit naturalis, quæ cum lapide Cincæ & fodinis emittitur, siue illa artificialis Gale- no ex vrina vel xre & quam speciem Discor, inter species Aeruginis reponit: Quare nos Borracem Nitri speciem dicemus. Borracem nitrosum vocant Arabes, & a sapore isto, omnia alia, quæ hoc sapore sunt prædita, Bora- calia vel nitrofa vocant. Additur & Caphuræ drach. 1. quia est sexta tenuium partium val- de: quare facili penetrat. Magna autem est inter medicos contentio de eius origine & temperatura, quoniam aliqui dicunt esse ar- boris lachrymam, alij Bituminis candidissimæ speciem, alij fistulium quidpiam. Ego verò puto aliam naturalem, aliam fictitiam ex Ma- stiche destillata in vrina: Naturalis certè Naphte naturam præ se fert, quod faciliè concipiat flammam. De eius ortu nihil certi habeo. Verum de eius temperatura certò possum as- firmare calidam esse, & quodd odorata sit, & quodammodo & ex Aerea substantia & tenui, ob quam tenuitatem ignem faciliè concipit etiam in aqua, quod forsitan aliquos decipit, quod semen absument: inde ab effectu colli- gunt fumum refrigerare: verum illa est secun- da operatio, non prima, per accidens, non per se: nam si quando seminis spiritum dissoluit, ob id Venerem extinguit, semine absument, vt Ruta, Agnus, Mentha sicca, vt & alia mul- ta calida: Sed videor hic limites institui tran- scedere. Hoc enim ad Medicum spectat, non ad Pharmacopœum: Hoc tamen addani, quod Caphura debet ab electuario diatragac. frigid. auferri, quia debet medicamentum istud resfri- gerare, & humectare, & inspissare: sed illa contrarium

conterarium præstat. A Diamargarito frigido non item, quia illa valet ad cordis iactitationem, siue palpitacionem, ad quem affectum hæc compositio multum confert. Præterea offuscat a Moscho, & alijs odoratis medicamentis, quod non fit in Diatrachacantho. Sed hæc satis de Caphura. Hic ponitur quia alba est, & dealbat, ut sulphur, per accidens resoluendo. e Corallii siue Coralli plantæ est marina, quæ supra saxa oritur. Multas rad. mixtit, sed supra saxi superficiem crasso caudice ad ierit, cor. hæc minus rubro videtur integri rubrum, non album: Quod facit, ut non credam esse florem salis, quo inuestitur: nam & album simili modo vestretur, cum in eodem saxo nascatur. Sunt autem res Coralli species distinctæ colore tantum, rubrum, album, & nigrum: quorum album vilius est. Rub. vero clarior ob multos vsus. Nam mulieres eo ornantur. Pueri in collo vel circa carpum gestant aduersus fascinores, & Medici ad hiccandum, refrigerandum, & vomitum trahendum vtuntur frequentissimè. Nascuntur in eodem loco. Nigrum vero vocatur *adrasia*. Raro inuenitur, colorque f. Hebeni est. Album in hoc vnguento præfertur, quanquam in omnibus alijs remedijs rubro sit inferius, non alia ratione, quam colore: Nam cum hoc non solum ad morborum curationem, sed ad candorem faciei mulieribus inducendum paretur, præfertur album rubro. Differt etiam album, quod in medio cavitatem habet, neque solidum sit ob coxiledones siue acetabula, quæ habet frequentia. Scat, refrigerat, & dealbat, vel maculas cooperit. Quanquam non est negandum ob falfuginem, quam habet paruum, detergere, ut omnia falsa: neque magis refrigerat, quam rubrum. Color qui distinguit speciem, nihil ad temperamentum pertinet. Paratur autem multis modis, pro diuersitate affectionum & partium affectarum. Nam si ad frangendum lapidem, occidendos vermes, vel ad sicanda vlcera interna, vel detersionem oculorum, paretur sine vilioue. Verum si ad fluxum ventris, vel si ad ventriculi extinctionem, vtendum, sed abluendum: nam nisi abluatur, vim calidam habet. Quare & calfacit: qua in re magni nominis Medici frequenter decipiuntur. Ad frangendum calculum, vel potius deturbandum renum calculum datur: runc in puluer. reducendum, & succo Linonum diluendum: item cum vernis occidendi sunt. Si quis plura desideret, Diosc. lib. 5. cap. 139. & 140. legat, & plura apud Plinium lib. 32. cap. 10. Sed quod in Scythiadibus insulis reperi dicit laudatissimum, & quod

fructum ferat, experientia docet contrarium. Iuxta Album Rhafis collocandum. Quæ enim ex Lythargiro cocto, vel non cocto sunt, non multum differunt ab vnguentis ex Ceruis, & contra. Sed quia minimo paratur, & ut optimi veterum consulumus, hic talia vnguenta apposui, quibus tamen carere possumus: Nam Triapharmacum putamus parandum, quia longiori tempore paratur; quam Lichargyrum Nutritum, differuntque coctura tantum.

e. Corallus.

b *Florum Nymphaea in Græcis exemlaribus legitur, sed facilius & melius Caphura dealbat & siccat.*

c *Crystallum upo fieri ex nive, vel humore conueto celesti docet Iulius Solinus contra Plinium, qui ex nix & Gela fieri scribit, 37. Cap. 2.*

Vnguentum Resatum D. Mesuz vitarunt, candidissimi coloris, commendatissim. q. odoris.

Rec. *Ax: Porci recentis mundatæ a pellendis, opere sit in pila marmorea pistilla ligneo confusa, & assisa aqua fontana mista, deinde & osacea, frequenter tota, quantum vis; cui adde Rosarum rubearum confusum tantundem: Infunduntur in balneo aut loco calido aliquot dies: Postea cognantur & percolentur. Næque Rosa infunduntur & hic labor repetitur; pistilla bene oiterum itidem, ad candorem teritur. Ad suauissimum odorem conciliandum, Lydonicus Myrene gener mens Phormacopæia Regina Anglobritan. artis sua peritissimus & nitidissimus affundere solebat aliquot guttulas Olei stillantis Resaturum, cum aqua simul eluat.*

Magis compositum hoc vnguentum sit additis Caphura, Opio, oleis & succis herbarum ex scopo Medici, sed minus suauis edidit.

Rosa alba si addatur, Vnguenti candoris gratiam debent, Phormacopæia saltem, qui nesciunt, eorum succum inficere colore luteo per ele-ganti ex paucis Alumine.

Vnguentum Pomatum.

Rec. *Auguria hædæ recentis eadem artis lege stilla, lota & preparata lib. 2. Pomorum odoratorum, N. 10. Caryophyllorum, Acori, vulgè Calami ana. drach. 2. f. Iridi Florentina, unci. f. Cinnamon, Nucis Moschata, ana scrup. f.*

Sampfuci,

Samplici, drach. 2.

Cyperilongi, drach. f.

Laurendula, drach. 1.

Contusi omnibus effervescant in vase duplici, addendo sub finem Moschi, q. f. Olei Balsami parum si durius sit, aut Ax; Sville.

Vnguentum Populeum D. Nicolai,
cum expolitione Cordi,

Rec. Oculorum Populi arboris recentium,
lib. 1. f.

Axungia porcinæ preparata, lib. 3.

Oculi Populi contundantur, & macerentur in Axungia, donec sequentes herba colligi queant vere & assate.

Rec. Foliorum Papaveris agrestis.

Foliorum Mandragoræ.

Cymarum Rubi tenerrimum,

Foliorum Hyoscyami,

Solani,

Vermicularis,

Lettuce,

Sempernini maioris,

Bardana,

Uolaria,

Scutnellæ, ana. vnc. 3.

Herba contundantur & miscuantur oculis Populi & Axungie, & dimittantur per dies decem: deinde coquantur supra lenem ignem cum vini odorati sufficienti quantitate, donec vinum consumatur; postea colentur & exprimantur, & expressam vnguentum resonatur.

Mandragoræ folia ubique haberi non possunt, ideo duplex pondus foliorum Hyoscyami samentum est.

Vermicularis vera, est Sempernina minor, linguam non mordet aut,

Bardana id est, Lappa maior, cuius radicem præcipue esse accipiendam Nicolaus Alexandrinus.

Scutnellum, revera est Umbilicus Veneris seu Cymbalaris, & non Kreutzkraut. Folia habet pinguis concava ut Cymbalum, radicem Aro similem: perquam pauci eam cognoscunt.

Contra nimiam calorem valet, & temporibus illis, somnum conciliat.

Tripharmacum sue Tripharmacum Mes.

Recipit Lythargyri acri loti, Aceti, Vini rubri, mordaci, si. ana. vnc. 6. Olei, vnc. 12. coque lento igne ut Diachylon,

Vnguentum Nutritum.

E Xistens paratur Nutritum, sed ducta proportionem, ut

Rec. Lytharg. auri vnc. 2.

Olei communis lib. f.

Aceti vnc. 3. vel q. f.

Agitentur in mortario, lenis oleum & Acetum instillando. Si fiat in mortario plumbeo, erit efficacius.

Vnguentum Psoricum, sine Enulatum.

Rec. Rad. Enulæ camp. coctæ in Aceto,
& confusæ lib. 1.

Axungie Porci,

Ol. communis, vel Rosati, ana. vnc. 3.

Ceræ rosæ, vnc. 1.

** Argenti vivi extincti in Axungia, vel succo Limoni,*

Tebeiath. lotz ana. vnc. 2.

Sal. communis pulverisati, vnc. f. incorporatur simul in mortario, ut decet, fiat Vnguentum.

Nihil autem immutandum fuit. Paratum servetur, quia psoricum est efficacissimum, & pro alijs omnibus hoc sufficit.

Addere solet lib. f. Radicum Lappatij acuti & angere dosim Olei, Ax; porci, ana. ad vnc. 4. & Tebeiathina ad vnc. 2. drach. 6.

aut vnc. 3. Salis ad drach. 6. aut vnc. 1.

** Argentum vivum augetur, aut minuitur. Paratur utem sine Hydragro pro delicatioribus.*

Ad pruritus molestissimum efficacius est addita radice Lappatij.

Addi possunt vnc. 2. rad. Celidoniæ malaris. Quidam miscent vnc. f. Hellebori nigri, aut viriusque Hellebori, ana. drach. 2.

Vnguentum contra vermes.

Q Vanquam Vnguentum Aragon vermes occidat, & deiciat, huius tamen descriptione in apposuitus, ut si paratum habere velint, habeant.

Rec. Ol. Amygd. amararum vnc. 2.

Succi foliorum Persici,

Absynthij, ana. vnc. f.

Farinz Lupinorum,

Cornu Cerui vili, ana. drach. 1.

Aloes Succotrinæ,

Fellis Tauri, ana. drach. 2.

Ceræ, q. f. fiat Vnguentum.

Melius esset sine Cera & Oleum ex Aceto, succo, & felle liquavit, in formam cataplasmati

* Hydragrum illico extingitur ex Terabithina.

malis reducere. Illa quantitas olei vnc. 4. pauca est. Sueci si decoquantur, minus efficaces sunt. Nos in hoc succum Absynthij pro materia substitimus, quia Absynthium magis amarum est.

De EMPLASTRIS.

Quibus oportet Pharmaco-polam nuntium medicamentis, in vniuersum dictum. Inter quæ Emplastra enumerauimus, quia oportet ea reposita habere, quæ magno artificio parantur, ne si quando egeamus, non redi parentur, sicutò parari cogantur, quæ longo tempore debent parari, item quæ certis tantum temporibus parantur, ut Emplastrum ex succis herbarum, parata inuari debent. Adde quod illa diu seruari possunt, nec antiquitate corrumpuntur. Ergo hæc parata habeat, quibus freuentius utatur.

De Diachylone communis
Iohannis Damasceni,

Rec. Muscilag. seminis Fœnigræ.
Succi Lini & radie. Altheæ, ana. lib. 1.
Litharg. puluerisati, a plumbo & scoria purgati ana. lib. 1.

Oleum, lib. 3.
Litharg. & Oleum multum & diu in mortario vel libere pistillo ferreo agitentur, & misceantur. Deinde igne lento coquantur, spatula semper agitando, donec liqueat Litharg. & crassescat. Deponatur a igne & refrigeretur; quo refrigerato, muscilagines leuiter coctæ sensim infunduntur, agitando, donec exactè misceantur, & coquantur. Hinc descriptionem Mæcapposimus, quæ retinenda est, faciliè cum paratur, & satis est efficax ad duros partium tumores, & ad dolores, qui sub costis aut ossibus sunt, nam in alijs ob duritiem dura Emplastra supra partes dolentes externas poni non debent, ut docuit Gal. Auger enim dolorem durius Emplastorum quare in vaquentum dissolui debent. In hoc Emplast. hoc tantum animaduersione dignum, Lithargyrum diligentiissimè conteri debere, ut facilius liqueat, & permisceatur oleo. Purgetur a plumbo & scoria, quia Litharg. ex plumbo conficitur: quare remanet aliquid, quod concoctum non est, & fix siue scoria; quæ partes etiam tandem sanitate in habeant, nihilominus liquari & permisceari non possunt. & qualiter, quod desideratur. Oleum antiquum videtur magis conuenire, medix ætatis, vel reuens, quia magis emollit; antiquum magis digerit. Ex hoc

loco rationem parandi Emplastrum ex Lithargyrio, & muscilag. intelligitur.

De Emplastro Diachyloni Parui, Mæsus.

Rec. Lithargyri vnc. 6.
Ole. a. veteris lib. 1.

Muccag. Pijij, vnc. 4.

Muccag. rad. Altheæ, vnc. 2. fiat Emplastrum, ut supra. Hanc compositionem retinuius, quia sius recipit ad naturationem tumorum calidorum, quamquam, ut supra monstratum est, supra tumores calidos Emplastra minus conueniant ob duritiem: quare melius in vnguentum mutabitur, diluendo oleo violaceo. In hoc parando, quæ supra de Lithargyro & de coctura mucaginum, referre oportet. Oleum vetus expungetur, quia cum frigidis, hoc coctum non debet antiquum indid, quia digerit magis, quam emollit, vel maturat. Illa enim maturant, quæ temperata sunt, vel calorem calori nostro similem habent. Quare simpliciter (Oleum) vel communis legendum est.

a. Communis
non veteris
Rouel.

Emplastrum Diachylum magnum.

Rec. Litharg. tenuissimè puluerisati, & cribellati, vnc. 12.

Oleum,
Chanenklini,
Anethini, ana. vnc. 8.
Muccag. sem. Fœnigræ.
Lini,
Radie. Altheæ,
Ficiuum pinguium,
Pissillarum,
Succi Ireos,
Scyllæ,
Oscipi humidæ,
Glutinis Pissium, ana. vnc. 12. f.
Terebinthinæ, vnc. 3.
Resinæ Pinæ,
Cereæ emulæ, ana. vnc. 2.

Lithargyrum cum oleo decoquatur lento igne, spatula leuiter agitando, donec coagulentur. Muscilagines misceantur, ut supra dictum est, & ubi crassitatem acquisuerint, supra inarmor imposito, nigdaleones formantur. Hæc compositio tam frequenter usurpatur à Medicis ad emolliendum, ut nullo modo carere debet Pharmacopola. Quæcunque dicta sunt superius, in alijs obseruanda, & præter illa, hoc quoque animaduertendum, quod sueci Ireos & Scyllæ sub finem imponendi, quos absumere oportet, priusquam Terebint. adijciatur,

adiciatur, quæ etiam diu decoqui non debet, vt nec Oclipus, nec Ichtyocolla, siue glugen Piscium.

Dyachylon cum Gummi & Ireatum.

Quidam supradictis aliqua addiderunt ad aliquas affectiones curandas, vt Irideni, & appellant Dyachylon Ireatum ab Iride dictum. Est autem talis proportio.

Rec. Dyachylonis communis, lb. 1,
Radic. Iridis, vnc. 1.

Malaxantur cum oleo Liliorum. Tale est Ireatum. Est aliud, quod appellant Dyachylon cum Gummi, ob lachrymas, quæ adduntur, respondens Emplastro è Muccaginibus.

Idud cum Gummi, incerto authore siue è Muccaginibus apud P. apostolum.

Rec. Muscilag. rad. Althex,
Sem. Lini,

Muccag. medianæ corticis Vini, & Fœnigr. ana. vnc. 4.

Ol. Chamæmeli,

Liliorum,

Anethi, ana. vnc. 1. f.

Ammoniaci,

Galbani,

Opoponacis,

Sigapeni. ana. vnc. f.

Cerepouz, 4. drach. 20. a. 2. Cardus

Croci, drach. 2. habet vnc. 15.

Terebinthinæ, vnc. 2. cum gummi in vino dissolutis fiat Emplastrum.

Illâ descriptio est Emplastri è Muccaginibus. Differunt tantum in dosi. Post Emplastrum analætica reponendum est Emplastrum Cheroneum, & Oxicroceum, & Emplastrum de Meliloto.

Emplastri filij Zachariæ Mesuræ,
apud Pizpositum.

Hoc Emplastrum subinximus, quia sæpè à Rondellis prescribatur ad tumores acres scirrhusos bapatis, uteri, musculorum thoracis aliarumq; partium & iuncturarum.

Rec. Cereflua,
Medulla cruris Vacca,

Adip. Anatis,

Galina,

Muccaginum } Sem. Lini,
Fœnigraci,
Rad. Alibea,

*Oesipi dumida,
Ichthyocolla, singulorum partes æquales,
Oles Kyrini, & è semine Lani, ana. q. f.
Fiat ex arte Emplastrum aut Ceratum.*

Emplastrum de Meliloto Mesua.

Rec. Meliloti, vnc. 6.
Florum Chamæmeli,
Seminis Fœnigr.
Baccarum Lauri,
Radic. Althex,
Samplici,
Abinthii, ana. drach. 3.
Cardamomi,
Sem. Aphj,
Iridis,
Cyperi,
Siccæ Nardi Iodice,
Xylo-Cassæ,
Amicos, ana. drach. 2. f.
Ammoniaci, drach. 10.
Styracis Calamitæ,
Bilebi, ana. drach. 5.
Terebinth. vnc. 1. f.
Ficuum pinguium, numero 12.
Sem. Capriui,
Resinæ, ana. vnc. 2. f.
Ce x, vnc. 6.

Ol. Samplicini, & ol. è Spica 4. q. f.

Infundantur lachrymæ in aqua, in qua melil. Fœnigr. Chymionula incocta succint. Fiat Emplastrum. Huius nonnisi multæ sunt compositiones, sed vix 2 nam alia est apud Gal. alia apud Trallianum. Quia verò illa Mes. comprobata est, illam proposui descriptionem. Hoc autem difficultatis inueni, quod alij legunt Cardamenum, alij Cardamomum, quanquam vtrunque calasciat. Non satis constat inter interpretes, quid sit Cardamenum Arabum. Certius erit ardamonum accipere, quanquæ negant illud Diosc. esse, de quo alio loco dicemus. Alij parari sic volunt. Ficus coctas per setaceum mittunt, vt grana separentur, Lachrymas non in decoctione, sed in b. oleo liquant. Deinde Ceram post Terebinth. Postquam refrigerit, odorata tenuissimè trita permiscunt. Radices Althex & ficus vna prius decoquunt.

a. Nardi Mes. vna è Spi. a Lavendula, vt abnti phlegm Pharmacopri.

b. Alium modum vt A. A. aut vino albed. soluant.

Emplastrum

Rec.

Mastiche, vnc. 4.
Olibani,
Ladani, ana. vnc. 3.
Myrridarum,
 2. *Foliorum vel seminum Lentisci* im-
 maturorum, ana. vnc. 2.

Sumach,
Hypocistides,
Acacia,
Rosurum,
Boli Armeni,
Terra sigillata,
Meniba sicca,
Absynthij,
Sampuci,
Anthos, ana. vnc. f.
Galla Moschata, drach. 2.
Resina,
Cera alba, ana. lib. 3.
Terebinthina, lib. 1. f.
Pici nautalis, vnc. 8.
Olei Lentiscini,
Nardini Ales, ana. vnc. 3.
Misce, fiat Emplastrum ex arte.

Emplastrum è Mastiche Monspelienſium de-
 ſcriptum à D. Iouberro non adeò diuerſum;
 ſed ponderibus varium.

Rec.

Mastiche, lib. f.
Thuris,
Ladani, ana. vnc. 5.
Foliorum Lentisci,
Myrti,
Myrridarum, ana. vnc. 4.
Sumach,
Berberis,
Hypocistides,
Acacia,
Rosa ura,
Santalum rubri,
Boli Armeni,
Terra sigillata,
Meniba,
Galanga,
Cypero,
Coriandri,
Xylostei,
Cinnamomi,
Cimini aceto infuſi & ſoliti,
Absynthij,
Sampuci,
Florum Roſmarini,
Galla Moschata,
Terebinthina,
Pici nautalis, ana. lib. f.

Resina,
Cera, ana. lib. 2. f.
Olei Masticum,
Nardini, ana. parum.
 Fiat Emplastrum.

Qui vnum horum habet, poteſt cavere Empla-
 ſtro pro matrice.

Negleſſoſimèter Caryophyllos aromaticos qua-
 rum ſequencia ant bina uncia addi poſſunt.

Pro Oleo Lentiscino ſume Olei Masticum &
 Cydonitis in ſigidis regionibus que Lentisco ca-
 rent, ana. partes a ſuales.

Emplastrum diuinum Nicol Praepositi.

Rec.

Lithargyri, lib. 1. f.
Lapis Magneti, vnc. 4.
Ammoniaci, vnc. 3.
Bdellij, vnc. 2.
Galbani,
Myrrha, ana. drach. 10.
Olibani, drach. 9.
Opopanacis,
Mastiche,
Aristolochia longa, lib. 1. f. Cleusaticis.
Viridis erui, ana. vnc. 1.
Olei cominum, lib. 1. f.
Cera, vnc. 8.

Lithargyrum puluerizatum in mortario aut
 lebeſte oleo permixtum coquatur. Ammonia-
 cum & Opopanax diſſoluantur, & liquentur,
 & colentur, quæ cocta Lithargyro & lique-
 factæ Cera miſceantur, ſpatula agitando.
 Myrrham, Olibanum, Maſticum, Aſtolo-
 chiam, & Magnetem in pul. tecta ſeuſim
 permiſce. Formentur magdaleones. Hoc
 Emplastrum præparandum ob vires egregias
 & diuinas. Non multùm à Cheronco diſſert:
 quare ſi paratum non habeatur, addendo Ari-
 ſtoloſchiam & Magnetem, ſimile redditur. A-
 riſtoloſchia longa vſurpanda eſt, vel rotunda.
 Pro Bdellio, Propopolis vſurpanda. *Ulcerni-
 bus malignis vtile.*

Lud. Myrreri.

Emplastrum Opodeltoch Germanorum,

Ob inſignes & Diuinās dotes quibus hoc
 Emplastrum Teutonica lingua conſcrip-
 tum polles, cuius uſus apud ſuperiores Ger-
 manos increbruit; operæ precium duxi
 huic Emplaſtro Diuino ſubnectere &
 Poſſeruatilatinè vertere.

Emplastrum vocatum Opodeltoch non
 immerito habet primarias, tanquam Em-
 plaſtrum

plastrum generale aut vniuersale ad omnia vulnera & fodicatiões, quod (ceteris sanationis causâ) omnia accidentia præcauet. Et quamuis laboris & studij multum requirat, in compositione; tamen consideranda cõpensatio, quod eius semi-vncia plus præstet quam decem semiluncie Emplastri fodicationum, quæ etiam secundum meam descriptionem sint bona, huic tamen non conferenda: qui vero huius voluerit esse compos, necesse est plurimum in iterum cognitione esse expertum artificem.

Itaque hoc modo para.

Rec. Cera Virginæ, lib. 2.
Terebintina turbida lib. 1.
Olei oliuarum, vnci. 3. liquefiant simul & adde
Succi Chelidoniz,
Succi foliotum Quercii,
Succi Saniculæ, & Veronicæ, ana.
vnc. 1. f. coquantur ad liquorum consumptionem: postmodum adde
Guthni Ammoniaci,
Galbani,
Opoponacis, Aceto solutorum, ana.
drach. 6.
Succini, vnci. f.
Colophoniz, vnci. 1. f.
Masticis,
Mithæ,
Olibani,
Sarcocollæ, ana. drach. 3: subigetur omnia cum Emplastro rudicula mouendo: cum refrigeratum fuerit, misce Lapis Magnetis præparati, & in tenuissimum puluerem redacti, vnci. i. f.
Crocii Martis, vnci. 2;
Crocii Veneris, vnci. 1.
Tunæ perpratæ, vnci. 3.
Lapis Calaminæ præparati, vnc. 10.

Hæc omnia tandem cum Emplastro miscantur, & cum propemodum refrigeratum fuerit, adnuce retez rubæ Virrioli dulcis tatum quantum opus est ad colorem ex rubro purpureum inficienduni. Tunc exihte, malaxa & fac magdateones; reserua vsui.

Ita coquas, vt modicè calefactum, cum vi volueris, mollescat: alias vero cum frigidum est, non facillè malaxari aut leniri potest, sed vi viuenti frangitur.

Hoc Emplastrum cicissimè carnem superfluan suppressit, & ad cicatricem perducit mala præcauendo accidentia.

Præparatio nonnullorum ingredientium in

præscriptum Opodeltoch, & primo Maguetis.

Magnes sic præparatur, Recipe Magnetem, redige in minutissimum puluerem: pone in crucibulum, vt ignescat; & sic ignitum in dulcificatum Oleum Martis ad æquales partes infunde, & igni moderato admoue donec excicetur; sic habebis Magnetem præparatum, cuius vnci. f. plus quam erudi lib. 1. efficit.

Oleum Martis ad hunc usum simpliciter sic paratur.

Rec. Aluminis, lib. 1.
Salis communis, vnci. 4.

De illa aquam, ex qua humectetur Ferrum limatum sæpius in die, & sic rubigine obducatur, quam diligenter abluas, & aquam euaporare sines, vsq; dum oleagrosam habear substantiam, quæ altera destillatione dulcis fit, reposita destillatione & euaporatione; Tunc habebis Oleum Martis ad hunc usum aptum.

Lapis Calaminaris sic præparatur.

Rec. Lap. Calaminarem redactam in tenuissimum puluerem; pone in crucibulum, & candetæ & feruidum effunde in ollam optimo Aceto seniplenam, & illico cooperiat illa donec Calaminaris extingatur. Postmodum leuiter & ex ædè effuso Aceto Calaminarem iterum inijce in crucibulum & ignitum denuò effunde in idem Acetum: postmodum tutius ignescat, & refrigeratum vsu lectu.

Tutia præparatio.

VNo eodemq; modo Tutia vti lapis Calaminaris præparatur: sed loco Aceti qua sceniculi aut Chelidonij tumenda: Nam Tutia aliud nihil est quam fumus seu fuligo adherens ferreis virgis supra furnum in quo cupiunt funditur.

Crocii Veneris præparatio.

Rec. Cupri laminas tenues, quas immittet in ollam & cum sale communi stratum supra stratum: in ignem vt candescat immittantur. Postea effunde Laminas vna cum sale in aquam frigidam, quas Laminas abluas diligenter ab omni nigredine, & de nouo adde recentem saltem & in olla ignitas, in frigidam infunde, vt prius lata & hoc reitera

quantoties volueris. Postmodum accipias aquam in qua abluiſti Lamiuſ Cupri, & adde bonam quantitatem aquæ calidæ, & tandem leniter effunde : inuenies Crocum Veneris in fundo, ſanguini inſtar ruberrimum, quem optime abluas, donec nulla amplius ſalſedo percipiatur, & panno lineo optime ſicca & diligenter uſui ſerua.

Croci Martis preparatio.

Multi faciunt Crocum Martis cum ſale; nonnulli cum urina, aliqui ex Aceto, alij alijs quia ferrum in rubiginem conuertunt; ex qua rutigine poſtmodum Crocum Martis hoc modo faciunt: cum ferrum plane in rutiginem conuerſum fuerit, inſidunt in crucibulum & reuerberant, aut iâ diu candefaciunt, donec alium colorem aſciſcat: hoc autem modo fieri non debet, quia ſal non ſeparatur illa ratione ideoq; in Medicamentis eſt inutilis: oportet autem abſque omni rubigine, & ſine vlla additione ſalis paretur; quod hoc paſſo fiet. Recipe ferrum abſque omni rubigine tenuiſſimè limatum: pone in reuerberatorium longû, & igne fortiffimo in quarto gradu reuerbera, per diem & noctem, donec colorem rubrû acquirat; poſtea exiue & cum refrigeratum fuerit, inijce in orcam plenam aquæ, & agita fortiter ſpatulâ, & ceſſerime reſunde in aliud vas: ſic omne ferrum in primi vaſculi fundo reperies; quod nondum ſatis reuerberatum fuerit abijce; id autem quod cum prima aqua tranſiit ſerua, & pone ad ignem, & euapora donec ſiccum fiat. Euapora (inquam) nec reſunde, ne forte virtutem ſtipticam ſimul auſietas. Hic eſt modus optimus parandi Crocum Martis.

Terræ vitrioli ſic para.

Rec. Vitrioli quantum voles, inijce in ollam & pone in igneum circulum, vt planè ad rubedinem calcinetur, cum omnino rubrum fuerit, fundatur in aquam, ſtet per diem & noctem, poſtea effunde aquâ clarâ & aliam affunde, & ſic vt ante, idq; toties reſepte, donec nullam amplius acredinem in ea reperias; ſed aqua dulcis remaneat. Tunc exicca, & habebis Terrâ vitrioli efficaciorē in vulneribus virtutem habentem, quam Bolus aut terra ſigillata.

Lud. Myrræns.

Emplaſtrum ad Callos pedum efficax, acceptum à C. D. D. Jacobo Cargillo Scotto.

Rec. Gummi Ammoniaci Aceto ſoluti, vnc. i.

Vitrioli Romani,
Calciſ viuz, ana. drach. 6.
Viridis Aeris, drach. f.
Auripigmenti,
Canharidum, ana. drach. i.
Ceræ nouæ, vnc. 4.
Olei Chamæmelini &
Euphorbij, ana. q. ſ. fiat Emplaſtrum.

Emplaſtrum Ceroneum Nicol.

Rec. *Picis Naulis,*
Ceræ, ana. vnc. 2. drach. 3.
Sagapeni, vnc. 2.
Ammoniaci,
Terebintina,
Colophonia,
Croci, ana. vnc. i. drach. 3.
Aloes,
Thuris,
Myrræ, ana. vnc. i.
Opoponaci,
Syracæ,
Galbani,
Maſtiche,
Alumini,
Famæraci,
Syracæ rubræ,
Edelley,
Lithargyri, drach. 2. ſ.
Fiat Emplaſtrum ſecundum artem.

Emplaſtri contra Rupturam prima deſcriptio.

Rec. *Picis naulis,*
Aloes, ana. vnc. 3.
Litharg.
Ceræ rubræ,
Colophoniz,
Galbani,
Ammoniaci, ana. vnc. 2.
Viſci quercini, vnc. 6.
Gypſi,
Vitriusque Ariſtolochiæ,
Myrræ,
Thuris, ana. vnc. 6.
Terebint. vnc. 2.
Vermium terreſtrium,
Gallarum,
Vitriusque Conſolidæ,
Boli Armeni, ana. vnc. 4.
Sang. Draco. lib. i.

Extat alia deſcriptio, quæ dicitur de pelle Arietina Arnaldi de villa noua, ex lib. 2. cap. de Crepatura, quæ magis ſiccatur, & conſtringit,

git, & melius ordinatur. Magis mihi placet illa descriptio, quæ recipit.

Emplastrum à pelle Aristina Arnaldi de Villanova.

Rec. Lithargyri auri,
Lapis Hematidis,
Sang. Draconis,
Boli Armeni,
Mumiz,
Galbani,
Thuris,
Lumbricorum terrestrium, ana. drach. f.
Picis navalis,
Colophoniz,
Cere albæ & rubr. ana. drach. 1.
Rad. Consolidæ maioris, minoris & mediz,
ana. drach. 3.
Ros. rubr.
Myrriz,
Aloes, ana. drach. 4.
Stellæ marinæ combustæ,
Gallarum combustarum,
Aristolochiæ rotundæ, ana. drach. 6.
Visci Quercini,
Terebinthinæ, ana. drach. 3.

Sang. hominis rufi, lib. 1. ininus quarta. Conficiatur hoc modo. Pellem Atticain recentem extraham seu excorticatam cum pilis coque ad dissolutionem. Collaturæ lib. 2. misce Viscum Quercinum dissolutum, cum spatula stagnæ agitur, deinde Cera, Picē, Colophoniam adde. Anmoniacum, Galbanum dissolvantur in aceto, & coeantur. Addatur deinde pul. aliorum; vitino loco odorata, & quæ minorem calfacientiam & calorem ferre possunt. Postremò Terebinth. sanguis perniscentur, Vermes in vino cocti & diligenter triti commisceantur; coquantur, donec non inquinent manus, manibus inunctis oleo Ros. vel Cytoniorum, non Violaceo, ut vulgus facit. Malexentur, fiant Magdaleones. Ego taurinum mutavi, quod legit Palleam, Marinam Stellam legendum, quæ est ad id efficacissima. Quod sanguis hominis rufi legit; censerem potius hominis pituosi legendum, qui sanguinem viscosorem & tenuiorem habet. Satis ficeant alia medicamenta, sed parum tulerit. Nam oportet accipere sanguinem eorum, qui truncantur capite, in quo fuit venalis & arterialis, & sic est satis ficeus & viscosus, & hæc satis de Emplastro contra rupturam.

2. De Cera à Pelle Aristina, inter Cerata discernimus.

Emplastrum à Stella marina ad Hernias, præciosos nervos, & musculos glutinandos L'Obelij.

Cum animadvertere omnes, perperis Nicolai, Villanovani, & Guidonis Ceratis, aut verius ad Hernias Emplastris variare; & doctissimos quosq; similes descriptiones ex siccanibus aut glutinantibus dare: visum fuit subungere aliam, quæ sepe feliciter usus sum, eoque aliquoties dispensandam procuravi: & hinc ita duxi, quod etiam egregius, industrius & fidus vir Thomas a fessa, sine fossanis Pharmaceutices apud Midelburgenses Zelandorum callentissimus paravit. Optima sive mixtura proportionis & corporis moderaturæ, crassitie aut crassamento, ut artis verba visum. constitum; nonnullarum præscriptionum Rondelii imitatione, ex copiosis Stellis marinis, loco Palse, aut Pila marina, in Cerato sine Emplastro & Pelle Aristina Arnaldi Villanovani; optima lege, ratione & siccandi dote humidas relaxationes, suppositis.

Rec. Radicum Consolidæ maioris recentium, unc. 18.

Malicij, unc. 12.

Radicum Nareissiacentium, unc. 10.

De coquantur ad molliem aut dissolutionem in partibus duabus sufficientis quantitates vini rubri tartini, & una succi Cybeticum, aut vini Cydonis, sequentibus balneo occluso. Refrigeratis; coeantur, tandem, & cribrentur, quibus adde mucaginem, sine Glucen sequentia Ictiocolle, prius incisa minutim, infusa itidem balneo & eliquata in colatura prædictarum radicum Symplicium maiorem, deinde colatam & solidiusculè excolim. Adde vinum si Colamen non sufficit.

Visci aucupatorij à corticibus radicum Agrifolij, vel querno aut Pyrastri Visco paratis, unc. 6.

Postea admisceto infra scriptam succatamentum: quæ

Rec. Rhiz Coriariarum,
Malicij, ana. unc. 12.

Radicum Pentaphylli,

Tormentillæ,

Bistortæ are-

scularum.

Fabrarum torrefactarum,

Nucum Cupressi,

Myrtillorum,

Rubia struthium,

Seminis Nasturtij,

R. Aristolochiæ Clematis,

Seminis Psyllij, ana. drach. 10.

M 3

Continu

Contundantur, leniterq; effervescant in vini rubri tortini aut nigri astringentis partibus duabus & una Aceti Rosati, vel succi Cydonitis, Balneo, vitro aut alio vase lapideo, optimè clauso. Omnibus praelibatis, discoquantur molli igne in Balneo donec concreverint Electarij solidi instar. Quibus omnibus addo peraltis

Terebinthina clata, vnci. 3. vel q. s.

Piciæ navalis, vnci. 15.

Colophonia, vnc. 7.

Galbani,

Anomiaci dissolutorum in vino,

Myrrha, ana, vnc. 2.

Pulveris Stella marina vitulata clibani, vnci. 9.

Pul. Boli albi, vnc. 3.

Pul. Eapidis Calamularum sexties candefacti & Aceto extincti,

Sanguinis Draconis, ana, vnc. 1. s.

Pulveris Olibani,

Lythargyri aurei loti,

Mastiche,

Sarcocolle,

Alleti,

Pissae phali,

Scoria ferri aceto preparata,

Succi Herniaria, aut saltem Polygami extracti ex vino rubro & densati.

Hypocisti, ana, vnc. 1.

Pici prius liquefacta cum Colophonia, addo Terebinthinam, Ichtyocollam Visco permixtam; omnes pulveres paulatim adijciendo assidueq; mœuendo.

Quandoquidem hoc aut similibus frequentissimè non modo optimi virtutis Medicis in remedijs ad Herniam; verumetiam aduersus varios vteri affectus; etiam ligamentorum relaxationem, alia-

rumq; partium; renum, venaarum, arteriarum, nervorumq; dilataciones & desiccationes inde natas arcendas, ut in dentium doloribus hanc descriptionem consilio dedi. Quotiescunq; maiore astringitione opus est, solens boni & praelari practici irrigationes Aceti Rosati (embrocationes vocant) aut irrigationes ante usum huius Emplastri aut Comitissæ Cerasi præscribere; tamen quia acetum nervosum genus infestat, inbeo Chylaria simplicium huius Emplastri ex vino astringente elicenda, diluto aquâ Chalybeatâ, quotiescunq; calorem veremur: Obijci verò potest, Acetum Rosatum, aut Acetum ex vino atro, crasso, sortiuoq; paratum, magis astringere, deussare & contrahere, quam penetrare. De Aceti vtri diffinitione & vtilitatissimè diximus, Capite de Iride Illustrationum Sterpium, & Adversariarum altera parte:

Tantum commendatur Filix florida, Osmunda vocata, à posteris, quantum Filix vulgaris à Lucio Apuleo ad vulnera, puerorum ramorum & splenam, iam pota quam almona. Liberum itaq; erit, si placet, vnci. 2. aut plures Radices Osmundæ, si copia adsit; aut alterius, si desit, huic Emplastro inferere.

Emplastrum ad Herniam apud Ferneliq; recepitur potenter quidem exiccantia, sed pondus, quantitas aut numerus agglutinantium unus est quam par est ad Peritonei Rupturam, Herniasuè (barbarè Crepaturas vocant) agglutinandas: ideo agglutinantium quantitatem & numerum auximus, ut radici Symphiti & aliorum, additis radicibus Narissi, qua Dioscoride teste & experientiâ, præcisos nervos illam glutinant: & vti radices Liliacea cum melle delecta, nervis præcisi, luxatisq; medentur.

Stella marina Indica reticulata.

Miranda Dædala Natura, inter mille Conchitarum variorum eolorum, Pisciumq; generæ & Zoophyta, elegantissimam Stellam marinam, quinta à Rondellio obiter descripta congerem, reducibus ex Orientalibus & Occidentalibus Indis, ad solum nativum Batavis nauculis nobis largita est: in quinque angulos, ramos aut radios à medio partitam; pedalis & amplioris magnitudinis, prominente medio tergo quatuor digitorum eminentiâ, minimè ut ceteram planam, elegantissimè reticulato & multis verruculis per variis & quamplurimos versus asperiusculo: aversa verò parte à medio depresso ore & centro per medium ordinibus quinque gemino situ scellatis, denticellis crebris, una cum lunari marginibus, stipatis: cetera totaq; Stella faciet verruculis

conspersa est, ordine pulchro, admirando Naturæ spectatu dignissimo lusu; testacea concretione.

Stellas marinas vti plerasy, Plautus in usum renouavit exercitissimus in rerum cognitione & summi practici Rondellietini, ad Hernias sequenti formula Remedijs.

Rec. Emplastri epelle Arietina, vnci. 4.

Stella marina,

Blatta Bycæntia

ana, vnci. 1.

Pul. Mastiche,

Gallorum,

Malicorij, ana, vnc. s. malaxentur ex oleo Hyperici.

Fonatur pars sepe decocto radicum Symphiti maioris

Emplastrum de IANVA.

Rec.

Succorum { *Apij,*
Plantaginis } ana, lib. 1.
Betonica,

Emplastris,

Cera,
Picis } ana, lib. s.
Resina,
Terebinthina,

Fiat Emplastrum.

Galli ceteras Nationes excellunt in parandis

Succedaneorum Collectanea L'Obelij aucta &
 recognita, ex classis authoribus, imitatione Rondeletij,
 è cuius fragmentis & prælectionibus ferè
 decrepta fuerunt.

Rondelet.

CVM attentiore lectio animaduertissem vulgatum Succedaneorum libellum, quem nonnulli Galemi abj Paulo acceptum ferunt, scatero moras, & plerisq; locis mutilum esse: vitio qui ex Graeco in Arabicum, & de Arabico sic deinde Latine versus, aut potius peruersus, à Mauro quopiam, vel Mauro-græco, qualis fuit & Altiarius: visum fuit, quæcumque Dioscorides, Galenus, Aetius atq; Paulus literis mandassent, expurmentaq; tam veterum tum recentiorum confirmassent, seligere, eaque sic digerere, ut quid alteri cuius æquipollens, studiosi in posterum patres.

Hunc autem libellum neoterici cuiuspiam esse, vel id plura facit arguit, quod nonnulla addita inibi sint, quæ Galeni tempore ignota fuisse, uti Anacardis, aliæq; complura, nullo tamen ordine aut delectu, ac sine indicio. Vi, quod fortè Chamaelini legerant alicubi, nominis decepti affinitate, Martium subdiderunt, quàm insectis nullus est qui ignoret: illud enim laxas & moderatè calfacit, hoc verò refrigerat astringitq;. Eadem inoperta, quod fortè Cyparum Portulacæ similem la-gissent illius vires huius facultatibus responsuras putarunt. Itidem Leporè summatillem Cancris loco usurpari, vel, ut alius quispiam correxit, marinum, iudicellè, ut qui ignorasse videatur Cancrum alimentum & antipharmacum esse, Leporem verò vel odore solo vomitorium & venenum. Nec hoc falsum solummodo, at & discriminis plenum, cum loco Opobalsami Opocarpation substituit, quod venenum frigidum est Dioscoridi, vinog; uti Cicuta, expugnandum, teste Gal. lib. de Antidotis. Verum si hic Carpasum legamus, vera fuerit lectio, est enim tenuissimum partium. Cinnamomo item Eben rubrum respondere nequit. Neque placet ordo seriesq; collationum: nam olea oleis, non resinas aut aquis sunt conferenda, ut, quoad eius fieri potest, sint simillima. Deinde si non licet ex specie proxima, saltem è genere, cum abundamus probe remedijs. Nec parvi faciorem-gium ubi nascuntur proprietates, veluti Cretis-

carum Plantarum, quas Italicis efficaciores putos, nisi retorrda admodum fuerit ætas; quæ desiciente alimento Plantas tabefacit: itum enim Polia Italicum aut Stachas non cedunt Cretico aut à Stachadibus insulis.

Imperitia fatua est, substituenda præcipere variobus inuentu, ea quibus caremas, aut a dulcorata, ut loco Cinnamomo, Anomum. Iusania itidem, ubi abundamus lactuca, Opocarpation optare, Licuerit tamen, si qua sint rariis obuia aut minus trita, eorum loco usurpare viribus similia, uti Terebinthina vera loco, Lentiscio esinam, quia frequentior est.

Cum autem Succedaneis vti non rarè cogamur, nec enim omne fers omnia solum, nec vbiq; medicamenta opportuna occurrunt: (rursum enim de quædã sine facili parabilibus utendum: & cum medicamenta necessaria ad repentinis casus ad manum minimè sint, presentibus utendum) eligenda erunt quæ nostris simplicibus substitui possunt, ut Galenum fecisse legimus, cui Euphorbium cum ad spicula, aculeos & infixa eximenda deesses, ex alnetijs: Propolis pro Euphorbio solida successu usurpauit.

Succedaneorum verò usus hodie magis est necessarius quàm vquam fuit; cum multis quæ antiquis in regionibus suis exortiuis & exorticia diues & uber prouentus sufficiebat, hodie carceramus, tum suppositicia: Hebraeorum & mercatorum vastro ingenio adulterata transuectantur, quæ si reijcienda, alia substituere necesse est. Ad hac pleraq; prisca simplicia medicamenta exoleta antiquis notissima & vtitissima, hodie ignorantur.

Per multa Arabibus excoctata & vitios inuenta compositiones, efficacissimæ, remedia in vsum recepta, quorum simplicia barbarie vocum nobis prorsus ignota sunt. Quid enim nominibus illis barbaris significare voluerint, nescimus, aut illis caremus. At in Succedaneorum delectu & usu, pessima illa medicorum consuetudo merito reijcienda, quæ iam à multis annis inualuit, magno agrorum incummodo; quæ in compositione re-

mediorum

mediorum omnia quæ commendata sunt vel ad morbum, vel ad partem affectam, vel aliquod symptomata, congerunt temere; & cum omnia similia usuperant, haud habent amplius quod pro ea herba aut medicamento substitui possit. Quod si una, duabus, vel tribus herbis contenti essent; nunquam succedaneo desisteretur pharmaceutum. Sin autem quantitas necessaria foret; pro manipulo adde duos, pro duobus tres vel quatuor. Hinc duo consequentur commoda: certior medicamenti operatio, facilius & citissima preparatio; pluribus remedijs & succedaneis summo artis Medica ornamento abundabit medicus, cui iterare, immutare, supponere pharmaca licebit, & plura quam vulgus Medicorum & Clinica facere. Vt si in suo decocto Boraginem praescribas; ea si defuerit, Angustifoliam agrestem substituere vel contra: si Scariola defuit, succum substituere vel serapum licetbit; si Cichorium, Dens leonis, vel Endivia: si Chamapitys, Chamadrys substituantur, si desit, vel contra. Sed quid facies, si omnia congerantur in uno eodemque medicamento? certe nihil aliud eris, quam poeticum illud chaos.

Illud Villanovani ante oculos voluunt, ubi in promptu habentur simplicia, dolum esse si quis compositum utatur.

A prima igitur consuetudine recedunt, & illas tanquam scopulos vitent; & caveant item malos anaroi, improbos, indoctos, impudentes pharmaceutos, & Circulatores, qui nummi & lucri rapaces, sarraginem medicamentorum etiam semipitridorum inter se pugnantium collaudant. Quidam hoc faciunt ut copiam ostendant, vel ignorantiam, vel superbiam; & aliqui docti, ne videantur inremediorum cognitione minus exercitati.

Blaces quidam Medicastri impostores nobiles, populares aggras, bistrionesq;, Hippocratici, Avicennæ Antreoli Theophrasti aselli, (cuius tamē documenta vix summis degustarunt labris, quique magistri prudent, quomodo neque agnoscere, neque suscipi audient, ne apud doctos & vulgus, ob circulatorem, qui falso discipulos Theophrasti se gloriantur, illud solum & technas mali audiant) ementiam, irrationalem garrulam pertinacem perfrectæ fraudis impudentiam mordicus unam phibisophiam efficiunt, oblitterant & pro sua ostentant; Panacea sedâ unica siue decocto parato ex omni confusa barbarum etiamq;, deleteriis, nullius delectolus, inter se ex diametro pugnantium, maligna & infusa sideratione collectarum sarragino, addita Senâ, Cinnamonom, Saccharo & huiusmodi ad saporis gratiam, pro vniuersali omnium humorum aili medicatricum & obstetricum coiberti notissimo, freti & contenti, ad omnes morbos, quos Aristotelici & Hippocratici sectatores incurabiles iactitant, à se viginti quatuor ho-

rarum spatio percurari posse illicò utique & vbini pollicentur; imposturi à, supinâ audacia & gonatonica adulatione, nullis interditijs aequi noxijs & quibus morbis foveantur edulys.

Huiusmodi sanè homines potius sentitâ digni, quàm patris & temporis iacturâ in describendis illorum ineptijs, mendacijs & imposturis: In illos sanè Reges, leges, & Medicorum celeberrima collegia deberent animaduertere, & ex Republica propellere; doctos autem viros fovere & erigere; qui pro dolor hodie multis locis pereunt, & haudquaquam ab improbis & indoctis logodadulis famulidicis discernuntur.

Potro cum sint quadam compositiones vitiles priscis medicis excogitatae, experientia & ratione receptæ & comprobatae, nonnullis succedanea inuestigare, agnoscere, & sufficere oportet, ut parari possint nobilissima pharmaca, quæ ea ratione minimè excludenda & rejicienda: cum non tanta infelicitate succedanea quædam illi non inferiora interdum aequè bene expleant omnes pollicitationes gennini medicamenti.

SUCCEDANEA, QUANTVM FIERI
potest, eiusdem sint generis
& speciei.

Rondel. Herba pro herba.
Radix pro radice.
Flos pro flore.
Semen pro semine.
Succus pro succo.
Lachryma pro lachryma.
Resina pro resina.
Mucago pro mucagine.
Metallum pro metallo.
Lapis pro lapide.
Terra pro terra.
Pix pro pice.
Axurgia pro axurgia.
Medulla pro medulla.
Anis pro ane.
Serpens pro serpente.
Pars animalis pro parte.

COMPOSITIO PRO COMPOSITIONE.

Pulvis pro pulvere.
Trochiscus pro Trochisco.
Opiata pro opiata.
Electuarium pro electuario.
Pilula pro pilulis.
Eclegma pro eclegmate.
Tabella pro tabella.
Confectio pro confectio.

Conservatio

Conseruatio pro conseruatione.

Syrupus pro syrupo.

Emplastrum pro emplastro.

Oleum pro Oleo; sine simplex, sine compositum.

Unguentum pro unguento.

THEOREMA VNIVERSALE VEL
COMMUNE.

*Medicamentum quod substitui debet, sine inter-
nis, sine exter-
nis conseruare
debet.*

*(Variis oculis, mani-
festis, & consuetis.
Sic etiam simile in
Sapore,
Olore,
Estate,
Natalitij & regione.
Natura & temperamento.*

Nonnulla in externis remedijs supponuntur;
quibus in internis uti non licet: ut succus Carpa-
thi substitui potest pro Lactuce succo in externis:
cum iam venenatus sit, non introsumitur.

Non tamen simplex; sed aliqua partes substitui-
untur.

Ut Mucago seminis Psyllij pro mucagine
seminis Cydoniorum: non totum semen, quia pars
interior temperamento differt à mucagine, & ve-
nenata putatur. Neque etiam Cydonum malum
conuenit pro semine suo; quia viribus & consi-
stentia differt.

Formula quaedam in quibusdam remedijs sibi
mutuo succedunt, ut

Conseruatio, pro syrupo eiusdem simplis, fructus,
floris, vel radicis.

Conseruatio Capillorum Veneris, pro syrupo in-
opiata substitui potest: Sed in syrupo consistentia
non potest, quia remedijs formula non patitur.

Pro liquidis liquida substitui debent: quare
deficiente syrupo, aqua vel herba decoctum substi-
tuatur.

In quibusdam conditis supponere licet syrupum
conseruationis; quia in syrupo conseruatur. Ut
syr. Conseruationis Citri, pro syrupo à corticibus
Citri. Syr. Conseruationis radicis Buglossi, pro
Syrupo Englossi.

Emplastrum item pro unguentis uti licet; &
contra, modo pars effusa asseniat, ut Empla-
stro sibi Zachariae, pro unguento Resumptiuo; &
Resumptiuo pro emplastro. In thoracis verò af-
fectibus, nisi dissoluantur aut malaxentur, non v-
tendum, quia emplastrum imposita dilatationem co-
stis & respirationem impedit.

Emplastrum è Cernisa, pro unguento albo, nisi
inflammatio probentur; quæ neque dura, neque
grana scire potest.

VARIA ALIA MEDICAMEN-
TA PRO ALIIS SVBSTITVERE
licet, modò vires correspon-
deant.

Pilula pro confectiionibus: & confectiiones pro
pilulis, ut
Hiera simplex pro Pilulis de Hiera & Benedi-
cta: & contra.

Et pro pilulis pituitosis; Electuarium Diacar-
thami; de Citro solutivum.

Pro bibosis, Electuarium de succo Rosarum,
& contra, ol. sernati cuiusque quantitate. Hiera
& similem Electuarii n. deses augenda, ob mellis
molem, quæ medicamenti vires minuit.

Syrupus pro Elegmate, silambendo assumi debe-
at, ut

Syr. Inubarum pro Loboch sano & experto.

Syr. à Papauere, pro Diacodio.

Pulus pro trochisco, & contra, ut

Diarthodon pro trochiscis diarthodon.

Trochisci è Squilla, pro elegmate è Squilla
ancta vel immixta a quantitate pro ratione, indi-
catione morbi, & scopo medici.

In simplicibus partes aliquando religiose non
obseruantur, ut

Turbith pro Agarico trochiscato, & contra.

Hic simplex pro composito ponitur, vel compositum
pro simplici.

Pro Agarico, Colocynthis in minori quantita-
te. Carthamo duplum & triplum pro Agarico,
& contra.

Difficile tamen inueniri simplex medicamen-
tum substitutivum, quod verò è vndeque om-
nino ex parte conueniat, ut testatur Aucennas
in suo canone; ubi vix reperies duo simplicia me-
dicamenta, aliorum facultate similitum pariter,
substitui tuto possint. Quod cum difficillimum fo-
ret, ille aliquando duo, interdum tria, pari ponde-
re & mensura, nonnumquam duplicato & tripli-
cato, ad data quinta aut octava parte alterius me-
dicamenti quæ omnino simile temperamentum ob-
tineant, aut eandem proprietatem, crassitiem, tem-
peratam partium, & proprietatem occultam.

Variis in compositionibus est medicamentorum
usus,

Vel ob calorem, frigus, humiditatem, siccita-
tem; in principio primi, in medio & primo gradus,
& sic de alijs.

Vel ob partium tenuitatem, vel crassitiem, leu-
tatem, seperem, colorem: quare id quod tempe-
ramento respondens, saepe dissidet crassitie vel te-
nuitate partium; vel alia facultate, ut pro Asa-
ro Acorum substitutivum censent. At in omni
operatione non conuenit, non omnia omnia potest
Acorns

Aceris quæ Afarum. Urinas quidem & menses citius quare in vreticis tantum supponendum) vomitum verò excitare, aquasque educere, vii *Afarum*, minime valet.

Eadem ratione *Hyacinthus* pro *Anchusa* substituitur: Sed si ob colorem *Anchusa* opus sit, ut in vnguentis, *Hyacinthus* non conueniet.

Eius verò loco *Lacca* supponitur, vel *brasilia*, *Santalum rubra*, *Lacca pistorum*, vel *Coccos* *ba-phica*. *Assa dulcis* pro fetida non conceditur propter odorem, ut *Anicema* substituitur in affectibus vteri, quia odore incundo vterum sursum alliceret sequitur enim odorata, fugit fetida.

Propter saporem quædam vsurpantur; sed non conueniunt vndeque.

Pro *Saccharo Mel* & *Manna* substitui possunt in quibusdam remedium formulis, & in medicamentis laxantibus: minime autem in adstringentibus, quia *Manna* ventrem soluit magis quam *Saccharum* vel *Mel*.

Mucos visilis est in fluxu sanguinis, & ob lentorem vsurpatur *Fœnemegrecum*, quod *mucaginem* reddit, sed calidum: ideo in sperto sanguinis reicienda, quemadmodum in externis remedijs, ut *Ophthalma*, in qua omni albumen praefertur quidem in principio & incremento: in statu verò & declinatione *mucago* *Foenigræci* commendatur.

Quæ supponuntur, non in omni formula remedium substituantur, ut

Myrrha pro *Bello* in pilulis & vnguentis.

Sed in pilulis è *Bello* nullo modo conceditur, quia sanguinis fluxum & hæmorrhoidarum, ut mensis *Myrrha*, elicit.

In substitutis igitur hæc obseruare oportet, ut suppositivum in locum adulterati genuini penuria: eadem efficiat quod ipsum genuinum praestabat.

Vi si calfaciebat, refrigerabat, humellabat vel siccebat, adstringebat, vel laxabat, vel concoquebat.

Pro *Aisynthio* simpliciter dicto in compositionibus *Greecorum*, *Scribium* vel *Sanonicum*.

Pro *Aisynthio* è *Ponto* vel *Tauromonte*, *Romanum*,

Pro *Romano*, illius loci ubi habitat.

Hoc licet in omnium herbarum doctum prestare, quæ sunt ab eorum regionis finitima, vel saltem simillima assumat. Cuiusmodi est *Craux* vulgò *Gallo-prauincia*, siue *Creta*, ubi *Thymus* nostras æqualis solus & *Epithymus* optima & copiosissima.

Secundo loco herba regionum humidarum, modo æstas siccor fuerit, in locum calidarum substitui possunt. Quod fecisse *Galenus* docet in preparatione *Thiæracis*.

Pro *Macedonico* *Petroselinum*, *Petroselinum*

alterius regionis.

Sed regionis similitudinem obseruare oportet; nam regio augeat vel minuat medicamenti efficaciam & bonitatem.

Pro *Iride* *Ægyptica*, Venetam sumemus, &

Pro *Africana* *Florentinam*.

RADICES.

Rhapontico, *Radix Centaurij maioris*, vel nostri *Rhabarbari magna*, siue *Rhabarbarum* ad alios usus prius infusum & expressum. *Rhabarbarum* terrefactum improbat a multis propter empyreuma.

Zingibere, *Costus*, & contra, vel *Helenium*, & *Pyrethrum*.

Costo, *Pyrethrum*,

Aristolochia longa: *Rogunda*, & contra: vel una pro omnibus.

Acoro, *Calamus aromaticus officinarum*, & contra.

Acoro in laxantibus & clementibus urinas & menses: *Radix Asari*.

Asaro quando purgare & vomitum citare opus est; *Elleborus*, semen *Genista* & *Rapani*, vel hæc tria simul.

Galanga; *Cyperus rotundus*, & contra.

Calamo odorato *Libani*; *Schœnanthemum*: *calamus* siue *Acorus officinarum*: si ad odorem solum, *Santalum citrinum officinarum*.

Pro *Althæa*, *radix malna bortenstis*, vel syl. *Asparago alibi*, *Corruæ* immixta quantitate, quia acrior & efficacior.

Rusto, *Radix Asparagi*, & contra.

Corice radicit Caparis, *Cortex radicit Tamarisci*, *Sambuci*, *Ebuli*, *Papali* & *Lactis*.

Asij, *Petroselinum*, vel *Macedonici*.

Gentiana, medietas *Asari* & *radicit Caparis*.

Turbit, *Thapsia radix*, siue *Turbit Mesæ*, *Agriensis trochiscatus*, vel *Colocythi* minore dosi.

Zigibere, *Mechin*.

Serpentaria, *Ierus*, *Dracunculus*.

Lapathio, *Oxalidis radix*.

Rhabarbaro ad laxandum, succus *Rosarum*.

Rhabarbaro ad astringendum, *Hydrolapathi radix*, vel *Galanga maioris*, si calore opus est, si refrigeratione, *radix Bistortæ* *Nardo*: *Nardi species*.

Secacul: *radix passinaca marina*.

Folentis Senæ, duplex *folerum*.

Succedanea

SVCCEDANEA QVANTVM

FIERI POTEST SINT SIMILIA

omni ex parte, viribus, genere,

& specie, vt,

O Mnes Dauci	<i>Hedera</i> , excepta <i>Hederula terrestris</i> .
<i>Imibi</i> ,	<i>Rule</i> ,
<i>Adjuncti</i> ,	<i>Seseli</i> ,
<i>Concrilla</i> ,	<i>Aij</i> ,
<i>Hieracij</i> ,	<i>Rosmarini</i> ,
<i>Rumicij</i> ,	<i>Marrubij</i> ,
<i>Abfinthij</i> (pro <i>Abfinth</i> .)	<i>Leuceij</i> ,
<i>Anticenn</i> :	<i>Orchoid</i> ,
<i>Poliun</i> substi-	<i>Malua</i> ,
tut.)	<i>Polyg: i maris</i> & <i>fo-</i>
<i>Abrorum</i> ,	<i>mana</i> ,
<i>Sideristidis</i> ,	<i>Symphyti</i> ,
<i>Aconiti</i> ,	<i>Tribuli</i> ,
<i>Utratri</i> ,	<i>Rubi</i> ,
<i>Anagallidis</i> ,	<i>Equiseti</i> ,
<i>Anchusa</i> ,	<i>Priscæ</i> ,
<i>Anemones</i> ,	<i>Tithymalorum</i> ,
<i>Asparagi</i> ,	<i>Mercurialis</i> ,
<i>Eroscæ</i> ,	<i>Heliotropij</i> ,
<i>Calamintha</i> ,	<i>Origan</i> ,
<i>Cepa</i> ,	<i>Aristolochia</i> ,
<i>Chelidoni</i> ,	<i>Valeriana</i> ,
<i>Colli</i> ,	<i>Bituminis</i> ,
<i>Nardi</i> ,	<i>Ticis Resina</i> ,
<i>Beta</i> ,	<i>Aij</i> ,
<i>Bliti</i> ,	<i>Perri</i> ,
<i>Iuniperi</i> ,	<i>Plantaginis</i> ,
<i>Sabina</i> ,	<i>Panacis</i> ,
<i>Cedri</i> ,	<i>Pastinacæ</i> ,
<i>Rhamni Diosc.</i>	<i>Lychuidis</i> ,
<i>Myrti</i> ,	<i>Conisa</i> ,
<i>Piperis</i> ,	<i>Nymphaeæ</i> ,
<i>Cyclaminis</i> ,	<i>Anthemidis</i> ,
<i>Ranunculi</i> ,	<i>Verb: sci</i> .

Et denique omnes, nisi quid proditum inbibeat, ut de Clematide; quarum alteram vire, ventrem laxare, bilem, pituitam trahere scribit Dioscor.

Prior verò alui profluxu & dysenterias sedat. Sic Cucumis agrestis, & sativus, pepo & colocynthis, sed hæc paucis enenire solent.

De partibus etiam observandum: Nam aliqua facultatibus differunt, ut Radix *Aledij* mensis decursa sistit peral: quot dies sumpta: Semen autem in viro sumptum menstrua pellit.

Iuniperi fructus introsuntur: ramenta verò occidere præduntur.

Coriandri herba succus interfectis creditur: semen verò medicatum.

Qua ratione medicis minime vniuersalibus, sed potius particularibus nisi præstaret: Nam eorum plerumque est maxima differentia quæ eisdem esse putantur.

Summe igitur

Pro folio *Indo* & *Malabarbro*; folia *Citri*, (*Macis* aut *Spica* sumitur ab alijs)
Canelle vel *Malabathri* vulgaris.
 Pro folijs *Lauri*, *Citri* folia.
Papaueris albi, *Solani* folia; *Paueris nigri* minore quantitate, vel folia *Hyoscyami* albi.
Loffuca *Scarimla*, & contra.
Cichorio siluestri; *Dentem leonis*.
 Pro *Eupatorio*, *Astrum* & media pars *Abfinthij*.
 Pro *Strutio*, *Nux Vomica* & tertia pars *Papieris Anticenn*.
 Pro *Dillanet* prima species, secundam, tertiam, vel *Pulegium Cernuium*.
Calamentha montana prima; secundam, & tertiam. Sic de similibus.
Chamaepity; *Chamaedryu*, & folia *Eupatory*.
Malua siluestri; *hericifem*.
Malua arborescente; *Aithaam*.
Tiblasti, *Nasturtium*.
Meniba: *Balsamitam*.
Pulegio Regali; *Ceruinum* & contra.
Lepido Paulo, *Agrieta*, *Drabam*, vel *Iberida*, vel *Nasturtium*.
Phyllitide; *Asplenium* sine *Scolopendrium*, *Ceterachæ*, & contra.

Folij Olea } Nucum *Inglandis*,
 vel *Litisei* } Folia } Cupressi,
 } Pini, vel
 } Pinastri.

Folij Myrti } Bacas *Myrti*,
 } vel *Inglandis* nucleis
 } immaturas.

Folij Oleastri: Olea folia.

Folij *Terebinthi*, *Lentisei* folia.

Myrti alba; nigra & contra.

Folij *Myrti*; folia *Pyri* siluestris, *Sumacbi*, *Lentisei*, *Caiinos*, *Serbi*, *Cydoniarum*.

Thymo. *Saturciam*, vel *Org. umum*.

Ruta syl. *Rutæ* domesticæ siccatam maiori quantitate; vel contra.

Spica Lavendula; *Lavendula* species hortenses.

Adiantu, *Saluam* vitam, *Polytrichum*, *Adiantum nigrum* Plin. In *Asthmatic* viela par pondus cum medietate *Glycyrr*.

Telephio: *Portulacæ*.

Portulaca; *Umbilicum Veneris*.

Folij *Sambuci*, *Ebuli*, & contra.

Beonica; *Verbacæ*.

Ateliffa, *Corticem Citri*, *Marrubium*, & contra.

Agro montana; domesticam siccam in maiori dosi.

Cepæ, Pertulicam.

Nardo montana; Nardum Gallicam.

Philyrea folijs, Oleæ folia, & contrâ.

Folij Caprifici, Ficus domestica folia, & contrâ.

Thymbra: Thymum vel d'ersikum.

Pro prima specie Calamintha, secunda, pro secunda, tertia.

Coriandri folijs, Petroselinî hortensis folia, in externis remedijs tantum.

Hypomarathro altero: Coriandrum vel Petroselinum domesticum.

Folus Danci, Pastinacæ agreitis vel domestica folia.

Conisa prima: secundam.

Conisa secunda: tertiam maiori quantitate & siccatam.

Sanguinalis femine folijs; folia maris, & contrâ.

Hippuride prima: secundam, & contrâ.

Semperniæ maiore: paruum Umbelicæ Ucnocæ, & contrâ.

Folus Labrusci: domestica vitis folia minus cul'a.

Chamaelea: Thymelaam, Chamaepityn primam Diosc. Laureolam.

Alina elus: Helxines folia, & contrâ.

Vite alba: nigram, & contrâ.

Eubonto, sine Inguinaria: sine Asters Attico, Antirrhinum, & contrâ.

Folus Sabina: folia Cupressi, Ianiperi & Cassiaam.

Pro Hyperico, pondus Schœnantibi.

Semperniæ, Suc. Lactuca & Solani.

Colocynthide, triplum Cucum. Asiniui.

Dorycno: Mandragoræ, & contrâ.

Dragantio: Ari.

Folus Abietis: Populi folia.

Eryfino: Eracæ, & contrâ.

Folus Hippoparati, Lapatibi folia.

Folus Piceæ: folia Pini.

Lathyridis folijs, Tithymali folia.

Libanotide sterili, folia Libanotidis coronaria.

Lepidij folijs: Nasturtij folia.

Nymphaea alba: luteam, & contrâ.

Sorbi folijs, Mespilii folia, & contrâ.

Oxyacantha vera: Pyrastrum.

Folus Pepli: Tithymali folia.

Pitynsæ folijs: Tithymali folia.

Polygoni maris folijs, fœmina folia.

Filice fœmina: marem.

Seride: Condrillam.

Smyrno: Apiam aut Petroselinum.

Solanî hortensis; Halicacabum.

Symphiti Petrai folijs; aliorum folia.

Pro Beta alba; nigram.

Pro vniuersi specie Tithymali folijs: folia aliorum in laxando.

Pro Tragorigano; Origanum, & contrâ.

Pro folus Tribuli terrestris in refrigerando; folia aquatici; non in humectando.

Pro Hipocot folijs, folia Papaneris.

Pro Verbasci vniuersi folijs, aliorum folia.

Pro Spica Indica, Syriaca; Valeriana montana ra. ix.

Pro Viticis folijs & semine; Ruta folia & semen.

Pro Seridis folijs; Lactuce folia.

Pro Buglosso sine Boragine latifolia; Buglossum angustifolium.

Pro Soncho leui, Sonchum asperum, & contrâ.

Pro Fumaria; Senam.

Pro Hyssopo, Origanum, Sampsachum.

Pro Hyperico, Androschemum, Asciram, Scabranthum.

Pro Siebe Diosc. Stœben herbariarum, Iacoam, Scabiosam, Passoriam bruscæ, Bellides, & Gnaphalia.

Pro Halysæ, Auenæ prisanam totam.

Pro Amylo farinam Siliginis siccam.

TABVLA PRIMA RONDELLETII, REFERENS
CAPSVLAS RADICVM ET CORTICVM.

5	COSTVS.		Cinnamomū sive offic. cassia tenuis.	Cortex inter- nus nucis moschatz.	Alarum.	
4	Zedoaria.	Calamus o- dotatus.	Cassia sive of- fic. cinnamo- mum crassum	Nux moschata	Schoenanthū.	pro Cortice Thuris.
3	Zerumbet.	Galang. maior	Phu	Macis	Spica Nardi	Cortex Pinii
2	Mequin	Galang. minor	Anthophylli	pro Folio Malabathri	Spica Celtica	Cort. Lentisci
1	Pro Zingibere	Cypero	Caryophyllis			

Cortic. Quercus	Cortic. Maligranati.	Cortic. myrobal. Citrinarum.
Ilicis	Cortex nucis Juglandis	Kebularum
Suberis		Indarum
		Emblicarum
		Bellericarum

Rondelletius.

In hac tabella primum reposuimus Zinziber, quia frequentius eo utimur quàm Mequin (quod species est Zingiberis) si fortè alterum pro altero sumiatur, nihil inde mali sequetur: Zerumbet, Zedoariam & Costum in vltimis capsulis reposuimus, quia eis minus frequenter vrimur. Hoc modo medicamentis dispositis multo minori negotio medicamenta parabuntur, vt quæ in compositionibus simul ponuntur, simul inueniantur. Adde quòd hæc medicamentorum dispositio, *artificiosa* indicabit. Nam quæ in prima Capsula ponuntur, pro secunda poni possunt, & è contrâ dimnuto pondere. Cum dicimus quantitatē augeri, nolumus duplum substituere quia hæc medicamenta non sunt duplo fortiora, quamquam pro Cinnamomo duplum Cassiæ infuerint aut qui substitui: nam si medicamenta sint adeò imbecilla, satius est eis non vti, quàm duplo pondere substituere ea: nam vires medicamenti augetur, & vis aliorum medicamentorum minuitur. Vt omnia medicamenta ordine digerantur, oportet locum in multis classes diuidere, & in vna classe partes superiores atque inferiores. In iisdem classibus distinguenda erunt medicamenta calida, frigida, sicca & humida, tam simplicia quàm composita.

CAPSVLA RADICVM SECVNDA.

5	Costus dulcis Arabum		
4	Tussilago	Aristolochia	
3	Helenium.	Clematidis	
2	Iris Florentina	Aristolochia longa	Hermodastylus
1	Pro radice Iridis Veneræ	Aristolochia rotunda	Asphodeli

Pro { *Asaro, Acori pars media, sexta Anomii,*
Acoro, pondus Cimini cum 3. parte Aristolochia,
Aristolochia rotunda, Zumbet pondus aequale,
Aristolochia longa, Zumbet pondus aequale & medietas Piperis.
Ciclamine, aequale pondus Aristolochia & sexta seminis Cistri & Mentastri.

CAPSVLA RADICVM TERTIA.

5	Graminis						Glycyrrhizæ
4	Asparagi			Staphisagria			Tussilaginis
3	Rufci	Oenantes	Aristolochia omnis	Bryonia	Zedoaria	Cyperis	Helenij
2	Petroselini rad.	Rubia maioris	Asari	Pyrethri	Costi	Galanga minoris	Veneræ radix.
1	Pro Apio	Pentaphyllo	Cappari	Mequin	Zingiber	Galanga crassa	Iride Florentina

Pro { *Gentiana, medietas Asari & radice Cappari.*
Polypodio, Epithymi medium pondus
Triticulo vulpis, Scirpus, & contra.

quantoties volueris. Postmodum accipias aquam in qua abluisi Lamiuz Cupri, & sode bonam quantitatenu aquæ calidæ, & tandem leniter effunde: inuenies Crocum Veneris in fundo, sanguinis iustar ruberrimum, quem optime ablues, donec nulla amplius falsedo percipiatur, & panno lineo optime sicca & diligenter vsui serua.

Croci Martis preparatio.

M Vlei faciunt Crocum Martis cum sale; nonnulli cum vrina, aliqui ex Acero, alij alijs quia ferrum in rubiginem conuertunt; ex qua rutigine postmodum Crocum Martis hoc modo conficiunt: cum ferrum plane in rutiginem conuersum fuerit, istud in crucibulum & reuerberant, aut ita diu candefaciunt, donec alium colorem asciscer: hoc autem modo fieri non debet, quia sal non separatur illa ratio ne ideoq; in Medicamentis est inutilis: oportet autem absque omni rubigine, & sine vlla additione salis paretur; quod hoc pacto fiet. Recipe ferrum absque omni rubigine tenuissimè limatum: pone in reuerberatorium longū, & igne fortissimo in quarto gradu reuerbera, per diē & noctem, donec colorem rubrū acquirat; postea exime & cum refrigeratum fuerit, iniice in orcamplenam aquæ, & agita fortiter spatulā, & celerrime refunde in aliud vas: sic omne ferrum in primi vasculi fundo reperies; quod nondum satis reuerberatum fuerit abijce; id suten quod cum prima aqua transijt serua, & pone ad ignem, & euapora donec siccum fiat. Euapora (inquam) nec refunde, ne forte virtutem stipticanti simul amittas. Hic est modus optimus parandi Crocum Martis.

Terram vitrioli sic para.

Rec. Vitrioli quantum voles, iniice in ollam & pone in ignem circulum, vt planè ad rubedinem calcinetur, cum omnino rubrum fuerit, fundatur in aquam; stet per diē & noctē, postea effunde aquā clarā & aliam affunde, & fac vt ante, idq; toties reperi, donec nullam amplius acredinem in ea reperias; sed aqua dulcis remaneat. Tunc exicca, & habebis Terrā vitrioli efficaciotem in vulneribus virtutem habentem, quam Bolus aut terra sigillata.

Lud. Myrrens.

Emplastrum ad Callos pedum efficax, acceptum à C. D. D. Iacobo Cargillo Scotto.

Rec. Gummi Ammoniaci Aceto soluti, vnc. 1.

Vitrioli Romani,
Calcis viuz, ana. drach. 6.
Viridis Aeris, drach. f.
Auripigmenti,
Cantharidum, ana. drach. 1.
Cera nouæ, vnc. 4.
Olei Chamæmelini &
Euphorbij, ana. q. f. fiat Emplastrum.

Emplastrum Ceroneum Nicol.

Rec. Picis Naualis,
Cera, ana. vnc. 2. drach. 3.
Sagapeni, vnc. 2.
Ammoniaci,
Terebintina,
Colophonia,
Croci, ana. vnc. 1. drach. 3.
Aloes,
Thuris,
Myrrhe, ana. vnc. 1.
Opoponacis,
Syracis,
Galbani,
Mastiches,
Alumini,
Famugraci,
Syracis rubra,
Bdellij,
Lithargyri, drach. 2. f.
Fiat Emplastrum secundum artem.

Emplastri contra Rupturam prima descriptio.

Rec. Picis naualis,
Aloes, ana. vnc. 3.
Litharg.
Cera rubra,
Colophonix,
Galbani,
Ammoniaci, ana. vnc. 2.
Visci quercini, vnc. 6.
Gypsi,
Vriusque Aristolochiz,
Myrrhe,
Thuris, ana. vnc. 6.
Terebint. vnc. 2.
Vermium terrestrium,
Gallarum,
Vriusque Consolidæ,
Boli Armeni, ana. vnc. 4.
Sang. Draco. lib. 1.

Extat alia descriptio, quæ dicitur de pelle Arietina Arnaldi de villa noua, ex lib. 2. cap. de Crepatura, quæ magis siccatur, & constringit,

git, & melius ordinatur. Magis mihi placet illa descriptio, quæ recipit.

Emplastrum è pelle Arietina Arnaldi de Villanova.

Rec. Lithargyri auri,
Lapis Hematit,
Sang. Draconis,
Boli Armeni,
Muniz,
Galbani,
Thuris,
Lumbricorum terrestrium, ana.drach.f.
Picis navalis,
Colophoniz,
Cetæ albæ & rubr.ana.drach.1,
Rad.Consolidæ maioris, minoris & mediæ,
ana.drach.3,
Ros.rubr.
Myrrhæ,
Aloes, ana.drach.4.
Stellæ marinæ combustæ,
Gallarum combustarum,
Aristolochiæ rotundæ, ana.drach.6.
Visci Quercini,
Terebinthinæ, ana.drach.3,
Sang. hominis rufi, lib.1. [minus quarta.

Conficiatur hoc modo. Pellem Arietinam recentem extraham seu excorticatam cum pilis coque ad dissolutionem. Collaturæ lib.1. misce Viscum Quercinum dissolutum, cum spatula stagnæ agitur, deinde Cerâ, Picē, Colophoniam adde. Animoniacum, Galbanum dissolvantur in aceto, & coeuntur. Addatur deinde pul.aliorum; ultimo loco odorata, & quæ minorem calfactionem & calorem ferre possunt. Postremò Terebinth. sanguis permisceantur. Vermes in vino cocti & diligenter triti commisceantur; coquantur, donec non inquinent manus, manibus inunctis oleo Ros.vel Cytoniorum, non Violaceo, ut vulgus facit. Malexentur, sicut Magdalones. Ego tantum mutavi, quod legit Palleam, Marinam Stellam legendum, quæ est ad id efficacissima. Quod sanguis hominis rufi legit; censerem potius hominis pituosi legendum, qui sanguinem viscosiorem & tenaciorem habet. Sais siccant alia medicamenta, sed parum telenti oportet accipere sanguinem corum, qui truncantur capite, in quo fluit venalis & arterialis, & sic est satis siccus & viscosus, & hæc satis de Emplastro contra rupturam.

2. De Cerato de Pelle Arietina, inter Cerata differimus.

Emplastrum è Stella marina ad Hernias, prafisos nervos, & musculos glutinandos L'Obelij.

Cum animadvertere omnes, perperis Nicolai, Villanovani, & Guidonis Ceratis, aut verius ad Hernias Emplastris variare; & doctissimos quosq; similes descriptiones ex siccanibus aut glutinantibus dare: visum fuit subiungere aliam, quæ sepe saliciter usus sum, eoq; aliquoties dispensandam procuravi: & hanc ita diu est, quod etiam egregius, industrius & fidus vir Thomas a Jessa, sine fossanis Pharmaceutices apud Middelburgenses Zelandorum callentissimus paravit Optimam sive misturam proportionem & corporis moderaturâ, crassitute aut crassamento, ut citis verbis usumque, constitum; nonnullarum præscriptionum Rendelshij imitatione, ex copiosis Stellæ marinæ, loco Polæ, aut Pila marina, in Cerato sive Emplastro Pelle Arietina Arnaldi Villanovani; optima lege, ratione & siccandi dote humidas relaxationes, suppositis.

Rec. Radicum Consolida maioris recentium, unc.18.

Malinij, unc.12.

Radicum Narcissi recentium, unc.10.

Decoquantur ad molliem aut dissolutionem in partibus duabus sufficientis quantitatis vini rubri tartini, & una succe Cybomicrum, aut vini Cydonis, s. quantitate balneo oculo. Refrigeratis; coeuntur, tudentur, & cribrentur, quibus addo mucaginem, sine Gluven sequevincta Ictiocolle, prius incisâ minutim, infusa itidem balneo & eliquata in colatura prædictarum radicum Symphi maioris, deinde colatum & solidum seu extractum. Adde vinum si Colamen non sufficit.

Visci aucupatorij è corticibus radicum Agrifolij, vel querno aut Pyrastri Visco parati, unc.6.

Postea admissæ infusæ scriptam succatiancolam: quæ

Rec. Rhois Coriariæ,
Malicij, ana, unc.12.

Radicum Pentagilli,

Tormentilla,

Bistorta are-

foliarum.

Fabrarum terrestrum,

Nucum Cupressi,

Myrtillorum,

Rubia tinctorum,

Seminis Nasturtij,

R. Aristolochiæ Clematidis,

Seminis Psyllij, ana. drach.10.

M 3

Continuum

Contunduntur, leniterq; efferveant in vini rubri tortius aut nigri astringentis partibus duabus & una Aceti Rosati, vel succi Cydoniæ, Balnei, vitro aut alio vase lapideo, optimè clauso. Omnibus prælis subiectis, discoquantur molli igne in Balneo donec concreverint Elellarij solidi instar. Quibus omnibus addde peralij

Terebinthina clata, unci. 8. vel q. s.

Pici navalij, unci. 3. 5.

Colophonia, unc. 7.

Galbani,

Ammoniæ dissolutorum in vino,

Myrrha, ana, unc. 2.

Pulveris Stelle marinae visulata clibano, unci. 9.

Pul. Boli albi, unc. 3.

Pul. Epididymi Calamumæ sexties candefacti & Aceto exsiccati,

Sanguinis Draconis, ana, unc. 1. s.

Pulveris Olibani,

Lytharij auri loti,

Mastiche,

Sarcocollæ,

Alloë,

Passiphali,

Scorpiæ ferri aceto preparata,

Succi Herniariæ, aut saltem Polygoni extracti ex vino rubro & densati.

Hypocistij, ana, unc. 1.

Pici prius liquefacta cum Colophonia, addo Terebinthinam, Ichtyocellam Visco permixtam; omnes pulveres paulatim adijciendo assidueq; mendo.

Quandoquidem hoc aut similibus frequentissime non modo optimè vivuntur Medici in remedijs ad Herniam; verumetiam adversus varios vteri affectus; eius ligamentorum relaxationem, alia-

rumq; partium; renum, venterum, arteriarum, nervorumq; dilataciones & deflexiones inde natus arcendas, ut in dentium doloribus hanc descriptionem consilio dedo. Quotiescunq; maiore astringentis opus est, solent boni & praelari prælici irrationes Aceti Rosati (embrocationes vocant) aut irrigationes ante usum huius Emplastri aut Comitissæ Cervæ præscribere: tamen quia acetum nervosum genus infestat, inde Chylaria simplicium huius Emplastri ex vino astringentis elicienda, diluto aquâ Chalybeatâ, quotiescunq; calorem vereremur: Obijci vñ potest, Acetum Rosatum, aut Acetum ex vino atro, crasso, sortivoq; paratum, magis astringere, densare & contrahere, quam penetrare. De Aceti vñ diffinitionis & usu latissimè diximus. Capite de Iride Illustrationum Sterpium. & Adversariorum altera parte:

Tantum commendatur Filix stirida, Osmunda vocata, à posteris, quantum Filix vulgaris à Lancio Apuleo ad vulnera, puerorum rancem & splenem, tam pota quam alimta. Liberum itaq; erit, si placeat, unci. 2. aut plures Radici Osmunda, si copia adsit; aut alterius, si desit, huius Emplastri inferere.

Emplastrum ad Herniam apud Fernelium, Recipit potenter quidem exiccantia, sed pondus, quantitas aut numerus agglutinantium minus est quam par est ad Peritonei Rupturam; Herniæ (barbarè Crepaturæ vocant) agglutinandas: ideo agglutinantium quantitatem & numerum auximus, ut radices Symphiti & aliarum, additis radicibus Narissij, qua Dyscoride teste & experientia, praeiosos nervos illius agglutinant: & ut radices Liliacæ cum melle detrita; nervis præcisij, laceratq; medentur.

Stella marina Indica reticulata.

Miranda Dædala Natura, inter mille Conchytium variorum colorum Pisciumq; genera & Zoophyta, elegantissimam Stellam marinam, quinta à Rondellio obiter descripta congenerem, reducis ex Orientalibus & Occidentalibus Indis, ad solum natiuum Bataviæ naucleris nobis largita est, in quinque angulos, ramos aut radios à medio partitans; pedali & amplioris magnitudinis, prominente medio tergo quatuor digitorum eminentiâ, minimè ut cetera in plano; elegantissimè reticulato & multis verruculis per variis & quamplurimos versus aspersis: a versa verò parte à medio depresso ore & centro per medium ordinibus quinque gemino situ stellatis, denticellis crebribus, vñ cum lunatis marginibus, stipatis: cetera totaq; Stelle faciès verruculis

conspersa est, ordine pulchro, admirando Natura spectatu dignissimo insu; testacea concretione.

Stellas marinas vti plerasy, Plantas in usum reuocavit exercitissimus in rerum cognitione & summus prælicus Rondellietius, ad Herniam sequenti formula Remediij.

Rec. Emplastri et pelle Arietina, unci. 4.

Stella marina,

Blata Byzantia

ana, unci. 1.

Pul. Mastiche,

Gallorum,

Masticorij, ana, unc. s. malaxentur ex oleo Hyperici.

Fonatur pari sape decollo radicum Symphiti maioris

Stella marina Indica.



maioris, Narcissi, Bisorta, herba Iudaica sine Tetrabit, Polygonij, Herniaria & similibus, ut alibi dicemus. Alius fluida sit medicamento aut glando; improbantur clysteri.

Emplastrum nigrum Peiniones illico sanans; attritam longo decubitu cutem breui tempore ad cicatricem perducit. Polychrethi efficax, paucissimis constans.

Rec. Cersa alba, lib. 2. } coquantur ad
Olei seminis Ls. } duritiem
ni, lib. 2. } ex arte.

Emplastrum de gratia Dei. Nic. Prop.

Rec. Terebinthinæ, lib. 2.
Resinæ, lib. 1.
Cera albæ, vnc. 4.
Mastiches, vnc. 1.
Verbenæ,
Betonicæ,

Pimpinellæ, ana. M. i. fiat decoctio herbarum in vino albo generoso ad consumptionem tertie partis: Colaturæ dissolue Ceram, Resinam, Mastichem. a. Bulliant, donec incorporantur, & agitentur. Tunc ab igne deponantur, & Terebinthina infusetur, agitando cum spatula, & fiat Emplastrum dictum Gratia Dei.

a. D. Iohannes, Nicolai, Plantius apud Ferrelum, & alij omnes qui sese sequuntur, fallun-

tur, vno ore dicentes, Cera, Resina & Mastiche coquantur ad instam consistentiam, aut donec optime incorporantur, verbis Nicolai iunxi.

Diximus in Oleo Mastichino, Mastichen decoctionem minime ferre, etiam in grumato abire si pulvis solum calidior misceatur in antidoti.

Meliores parandi rationes descripsit Syllius hoc modo.

In colatura vini & herbarum decoquitur Cera & Resina ad colati prope consumptionem: tunc Mastiche additur; Postremo Terebinthina: igne auferi, ubi refrigit, cylindrica fingit maldacenes.

* Alij, inquit, in colata Resinam solum coquant; hoc prope consumpto, Ceram addunt; postremo Terebinthinam extra ignem, & ubi refrigerari incipit Mastichen pulveratam miscent.

* Uterq; hic modus, quam Nicolai est praestantior, quod Mastiche collisionem non sustineat ob essentia tenuitatem.

* Hodie ut albus fiat, addita paulo largiore Terebinthina trahunt modo Henidiorum.

* Succos colatos per se in Melle spissitudine coquerem potius, & deinde ceteris liquatis miscerem, ut Syllius faciendum suadet, in Emplastro de Ianua Nicolai, ad vulnera & ulcera, quod

Emplastrum de IANVA.

Rec.

Succorum { *Apij,*
Plantaginis } ana, lib. 1.
Betonice, }

Emplastris.

Cera,
Piceis
Resina,
Terebinthine, } ana, lib. s.

Fiat Emplastrum.

Galli ceteras Nationes excellunt in perandis

Succedaneorum Collectanea L'Obelij aucta &
 recognita, ex classis authoribus, imitatione Rondeletij,
 è cuius fragmentis & prælectionibus ferè
 decepta fuerunt.

Rondel.

CVM attentiore lætione animaduertissem vulgatum Succedaneorum libellum, quem nonnulli Galeni, atq; Paulo acceptum ferunt, scaterere mensis, & pleriq; locis inutilem esse: vixit qui ex Græco in Arabicum, & de Arabico sic denudè Latine versus, aut potius peruersus, à Mauro quopiam, vel Mauro-græco, qualis fuit & Altiarius: visum fuit, quæcumque Dioscorides, Galenus, Aetius atq; Paulus iteris mandassent, experimentaq; tum veterum tum recentiorum confirmassent, seligere, eaque sic digerere, ut quid aliteri cuius aquipolleat, studiosis in posterum pateret.

Hunc autem libellum noster cunctispiam esse, vel id plus satis arguit, quod nonnulli addita imbi sint, quæ Galeni tempore ignota fuisse, vti Anacardis, aliæq; complura, nullo tamen ordine aut delectu, ac sine iudicio. Vt, quid fortè Chamaemeli legerant alicubi, nomen decepti afficere, Malum subdiderunt, quàm insectis nullus est qui ignoret: illud enim laxa & moderatè calfacit, hoc verò refrigerat astringitq;. Eadem inopia, quid fortè Cerasi Portulacæ similem legissent illum vires huius facultatis responsuras putarunt. Itidem Leporè flumiatilem Cancris loco usurpari, vel, ut alius quispiam correxit, marinum, indultè, ut qui ignorasse videatur Cancrum alimentum & antipharmaçium esse, Leporem verò vel odore solo vomitorium & venenum. Nec hoc falsum solummodo, ac & discriminatè plenum, cum loco Opobalsami Opocarpium substituit, quod venenum frigidum est Dioscoridi, vinosa, vti Cicuta, expugnandum, teste Gal. lib. de Antidotis. Verùm si hic Carpasum legamus, vera fuerit lætiss, est enim tenuiss partium. Cinnamomo item Eben rabum respondere nequit. Neque placet ordo seriesq; collationum: nam olea oleis, non resinis aut agnis sunt conferenda, ut, quoad eius fieri potest, sint simillima. Deinde si non licet ex specie proxima, saltem è genere, cum abundemus probe remedijs. Nec parvi facere regionum ubi nascuntur proprietates, veluti Creta-

carum Plantarum, quas Italici efficaciores putant, nisi torrida admodum fuerit ætas; quæ deficiente alimento Plantas tales facit: tum enim Palsi Italianum aut Starchas non eodem Cretico aut à Starchadabni insulis.

Imperitia fatua est, substituendi præcipere variobus inueniunt, ea quibus careamus, aut adulterata, ut loco Cinnamomi, Anisum. Infans itidem, ubi abundamus Laetia, Opocarpium optare, Licuerit tamen, si qua sint rariis obuia aut minus trita, eorum loco usurpare viribus similia, vti Terebinthina vera loco, Lemiscæ resinam, quia frequentior est.

Cum autem Succedaneis vti non raro cogamur, nec enim omne fert omnia solum, nec vbiis medicamenta oportuna occurrunt: (rursus enim detrahendi sine facili parabilibus vitandis) & eorum medicamenta necessaria ad repetitus casus ad manum minimè sint, presentibus vitandum) eligenda erunt quæ nostris simplicibus substitui possunt, ut Galenum scilicet legimus, cui Euphorbium cum ad spicula, aculeos & infusa eximenda deesset, ex alocarij Propolim pro Euphorbio felici successu usurpauit.

Succedaneorum verò usus hodie magis est necessarius quàm unquam fuit; cum multis quæ antiquis in regionibus suis exortibus & exorticiis diues & uber prouentus sufficiebat, hodie excremus, tum suppositicia: Hebraeorum & mercatorum vasto ingenio adulterata transuehantur; quæ si reijcienda, alia substituere necesse est. Ad hac pleraq; prisca simplicia medicamenta exoleta antiquis nobilissima & vtilissima, hodie ignorantur.

Per multa Arabibus excogitata & vtilissima inuenta compositiones, efficacissimæq; remedia in vsum recepta, quorum simplicia barbario vocum nobis prorsus ignota sunt. Quid enim nominibus illis barbaris significare voluerint, nescimus, aut illis excremus. At in Succedaneorum delectu & usu, pessima illa medicorum consuetudo merito reijcienda, quæ iam à multis annis inualuit, magno agrariorum incommodo; quæ in compositione re-

medior. 1170

medicorum omnia quae commendata sunt vel ad merbum, vel ad partem affectam, vel aliquod symptomam, congerunt temere; & cum omnia similia vspergunt, haud habent amplius quod pro ea herba aut medicamento substitui possit. Quod si una, duabus, vel tribus herbis contenti essent; nunquam succedaneo desitiretur pharmacarium. Sin autem quantitas necessaria foret; pro manipulo adde duos, pro duobus tres vel quatuor. Hinc duo consequentur commoda; certior medicamenti operatio, facilius & celsissima preparatio; pluribus remedijs & succedaneis summo artis Medicae ornamento abundabit medicus, cui iterare, immutare, supponere pharmaca licebit, & plura quam vulgus Medicorum & Clinica facere. Vi si in suo decocto Boraginem praescribit; ea si defuerit, Buglossum agreste substituere vel contra: si Scariola desit, succum substituere vel symplicitatebit si Cichorium, Dent leonij, vel Endivia: si Chamapiys, Chamadry: substituatur, si desit, vel contra. Sed quid faciet, si omnia congerantur in uno eodemq; medicamento? certe nihil aliud erit, quam poeticum illud chaos.

Vbi Villanovani aude oculos voluunt, ubi in promptu habentur simplicia, dolum esse si quis cōpositis utatur.

A prava igitur consuetudine recedant, & illos tanquam scopolos vitent & caveant item malos auratos, improbos, pudolos impudentes pharmacarios, & Circulatores, qui nummi & lucri rapaces, farraginem medicamentorum etiam semipitridorum inter se pugnantium collaudant. Quidam hoc faciunt ut copiam ostendant, vel ignorantes, vel superbia; & aliqui docti, ne videantur inre medicorum cognitione minus exercitati.

Blases quidam Medicastri inuastores nobiles, populares agryia, histrionesq; Hippocratice, Acreniū Antreoli Theophrasti aselle, (cuius tamē documenta vix summis demonstrant labris, quique magistri pudent, quemque neque agnoscere, neq; tutari audent, ne apud doctos & vulgus, ob circulatorum, qui falso discipulos Theophrasti gloriantur, illusiones & seculi mali audiant) ementiam, irrationalem garrulam pertinacem perfritie frontis impudentiam mordicus nouem fibrisopbiā efficiunt, obliterant & pro sua ostentant; Paniceā sedā unicā sine decocto parato ex omni confusa barbarum etiamq; deleteriorum, nullius delectus, inter se ex diametro pugnantium, malignā & insansā fideratione collectarum farragine, addita Scādā, Cinnamonio, Saccharo & huiusmodi ad saporis gratiam, pro vniuersali omnium humorum anili medicamentum & obstrictum cohorti iussimmo, freti & contenti, ad omnes morbos, quos Aristotelicis & Hippocraticis scāstariobus incurabiles iactitant, à se viginti quatuor ho-

rarum spatij percurari posse illic & vbiq; & vbiq; pollicentur; impostura, supinā audacia & gnomica adulatione, nullis interdictis aquis uocijs & quibus morbi fouentur edulys.

Huiusmodi sanē homines potius sentitā digni, quam patris & temperis iacturā in describendis illorum ineptijs, mendacijs & imposturis: In illos sand Reges, leges, & Medicorum celeberrima collegia deberent animaduertere, & ex Republica propellere; doctos autem viros fouere & erigere; qui prohi dolor huius multis locis perennit, & haudquaquam ab improbis & in doctis logoda dalis s. amandis discernuntur.

Porro cum sint quadam compositiones vitales pristis medicis excogitatae, experientia & ratione receptae & comprobatae, nonnulla succedanea inuestigare, agnoscere, & sufficere oportet, ut parari possint nobilissima pharmaca, quae ea ratione minima excludenda & rejicienda: cum non tanta infidelitate succedanea quaedam illis non inferiora interdam aequē bene explant omnes pollicitationes gentini medicamenti.

SUCCEDANEA, QUANTVM FIERI potest, eiusdem sint generis & speciei.

Rondel. Herba pro herba.

Radix pro radice.

Flos pro flore.

Semē pro semine.

Succus pro succo.

Lachryma pro lachryma.

Resina pro resina.

Muccago pro mucagine.

Metallum pro metallo.

Lapis pro lapide.

Terra pro terra.

Pix pro pice.

Axungia pro axungia.

Medulla pro medulla.

Anis pro ane.

Serpens pro serpente.

Parti animalis pro parte.

COMPOSITIO PRO COMPOSITIONE.

Pulvis pro pulvere.

Trochiscus pro Trochisco.

Opia pro opiata.

Electuarium pro electuario.

Pilule pro pilulis.

Eclegma pro eclegmate.

Tabella pro tabella.

Consellio pro consellione.

Conservatio

Conservatio pro conservazione.

Syrupus pro syrupo.

Emplastrum pro emplastro.

Oleum pro Oleo; sine simplex, sine compositum.

Unguentum pro unguento.

THEOREMA UNIVERSALE VEL
COMMUNE.

Medicamentum
quod substitui
debet, sine inter-
nis, sine exter-
nis conuenire
debet.

Varibus occultis, manife-
stis, & consistentia.
Sit etiam simile in
Sapore,
Odore,
Ætate,
Nataliis & regione.
Natura & temperamento.

Nonnulla in externis remedijs supponuntur;
quibus in internis uti non licet: ut succus Carpa-
thi substitui potest pro Lænice succo in externis:
cum tamen venenium sit, non introrsum iungitur.

Non solum simplex: sed aliqua partes substitui-
untur.

Ut Mucago seminis Psyllij pro mucagine
seminis Cydoniorum: non totum semen, quia pars
interior temperamento differt à mucagine, & ve-
nenata putatur. Neque etiam Cydonum malum
conuenit pro semine suo: quia viribus & consi-
stentia differt.

Formula quadam in quibusdam remedijs sibi
mutuo succedant, ut

Conservatio, pro syrupo eiusdem simplis, fructus,
stirax, vel radice.

Conservatio Capillorum Veneris, pro syrupo in-
opiata substitui potest: Sed in syrupo consistentia
non potest, quia remedijs formula non patitur.

Pro liquida liquida substitui debent: quare
deficiens syrupo, aqua vel herba decoctum substi-
tuatur.

In quibusdam conditis supponere licet syrupum
conservationis; quia in syrupo conseruantur. Ut
Syr. Conservationis Citri, pro syrupo à corticibus
Citri. Syr. Conservationis radicis Buglosi, pro
Syrupo Euglossi.

Emplastris item pro unguentis uti licet; &
contra, modo pars afflicta assensatur, ut Empla-
stro sibi Zacharie, pro unguento Resumptino; &
Resumptino pro emplastro. In thoracis vero af-
fectibus, nisi dissoluantur aut malaxentur, non vo-
lentur, quia emplastra imposita dilatationem co-
stæarum & respirationem impediunt.

Emplastrum è Cereis, pro unguento albo, nisi
inflammatio probet; quia neque dura, neque
graua ferre potest.

VARIA ALIA MEDICAMEN-
TA PRO ALIIS SUBSTITVERE
licet, modo vires correspon-
deant.

Pilula pro confectiombus: & confectioes pro
pilulis, ut
Hiera simplex pro Pilulis de Hiera & Benedi-
ctis; & contrà.

Et pro pilulis permixtis; Electuarium Diacar-
thami; de Cithra solutissimum.

Pro biliosis, Electuarium de succo Rosarum,
& contra, olferuat à cuiusque quantitate. Hiera
& similitum Electuarium à dosi augenda, ob mel-
liorem, quæ medicinali vires minuit.

Syrupus pro Elegmate, silambando assumi debe-
at, ut

Syr. Inuiubarum pro Loboch sano & experto.

Syr. è Papauere, pro Diacodio.

Pulus pro trochisco, & contrà, ut

Diarrhodon pro trochiscis diarrhodon.

Trochisci è Squilla, pro elegmate è Squilla
aula vel immixta quantitate pro ratione, indi-
catione morbi, & scopo medici.

In simplicibus partes aliquando religiose non
obseruantur, ut

Turbit pro Agarico trochiscato, & contrà.

Hic simplex pro compositoponitur, vel compositum
pro simplici.

Pro Agarico, Colocythis in minori quantita-
te. Caribami duplum & triplum pro Agarico,
& contrà.

Difficile tamen inueniri simplex medicamen-
tum substituendum, quod verè undequaque
omnino ex parte conueniat, ut testatur Auicenna
in suo canone; ubi vix reperies duo simplicia me-
dicamenta, aliorum facultate similitum pararia,
substitui tunc possint. Quod cum difficillimum fo-
ret, ille aliquando duo, interdum tria, pars ponde-
re & mensura, nonnumquam duplicato & triplicato,
addita quinta aut octava parte alterius me-
dicamenti quæ omni modo simile temperamentum ob-
tineant, aut eandem consistentiam, crassitiem, tenui-
tatem partium, & proprietates occultas.

Varius in compositionibus istè medicamen-
torum usus.

Vel ob calorem, frigus, humiditatem, secita-
tem; in principiis, in medio & primo gradus,
& sic de alijs.

Vel ob partium tenuitatem, vel crassitiem, len-
torem, saporem, colorem: quare id quod tempe-
ramento respondens, sepe dissidet crassitie vel te-
nuitate partium; vel alia facultate, ut pro Asa-
ro Acorum substituendum censuit. At in omni
operatione non conuenit, non eam enim potest
Acorum

Acorns qua Asarum. Urinas quidem & menses elicit: quare in urticis tantum supponendum vomitum verò excitare, aquasque educere, uti *Asarum*, minime valet.

Eadem ratione *Hyacinthus* pro *Anchusa* substituitur: Sed si ob colorem *Anchusa* opus sit, ut in unguentis, *Hyacinthus* non conveniet.

Eius verò loco *Lacca* supponitur, vel *brasilia*, *Santalum rubrum*, *Lacca pillarum*, vel *Coccus* *ba-phica*. *Assa dulcis* pro fetida non conceditur propter odorem, ut *Aucemas* substituit in affectibus uteri, quia odore incundo uterum sursum allaceret sequitur enim odorata, fugit fetida.

Propter saporem quidam usurpantur: sed non conveniunt undequeque.

Pro *Saccharo Meli* & *Manna* substitui poterit in quibusdam remediis formulis, & in medicamentis laxantibus: minime autem in adstringentibus, quia *Manna* ventrem solvit magis quam *Saccharum* vel *Mel*.

Mucus utilis est in fluxu sanguinis, & ob lentorem usurpatur *Ecnomogracum*, quod *muccaginem* reddit, sed calidum: ideo in spatu sanguinis recitanda, quemadmodum in externis remedijs, ut *Ophthalmia*, in qua ovi albumen praefertur quidem in principio & incremento: in statu verò & declinatione *muccago* *Fenigraci* commendatur.

Quae supponuntur, non in omni formula remedijs substituantur, ut

Myrrha pro *Bellio* in pilulis & unguentis.

Sed in pilulis è *Bellio* nullo modo conceditur, quia sanguinis fluxum & haemorrhoidarum, ut mensis *Myrrha*, elicit.

In substitutis igitur haec observare oportet, ut suppositivum in locum adulterati gemini panuria: eadem efficiat quod ipsum genuinum praestabat.

Ubi si calfaciebat refrigerabat, humellabat vel fecabat, adstringebat, vel laxabat, vel concoquebat.

Pro *Abynthio* simpliciter dicto in compositionibus *Greecorum*, *Serphium* vel *Santonium*.

Pro *Abynthio* è *Ponto* vel *Tauromonte*, *Regium*,

Pro *Romano*, illius loci ubi habitas.

Hoc licet in omnium herbarum delectu prestare, quae sunt alicuius regionis finitima, vel saltem simillima assumas. Cuiusmodi est *Craux* vulgè *Gallo-romancia*, siue *Creta*, ubi *Thymus* nostras argenti folius & *Epithymus* optima & copiosissima.

Secundo loco herba regionum humidarum, modo astas hiecor fuerit, in locum calidarum substitui possunt. Quod fecisse *Galenus* docet in praeparatione *Theriacis*.

Pro *Macedonico* *Petroselino*, *Petroselinum*

alterius regionis.

Sed regionis similitudinem observare oportet: nam regio auget vel minuit medicamenti effectum & bonitatem.

Pro *Iride* *Ilyrica*: *Venetam* sumemus, &

Pro *Africana* *Florentinam*.

RADICES.

Rhapontico, *Radix Centaurij* maioris, vel nostri *Rhabarbari magna*, siue *Rhabarbarum* ad alios usus prius infusum & expressum. *Rhabarbarum* torrefactum improbatum à multis propter empyreuma.

Zingiberi: *Costus*, & contra, vel *Helentium*, & *Pyrethrum*.

Costo: *Pyrethrum*.

Aristolochia longa: *Rotunda*, & contra: vel una pro omnibus.

Aceto, *Calamus aromaticus* officinarum, & contra.

Aceto in laxantibus & cientibus urinas & menses: *Radix Asari*.

Asaro quando purgare & vomitum citare opus est: *Elleborus*, semen *Gemista* & *Rybbani*, vel *hec tria simul*.

Galanga: *Cyperus rotundus*, & contra.

Calamo odorato *Libani*: *Schomanthum*: *calamus* siue *Acorus* officinarum: si ad odorem solum, *Santalum citrinum* officinarum.

Albaea, *radix malva hortensis*, vel syl.

Asparago albis, *Corrida* immixta quantitate, quia acrior & efficacior.

Rusto, *Radix Asperagi*, & contra.

Cortice radice Caparis, *Cortex radice Tamarisci*, *Sambuci*, *Eboli*, *Populi* & *Laxi*.

Ajy, *Petroselinum*, vel *Macedonici*.

Gentiana, *medietas Asiri* & *radice Caparis*.

Turbit, *Thapsia radix*, siue *Turkish Mesua*, *Agaricus trochiscatus*, vel *Colocynthis* in ore dosi.

Zigiberi, *Hecbin*.

Serpentaria, *Iarus*, *Dracunculus*.

Lapath, *Oxalidis radix*.

Rhabarbaro ad laxandum, succus *Rosarum*.

Rhabarbaro ad astringendum, *Hydrolapathi radix*, vel *Galanga maioris*, si calorem opus est, si refrigeratione, *radix Bisforta*

Nardo: *Nardi species*.

Secacul: *radix passinaca marina*.

Folculis Sena, duplex foliorum.

Succedanea

SUCCEDANEA QVANTVM

FIERI POTEST SINT SIMILIA

omni ex parte, vitiis, genere,

& specie, vt,

O Mnes Danci Hedera, excepta Hedera terrestris.

Intibi,	Ruta,
Adjuncti,	Seseli,
Condrilla,	Alij,
Hieracij,	Rosmarini,
Rumicis,	Marrubij,
Abfinbij pro Absinth.	Leuceij,
Aucenn:	Orchreos,
Pelium subfistunt.)	Malina,
Abratoni,	Polygo: maris & fœmina,
Sideritidis,	Symphyti,
Aconiti,	Tribuli,
Utrari,	Rubi,
Anagallidis,	Equiseti,
Achuse,	Vitice,
Anemones,	Tithymalorum,
Asparagi,	Mercurialis,
Eruſſica,	Helioſcopij,
Calamintha,	Origani,
Cepa,	Aristolochia,
Chelidoni,	Valeriana,
Colli,	Bituminis,
Nardi,	Pici Refina,
Bete,	Alij,
Bliti,	Porti,
Iuniperi,	Plantaginis,
Sabina,	Panaci,
Cedri,	Pastinacæ,
Rhanni Dioſc.	Lycnidi,
Myrti,	Conſe,
Piperis,	Nymphae,
Cyclaminis,	Anthemidis,
Ranuncub,	Verbeſci.

Et denique omnes, niſi quid prædicitur inhibeat, vt de Clematis de: quæcum alteram vtræ, ventrem laxare, bilem, pituitam trahere ſcribit Dioſcor.

Prior verò alii proſtuvia & dyſenterias ſedat. Sic Cucumis agreſſi, & ſaturni; pepo & colocyntidis, ſed hæc paucis euenire ſolent.

De paribus etiam obſervandum: Nam aliqua facultatibus differunt, vt Radix Aleij menſes decedat ſiſtit per aliquot dies ſumpta: Semen autem in vino ſumptum menſtrua pellit.

Iuniperi fructus introſumuntur: ramenta verò occidere produuntur.

Coriandri herbe ſuccus interficere creditur: ſemen verò medicatum.

Quæ ratione medicos unimè vniuerſalibus, ſed potius particularibus niſi præſtiter: Nam eorum plerumque eſt maxima differentia quæ eadem eſſe putantur.

Sume igitur

Pro folio Indo & Malabathro: folia Citri, (Macis aut Spica ſumitur ab alijs)

Canelle vel Malabathri vulgaris.

Pro folijs Lauri, Citri folia.

Papaveris albi, Solani folia: Paueris nigri minore quantitate, vel folia Hyoſcyami albi.

Letuſca Scariolam, & contrà.

Cichoria ſilueſtris: Dentem leonis.

Pro Eupatorio, Aſarum & media pars Abſinthij.

Pro Strutio, Nux Vomica & tertia pars Piperis Aucenn:

Pro Diſſanmi prima ſpecie, ſecundam, tertiam, vel Pulegium Cernuinum.

Calamentum montanæ primæ: ſecundam, & tertiam. Sic de ſimilibus.

Chamaepij: Chamaedry, & folia Eupatori.

Malua ſylueſtris: hortenſem.

Malua arboſcente: Althæam.

Thlaſpi, Naſturtium.

Mentha: Baſſamitam.

Pulegio Regali: Cernuinum & contrà.

Lepido Pauli Agrieta, Draban, vel Ibrida, vel Naſturtium.

Phyllitide: Aſplennum ſine Scolopendrium, Cetrachus, & contrà.

Folij Olea } Folia { Nucum Inglandis,
vel Læiſti } Cupreſſi,
Pini, vel
Pinuſtri.

Folij Myrti } Baccas Myrti,
vel Inglandis nuges
immaturas.

Folij Oleaſtri: Olea folia.

Folij Terebinti, Lenticiſci folia.

Myrto alba: nigram & contrà.

Folij Myrti: folia Pyri ſilueſtris, Sumachi, Leu-

iſci, Cotini, Sorbi, Cydoniarum.

Thymo. Satureiam, vel Organum.

Ruta ſyl. Rutam domeſticam ſiccata maiori quantitate: vel contrà.

Spica Lauendula: Lanendula ſpecies hortenſes.

Adiantho, Saluam vitam, Polytrichum, Adiantum nigrum Plin. In Aſthmate viola par pandum cum medietate Glycy.

Telephio: Perulacæ.

Portulacæ: Umbilicum Veneris.

Folij Sambuci, Ebuli, & contrà.

Beonica: Verbacam.

Meliſſa, Corticem Citri, Marrubium, & contrà.

Ajio montano; domesticum siccum in maiori dosi.
Cepæ; Portulacæ.
Narda montana; Nardum Gallicum.
Philyrea folijs, Oleæ folia, & contrâ.
Folij Cærisfici, Ficus domestica folia, & contrâ.
Thymbra: Thymum vel Læticum.
Pro prima specie Calamimba, secunda, pro secunda, tertia.
Coriandri folijs, Petroselinî hortensis folia, in externis remedijs tantum.
Hypomarathro altero Coriandrum vel Petroselinum domesticum.
Folus Dauci, Pastinacæ agreilis vel domestica folia.
Cumisa prima: secundam.
Cumisa secunda: tertiam maiori quantitate & siccant.
Sanguinalis fæmine folijs, folia maris, & contrâ.
Hippuride prima: secundam, & contrâ.
Semperuino maiore: paruum Umbilicum Veneris, & contrâ.
Folus Labruscæ: domestica vitis folia minus cul.a.
Chamelæ: Thymelæam, Chamæsityn primam Diosc. Lantæolam.
Alina folus: Helxines folia, & contrâ.
Vitis alba: nigram, & contrâ.
Bubonto, sine Inguinaria: sine Astere Attico, Antirrhinum, & contrâ.
Folus Sabina: folia Cupressi, Iuiperi & Cassiani.
Pro Hyperico, poudus Schœnanthi.
Semperuino, Sicc. Lactuca & Solani.
Colocynthide, triplum Cucum. Asinini.
Dortico: Mandragoræ, & contrâ.
Draguntio: Ari.
Folus Abietis: Populi folia.
Eryfino: Erucam, & contrâ.
Folus Hippolapathi, Lapathi folia.

Folus Piceæ: folia Pini.
Lathyridis folus, Tithymali folia.
Libanotide sterili, folia Libanotidis ceromaria.
Lepidij folijs: Nasturtij folia.
Nymphaea alba: luteam, & contrâ.
Sorbi folijs, Meisuli folia, & contrâ.
Oxyacantha vera: Pyrastrum.
Folij Peyli: Tithymali folia.
Pitynsæ folijs: Tithymali folia.
Polygoni maris folijs, fæminea folia.
Filice fæminea: marem.
Seride: Condrillam.
Smyrno: Apium aut Petroselinum.
Solanî hortensis: Halicacabum.
Symphiti Petrai folijs, alterius folia.
Pro Betæ alba: nigram.
Pro vniuersæ Tithymali folijs: folia aliorum in laxando.
Pro Tragerigano: Origanum, & contrâ.
Pro folis Tribuli terrestris in refrigerando: folia aquatici, non in humectando.
Pro Hippocri folijs, folia Papaueris.
Pro Verbasci vniuersi folijs, aliorum folia.
Pro Spica Indica, Syriaca: Valeriane montana ra ix.
Pro Vitis folijs & semine: Ruta folia & semen.
Pro Scendis folijs: Lactucæ folia.
Pro Buglosso sine Boragine lasifolia: Buglossum angustifolium.
Pro Soncho leui, Sonchum asperum, & contrâ.
Pro Fumaria: Senam.
Pro Hyssopo, Origanum, Samysuchum.
Pro Hyperico, Androssemum, Ascurum, Schœnanthum.
Pro Stæbe Diosc. Stæben herbariorum, Iaceam, Scabiosam, Pastariam bursum, Bellides, & Guaphaba.
Pro Halyca, Auenæ pisanam totam.
Pro Amylo farinam Siliginis siccam.

CAPSVLA RADICVM SECVNDA.

5	Coffus dulcis Arabum		
4	Tussilago	Aristolochia	
3	Helenium.	Clematidis	
2	Iris Florentina	Aristolochia longa	Hermodactylus
1	Pro radice Iridis Venetæ	Aristolochia rotunda	Asphodeli

Pro { *Acoro, Acori pars media, sexta Anomii,*
Acoro, pondus Cimini cum 3. parte Aristolochie,
Aristoloch. rotun., Zumbet pondus aequale,
Aristolochia longa, Zumbet pondus aequale & medietas Piperis.
Ciclamine, aequale pondus Aristolochia & sexta seminis Cistri & Mentastri.

CAPSVLA RADICVM TERTIA.

5	Graminis						Glycyrrhi- zæ
4	Asparagi			Staphisagria			Tussilagi- nis
3	Rufci	Oenanthes	Aristolochia onitis	Bryonia	Zedoaria	Cypeti	Helenij
2	Petrofelin rad.	Rubia maioris	Asari	Pyrethri	Coffi	Galanga minoris	Venetæ radix.
1	Pro Apio	Pentaphyllo	Cappari	Mequin	Zingiber	Galanga crassa	Inde Flo- rentina

Pro { *Gentiana, medietas Asari & radice Capparis.*
Polypodio, Episthymi medium pondus
Tellieula vulpis, Semen & contra.

CAPSVLA RADICVM QVARTA.

3	Cucumeris agrestis	Centaurei minoris	Polypodij	Ellebori v- rriulque		
2	Aspidodeli	Suc. Rosarum	Turbith	Ebuli	Afari	He. moda- tylorum
1	pro rad. Gen- tianę	Rhabarbari	Agarico	Hemmoda- tyli	Cyclanunis	Asphode- lorum,

CAPSVLA RADICVM QVINTA.

3		Rad. Buglo- fi vtriusque	Maluarum	Thapfi bar- bari	Spondylii	Radix. Vlni
2	Passulę	Behen ru- brum	Bismaluarū	Bistortę	Pancratij	Consolidę minoris
1	Pro rad. Gly- cyrrhizę,	Pro Behen albo	Liliorum	Quinque fo- lij	Squillę	pro rad. Con- solidę ma.

Behem vtrumq; L'Ob.]

Cum radice Behem albi & rubri destituamur, necessarij Succedanej vtendum. In Cordi dic-
tissimis medicamentis, vt Diamorfo dulci & amaro Mesua & alijs similibus, radices vtriusq; Bu-
glofi substituenda.

In Medicamentis ad Venerem; Horminum, Satyria, Sciucus vel radices Pastinacę satina &
silynestris Dioscoridis, sine Danci silynestrie Galeni & Officinarum, Aliuany exemplo qui eas Behem
substituit in Dysatyrrio. De his plura, in Plantarum obseruationibus, aut Illustrationibus nostris.
& Aduersariorum altera parte.

De Ben sine Balano Myrepsico in Aduersarijs egimus, pag. 414.

CAPSVLA RADICVM SEXTA.

5		Corticis rad. Lauri	Afari	Staphidis agriz	Behen rubri
4		Cort. rad. Sā- buci & Ebuli	Afi	Clematidis alteri- us siue Flammulę	Behen albi
3		Fraxini, vel Populi	Serdentariz	Rad. Dentillariz	Boraginis
2	Rubiz mino- ris	Tamarisci	Raphani a- grestis	Pyrethri	Buglossi
1	Pro rad. Ru- biz maioris	Cortice rad. Caparis	Cortic. Sam- buci		Glycyrrhizę

TABVLA SIVE CAPSVLA SEMINVM.

1	2	3	4
Pro sem. Cucurbitæ	Melonum	Citrulli	Cucumetis
Lactucæ	Portulacæ	Endiuæ	Scariolæ
Violarum	Papaueris albi	Papaueris nigri	Hyoscyami
Bombacis	Malux, Bifinalux	Pisyllij	Cydoniorum
Linij	Fenugræci	Lauendulæ	Keyri rubri vel Citrini

CAPSVLA LIGNORVM.

5	Citrinum	Xylobalsamum	Scobis Buxi
4	Rubrum	Sutculi Lentisci	Ebenum
3	Pro Santalo albo	Aspalathus	Guaiacum
2		Ligno Aloes	Echinæ radic.
1			Salsaparilla

PVRGANTIVM.

1. pro Scammonio	2. Diacridis	3. Colocynthis	4. Aminoniacum
Sena	Semen Carthami	Folia Brassicæ marinæ	3. Sal gemmæ
Folij Scammoni	Thymelææ	Cianizæ	2. Sal Petreæ
Semine Hederæ	Sem. Afari	Sem. Geniftæ	1. pro Sale nitro

4					Coccus Cnidius	
3	Thymus	Chrylocolla, vel forte Chrysolith.	Elleborus albus	Althandal	Semen Ca- taputicæ	Rhaponti- cum
2	Epithymus	Lapis Arme- nus,	Niger	Diacridium	Rad. Tithy- mali	Myroba- lans
1	Pro Cassitha	Lapide La- zuli	Colocyn- thide	Scammonio		Rhabarbaro

Polypodium	Rhabarbarum	Chamelæa	Esula
Turbith album	Lapathio	Thymelæa	Turbith
Turb. cineritio		Biastica marina	Polypodio

SEMINVM.

5	Capita Papa- ueris	Acetosæ					
4	Semen Ma- dragonæ	Portuacæ	Citrulli				Semen violarû
3	S. Hyoicya- mi	Scariole	Melonum	Bismaluz	Fœnugræci		Crici
2	Papaueis nigri	Endiuæ	Cucumeris	Miluarum	Lini	Pfylj	Vrticæ
1	S. Papaueis albæ	Lactucæ	Cucurbitæ	Bombacis	Sesami	Cydo- niorû.	

SEMINVM.

5	Cumini	Pastin. syl.	Rutæ agrestæ			
4	Carui	Pastinacæ domesticæ	Rutæ do- mesticæ	Sinapi	Semen con- tra vermes	S. Paliuri
3	Fœniculi dulcis	Petrofelinæ	Anmeos	Eruæ	Caulium	Hyperici
2	Anisi	Apij	Seseli Aethi- opici & Pe- lopouensis.	Thlaspi	Rapæ agre- stis	Milij Solis
1			Seseli Massi- liensis	Nasturtij	Rapæ do- mesticæ	Alkekengi

SEMINVM.

Piper longū	Cardamomi maioris	
Piper album	Cardamomi minoris	Granorum Paradisi
Pipere nigro		Cubeborum

3	Berberis	Sorbarum
2	Vuarum immaturarū	Mespilorum
1	Spinæ albæ	Cornorum

Pro { *semine Myrti, Berberi, & contra.*
Napi, Rapi.
Conthari, Vrtice, vel Agniscus
non Trachiscanti.

Pro { *Mandragora, Cicuta.*
Semina Asari, Semen Ge-
niffe.

SEMINVM ET FRVCTVVM.

5	Geni- fice	Ace- se	Gallarum	Cytini	Vua Corin- thiæ		Ficus
4	Asari	Citri	Sumach	Balaustio- rum	Passulæ mundatæ	Tantr-Indi	Sebesten
3	S. He- deæ	Berbe- ris	Myrtillorū	Cortic. ali- granati	Daſtyle	Prunæ aci- dis	Iunibz
2					Pruna dulcia		Passulis mundatis
1					Ficubus.		

CAPSVLA FLORVM.

3	Oenā- thes	Cichorei	Nymphææ luteæ	Sambuci A- brociani	Corticum Glabris	Saluiz	
2	Myrti	Bugl-ſſi vul- gans	Nymphææ albæ	Meliloti	Balaustiflorum	Sax. haidis	Genistæ
1	Rofa- rum	Bugl-ſſi la- titatius Bo- raſis	Vioarum	Chamaemeli sol:Chamaemeli flos.	Cytini	Anchos	Sambuci

3	Leucoij		Flo. Cichorei		Spinæ, vulgo <i>Aſpis</i>
2	rubri	Flo. Tama- riſi	Flor. Intubi domestici		Lauendulæ
1	Leu. lutei	Flor. Genistæ			Flor. Saluiz

DE SVCCIS.

PRO ACACIA succoꝝ succus Prunellorum probatur, & Rhus Diasc.

Dioscorides succum Hypocistidis substituit: verum aliquanto magis adstringit & siccatur, si in antiquorum pharmacis recipiatur.

Pro Opio, Mecumum, vel succu Lalluca syl. vel domestica, quantitate maiori, Sem: Hyoscyami: triplum & Afandrog. duplum.

Pro Absinthij succo; Abrotani, Eupatarij, vel Centaurei minoris utriusque; vel Agerati.

Pro succo Absinthij Pontici, nostratu Romani succus; differt tantum regione, ut Macedonicum à Pontico. In externis remedijs, Santonicum & Marinum; vel ablinum leuiter in internis concedatur.

Pro Opobalsamo; Stacte, i. styrax liquida non adulterata; vel oleum Myrrha. In suffusionibus ad digerendum; Oleum Spica Laudale; quod aquitennium est parium: sed impari mensura.

Pro Glycyrrhiza succo, infusum & decoctum eiusdem, vel succus vinarum passularum, vel vinum colium, sine saça.

Pro Lycio; Amura.

Pro Citri succo; Limonium.

Pro Thymela; Chamelae succus.

Pro Cyclaminis; Iridis.

Pro Omphacij; Rhois, & contra.

Pro Aloe; Absinthij succu.

Pro Sempepini; Coryledonis succus & contra. vel Solani, Lalluce.

Pro Sanguis Draconis; Laccam substituit Amicem in omnibus operibus suis.

Pro Elaterio; succus Cucumeris agrestis aliquantum collui.

Pro Saça; vinum dulce, & contra.

Pro Licio; Gentiane succus in ulceribus.

Pro aqua fontana; fluitatilis.

Pro aqua pluvia, fluij potius quam fontana, contra quam Galenus precipit in Diacodio, quia composita est partim ex pluvia, partim ex fontibus.

DE LIQVORIBVS.

ET LACHRYMIS.

PRO Opobalsamo, Stacte sine Myrrha liquida natura vel arte parata: Liquor Terebinthi.

Opocarpabum, ut auctor Succedaneorum precipit.

Non } Oleum Lurinum.

Liquor Myrti.

Non semen Myrti, & Zedoaria, ut precepto-

res nostri stauerunt. Pro Carposalsamo semen Lemusci vel Terebinthi, cuius multa sunt species. Cubea in minori dosi; vel Terebinthi partes dua, una Cubebarum.

pro Cedria } Oleum eramentis Iuniperi paratum per descensum. vel Gummi Iuniperi.

Pro Xilobalsamo, serculi Lemusci.

Pro Oleo lachryma, G. Elemis.

Pro Galbano, Sagapenum.

Pro Sagapeno, Cumi: Cedri, Pini, vel Opopanacu medum.

Pro Ammoniaco, Propolis, sine sordes Alutariorum.

Pro Myrrha: Bdellium, vel succus Smyrni; vel Asy.

Pro Opopanace; Ammoniaco, vel Galbanum, vel Bdellium, maxime cum emolliro volumus. Gal. usus est Propolis in externis.

Pro Macna thuris, cortex cui adharet aliquid eburiæ.

Pro Thure, Mastiche & resina pini sicca.

Pro Styrace, Benzoinum.

Pro Terebinthina, Mastiche.

Pro Mastiche, Abietina resina indurata aut fixa: ut docet Diosc.

Pro Cupressina, Liricina.

Pro Abietina, Resina Pini.

Pro Pice, Resina Pini cocta.

Pro Pice liquida; Pix Oleo dissoluta, vel pix ex oleo Iuniperi liquefacta.

Pro Pissaphalto, fix & Bitumen.

Pro Mumia, pissaphaltum.

Pro Asphalto, Petroleum, vel Gages, & contra. Et carbones petras à terra visceribus, quibus sibri ferrarij videntur.

Pro Lacca, Myrrha.

Pro Adipe Ursi, Vulpis.

Pro Adipe Asferis, Anas vel Gallinarum

Pro Adipe Capi, Gallina.

DE MINERALIBVS.

PRO Antiimonio, plumbum vstum, & contra. Auicem. & Stannum vstum.

Pro Lythargyro, plumbum vstum, Malydana.

Pro Plumbo, Stannum.

Pro stercoribus, arneis.

Pro Spodio, Antispodium, ex Myrto Lemusci, Olea, Oleastro, malo Cydonio, vel Cornu cerni vstum.

Pro Pompholyge, Spodium Diosc.

Pro Cadmia, Lapis calaminaris.

Pro Sandaraca Gracorum; Aripigmentum & contra,

Fuguentum

Vaguenium Comitisse Guil. Variegana.

A Rondelletio neglectum fuit, quia non magna arte paratum, ex aditriugentium farragine, quæ satis respondet Emplatro contra rupturam Plantij apud Femelium. Sed quia quotidiani usus est, eius descriptionem suo loco omisiâ hîc dedi.

Rec. Corticis mediani Castanearum,
Glandium Quercus arboris (videtur legendum cum Andernaco) ad differentiam Glandis Suberis, Illicis aut aliarum glandiferarum arborum : Non multum tamen refert, etiam si assumantur integri Glandes cum corticibus suis & Cupulis, ut aliqui solent.

Gallarum,
Myrtillorum,
Equiseti,
Corticum Fabarum, (aliqui non ineptè Fabas integras)
Acinorum Vux Labruscæ,
Sorborum siccorum,
Mespillorum immaturorum sicci
Foliorum Pruni syl: (alij radicis cortices)
Rad. Celidoniæ, (alij melius Bistolæ siue Britannicæ) ana. vnc. 1. f.
Contundantur, & decoquantur ex aqua vel decocto Plantaginis q. s. Deinde percolatis Cæx nouæ (alix potius) vnciæ octo, in Olej Myrtæ a. lib. 3. f. liquefactæ, abluuntur frequenter & Ex tandem sequentes pulueres inspurguntur.

2. Alij Myrtæ & Mastichini, ana. lib. 1. f.

Rec. Corticis mediani Castanearum,
Glandium Quercus,
Gallarum, ana. vnc. 1.
Cineris Ossium cruris Babuli,
Myrtillorum,
Acinorum Vux Labruscæ, aut alterius omphacitis,
Sorborum aut Mespillorum immaturorum siccorum, ana. vnc. f.
Pasilulorum è Succino vnc. 3.

Medicorum insu Lud. Myreus in Germania hoc Emplastrum Opuntia vocatum, ut sequitur parabat, omisso confusus repetitis simplicibus.

Rec. Corticum Glandium,
Granatorum,
Foliorum Quercus,
Equiseti,

Myrtillorum,
Gallarum,
Corticum Fabarum,
Gygarum Granatorum,
Mespillorum,
Sorborum,
Corticum Cappatorum.
Corticis rad: Pruni syl.
Rad. Tormentillæ ana. drach. 3.
Contundantur & percoquantur.
Ex colatura abluæ,
Cæx nouæ vnc. 2. f.
Olei Mastichini,
& Myrtæ, ana. vnc. 4. & f.
Pistremò adde
Pul. restituti, vnc. 1. f.
Troscil. è Curabe, vnc. 1.

Pul. restitutus.

Rec. Gygarum Vux Labruscæ, vnc. 1. f.
Gran: Myrti,
Sumach,
Florum Granatorum,
Nucis Cupressi,
Gallarum immaturarum, ana. vnc. 1. f.
Boli Arm. præpar:
Sang. Draconis,
Terre sigil. ana. vnc. f.
Licij,
Hypocistidis, ana. drach. 3. scrup. 2.
Succi Acatiz, drach. 5.
Succini albi,
Mastiches,
Thuris, ana. drach. 2. fiat Puluis.

Emplastrum Dia. Chalciteos Chirurgorum, siue Palmæum Galeni, frequentissimi usus, omisso suo loco,

Rec. AX. Suillæ veteris, lib. 3,
Olej veteris, & Lythargyri loti, ana. lib. 3.

Chalcitidis vitz, vnc. 4. Coque & moue spatula parata ex viridi recentique succulentato pinnati folij, crassiore nervoso caule aut pede Palmæ caudici proximo.

Montepeliensēs apud quos Palma crescit, inter coquendū turiones aut tenerissima Palmæ addunt. : Reliqua Gallia quæ Palma caret, Ligustrū substituit. Rondelletius succum vel decoctum præcisum Taphi Barbati commendabat vna cum floribus, arthriticis doloribus demulcendis efficax; sed Emplastri candore derogatur.

Quidam Chalcitidem vrunt, terunt, lauant ex eodem decocto.

Septentrionales spatula Saligneæ vtuntur.

N 5 Deus

Pagina vacatura implenda sequentia addida.

Ben, siue Balanus Myrepfica fructus est filicii similis, descriptus Aduersariorum pag. 414.

Quia videmus multos falsos & anxios esse, nosque metipso nescire quid Behen utrumque Arabum sit, pauca quale debet esse & quibus possit viribus indicabimus.

Behem, Behenium interpretatur Auerrhoes:

Scitatio duas ita. ut species, album & rubium; Vtiam vtramque esse ait (Venas autem radices vocat) magnitudine Pastinacae parum radibus pares, quarum quaedam tortuosae sunt: Deseruntur ex Armenia: odor eius bonus est, & in eis est viscositas quaedam. Vtraque calida & humida, augmeniumque faciunt in sen ine.

Auerrhoes calidum & humidum esse, stomachum calfacere, instrumenta spermatum: exasperare, fortificare virtutem concupiscibilem coitus, praestare spermata, & contra melancholicos humores valere ait.

Rhazes Behen rubro eisdem facultates ascripsit.

Difficile est indicare quid velint Arabes per Hermodactylum, nam vix est & quicquid: aliud apud Arabes, aliud apud Graecos designans. Graeci Pentaplastum vocant ut Dioscorides testatur. Arabes radicem albam duram per Hermodactylos inuenerunt: cuius nulla reperitur rubia.

Infamia opus est radices albas & rubras pro Behen vtroque distrahunt: Sed nouis & coloribus faciliatim Scirapione traditis, nunc est conuenienter luterantur: utriusque Pastinacae parum, inodo: & neque ad odum tenent, ideo reuerentiae Adde quod euasitales esse vix, cum ex Armenia deferantur, siciores sunt, non humidae: quare neque melancholicum humorem castigant, vi *Auerrhoes* vult, quia non humectant; neque etiam spermata augere, vel Venerem prouocant, deperdito humido radicali: huiusmodi enim siccitatem melancholici humoris castigant; corpus alunt, semen augent.

Anguillaria & Itali Behen albu & rubrum Daucum satium & agrestem Diosc. & Gal. esse statuerunt, vbi in Sinapium illud traionib diximus. Consulto Galenum.

Cum non constet quid per Hermodactylum velint, cumque vtriusque Behen radices non sint genuinae, necessario Succedaneo utendum.

Pulueribus Cordialibus, ut Diamosci & aliorum, radices vtriusque Buglossi loco Behen sumendae.

In In medicamentis ad Venerem, Hormonium: vel radices Pastinae & Agrestis Diosc. ut Aetianus fecit in Diasatyrio, in quo radicibus Dauci domestici & agrestis usus est.

Diasatyriū Aetianij Diasatyrij Mesueti & Nicolai, quae saepe à Pharmacopolis confunduntur praefendum.

Constat relictum Syriij viridis, rad. Dauci satium & syl. Nucis Indicæ, Pistachionum, Nucis Pineae resurgat, singulorum drachmis duodecim:

Zingiberis Carvophyllo uni, seminis Anisi, Eruct, singulorum drachmis quinque: Cinnamonis, Sinapi Bubri seminis, singulorum siclico (id est drachmis duabus) & sesquialterupulo: Mellis sesquialtera.

Mel huiusmodi salci reuocet quod in Sacchar, v. s. Roussetto teste.

Radices Syriij, Dauci, tam satium quam agrestis, priuatim & seorsim tunduntur, collectaeque in vnum, in oleo longum paululum seruelantur: Rursum Pistachia & Pineae nucleae tussae adiecit.

De Succedaneis Imitatio ne Rondeletij. 155

ie & rigantur, dum aliquam crassitudinem conceperint : deinde sublato ab igne vase, tuiæ & cribratæ species adduntur : postremò Moschus cum exiguo liquore, quem stullantes Rosa remiserunt, inseritur. Modus, cochleare est, ex vino dulci.

Pollet contra vesicæ & renum imbecillitatem : ijs etiam auxilio est, qui urinam reddere nequeunt : Venter mirum in modum stimulat ; eanique certa de causa cessantem haud segnitè restituit.

Diasatyriion D. Mesuz.

Rec. *Secacul albi & mundi, & elixati in decocto cicerum quorum prima aqua in qua decoquebantur, sit effusa. lb. 1.*

Testiculorum unipis, vnc. 8.

Radici Raphani, vnc. 3.

Radici Lappulani, vnc. 2.

Terantur hæ tres radices posteriores, & infundantur super eas lactis bubuli aut ovilli tantum, ut læ duos digitos emineat, adijciendo

Olei Sesamini,

Butyri recentis non saliti, ana. vnc. 4.

Coquantur cum facilitate usque ad consumptionem lactis. & donec omninò remota sint radices, & habeant instam spissitudinem instar pulvis crassioris : nam si aqueum quod in lacte & radicibus est, non consumatur, sinum contrahit hoc medicamentum.

Postea affunde omnibus hisce prædictis Radicibus,

Mellis despumati optimi, lb. 6.

Succi Casarii recentium, lb. 1.

Coque omnia simul ad perfectum decoctionem, deinde ab igne depone, & inasperge subsequentiæ specierum minutissimum pulverem.

Caudatum Scinci cum renibus & summe vnc. 1.

Seminis Erucæ,

Zinzaberis,

Bebenalbi,

Bebenrubri,

Lingæ anis [id est, seminis Frazini arboris,]

Seminis Nasturij,

Cinnamomi,

Piperis longi,

Seminis Bancia,

Seminis Napi,

Pulpa seminis Asparagi maximè recentis, ana. drach. 4.

*Confice cum eis : ultimò verò adijciantur subsequentiæ. * Pinearum mundatarum. lb. 1.*

*Fissicorum, (i. Pistaciorum mundatarum) vnc. 10. * Cerebellorum passerum, vnc. 2,*

Confice & misce omnia optimè, & aromatiza cum Moscho boni, drach. 1.

RADICIS Raphani, videlicet sativi, quam vocamus *Rettich.*

LVP H planum] Duplex est Luph (id est, Serpentaria) crispum scilicet & planum ; Crispum folia habet diuila & crispa. Planum verò lata & plana veluti Aron, vnde utriusque nomen inditum est ; Vulgò autem apud nos caiemus Luph, id est, vera Serpentaria : ideo eius loco accipiendæ sunt radices herbæ quam Aron vocant. Cordus.

P. C. SCHOL.

Testicula Unl. in hoc loco] Cordus hæc Orchin cum Satyrione confundit, ut ritè inquit Franciscus Alex : Quare Orchios dictio delenda est.


VALET *ad erectionem virgæ, multiplicat spermæ, & desiderium coeundi.*

DEus Opt. Max. Medicos pios, synceros, dociles, liberales, in omnes charitatem exercentes & mansuetos nobis largire dignetur, qui in primis Iehoux, deinde Hippocratis Divinai legibus deleantur, de ijs noctu diutè meditentur : quorum virtutis amore & proximi utilitate, oblectatio omninò sit in cognitione Morborum, præscribendi, præparandiq; Medicamentorum suorum legitima ratione, ut has semitas & tramitez, seruis suis Pharmacarijs & Chirurgis edoceant, quò fideliter se in officio gerere queant, edificantque secundum artis præcepta Antiquorum & Nuperorum optima, nuda, efficacissima Pharmaca, Medicorum & agrotorum

Grotum blando leuamine, componere, (horum namque sordida & empirica famelica, & perquam ignara pars, hæc nescia; empyricis crassa Minerarum, nullius delectus, fallacibus trivialis Medicaminibus, muliercularum & vulgi Unguentis & Ceraus, assueta;) qui quidem se plura archana scire in arte gloriantur, quam Medici, & ab illis neque doceri, neque illos admittere volunt, ne detegatur illorum elata & crassa asinina ignorantia. Huiusmodi populares Medicastri & Medicarnes Lenæ, pluri sunt apud plebeos, quam plerique doctissimi Medici aulici apud Reges; quorum conditionis miserebatur *Rondellietius*, inquires: Reges, Principes, & Magnates Medicis solis curandis non committuntur; sed Cardinales, Equites, Nobiles, & mulieres clinicæ omnes suam proferunt sententiam, empyricis gaudentes; optimos quosvis Medicos à vera curandi ratione reuocant, & timoreni incutiunt; quare ne incusentur aut calumpnientur, nihil præscribere audent, nisi quod à magnatibus aulicis & sagacibus mulierculis, etiamque à vilissima empirica turba probatur. Cor vel mens Medici pij & docti MANVS DEI cum sit; cognoscit & curat morbos, cum Deus vult; est enim instrumentum, quod *Alanus Dei* regitur. Sic sunt res humanæ: eruditi perstringuntur, & pessundantur.

Succurre Te bona, iam veraces ex filijs hominum desecere.

FINIS.



Epigramma in Opera nouissima L'Obelij.

Scripseras (heu nostri dispendia maxima seculi!)
 Plantarum Historiam Salomon Rex inclitus olim:
 Huic aus damno ingenti nostratis, vi omni
 Succurras studio, doctus L'Obelius omnem
 Etatcm insumpsit: magnis Deus adsuit ausus,
 Simplicium nemo facies, viresq; reclusit,
 Clarius aut melius Composita Pharmaca nemo
 Tam docta miscere manu, Formasq; vetustas
 Emendare; nouis artem diare repertis
 Edocet: ista sequens dignosces rectius atq;
 Nostrâ hac, sordescit Virtus, con'emissur, alger.

Fran: Heringius D. Medic. Collegij Medici Londinensis Socius, amoris & amicitiz causa Mnemosynon posuit.



LONDINI

Excudebat prælum Thomæ Purfootij 1605. Id. Aprilis.

Cum gratia Priuilegij Reuerendissimi Domini Ioannis Archiepiscopi Cantuariensis; cuius iussu subscripsit *Hadrianus Saranus*,

DILVCIDAE
SIMPLICIVM MEDICAMENORVM
EXPLICATIONES,
&
STIRPIVM ADVERSARIA,

Perfacilis vestigatio, luculentaque accessio ad Priscorum, praesertim *DIOSCORIDIS* & Recentiorum *Materia Medica* solidam cognitionem.

Methodo exquisitissima, a notioribus summisque classium generibus ad ultimas usque species digesta.

Auctoribus PETRO PENA & MATTHIA De LOBEL. *Medicis.*

Quibus

Accessit ALTERA PARS, cum prioris

ILLVSTRATIONIBVS, CASTIGATIONIBVS,

AVCTARIIS, RARIORIBVS aliquot PLANTIS.

Selectioribus REMEDIIS,

SVCCIS MEDICATIS & METALLICIS, Medicinæ Thesauris,

OPII, OPIATI antidoti, decantissimiq; Chymistarum & Germanorum LAV-
DANI OPIATI formulae,


Opera & studio eiusdem Matthiae de L'Obel.

Reliqua suis locis designantur.



LONDINI. 1605. Idibus Aprilis.

Ex Typographia Thomæ Purfootij.




THEATRVM VNITA DEVS.



Suauissimā Concordiā dissoluationem continuit.

Præsentem monstrat quælibet Herba Deum.



Mendæ præcedentis pag.

Legæ lineæ 17. decantatissimi.
Demæ lineæ 7. distinctissimi.

ANTIQUISSIMAE ET NOBILISSI- mae Nitiobrigum Academiae, Regiis Professoribus, ceterisque bene-meritis Praeceptoribus Monspeliacis,

Operis argumentum & emolumentum.



ET SI quædam fatalis Orci filia seritas, diis extreme deformitatis exemplis iamdudum isthic grassata, tantam stragem mortaliū, in id & virtutum valitatem lecerit, ut non tantum Vrbes & Academijs seie vbiq; Galliarum studiosis hominibus, sed etiam studiosos ipsos ossiosa gratia; humanitate exhauserit: tamen istius vrbs, gentis & soli amenissimi, veltiq; & commilionum amoris, & collatz in nos beneficentiz suauissima recordatio, tantum & tandiu apud nos viguit, dum non modò non ingratos esse se iuisset, sed etiam fecisset audaces. Quippe varijs & celebribus in Academijs & Regionibus Europæ multum & diu versatos nos, tum Praeceptoribus Medicis & Philosophis eruditissimis vsos, vestratandem Schola exceptos, ea nos accuratione & exercitatione de integro excoluit, ut minimè operæ postea postea vnq; penituerit. Cumq; inter studiosum oblectamenta, Herbariam cognitionem veluti conuolumenta quædam lauto: a ieiunioris aut asperioris Medicæ Physicæ habereimus, eoq; nihil ferè herbarū in Italia; Germanijs, & reliquis Gallijs, aut finitimis regionibus, vel inspectione vel seiscitatione incaptolatorum reliquimus: tamen posteaquæ pax vel maiore sedulitate Narbonæ tum Mediterraneæ & montanæ, tum Maritimæ varijs item rusticationibus lustrassemus, multas deesse cæteris regionibus, quæ huic abundè familiares essent, nec pauca superesse cognosceret. Das ijs doctissimis vestigatoribus, qui multas nos docuissent, conperimus. Enimvero si delicias & diuitias plantarū, quæ Narbonensi agro cis transq; Rhodanum Lyguribus & Pyrenæis alpinis vtiq; maritimis contemino virent, cum pleriq; Septentrionis, vel ipsis Italiz tractibus quib; conferat, hæc saltus & pascua, humas aut desita loca putet: Norbonenses autem præfecturas, amicitate & varietate feraci Elysia vireta dicat: illis quidè sparsim multa & rara, sed hæc tum eadem, tum longè plurima & lætiora etiam in montis & conualis ambitu pusillo, quasi vno Euxorzi Orbis conpendio, occurrunt. Tanta inibi agri ætherisq; consensio & auxilium blanditæ eas fouent, ut montes Meridianas ab æstu, conualles autè Septentrionales alsiosas à frigore, vindicent: ut nec iam aliud cupiat Apollo suam sacrosanctam Musarū Aclepiadæum Agamippen, aut Montem illum Pelion olim celeberrimum, quàm Montem Pelum translatam. Quare qui iam tum multa lætione, rerum exercitatione & vestra indagine, hæc plantas diligenter conuassassemus, præsertim quas nondum in literas missas rebatur, veriti conuincimur biennio post sequamur narisgram reimpellat, atque audiui noscendi, num plures vestriatibus & rariotes alerent Aquiloniz plagæ, quæ minus videntur noxæ fuisse antiquis Botanicijs, huc in portum tranquillitatis, caslem nolq; vnà commodum subduximus: vbi rursus singulis annis tam multas consequuti sumus, partim hic oriundas, partim satas, etiamque ex vtrisque Indijs & Acrijs inuectas, ut eam numerus penè altero tanto, vel Theoph. Diosc. & Plinij, vel Matthioli & Dodo: qui ut postremi omnium hanc familiam ditarent, ita primam laudem meriti sunt, copias superarint. Ex igitur mundi senecta cum in Philoſophiæ sinu vestrum onuiū interitum, imò & bonatū artium *uirtutis* penè eluxissemus, quò iacturam tam excellentiū mercurij, & dispensationem lucrificeremus, lubuit quantum vspici habuissemus & meminisse potuissemus vigilatorum & rariou herbarum de integro recensere, easq; institutorū more, quasi in paginis dati & accepti suis popularibus ex aduerso aggregare: quod genus cōmentarij Cicero *Aduersaria* vocat, quia tumultuariè & è re nata cō recens acceptæ debiti portiones potius congerantur quàm digerantur, ex quibus potius codices absoluti consunt. Quo quidè nomine, neutiquā nouandi, aut cuiquā aduersandi, sed potius modestæ causa & calumniz eludendæ, vobis hæc muneri mittere noluimus, aut potius vestrata rempore & remetin beneficia, *gratias* ut ferunt Charitum leges, quæ absolutum opus profiteri. vnde futurū speramus, siquidè vobis vacat (debet autè vacare & placere) ut ista Aduersaria, siue opū non modò Norbonensiū, sed vtriusq; oib; congeries, in codices nitidos vestris perspicacioribus iud cijs re digantur, nec parum gratiæ à vestra dignitate consequantur.

Ceterum ne huius naturæ partis, quàm *voluptuosa* iure Theophrastus vocat, immensitas, Tyronibus metum vel laborem nimium afferret, nève nescio quis Caprinulagus, institutum, res, aut ordinè, potius quàm flores aut fructus in hoc opere carpat, monendus est benignus lector, nos summo studio habuisse, ut quàmplurima paucissimis cōmodissimè diceremus. Proinde *Aduersariarum* voce nouas veteribus additas plantas, & nouum ordinè quadatenus inuimus. Qui ordo vtiq; sibi similis & vnus progreditur, ducitq; à sensui propinquieribus, & magis familiaribus

*Nomen acci-
si.*

testatim.

*Ordo vniuersi-
salis.*

hua

bus ad ignotiora & compositoria; modumque siue progressum similitudinis sequitur & familiaritatis, quo & vniuersim & particulatim, quantum licuit per rerum varietatem, & vilitatem, sibi responderet. Sic enim ordine, quo nihil pulchrius in cælo aut in sapientis animo, quæ longè latèque disparata sunt, vnum quasi sunt magno verborum, memoriar & cognitionis compendio, vt Aristoteli & Theophrasto placet. Verùm, si idem quod illis, nobis hic contingat, neupè vt quam instituisset methodum, non potuerint vsquequaque sequi; operis inscriptio & tui bulem-ti huius æui quæ hæc apparabamus, fluctuatio nos excusatos habeat, apud eum sanè, qui nouit tantò plus habere perplexitatis tantum negotium, quanto venis minus. Quamuis dum reli-quarum stitipium, quæ hic non habentur, quasque plurimas per superiorem calamitatem hæc ex Gallijs accersere non licuit, Icones *ἱστὸρ καὶ* arguta manu & emodulata ad plantarum ip-sarum magnitudines & effigiaturas proportionem (quam alij picturæ sollecissimis crebrò delor-niant, dum herbulas æquè magnas ac arbores & fructices pingunt) delineantur & exculpuntur, datur opera in appendice, ne quemquam huius lectionis peniteat, Quin eum pudeat potius pœ-nituissè, nec vidisse domi & vno intuitu, sibi nusquam visâ aut lectâ, quæ multis mensibus aut annis pau: vix videre potuerunt. Et quia plantarum duplex est cognitio, altera nempe de facie exterior, altera virium, quasque interior: illa huic anteuertere oportere monet Philosophi opera, imò ipsa Natura. Neque enim potest quis vllam certam cognitionem sibi arrogare eorum simplicium quæ nunquam atpexit. Proinde nos primùm cuiusque nomenclaturam, vt quæ non rarò ipsam rem apè notat, è Græcis præsertim, enucleare conati sumus: obiter re gio-nem, & in ea scotissim natales; illam Geographiam, hæc Cōrographiam vocant; pressius quâ quiquam auctor antehac, designamus: vt quasuis plantas, quo loci, quando & à quo ipsi nati-cisci, vel amicos rogare mittendas, vbiunque tandem nostri o:bi, vel Indiarum illæ occurrunt, scire possemus. Descriptiones autem inter congeneres & similes, dissimilitudinis, collationis, & similitudinis ope, breuiores semper, etrendatiores plerunque & faciliores aptauimus, non tam antiquorum historiarum, quàm iterarum inspectioni & ex viuis ipsi plantis expansioni, quæ penes ius est & norma rectè & verè describendi. Sed vires parcius & consilio extenuis aringimus, quantum vel ad cognoscendum, vel ad probandum quantipiani vnani plantam satis videbatur, Aristotelem nempe in alio, & Theophrasti in simili instituto, imitati. Nam recentiores quidè, qui Commentatoris nomine turgent, potius videntur suum fastum, quàm plantas viuante eas nosse, endi describere. Nec ex locis natalijsve sereni historiarum inire, vt doctissimus & candi-dissimus scriptor Dodonæus cepit, sinunt plan:æ pluuiarum, quæ tum atidis, tum humentibus & rigulis erumpunt, vt Cardamine in vinctis, vijs & rigulis: Lapauum vtrunque, vtroque, aut v-bique: quædam in montibus pariter & conualibus, vt Eryngia, Calamentum, Polium, & alia quamplurima. Et quod in primis obseruati dignum, quæ iugis montum regionum calidiorum proueniunt, eadem in planis, syluosis vel depressis regionum Septentrionalium exeunt. Græcorum verò autorum ex ant potius Indices Alphabetici, quàm Simplicium Methodi, præter-quam opus Diosc & fragmenti Cræteæ, ex quibus illi vires & verba mea excerpisse videntur: vnam notas non neglexissent; aut eo pudore fuisset Plinius; quo diuinus Senex, qui se parum in Stipitum cognitione profecisse, professus est: aut Dioscoridem diligentius legisset. Diosco-ridea tamen methodus, optima quidem illa, illis qui iam diu nouerunt plantas: verum ad cog-nitionem compendiosam, *ἱστὸρ καὶ* inspectione, quam tantopere laudat Diosc, comparan-dam, minus est accommoda. Diversis quippe libris eiusdem speciei & similitudinis plantas di-straht, quas alioqui vno intuitu fere discas: veluti Cucumerem syluestrem à satiuo, Colocyn-thides, siue Cucurbitulas, ab esculentis Cucurbitis, Thapsiam à serpyllaceis, Crocum à Colchico, Scammonium & Soldanellam, à volubilibus, Sisymbrium à Meniha, Hieracia à Chondrillis, & quamplurima passim: tamen si alibi volens à sese desciauit, sequutus, quam nos hic adumbra-mus, Methodum, vt in Portulacis, Semperviujs & alijs,

Tyrones proinde monemus & rogamus, vt rei herbariæ totius Medicatrici cernissimæ & vtilissi-mæ, iucundissimæ, etiani minima quæque; explorent, persuasumque habeant, in istis Dejs diuinjs, nihil *ἱστὸρ* esse despicabile aut indignum homine Philosopho, cui vni hæc ille condidit, voluitque, vt est in sacra pagina, *Nos sanari herbit, non verbis, ne sapientia sua opera errata forent.* Nec posse Tritico, Vino, La:te, & Melle, olusculo, aut herbulis etiam contemptissimis, non posse corpora æquè sanari: æque ali: Neque Aristippos quosdam sericatos, vndular, auri & auræ po-pularis, quàm penitioris eruditionis stitulosiores, audisse, quos pudet hæc ferò doceri, & disce-re serid, arduiq; laboris tædet. Vosq; Præceptores clarissim, impendidi seram, vt mulceturis an-nuam, *ἐξ ἱστὸρ καὶ* vtriusque *ἱστὸρ* Aduersaria hæc, non secus ac peregrini aut hostes ex-pendatis, foueatis autem, concinnatis, & augeatis vt parentes: nosque sicubi nolentes lapsi su-mus (imò quia sæpè sumus) benignè monearis. Nec enim laudem venamur, dum taxat culpam vel inuidiam deprecamur: vester cæterò amor, beneque sibi animi nostri conscij, quos multi an-ni, multa peregrinatio, studia, omniumque rerū ætissima necessitudo amicitia deuinxit, nobis a-bundè præmium & precium sunt futuri. LONDINI, pridie Diuini Natalijs.

STIRPIVM ADVERSA-

RIA NOVA.

Graminis omne Genus.



ΓΡΑΜΕΤΙΣ QVASE AGRESTIS DICERETVR planta nec satiuā aut ferenda Græcis scitē nuncupata fuit : utpote quæ ruri vbique sponte quouis anni cardine , cælo , solo & fide luxuriat : eius namque perennis proventus feracitatis re-
stibilis , nec minus immensæ utilitatis quantum toto orbe ex-
tat terrarum , virore ornat ameno , & veluti gradatim sese pro-
pagando amicit decore , vnde Latinis Gramen deflexum pu-
tatur . Triticæ generi , vt cognata , & similis , sic perinde va-
ria & nobilitate proxima . Quin differentię magis confpicuæ

è radice , spicata coma , folio & flore sunt ducendæ : quas etiam cunctas partes & diffe-
rentias (quia varias tritici species æmulantur , deque mutua inter se collatione facilius di-
scernuntur & discuntur) aptius fore duximus nominibus & notis quamque suis , vel ni-
mias qualisq; prosequi , quas natura pecori quidem vscendas , sed homini vni non mo-
do vtendas , adeoque prius cognoscendas , peperisset . Nullum enim vel despiciatissi-
mum illius operum , nostra , id est , mortalium Philosophantium indiguum cognitione &
admiratione ducendum , summus Philosophus in libro , De partibus animalium , luculen-
ter docuit , eiusque alumnus Theophrastus in Plantarum historijs

Vulgatiu pratense	{	Maius,	}	
		Minus,		
		Minimum,		
		Rabinum vel Rucifum Montanum, folijs vesonica Caryophyllata,		
Caninum,	{	Longius radicans,	}	Officinarium,
		Bulbosum , nodosum,		

GRAMEN.

Harundinaceum scabrum , equi nex Babylonium aut Ciliacum .
Harundinaceum lene , & pilosum nemorum . *Ischemum ,* , forte *Plinij* .
Harundinaceum striatum album .
Harundinaceum Marinum .
Ischemum vulgare .
Parnasi hederaeo , aut Chelidoni folio , &
Plinij Arzoi effigie graminis suis locis .
Manna sculentum .

GRAMEN PRATENSE MAIVS VVLGATIVS.

EST igitur quàm quod notissimum gramen pratense dictum , vulgo notum , & Fœnum
quādo aruit vocatum , exilioribus radicum cirris seu pullis capillamentis , & creberrimis
cespitem summum sugens , humumque perreptans & tegens , densissimo & numerofo
foliorum triticeorum stipatu : culmos pedem & cubitum altos surgens , tenues genicu-
latos , lzues : lanosa , sparsa & magis harundinem Vallatoriam imitante spica fastigiatum .
Eius semine in horreis è spicis excusso & collecto vtimur complures Medici ad obstru-
ctiones viscerum , calculum , potu , ad motuque ad disculsionem pertinacium tumoram , &
statum , tametsi officinis visu ignoto ,

FOENYM.

Gramen vulgo
notum . *Trag.*
Ephæmæ
Folio . 107.

STIRPVM aduersaria noua.

MINVS.

Istud idem quod fundit Montanus, vel declius incultus, exactus & aridior ager, vt pabulo gratus & vtilius velleri, sic multò delicatius, minus, & semine efficacius est.

MINIMUM.

VARIETAS.



Aliud etiam in fabuletis squallidis, & vinetis glareosis Norbonæ sæpius visitur, omnium minimum: perpusilla radice, capillacea, alba, calamulis etiã capillamentis similibus, eleganti purpurea lucetibus, graminei lichenis vocato non diuersis, sed spica mollicella, latiore, sericea, speciosa.

RABINVM vel RAVISVM montanum, folijs vetonica garyophyllata.

Saginæ & lactis vbertati omnium laudatissimum: Montium accolæ opiliores Sabaudi & Heluetij Rabis vel Rabinũ vocant, quasi præstantius & præcipuum gramen dicas, (vt quasi Robus in Triticeo genere) Folijs est crassioribus, carnosioribus, breuioribus ad Tunicẽ vetonicam propius accedentibus, Motosis vdis Angliæ & Heluetiæ familiare.

GRAMEN CANARIVM, Medicatum Officinarum.

Germaniæ, gras.

Italiæ Gramigna.

Angliæ, quæth gras.

Galliæ, dent de chien.

Extat. figura, folio 343. apud Dodonæum, apud Mathiolum, 999.

ET istud perquam cognitum, sed in aruis & satis, non pratis, vt plurimum, frugibusq; haud parum incommodũ: eoque sementem facturi rastris Septembri, etiamq; primo Vere, manibus runcandum præcipiunt coloni. Prolixioribus, crassioribusque radicibus implexis, candidis, gustanti dulcioribus, geniculatis, longè latèque subtus tellurem serpit: minus numerosam sobolem promit foliorum triticeorum & harundinaceis minorum, egeniculatis calamulis, rigidioribus, crassioribus & longioribus, vti & folia, quàm pratensis: flore item spicato, minus tamen lanuginoso, asperiore semine, totaq; planta magis vesca dulcis & frumentacea, visibûsq; Medicis receptissima, præsertim radix, quæ reseat viscerum farctus & renum, citra calefactionem, lumbricosq; huius stillatitia interimit, nempe pabulo humorum putridorum fraudatos.

GRAMEN BVLBOSVM, NODOSVM.



Rarius aliquantò istud, minûsq; plerisq; Europæ regionibus vsu cognitum: Lemmano autem Lausanæ finitimis aruis & legetibus plurimum. Frequētissimum etiam Sabaudia & Angliæ, vbi idem efficacissimum experiuntur Medici eruditissimi quidam, Londinenses præsertim. Cuncta prorsum ei canino gramine similia sunt, si huic glandulas teretes, rotundas, gustu dulces, radicis antracibus hærentes, demas, aut illi addas.

CALAMA

STIRP I V M aduersaria noua.
CALAMAGROSTIS vel HARVNDINACEVM
forte BABYLONIVM.

3

PRATIS vdis, sed strigosis, macilentis & sabulosis neglectis familiare graninis genus istud, quod apprimè Babylonio respondet, ac quā Caninū gramen altero anto maius est, calamis & folijs rigidioribus, scabris, quibus ad harundinē valatoriam non parū accedit, nec pabulo cedit, nisi multum esuriant & penuria melioris admodum laborēt veterina, nec eo greges vescitur, quippe, quibus non modo ingratissimum (*agre & dur*, seu acidum, Rura vernaculè dicunt) verum etiam maciem, sitim & tabem conciliare creditur, linguam & oesophagum vulnerat & arctat, sanguinem in ventriculū elicit, vnde tumefactio, inflammatio & mors plerumq;. Quod si Babylone fuit enatū, vbi id maleficij pernicie adferre proditur, siccius & rigidius, grex verò imbecillior & aluo durior, minus mirum illius esu iumenta illic enectum iri. Sic enim videas interdū iumētorum labra & fauces cruore manantia & sauciata, quæ cum reliquo stramine pefenicecia, huius aut cōsimilia harundinacea folia esitarint: mediæ itaque inter harundinem & gramen est naturæ, figuræ, Radice geniculata, alba, promissiore & longo reptatu vagata, compressiore tamē & crassiore, Canario graminī simili, sed valatorium pante. Spicata, Panic aut Sorgi comosa lanugine.

GRAMEN HIRSVTVM NEMOROSVM,

[Ichnemum videtur Plinianum.]


MONTOSIS & opacis syluis Pedemontium & Lugdunensis Galliæ abens prouenit, duplo quā Caninum maioribus folijs, mollioribus, & deorsum reflexis milij, pilis & setacea lanugine multum hirtis, pallentibus. In sesquicubitali calamo geniculato, floribus canini graminis, similibus, maioribus, albidioribus, sed radice ciliibus fibris & capillamentis barbata, pratensis graminis. Iunio & Augusto, nec nisi nemorosis floret.

HOLOSTIVM quidam docti amici, sed imbecilla coniectura, augrabantur. Longè verius coniecturi sū, *χαμύρ* Plinianum dixissent: è terra quippe at in terram serpit milio similis, folijs asperis & lanuginosis, in naves farcitur. At recentiores aliud gramen subdendum docuere *χαμύρ*, de quo mox.

HOLOSTIVM.

*Ichnemum, Pl.
libr. 25. cap. 8.*

GRAMEN SVLCATVM vel STRIATVM album.



COLITVR istud in Belgio & Angliæ, syluosis autem, montosisq; Sabaudie & Galliæ Allobrogæ montē nascitur, milij potius folijs, sed vt iannæ Valatorie rigidis, mucronatis: longitudinem medium glaucam, complures candidæ venæ vel lineæ argenteæ insigniunt: culmos & Panic sylvestris vel canni erigit. Radix pusilla, fibrosa, albidā, pratensis graminis.

NONnullæ littoreis vadis quæ vndæ æstusq; æquoris illiduntur, præsertim ad *Aquas* Marianas & Peraus, proximè piscatorum attegias; gramen istud etiam harundinis æmulum, & triusque particeps naturæ, plurimum reperitur: verum luculentioris magnitudinis, & radicibus quidem ternas quaternasve vlnas prolis, digitum crassius multum flexilibus subter fabuletas, ubi Eringiû, reptantibus: geniculatis, cæcidis, gustu & figura prorsum Canini graminis, sed paucioribus anexas fibrillis. Calami verò & stipulæ geniculis & foliis superiori similibus donantur. Sed procerioribus & commosis lanosisq; inter harundinem & caninum gramen; floribus in auras, incunte hyeme, euolantibus.

ISCHÆMON vulgare.
 { CRVS Galli, DACTYLON PLINIO, }
 & Aculeatum, an Scirpus Tragi?
 Sanguinella & Capriola Italæ.

Inter Iconas.
 Trag. fol. 209.

Leoniceo per
 Cornu sine cornu
 nopus

VINETA Galloprovinciæ & Norbonæ isto scatent nonnullis æstatiibus; exiguum est gramen, sicut tamen elegantia, & viticulatorum cognitu dignum. Sunt namq; purpureo nitido hanthino lucidi calamuli, geniculati, surrecti, singuli, in quinas senasve exiles florum spicatas caudicellas, vel pannosas propagines, cyperidis modo, digitatim sparsi; aut potius graminis Mannæ vocati; Radice & folijs graminis pratensis minimi, sapore subdulci, sed altringente, & exsiccante; vnde potuit coniectura arripi Ischæmi Pliniani, à quibusdam non parum eruditis Medicis, vt Rondelletio & Asstatio præcepto-ribus exercitatisimis.

PARNASIUM hederaceum.

PARNASIV verò Dioscoridi memoratum gramen, & sic dictum magis vt videtur, propter passionem salubrem & opimam, quam propter similitudinis comparationem, quia facie pngè alia (folio nempe hederaceo & flore albo est) proximè chelidoniam minorem & cochleaream, cognitionis facilioris, & nostri instituti causa, relegamus. Alioqui possi quis ex vulgi vsu Burgundiacum fœnum dictum, Cytisum, aliaq; loti & trifolij genera pbulò laudatissima, gramina vocare; & huc aduocare; eadem prorsus ratione, & consuetudine plebeia: quæ aniam dedisse etiam Plinio videtur enumerandæ quedam AIZOI VRENTIS effigie gramina, quorum alterum medeatur Paronychiis vnguium, & canium excreffentis in digitis, eoque DACTYLON vocetur.

Gramina Plin.
 Aizoi effigie.
 Dactylon.

Alterum verò in parietinis & tegulis nascens, cui etiam caustica vis, & sistendo vicibus quæ serpunt astra. Quæ vtramque Illecebram, siue Aizoi quartam speciem, ita representant, vt nulli paulum versato, non liquidò constet, eandem plantam propter margines viarum aridiores, atque in parietinis spontè nascentem, designatam à Plinio.

Qui an Dioscoridei Cilicium gramen non descriptû, nisi quod boues inflamat intellexerit, coniectari licet; asserere non item nostri est instituti: Id autem interfuit illius magni Senensis apud Dioscoridem, in quem tamen, operâ sui similis, & adeo iciuna ad plantas noscendas & discernendas est; vt nisi, quia veluti quispiam putidus pedotriba, Pliniana loca incondiè & inscitè aceruat, satius duxissemus de Graminis & Triticis vaga & varia historia quempiam Auernum aratorem, quam istum commentatorem consuluisse. Ne nihil tamen egisse videatur hoc capite, ad Leoniceum & Ruellium à se repræhensos nos amandat; & gramine Parnasio nouo (vt sunt pleraque omnia Cortusiana) nos donat; nec tantillum descriptionis dat: Et cum Ischæmum, seu vulgatam sanguinariam, cum gramine Mannæ eadem asseuerat, non parum dubios animi relinquit istos anxios herbarum exploratores amicos nostros, qui putarant potius esse congenerem quam eandem: nulli enim cibo cedit illa.

Apud Math.
 theol. fol. 1001.

GRAMEN MANNÆ esculentum,
 Germanis Himnells dean & Hyumels dan.

Pistura elegans
 in Math. 1000.

NON aliundè quam hinc auspicari frugum historiam quisquam potuit, commodiore notione & naturæ imitatione; cuius mirificus ordo & scita varietas, à gramine ad Triticum & harundinacea per cognationes & gentilitates gradum fecit, intermedix & pro-

promiscue naturæ; cuiusmodi est graminis Cerealis huius, *Winnels deau*, à Septentrio-
nalibus dicta planta, id est, *C. E L E S T R M A N N A*, seu Ros. Est hæc sanè adco similis
Ischæmo vulgari, vt cultu duntaxat distare videantur: habitior quippè tantum tota, ra-
dice fibrosiore, latioribus folijs, & calamis minus rubellis, plures spicatos stilos geren-
tibus; semine in glumis magis conspicuo, exiguo tamen albedo & compresso oriz gu-
stu. In pultibus, iusculisque pinguibus incoctum, non dispari gratia elicitant Germani
Alpini, qui semen istud Manna cælicum vocant, setunt & colunt.

TRITICI GENERA.

FRUMEN- TVM, aut est Triticum aut Zea.	TRITICVM, sine Robus, Robur, vel Rubens. Siligo.	} } SECALE & varietas.	} Vernum, Autumnale.	
	Trimestre sine Setanico, seu Pentanico, id est, quinque mensium.			
	HORDEVM, & va- rietas.	} } Autumnale, Vernum, Nudum, Spontanæum spurium.		}
	Z E A.			
Zea Spelta, sine Typha.				
Zea Theophr. præstantior & mitior.				
Zeopyrum.				
Zea Olyra, seu Arinca media bonitatis,				
Zea Briza, valde degener, & ultima ora, pecori potius quam homini pabulo.				
A V E N A,		} } Satius, Sterilis, Bromos, Nuda.	}	

TRITICVM.



TRITICVM nobilissima & mortalium sorti vtilissima, vt qua animan-
tium princeps homo, vitâ trahit, TRITICVM est: sic vti videtur latinè
dictum, quia molis teratur, Græcè autem *πίτος* ab acutic, aut simili-
tudine cum fructuum nonnullorum gygartis, nucleis & granis, quæ
πίτος dicerentur. *Σίλος* autem quasi cibus dictus, quæ tamen vox vni-
uerso cerealium generi congruit. Sic etiam Frumentum à fruendo di-
xere priuici, qui Triticum in quamplurimas differentias distaxerunt; cognomines re-
gionibus suis & exoticis, vnde illud aduectum fuisse, solo, cælo, satu, cultu & indu-
stria varium, ceteroquin specie, & natura re apse vnum.

Est namque annua planta canini graminis folijs, sed pratensis radice, multo notissi-
ma; spicis seminum feracissimis, cuius etiamnum coloni binas vel ternas agnoscunt dif-
ferentias, à coloris, alijsque bonitatis notis quæsitæ: quæ Varroni & Columellæ R O B U R
aut saltem S I L I G I N I, & Setanio respondeant. Primæ dotis & præstantissimum Eu-
ropæis, hodiè pistorum suffragio notum, & in panificia receptum; videtur illud quod è
quibusdam Ciliciz atque Corsicæ mercatis, Lucam & Genuam venum asportatum me-
minimus: Non ita tumidum, sed solidum, flauum, graue & siccis mansuque minimum
muscidum, sed friabile & nitidum, è solo letiore & pingui minime vliginoso, sed flati-
bus & solibus siccioribus obuerso, cuiusmodi etiam quibusdam Hispaniæ Beticæ, &
Norbonæ aruis enatum vidimus. Istud mirum, ni Varronis & Columellæ sit primæ com-
mendationis R O B U R. Nec enim priscorum sedulitatem in colenda annona neglectui
habuisse, tam excellentis frumenti sementem, & propagationem fas est credere: tantò
minus nostre ætatis auidam, ad gulæ cupidias comminiscendas satagentiam huius adeò
parabili cibi vsum, fructum non repetituram putandum, etiam si in vltimos orbis re-
cessus (vnde multò minoris momenti, quamplurima accersit grana & aromata) antiquis
abrepta fuisset: Sed hæc mutatio cum est frugibus & fructibus quæ vrescendo sunt, valdè

SILIGO.
Triticum.

Effigies apud
Mab. 391.

ROBVS &
Siligo differunt.

consueti (vt pomis, pyris, peponibus & melonibus) tum maximè triticeo generi: cuius semen & idem fructus triticum istud cum sit, speciem quidem seruat, sed qualitates saporis, odoris, coloris, aliâque affectiones aspicit, aut exiit: prout fuerit ager, imber, succus, status, cultus, sol. Itaque ROBVS, ROBVS, vel RVBVS non suo solo satus abit in SILIGINEM, id est, TRITICVM, deterius pondere, colore, etiamque pollinis robore. Eiusmodi est in vniuersa fermè Gallia, Germania, Belgia, Anglia & Septentrione: quod tamen optimum quidem illud, sed quasi proles nonnihil degener illius præstantissimi habendum. Istud tamen nostras feracius & vberius, illud pauciores culmos, minusque grauidas semine spicas segete fert: ac faciliè videre est, quam non omnia omnia tellus ferat similia: Etenim Scotiæ agri uonnulli glareosi triticum annuum spatium, vel menses tredecim, propter hyemis sæuitiam, fotum & educatum edunt, ex quo panis longè excellentissimus nascitur. At illud cuius Ostlandi, seu eorum vicini Septentrionales Orientales, Antuerpiam, maximam quotannis vim & comearum, venum nauibus important, minus lautum atque cædidum constat panem: tamen penè sub iisdem cæli segmentis vtrunque enatum sit: sed istud vliginoso & depresso aruo. Illud autem subastiore, glareoso, decliuore, & magis perlato: cuiusmodi quod ex solo Hispanico squallido vidimus aduectum in Belgio pellucidum, Rubellum, rutilum, sed adeo durum, vt quia vix molis frangi posset à Flandris mercatoribus sperneretur. Quapropter id dum taxat fuerit discriminis inter ROBVM & SILIGINEM, quod hæc minus excocta succoque blennofo & crasso, ROBVS verò elaboratiore tenuiore & magis grato adoleuit.

ESTANIVM Gr. TRIMESTRVM.

Flandris, Sommer teruen. Gallia, Bled de Mars.

TRIMES.

ITIDEM ab vtroque horum non specie, sed imbecilliore quadamtenus constitutione, TRIMESTRVM triticum, quod SETANIVM Græci vocant, differt: Eius quippè solutior crasis & corporatura, celerius germine & culmo proficit, subque equinoctium Vernum satum, ante Autumnale cum diutissimè cunctatur, spicam maturat: Nec quia neuitquam perferre hyemis rigores potis sit, satio in vernum teporem differtur, vt autumant: Sed quod amissa tempestiua Autumni sementis occasione, propter vel imbres aliaue incommoda, huius serotina satio subsidium venit agricolis. Huius in Gallia Norbonensis montosis satio multa, vbi TREMES quasi TREMESTR vocatur. Franci verò MARTIVM dicunt, à mense cognomine, quo feritur. Septentrionales SOMMER teruen, hoc est, æstiuum triticum, nuncupant. maturat enim æstate ineunte Meridionalibus, ideo Trimestre vocatū. Septentrionalibus verò exeunte, idcirco PENTAMIVM seu quinque mensium potest dici: non perindè tamen aut delectat, aut rescit huius usus, minusque vberè prouenit. Facilius longè exiturum, & vberius si eodem quo reliqua duo genera tempore aruo mandaretur: Nam quodlibet triticum vbius gētium, & quolibet anni vertentis momento satum, germinabit & proueniet, & adolescet modo superuentu frigoris, aut ardoris non enecetur.

SECALE.

{ Gal. Seigle. }
{ Germ. Rogge. }
{ Anglia. Rye. }

Figura apud
Mab. fol. 402.

NOTIVS & vscitatus quam gratus plebeculæ frumentum istud, quo inuitæ fruuntur, famenque arcet multæ Europæ regiones, atque quantum à Siligine vincitur bonitate, tantum accedit grani similitudine, magnitudine, nuditate: nigrius tamen & longius & angustius istud. Inter glumas è spicis, per maturitatem pendulis aristæ horrent, cuiusmodi siliginis: non perindè vt hordei rigidæ, scabræ, pungentes in culmis senis septenisque siliginis multo procerioribus, sed gracilioribus tenerioribus, & internodia terna aut quina habentibus. Radice item triticeæ non dissimili: E satione faciunt differre coloni.

Serunt

spica aristisq; fastigiata hordei prorsum; sed molliusculz, minores & grano castz, vt auena notha aut Ægyptops; at cuius cognominem morbum Ægyptem dictum valere scimus: Sed longè magis straminis cineres ad zdemata podagrica.

ZEARVM HISTORIA.

SPELTHA. Vnde quam vagum *Zeus* vel *Zez* nomen, & perplexæ notionis fuit; latiusque multo olim patuit quam hodiè, **SPELTHA** vel **SPEAVTRA** huius ætatis; quæ id nominis duntaxat vni frumenti generi largitur, aceroso multum glumoso, leuiore, & aristis horrido pauci alimentum, non tamen præui succi nec insueti: apud Italos Insubres, Genuenses, Longobardos, Sabaudos, Galloprovinciales, & vascones; qui serunt propter varietatem grani & agri: nec nisi potioris grani penuria vescuntur. Hæc planè videtur **TYPHA CEREALIS** vocata, quam Germani *welsche weyten*, & *Romische Tere* dicunt, Peregrinum & Romanum Triticum vel far; quia indidem allatum. Est siquidem tenui calamo, & vt plurimum singulari spica, multis & prælongis hordei non dissimilibus armata aristis scabris & rigidis, quibus Ægypteta scitè præcipit narium interna vasa punctim laceranda ad sanguinem in quartanariis eliciendū. Granum autè languidiū, & exilius multò, multiplicique scabriore & membraneo pertinacius hærente folliculo arctè inuolutum. Longius à tritici natura recedens, quam *Zea mutica* aut *Olyra*. At **THEOPHRASTI & ANTIQVORVM ZEA** ferè eadem laus & conuendatio, atque siliginis. Quippè tritico simillima, firmissima, copiosissima, & multiplici & alta radice, culmo numerofo & alto fruticat; nec vllis valatur aristis spica, grano multis folliculis incluso, lauisimo & euntis animantibus iucundo, læti pinguisque soli alumnæ, & olim Græciæ folius vernacula; postea regionibus multis expetita & sara. Vndè facile discas nostratæ **SPEAVTRAM** multum ab hæc *Theoph.* abesse, & tamen congenere, aut potius degenerem *Zeam* esse, Quantūque *Zea* à præstantiore siligine, tantūdem hanc à *Zea* melioris notæ defecisse: Sunt enim, & possunt esse mutationes cōplures & familiares inter **SILIGINEM**, **ZEAM** & **HORDEVM**, propter cōmunia seminis & essentiz principia interiora; atq; foris multiplicem euentum: vt consulti Rusticæ rei norunt. Quapropter cum ex Dioscoride tres sint *Zez* differentiz, (illi enim est **OLYRA** è **ZEIS**) satis liquet, ætatem Theophrastum sequutam, latiore huius nominis significatu usam; & complexam non solum **ZEOPYRVM**, sed etiam **OLYRAM** **TYPHAM**, & **BRISAM**, præter illam primi meriti *Zeam*. Idcirco si rem adeo dissipatam & perplexam, quis pressa & facili designatione digerere & perstringere queat, adhuc modum tentandum.

ZEOPYRVM sive TRITICOSPELTHVM.

HORDEVM Hunc proximè locum vendicat Zeopyrum triticum; cui nomen conflatum ex tritico & *Zea*, quia effigies sit inter *Zeam* & siliginem vel robum, mediz. Stipula siquidem culmo, spica & aristis *Zez* est: granum autè simplici gluma & solutu facili amictum: sed longius minusque quam triticum ventriosum & plenum etiam in hortis factum, quale habuimus his duobus annis; Speltæ vulgari colore & cuticula nonnihil ad fecale accedente, gustu minus quam cōmunis hordei suauis, non tamen ingrato. Vtilitas, vt copia, rarior.

ZEA THEOPH.

ZEA Theophrasti omnium secundum siliginem præstantissima; est admodum affinis siligini, nec nisi perpusilla varietate distans, non tamen eadem prorsus; nam veterina esu siliginis crepant, aut torminibus intereunt, quibus tamen Theophrasti *Zea* iucunda & commoda. Huic *mutica* nec vallata aristis spica donata est; glutinis tamen tuniceis occlusa.

OLYRA.

Siligo Tragi, seu far candidum.

{Ger. Ammelkorn.

TRAGICO, 194. DEINCIPS *Olyra* subdenda, quæ *Zea* Herodoto vocatur; panificisq; apta habetur. Hanc Germani, quia pollinis perquam boni & candidi sit, in **AMYLVM** soluūt, &

& AMBELKORN, id est, Amyleum triticum vocant; putantque nonnulli, propter huius in panificio candorem & suauitatem Siliginem esse priscorum, vel STANIVM, verum secus est.

TYPHA, *an* SPELTHA?

SEQUITUR Typha; cognata & hæc Tritico; sed Theophrasto monente, cæteris multo læuior quam Zea, nec pinguis fecundique soli, sed soluti & macilentioris seges. Hanc nostras, uti fermè auenam alternis ferunt annis, non veruaculo, sed etiam defesso agro; SPELTAMQUE vocitant: Admodum aceroso, scabro, squallido & arrido grano, minimi ponderis, & eiusdem fermè cum auena indicatur apud colonos, quare Olyra deterior, Briza autem melior & læuior videtur.

BRIZA. {Ger. S. Pieters Roze.

ZEARVM ut sic loquamur, deterrima videtur Briza, peritum enim est onerare, ag- Dodo. 313.
grauare, & quasi veterno sopire: Quod huius panis esu euenire testatur Galenus post Museum Medicum. Typhæ culmo & spica simillima, grano folliculis incluso ex fusco rufescente; panem acerosum, atrum, improbum, olidum, perquam ingratum dant. Germani istud St. Pieters Roze, & Lynsom, dicunt: nec dubium quin Zea species sit, id est, Spelthæ; tamen nonnulli inficiantur, qui aristis carere dicunt. Quod superius contingere vniuerso triticeo generi, monuimus; sic etiam quando degenerant foetere, saltem Zea vitium esse, eoq; hæc accensendum, per criticos herbarios nobis liceat.

Avena vesca & sterilis.

BEQUOS {Germ. & Dauct. {Ital. Biana.
{Flandr. {Angl. Dettes.

NI si in hordeum, quod rarius, aut Zeam, quod frequentius fit, descuerit Siligo, Math. 401.
in vitium illud segetum primum ac minus cæteris malū abit, quæ auena latinis, Græcis autem BEQUOS vocatur: non à foetore, sed potius quia veterina eā multa vescantur, vel à fragore, sonituue quem seges matura minimo tactu statim, edit. Frugum generi si- BROMOS.
quidem colatur accensenda; sin neglecta inculta, aut semine fuerit vidua, tunc BEQUOS erit, edendo inepta, & quæ de Virgilio STERILES DOMINANTVR AVENA, Dodo. 346.
canit. Proindeque hæc secruit Dioscorides, utque vsu essent diuerso, tamen genere & figura non diuersa; utriq; enim ut nomen sic facies & natales eadem. Sed minore, gracilioreq; pedali stipula, apiculisque staminibus delicatioribus, minimè mordacibus, comosa est hie BROMO STERILI; semen fermè euavidum, in tuniculis fermè vacuis. Sed BROMO AVENAVÈ frugi proceriora crassioraq; calamus & setacei apices th-
nicis prognati; semen plenum fecali simile, sed arcus, longius & acutius; colore interdum pullo, alias nigro, sæpissimè albicante, & admodum per menses caduco. Vniuersæ Galliz, Germaniz, Italiz, equis est laudatissimum pabulum granum. At in Anglia huius locò panes fabaceos plerique omnes dant: Iumenta quoque aenæ esu minus bellè habere, aut labores ferre persuasi sunt: Tamen bonā habeant auenam, quæ in Wallia, quæ Cambria est occidua Angliz pars, panes & placentas ex hac exuta glebis nō prorsum respuenda sæpius esitauimus. Pulres illic etiam ex farinæ polline aut flore, cuiusmodi meminimus in Heluetia atque Germaniz Alsatia: potionibus etiam accommodant integram; vel farinam, decoctis aluum siccantibus & astringentibus.

Avena nuda.

NON procul ab amæno Tamesi quæ Londinum præterlapsus est, atque in Cantia Angliz patent alicubi planities nudata auena colitur; cuius omnia similia, si granū quod colore ad Speltham, & nudatum hordeum siuè Zeopyrum accedit, exceperis. Mirum quantum, in cuniculis hæc seges placeat. Parant ista fruge tabefacta aqua maccando, optimam ceruisiam; nam suauior aliquantò & vescendo gratior hæc est, nequedum valde frequens.

ÆGYLOPS.

PHOENIX, *sui Herdeum maritimum, & Lolium rubrum.*

LOLIUM.

USTILAGO.

MELAMPTRYM an Alopecurus Pl:

PSEUDOMELANTHYM.

ÆGYLOPS.

NOMEN obtinuit à morbo perquam difficili curatu, cui medicationem pollicetur Ægylops, affectio notans proximè oculi vtriusuis magnum canthum, cauernulam, vel sinuosum vlcusculum, aut abscessum. Permulta ferunt Ægyloper segetes triticeæ & hordeaceæ agri Norbonensis & Galloprouinciz, æstuosis & glareosis marginibus, qualem Dioscorides docet: herbulam sesquipalmū, binosque palmos altam, foliis triticeis, exilibus, spica exigua, breui, duo plurimum, interdum tria grana gerente, glumis amicta striatis, & aristis singuli grani ex apice, nō spica emergentibus: hordeacea grana, radice triticea pusilla. Hac nulla propior genuinæ Ægylopi, cui morbo potius fieri cepto, quam iam longius progresio, non semel periclitati sumus profuisse. Exicat enim astringendo citra calefactionem multam. Potui cereali etiam addita semina, cerebrum temulentum faciunt.

*Min' veri Ma
thiolo Ægylops
altera figu: 1206
& prima autem
falso Bromos.*

PHOENIX, *Latini herdeum maritimum.*

*Fol. 346. Hysto-
ria Dodo.*

LOLIUM
Rubrum.

DICTA Phœnix fuisse videtur, quemadmodum Phœnicopteros auis à colore Phœniceo, puniceoq̃, quasi flammeo, eoque vocant Flamiment istam aem Norbonenses maritini, nam cum radices, exiguaeque folia & viticulos Tritici vel Ægylopi habeat, spicam obtinuit rubello colore, purpurascēte ex fusco nitente, alterno situ glumas haerentes habentem, & prorsum lolij similes: vnde nonnulli RYBRYM LOLIUM vocitarunt. Et nisi multum fallimur, est hæc Plinianum HORDEUM MYRINUM, folio hordeaceo breuiore, angustiore: spica lolio similis. Rami digitorum senum radicem circulant: In aruis & regulis, recens illitis, trita & vino pota præclare menses ciet: quod nobis hætenus incompertum, non enim fuimus ausi experiri, veriti nē capri dolorem moueret, aliaque incommoda temulentiz faceret, cuiusmodi nouimus Lolium facere solitum: Præsertim apud Prouinciales, Delphinates. Repertu & cognitu hæc facilis, Germaniz, Angliz, & Galliz.

{ *ῥαφα καὶ βλαφός.*
{ *Gal. Turays.*

{ **LOLIUM**, & temulentum triticum.

*Figū, apud Dod
320.*

ALEXANDRI vocarunt Graeci vt coioctura fert *παρὰ τοῦ ἀγροῦ*, quod est efferri & attolli, vel sursum rapi: rapitur quippe in cerebrum lolij vapidā noua aura, atque dementiz affinem renebricosam vertiginem, temulentiamque efficit. Quo quidem maleficio vel infimæ plebeculæ notum, & inuisum plus satis est, præsertim Galloprouinciz, Norboniz, & passim in reliqua Gallia, vbi *γυρῆ*, quasi ebriosa vel inebrians vocatur. Quippe etiam in Nortmania, Belgio, & Anglia, non solum pani mixta farina, sed multo magis Cerealibus potionibus, Ale & *Byere* addita, & seruēfacta, torpore & temulento veterno cerebrum opprimit, & opacat, reliquaque membra torpida reddit. At foris admodum, eiusdem ex actungia deplutum cataplasma, eadem pellit incommoda, doloresque diurnos artuum & pericranei soluit. Spica similior nulli quam phœnici, vt sirs Dioscorides monet: eoque qui alterutram norit, ambas nouerit. Granum in dura tunica: stipula, radix, & reliqua tritici, vel fecalis sunt: eoque ea in opinione, qui ex Theophrasto est Sencensis, vt hæc tritici pestis, rursus in triticum redire solita sit: vt verum dicit, ita ineptum & Physices imperitum se prodit; quum de Hippocrate historiam, è Plinio exemplum sexus humani mutari adducit. Quippe neque ad rem facit hic sexus mutatio, & in plantis sexuum distinctio non vera, sed metaphorica & figurata doctis merito censetur: igitur res vera, ratio improba. Nullus enim non nouit hic defecisse Lolium à tritico, nec in feminam abiisse, sed in vitium quodpiam, aut aliam segetis speciem: calidius enim & siccus est lolium, reliquo quolibet frumento, impro-
bū

bum alendo, præsertim homini, tritico autem planè contrarium natura. Hoc enim homini salubre, veterinariæ autem nex plerumque. At lolium hîsce, vt neque alitibus gallinis nocet nihil, illi tamen plurimum: quare specificæ differentiz sunt, non maris aut foeminae, vt blaterabat Commentator. Quinetiam Adamus Leonicerus, Germanus Botanicus minimè malus.

USTILAGO.

{ *Germ. Brant.* { *Gal. Brustura.*
 { *Fland.*

NON è deprauatus humi grans, sed ambustis culmorum fastigijs, quæ iam spicari ceperant, istud vitium oritur, quòd ideo *Brant* Germani, & vstilaginem recentiores dicunt: *Brustura* Galli, apud quos, inter siliginem, secale & auenas, frequens oritur. Dum enim in floribus atque granorum spe adhuc est spica tenera, si completa madidæque imbre fuerit, ac repente sole feruidiore arefacta, iam vitium istud sterile fit, nullius in Medicina commodi comperti: cognitu tamen facile, quia culmis, folijs & radice est siliginis, vel auenaceis: Spica autem puluerulento situ fusco, aut atro obducta, quæ illico, quasi defloresceret in puluerem ambustamue teredinem cariiosam, fatiscit.

Historia. Dodo.
 321.

CRATÆGONON.

CRATÆGOS, vel Cratægon arbor est, qua de inter Mespila dictum. Crategonum verò herba Cerealis videtur, & affinis melampyro, cuius vsus & esus, semen viuendum & genitale redderet, id enim τὸν γόνον νεκρῶν, est semen robore acuere, & quasi viribus imbuiere. Nullius venit in mentem plantæ, cui aptius quadrarent notæ, quàm ei, quæ propter similitudinem recentioribus, alterum MELAMPYRI genus putatur. In Syluosis collibus, & deuexis, vmbrosis, Norbonæ, Angliæ, Sabaudiz, & Pedemontis passim multa æstate fruticat, cubitum, sesquicubitumque plusculi, & geniculatis germinibus, in alas multas diuisis, eufrazie ritu: sed multo crassioribus & maioribus, quas ab imo totas folia melampyri, seu tritici vaccini vocati, vel luteæ cristæ gallinacæ dicit, psylli aut linariæ ambiunt: Flores in summis herbacei ex luteo, calatulis minoribus, quàm Albæ digitalis, sed similiter digestis, & vt melampyri aut linariæ effigiatis. Semèn in folliculo exiguo milio non dispari, cuius odor & sapor acre non nihil testantur, vt & folia siccata. Ac tamen videatur hic locus lacunosus & hians, tamen istud semen in pollinem pultemque ductum, esse Veneris incensivum, & seminis genitales quasi fermentum quoddam & cotem, non abs re reor.

MELAMPY-
 RION, aliter non
 Noctericotum.

MELAMPYRVM an ALOPECYROS PLI,

Triticum. Vaccinum. Dodo.

{ *Germ. Kweyssen.* id est, *Pabulum vaccinum.*

Melampyrum perpusillum latens.

Uit & hæc species, hic addenda, vt pote nõ descripta aut depicta familiaris Galloprovinciæ segetibus. Dodrantem aut sesquipedem vix ferat: tota facie supernoctem præfert, sed non illi luteus, & folijs altius diuisis. Cuiusmodi propria.



roxima facie triticum vel pabulum tota, & consimilibus cristæ Gallicæ Plinius Alopecorum fecit: folia ordine, tamen stellatum oriuntur: vrascentibus ex cæruleo, deinde in marcescentibus, inter quos glunora, & nigriora. Ido grata & innocua, & in quam

Historia. Dodo.
 320.

PSEP.

bus ad ignotiora & compositiora; modumque huius progressum similitudinis sequitur & familiaritatis, quo & vniuersum & particularem, quantum licuit per rerum varietatem, & vilitatem, sibi responderet. Sic enim ordine, quo nihil pulchrius in cælo aut in sapientis animo, quæ longè latèque disparata sunt, vnum quasi sunt niagno verborum, memoriarum & cognitionis compendio, vt Aristoteli & Theophrasto placet. Verum, si idem quod illis, nobis hic contingat, nempe vt quam insufficiens methodum, non potuerint vsquequaque lequi; operis inscriptio & tui bolen-
*Iconum em-
 dulata propo-
 siones.* ti huius æui quæ hæc apparabamus, fluctuatio nos excusatos habeat, apud eum sanè, qui nouit tantò plus habere perplexitatis tantum negotium, quanto veniat minus. Quamuis dum reli-
 quarum stirpium, quæ hic non habentur, quasque pluiimas per superiorem calamitatem huc ex Gallijs accersere non licuit, Icones *in v. adla* & arguta manu & emodulata ad plantarum ip-
 sarum magnitudines & effigiaturas proportionè (quam alij picturæ solceissimis crebro defor-
 mant, dum herbulas æquè magnas ac arbores & fructices pingunt) delineantur & exsulpuntur,
 datur opera in appendice, ne quemquam huius lectionis peniteat, Quin eum pudeat potius poe-
 nituisse, nec vidisse domi & vno intuitu, sibi nusquam visa aut lecta, quæ nulis mensibus aut
 annis pau. i. vix videre potuerunt. Et quia plantarum duplex est cognitio, altera nempe defae-
 cie exterior, altera virium, quasque interior: illa huic anteuertere oportere monet Philoso-
 phi opera, imò ipsa Natura. Neque enim potest quis vllam extrinsecus cognitionem sibi arrogare
 eorum simplicium quæ nunquam aspexit. Proinde nos primùm cuiusque nomenclaturam, vt
 quæ non rarò ipsam rem aptè notat, è Græcis præsertim, enucleare conati sumus: obiter re gionem,
 & in ea seorsim natales; illam Geographiam, hæc Còrographiam vocant; pressius quàm
 quiquam auctor antehac, designamus: vt quasuis plantas, quo loci, quando & à quo ipsi nati-
 cisci, vel amicos rogare mittendas, vbiunque tandem nelli o. bis, vel Indiarum illæ o. iensur,
 scire possemus. Descriptiones autem inter congeneres & similes, dissimilitudinis, collationis,
 & similitudinis ope, breuiores semper, emendationes plerumque & faciliores aptauimus, non
 tam antiquorum historiarum, quàm iterarum inspectione & ex viuis ipsis plantis expeditioni, quàm
 penes ius est & norma rectè & verè describendi. Sed vires parcius & consilio cætenus attigimus,
 quantum vel ad cognoscendum, vel ad probandum quantipiam vnam plantam satis videbatur,
 Aristotelem nempe in alio, & Theophrast. in simili instituto, imitari. Nam reuoluentes quidam,
 qui Commentationis nomine tui gent, potius videntur suum fastidium, quàm plantas viuante eas
 noscendi desinere. Nec ex locis naturalijve serieni historiarum inire, vt doctissimus & candi-
 dissimus scriptor Dodonæus cepit, sinunt plan. & pluuiarum, quæ tum arida, tum humentibus &
 rigulis erumpunt, vt Cardamine in vineis, vijs & rigulis: Lapatum vtrouque, vtrouque, aut vbi-
 que: quædam in nionibus pariter & conuallibus, vt Eryngia, Calamentum, Polium, & alia
 quædam planaria. Et quod in primis obseruatu dignum, quæ iugis montium regionum calidiorum
 proueniunt, eadem in planis, syluosis vel depressis regionum Septentrionalium exeunt. Græ-
 corum verò auctorum ex ante potius Indices Alphabeticis, quàm Simplicium Methodi, præter-
 quam opus Dioscoridi & fragmenta Cræteæ, ex quibus illi vires & verba merè exscriptisse videntur
 vnam notas non neglexissent; aut eo pudore fuisset Plinius, quo diuinus Seneca, qui se parum
 in Stirpium cognitione profecisse, professus est: aut Dioscoridem diligentius legisset. Diosco-
 ridea tamen methodus, optima quidem illa, illis qui iam diu nouerunt plantas: verum ad cog-
 nationem compendiosam, *si dicitur* inspectione, quam tantopere laudat Dioscorid. comparanda,
 minus est accommodata. Diuersis quippe libris, eiusdem speciei & similitudinis plantas dis-
 trahit, quas alioqui vno intuitu ferè discas: veluti Cucumere in syluestre maiori fæuio, Colocyn-
 thides, quæ Cucurbitulæ, ab esculentis Cucurbitis, Thaphiam à seilaciis, Crocum à Colchico,
 Scammonium & Soldanellam, à volubilibus, Sisymbrium à Menthæ, Hieracia à Chondrillis, &
 quàmplurima passim: tamen si alicubi volens à sese desecui, sequutus, quam nos hic adumbramus,
 Methodum, vt in Portulacis, Semperuijs & alijs,

Tyrones proinde monemus & rogamus, vt rei herbariarum totius Medicatricis certissimæ vtilissi-
 mæ, iucundissimæ, etiam minima quæque exlorent, persuasumque habeant, in istis Dejs diuinijs,
nihil vspiciam de speculabile aut indignum honore Philosopho, cui vni hæc ille condidit, voluitque,
 vt est in sacra pagina, *Nos sanari herbas, non verba, ne sapientia sua opera irrita forent.* Nec pu-
 tent Tritico, Vino, Lactis, & Melle, olivulo, aut herbulis etiam contemptissimis, non posse
 corpora quæ sanari etque ali: Neve Aristippos quosdam fescicatos, vndularos, auri & auræ po-
 pularis, quàm penitioris eruditionis fisticuliflores, audisse, quos pudet hæc serò doceri, & disce-
 re serò, arduum; laboris tædet. Vosque Præceptores clarissimi, impendite oramus, vt multorum an-
 norum, *exigenti & virorum doctissimorum* Aduersaria læc, non secus ac peregrini aut hostes ex-
 pendatis, foueatis autem, concinnatis, & augeatis vi parentes: nosque sicuti volentes lapsi sum-
 mus (imò quia sæpè sumus) benignè monearis. Nec enim laudem venamus, dumtaxat culpam
 vel iniuriam deprecamur: vester exierit amor, beneque sibi animi nostri conficij, quos multi ag-
 ni, multa peregrinatio, studia, omniumque rerum arctissima necessitudo amicitia deuinxit, nobis ab-
 bundè precium iuri & precium sunt futuri, LONDINI, pridie Diuini Natalis.

STIRPIVM ADVERSA-

RIA NOVA.

Graminis omne Genus.



FRÆTIS QVASI AGRESTIS DICERETVR plantæ nec fatiua aut serenda Græcis scitè nuncupata fuit : vtpote quæ ruri vbique sponte quouis anni cardine , cœlo, solo & sîdere luxuriat : eius namque perennis prouentus feracitatis restibilis , nec minus immensæ vtilitatis quantum toto orbe extat terrarum, virore ornat amœno, & veluti gradatim sese propagando amicit decore, vnde Latinis Gramen deflexum putatur. Triticeo generi, vt cognata, & similis, sic perinde varia & nobilitate proxima. Quin differentiæ magis conspicuæ

è radice, spicata coma, folio & flore sunt ducendæ: quas etiam cunctas partes & differentias (quia varias tritici species æmulantur, de quæ mutua inter se collatione facilius discernuntur & discuntur) aptius fore duximus nominibus & notis quàmque suis, vel minimas quæsq; prosequi, quas natura pecori quidem vescendas, sed homini vni non modo vtendas, adeoque prius cognoscendas, peperisset. Nullum enim vel despiciatissimum illius opus, nostra, id est, mortalium Philosophantium indigum cognitione & admiratione ducendum, summus Philosophus in libro, De partibus animalium, luculenter docuit, eiusque alumnus Theophrastus in Plantarum historijs.

Uulgatius pratense { Maius,
Minus,
Minimum,
Rabinum vel Rasinum Montanum,
folijs veticina Caryophyllata,

Caninum, { Longius radiculatum,
Bulbosum, nodosum, } Officinarium.

GRAMEN.

Harundinaceum scabrum, equi nex Babylonium aut Cilicium.
Harundinaceum læue, & pilosum nensorum, Ischemum, sicut Plinij.
Harundinaceum striatum album.
Harundinaceum Marinum,
Ischemon vulgare.
Parnasi bederacco aut Chelidoni folijs, &
Plinij Arzoi effigie gramina suis locis.
Manna esculentum.

GRAMEN PRATENSE MAIVS VVLGATIVS.

EST igitur quædam quod notissimum gramen pratense dictum, vulgo notum, & Fœnum quædam aruit vocatum, cilioribus radicum cirris seu pullis capillamētis, & creberrimis cespitem summum fugens, humumque perreptans & tegens, densissimo & numerofo foliorum triticeorum stipatu: culmos pedem & cubitum altos surrigens, tenues geniculatos, læues: lanosa, sparsa & magis harundinem Vallatoriam imitante spica fastigiatum. Eius semine in horreis è spicis excusso & collecto vtimur complures Medici ad obstructions viscerum, calculum, potu, admotuque ad disculsionem pertinacium tumorum, & flatuum, tametsi officinis vsu ignoto.

FOENVM.

Gramen vulgo notum. Trag.
Ephæra
Folio. 207.

STIRPVM aduersaria noua.

MINVS.

Istud idem quod fundit Montanus, vel declius incultus, exactus & aridior ager, vt pabulo gratius & vtilius velleri, sic multo delicatius, minus, & semine efficacius est.

MINIMUM.



RABINVM vel RAVISVM montanum, folijs
veticis garyophyllata.

Saginx & lactis vbertati omnium laudatissimum: Montium accolæ opiliones Sabaudi & Heluetij Rabis vel Rabinu vocât, quasi præstantius & præcipuum gramen dicas, (vt quasi Robus in Triticeo genere) Folijs est crassioribus, carnosioribus, breuioribus ad Tunicæ vetonicæ propius accedentibus, Motosis vdis Angliæ & Heluetiæ familiare.

GRAMEN CANARIVM, Medicatum Officinarum.

{ Germanis, gras.

Ital. Gramigna.

{ Anglis, quich gras.

Gallis, dent de chien.

Ext. a. figura.
folio 345. apud
Dodonæum
apud Mathio-
lum. 999.

ET istud perquam cognitum, sed in aruis & satis, non pratis, vt plurimum, frugibusq; haud parum incommodu: eoque sementem facturi rastro Septembri, etiamq; primo Vere, manibus runcandum præcipiunt coloni. Prolixioribus, crassioribusque radicibus implexis, candidis, gustanti dulcioribus, geniculatis, longè latèque subtus tellurem serpit: minus numerosam sobolem promit foliorum triticeorum & harundinaceis minorum, egeniculatis calamulis, rigidioribus, crassioribus & longioribus, vt & folia, quam pratensis: flore item spicato, minus tamen lanuginoso, asperiore semine, totaq; planta magis vesca dulcis & frumentacea, visib; Medicis receptissima, præsertim radix, quæ reserat viscerum sacculus & renum, citra calefactionem, lumbricisq; huius stillatitia interimit, nempe pabulo humorum putridorum fraudatos.

GRAMEN TVLBOSVM, NODOSVM.



Rarius aliquantò istud, minúsque; plerisq; Europæ regionibus vsu cognitum: Lemmano autem Lausanæ finitimis aruis & segetibus plurimum. Frequētissimum etiam Sabaudie & Angliæ, vbi idem efficacissimum experiuntur Medici eruditissimi quidam, Londinenses præsertim. Cuncta prorsum ei canino gramine similia sunt, si huic glandulas teretes, rotundas, gustu dulces, radicis anfractibus hærentes, demas, aut illi addas,

CALAMA

PRATIS vdis, sed strigosis, macilentis & sabulosis neglectis familiare graninis genus istud, quod apprimè Babylonio respondet, ac quā Canini gramen altero anto maius est, calamis & folijs rigidioribus, scabris, quibus ad harundinē valatoriam non parū accedit, nec pabulo cedit, nisi multum esuriant & penuria melioris admodum laborēt veterina, nec eo greges vescitur, quippe, quibus non modo ingratisimum (*agre & dur*, seu acidum, Rura vernaculè dicunt) verum etiam maciem, sitim & tabem conciliare creditur, linguam & œsophagum vulnerat & arctat, sanguinem in ventriculū elicit, vnde tumefactio, inflammatio & mors plerumq;. Quod si Babylone fuit enatum, vbi id maleficij pernicie adferre proditur, siccus & rigidius, grex verò imbecillior & aluo duriore, minus mirum illius esu iumenta illic eneētum iri. Sic enim videas interdum iumētorum labra & fauces cruore manantia & sauciata, quæ cum reliquo stramine per senecia, huius aut cōsimilia harundinacea folia esitarint: medix itaque inter harundinem & gramen est natutz, figuræ, Radice geniculata, alba, promissiore & longo reptatu vagata, compressiore tamē & crassiore, Canario gramine simili, sed valatorium exante. Spicata, Panici aut Sorgi comosa lanugine.

GRAMEN HIRSVTVM NEMOROSVM,

Ischemum videtur Plinianum.


MONTOSIS & opacis syluis Pedemontium & Lugdunensis Galliæ abens provenit, duplo quā Caninum maioribus folijs, mollioribus, & deorsum reflexis milij, pilis & seracea lanugine multum hirtis, pallentibus. In sesquicubitali calamo geniculato, floribus canini graminis, similibus, maioribus, albidioribus, sed radice ciliis fibris & capillamentis barbata, pratensis graminis. Iunio & Augusto, nec nisi nemorosis floret.

HOLOSTIVM quidam docti amici, sed imbecilla coniectura, augrabantur. Longè verius coniecturi si *χαμύρι* Plinianum dixissent: terra quippe at in terram serpit milio similis, folijs asperis & lanuginosis, in nares farcitur. At recentiores aliud gramen subdendum docuere *ἰσχυρόν*, de quo mox,

HOLOSTIVM.

*Ischemum, Pb.
libr. 25. cap. 8.*

GRAMEN SVLCATVM vel STRIATVM album.



COLITVR istud in Belgio & Anglia, syluosis autem, montosisq; Sabaudia & Gallia Allobrogum fronte nascitur, milij potius folijs, sed vt canis Valatoris rigidis, mucronatis: longitudinem mediam glaucam, complures candidæ venæ vel lineæ argenteæ insigniunt: culmos & Panici sylvestris vel canni erigit. Radix pusilla, fibrosa, albida, pratensis graminis.

NORBOſæ littoreis vadis quâ vnde æſtuſq; æquoris illiduntur, præſertim ad Aquæ Marianz & Peraus, proximè piſcatorum attegias; gramen iſtud etiam harundinis æmulum, & triuſque particeps naturæ, plurimum reperitur: verum luculentioris magnitudinis, è radicibus quidem ternas quaternafuè vlnas prolixis, digitum craſſis multis flexilibus ſubter ſabuleta, vbi Eringiû, reptantibus: geniculis, cædidis, guſtu & figura prorsum canini graminis, ſed paucioribus anexas fibrillis. Calami verò & ſtipulæ geniculis & foliis ſuperiori ſimilibus donantur. Sed procerioribus & commoſis lanuſiq; inter harundinem & caninum gramen; floribus in auras, ineunte hyeme, euolantibus.

ISCHÆMON vulgare.
 { CRVS Galli, DACTYLON PLINIO,
 & Aculeatum, an Scirpus Tragi?
 Sanguinella & Capriola Italie. }

Inter Icones.
 Trag fol. 209.

Leoniceo per
 Cornu ſine cornu
 nopus

VINETA Calloprovinciæ & Norbonæ iſto ſcatent nonnullis æſtatibus; exiguum eſt gramen, ſtrum tamen elegantia, & viticulorum cognitu dignum. Sunt namq; purpureo nitido hanthino lucidi calamuli, geniculati, ſurrecti, ſinguli, in quinas ſenafuè exiles florum ſpætas caudicellas, vel pannofas propagines, cyperidis modo, digitatim ſparſi; aut potiùs graminis Mannæ vocati; Radice & folijs graminis pratensis minimi, ſapore ſubdulci, ſed aſtringente, & exſiccante; vnde potuit conſectura arripi Iſchæmi Pliniani, à quibulſam non parum eruditis Medicis, vt Rondelletio & Aſſatio præcepto-ribus exercitatiſſimis.

PARNASIVM hederaceum.

PARNASIVM verò Dioſcoridi memoratum gramen, & ſic, dictum magis vti videtur, propter paſionem ſalubrem & opimam, quam propter ſimilitudinis comparationem, quia facie pngè alia (ſolio nempe hederaceo & flore albo eſt) proximè chelidoniam minorem & cochleaream, cognitionis facilioris, & noſtri inſtituti cauſa, relegamus. Alioqui poſſi quis ex vulgi uſu Burgundiacum ſænum dictum, Cytifiſum, aliaq; loti & trifolij genera pòulo laudatiſſima, gramina vocare; & huc aduocare; eadem prorsus ratione, & conſuetudine plebeia: quæ anſam dedidiſſe etiam Plinio videtur enumerandi quædam AIZOI VRENTIS effigie gramina, quorum alterum medeatur Paronychiis vnguim, & canium excreſcentiis in digitis, eoq; DACTYLON vocetur.

Gramina Plin.
 AIZOI effigie.
 Dactylon.

Alterum verò in parietinis & tegulis naſcens, cui etiam cauſtica vis, & ſiſtendo vicibus quæ ſerpunt aſta. Quæ vtramque Illecebram, ſiue Aizoi quartam ſpeciem, ita reſ præſentant, vt nulli paulum verſato, non liquidò conſtet, eandem plantam propter margines viarum aridiores, atque in parietinis ſpontè naſcentem, designatam à Plinio.

Qui an Dioſcoridei Cilicium gramen non deſcriptû, niſi quod boues inſlâmât intellexerit, coniectari licet; aſſerere non item noſtri eſt inſtituti: Id autem interfuit illius magni Senéſis apud Dioſcoridem, in quem tamen, operâ ſui ſimilis, & adeò ieiuna ad plantas noſcitantandas & diſcernendas eſt; vt niſi, quia veluti quiſpiam pntidas pedotriba, Pliniana loca incondiè & inſcitè aceruat; ſatius duxiſſemus de Graminis & Triticici vagæ & varia hiſtoria quempiam Aucrum aratorem, quam iſtum commentatorem conſuluiſſe. Ne nihil tamen egiſſe videatur hoc capite, ad Leoniceum & Ruellium à ſe repræhenſos nos amandat; & gramine Parnaſio nouo (vt ſunt pleraque omnia Cortuſiana) nos donat; nec tantillum deſcriptionis dat: Et cum Iſchæzum, ſeu vulgatam ſanguinariam, cum gramine Mannæ eadè affeuerat, non parum dubios animi relinquit iſtos anxios herbarum exploratores amicos noſtros, qui putarant potiùs eſſe congenerem quam eandem: nulli enim tibo cedit illa.

Apud Math.
 ſchol. fol. 1001.

GRAMEN MANNÆ eſculentum,

Germaniæ Himuncels dean & Spunnels dan.

NON aliundè quam hinc auſpicari frugum hiſtoriam quiſquam potuit, commodiore notatione & naturæ imitatione; cuius miſiſſicus ordo & ſcita varietas, à gramine ad Triticum & harundinacea per cognationes & gentilitates gradum ſecit, intermedix & pro-

promiscue naturæ, cuiusmodi est graminis Cerealis huius, *Bimmels* deau, à Septentrio-
nalibus dicta planta, id est, CÆLESTE MANNA, seu Ros. Est hæc sanè adco similis
Ischæmo vulgari, vt cultu duntaxat distare videantur: habitior quippè tantum tota, ra-
dice fibrosiore, latioribus folijs, & calamis minus rubellis, plures spicatos stilos geren-
tibus; semine in glumis magis conspicuo, exiguo tamen albedo & compresso orizæ gu-
stu. In pultibus, iusculisque pinguibus incoctum, non dispari gratia elitant Germani
Alpini, qui semen istud Manna cælicum vocant, serunt & colunt.

TRITICI GENERA.

TRITICVM, *sive* }
Robus, Robur, vel Rubens. } *SECALE & varietas.* } *Vernum,*
Sibigo. } *Autumnale.*
Trimestre *sive* Setarium, seu Pentanion, id est, quinque mensium.

HORDEVM, & va- } *Autumnale,*
rietus. } *Vernum,*
} *Nudum,*
} *Spontanæum spurium.*

ZEA.

Zea Spelta, *sive*
Typha.
Zea Theophr. præstantior & mutica.
Zeaopyrum.
Zea Olyra, seu Arinca media bonitatis,
Zea Briza, valde degener, & vltima nota, pecori potius quam homini pabulo.

AVENA, } *Sæua,*
} *Sterilis, Bromus,*
} *Nuda.*

TRITICVM.



TRITICVM nobilissima & mortalium sorti vtilissima, vt qua animan-
tium princeps homo, vitam trahit, TRITICVM est: sic vt videtur latine
dictum, quia molis teratur, Græcè autem *ωῖπος* ab acutic, aut simili-
tudine cum fructuum nonnullorum gygartis, nucleis & granis, quæ
ωῖπος dicerentur. Stilos autem quasi cibus dictus, quæ tamen vox vni-
uerso cerealium generi congruit. Sic etiam Frumentum à fruendo di-
xere priores, qui Triticum in quamplurimas differentias distraxerunt; cognomines re-
gionibus suis & exoticis, vnde illud aduectum fuisset, solo, celo, satu, cultu & indu-
stria varium, cæteroquin speciem, & natura re apse vnum.

Est namque annua planta canini graminis folijs, sed pratensis radice, multo notissi-
ma; spicis seminum feracissimis, cuius etiamnum coloni binas vel ternas agnoscunt dif-
ferentias, à coloris, alijsque bonitatis notis quæsitæ: quæ Varroni & Columellæ R 30
aut saltem S I L I G I N I, & Setanio respondeant. Primæ dotis & præstantissimum Eu-
ropæis, hodiè pistorum suffragio notum, & in panificia receptum; videtur illud quod è
quibusdam Ciliciz atque Coricæ mercatis, Lucam & Genuam venum asportatum me-
minimus: Non ita tumidum, sed solidum, flauum, graue & siccis manisque minimum
muscidum, sed friabile & nitidum, è solo letiore & pingui minime vliginoso, sed statim
bus & solibus siccioribus obuerso, cuiusmodi etiam quibusdam Hypaniz Beticæ, &
Norbonæ aruis enatum vidimus. Istud mirum, ni Varronis & Columellæ sit primæ com-
mendationis R O B V S. Nec enim priscoorum sedulitatem in colenda annona neglectui
habuisse, tam excellentis frumenti sementem, & propagationem fas est credere: tantò
minus nostræ ætatis auidam, ad gulæ cupedias comminiscendas satagentiam huius adeò
parabili cibi usum, fructum non repetituram putandum, etiam si in vltimis orbis re-
cessus (vnde multò minoris momenti, quamplurima accersit grana & aromata) antiquis
abrepta fuisset: Sed hæc mutatio cum est frugibus & fructibus quæ vscendo sunt, valde

R O B V S.

consueti (vt pomis, pyris, peponibus & melonibus) tum maximè triticeo generi : cuius semen & idem fructus triticum istud cum sit, speciem quidem seruat, sed qualitates saporis, odoris, coloris, aliâque affectiones assequitur, aut exiit: prout fuerit ager, imber, succus, flatus, cultus, sol. Itaque ROBVS, ROBVS, vel RVBEVS non suo solo satus abicit in SILIGINEM, id est, TRITICVM, deterius pondere, colore, etiamque pollinis robore. Eiusmodi est in vniuersa fermè Gallia, Germania, Belgia, Anglia & Septentrione: quod tamen optimum quidem illud, sed quasi proles nonnihil degener illius præstantissimi habendum. Istud tamen nostras feracius & vberius, illud pauciores cultus, minusque grauidas semine spicas segete fert: ac faciliè videre est, quam non omnia tellus ferat similia: Etenim Scotiæ agri nonnulli glareosi triticum annum spatium, vel menses tredecim, propter hyemis seuitiam, solum & educatum edunt, ex quo panis longè excellentissimus pinfitur. At illud cuius Oslandi, seu eorum vicini Septentrionales Orientales, Antuerpiam, maximam quotannis vim & comeatum, venum nauibus important, minus lautum atque cædum constat panem: tamen penè sub iisdem cæli segmentis vtrunque enatum sit: sed istud vliginoso & depresso aruo. Illud autem subastiore, glareoso, decliuore, & magis perlato: cuiusmodi quod ex solo Hyspanico squallido vidimus aduectum in Belgio pellucidum, Rubellum, rutilum, sed adeo durum, vt quia vix molis frangi posset à Flandris mercatoribus sperneretur. Quapropter id dum taxat fuerit discriminis inter ROBVM & SILIGINEM, quod hæc minus excocta succoque blennoso & crasso, ROBVS verò elaboratiore tenuiore & magis grato adoleuit.

SILIGO.
Triticum.

Effigies apud
Mab. 391.

ROBVS &
Siligo differunt.

ESTANIVM Gr. TRIMESTRVM.

Flandria, Sommer teruen. Gallia, Bled de Mars.

ITIDEM ab vtroque horum non specie, sed imbecilliore quadamtenus constitutione, TRIMESTRVM triticum, quod SETANIVM Græci vocant, differt: Eius quippe solutior crasis & corporatura, celerius germine & culmo proficit, subque equinoctium Vernum satum, ante Autumnale cum diutissime cunctatur, spicam maturat. Nec quia neutiquam perferre hyemis rigores potis sit, satio in vernum teporem differtur, vt autumant: Sed quod amissa tempestiua Autumnni sementis occasione, propter vel imbres aliaue incommoda, huius serotina satio subsidium venit agricolis. Huius in Gallia Norbonensis montosis satio multa, vbi TREMES quasi TREMESTRERE vocatur. Franci verò MARTIVM dicunt, à mense cognomine, quo feritur. Septentrionales SOMMER teruen, hoc est, æstiuum triticum, nuncupant. maturat enim æstate ineunte Meridionalibus, ideo Trimestre vocatur. Septentrionalibus verò exeunte, idcirco PENTAMINVM seu quinque mensium potest dici: non perinde tamen aut delectat, aut reficit huius efusus, minusque vberè prouenit. Felicius longè exiturum, & vberius si eodem quo reliqua duo genera tempore aruo mandaretur: Nam quodlibet triticum vbiuis gætium, & quolibet anni vertentis momento satum, germinabit & proueniet, & adolefcet modò superuentu frigoris, aut ardoris non enecetur.

SECALE.

{ Gal. Seigle.
{ Germ. Rogge.
{ Angli. Rye. }

Figura apud
Mab. fol. 402.

NOTIVS & vscatius quam gratus plebeculæ frumentum istud, quo inuitè fruuntur, famenque arcant multæ Europæ regiones, atque quantum à Siligine vincitur bonitate, tantum accedit grani similitudine, magnitudine, nuditate: nigrius tamen & longius & angustius istud. Inter glumas è spicis, per maturitatem pendulis aristæ horrent, cuiusmodi siliginis: non perinde vt hordei rigidæ, scabre, pungentes in culmis senis septenisque siligineis multo procerioribus, sed gracilioribus tenerioribus, & internodia terna aut quina habentibus. Radice item triticeæ non dissimili. E satione faciunt

Serunt

Serunt quippe utroq; equinoctio, & A V T V M N A L E quidem istud robustius, maius & habitius dicunt; V E R N V M vere seu Martio satum, minore stipula culmo, spica, grano, & ad alendum efficacius, Vtriusq; alioquin pollen & farina panificio & Byeris, seu Zythis apud Belgas, Antuerpianos pillores, & ciues Siliginis anonam & com meatum supplet, nullum enim granum propter solum sabulosum & macilentum (quale amat) ibi frequentius crescit aut panificio cedit. ex quo tamen multa & sedula subactio, & pedum procucatione, m assam, panesq; non adeo ingratos stomacho pinguunt; Aluo tamen arctiori, non incommodus acerosus hic panis, & medicamentis etiam opportunus. Si quidem laxioribus cerebri meatibus & continuis defluxionibus est præsidio, panis vel pollen ex aceto & oleo rosaceis, & nuce moschata vnâ subactis. Huius paleæ & corticum arantiorum decoctum muliercularum frequenti experimento flauum, & nitidum efficit capillitium.

HORDEVM.

S V M M A duo fuisse videntur apud Antiquos Segetis fastigia } *Siligo & Hordeum.* } quorum *Effig. Marsh. 395.*
 Sillud, de quo iam dictum fuit, quia rustum rutilumue esset }
 πυρρον siue πυρρον vocarunt, isti cui multa opera essent secernendæ glumæ, & πυρρον, quasi secretum aut separatum nomen fecere. Notissima illa quidem ac præ cæteris omnibus cerealibus vtilissima, & quarum cætera sint quasi abortus, aut illarum degeneres foetus, naruræq; mixte ex siligine & hordeo: Quin hordeum ipsum nonnullis visum Siligo Spuria. Hæc enim maximas subit mutationes, non specificas, sed accidētarias, seu aduentitias, nempe magnitudinis, coloris, saporis, aristis, glumis & alijs affectionibus. Eapropter discussa illorum vaga, & magnopere confusa recensione, mox hic non minus perplexam Zearum, Auenarum, affinumq; segetum, quæ vitia, & præuaricationes illorum vocatur, excutiemus historiam paucis & perspicuis.

Vniuersæ Enropæ, & multo vsui notissimum hordeum, ὀρῖον dixerunt Græci. Septentrionales & Germani, *Gersten*: Angli, *Barley*: Orge, *Gally*: cuius magna etiam varietas, magnitudine, colore, spica, gluma, versu, satio, prouentu & vsu. Nam culmis procerioribus è grano pleniore, maiore coloreq; rubello prouenit. Sed insignior differentia est in glabritie, nuditateuè grani. Si quidem oritur hordeum, aut foliello pertinaci adhaesit granū sepiente, aut leuiore gluma & exutu facili, cuiusmodi est illud gen^{us}, quod nudū vocatur vulgo. Notissimū nostras, quod à semētis occasione In { A V T V M N A L E } di-
 uiditur. Quippè illud pinguiori veruato, vel restibili In { V E R N V M. } *le, Vernum.*
 mandant, eoq; corpulentius, maiusq; stipula & spica euadit. Vernū verò, vt minore perficitur spacio, sic minus granum, minusq; alens è graciliore tum stipula, tum spica promittit proportionem quadā cum siligine trimeltri. Alimentis & medicatis cibis plurima commendatio: deglubitum maxima vi vernū fertur hodiè è Germania superiore in Belgicam, Angliāq; Septentrionales plagas, nudatū glumis & acere, quod M V N D A T V M vocant. Reliquæ Galliæ officinæ, ligneo pistillo assusa feruida pauca mortariōq; inditū hordeū leniter tundendo tunicis palleaceis exiit, mundunq; vocitat ad Ptyſanam, sorbitunculas, aliasq; pulticulas, ægris non parum accommodas facitandas. Est istud mansu suauis, albidum, pellucidum, & transparens, minusq; vtrunq; quam triticum viscidum, minusq; vel calidū, vel pingue. Eoq; pleureticis & Hepaticis multo vtilius. Nā potionibus diarnis diuturnisq; temetis, Cuiusmodi Galliæ quædam pars inferior aut Germania, Russia, Flandria Anglia, Hybernia, Moscouia Nortuegia, & Suetia potat, cæteraq; gentes ad Septentrionem, non exiit: sed triduum integris granis maceratur ad M A V T H, confectionem. Vt in Byera, Zytho, Curmi & cæteris temetis latius dicturis sumus.

HORDEVM SPONTANEVM SPVRIVM.

In Belgij, Angliæ, & Franciæ aggeribus, mæniis dirutis & parietinis colligit, ludibundi pueri in manipulos segetem hanc, qua vapulat mntuo, atq; verrūt quasi scopis asseres, Mulierculæ etiam hac non secus atq; secalis & maioris Hordei. Vulgo *SOVCRION* *SOVCRION* quod flauius est stipula & spica, lixiuo maceratis crinem flauum efficiūt, fibrosa, pusilla hordei radice, pluribus in imo folijs gramineis, cubitum altæ plures stipulæ assurgunt, A. iij. spica

spica aristisque fastigiatur hordei prorsum; sed molliusculæ, minores & grano cassæ, uti auena notha aut Ægyptops; ad cuius cognominem morbum Ægyptem dictum valere scimus: Sed longè magis straminis cineres ad ædemata podagrica.

ZEARVM HISTORIA.

SPELTHA. **V**ALDE quam vagum *Zeæ* vel *Zæ* nomen, & perplexæ notionis fuit, latiusque multò olim patuit quam hodiè, *SPELTHA* vel *SPEAVTRA* huius ætatis; quæ id nomen duntaxat vni frumenti generi largitur, aceroso multum glutinoso, leuiore, & aristis horrido pauci alimenti, non tamen præni succi nec insueti: apud Italos Insuæres, Genuenses, Longobardos, Sabaudos, Galloprovinciales, & valcones, qui serunt propter varietatem grani & agri: nec nisi potioris grani penuria vescuntur. Hæc planè videtur *TYPHA CEREALIS* vocata, quam Germani *welsche weyten*, & *Kamische Zære* dicunt, Peregrinum & Romanum Triticum vel far; quia indidem allatum. Est siquidem tenui calamo, & ut plurimum singulari spica, multis & prælongis hordei non dissimilibus armata aristis scabris & rigidis, quibus Ægyptæ scitè præcipit narium interna vasa punctum laceranda ad sanguinem in quartanariis eliciendum. Granum autè languidius, & exilius multò, multiplicique scabriore & membraneo pertinacius hærente folliculo arctè inuolutum. Longius à tritici natura recedens, quam *Zea mutica* aut *Olyra*. At **THEOPHRASTI & ANTIQVORVM ZEÆ** fermè eadem laus & commendatio, atque siliginis. Quippè tritico simillima, firmissima, copiosissima, è multiplici & alta radice, culmo numerofo & alto fruticat; nec vllis valatur aristis spica, grano multis folliculis incluso, læuissimo & cunctis animantibus iucundo, læti pinguisque soli alumna, & olim Græciæ solius vernacula; postea regionibus multis expetita & sacra. Vndè facile discas nostratam *SPEAVTRAM* multum ab hac *Theoph.* abesse, & tamen congenere, aut potius degenerem *Zeam* esse, Quantūque *Zea* à præstantiore siligine, tantūdem hanc à *Zea* melioris notæ descississe: Sunt enim, & possunt esse mutationes cōplures & familiares inter *SILIGINEM*, *ZEAM* & *HORDEVM*, propter cōmunia seminis & essentia principia interiora; atq; foris multiplicem euentum: ut consulti Rustici rei norunt. Quapropter cum ex Dioscoride tres sint *Zæ* differentia, (illi enim est *OLYRA* è *ZEIS*) satis liquet, ætatem Theophrastum sequutam, latiore huius nominis significatu usam; & complexam non solum *ZEOPYRVM*, sed etiam *OLYRAM TYPHAM*, & *BRISAM*, præter illam primi meriti *Zeam*. Idcirco si rem adeo dissipatam & perplexam, quis pressa & facili designatione digerere & perstringere queat, adhuc modum tentandum.

ZEOPYRVM sive TRITICOSPELTHVM.

HORDEVM **H**VNC proximè locum vendicat Zeopyrum triticum; cui nomen conflatum ex tritico & *Zea*, quia effigie sit inter *Zeam* & siliginem vel robur, medix. Stipula siquidem culmo, spica & aristis *Zæ* est: granum autè simplici gluma & solutu facili amictum: sed longius minusque quam triticum ventriosum & plenum etiam in hortis satum, quale habuimus his duobus annis; Speltæ vulgari colore & cuticula nonnihil ad fecale accedente, gustu minus quam cōmunis hordei suavi, non tamen ingrato. Utilitas, ut copia, rarior.

ZEA THEOPH.

ZEA Theophrasti omnium secundum siliginem præstantissima; est admodum affinis siligini, nec nisi perpusilla varietate distans, non tamen eadem prorsus; nam veterina esu siliginis crepant, aut torminibus intereunt, quibus tamen Theophrasti *Zea* iucunda & commoda. Huic mutica nec vallata aristis spica donata est; glumis tamen tuniceis occlusa.

OLYRA.

Siligo Tragi, senser candidum.

{*Ger. Ammelcorn.*

TRAGICO, 194. **D**EINCEPS *Olyra* subdenda, quæ *Zea* Herodoto vocatur; panificisque apta habetur. Hanc Germani, quia pollinis perquam boni & candidi sit, in *AMYLVM* soluit, &

& AMMELKORN, id est, Amyleum triticum vocant; putantque nonnulli, propter huius in panificio candorem & suauitatem Siliginem esse priscorum, vel SETANIVM, verum secus est.

TYPHA, an SPELTHA?

SEQUITUR Typha; cognata & hæc Tritico; sed Theophrasto monente, cæteris multo læuior quam Zea, nec pinguis fecundique soli, sed soluti & macilentioris seges. Hanc nostrates, vti fermè auenam alternis serunt annis, non veruaculo, sed etiam defesso agro; SPELTAMQUE vocitant: Admodum aceroso, scabro, squallido & arrido grano, minimi ponderis, & eiusdem fermè cum auena indicatur apud colonos, quare Olyra deterior, Briza autem melior & læuior videtur.

BRIZA. {Ger. S. Pitter Korn.

ZEARVM vt sic loquamur, deterrima videtur Briza, periculum enim est onerare, ag- Dodo. 313.
grauare, & quasi veterino sopire: Quod huius panis esu euenire testatur Galenus post Muesiteum Medicum. Typhæ culmo & spica simillima, grano folliculis incluso ex fusco rufescente; panem acerosum, atrum, improbum, olidum, perquam ingratum dant. Germani istud St. Pitter Korn, & Lynkorn, dicunt: nec dubium quin Zeæ species sit, id est, Spelthæ; tametsi nonnulli inficiantur, qui aristis carere dicunt. Quod superius contigere vniuerso triticeo generi, monuimus; sic etiam quando degenerat sceleret, saltem Zeæ vitium esse, eoq; huic accensendum, per criticos herbarios nobis liceat.

AVENA VESCA & STERILIS.

Βεραμος {Germ. & Baver. {Ital. Biada.
Flander. {Anglis. Dettes.

NI SI in hordeum, quod rarius, aut Zeam, quod frequentius fit, desciverit Siligo, Mathi. 401.
in vitium illud segetum primum ac minus cæteris malū abit, quæ auena latinis, Græcis autem βεραμος vocatur: non à fœtore, sed potius quia veterina eā multa vescantur, vel à fragore, sonituū quem seges matura minimo tacta statim, edit. Frugum generi si- BROMOS.
quidem colatur accensenda; sin neglecta inculta, aut semine fuerit vidua, tunc βεραμος erit, edendo inepta, & qua de Virgilius STERILES DOMINANTVR AVENÆ. Dodo. 346.
canit. Proindeque hæc se creuit Dioscorides, vtque vsu essent diuerso, tametsi genere & figura non diuersa; vtriq; enim vt nomen sic facies & natales eadem. Sed minore, gracilioreq; pedali stipula, apiculisque stamineis delicatioribus, minimè mordacibus, comosa effigie BROMO STERILI; semen fermè euanidum, in tuniculis fermè vacuis. Sed BROMO AVENAVÈ frugi proceriora crassioraq; calamus & setacei apices tunicis prognati; semen plenum secali simile, sed arctius, longius & acutius; colore interdum pullo, alias nigro, sæpissimè albicante, & admodum per menses caduco. Vniuersæ Galliz, Germaniz, Italiz, equis est laudatissimum pabulum granum. At in Anglia huius loco panes fabaceos plerique omnes dant: Iumentaque aucæ esu minus bellè habere, aut labores ferre persuasi sunt: Tametsi bonā habeant auenam, qua in Wallia, quæ Cambria est occidua Angliz pars, panes & placentas ex hac exuta glebis nō prorsum respuenda sæpius estitauimus. Pulres illic etiam ex farinæ polline aut flore, cuiusmodi meminimus in Heluetia atque Germaniz Alsatia: potionibus etiam accommodant integram; vel farinam, decoctis aluum siccantibus & astringentibus.

AVENA NUDA.

NON procul ab amæno Tamesi quā Londinum præterlapsus est, atque in Cantia Angliz patent alicubi planities nudata auena colitæ; cuius omnia similia, si granis quod colore ad Speltham, & nudatum hordeum siuè Zeopyrum accedit, exceperis. Mirum quantum, cuniculis hæc seges placeat. Parant ista fruge tabefacta aqua macerando, optimam ceruissiam; nam suauior aliquantò & vescendo gratior hæc est, nequedum valdè frequens.

ÆGYLOPS.
 PHOENIX, sive Hordeum murinum, & Lolium rubrum.
 LOLIUM.
 USTILAGO.
 MELAMPTRYM an Alopecurus Pl:
 PSEUDOMELANTHYM.
 ÆGYLOPS.

NOMEN obtinuit à morbo perquam difficili curatu, cui medicationem pollicetur Ægylops, affectio notans proximè oculi vtriusuis magnum canthum, cauernulam, vel sinuosum vlcusculum, aut abscessum. Permulta ferunt Ægyloperum segetes triticeæ & hordeaceæ agri Norbonensis & Galloprovinciæ, æstuosis & glareosis marginibus, qualem Dioscorides docet: herbulam sesquipalmū, binosque palmos altam, foliis triticeis, exilibus, spica exigua, breui, duo plurimum, interdum tria grana gerente, glumis amicta striatis, & aristis singuli grani ex apice, nōspica emergentibus: hordeacea grana, radicē triticea pusilla. Hac nulla propior genuine Ægylopi, cui morbo potius fieri cepto, quam iam longius progresso, non semel periclitati sumus profuisse. Exicat enim astringendo citra calefactionem multam. Potui cereali etiam addita semina, cerebrum temulentum faciunt.

PHOENIX, Latini hordeum murinum.

Fol. 346. Hist.
ria Dodo.

LOLIUM
Rubrum.

DICTA Phœnix fuisse videtur, quemadmodum Phœnicopteros auis à colore Phœniceo, puniceoq̃ue, quasi flammieo, eoque vocant Flammient istam auem Norbonenses maritimi, nam cum radices, exiguaque folia & viticulos Tritici vel Ægylopi habeat, spicem obtinuit rubello colore, purpurascēteque ex fusco nitentem, alterno situ glumas harentes habentem, & prosum lolij similes: vnde nonnulli RYBRYM LOLIUM vocitarunt. Et nisi multum fallimur, est hæc Plinianum HORDEUM MYRINUM, folio hordeaceo breuiore, angustiore: spica lolio similis. Rami digitorum seuum radicem circumdant: In aruis & tegulis, recens illitis, trita & vino pota præclare menses ciet: quod nobis hæcenus incompertum, non enim fuimus ausi ex periri, veriti ne capiti dolorem moueret, aliaque incommoda temulentiz faceret, cuiusmodi nouimus Lolium facere solitum: Præsertim apud Prouinciales, Delphinates. Repertu & cognitu hæc facilis, Germaniz, Angliæ, & Galliz.

Σίσις καὶ διασος.
Gal. Yurage.

LOLIUM, & temulentum triticum.

Fig. apud Dod.
320.

Aequi vocarunt Græci vt coniectura fert παρὰ τοῦ ἀγροῦ, quod est efferri & attolli, vel sursum rapi: rapitur quippe in cerebrum lolij vapidam nocua aura, atque dementiz affinem tenebriosam vertiginem, temulentiamque efficit. Quo quidem inaleficio vel infimæ plebeculæ notum, & inuisum plus satis est, præsertim Galloprovinciæ, Norbonæ, & passim in reliqua Gallia, vbi yurage, quasi ebriosa vel inebrians vocatur. Quippe etiam in Nortmania, Belgio, & Angliæ, non solum pani mixta farina, sed multo magis Cerealisbus potionibus, Ale & Byere addita, & feruesfacta, torpore & temulento veterno cerebrum opprimit, & opacat, reliquaque membra torpida reddit. At foris admotum, elusum ex axungia depictum cataplasma, eadem pellit incommoda, doloresque diuturnos artuum & perieranei soluit. Spica similior nulli quam phœnici, vt sibi Dioscorides monet: eoque qui alterutram norit, ambas nouerit. Granum in dura tunica: stipula, radix, & reliqua tritici, vel secalis sunt: eoque ea in opinione, qui ex Theophrasto est Senensis, vt hæc tritici peltis, rursus in triticum redire solita sit: vt verum dicit, ita ineptum & Physices imperitum se prodit; quæ de Hippocrate historiam, è Plinio exemplum sexuum humani mutati adducit. Quippe neque ad rem facit hic sexus mutatio, & in plantis sexuum distinctio non vera, sed metaphorica & figurata doctis merito censetur: igitur res vera, ratio improba. Nullus enim non nouit hic defecisse Lolium à tritico, nec in feminam abiisse, sed in vitium quodpiam, aut aliam segetis speciem: calidius enim & siccus est lolium, reliquo quolibet frumento, impro-

Melampyrum perfoliatum luteum.

*F*uit & hęc species, hic addenda, ut
pote nō descripta aut depicta sa-
miliaris Galloprovincię segetibus.
Dodrantem aut sesquivnciam vix su-
perat: tota facie superiorem præfert,
sed flos illi luteus, & folia altius diui-
sa, Coronopo propiora.





bum alendo, præfertim homini, tritico autem planè contrarium natura. Hoc enim homini salubre, veterinariæ autem nex plerûque. At lolium hisce, vti neque alitibus gal-
linis nocet nihil, illi tamen plurimum: quare specificè differentiæ sunt, non maris aut
fœminæ, vt blaterabat Commentator. Quinetiam Adanus Leonicerus, Germanus Bo-
tanicus minimè malus.

USTILAGO.

{ Germ. *Brandt.* { Gal. *Brusure.*
{ Fland.

NON è deprauatis humi granis, sed ambustis culmorum fastigiis, quæ iam spicari
cœperant, istud vitium oritur, quòd ideo *Brandt* Germani, & vstilaginem recetio-
res dicunt: *Brusure* Galli, apud quos, inter siliginem, secale & auenas, frequens oritur.
Dum enim in floribus atque granorum spe adhuc est spica tenera, si compluta madidique
imbre fuerit, ac repenti sole feruidiore arefacta, iam vitium istud sterile fit, nullius in
Medicina commodi comperti: cognitu tamen facile, quia culmis, foliis & radice est
siliginis, vel auenaceis: Spica autem puluerulento situ fusco, aut atro obducta, quæ il-
lico, quasi defloresceret in puluerem ambustamue teredinem cariösam, fatiscit.

Historia. Dodo,
321.

CRATÆGONON.

CRATÆGOS, vel Cratægon arbor est, qua de inter Mespila dictum. Crategonum
verò herba Cerealis videtur, & ætina melampyro, cuius vsus & esus, semen viu-
dum & genitale redderet, id enim τὸν γόνον κερταῖον, est semen robore acuiere, &
quasi viribus inbuere. Nullius venit in mentem plantæ, cui aptius quadrarent notæ,
quàm ei, quæ propter similitudinem recentioribus, alterum MELAMPYRI genus pu-
tatur. In Syluosis collibus, & deuexis, vmbrosis, Norbonæ, Angliæ, Sabaudie, & Pe-
demontis passim multa ætate fructat, cubitum, sesquicubitumque plusculis, & ge-
niculatis germinibus, in alas multas diuisis, eusasiæ ritu: sed multo crassioribus &
maioribus, quas ab imo totas folia melampyri, sen tritici vaccini vocati, vel luteæ criste
gallinacæ dicunt, psylli aut linariæ ambiunt: Flores in summis herbacei ex luteo, cala-
ticulis minoribus, quam Albæ digitalis, sed similiter digestis, & vt melampyri aut lina-
riæ effigiatis. Semè in folliculo exiguo milio non dispari, cuius odor & sapor acre non-
nihil testantur, vti & folia siccata. Ac tametsi videatur hic locus lacunosus & hians, ta-
men istud semen in pollinem puluèrque ductum, esse Veneris incentiuum, & seminis ge-
nitalis quasi fermentum quoddam & coterem, non abs re reor.

MELAMPY-
rum, alterum,
Nostericorum.

MELAMPYRVM et ALOPECYROS PLI,

Triticum, Vaccinum, Dodo.

{ Germ. *Wurcyssen.* id est, *Pabulum vaccinum.*
{ Fl. *Heerblommen*

HVI c quæ plurima & noxia inter segetes oritur, proxima facie triticum vel pabulū
vaccinum, *Wurcyssen* Germanis dictum, sed maior tota, & consimilibus criste Gal-
li floribus, magnis, spicatis, vti cauda vulpina, eoque Plinius Alopecorum fecit: folia
osyridis latiora vel rubia, quæ tametsi dispari magis ordine, tamen stellatim oriuntur:
exigua & dura radix, floribus colore primulum purpurascens ex cœruleo, deinde
dehiscens, luteo, cœruleoque permixtis in virorem marcescentibus, inter quos glu-
mosæ siliculis duo grana cohibent loliacea, triticis minora, & nigriora.

Historia. Dodo,
320.

Vitium est tritici, & comes importuna, vacci pabulo grata & innocua, & in quam
triticum minus laudatum abiisse videtur.

PSEV.

Germ. Keden & Kornroß.
Fland. Korenroosen & negelbloemen.
Italis. Gittone.
Gallis. Nielle des bledz.

Mathis. officin.
Fol. 798.

PORRO sui generis est Pseudomelanthium vocatum, nam tritico permixtum atque farina in panificio vesca est: solia pilosa, pſyllii latiora, breuiora, caules rectos, proceros, pilosos, in summo caliculis oblongis donatos, qui quaternis, quinisue micronatis, exilibus vnguiculis, flores maluz colore & modo ambientes. Semen copiosum fusco pulloue colore foris, intus albedo.

RELIQVA CEREALIA.

Oriza
Milium

- Vulgare*
Indicum Plinianum, seu Mais Occidentale.
- Sorgo.*
- Panicum.*
- Panicum, sylvestre.*
- Panicum. Caruleum, Indicum, unde forte*
Indum. Dioscoridis.

Phaleris.
Phaleris pratensis minor.
Lathospermum Plinianum.

ORIZA.

Italis. Riso.
Germ. Reisz.
Flan. Raps.
Gall. & Anglis, { Ris. }

Mathiol. 403.

VT semen ex India primum fuit allatum, sic & indidem nomen adscitum videtur, ORIZON Theophrastus, Dioscorides verò ORIZAN, Noltrates trunca voce *Ris* vel *Riso* Italis vocarunt, Notissimum illud Afiz & Europæ, sed vnus duntaxat generis nobis visum in Prouincia Norbonensi & Hispania, sed maximo prouentu in agris Mediolanensis depressis, & patenti planicie vdi agri, quem tamen euripis & illicibus & flumine è lacu Maior vocato ductis, crebrius, quoties opus vident, rigant: alioqui nullam aut cassam segetem laturum, vt mirum sit tam siccum & exutum granum, tam palustrem & humentem optare fundum, bonum alimentum & lautum suggere, etiãque valetudini prodesse posse. Huius melsis serotina est circa æquinoctiũ Autumnale, quippe maturefcit æstiuis solibus multis: eoque Septentrionales, tametsi humentes magis respuit tractus, vtpote aliosos. In arista flexuosa, sed rigidula spicatum alterno situ insunt grana, subflauo folliculo, acutis seu angulosis striis in longitudine donata: quo cum sibi supernè hærentibus aristis seu angulosis striis in longitudine donata: quo cum multo pulchriora, atque candidiora quouis præstantissimo tritico siligineo. Culmi hordeacei sesquicubitalis & cubitalis, radix tritici: at solia potiùs mili aut hordei quam porri nobis (ni multum labat memoria) visa in Longobardicis & Hetruscis campis latissimis & vliginosis, atque in Prouincia Galla. Eapropter Mathiolus Senensis, sequutus videtur eos, qui ex Plinio ORIZAM hodie ignotam, radice Gemmeæ rotundis, sequeutus videtur eos, qui ex Plinio ORIZAM hodie ignotam, radice Gemmeæ rotundis, cum rostrati vulgata Oriza inscitè confuderunt. Illud porro radice rotundæ RISVM, fortè sit illud, quod Romanis inuidebat iam rû Asia, & Syria Barbara, iureiurando adigere solita messorum & insitorem, ne prius quam excocissent, vlli venderent, veriti ne semen in alias regiones communicaretur, quæ semina sic coctione exanimata, munere accepta

ORIZA
Plin.

accepta, nos metipfos non raro sefellerunt. Plurimum & optimum alimentum fufficit probe lacti incoctus faccharo & amygdalo noſtratis Oryza pollen, eoque ſanguinem & ſemen auget, quod non dubius animi ille Senenſis efferet ſi in Mauritania vel Hiſpania egiſſet, vbi etiam ex Oryza macerato lacte frumento deſillant liquorem, limpidum primo, deinde oleoſum habent, nec parū ſuaue, nec minus exhilaratē ſpiritus & inebriantē, quā ipſum (quo illi abſtinent, vel carent) vinum. Etiam eius pabulo mirē delectantur & dociles fiunt Aphri Elephantes.

Κέϋχεος, MILIVM VVLGARE,

Flandris, Biers ſeu Mals.
Italis, Miglio.
Germanis, Gerſten.
Gallis, Millet.

GRÆCĒ à minutis ficuli granis ſeu gygartis numeroſiſſimis, quæ κεϋχευιδες vocantur, dictum videtur. Latine verò quaſi milleſimum ſerat granum: eſt enim tantæ ſeracitatis, vt granum ſingulum ternos reddere ſextarios ſeratur. Niſi potiùs dictum putet quis quia communis nomenclatura Græci *μειλιον* vocant, tum Panicum, tum Milium auctore Varrone. In Hetruria & Norbonenſi Gallia, primo Vere ſerunt, metuntque tertio ſerē menſe poſt. Solum pingue, limoſum & glebā glutinoſā, & aërem tepidiorem amat: ab radice fibroſa Panici ternos quaternoque culmos binum, triūmve cubitorū altos, hiriſtus harundinaceos porrigit: foliis & comola ſœtura, faciēq; ſumma quadantenus oryza, ſed longè maiore & magis ſparſa ſœtura iubata, comani harundinaccam imitante, & grauida puſillis granis, leuiore tunica teſtis Phalaridis aut Lini, ſed rotundioribus, minoribus, magisque lubricis, quæ tamen facile ſtriata, inque pollinem redacta panes, lagana, placentiſque coſtant, grauiā concoctūque difficiia, & mandendo glutinoſa, atque ingrata, niſi mox quum cocta fuerint edantur. Eoque Venetijs, calentia adhuc eſtant & vœnūdat plebecula in compitis, addito elogio recentis à clibano vel furno caliditatis. Sed ſeu recens, ſeu vetus eſt, vtique compactæ compendiū & ponderoſe molis, prauūque ſuccum & multò ſilagine ac oryza deterius alimentum ſuggerit, vel quibuſuis Carbonarijs, opilionibūſque Tiriolenſibus ludicibus, nedum Galeno: quos illic cum percontaremur, num vera ſcripſiſſet Mathiolus, nimirum eos poſſe viſitare, niſi pane miliaceo, vel polenta lacte incocta, nos ridebant, & Commentatori ſimilem victum perpetuum & lautitias optabant, & ioco addebant, ſe non poſſe quidem perdere, vt quorum res, pecuniā neutiſquam potis eſſet meliores eniere panes. Auiculæ iſto non ſectus ac Phalaridis, Lini & Canabini feminibus viſitant, vt Canariæ Philomelæ, Linottæ vndè nō nomen, & κεϋχευιδες fortè à milio illi auiculæ, quam Galli *Queracereen* vocant. Siccat tenuitate multa, pauco aut nullo eſt calore, eoque cerebri fluxionibus valdè accommodum. Eidem ad fluxiones artuum, ſtatūſque inteſtinorum magno leuamento. Torrefactis ſalis manipulis duobus ſerreo cochleari vel imbrice, addunt milij tantundem, ſed ſubducto ab igni cochleari, nè vratur milium, quod calore & contactu ſalis vel ſurfuris, dum remiſcentur vnà crepat, medullāque candidā tumidā, Aniſi aut Carui conditi parem, ſimilem, & concolorem adeo excludit, vt pueris ſpecie tragematis ſacchariti illudat. Ex ſiccis linteis excepta, calida admouentur, etiam partibus delicatioribus, torſionibus vexato abdomini, lateri, denique euulſibet ad huiorem craſſiorem impactum digerendum.

MILIVM INDICVM PLINIANVM ſeu MAIS

Occidentalium, Frumentum Turcicum, vulgè.

Flandris, Turchkopen.

FRUGVM maxima & perquam ſpecioſa hæc noſtro orbi inq̄uiliſſima, indè à Ne-ronis principatu in Italiam inuecta, iamque noſtra ætate magis oblectationi quā Panificio ſata & culta, Turcicumque frumentum, tum vulgo tum doctiſſimo Fuſchio nuncupata eſt. Quem tamen perbonum doctorem, cum alijs non ſemel, tum

B. i,

hic

hic potissimum immerentem lapsus inculsat commentator Senensis : quòd istud Milium perperam triticum appellarit, vt pote non ex Turcica allatum, sed ex Occidentibus Indis primum asportatum. Atqui cum huius deliniationem, proceritatem & fecunditatem scitè Plinius adumbret, cuius xuo nulli Europæorum nota fuit aut perua Occidua India, perperam illius primum allatum fuisse commentatoris Chronographia statuit : quare rectius nacleri qui ex Asia Turcica maiore, Indiis finitima aduexissent, Turcicum vocarunt. Radice, folijs, & floribus est planè Milij, sed multo maioribus atque culmis procerioribus, septenùm, octonùmue pedum, harundinaceis, rigidis, digitum & pollicem crassis, geniculatis & medulla farctis densa, candida, cuiusmodi saccharinæ harundinis, è cuius medio, inter geniculorum & foliorum finem se prodit Cylindrea effigie Typhæ claua crassiore, sed breuiore, tunicea & tenui vagina operata, in qua conduntur grana Pisi magnitudine, compressa & denis pluribus. e versibus rectis scitè & arcuè stipata, colore purpurea, interdum fulua, nonnunquam alba & fusca : quorum varietate flores utique concolores miliaceis similes respondent, in summoque culmo nutant nullo indidem prodeunte grano, raro naturæ luxu, quæ non vt pararet umbram sctoræ, sed vt ostento spectatorem oblectaret, eodem cossos semine fecisse videtur, quod rarò alijs in frugibus animaduertas. Aprili & Maio triduo maceratum semen (vti cætera duriora grana) complotto mandant aruo, scrobibusque depressis infodiunt & opcriunt, non secus ac Pisi, & Fabas rurales. Maturat Augusto & Septembri in Anglia. Peruvianum M A I s verò ferunt ; qui illic fuerunt, ferme toto vertente anno posse & feri, & meti. Est quod, trimestri, bimestrique aut sex hebdomadarum spatio maturat, prout terræ & ætheris fert temperies, nec disparementis facilitas in Asiaticis Orientalibus Indiis. Est huius M A I s panis, vt miliaceus, grauis & gratus minimè ventriculo : præsicus enim & terreus, alimentosi succi expers longè nostrati filigineo bonitate inferior, quem Phronæ illi genti apparauit, vt similes habere labra lactucas. Mouendo puri, faucibus, salua & mansu subigunt quidam : dulcedinem quandam insulsam percipias & gluten, quo, occlusis calori natiuo spiraculis, facilius & citius pus fit.

SORGHI ITALIS & GALLIS.

EST etiam Sorgha re & nomine Indicum Milium huic affine, & indidem aduectum, sed vt minus speciosum, ita frequentius multò in Italia, præsertim vbi secus viam, & tuguriola rustica : inter Patauium & Ferrariam, videas hanc fegetem Septembri menses aptam, quam Vergiliarum ortu seuerint. Similiter superiori harundineis quaternis, quinifue, medulla farctis assurgit culmis hominis proceritate, gracilioribus aliquantò, fuscis, geniculis tuberosis, superioris folijs mucronatis, sed summitatibus spicata fastigia Panico maiora insunt, quæ post delapsos flores luteos, grana oblongæ rotunditatis, subrubra, canabis, milij maiora duplò, & duplici tunica inuoluta promut. Miscelli illuc coloni pertæsi operæ & longioris moræ, qua egent cæteræ fruges, sorgam ferunt ad panem faciendum, aut columbis & pullis alendis. Concinnant etiam scopas huius arefactis rectoribus & rigidioribus, exilibus summis viticulis, aut virgis, ad vestes pannosq; quotlibet verrendos in Italiæ & Galliæ varijs locis.

PANICVM.

{ *ελυμος & μιλανος* : *Italus, Panico.*
Germanis, Phenic α *Heydelphemic.*
Flendris, Panichkoyen.
Gallis. Paniz ou Panic.

Extat apud Do.
de frug. pag. 17.

Mathiol. 406.

Ελυμος & μιλανος vocarunt Græci, vnde & Milium Latini auctore Varrone : fuit enim promiscua nomenclatio, Milij & Panici propter communes tum naturas tum vsus. Est quippe species milij, sed Panicum dictum à glomerosis tuberosis quasi racemis, in paniculam, siue conicam spicam hirsutam, nutantem, palmum & selqui-palmum longam aggestis : Miliaceis, sed exilioribus, numerosioribusq; multo granis, multatque

multaque tunica obfistis concoloribus, interdum albis, fuscis, interdum ex pallido luteis: folia item Miliacea, mucronata in culmis firmis harundinaceis dense geniculatis quinque, senumue pedum. In Gallia & Vaseonia vltima, etiamque Belgicæ Galliarum hortis, sed feliciter in soluto & sabuloso aruo, sicciorisque & tepidiore Climate: Nullius ferè commodi hodie, nec Officinis, nec Panificio: est enim præfici, macilentum, & leuioris, vt sic dicam, alimenti, eoque auiculis ad cibum erogatur, non secus atque Phalaridis & syluestris iam describendi, spicz.

PANICVM SILVESTRE.

DISTAT nostrate Syluestre vocatum, inter Italix & Norbonæ rudera, & vrbium Areas plurimum oriri spontè solitum, non solum cultu, sed etiam spica peculiari, nec in turbonem collecta, sed minore multò & alterno situ summo cauli hærente, Perficariæ, aut Potamogetonis similitudine. Cætera verò facies multum præ se fert Panicum, stipula, folio, culmo, radice, & internodiis: omnia non dissimilia, tametsi longè minora, eoque Panici recepto nomine herbariorum donata, vsu hodie neglecta.

PANICVM COERULEVM INDICVM

vnde fortè INDVM DIOSCORIDIS.

QUOD posuit in plantarum ortum & educationem æther, aer, & tellus, vel hæc luculenta, si quæ alia planta, luculento exemplo erit: cuius semen recens ex Indijs acceptum, & summe humanitatis, & summi admiratoris stirpium, generosi Ioannis Brancionis Mechliniensis munere acceptum, à nobis Monspellijs hortis factum Martio mense, antè Augustum harundinaceos culmos, quales canne saccharatæ, hominis proceritate erexit: crassiores digito, medulla fungosa pallente farctos, rectos, geniculatos, qui proximè radicem (quam pro sui magnitudine minorem, & sermè Panici prioris magnitudine habet) cæruleo, elegant, nitido purpurascunt, vt etiam in summo cylindricè spicæ vel conis superne retuso fastigio, ad effigiem Indici MATIS, seu Milii Turcici: nitent stamineis apiculis florum ex cæruleis dilutis & gemmulis, grano dense elegantèrque stipatis, oblongis, teretibus, cæruleis, aenæ nudatæ similibus quadantenus, minoribus, copiosissimis. Folia harundinacea, medius secundum longitudinem nervus percurrit, lata medio tenuis internodia inuoluentia: gustus miliaceus, vsus nullus, quia inter rarissimas fruges hæc.



Φάλαρις { Flandria &c } Spacnich saet & Saet van Canariën.
 { Germania }

NON modò è Canarijs Saccharinis & Hispanijs, sed etiam Norbonensi agro, via ad Magalonem propè segetes ad pontem, Phalaridem veram, cuiusque enatum semen feliciter in Belgio & Anglia habuimus: quò institores Canarijs Philomelis plusquam saccharatas & mellifluas cãtilenas modulantis alendis venum asportant seminis magnam vim: Sefamo paulò maius & concolor, aliquantò depressius, & minus quàm lini semen: in spicatis culmis, & glumis acerosis, æqualibus: cubitales sunt culmi, geniculati, folijs & radice hordei, aut potiùs, vt tota facies, Zex. Alimento est, & nonnulli panes pin-sendos curant, esitãntque ad calculum facitùsque vesicæ.

PHALARIS PRATENSIS MINOR.

Trago *Aegypti* Pl.

Inter Icona

Hiero, Tra, 204

QUO modo & quantum distat gràmè pratenfè minimù à canino gramine, tantù hæc à Phalaride: quippe non in segetibus, sed herbidis pratensibùsque Germaniz, Galliæ, Angliæ oritur, gracilioribus ac fuscis ex sanguineo lucidis stipulis, sesquipalmariibus, interdum & pedaliibus, persumma in sericeis capillamentis sparsim copiosas glumas gestantibus, nitidas, ex atro fuscas, & semina superioris phalaridis duplo minora: folia item & radix minimi graminis vel Ischæmi.

LITHOSPERMVM PLINIANVM, sive Maius.

LACHRYMA Iob seu Christi.



GAlloprouinciz & Norbonësia vireta, præsertim Cænobiôrù, non dũ intestinis bellis efferuentibus euerfa, hanc plantam sedulò colere solita erant, seminis lapidei causa: quo traiecto filo preculas funditabant & supputabant. Et etiamnum ad calculum Renum & Vesicæ faburam, polline & decocto præsidium vulgatum. Rotundum, leuiter altera parte turbinatum, altera nonnihil depressum, Staphylodendri bacæ hæd dissimile, magnitudine Ciceris: nitore, leuore, candore, colore Lithospermi maioris Dioscoridis: sed duritie filicea, & lithospermo multò pertinacius: præsertim quod è Creta, Syria, atque Rhodo allatum, & spontè natum erat: medulla intus pauca, gustu emplastico: nostratis autem folia Orizæ, milij, vel pusillæ harundinis, palmum & sesquipalmù longa, digitù lata, surrecta: statim ab radice Trifici cul-

meos cauliculos, geniculatos, rotundos, cubitum altos complexa: quorum è singulo sinu singulæ barbule (vt hic Plinius ait) seu panniculæ miliacæ prodeunt, seménque continent magnitudine ciceris, duritiæ lapidis, vt idem describere pergit Plinius. Cuius si quis exactius verba perpendat, & cum vtroque comparet Lithospermo, facillè animaduertat vtrumque ab eodem designatum, sed (qui illi penè fatalis lapsus, vt de Chrysanthemo monuimus) in vnam descriptionem constatum. Primù *Λιθοσπέρμον*, id est Iouis triticum indicat triticeis aut harundineis similem, aut congenerem: herba quinquicillalis, folijs rutæ duplò maioribus, ramulis furculosis, crassitudine Iunci, quæ ex vtriusque deliniatione mixta sunt. Sed post addit lapillos magnitudine Ciceris, duritiæ lapidis, candore & rotunditate margaritarum, cauernulas habent quæ pediculis hærent: quæ postrema prorsum Lachrymæ Iobæ quadrant, neutiquam Dioscoridis Lithospermo. Quod licuit illi quâ plurimis in agro Romano locis videre: hæd sanè tam stupèda mirabilitate, si vulgo cognitù Miliù solis intellexisset: eoque dicit, sibi non hærentè, sed vulsam visam plantam in Italia crescere, puta hortis. In Creta optima, nimirù natiuo solo: quin tantus decor veluti cãdicantibus margaritis: cæterâq; inibi verba, neutiq; deformi & tristù Lithospermo congruant, sed Lachrymæ Iobæ longè hilariorè & iucundiorè aspectu: quibus

quibus intus inest semen (vt idem dicit) & subtus cauernulæ, neutiquam cõmuni. Mut-
tit hic Rapfodus Senensis, & superius in Fuschium ineptit, & superiore volumine nobis
Phalaridem vorarat.

Αλωπεκός THEOPH.

Cauda vulpi Monspellensium.



HERBAM quam caudis Vulpinis similem & cognomi- Lib. 7. capl. 10.
nem factam dicit Theophrastus, cum de superiorum
collatione, tum verò de ista Philoſophi delinatione, no-
tiſſima eſt, frequẽſque maritimis ad Magalonam Aquas
Marianas, & Monſpellio propinquieribus. Pedẽ alta tota
planta, albicans tenui canicie & triticeis culmis, folijs, ge-
niculis & radicibus exilibus. Specioſiorem tamen ex ſta-
uo pallentem, paleo colore molliorem, & denſa lanu-
gine obductã, pilis delicatioribus & longioribus in Vul-
pinam caudam, etiam vulgi illic ſuffragio & nomenclä-
tura, eleganter eſſormatam habet, quälẽ & vndẽ Theo-
phraſtus nomen mutuo habuiſſe dixit: ſapore fruen-
taceo inſipido. Huius autem non vſquequaq; accuratus

BELGARVM.
interpres Plinius, videtur *αλωπεκος* (quam Melampy-
rum Belgij hariolamur) loco Alopecurũ accepiſſe: vti deſcriptio liquidò docet. Nam *αλωπεκος*,
quod nonnulli Plantaginẽ, etiam alij ortigen acceperint, non propterea plantago ſit
ſtatim cenſenda, vt monuimus, varijs adducti exemplis in Stæbe: ſunt enim nomen-
clationes vulgi incertæ, niſi certioribus ſtabiliantur coniecturis.

HOLOSTEVM DIOS. floribus albis

vel ολόστον *Egineia*.

HERBULA ſit oportet tota tenella & graminea hoſtoſium, ſic contraria notione di- Perperam Fuſc.
ſta tota oſſea, quaſi nihil duri oſſicue haberet: ſic etiam Græculi τὰ γλυκύα id eſt Gramen.
dulcia ſella contrario ſignificatu, vt quæ ſint amariffima, vocant: ſic etiamnum vulgus Ico: 74.
Iuam moſchata, & Vnguem odoratum dicunt. Dux verò ſunt plantæ gramineæ, qua-
rum altera perperam à Doctis: altera non malè forſan à nobis, proponuntur. Quãplu-
rimis Galliz, Belgiz, & Angliz locis incultis, & viarum marginibus, exiles, tenelloſi vi-
deas & humi caducos, per interualla geniculorum, bina folia gramineis breuiora, acu-
tiora, habentes cauliculos: floribus lacteolis Ornithogali, & Moſu gallinz minoribus:
vtriculos, Lini ſeminis, aut Anagallidis ſimiles relinquentibus: Radicibus ſtamineis,
albidis geniculatis prolixè per terram vagantibus, gramineis multò exilioribus, quibus
tamẽ etiam hodie abutuntur quamplurimi Angli Pharmacopœci, graminis loco & igno-
ratione. Hanc Lutetiani Pariſienſes præceptores iamdiu hoſtoſium opinati ſunt.

HOLOSTIVM ALTERVM.



SEn enim noſtra hæc multò breuioribus & crebrioribus
ſgramineis vix palmeis viticulis, & folijs exit Coronopi
diuiſura, in ſuperiore ambitu ex ſuſco virentibus, delica-
tioribus fermè, vt Capillarium, ſparſis. Radix tenuiſ-
ſimis cirris, & capillis pluribus Adianthi veri, ternos &
quaternos digitos proluxa, pulla & albicans fulcedine.
In Norbonæ ad Veganium, & propè Lugdunum, e-
tiãque in Alſatia Germaniz vidimus, ſaxoſis & in-
cultis ſterilibuſque collibus. Guſtu exiccat & adſtringit,
grata ſatis & cuiuſdam lentoris non immunis. Quare SERPENTI-
multò certius quis hanc verum hoſtoſium profiteatur, na.
quàm SERPENTINAM vernaculè vocatam & Eſt apud Ma-
Mathiolo Hoſtoſium putatam, cuius radix adeò non chiel. Fol. 494.
eſt capilli tenuitatem aſſequuta, quod vult Dioſco-
rides,

B. iij. rides,

rides, vt crassie lignosa & fusca minimum digitum fermè crassa manifestò conspicitur. Reliquæque planta capitulis & semine plantaginis: non mollicella aut tenera, sed durior, rigidiorque, quàm vt holostio datum sit. Folia illi iuncea, angusta, crebra, in terram procumbentia.

HOLOSTIVM MONSPELLIENSE



Nec quam Monspellenses Holostium suspicabantur probàda, propter eandè planè radicis còtrariam notà. Est enim (tametsi alba) lignosa, crassa, lux aut Cotulz, aut Cichorii æqualis, furculosa, statim folia Psyllii aut Coronopi non incisa tamen, albicàtia, complura, & nònihil lanugine pilosa emittens. Viticulis etiam & floribus Coronopi vel Plantaginis, sed albidis. In Monspellensibus aridis oliuetis, & non procul ab aruis viæque Boutoneti proxima frequens oritur. Exiccat & hæc nonnihil, adstringit, terreo sapote, subfalso, saliuam ciente.

PHALANGIVM aut MOLT PLI.

Φάλαγγιον.

Nonnulli Dod.
Mely. Fol. 348

NON sine dispendio nostræ cognitionis, & tædio conquestionis omissa sunt folia Phalangii, in Dioscoridis Plinique deliniatione. Cui tamen multum diùque, vt nonnihil quod bellè quadraret, nancisceremur, a nobis elaboratum est. Lugduni in collium accliuibus ad Rhodanum, non procul ab arce noua Lucernæ portæ, & Pedemontis Taurino, Eridanòque flumini collibus vicinis planta est gramineis folijs latioribus, pallidioribus, caulem imum cubitalem & sesquicubitalem amplexis, ab vno ortu excurrentibus & reflexis, radice exili, fibrosa: plures pusillos ramos in summo promens, quibus ex pediculis flores aptantur candore & diuisura Lilij, sed crebriore Asphodeli pares, nec ablimiles. Semen angulosum pericarpio Linii, aut Asphodeli oclusum, sed multò minus. Varijs Londini & in Belgio hortis colitur, nominèque Phalangij donatur. Multò sanè aptius quàm MOLY, seu Dioscoridis, seu Plinij, vt nonnulli voluerunt non indocti: nullo enim bulbo, ne quidem atra radice præditum est, vt cætera taceamus.

PHALANGIVM CRÆTÆ Salensis.

DVM Monspellio Galloprovinciæ Mafsilæam lufum iremus, cum plures commilitones per Crætam, glareosâque, & fufas planicies Salonæ, quæ vocantur *Craux de Salon*, alteram non dissimilè huic copiosam collegimus, nisi magnitudine differentem, quæ pedem vix æquabat: & folio minore quidem, sed crassiore, rigidiorè multò, ad Garyophyllatâ accedente. Iunio flos, & semen Augusto fundebat similia, sed minora.

PHALANGIVM. H. TRAGI.

PHALANGIVM verò singularis iudicij Tragi, non Lilij flore, sed potiùs papposo flore quopiam vixit Iunci, cui item folio, caule pedem alto, totòque habitu accedit, quò etiam referemus.

PHALANGIVM MATHIOLI.

COMMENTATORIS Senensis verò Phalangium pictum, vti pleraque alia, nec descriptum nobis, nec multis doctioribus nusquam visum, (fortè nec Mathiolo) qui quasi mutus foret, sculptori munus commentandi relinquit. Multus alioqui hic & alibi, in ex Ruellio & Plinio iamdiu perterritis locis vel interpretationibus conferruminandis.

▲ RVN.

ARVNDINES

	Saccharum.
	Sacchari purgandi ratio.
	Saccharum { Candum candidum.
	{ Candum violaceū venetorum }
Saccharina Indica	Arundinis Indica siue Saccharum mel, & Sal Indum Egineta.
	Melapum.
	Oleomel.
	Manna, Ros seu Drosmeli vel Acreomeli, & Melysaccharum.
Arundines	Manna { Israelitarum.
	{ Brianfannensis.
	{ Calabrensis.
	Vallatoria aquatica seu Phragmites harundo.
	Alua & Satina nostras.
	Fistula, vel Syringa & scriptoria.
	Nallos seu sacra, Toxica Theoph.
	Aulius seu tibicinaria fumina.
	Calamus odoratus Libani.
	Cannacorus, Canna Indica Neotericorum.

H ARVNDQ SACCHARINA INDICA.



ON
modò
effigie,
que illi
cò Miliu
vel Panicu
intuen
ti of-

fert, sed etiam natura & vsu hunc proximè locū sibi vendicant Harundines: vt quarum radicibus tuis arefactus & in farinam molitis, etiamnum hodie nonnullæ gentes panem nō insuauem conficiunt. Quinetiā graminoso est sapore, etiam nostratis arundinis radix. Et ea quæ Saccharum fundit delicias lautitiæque, tum culinæ, tum Pharmacariæ vtiliorne an similior Miliaceis sit incertum est, idcirco hanc illis proximè subdere consilium est, Medius siquidem inter Miliaceas atque Arundinaceas videtur hic Saccharatus Calamus, nobilissimus hodie & orbi Europeo iā multis ad Mediterraneū Oce-



anumque tractibus inquilina: vt Hispaniis, Lusitaniæ, atq; amenissimis Olibi in Galloprovincia viretis, non procul, & ex aduerso Stoechadibus insulis, quem virentem inibi & alibi habuimus, & in Belgio meminimus. Septenum octonūque pedum calamos pollice crassiores, densis geniculis, fungosa, perquam dulci, succulentæque medulla obfarcta albida promit. Folia binos cubitos equant, angustiora tamen Donacis, scabra &

B. iij.

secundum

secundum longitudinē striata, numerosa: Stolonis harundinibus ceteris concolores, complures amplexicia, angustiora quā ea sunt, quibus Saccharatæ Metæ inuolutę passim apud iustiores cernuntur. Comoso flore, & quadatenus Sorgi. Radix ad Canuz radicem accedit, sed dulciore, succulentiore, minuscque lignosa: vnde germinula erumpunt stationi oportuna, refecta. Panguntur etiam tales inæ radici abscissę, atque bellę primò proficiunt in Gallia & Belgio, sed hyenis sçuicia enecantur, humentis soli, sed tepidioris aeris & aurę alumne atque amaliæ. Latitem hæc dat prorūm incomparabilis utilitatis esui potuique, secundę atque aduersę valetudinis cuius ætati, sorti, & regioni plusquam mel iucrum, & meras cupedias. Nec tamen Indico hodie prima laus, tametis ex India primū in citeriorem Asiam, Rhodum, Cyprum, aliāque non pauca loca transmississent. Nam hodie Canarium & Maderense longē omnibus suauitate & candore excellit: quippe tametis quod Genuam, Malsilzam ex India, Alexandria, & alijs Aphricę emporijs, Liburnicis Venetijs asportant, sæpius excoctum, candore marmoreo Canarij prouocat: multò tamen suauitate & dulcedine gratissima superatur. Dum enim lixiuius illo acriore, quasi sapone ex calce parato, sęculentioris, nigriorisque pinguedinis fordes eluuntur & abstergantur, vber dulcedinis gtatoris perit, atque nescio quid rancidę acrimoniz inuritur: vnde bilis gignitur, & sanguis vritur, caput grauitur. Quod quilibet nosse potest ex esu vsūque Thomæi rubri vocati Sacchari, ex cognomine insulz, sub ipso fermē Equatore sitz. Antuerpiam enim & Londinum Angliz, vbi defecare solent quidam indutrij artifices, si gustes adhuc impurum & rubrum, multò suauius & dulcius reperias, quā excoctum, lixiuiāque & cortinas expertum. Et quia, qua purius reddant industria, coelant Pharmacopœorum plebem: lubitum est hic monere. In Cortinā seu ahenum, sacchari Thomæi, vel alterius quantam volunt, immittunt. Lixiuij fortis sola ex calce viua parati, iustum modum, & quod ebullitioni, despumationique sufficiturum sit, affundunt: tum agitatione, scopulisque spumas tumidas multorum albuminum onorum sensim affundunt, vicissim despumando, & rursus instillando, donec situlam plenam mellea & fordidiore pinguedine, despumando exemerint. Tunc probē lympidum & saluum factum syrupum, lixiuius nondum absumpto, transmittunt per cilicium, colam, vel stamen, quo inibi festucas, quisquiliāsque relinquunt. Tum feruet denuo, donec expirarit in vaporem lixiuium. Quod si (vt scire sit) seruens saccharum impetu, artifice inuito, labrum effusione, & ebullitione superet, non aquum: nam sic (vt illi loquuntur) decoqueretur, recrudesceret: sed butyri momentum illicò addunt, atque actutū resident vndantes spumę. Iam ē syrupo ad durtiem excoctum, saccharum in nolas, infusibulæ siglina vasa, (Venetięna) quibus subtus in angustiore loco inest foraminulū, prius fontana inibutas, Saccharo adhuc calente, opplent, eodem oburato foraminulo: recunduntque promo, cella, aut Hypocausto sicciorē, tepidiore cumque induruerit. Metę ordine dispositę latiore basim inducunt, luto ex siglina fusca aut pulla terra & aqua calida subacto dilutiore, loriam laram duorum triumue digitorum. Quę crusta vti partim loci, partim sacchari tepore sicco & bibaci; aruerit, demitur, noua apponitur: bis tēre repetit: sed singula in mutatione fusi mucronem in foraminulum immittūt, vt facilius effluat crassamentum pinguius, & sordidius, quod Syrupum vulgo vocant, Gallis *Melasse*: qua quidam improbiore pharmacarij, suos stercoreos syropos cōdunt. Postremò bis aut tertio ex Metis erutum fontana liquefaciunt: rursūque in Metas infuso, referant subtus foramen, supernęque lutum addunt, cuiusmodi diximus.

SACCHARVM CANDVM.

NOTA etiam est candoris impertiri discendi cupidis modum, quo Veneti Candum saccharum efficiunt. Primę notę, seu finissimi vocati Sacchari accipiunt vicensas tricenāsque libras, pauca aquila fontana, vt lique scat, faciunt: & nē multum in multa aqua bulliat (nam flauesceret) & quia parum aquę inest illicò in crassum syrupum abit. Tuuc arundinaceos bacillos, aut ridicas pusillas, quas prius cancellatim, decussatimque ad ollę imum, & latera aptarint, mersa saccharo syrupoue calente, & vas paulò superius, quā medio tenus opplete, multum inuolutum bombacę densa, vas cella, aut officina calefacta reponunt super asserē, semimenis aut viginti post diebus aperiunt os, & nōdum concretum syrupum prius effundunt, repente affusa calida, ad syrupi eluendam pinguedinem.

guedinem. Qua denuo & illico affusa, reponunt quouis calidiorē, aut quouis alio loco: effractōq; eodem die aut biduo vase, pellucidi candoris crystallinas bacillis aggestas habent glebas, multo durissimas, quas citius vres, quā liquefacies igni, nisi liquore addito.

CANDVM VIOLACEVM.

PVRPVRVM Violaceum æquē pellucidum, sed pulcherrimum, nec minus vtile, solis Venetis, dum illic ageremus, notum, sic paratur. Sumito, exempli gratia, sacchari finissimi *L. vi.* liquefant & bulliant quān fieri potest paucissima aqua, donec ad tabellarum eleſtuarium crassitiem deducatur. Tunc affusis vncijs 24. expressiois coactæ, cōpendiosæ, & recens eductæ ex frigida & violis contusis: aut potius violacea stillaticia (ne vires colorē deleatur) recrudeſcat, seu (vt illi loquuntur) decoquatur, vt recedat ad syrūpū superioris simplicis Candi crassitiē. Feltucis olla, & eodē loco & modo paretur elegantissimum Violaceum. Dum saccharo percocto miscetur Violarum dilutum, vel expressio purpurea, qualem diximus, addendo aliquot guttas succi Limonium, vinidiorē colore & limpidiorē diaphano placebit.

Denique vtilissimum simul arque fragrantius, curauimus parandum, additis drachmis duabus Iridis candidissimæ lacinia inuolutæ, quæ amica societate, solita est Violæ fragrantiam & gratiam, tum addere, tum excitare, nec parum sic Arteriacis commodi adferre. Sic decet nitidum Pharmacopœum parare, nec perpetuo, quasi miscellus foret seruitor, Seraphico Vercellensi radiato Apollini auscultare, qui imperat vas cōdendum & obruendū sterquilinio, vt fermentando & putrefaciendo (forte & ipse persuasus à Theophrastinis stercoreis Philosophis) suaues imbibat penitus fragrantias & vapores, stercoreoſque adſciſcat spiritus.

Multa scitæ elegantiz etiam ē saccharo conſtantur, loricantur, condiuntur, & cōcinantur dulciora & tragemata & gulæ blandimenta: quibus quia prolixiora, superſedemus, conſulto prolixitatis hostes perennes: nedum vt Triviales, prolixāq; lites huc adducamus ex Ruellio, Manardo, Fuschio & alijs, Senensis exemplo. Vt quid enim querunt tam diu & blatiunt tam multa, notum ne fuerit Antiquis saccharum? Sanè fuit, etiā Dioscoride & Galeno antiquiori Theophrasto, huiusque præceptorī Philoſopho. Ait enim Theophrastus mel arundinibus Indicis excipi: eadem ferme etiam Aristoteles. Quod poro vltieris tumultuantur & ſciſcitantur num illi vſi fuerint saccharo hodierno? ex historia in promptu reſponſum: Galenus φάρμακον, id est, inquit dicit, oriri ſciſcitet in Indicis harundinetis Mel saccharum vocatum: igitur auditione magis, quā exploratione norat. Et Paulus ſacētē cenſet inter ſales SACCHAR, SALEM INDVM sapore dulci, saccharum innuens, dentibus vt ſal fragile. Quinetiam Plinius, quā valdè rarum, nec adeo alimentofum vel familiare foret noſtro corpori, inquit ſumi quantitate nucis caſtanæ aut auellanz. Eoque primò ē Græcis Actuarijs, Medicatoſ ſuccos saccharo excepiſſe, nomēque Ioſacchari, Rhodoſacchari commentus fuiſſe putatur.

Sal Indum.

At Dioscorides paucis litem dirimet: Salis in modum concretum, & dentibus fragile saccharum, in India, & felicis Arabiæ arundinibus, quod aqua ſolutum, potui, ſtomacho vtile. Sed addit καλὺται, id est, vocatur: vtpote cuius nō valdè certus erat: quia vſum tantum nondum ars locupletarat. Vocant quippe rem minus notam propter dulcedinem Mel: quemadmodum ſal Aegineta, propter concretionem duram, lucidam, fragilem, & candorem. Rimas namque anulæ harundines, præ ſenio, aut turgidæ, agūt, excluduntque ſuccum saccharatum pauciorē, ſed ſolidum, & ſalis aſpectu, quale vulgatum arte excoctum saccharum, etiāque vt Candum. Quia verò admodum paucum & exoticum, minus erat notum, vſūque receptum: quod neūquam mirandum, cum Manna roridum, Laricidūque, Europæ multis locis familiare, illis penè fuerit prætermiſſum: quia nondum conmodum experimento auditionēque compererat.

Norbonenſis Varro & Strabo, etiamtum ex radicibus ſuccum præmi ſuauiſſimum, ex arundine arborea non nimis magna.

Strabo arundines Indicas gignere mel ſine apibus: Igitur ſi μελιτῖς seu apīs non eſt penſum, non erit mel, ſeu meliſſæ excrementum, ſed plantæ: quā ciuſue laticem, Sacchar Indi vocarunt.

Et Seneca à nobis facit: Inueniri in India Cannas, quarum humor pinguis, dulciſſue,

in

in mel abeat. Et sapor cannarum fermè omnis dulcis, radicis præsertim. Fluxiones sistit suffitu Saccharum. Et nostrate Candum, etiãque vulgatum abstergit, oculisque prodest, vti tempore Dioscoridis faciebat Spontaneum: quare idem esse nulli controuersum. Nec hodie foret ignotum illud Antiquorum: cum vniuersa pateat per Mediterraneum & Oceanum Æthiopicum Arabia & India.

MEL APVM COMMUNE.

SACCHARO nobilitate, vtilitate & origine proximum mellis nectareus liquor: quem largita videtur Phronæa populis fermè omnibus, præsertim apud quos sacchari arundo nullo nequidem mangonio, cultu viuere quit. Eadem vtriusque natura, ortus & ferme modus videtur. Verù mel calidius, acrius, æreum, magisque igneum & spirituosum: vnde tantopere prodesse senio confectis & calori languido, Democratis exemplo fertur. Nec abs re sanè, quippe vini saccharique vigorem, vitam & efficacitatem mel merito complexum esse quis dicat: M V L S A enim, vbi aquæ plurimum, mellis non multum, diuturna intestinæque mellis ebullitione, in vinum vicinæque saporem multò vtilissimè

M V L S A. abit. Et Pannonica seu Polonica Moscouitarumque potionum M E D A vocata, atque Cambricorum Anglorum M E T E G L I N, suauiora sunt, & salubriora non paucis optimis vinis. Quarum quidem vsum, quàm scimus certò profuturum Meridionalibus, tam lubenti animo illis hic impertimur: quæ sic habet.

Rec. Mellis boni Lib. 20.

Aquæ pluriæ, fluminis illius vel fontana Lib. 120.

Bulliant despumando ad Libr. 80.

Quibus semirigefactis, inditis in vas vinarij, addantur fermèti panis, vel Alz, vel Byere acidioris vnciz. vi. vel quod satis sit excitandæ ebullitioni & defæcationi. Et vna de licinia vel nodulo hæc suspendantur metganturque, nec fundum tamen tangerent aromata.

Rec.	{	Cinamomi,	}	an. drach. ij.
		Gravorum paradysi,		
		Piperis,		
		Zingiberis,		
		Garyophyllorum crescens confusorum		
		Florem sambuci Alan. i. in. dolium, merformem.		

Sinantur in cella vinaria tepente per hyemem: estate verò in sole maneant 40. dies, vsquedum adsciscat vineum saporem & exuat dulcorem ingratiorem mellis. Qui vinum colore eumentiri cupiunt, panni Tornefolis (nomen sonat heliotropium purpureum verucarium) Lib. S. addunt. Nonnulli efficacius & gratius, addita vini tertia parte, tedunt. Hæc si quis, non vt quotidiano potu, sed quasi medicato vtatur, multum commodi percipiet, tum ad febres quartanas, tum ad cachexias, & ad morbos cerebri, quibus potas vini perniciosus, vt Epilepsiz & Analepsiz: adq; noxas aquarum corrigendas, vbi hæ multas putridas febres excitare solitz sunt: eòq; Troglodytz, propter multos fructus aqueos, & putres aquas plurimo, tametsi fetuida in regione sint, vescuntur pipere.

M E T E G L I N.

CAMBRICVS etiam ille potus Metegla, non patrio (vt putant illi) sed Græco nomine dictus, vt multò salubrior parari potest, ita multò dignior qui Transmarinis innōtescat: est namque altera liquida & limpida Septentrionis THERIACA. Eadem proportionem fermè miscetur mel & aqua, addunturque despumatis herbæ siccate quamplurimæ, fermè numero sexagenæ, bulliuntque bullitissimè ad dimidias, interdum ad tertiam partem. Quò fit (vt cōtra quàm ferunt vulgata Pharmaciz documenta) diuturna coctione herbacei viroris & saporis exuat fastidium, adipiscaturque vegetiorem, & quasi tertiam quandam peculiarem alendi vim, & gratiam saporis Maluatici vini æmulam, nec minus duratione perennem. Triennij enim & quadriennij colore, crasi, & sapore maluatici vel Muscati Meteglam non raro illic bibimus. Quotidiano hæc senibus potui

potui placet, & plurimum prodest: nec adeò temulentiam vertiginosam, sed amcenior è facit. Multò aptior foret & vtilior, si Medici Docti Instituto, quilibet sibi accommodam parandam curaret.

Quibusdam naturis, etiam hepate calidioribus, mel ieiuno sumptum ventriculo, multum conferre scimus, & compertum (secus quam vulgò videatur) maiore copia & satietate ingestum crudum purum Anglicum plus prodesse, quam moderatè sumptum Hispanicum, optimum putatum. Quippe acrius Atticum, Norbonense, vel Hispanicum crudum, facilius in bilem abit, magis sanguinem adurit, & minus ventrem subducit, nec perindè recens hic habetur. Minus speciosum ac delicatum Anglum: sed quibusdà, præsertim saltibus & pascuis, vbi lana commendatior, lectum, vernum aut æstiuum, biliosa excrementa inferius extergendo pellit, & aciei oculorum prodesse putatur. Venetias & Veronam ad Theriacæ confectionem delata sæpius Græca famigeratissima, Attica & Hyblæa mella gustauimus, suluiora & puriora, sed minus candida Norbonensi aut Hispanico: quæ duo tamen celebriora apud Francos, Germanos, Belgas & Anglos, adeoque multò cariora.

TURONES NORBONENSIBVS.

Italis, Amigdalato.

ISTO Norbonenses Pharmacopœi parant placentulas niuei candoris Turones illiè vocatas, ad alendum tabidos, & expectorandum crassos pulmonū farctus, simul suaves & vtilis: vtiliores tamen futuras Anglis & alijs ad Septentrionem populis, etiàmq; PIGNOLATO dicto medicatiores. Nam Italis valdè quàm elegans & marmoreum niueum PIGNOLATVM (hodie ex puluerato finissimo saccharo, & postea albuminibus & modica rosacea, & succo Limonium subactò, & donec summum contrahat candorem, atque pelluciditatem, agitato: pineis lotis, & siccatis fursuribus & absterfis, additis, & remixtis omnibus, viuio sed pusillo, puròque in igne exiccatis, & in duritiem coctis, in morcellos digitum longos, conflat) tametsi prodest & alit, tamen minus intrò subit aut incidit & abstergit arteriæ vel viscerum mucosos farctus, quàm ex melle & amygdalis parati Turones, qui sic fiunt.

PIGNOLATVM

{ Mellis prima note & purissimi Libra sex,
Albumina enorum. sex.

In pelui tamdiu frigida pistillò ligneo agitantur, donec lacteum candorem assequantur. Tunc prunis cinere obrutis, ne vrantur aut nigrescant, sedulo versando pistillò ad suppositoriorum crassitiem iam fragilem coquuntur. Tum additè dulcium amygdalarum integrarū deglubitarum fursuribus torridis tollarum vnciæ, quantas excipere moles iam Pignolati specie potest. Calentes super Nebulis (quæ crustula sunt) extensæ ducuntur in placentulam, vnciam crassam, latiore superficie, quam acie adhuc calentes in rhombos dissepunt, Medico volente, interdum adduntur puluisculi gemmei, coralli, crystalli aut aliorum.

MANNA ARABVM TEREINABIN

Drosamelis, Acreomeli & Melisaccharum. Manhu.

Δροσμήλιν.

POSTRIDIE quàm Iopa largitus esset victum Plebi Israeliticæ, complutæque fuisset humus, & conspersa rotundo semine Coriandri simili, minuto, albo, gustu mellitæ placentæ, aut specie Bdellij: ex quo districto mola, panes factitabant sapore libi ex oleo: Gens Israelitica mirabunda, cum primum hæc cœlestia, & nusquam antea visa munera fuisset conspicata, cœpit dicere: MANN-V, id est quidnam istud? Cuius nominis vestigia remansisse apud posteros Indicat Mannæ Thuris Libani Palestinæ montis nomen: cuius similitudo cum illo Bdellio simili Mannæ nonnulla esset: vndè etiam verisimile La-

pinij

MANNA È RAMIS LARICIS.

tinis deductum nomen Manum, quod bonum interpretatur perbonus Latinicatis autor Marcus Varro. Et indidem putandū Medicatum istud Manna, quo de hic iam agemus, dictū fuisse recentioribus Græcis & Latinis. Eximium sanè Naturæ opus, ac mirabilitatis plenum: nec valde antiquis notum: indicio est quòd paucis & vacillantibus verbis illius meminertint, nec quantæ esset ad purgandum salubritatis monuerint. Theophrastus siquidè ex Hesiodo & Aristotele succum mellitum ex æthere quercub' siue Robori illapsū putat, quale Galenus prouètu portentoso è Libani arboribus excusis memorat: & Celsus SYRIACVM MEL

Lib. 5. Historiæ animal:

MEL Cedraum. Hippo. Succus Mellinis Theophr. Syriacum Mel Celsi.



vocat: qui omnes persuasi fuisse videntur (præterquam experientissimus senex Hippocrates, qui non aëreum sed CEDRINVM MEL vocat) nihil aliud esse Manna istud, quàm roridū ex humo in æthera subuectum interdiu, vi & calore Siderum, vapidū spiritum, qui reduce nocte occurrans frigori liquor refluus & quasi stillatitius factus, arbores, tellurēque rursū, horis antelucanis præsertim irroret. Quam opinionem, vt improbare nolumus: ita etiam sequi, nescio quo modo, renuit animus. Quæ nam tenuitatis tantæ, partim aqueæ, partim aëreæ, cuiusmodi ros esse videtur, destillatitia, illico vel imbecillis Auroræ radijs diffari in auras solita, possit in grumos masticheos, gummosos, farinaceos, emplasticos, solidos & densos abire? Quin Manna etiam calidiuscula est, grauis ac pinguis, & soluta non adeò facilis. Imò soluta, liquori calido non vti mel, aut saccharum, mixta, perstat, sed plurius quasi aqueū respuens liquorē resine gummi, & Caphuræ scætitig modo rursū coit, & collecta vasis lateribus hæret. At imbrium cœlestium proles nix, grādo, pruina, gelu, ros, omnia frigida, neutiquam pinguis, sed facillimè vel calore, vel humore soluuntur, nec quicquam pinguis vestigij relinquunt. Quare suspicio magna est Manna non aëreum rorem, qui refrigerando, temperandōque diurnum æstum natura comparatus fuit: sed succum vaporēque viuificum cuiuslibet tum arbori, tum herbæ instum iam per soles tēpestiuos & genitabiles maturitatem assequutum, qui extillans expirānsque interdiu trans latentes corticis superficieiq; meatus, in auras à sole seruido dissipatur: noctu verò ros consuetus illabens sese cum isto permiscet, atque ne dissipetur, partim obstat, partim seipsum vna fermentat, inque amicam naturam vnā coeunt, ac demum quippiam conflant

stant mediz inter mel & Saccharum naturæ. Quod quispiam MELIBACCHA-
 xvm vocare possit. Istud nostrum paradoxum confirmat eorum diligentia Pharma-
 copærum, qui ramos magnos præcisissos Laricis & Fraxini, inque vinariani cellam, quo
 æstatis tempore Manna colligi solitum est, asportatos, Manna postero die, tametsi non
 perinde nitidum, conspectum sibi affirmabant. Quod etiam minùs mirum videatur
 illis, qui sciunt RORI COMMUNI deciduo purgatorium vim inesse, non a se,
 sed foliis herbarum, quæ abluuntur & absterguntur ab illo. Sic Brasicæ foliis & Ro-
 sarum rorem exceptum detergente, nitroso & laxante succo magis lubricare certù. Ea-
 propter consulto huic infundunt Rosas nonnulli ad syrupum Rosarum ex infusioni-
 bus. Quare cum quilibet obseruare possit post ramos & truncos auulsosque surcu-
 los, vel etiam radices Laricis, Pinæ, Iuniperi, & aliarum gummosarum aut tedise-
 rarum arborum gummi, Lacrymas & micas etiamnum in superficie congeri atque con-
 crescere, quas idè propter similitudinem Manna Thuris Græci, Rustici autem
 Norbonensis Metaphorice in Iunipero & Teda glaciem, Galli Vernicem vocant,
 poterit secum pendere idem Larici, Ornoglosio, Amygdalæ, Prunis ac aliis
 quamplurimis viâ venire posse. Quin quod de æleomelite Norbonensi diximus in
 Olea Æthyopica magis fulciatur hæc persuasio, alioqui & rara obseruatio est, neque à
 quoquam recentiorum literis prodita, quin potiùs à nonnullis quasi fabula foret ex-
 cepta, nec ipsimet assentiri recensionis ausi essemus, nisi oculis manibusque id comperis-
 simus in Prouincia Norbonensi maritima, non procul Monspellio vrbe tam lauta quàm
 nobili.

E LÆOMELI.

EX olea arbore vulgari perquam amara tota & ingrata, cortice, caudice, fructu
 nondum sale condito, emanare MANNA verè melleum, non solum colore, sapore,
 sed etiam duratione incorruptum experti sumus. Habemus namq; partim iam duodecim
 ab hinc annis collectum à Rondelletio præceptore aliquot vncias, partim à nobis quin-
 que ab hinc annis, cum eo nos duxisset Stephanus Barrallius Monspellensis Dioscori-
 des vocatus, atque in tenellis ramis & stipitibus Olearum arborum tam insolitas diui-
 tias affatim nos latere monuisset. Tunc enim rimosis è corticibus, partim scalpello fau-
 ciatis, satis excepinus non modò ad explorandum, sed etiam amicis impartendum. Ver-
 um non nisi propemodum pene matura oliua ac nigricante vel purpurascente, quam
 Nouembri & ingruente Hyemis sæuitia decerpunt, quisquam reperiet mel istud: vt nos
 plebecula monebat, quæ interdum tantam copiam ramis aggestam se vidisse vna aut
 altera die ante vel post D. Catherinæ festum aiebat, vt auiditati explèdè pueri & mendici
 eò certatim confluerent. In proximis vinetis pone fanum fune cinctorum Franciscano-
 rum, viâ ad Latrensem portam, etiam nonnihil emanabat, & plurimum ferebatur
 Lunellæ extillare, præsertim scætis maioribus truncis, è quibus initio melle liquidior
 latex glutinosus effluebat, postea inibi residens aliquamdiu frigore densior euadebat,
 atque non tam mel quàm Manna verum præ se ferebat specie, gustu, sapore, concre-
 tione omnium comilitonum iudicio qui degustarant, inter quos Iacobus Vtenhouius
 Gandauensis generosus, & multarum literarum Medicus doctissimus. Quin iam dum
 hæc proderemus, cum multi alij degustarunt & mirati sunt, tum Medici singulari erudi-
 tionis, vniuersæque materiæ medicæ consultissimi D. Parisiensis Drouetus, & D. Peni-
 us Anglus.

An cum Arabes excubunt fortè de Galenico Manna rorido, quo còpluerat arbores Li-
 bani atq; lapides Iuppiter, hallucinantur nominis & naturæ affinitate, interpretati nemp-
 pe quæ Græci antiqui de latice illo mellito suauique rore antelucano, qui instar sudoris
 expirantis, partim è puro sudòque aëris ambientis madore, patimque ex potiore ge-
 nita biliq; cuiusq; arboris & herbæ salina gutticellas lymphidas & prædulces in arborù fo-
 lijs & herbarum constituit: vnde mellis apum ortum & naturam faciliè quis asse-
 quetur? Sanè sic videtur, nec enim manna illud fordidi, gûmosum, granatum, quisquilijs
 C.i.

arborum mixtū, in ramis lapidibūsq; diu delitescens, non Sole Canicula seruido, aut imbeibus ita facile liquefcere solitū cuiusmodi māna intelligunt Arabes, idē cū rore ethereo. Eapropter Grecorum Stillatiā aērē mue rorem mellitum illum tenuem, nequitiam Manna Iudæum Arabicūque putamus, sed grana ista Maltichina pellucida, solita ē ramis folijsque arborum elabi prae copia, rotunditate & lubricitate granorum, succussatione & ventorum impetu, qui montes crebrius persilant, sicque colligi in montosis syluosis humi, & ideo putasse quoddam instar grandinis ē Caelo manasse. Istud nosstrate porrō nos quasi vtriusque naturae cinnū & particeps plurima arborum genitabili salina suauī & madore, qui cuiuslibet inest pro sua natura plantae varius, conflatum putamus. Cui dū occurrit noctis periodus anteculana frigidiuscula, quemadmodum tunc coactio in Aethere vel aēre vapore aqueum facit ROREM vocatum, sic in arboris superficie cogendo & ad densando expirantem per latentes poros mellitam exhalationem, sistit inibi manna. Quae eadem causa efficit; vt ficus suos fructus noctu maturare verē dicatur, non propter quem apud Plutarchum Graculi Lunae afferēbant calorem *παραλήγ*, quippe illi noctu silente aequē benē maturitatem assequuntur, Sed quia ficum leuis cortex, laxae cum sit texturae, vt tota arbor, facile Solis radios admittit, qui spiritum caloremque insitum lacteo liquori dissipant interdiu, vnde concoctioni officitur: at noctu hic non diffatur, eoque maturitati impenditur totus, quam celerius & perfectius absoluit, nisi propter laxitatem arboris & lactei succi vbertatem nimia obruatur, vt in ficu Aegyptia euenit, quae ideo non nisi vulneribus saucia maturat quia plus iusto obruebat lac alimentūque quod per vulnus effluxit.

ROS.

MANNA
quomodo fiat.FICUM, manna-
ratio.MANNA
Israelitarum
quale.

Nec dispar modus opūsque mellificij: vt enim efficit ex rore aut cum rore & succo benigno arboris, natia insitāque vis Manna, sic ex vtroque ē floribus decerpto, suo calore & spiritu conficit apicula sedula, etiamque alia volucellae insectae, carpto in truncis arborum humore, quem percoquant in mel album saccharo simile, siue Stercus suauissimum, quod etiam Hispanus à Vega magni nominis Medicus sibi visum narrat. Non enim rore solo caduco, sed suauī, odoratoque vapore, & plantae tenuissimo succo, quem suis sibi intestinis fouet apis, conficit mel. Nam qui possit ros Stillatici siue imber aut vapor in Ceram, Propolidem, facēsque quot continent faui abire? Quin mel grauius multo oleo, vino, aqua, lacte, sanguine, quorum zmulatur aut superat dulcedinem. Quin amarum mel, improbum, venenatum, ex Absinthio, Erica, Oleandro & alijs. Cur non potius ē folijs Iuglandis, aut quercus hauriat apicula, vbi plus nebaraei & dukis roris, quā ē florum aridis calyculis? Nisi quia vbi optimus est aer, inibi optimum mel, modō Stirpes sint natura aptae mellificio, sugantque ē solo probum alimentum. Sed haec latius in Larice & Fraxino.

Hebræum Germanicū notū, & Rabbinam admodum callentem Philosophiæ habuimus, qui Manna istud purum & Maltichinū vocatum affirmabat esse idem cum suo Israelitico, Bdellii specie, Coriandri granis simile, mellco sapore, quale etiamnum est in Palestina, Syria & Arabia. Porro, nobis obiectantibus illius supercelestes vires, portenta, & putredinem: Respondebat Iouam cunctipotentem pro eo ac ferebat sua voluntas, vsum & fructuonem Mannae illis largitum fuisse, qualem, quantum & quamdiu illi visum fuit: tēque ab se condita vtī solitum ad suam ostendendam siue gloriam, siue munificentiā, prae ter & super naturae leges ratas. Sic quoque MARRACH perquam amarum & salsum edulcuit iniecto ligno: & Arabicus sinus quasi medius scētus, vadum fecit proli Iouae, hostes vero obruit: Solis orbita cursum inhibuit & aequor montibus innatauit.

MARACH

Brianfennensis

Maltichina igitur vel Granata vocata, quae hodie ex orientis Emporijs Venetijs & Genuae prostat, optima. Nec tamen spernenda Brianfennensis ad Galloprovinciae & Allobrogum alpes provenire solita, qua vniuersa ferme vtitur Gallia, modō delectus nitidioris, purioris, candidioris, & recentioris grani habeatur, qualem illic nos effraētis ē Iarice surculis copiosam habuimus, quae nec dosi, gustu & effectu purgandi nihil planē cedere illi exoticae videtur, & multo minoris emittit, minorēque mangonij suspicione: blan-

blandè namque educit biliosa è primis venis & Iecore, èque pulmonibus pituitosa, veluti Lariceus liquor, Terebinthina Veneta vocata. Hac igitur, si illius Syriacè purè copia desit, aut CALABRIENSIS, vtendù ab vncia 1. S. ad vncias 3. Calabriensem tamè hodie perpaucam, aut nullam inueniri, quidam institores qui illinc veniebant, planèque desuisse conquirebantur.

ARVND VALLATORIA.

OMNIVM Vallatoria notissima, vbiuis Regionum vdis humentibus marginum vallis lacunis & scrobibus aruorum, aggerum & mœniorù tesquis, & attegiis, rusticisque tectis multum accommoda: sic & sepiendis turandisque satis. Multi è radice graminea, geniculata, prolixiùs reptante, marini graminis graciliores exeunt culmi recti, ex pallore pulli, concaui: alterno pullulatu folia emittèe graminea, milia- ceis longiora, scabriora, firmiora: spicas fert Milii modo sparsas, lanosa, mollique cesarie nutantes & purpurascèntes, maiores & elegantiores, cassidum plumas imitantes, quæ ventis hybernis abripiuntur, nullo comparente seminum vestigio, radice namque etiam combusta & eruta, seipsam denuò instaurat. Equidem quam noua depacta, albida, dulcis proluxa, & vt diximus graminea: quare scita consequutione graminis & triticeis subduntur hic arundinacea.

Δύξ DONAX SATIVA NOSTRAS.

NO parum frequens hæc hortis & Satis Galloprovinciæ & Norbônæ, vbi colos adnendum & clatras fenestris Rustici mulierculis fascitant, ssectuntque ad fornices topiarias, aliæque viretorum ornamenta, adque fulciendas vites humi depangunt. Similes istius sunt tubi illius Vallatoriæ, sed proceritas & crassities magnam æquat hastam: densissimis geniculis, è quorù acetabulis vel cauernulis basis latioris prodit neruus medio tenus ambiens calami ferme spatium, intergenicula. Acori vel Schenæ radix proluxa, tuberosa geniculis multis, latè huc & illuc subtus humum porrecta, albida foris intusque dulcis gustanti. Ex qua vsta Arabum Spodium paratur Pharmacopœis quamplurimis, tametsi vt non necessariò, ita non magno commodo: quando melius nec difficilius ex Myrtho aut Cithonio arbore, oleæ (vti monuerat in Antispodio Dioscorides) conficerent. Longè tamen grauius delinquant qui loco Palmæ foliorum teneriorum harundinis huiusce subdunt radices: namque harum facultas ex alto cum vel spicula euellere prodatur, calida etiam authore Dioscoride sit, planè Palma contraria sit huic oportet, cuius ad frenandâ cohibendâque Chalcytidis vehementiam addita folia videntur. Verum isti audaculi, quid intersit foliane harundinis, quæ fortè quadrarent, an radices addas, quæ prorsum aduersantur scopo, supino fastu malunt nescire quàm discere.

Spodium An-
tispodium.

FISTVLA vel SYRINGA, & SCRIPTORIA.

EADÈM cum Donacè harundine hæc est, vt cernere est in Galloprovinciæ & Corsicæ vdis & pinguibus prope vrbes locis, compactiore est carne, minore & polliceni vel indicem digitum æquante crassitie, octonum denumque pedum, radices & folia non disparia, Pueris etiam quæsitì calami ad maiuscula characterum crura delinianda: & hæc vti superiores dux, caua.

NASTOS seu FARCTA, TOXICA Theophr.

RARIOR hæc Europæis, nota tamen iam diu harundo mediterranci & Tyrtheni maris mercatibus: vbi interdum à naucleris emunt senes, robustiores & adultiores Stolones, quibus scipionibus siue labantis vestigiù fulcris vtuntur: leues nanq; sunt elegantes & robustæ. Exiliores Stolones verò Scythæ Asiatici & Syrii aptant ad iacula: quos emptos à quodâ Picæuo circulatore Alexandro vocato habemus exiles, leues, politos enodes prorsum, rectos, solidos, nec graues, colore cæsius pullo & purpurascènte nitentes. Ionbertus Monspellensis habuit, ni fallit memoria, perquam solidam & elegantem, pu- to ex Aphricæ Argvra, non Alepo.

TAMETSI fœminam hanc nuncuparit Dioscorides, tamen putamus nos à nostratibus vulgatis, non nisi textura delicatiore carniue solidiore distare, proindeque tubulam magis esse sonorum læuiorem & nitidiorem, cuius delectus penes aulcos & tibicines esto.

INDICA FLORIDA.

EXOTICÆ elegantiz pulcherrima planta hæc, ambigua inter Cannas & Acorum naturæ & figuræ. Ea ex semine Indiæ Occiduz amicis in Belgio, deinde nobis Monspellij in horto latos flores, Augusto ineunte, dedit: colos purpuræ miniatæ nitidos & vegetus: figura & magnitudo, numerus & habitus florum Gladioli, in ferulaceo vel harundinaceo bicubitali & tricubitali caule, læuore herbaceo, crassitie digiti minimi, quem circa geniculos ambiunt folia alternò & Acori vel Cannæ, situ & ritu, magnitudine & effigie hellibori albi aduultioris. Radices Cannæ nostratis siue Donacis vel acori palustris æquant, è quibus prima foliorum eruptio pereleganti volumine Hellebori albi erumpentis simulacrum ostentat. Rarissima in Italia & Gallia & Anglia etiàmque Belgio vbi tametsi quotannis nouo ex India aut Lusitania semine ab elegantiz amassus fata, tamen nec seniper floret, nec frigus ferre potis est. Idcirco commodi medici adhuc ignoti: sed cui locus hic merito relictus, quo ad Acorum, plantæque consimilis vultus viam institutam pergeremus.

ACORVS.

Acorus Diofcor.

Acorus palustris.

Acorus Aquitanicus.

Galanga } Maior.
 } Minor.

Fris Domestica Florentina.

Fris Illyrica.

Fris Syluestris.

Fris maritima Norbonensis an. Medium Diofco.

Perpusilla saxatilis Fris Norbonensis acaulis ferme.

Xyris.

Zingiber.

Terra Merita, Curcuma Officinarum.

Costus	{	Arabicus candidus leuis	} Zingiberis effigie.
		Syriacus buxemi grauis	
		Indicus leuis niger.	
		E Moluca cortice rugoso.	
	E Moluca lignosus.		
	{	Officinarum duplex	{ Dulcis Amarus
		Matb: spuritus suo loco.	

Zedoaria } herbe.

Zurumbet

Zedoaria Thora in. Napellis.

Zurumbet arbor in consuetudine.

Arnabo Pauli.

Mamiras Paul, In Drenicis.



Conditur etiam & prostat in Officinis alia radix Mechinum hodie dicta Zingiberi cognata, à quo nec maturitate, aut improbitate differt, vt parum verè fcripserunt, sed potius specie & concretionē (caret quippe fibris & filamentis) perspicuitate, fuscedine, soliditate, & acriore gustu, nec tereidine exedij solita.

Mechini rari varietas.

Nec vnquam nobis visa antea hæc quam iconē exhibemus Mechini species, nuper adferri coepit, cuius Morganus noster aliquot emit libras. Vulgarū Zingiberem aut Mechinum refert,



sed elegantiore aspectu, colore Mechini, cortice Zingiberis albi, sed squamatum geniculato, & serè articulado veluti Doronicum: aspectu pellucido: gustu quàm Zingiberis multò acriore, & sicciore, carne nō exesa.



VNCVPARVNT itaque sic plantam hanc quia τοῦς ἀλέγους Effig. scitè Ma-
thiol. 21. .

Zingiberis radices faciunt. Nam ΑΛΕΓΟΣ illa Theoph: Veneris mi-
nistice incentiuu longè alia est. Acorum verò verum esse istam ra-
dicein odoram & geniculatā, & longè ab vtraque Galanga dissi-
dere, etiam caulæ officinarum sciunt, nedum viri eruditi, quo-
rum factū opera, vt non solum innotuerit, sed etiā adeo vsu re-
cepta sit, vt pudor sit denuò illos rationum acervos euoluere.

Acori veri, Ga-
lange vtriusque,
& Calami aro-
matici discrimē.

Nec hodie Itali, Galli, Germani consultiissimi rei herbarie, alio
vtuntur quàm isto è Transyluania Moscouiticisq; tractibus Venetias, Antuerpiam, aliaq;
celebriora Emporia asportato: vbi nō rarò etiamnum folijs integris visitur Iridis emulis,
cuiusmodi à Dioscoride descriptus fuit. Eapropter minimè multis opus fuit verbis ad dis-
cernendū à Calamo aromatico has easdem radices, quas etiam perperā Calamum officina-
re statuere: non enim modò odore ceterisque facultatibus, sed etiam natura & effigie
tota dissident. Nec enim Acoro Arundinis, sed Iridis caulis inest, gracilior & longior ta-
men: at Calamus non modò caui tubi harundinaceo caule donatur, sed assulatum fran-
gitur. Porro cum hanc radicem ignotam tum Calamo suffecissent (vt fir meliorum penuria
& ignorance) demum proregem quasi Regem agnouerunt & tutati sunt. Quam
pertinaciam etiamnum fouent plerique Salgamarij, potiùs quàm Pharmacopœi excitate
impudenti, sed non tanta infelicitate. Quippe æquè bene explet ista radix interdum de-
scriptionis pollicitationes atque genuinus Calamus: intenso namque est odore, & pra-
sentissimis ad muliebres morbos viribus.

ACORVS NOSRAS TALVSRIIS

Germa. Selb wasser Zelen, id est Lilium aquaticum.
buenum.

Mathiol. 22.

VULGARIS nostratis haud aspernendæ aut vires vel vsus vt quidam minus verè tra-
dunt, qui primore lingua, non intimo gutture hanc explorarūt, cui aliquid acrimonię
gustando semper inurit, non quidem illico prima impressione, sed aliquanta cunctatione..
Idem experiaris in Phyllo Mòspelliensi aliisq; plantis, quarum vis calefaciens multa ter-
rea mole est sopita. Nam tamen illi odor fermè nullus, calor remissus, tamen alijs doti-
bus multos ad morbos peregrino præferenda: plus namque roboris & caloris addit ven-
triculo, partibusq; finitimis, quàm illa quæ suo feruore dissipat potius innatum calorem
atque vires infitas populatur. Qui igitur illi nonnihil gratiæ conciliat, Garyophyllis non
secus ac Iuglandes, traiciunt, at neutiquam cōtemnendum experiuntur.

Propior Aco-
aut Galanga
quam Iridi,
propter radi-
cis vim astri-
gentem.

ACORVS AQTITANICVS.

PLVS CVLTIS abhinc annis eruta fuit quædam Acori species in agro Tholosano, quam
Pharmacopœi pro Schina & venditare & venūdare auli fuere: quia facie esset haud ita
dissimili, sapore ferme nullo, cōque Apio affini. Radice crassiore, densiore quàm Schinæ
aut Galangæ, concolore, prædura, frageti contumace, lignosiore quàm Schine, prælonga,
tuberosis geniculis cincta: Harundinacea effigie Antuerpiam, Londinūque delata
Chynani emētica, propter quandā similitudinē, quæ multos Medicos in stultam letitiam
coniecit, ratos se in Gallia Schinam inuenisse, ad luis Veneræ apparatus. Sed Acorū non
Schinam gustus & euentus patefecit: astrictiōnis namque plurimum habet, tota est crassè,
inertisque facultatis, nihil leuitatis emplasticæ, vt Schina. Morbo Neapolitano curando
ineptissimam norunt, qui frustra sæpius experti sunt: tamen ad vlcera mala & strumas,
non desint illi suæ dotes.

Illas autem radices prægrandes, turbinatas, Americi orbis Schinam superioribus annis
ementitas, in caput de apio seruamus.

NIS: Gallatium Acorum, qui ceteris authore Dioscoride anteit, deprauarit in Galangæ sine Galangæ flexum Arabica scola, vt quæ speciem Acori Galangam fortè putarit, ignorari hanc fuisse antiquis Græcis necessum fateamur. Cum autem è proximo sermone authorumque descriptione Acorum nostrum esse Antiquorum genuinū liquet, tum diuersum esse ab vtrauis Galanga maiori & minuta Officinis dicta, vtriusque radices perpendēti perspicuū illico fit. Acorus namque albida, odora & amaricans etiam monente Galeno, effractūque facilis, eoque vt colore, sic concretionē similior Iridis, quam vtrauis Galanga: quia ex fusco intus forisq̃ rufescit, nec tundendo facillè cedit, acriore quidem sapore & aromatico sed minimè amaro, magis astringente, minusque proinde vires vicarias Iridis ad muliebres affectus exerente, qualem optant Dioscorides, Galenus & ceteri classici. Quibus an notæ fuerint vtriusuis Galangæ radices, vt incertum, ita nobis persuasum est iamdiu Acoro aut Iridi congenerem esse, nempe Acori palustris vulgaris radices habere, folia autem Iridis aut Xyridis nigricantia angustiora tamen. Alebant hanc, non multis ab hinc annis, horti Patauni & Veneti, vbi plurimum nobis visum virentem meminimus. Nec multo post à fidelissimis & peritissimis herbarijs accepimus hanc eandem è Syriæ montibus euulsam, vbi vulgo Iris putatur & nominatur, propter arctam foliorum potiùs similitudinem, quàm radices colorem, odorem, aut efficaciam: astringendo namque roborat, vt Acorus palustris, nec tenuitate partium quanta est in Iride & Zingibere est, sine astrictione pollet, præsertim maior Galanga, quam hic intelligimus.

GALANGA MINOR.

ALIOQVI minutam siue minorem, quam vocant Officinæ, an sit Cypeti species potius quàm Galangæ aut Acori difficile sit statuere. Nam tametsi radices aspectu, duritie, odore, sapore & nonnihil figura Cyperum longum præferant (quo quidem institorum fraude adulteratur, & permutatur) tamen folia si sunt Myrtbi (vt quidam Indicorum simplicium exploratores affirmant) non parum ab vtroque illorum etiàmque maiore Galanga dissidebit, quam alioqui viribus, odore, sapore, colore & nomine proximè æquabat, ac fortè superabat. Hanc tamen, vt & Zedoariam, Chinarum Emporia in reliquam Asiæ Indiam, Europamque occidentem mittunt: maiorem verò Iaua trans Æquatore m ditissima Insula Liburnicis in Septentrionem reductis venundat: vnde verisimile fit, aut diuersas putatas fuisse Arabibus, aut nō admodū notas Auicennæ & Serapioni, vtpote Græcos sequutis, ac propterea eos (vt solent de rebus peregrinis, parūque notis) caput duplex de ea instituisse: interdum duo admodum diuersa simplicia in vnum caput nūcuisse, veluti vbi Cancamum historiz de Manna intexuit, geminato errore, & quia Cancamum è cælo desuere, & quod in Sorbum excipi dixer, quæ de Manna, non Cancamo, ramis fraxini vel Ornoglossi, non fortè excepta intelligenda videntur.

IRIS DOMESTICA, FLORENÆ

rentina, Illyrica.

PRISCA gens horum florum conspicatæ amœnam varietatem coloriam & variegatam cœlestis Iridis æmulam, quæ opacæ luridæ nubis obice, Soli obuerso luminis repercussu occurssu æthera pingit, plantam Iridem vocauit: sic & Latini, Græca nimirum origine quibus ἰρις etiàmque ἰρις, οὐρανία & θαυμαρὴς dicitur, id est, sacra cœlestis atque admirabilis, qualem arcum fœderis post diluuium à IENOVAS sancti narrat diuina pagina. Hodie hanc tametsi admodum frequentem, tamen cunctæ ferme gentes deprauatè vocitant, Germani enim *Silgen*, *Schwetzel* Flandri, Ita-

li, Hispani Lilium, Galli etiam *Gleyoul*, propter arctam florum ipsorum inter se cum Lilio & Gladiolo similitudinem. Quod idem vsu venisse Poëti & imposuisse Historicis in Hyacinthis & Liliis dicitur, de quorum tamen collatione facile noscitur Iris, & ab ipsdem discernitur, folijs acutioribus, rigidioribus & latoribus quam Acori, aur Gladioli. Florum autem oræ diductiores hianresque magis, magisque reflexa foliola, senu vt plurimum, quæ alternatim in ansulæ speciem curuantur, introque flexa flaminum fibrillas condunt aliquot, quibus marcidis, æstate media ferè, siliqua Xyridis aut Acori palustris non dispari, anguloso item semine erui, sed minore, se prodit. Radice viuada, plantæ quippe semper virentis, plena, solida, albida, multas in propaggines per summum cespitem fusa: amaro, vehementi, aciori & feruidiore, dum recens est, gustu, vt & purgandi vi, quam arida facta prorsum amittit, multumque feruoris ingraticule saporis remittit, & odoratio, eoque commendatio euadit, præsertim *Tvscæ*, siue *Florentina*, hodie primam laudem merita. Quæ plurima in Mediterraneis, non procul Florentinis montibus eruitur, multum temperie agri & ætheris ad Illyricos tractus accedentibus, adeoque præstantior *ILLYRICA* HABETVR: nam hæc non-nihil rufescit, minùsque nitida, cuiusmodi vtuntur Veneti. Florentina verò candidior & elegantiore aspectu, suauiorque odore visitur. Neutra tamen illic flaccida, rugosa, rancida, fuscaue aut mulsida insolatu fit, vt nostras, præsertim Septentrionalis, cuius succum Hydropicis propinant Medicelli lectione practicozum freti quidam: incertum maiore ne cruciati an incommodo ægros vexent. Ac tamen si Galenus Illyricæ palmam statuerit, tamen cum idem sanxerit: vnde quodlibet simplex, in suo genere quo est fragrantius, eo præstantius esse, de eius sententia Florentinæ postponet quis Illyricam, à cuius bonitate tantum abesse Africæ, quantum animal vegetum à suo cadauere idem dixit: capropter videtur hæc Natalitiis gaudere neque admodum feruidis vt Aphricæ, neque ita frigidis vt Septentrionum: sed montosis temperatis & riguis, cuiusmodi ex Hispania hodie valde odoratam laudatissimam ferunt, & ad fluminum crepidines canit Nicander Naronianam Illyricæ non maritimæ, sed Septentrionalioris & riguz à flumine Macedoniæ, sic vocato.

IRIS Florentina.

ILLYRICA

Multiplicem igitur sortitur varietatem, non modò viribus, vt diximus, sed etiam magnitudine, odore & potissimum florum colore. Cuius multiplicis venusta mistura, non modò in diuersis plantis, sed etiam in vnius dumtaxat floribus spectanda venit. Elegantissæquidem hortensis amantes non modo purpuream (quæ vbiuis ferè Europæ ruri oritur, omniumque frequentissima visitur) sed etiam quassdam floribus candidis, liliaceis alunt, non item luteam, vt quidam doctus putat, ratus vulgarem aureis floribus vbiq; in pratis Acorum esse Iridem, cuius radices, vt idem Doctus Belga ait, rãt-opere astringunt, & planè Iridis facultatibus aduersantur, vt neutiquam futilis author literis mandat, hæc vel dumtaxat appensas appressasque corpori quemlibet sanguinis fluxum sistere: quare maluimus nos Acoro aut potius Galangis, quibus figura & viribus cognatio, reddere.

VARIETAS

IRIS SYLVESRIS.

IN O D O R A dux irides, quas Syluestres vocant recentiores, minùs obuiz sunt, minùsque multò aromatica dote commendabiles. Hortensi ferè eadem, nisi quia rota fragilior, harum quæ plurimum squallidis saxorum marginibus sponte oritur, cultaque retinet speciem quæ distat à satiuæ, etiam sapore ingrato, odore nullo in subalpinis Lygurarum & Taurinensium passim occurrit, nec vlla potest esse earum, quas commendat Plinius seu Illyrica, seu alia.

IRIS MARITIMA NORBONENSIS

an Medium Diofcori.

NE V T T Q V A M triualis venustatis est hæc altera quam verbis & typis hæc appictam damus, primum in Nitiobrigum maritimis & sabuletis herbis nobis lecta, diuque D. Assatio MonsPELLIENSIS medium putata, riguis herbis cis lacu non procul

C. iiii.

ab

ab oppido Frôtignana ex aduerso montis Ceti multa, nec
visquam alibi vniuersæ Galliz aut Italiz facilis repertu, nisi
maritimiis illic: quare num in Germania etiam reperia-
tur aut Heluetia, fides penes recētiore est, quibus ma-
lo assentiri, quàm tantilla de re rixari, tametsi radicis e-
rutæ recēnsque effractæ nullum vnquam olfecerimus
Armeniæ mali odorem, qualem illi inesse ait Commen-
tator. Radix, caulis, folium, siliqua & semen, Iridis
illi, sed minora, minùsque aromatica, saltem quibus
locis natalitiis nobis obseruata est, nempe vt plurimum
humidis & incultis. Flores tamen Calendis Iunijs aptius
Xyridem colore & figura foliolisque minùs repandis ex-
primunt. Sapor illi feruidus, amarus, tenuitas multa,
quam etiam medicis experimentis compertam habe-
mus.



PERPVSSILLA SAXATILIS IRIS
acaulis ferue.

MINIMA & rarissima omniū etiam Norbonensis
hæc: radicis plexu, substātia dēfa & colore Illyricæ
non absimilis, caule vero nullo, præsertim natalitiis, so-
lio latiusculo, rigido, mucronato, palmum alto, cuius-
modi Gladioli: flore, semine siliqua, Xyridis fētidæ. Hæc
mox quam è terra affurgit Chameleontis albi modo pu-
silla humilisque remanet, proindeque nonnullis Clia-
meiris nuncupanda videtur. Plurima oritur in agro
Norbonensi, locis aridis & saxosis, secus specum illam
sesequimiliare Monspellio disitam, via qua Frontigna-
nam itur, in cuius cautibus & rupium commissuris fre-
quens adolefcit prope Ferulam.



XYRIS sive IRIS ægyptiæ THEOPH.

Math. fig. 991

SPATVLA
Fetida.

ETIAMQUE Xyridem ob folij similitudinem quasi rasorium cultrum aut nouaculam
dixere appositè præci: est quippe folium ancipiti nouaculæ similis, acutiore acie, &
tenuiore rigidioreque quàm Gladiolus & Iris mucrone. SPATVLA FETIDA VVL-
GO dicta, quam seniores isti notarum exactiores, cum improbant, indicant se nec mul-
tas plantas vernaculis natalibus eruisse, neque virium periculum multum fecisse. Dum e-
nim nescio quid coloris & magnitudinis desiderant in radice & flore, non meminerunt
vtrāvis harum, vt pleræque alias, facile non nihil non ita magna de causa mutari. Etenim
si Iridis radices & flores colore, magnitudine, densitate, bonitate & odore adeo vari-
ant, vt cum Florentina si nostram componas, longè aliam colore & odore putes, quid ni
possit tantilla mutatio Xyridi contingere, quæ etiamnum omnibus vulgò vocatur Iris:
quemadmodum olim Theophrasto ægyptiæ Iris dicta fuit? Quin Illyricæ & Sclauonicæ ra-
dix subruissa, nostrati pulla & cineritia: Hetruscæ autem candida, eximia fragrantia, no-
stras vero ingrata ferme fatet: & vbi αλατύρεα folia & cacumine acutiora dicit Dio-
corides, innuit medium folij latius, aut ventriosius, summum verò multo angustiore
mucrone, cuiusmodi prorsum Spatulæ nascentis spontè quibusdam præsertim Gallopro-
uinciz & Angliz, vbi quàm vberima, prope vda prata & littoreos maris aggeres inspi-
cere licet. Eamque si conseras ruri enatæ Iridi in parietinis & siccis glareosis, angustiore
obseruabis folio: & caules etiam cubito maiores, plures, glabri, teretes, crassitie me-
diocri per media folia recti affurgunt: florēsque in summo promunt Iridis Syluestris, ter-
nis foliolis surrectis, nec reflexis, purpura saturiore Violæ Martiz, & in medio venis non-
nullis luteis, & phœnicis apparentibus Iunio & Augusto in Anglia. Siliquis, item Iridis
trique.

triquetris, trinâque carina defiscentibus: quando maturuit senien, quod rubrum, nitidum, rotundum, gemina secundum longitudinem serie, conditur in filiquarum membranis loculis, aut præsepis, uti in Præonia, Orobi, ut quidam ex Oribasio legunt, aut fabæ, non vulgaris nostratis, sed antiquæ & Dioscoridæ, quæ multo minor, & nostrate rotundior fuisse probatur à doctis. Radix (facilis enim & frequens mutatiuncula *μαρξή* in *μαρξή*) parua, geniculata, fibris multis donata & Iridi concolor, similis aut fusca. Ea vi & acrimonia prædita, tametsi Cotulam aut cimices oleat, ut multorum nostræ ætatis Medicorum monumētis & experimentis constet ea præstare, quæ Dioscorides Xyridi reddidit. Quin non modò Iridi similis facie, sed & viribus anteit, tum ad vlcera, olisque desquamanda, tum intro sumpta decocto aut succo, vehementius lotium ciet, & sudores, sed pharîngem adurit fermè. Si multa decocto bibatur, vomitum excitat, & tormina ventris, uti Iris facit. Gustauimus acre, & quod in Angliæ maritimis ad Brumam ferme vsque in siliquis pendulis hiantibus visitur.

ΖΙγγίβρι ΖΙΝΓΙΒΕΡ.

{ Gall.	Zingembre.
{ Ital.	Gengeno.
{ Ger.	Jugber.
{ Flan.	Sengber.
{ Ang.	Senger.
{ Hisp.	Gengiure.

EST etiam Zingiber, aut Gingiber ut in

Plinii codice legitur, herba & nomenclamētura Barbara, antiquitati viribus quâ facie notior: ut cuius Dioscorides reliqua descriptione supersedens, radicellas dumtaxat paruas, ut Cyperi memorat, cui tamen nec similes admodum, & multo maiores sunt, nec pendulæ Cyperidis ritu, sed Iridis modo implexæ. Iamque plebeculæ vbiq; gentium notiores & visitiores, quâ ut fusiore egeant Historia. Verùm reliquam effigiem, quæ est tota Iridis aut Xyridis, ex virore nigricantibus foliis surrectis, hic damus nulli dum depictam, qualem alebat Antuerpianus ciuis perbonus, perindustrius & peritus Pharmacopœus Guilielmus Drielsch, cuius munere habuimus: tametsi flores, utpote Septentrionali rigidòq; cœlo nullos promptit. Imbecillo stomacho vires instaurat, calorem fouet, aluumque emolliat Dioscoridi: nempe si maturæ sed teneræ recentisque radices comedantur, nondum exhausto humido lubricante & purgante, uti vidimus in Iride, quare vetustiores siccant potius & sistunt aluum. Succulentæ autem recens conditæ, multa cōmendatione ex Indiæ varijs locis, nec non Aphricæ finitimæ in Europam vitimâ Septentrionalem & Meridianâ vœnum feruntur: tametsi iam vi emolliente exoletæ, maceratas lixiuii condiunt saccharo etiâ nostrates Veneti, Antuerpienses & alii institores passim.



TERRA MERITA, CURCUMA Officinarum.

ILLAM radicem exoticam, Terram Meritam vulgò vocatam, vel Curcuma Sepalsiariis dictam, quam Zingiberis effigie nasci in India auditione acceperat Dioscorides, propiorem Zingiberi quam Cyperi putamus, etsi idem author speciem Cyperi esse apud quempiam legerit, eoque forte minus aptè dixerit Zingiberis radices paruas, cãdicantes odora-

odoratas Cyperi modo libro secundo: alioqui enim nisi perquam exigua illi cum Cyperis intercedit similitudo. At vires perquam similes quasdam habet (præter Croceû succum, quem mansu remittit) cum Zingibere, tametsi gustu ignauiore, ingratiore, docte autem referandi viscera potiore: ideóque hodie cursores & mulierculæ cum Zingibere miscent ad Ictherum. Vis autem psilothri illa feruida videtur elanguescere, longa temporis & locorum intercapedine atque teredine, cui eadem obnoxia est, sed minus quam Zingiber. Picthoribus & Chymistis, quam medicamentis hodie frequentior.

ZINGIBERIS EFFIGIE COSTVS

Arabicum & Syriacum.

INTRICATIO multò Costi dignotio, utpote etiam plantæ peregrinæ Indicæ, nec ullis liniamentis signatæ, nobis tamen visibus & præsidio futuræ. Spernendæ tamē recentiorū contentionēs & apponendæ recensiones, quæ doctis possunt esse argumentum & emolumento ad vberiorē cognitionem. Sexto abhinc ferme anno, cœpit veli radix à Syria & Ægypto Venetiæ Zedoariæ aut Zingiberis effigie, quam primus omnium singularis modestiæ amicus noster Vlerandus Donrez Flander Insulanus, & Historiæ huius peritissimus verum Costi censuit esse, cui Gesnerus primum frustum inter



B V X E A
Costi.

magnam copiam Zingiberis fortè repertum specimen futurum donat Venetiæ ituro, indeque in Syriam Simplicii perquirendorum causa nauigaturo. Radix intus candida, levis, minimè grauis, pollicem crassa, vnciam & sesquiunciam longa, hinc inde tuberibus oblongis atrinsecus donata, odora, gustu acri, odore inteso & incudo Cypræsi aut Cedri Libani quadatenus, interdum & B V X E A visitur, uti vulgata odore & sapore similis, subamaratra utraque, cætera similes. Qui Turcæ institores per sepe venditabant amico nostro, rati esse Zingiberem Syluestrem, haud ita magno pretio distrahebant. Ea Venetorum Medicorū collegio oblata, adeo placuit, ut dignam censuerint, quæ inter lectissima Theriacæ parandæ simplicia, anno 1563 infereretur, quod paulò post factum fuit, iamque inde maiore copia aduecta fuit Venetiæ. Et nostra opera factum fuit, ut amicis nostris Antuerpiæ innotuerit, quibus inuisus. Quæ quidem, ut non esset Costus genuina, tamē quia & radix est, eximiæque odoris saporisque acris gratia aromatica pollet, merita videtur parem Costo laudem & gradum, præferendæque non modò F V S C A G R A V I & I N O D O R A R A D I C I, Helenii compacta concretionē ignotæ, qua Officinæ hodie abutuntur, sed etiam Zedoariæ, quæ minus odora, aromatica & gustu grata est. Quin ne Angelica quidē præferenda est, quam N I G R V M C O S T V M, siue Indicum, propter insignes vires & odorem suauissimum hodie faciunt: non enim est adeo peregrina planta, sed Europæ familiarsima, nec admota vrere solita, nihilque adstrictionis habet, qualem Galenum in costo optare auctor est Senensis Commētator. Cuius plantam suis postremis commentariis insertam Costi nomine, nobis sæpius ab Herbariis Illyricis ostensam, quia nihil Costo dignum habet, sed potius facie Elaphobosci est, illuc reicienda.

C O S T V S
Officinatum.

Costi niger.

Costi Syriaci
Mathi: foli. 33.

COSTVS DVLCIS & AMARVS.

C O S T V M dulcem nouimus nullum, nisi collatione quadam cum acriore & amariore Costo sic vocetur: quo intellectu quis Actuarius accepisse putet, vel eandem plantæ radicem, quæ dum recentior mitior multo, vetustior vero amarore & seruore ingratiore facta, amara aut inamena vocetur. At Galeno nulla Costus non amara. Sedenim Arabes sequutis recentioribus indulgendum illud ut quædam species Costi suauiore quasque, ut vernaculè loquuntur, dulciore odore, seruiore mitiore, dulcis illis dicta sit, & vñ recepta: quo modo quis dicat Zingiber, Iridem, Helenium, Centaureum & plerâque alias radices mitiores & dulciores, dum tenellæ sunt: vetustiores vero & vietas aciores & calidiores. Id euidentius exemplo succorum excoctorū natura vel arte, in Aloe explicuimus.

COS.

DVAS insuper radices peregrinas Costum admodum similes, hic impertiemur candidis arbitris, ea beneuolentia qua Rupellensis Medicus doctissimus Launius easde nobis, quadricennium iam est, impertinit. Ambas acceperat à Naucleris è Molucia Insulis reducibus, quarum altera maior arboris maiusculæ cortex videtur, & figura Sambuci adultioris & cineracæ, rugis & plicis frequens, sapore & odore æque vehementi.

MOLVCENSIS LIGNO.

fus feruidior.

MINOR quidem altera radices Solani Syluestris valde quam similis, colore diluto pullo, gustu vrenter vix ardorem lingua ferre aut sustinere queat. Illisiam persuasum erat Costi esse speciem, tametsi parum odorum esset: quod uti non inficiamur, ita priorem ut potiorcm retinemus, & hasce ambas Molucenses nempe, minus odoras iudicio studioforum pictas subdidimus.



ZEDVARIA sine ZADVRA herbæ

ZERUMBET.

PROSTANT iidem, peregrinæ duæ radices in Officinis non perinde notæ è totius plantæ partibus, ut sunt celebres facultatibus. Neutra quidem Græcis memorata, sed dūtaxat figura Zingiberis à recetioribus prodita. Earū quæ notissima, Zedoaria vocatur: altera quæ rarior ZERUMBET: & utraque ut nominis, sic & generis eiusdem meritò putatur, nec secus inuicem disserre, quàm Cypripis rotundus & lógus, videntur. Eoque Serapio Zedoarium eandem Zurbabeto dixit, rotundæque radices Aristolochiæ describit & Zingiberis colore & sapore, in Chinis ultimis nempe Indiis oriundas. Abicenna autè, nisi sint eius tenebriones interpretes, permutatis nominibus contrarias planè Zedoariæ & Zerumbet affinxit comparationes: apud quem idcirco malim legere, Zedoariam Cypripis similem, minus tamen odoratam, Zerumbet autem Aristolochiæ rotundas radices inesse. Quod tamen parum interest rerum cognoscendarum cupidi vestigatoris. Satis enim discernitur apud Serapionem, modo sic accipat, utramvis harum radicum tuberosam esse, ac quemadmodum Doronicis siue Aristolochiæ & cenanthis contingit variare oblonga tereti, vel orbiculata & nodosa mole radices: sic euenisse Zedoariæ herbæ, cuius naturæ, quemadmodum nominis est particeps Zurbabet, quippe amaror, feruor, odor, color, ingratus vehementior gustus, modus, durities, duratio eadem & vsus ad Colicos cruciatus, præsertim aduersum venenata, certissimus, unde nomen forte fluxit. Indèque videntur Auicennas, Serapio ac Mauri nonnulli designasse antidota pluria, aut præsidia ad venena comparata, laxiore ut plurimum solent nominis ambitu, quemadmodum BEZARDICA generatim vocantur Arabicè, quæ vitam tuentur: eoque quæpià celebrè arborem eodem nomine implicuisse Zedoariæ aut Zerumbet foliis saligneis Citri odore, quæ item ad Ze particula multò alludit. Potiorè etiam eam Zedoariâ, quasi dicas antidotum, quæ radicibus Napelli adnata foret, eiusdem venenatæ Napelli præstantissimam Theriacam merito dicit, qualem nos experti sumus, & eruius copiosam variis in montibus, ut capite de Thora dictum. Ne dehinc porrò Principem Auicennam veni seuerum vindicem & serium Philosophum fabulatorem vocet ille Sabbatarius Indicarum mercium ex commentarijs triuialibus Nauigationum interpolator, qui valde vereor ne metipse fabulas non parum multas effutuerit, certè non vno loco multa præcipitanter effutita satis fuerat siluisse, ut de Calamo aromatico, Costo & aliis plerisque. Quem etiam non pudit, АРНАВОНЕМ arborem esse proceram apud Ægyptetam Lib. 7

BEZARDICA.

Arbor Zeduar.

THORA.

ARNABO.

Cap 3. prodere, cum nullius prorsum arboris ac ne stirpis quidem mentio fit inibi de ARNABONE 231 pagina Græci codicis. Bonum Medicum nimirum decepit Commentator Senensis, qui affirmat Arnabonem Pauli & Zarumbet Serapionis eadē esse, quod easdem is Zarumbeto, quas ille Arnaboni reddiderit facultates. At id secus est, nec Paulus ullam vilius plantæ partē exprimit, sed tantum dicit τὴν Ἀρναβὸν esse Arnabonē. Et vt eadem scripsisset Serapio de Zarumbet quæ ille de Arnabonē, non tamen illico id esse dictum oportuit, cum Zarumbet eidem Serapioni sit ipsa Zeduararia, radice nempe rotunda, adeoque Auiceana plantam Cypero similem sed minus odoriferam dicat. Quin Isacco vtroque illorum antiquiori Zarumbet radices sunt Aristolochiæ rotundæ colore & sapore Zingiberis similes è Chinis petendæ. Sed enim illis doctissimis viris (vnde hanc hausit labem Commentator) nominum anceps allusio, vt dudum monuimus. Ergo Zeduarariam triplicem innuere voluisse Arabes putamus: Oblongam nimirum vulgatiorem, Cypero propius accedentem, & huius speciem Zarumbet officinis infrequentiore, nobis rotundam dictam, tertiam autem luculentam arborem minus hodie cognitam. Illas itaque, quia recentiores foliis & natura Zingiberis æmulas deliniant, nec nisi radicum figura distare affirmant, huc non incommode attexuimus. Si cui autem propius Zeduariam videtur exprimere noster Costus Syriacus Zingiberis radice simili & maiore, sua sane opinione fruatur: nam & hanc dicunt ab usque vltimis Oceani Orientalis Chinarum plagis in Persiam & Syriam, vbi etiam, sed pauca, oriatur, transmitti. Probabilius tamen vulgatiore veriore esse, cum sint sibi per omnia similiore, vt Castani-bulbi cum cæteris cenanthis, exemplisque aliis superius ostensum fuit. Arnabonē verò Pauli & MAMIRAM, nobis ignotam adhuc esse, fortè & fore magis dolendum, quàm mirandum: cum priscorum pudor non ausus sit res peregrinas, neuiquam compertas temerè posteritati figurare: vnde NARCAPHTHON corticē aromaticū, ac pleraq; alia thymiamata famigeratissima nullo signo memoriæ mandata fuerunt. Mamiram tamen quī Doronicum vnum quodpiā arbitrat, neuiquam infirma coniectura nititur: at qui Arnabonem eiusdem Zarumbet Arabum hariolabitur, verum si dicat, illum putato vatem optimum.

MAMIRAS.

NARCAPH.

IUNCII & IUNCIA

	¹ Rotundus	<table><tr><td>Maior</td><td rowspan="2">} Syriacus,</td></tr><tr><td>Minor</td></tr></table>	Maior	} Syriacus,	Minor
Maior	} Syriacus,				
Minor					
Cyperus sive Iuncus angulosus.	Longus odoratus. Longus inodorus. Gramineus.				
Trasi.					
Papyrus Nilotica.					
Papyrus latifolia Brasilia.					
Arundo Papyracea.					
Sparganium.					
Typha.					
Typha minor.					
Scabe.					
Phleus Throphi.					
Schoenanthos, sive Iuncus odoratus Libani.					
Nardi spica.					
Nardus Gangitis.					
Iuncus	Lanus vulgaris. Acutus duplex. Aquaticus. Maritimus.				
	Bombycinus, Gnaphalium Trapi.				
	Cyperoides, seu floridus paludosus.				

IUNCII Varietates.

CYPERVS, sine Iuncus angulosus.

{ Gal. Sauber.
 { Ital. Cypero.
 { Ger. Wilder Galgan. }



ΑΤΥΡΑ natalitiorisq; cognatione succedent Iuncea Cyperoru seriei, vt etiā Theophrastus innuere visus fuit, cum Cyperu, Papyrum, Calami, alijsq; palustres recensuit. Dicta autem κύπερος aut κύπερις videtur à radicis effigie, quæ pyxidulam, aut poculum pusillum vasculum ue imitatur: sic etiā apud Theophrastum folliculum Vini κύπερις legitur. Huius certior multo Historia quàm cognatæ Curcutiæ, siue Cyperi Babylonici putati, de quo superiore capite, propterea quia nō multi sunt anni, cum quidā horti Itali rariorem, rotundum vocatū alebant, nōsq; copiam

Effigies M. A. B.
 26.

duorum generum Rotundi vocati ex Syriæ Emporijs Venetias aduehi vidimus apud Albertum Martinellum Pharmacopœum peritum à quo etiamnum habemus. Quare plures sunt species, quàm quot Dioscoridi recensitæ fuerint. Nempe Dioscoridis maior & minor rotundus: vterque peregrinus, Syriacus vocatus Nostratum autem Longus odoratus, & Longus inodorus: postremò etiam Veronensium Trasi, que sanè Cyperi sunt cōgeneres. Omnium effigies similis & eadem fermè, folijs porraceis Asphodeli striatis, angulosis, rigidis Sparganii vel Iunci floridi aquatici, caule gracili, nitido, triquetro, iunceo, floribus item seminibus & cæcuminibus pannicularum Iuncea spicatis. Vda, etiam scrobes & ripas fluminum, vbi Iunci, amant: quare meritò Iuncum angulosum sine triangularem vocarunt antiqui & nos hic collocauimus. Omnium tamen in radicibus discriminè: Syriaci maioris etenim radices multis filametis implexæ numerosæ, glandularum instar aut filipendulæ annexæ rotundiores, oliuis pares, intus albidæ, foris subruffæ, sapore minutè Galangæ, odorèq; aromatico, antidotis maiori gratia & vi misceri solito.

Minor verò radix duplò minor est, cortice fusco villosiore, duriore intus candore, alioqui & sapore & odore simili, non modo è Syriæ montosis humentibus, sed etiam Illyriæ & Apuliz consimilibus natalibus, vbi sponte prouenit, in Italiam ferunt, emunt: que magno vtramque harum, & ad Theriacæ compositionè, ceræque oblinunt ne teredine exedantur. Aptissimam enim Xylobalami succedaneam iamdiu Patauina & Veneta collegia sanxerunt & vsurparunt, tametsi commodiora hodie succedanea suffici possent vt sumus dicturi in Antibalomenis.

LONGVS HABITIOR.

NOSTRATIS duplicis Europæi frequentior multò prouentus & vsus Septentrionalibus regionibus, vt Germaniæ, Belgiz, Angliæ & Galliz, quàm Meridionalibus transmarinis. Harum pariter altera maior habitior, carnosior odoratiórque est. Radices illi longæ sibi cohesu mutuo implexæ Polypodij modo, etiam odore suauissimo mulieribus notæ, quæ ex illa destillationes & pulueres instituunt.

LONGVS INODORVS.

ALTERA verò minor inodora fermè neglecta, quam Theophrastus in Heluetia miscabant suis quintis ineptijs.

RECENTIORVM TRASIS, sine esculenti Cyperi.

EST & hæc prorsum è Cyperi genere, seu radices seu plantam reliquam totam speciem, cuiusq; natalis, nec differte videtur, nisi radicum sapore, qui gratus rescendo nec utilis minus est, vnde nomen in vulgus Italarum manauit, quod forsitan Tragum esse illam speciem frugis, quæ Halicæ speciem gerere quadamtenus describitur, secundo Dioscoridis Volumine, tametsi vtraque illarum factitia est: at Trasi planta est equi- Tragos & Caudum Diofco. factitia. tara, nec vsquam Christianæ ditionis oriri spontè solita, preterquam in amœnissimo Veronensium agro non procul ab vrbe, vbi etiam colitur pingui riguòque aruo, quò nos, dum floreret Iulio mense, duxit optimus ciuis, Pharmacopœus diligentissimus, Andreas Bellicoquus, cuius radices in Gallia, Belgio, Angliæ satè non paucis amicis opinionem fecerant Cyperi rotundi minoris. Cui equidem par est & similis: agnitu tamen facilis, quia can-

D. i. didion

didior, pellucidior, nec odora, nec medicata, sed alimentoso dulciorēq; quā Castaneæ sapore, vnde vulgo, *Doke Trasi* Veronæ & Venetiis per vrbes puerulos audias, qui radicū harum circumferunt vœnum plenos quasillos. Crudas coctāsque esitant in bellariis, ad acres fluxiones commendantur, nec dubium quin ptisana ex iisdem parata multum profutura sit, addito Coriandri semine, & pauca Iride quemadmodum quidam parant. Afri, quibus etiam spontē oritur, Hab-alselim vocant.

CTPERVS GRAMINEA siue MILIACEA.

ACCURSENDAM etiam Cyperis hanc caulis natiuūque locus suadent: est enim inodori Cyperi quadātenus affinis, breuior tamen foliis, quæ ab imo orta medio sui tenuis fermē caulem ambiūt pedalem, gracilem, ternis angulis asperū, coma donatum sparsa eleganti, & maiore quā pro sui magnitudine, copioso Mili aut Iunci referta semine, circū quā imam aliquot foliola enascuntur, vt in Cypero aut Papyro, lectam industria summæ sedulitatis Medici Thomæ Penii habuimus, ad Neccarum flumen agro Heidelbergenſi.



PAPYRVS NILOTICA.

NON corticis siue libri cui inscriberetur, vt quidam putarūt, est Ægyptia Papyrus, sed plantæ magnitudinis speciosę admodum, Cypero similis effigie, natalibus, etiāq; nomenclatura Ægyptia, qua in regione secus fluēt in Nilipalustribus adolescit, nec ē profundo emergit, sed tantum ē vadosis frutescit, non procul à ripis, vt etiam diuina pagina narrat Mosen diuinę spei & elegantię delictum puellum à matre inuita eiectū prope Nili ripam inter Papyros, vnde diuinitus iussu filię Pharonis eductus, indēq; Moses vocatus, quasi aquis ereptus, fuit. Niloticam Papyrum, vnde & qualem describunt Theophrastus & Plinius aduectam hortique Pisani totius orę Thyrrenę lōgē amœnissimī & rarī stirpibus ditissimī inquilinam faciā vidimus, & florentē legimus beneuolentia cruditisimī Professo-



ris in Academia Pisana Andriæ Acroariz Cifalpini , quo etiam hortante nonnullos Stolonones Papyri, & aliarum rariorum plantarum Gesnero misimus : quarum oblectatus peregrina elegantia , vt erat incomparabilis modestiæ & eruditionis , non ita multo post literis gratulabundis hæc significauit, Rarum spectaculū sui mihi præbuerunt stirpes dugmunera tua rarissima, quarum illam Papyrum Niloticam vocas, altera, mihi tecum ignota est: sed nec illam nouissem, nisi tu monuisses esse Papyrum Niloticam è Pisano horto lectam. Plinio videtur gemina Ægyptia & Babylonia ex qua præparantur acu chartæ diuise in prætenues, sed quam tenuissimas phyliras. Tua vero an sic possit parari nescio: Plinianæ premuntur prelis plagulæ & fecernuntur scapo nunquam plures quam vicenæ. Plurima quæ ibi habet Plinius non assequor, nec nunc cum Theophrasti, conferre vacat, sed peruelim scire cuiusmodi tuz sint folia , & an nō Cyperus sit, vt cū nostrum opus in lucem exhibi curem depingendas , ac tibi acceptas feram.

Neutiquam mirum doctissimo Gesnero visam esse Cyperum, cū illi sit congeneris & simillima : verum elegantior multo est, tunceo harundinaceæ triquetro caule, medulla tacto tomentacea , quæ tusa glutinisque in speciem subacta ducebatur in bractæas Papyraceas , quæ mutuo sibi appresse folia crassiora consabant scribendo apta , quemadmodum etiamnum sit ex lacinii linei panni contuli & in candidum gluten redacti. Medulla vero vtebantur ex præcepto antiquorum , quemadmodum hodie Chirurgi Itali linamentis , & turundis ex medulla Sambucina aut Spongiz paratis , quò suis poris melius saniem imbibant , suæque qualitate desiccando fistulâs latiores faciant, quod factitari solitum meminit Dioscorides. Stipitum numerorum proceritas , lauis , nitida , surrecta senum , septenūmue interdum cubitorum , quibus nuspiam, nisi ad imum folia in sunt Cyperi aut Sparganii repanda : radices autem arundinaceæ fibrosæ, quas in Ægypto eruias asseriebant non illic ortas , propterea quia femine caret, tametsi floribus est perquam speciosis & luculentam in ambitu cæsariem effigiantibus: numerosis gracilibus thyrsulis, denso & æquabili comarum stipatu, & apicibus prominentibus, Ferulæ in modum collectis , non vt Cyperi sparsis , quos circa ortum ambiunt radiatim scita folia multò minora illis, quæ sunt ad imum, vti in Cypero. Idcirco verisimile sit hanc veram Theophrasti esse , & Papyri descriptionem apud Plinium geminam esse , sed mutilam , eque duabus diuersi generis Papyris confusam , nempe ex Ægyptia hæc & ex Babylonia , cuius etiam alii scriptores meminerunt. Nam, vt nomen & res indicat, Theophrasti papyrus non alia est, quam Dioscoridis quæ notissima omnibus, fuit ex qua præparabantur chartæ , & vtilissima Medicis ad ora fistularum inducenda , nempe medulla , vt superius ostendimus , etiâque è luncea medulla hodie fieri scimus , nam ipsam chartâ non esse , sed medullâ, indicio est quòd Dioscorides dicat cinerem crematæ Papyri præstantiorem esse quàm è Charta , & ipsos stipites neutiquam inferi sinibus aut fistulis solitos , sed medullam, propter comoda quæ recenset Dioscorides. Idcircoque aut vsum tum funium, tum chartæ obscurius Plinius tradit, cum dicit: textuntur omnes tabula madente Nili aqua , quod de funibus quis sortè interpretetur. Et mox : turbidus liquor vim glutinis præbet , cum primo supina tabula schædæ illinitur longitudine Papyri, quæ potuit esse segmentis vtrinque amputatis : transuersâ postea cratis peragitur , premuntur deinde prelis & siccantur Sole plagulæ, atque inter se iunguntur , quæ medullæ gluten in Chartas duci solitum innuere videntur. At vbi in Euphrate circa Babylonium nasci scribit, non eandem videtur describere , sed eundem vsum habere chartas, quæ diuise acu in prætenues, sed quâ latissimas phyliras præparantur. Quare & si ista folia admodum lata , quibus metz saccharatæ adferuntur passim inuolutæ ex Austrinis trans Æquatorem Insulis vocari possunt Papyraceæ , quemadmodum olim etiam folia Palmæ & aliarum arborum , quibus poterat quippiam commodè scribi , tamen non esse genuinam certum est. Quapropter consultius est , vbi defuerit hæc nostra Papyrus , cinerem parare ex Cyperi vulgaris , aut lunci magni aquatici medulla, vtendum ad depascentium vlcera rabiem feram compescendam.

Folium saccha.
inuolutum.

PAPYRVS LATIFOLIA BRASILIA.

D.ij.

N 10

N E c etiam Papyrum esse illud folium quod doctissimus Generus describit, vel inde perspicuum, quòd Dioscoridi non folia, sed quidpiam certo modo paratum & plāta Papyrus vocatur. Tametsi, vt monuimus, nihil obset, quin folia hæc, vt quibus concinnè admodum characteres ac quiduis aliud exarantur, possit papyrus dici: præsertim etiam cum iisdem vigeat locis, quibus Arundo Saccharata & cœteræ aquaticæ.

ARVNDOPAPYRACEA.

A D M O N V M similis Papyri descriptioni, & nulli non Galliæ regioni familiaris, lacustris planta altera speciozæ proceritatis, quam nō semel in Lani torpentibus aquis non procul Monspellio conspicati papyrum Dioscoridis vt pote notissimam suspicati fuissimus, nisi illi scapi niuis angulosi essent, senū octonūque cubitorum, crassitie & similitudine Typhæ, sed harundinis in morem flore fastigiato thyrsi cacumine, folia item arundinaceis aut Parganij longiora, carinata, carnosa, triquetra, radice ampla, crassa, multas lateratim hinc & illinc propagines fundente, vrendo apta cum sicca. Ex folijs verò texuntur tergestia, quas Mattas vocant, non secus atq; è Iunco maiore, Sparto, Alga & alijs non pauci.

SPARGANIVM BTOMOS.

Theophr. Lib 1. Cap. 8.

A F T I N T S valde Typhæ Iunco florido Papyris & Cyperis Sparganium, qui idem *Ἀφτίς* id est admodum scindens Theophrasti videtur, nominis argumento id docente. Iisdem namq; paludosis & riuis inter & prope illa prouenit folijs cōsimilibus, triquetris, dorso prominulo & carinosis, acieq; vtrinq; manū arripiētis cæsim sauciente, partim ab radice graminea, fibrosa, surrectis: partim è bicubitali caule alterno ortu sparsa & reflexa: inq; alarum cauo globulos echinatos saturè virentes, duros, firmos, Platani parces habente, gustu subastringente & sicciore, insipido. Sunt qui respuunt vt Senensis, nec tamen describunt, non magi quàm Iuncum floridum vocatum, per eius commentaria hæctenus minus sane notum, iniquius paulò tamen interpretantur duas voculas *ἄνθος* & *ἰσχυρὸς*, id est angustiora, & incliniora. Atqui illa vaga nota latioris, angustioris folij, non sæpe certa, sæpissimè contrario sensu accepta in Dioscoridis lectione, ostenditur alibi: & vbi dicit magis quàm Gladioli inclinata, apertè indicat esse magis disparata & sparsa (vt sanè sunt) quàm sint Gladioli, quæ vt plurimum recta, & proximè caulem parallela assurgunt. Sed Commentatori illius triuialis intellectio literæ quæ sic habet; folia ad terram inclinata magis, vel procumbentia.

TYPHA.

Ital. Mazza Sorda. *Gallis.* Ma'se de Ionc. *Angl.* Cattis eayle & reede mase. *Germanis.* Wosfloben seu Narrem kolben.

C Y L I N D R A turbinatæque florum effigies quasi Typhonis sese gyantis turbinem, aut gigantis staturæ minacem signaret nomen huic dedisse videtur. Earum est & hæc quæ non nisi certis natalibus nempe annibus leniter fluentibus, & vada, stagnantēque aquas & palustres efficientibus emergit, è radice iuncea caulis procerior interdū homine procero super, rectus lzuoze colorēq; & parilitate illius fluiuatilis maioris, quæ propè haud raro nascitur folijs ab imo exeuntibus alterno situ carinatis triquetris mucronatis Cyperidis: fastigium tereti, papposæque claua clausum, fæsq; palmū, pedēque longum, quadam Tritici Turcici similitudine. Ventis abrepta lanugo pulla intus foris nigricans, cogitur à Tomacarijs mulieribus, & renibus æliuantibus lumbis haud parum commodi adferunt puluilli thoriuē eadem fæsti: etiam intusa pinguedini præsertim axungie, aut larido illiquato, arcet ambustis partibus tumorem & inflammationem serique vrentis collectiones. Quod prodiderunt ad Enterocelas tantopere facere, non huius reor, sed ad motorum & aliorum mīxtorum merito acceptum ferendum, nempe Hippoglossi, Gladioli, Bethonicæ: vnde malim hanc abesse lanuginē, quæ et suffocationis periculum minatur, mures enim sic enectos vel plebs nouit, & ineptiora cœtera medicamenta efficit.

Phleon, quam nonnulli Stœben appellant, lanugine mulieres ad lixiuium vti, pabulo esse folia ouibus, germina subus, partem imam radici proximam pueris teneram esitari, non in profundum actam radicem inque Orchomeno copiosam haberi, atque in Arabia exaduerso Æthiopico tractui, flumine præsertim quod Cinamoferam disternat Strabone narrante. Quæ tot notæ satis docendo erant, ipsam Plantam sicubi ea in Europa cerneretur. Dioscoridea tamen vix vnquam certa erit, cum nullis sit descripta notis, nisi vulgato vagòque nomine, & facultatibus quas nec diuersas nec ignauiores quis in Bursa Pastoria, Gnaphalii marinis, Iaceis, Scabiosis, Bellidibus & Globularia experietur: quarum maxima pars tamen antiquis indicta meritò putetur, fieri tamen potest, vt vna quæpiam Dioscoridis sit Stœbe, aut saltem non magno vel desiderio vel dispendio illius vsum expleat: easdem namque vires feruè Gnaphalio, Typhz & Iuncis reddiderunt antiqui.

IVNCVS ODORATVS seu SCHOENANTHOS.

INCORVM præstantissimus odoratus Schoenanthos olim vocatus à multis tempore Galenæ, florum prærogatiua roseæque fragrantia, tamen Galenius dixerat suo tempore minus aptè se dici, atque præcepisse quosdam Schoenanthum miscendum esse compositionibus, cuius florum non admodum suppetet copia, sæpe depauperibus nimirum similitates Camellis Africanis, qui Schoenantho vescuatur & maxime oblectantur. Quam Galeni rationem, vt prauam & veluti mendaciam ream ridet an. liter Commentator, quasi nupiam vllum eius florum vestigium Europæis compareret sed omnes ligurille Camelos diceret. At ille dum taxat sæpe truncam adferri reliquam herbam dicit, nempe radicem, caulem, coque stantem suppetere copiam, quemadmodum hodie videas in Emporiis, Venetis, Genæ & alibi longe copiam plantæ maximam, florum verò non admodum mercem frequentem. Quippe cum sint quadrentis flores papposi, tenues, facillè delabuntur, etiàmque cum cæteris graminibus vescuendo refecuntur, calore odore eorum exoluatur, ita ut partim eorum paucitate, partim etiam infistorum negligentia vt perpauci adferrentur. Iam lucri pes inculentior adeo sedulos colligendo adferendoque feci mercatores, vt nulli dubium, quin veri calami floribus integris quamplurimum habeat Nabathæ, Arabiæ & Aphici quorum etiamnum ex odore dotes noscitur quibus facillè possit (prostant enim interdum in Officinis) veri quidem sed adeo solati viribus, vt nonnulli putarint non aliam esse plantam, quam quæ passim in Adriaticis frequens & nonnunquam in Mediterraneis littoribus & sabulosis occurrat, planè specie, non nitidine, cum quoque concolori Schoenanthi odorati geminimisque hanc nobis oblatum à Pharmacopœis Venetis & Monspelli, qui affirmarent esse verè congenerem. Verum ab illius præstantia longius abest, quam Cana vulgaris à Calamo aromatico & aliis suis congeneribus est, & longè differt ab eis in profertur qualem aromaticum in Cana orundum ex Iunij memoratone, sed minus viribus pollentem quæpiam concedet. Siccatus hodie vendendi solus in sacculis vinctus radice est exigua, duricula, arida, fibris exilibus multis summo deserte sparsis, fonsque promentibus vna conuoluta & squamatis interfecta crassiora, rigida, summo palmi alta, mucronata pallida prope simplex calamulorum geminatione rotundior, plenum, non cauum, nitidum, pediculus, cyperi lunceæ concreione & luore, & in summo graciliorem, quem ornata gemina flosculorum ex pallido rubentium, acerosi glumis aut calyculis rubellis foris intusque paruis leuius, quæ Cyperum tota olent, sed trita in mortario aut digitis tacto opere flavescunt, præsertim interiora flosculi & calamuli, vt legitimum hunc esse qui inficietur, planè mucofar naris dici mereatur. Ne nunc blateret de Cyperi caule, quem non odorati Iunci, sed vulgaris, nulla expressa adiectione innuere videtur Dioscorides. Cætera porò descriptio adeo cum sit lucida, pudeat istos maleferiatos exactiores putidulz leucritatis in notis exquirendis.

NARDVS DIOSCORI. seu

Nardus achis Agineta.

NVM dicta fuerit à Naardo vrbe Syriaca Euphrati contermina, vbi etiam Nardum aliam

MARIUS
gramineus Iuncus
aut solus Schoenanthus.

aiam meminit Plinius incertum, certū tamen legitimā
plerisque locis Aegypti & Syriæ in Europam adferri, nō
modo radicem qualem Galenus vult, sed etiam qua-
tuor distinctas partes, nimirum radicem, spicas co-
masque, scelus & folia ipsa. Ima radix Schoenanthi,
exili & arido stamine à radícula siue torulo exit, cui in-
nascuntur spicatae comae confertaeque coniunctiones
quasi per cirros torulos nucleosue distinctae & costatae
capillamentis, vt in Meo. e quorū sparsis medijs emer-
gunt nonnulla iuncea folia maris Algæ modo, tamen
minora multo. Haec siccas interingentes fasciculorum
strues conspicit fuimus in ædibus amici nostri & periti
Pharmacopœi Alberti Martinelli Veneti ad Angeli sym-
bolum, & scimus nonnullis alijs studiosis Lugduni fuisse
animaduersa.



NARDVS GANGETIS SPVRIA NORBONÆ.

QVINVS iam agitur anas, cum aliā huic simillimā
& copiosam nacti fuimus. In Gallia Norbonen-
si à Gange vrbecula septem plus minus miliaria distans
mons perquam amœnus & cellus, herbarum lectiorum
feracissimus, cui ideoque vulgò nomen *Libert de Dieu*, id
est Dei Paradisus, inditum. In locus cliuo quæ ad meri-
diem maris Mediterraneum vergit, hæc vberi prouentu
erumpit, muscidis & vdis traxibus, imma radix pusilla,
exilibus fibris duris & raris, quæ subsunt spicatis cornosæ
que torulis minimum dictum crassis, colore pallefcenti-
bus ex fusco, setæ palmæ altis, non valde mucronatis, sed
quadatenus per extrema recisæ, folio est viridi, rigido,
iuncea, vix pede alto, tunicato quod ab ima radice ortū
trans spicam comam in unum caule ambientem sese ex-
erit: multæque plantæ quæ vno cespitis ambitu complexæ,
vnius effigiem præ se ferunt. Tota inodora est, præterquam
capulametâ spicæ, quæ mul-
to crassiora quam Indica sunt, odore Musci Quercus, vel terrestris, cui semimerse hu-
mo nascuntur, spinosa capillamenta: è quibus gracili, ac nitidi iuncus culmus Elphæ
vocatæ non dissimilis, cubitu ab eis exit, à medio cuius ad summum alternatim sunt admo-
dum exsertæ herbaceæ subtile apertis è calyculis aliquantulum Schoenanthi flori aut desflo-
rescenti Ceramio & Coryledoni similibus. Hæc tum visâ fuit Rondoletio præceptor
& Jacobo Vossio in puerulo Gaudaensi compilatori eruditissimo, & in hac parte nō
fuit à me innotescere rei in domo apprime exercitato, qui eam suis ipsis inanibus collegit,
& etiam in notis suis de GANGETIS Diofcondi prorsum quadrare. Nec cuiquā
memorati Gaudaensis videri ad huc factam mentionem, nam nullum oporerebat oppidum
nullumne innotescere pro quoque locus isto, quem alluunt duo amnes suauissimi, quorum
alter est Gauda, cuiusdam alibi huiusque turris mixtus, vnde etiam Auro colligunt. Quo verò
fato factum sit vt id nomen adueniret, equidem nescitur, non esse Indican scitur.



IUNCUS LÆVIS VVLGATVS.

NUNC ad reliquam Iuncorum Historiam pergamus sicuti à loris & funibus
Schenium, sic à iungendo Iuncum dixerunt. Præter vdis deterioribus nihil viu-
dus familiarissime Iunco lævi vulgato, qui duplex est, aut mucrone tenuis distans. Vtri-
que tamen rectæ, laeues, herbaceo colore virentes, nitentesque virgæ aut culmi mucrona-
tis cuspidibus & semine nigro conspicuis, medulla alba elychnum referente & vsu sup-
plente rigidis, cubitū & sesquicubitum altis, minusque duris mucronibus armatis culmis:

D. iiii.

semine

EST etiam Maio & Iunio in vdis pratis & riguis, exilibus & quasi gramineis foliolis donatum Iuncum videre, pannicula aut cesarie niveo candore lucente insignem, quæ etiam perquam procul oculis nitore pulchro allicit: radice fibrillis tenuibus, & mucrone minus rigido donata r. Germani ob tomentum lineumue floræ & vsum. *Matten Glachs*, quasi culcitæ stupam, aut tomentum dicunt.

GNAPALIVM
Tragi inter Ico.

ASPHODELI.

Alphodelus. { *Albus.*
 Luteus.
 Luteus Liliflorus, sive Liriosphodelus.
 Palustris radice non bulbosa.

Asphodelus Galeni.

Asphodelus Hesiodi suo loco.

Hyacinthis Poetarum.

ASPHODELVS ALBVS, sive HASTVLA REGIA.

{ *Germ. Gold Wurty.*
 Gallis. Afrodiles.
 Ital. Asphodelo.



RIDA Narbonæ littora Asphodeli cõmunis feracissima sunt, nec minùs mōtes à mari disiti, vbi bulbis illius, adultioribus rostro effosis, quātumuis acribus sues lubenter vescuntur: homini iam in cibum non cedit, vt Galeni Asphodelus, cuius vis etiā non elixi ignauior multo, & feruor mitior. Folia illi Cyperi, ænanthes, aut Porri similia, triquetra, carinata: Caulis rotundus, læuis, cubitalis & sesquicubitalis: flores stellati candidi Ornithogali maiores: semen fuscum triquetrum Sefami Theophrasti, in orbiculatis capitulis obscure virentibus occlusum. Radices teretes numerosæ ab vno capite, Prœoniæ minores, concolores firmæ, acres, glandibus simile s subsunt, acrioresque multò & ingratiore s quàm vt vescendo sint nostræ gulositati vt fuerunt holus priscæ frugalitati, cuius testis Hesiodi versus etiamnum extant: nisi huius cum Galeni eadem Asphodelus fuit, aut mitioris soli alumnus, vel coctus, vt de Aegypto, de Cœpis & bulbaceis acribus legimus & scimus.

ASPHODELVS LVTEVS MINOR.

NVSQVAM littoreis iisdem visitur, tametsi hortis Batauinis & Galliz familiaris luteus hic antiquis indictus, generèque diuersus, est enim radicibus prolixioribus, nec ita bulbosis, sed Corruad modo minus tuberosis, leniùsque turbinatis, è quibus Cyperi folia complura exeunt exilia, saturo virore. Caulis rectus, floribus crebribus, luteis alterius similibus fastigio tenuis stipatus: semen triangulum pericardiis continetur primi modo.

LVTEVS LILIFLORVS.

LIRTOSPHODELVS inter naturæ luxuriantis lusus, quia non minus elegans quàm noua, hic subdenda & describenda, qualem Venetijs superioribus annis vidimus, ac dein Antuerpiæ cum Asphodelo luteo in officinis Guilielmi Driesch & Petri Coldenbergii amicis peritissimis, denique MonsPELLI seimus. Radices illi ænanthes aut Asphodeli albi exiliores, caulis sesquicubitalis, folia statim à radice surrecta, exilia porracea. Extremus caulis in turiones sissus qui flores ternos quaternosue Liliaceos referunt, colore flauo, vel auro, quibus succedunt siliquæ angulosæ semine lucido, atro, oblongo, Prœoniæ fœminæ minore. Hunc Liliū luteum vel Asphodelum nuncupabant iam tum quidam Pharmacopœi Veneti.

Liliū luteum

ASPHO.

ASPHODELVS ACORIFOLIVS, *palustris, intus.*

ANG LIA Flandriæ; humentibus paludosisq; provenit è radice fibrosa sparsa non admodum protuberantibus per interualla graninea appendiculis, folia exeunt Gladioli aut Acori angustiora, atro virentia & striata, caulisque sesquipalmaris, ortu magnitudine & modo semineque in lagzniculis Hyacinthi.

ASPHODELVS HYACINTHINVS fortè Galeni.

*Asphodelus
farmina Dodo.
452.*

*Spicatum Or-
nithogalum.*

HY I c radix Ornithogali aut Hyacinthi, bulbus est vnicus albus, folia porracea, exliora, breuiora, caulis vnicus, reclus, pedalis, cauliculi triquetri altrinsecus harent spicz in morem, è quibus flores stellati lactei se explicant, è medio staminibus quibusdam productis Ornithogalum referentes, quare Ornithogalum spicatum quidam vocarunt, MonsPELLIENSIVM nonnulli Pancratium, alii Asphodelu Galeni, propterea quia incipitis videtur figurè & promiscui generis ex Asphodelo cuius flores habet, exque hyacintho, propter non dissimilem radicem.

Nos itaq; cœpimus à serie gladioli & similibus, hinc è cognatis principiis Hyacinthorum Historiâ bulbosis annectemus à Poëtico primum orsi Hyacintho vt qui Irides inter Lilia & Hyacinthos gladiolos & Asphodelos quadamtenus ambigat: quem voluissimus Iridum clasi proximè subdere, & poterat sanè, nisi potior collatio Acori & aliorum sese obrulisset, quibus hæc tantopere similis floribus, vt Iridem multi putarint. Verùm bulbis & foliis cognatio natura hyacinthis similiorem facit, eoque nos huc digressimus: variis enim de partibus & collationibus, varias ad stirpium gentilitates alluisse videtur Deda & munifica parens Natura.

HYACINTHI.

Hyacinthus Poëtarum.
Hyacinthus Dioscoridis.
Hyacinthus { *Germanicus.*
 { *Autumnalis.*
 { *Anglicus.*
Hyacinthi Orientales Græci.
Orientalis alter.

HYACINTHVVS POETARVM.

AD I o affinia sunt, & v elemēta, vt faciliè sit augurari tà iā, id est violas cognomēto dictos fuisse antiquis flores speciosissimos quosque, præsertim vernos & coronamentis innecti solitos, vnde tot florum generibus diuersis violæ vox quasi hyolæ communis facta sit, & proinde accommodata hyacinthis, quorum purpureum Plinius ab antiquis nigras Violas vocatas meminit, propter concolorem hyanthinum siue violaceū florem, vt liquet de Theocrito, pariq; ratione putandū Dioscorideum dictum fuisse propter hyanthinam incuruamq; & pronam deorsum comā, floribus plenam purpureis, cuiusmodi deliniatur & hodie conspicitur.

THEOCRITI & POETARVM Hyacinthus flore Iridis.

NVL I v s dum scriptor neotericus videtur scitè distinxisse aut agnouisse hæc species hyacinthi: ea propter nonnulli Iridem, alii Gladiolum sequuti Palladium coniectarunt, quidam rati lugubrem illum cruotem, qui *suspi humo signauerat verbus*, ac desiderat esse cruor *Tyroque nitentior astro*, floris Liliū formam exceperat, eadem prorsum: si non purpureus color his nempe hyacinthis, argenteus esset in illis, nimirum liliis candidis, vt Ouidius canit, rati inquam cruentos debere esse à cruore flores, Liliū rubrum Dioscoridis, Martagon Chymistarum, Hyacinthum Ouidianum fecerunt. Atqui istum Hyacinthi Poëtici colorem esse purpureum violaceum, non phœniceum siue puniceum, cuiusmodi in Minio, Anagallide & Martagone spectatur, ostrei Tyrii color violaceus siue hyanthinus abundè explicant, & ostentant buccina purpura, cuius sa-

cuius sanies ex violaceo tantillum rubet, vnde apud suauissimum Maronem suaue rubens hyacinthus dicitur, at Martagoni non suauiter rubent folia, sed flāneo flauente exuberāti rutilāt. Et porro, *Ibera ferrugine tunicum*, cum canit Poëta, innuit colorē, quem politz calsidēs igni calfactz aut candefactz simul ac frigescent, violaceum rubidum, nitidum contrahunt, vocant *Brunisfure* Galli, de quo etiam ferrugineas Violas dixit Claudianus, neutiquam vt putarunt, funestas, aut lugubres intelligens, nam Vergilij versus contrarium indicat: *Pūctus acn Chlamydē, & ferrugine clauus Ibero*. Quare vndequaque aptissimē nostras Poeticus Hyacinthus studiosz huius ætatis expectationi satisfaciēt, cui nullus hactenus poterat placere, cum istum nondum norat: quique non modo ē Hyacinthorum genere est, sed etiam tantum habet cum Lilio, Iride & Gladiolo similitudinis, vt hinc facile sit coniectari Poëtis, Historicis, Rusticis rei scriptoribus & aliis collatum fuisse penitus cum illis iisdem de plantis, & interdum iisdem acceptum, quod à plebecula etiamnum fieri in Iride diximus. Si enim huius florem, semen, vniuersumque caulem, & siliquam oculis Poeticis intuaris, Hyacinthum neges, Iridem dicas: sin bulbū, foliaque perpendas porracea, colorēque hyantinum, Hyacinthum asseueres. Sed harum rerum peritus arbiter (tametsi videat Pausaniam, Palladium aliōsque scriptores ambiguis sententijs fluctuare) rei ipsius exploratione nifus, neque hyacinthum prorsum dicet, quia nonnulla reclamant, & Iridem negabit, quod neque radix foliaue congruit: neque tamē illi despondendum erit, quin ea potius, quam nos sæpius hic inculcamus, moderatione & methodo expedienda Poetarum Historicorumque controuersia. Ne miseram nuperorum quorundam sattuigentiam imiteris, qui adeo se torquent in delectu ex antiquis plantarum habendo, vt frustra putent ortam plantam, & ferme in Natura censu perditam, nisi cuiusdam generi ab illis descripto, quasi sub vexillo suo possit aggregari. Atqui nos, quod Aristoteles & Theophrastus in Lapidum, Piscium, Quadrupedumque historia prodidēre, hic possumus multo verisimilius dicere, nō parum multas esse plantas ancipitis mixteque naturæ, non secus atque hinnuli ex contrariis aut diuersis speciebus conflati *ῥαφισα*, hybridas & amphibia non pauca. Proinde cum isthęc planta Iris non sit, & tamen illi atque Lilij florum elegantiz absimilis non sit, quorum æmula venustate Poëtæ assimularunt, & Palladius dixerat Iridem vel Gladiolum à foliorum similitudine vocari: sanē nobis Poëticus Hyacinthus esto, qualem in Angliæ, Flandriæque amenioribus viretis videre passim est corollis expetitam. Disparis igitur generis duplex hyacinthus erit, Poëticus noster scilicet purpureus, cæruleus hyanthinus violaceusue ferrugineus vocatus Iridis Historicis, & Palladio, Gladioli Poëtis, & vulgo Lilij similis, qualem exactē noster exprimit: effigie nimirum Iridis aut Gladioli propior, quàm Dioscoridei hyacinthi: quare prius hic de Gladiolo hyacinthisque spurij germanico, Anglico, Græco bino, & Autumnali, quia sint floribus stellatis & Liliaceis, mōxque de altera Diosc. comosa specie hyacinthi dicetur.



ῥαφισα, GLADIOLVS.

{ Germa. Schwaertel. }
{ Gal. Glais. }

XIPHIOT seu Gladiolo aut ensiculo nomen factum à folij figura, quz tametsi eadem propemodum sit multis plantis, vt Iridi, Xiridi, Acoro & bulbosis quibusdam, atque nonnullis etiam piscibus, tamen huic præ cæteris remansit, propterea quia propius mucronatum effigiat, striatumque liris & neruis scabris, rigidisque firmissimum, In satis frequentissimum, ea propter dictum segetalē Romanis. Caulis singularis, rectus, rotundus,

Effig. Deder.
Hist. Stir. 144

dus, striatus, nitidus, è folijs quasi sese exrens & flores conditos deinceps habens per interualla, interdum vnico tantum & ad vnam partem versus (sic nostras Norbonensis) interdum binis ordinibus vtrinque, vno, vt in Italo. Flores rutilant hilari saturâque purpura, senis & septenis folioli constantes Liliaceis similibus vel Ornithogali, sed minus repâdis aut diuulsis. Semen in folliculo rubrum Erucæ magnitudine: gemini bulbi radici sunt, quorum habitior & corpulentior interdum superior inferiori incumbit, interdumque hæc inferior maior & languidior Vere exacto iam efficta, pusculis pusillis bulbis propagatur Ornithogali modo coma fibrosa, subtus radicatur glutinosi bulbi & villosi inuolucro teguntur fusco, sapore non ingrato, acri, ad tumores strumosos & scrophulas tantè opis, vt nulla huic comparanda videatur, Recentiorum certissimis periculis factis. Arua & sata Norbonensis vero Gladiolo scaten, eoque cum Draba vulsam furculatores in proximam viam aut tramitem proijciunt.

HYACINTHVS GERMANICVS, Liliiflorus.

{ Germa. Blo Weizenblumen. }
{ Angli. our ladies flower. }

E GLADIOLO & Poëtarum Hyacintho noscenda est speciosa illa planta bulbacea Germaniæ notissima, quam propter florum pusillorum colorem purpureum, & diuisuram Liliij aut potius Asphodeli doctissimi quidam cum Fuschio Poëticum Hyacinthum dkuinabant: elegantia, magnitudine plausibilior spectanti, Iridis floribus gratia is notitum longè superat. Et reliqua illius effigiatura congruentior multò Dioscoridis Hyacintho quàm Poëtico foret, magnitudine etiam par, sed bulbi candidi, flores cærulei purpurei Asphodeli vel Ornithogali stellulis visuntur. Norbonæ môtosis arduis, Geneuæ, aut Heluetiæ & Germaniæ in campestribus & iuxta sepes nascitu r.

HYACINTHVS ANGLICVS.

Belgiæ Hyac. H VNC Anglicum nuncupare lubitum fuit, propterea quia nusquam terrarum germinosis saltus & prata vberiori scatent copia, quàm in Angliâ. Magna huic cum Germanico siue Fuschiano affinitas bulbi & foliorum, sed conspicua florum discrepantia: sunt enim his oblongi calyces Iesamini vel Filij ante patrem, cærulei, cæsiue, & interdum albidum extrema ora fimbriis stellatim reflexis dehiscetes plures è cauliculo nudo pedali niterentes, & inæquali situ penduli. Semen in folliculo her baceo atrum Nigellæ vel Cæpe, vt cæterorum Hyacinthorum.

HYACINTHVS AUTVMNALIS.

Dad. effig. de florib. leb. pag. 174. H VIVS effigiaturæ minimus, sed pulchellus, quem primi omnium Autumnalis donatum nomine Antuerpiam è Veronensi agro missimus Guilielmo Driesch. Plurimus postea etiam Lutetiæ Parisiorum, Norbonæ ad Aquas Marianas, & ad Cellam nouam MonsPELLIJ visus nobis glareosis asperis, Autumno ineunte, non Vere, vt superiores, non flosculos lagenosos edit, sed radiatos quinis senisue foliolis cæruleis Ornithogalli minoribus, cætera prorsum eadem, sed minora.

HYACINTHI ORIENTALES GRÆCI.

Effigies. Moly. A NNO 1562. Patauî primùm vidimus, donôque accepimus hæc duas bulbosas, vna cū bulbo Homerici Moly ab insignito celebri eruditionis laude Doctore Trevisano, que tum inter se multum similes erant, tum illi Anglico non ita diuerse: è floribus tamen discernuntur, alter enim est crassior, breuiore bulbo & flore, qui sunt veluti vtriculo violacei cærulei vel albi Anglici Hyacinthi, vel facæ medix vel albæ similes, rariores & à medio caule ad summum vsque hærent. Bulbus aliquanto crassior quàm Anglici, & Moly Homérico par.

ORIENTALIS ALTER

ALTER verò bulbus non dissimilis septū caulem pedalem attollit, à medio totum floribus siue caliculis in speciem comæ elegantis digestis, purpureis alias albis Asphodeli Galenici, siue Ornithogalli spicati similitudine & situ. Ambæ quadriennium, quinquenniūmue durarunt Antuerpiæ, quas in Belgio infosis bulbis seuissemus: in delitiis Adonidisque pensilibus horti alunt veneti.

HYACINTHVS COMOSVS Diosc.

QVAMVIS sit difficilis notiois verus Hyacinthus, tamen propterea quia coma *Neotericoz. 39.*
incurua floribusque plena purpureis descripsit hunc Dioscorides, Hyacinthorum classem à superiore seceruimus, ut quem putamus magis ad Diosc. Hyacinthum accedere, huicque proximè subdidimus, quia similimus etiam est, nisi quòd illi sponte frequentius Septentrionalibus regionibus, hi Meridionalibus lubentiùs florent. Siquidem Italiz, Norbonæ, relique etiam Galliz tepidiori abundè in satis & viarum marginibus prouenit maior Hyacinthus, folijs portaceis, bulbi Vomitorij latioribus, in terram reflexis, caule laui albicante ex herbaceo tenero, quem à medio summo tenuis amiciunt numerosi flosculi spicatum confertimque digesti, purpurei oblongi in tantillis pedicellis vix gygarta aut Lauendulæ flosculos imitantibus; superneque comosam umbellam latiusculā, circinnatam deorsum vergentem, nutantem & incuruam efficientibus, ex purpura violacea suauis rubore permixtā. Radix Capacea fermè quanta Narcissi, sed exitimus color nitidus illi roseus dilutiore purpura, propter quē *BVLBINAM PLINII* siue *BVLBVM ESCULENTVM* exercitatissimi quidam Monspellenses autumabāt, alij verò *PANCRATII* speciem: quia minorem iam describendam veriore putabant.

*Bulbus
esculentus,*

Bulbina Pl.

HYACINTHVS COMOSVS MINOR.

*Pancratium
alterū Monspel.*

EST siquidem hic toti Meridiano tractui multò frequentissimus, & Septentrionalibus in hortis tantum. Vere (quum superior floret) ornat hæc planta editiora, agrorumque margines herbidos, flosculis item venustis inque comam perspicuam per versus spicatam digestis lagenulas numerosas & admodū exiles confertim aggestas, & patulas ostentantibus, vnde vulgus Prouincialium *Barrelets* vocat, quasi lagenulas: cauliculis est sesquipalmum altis, folijs Iuncea tenerioribus, sparsis, striatis.

*Neoter. 19. Dod.
170.*

NARCISSI.

- Mediolanensis mediocrocus Poëticus.*
- Luteus totus Theophrasti.*
- Luteus Africanus, an Bulbus vomitorius &*
- Purpureus ceruleus.*
- Narcissus*
 - Norbonensis Lilionarcissus luteus.*
 - Non descripti duo Math.*
 - Leucum arcissus siue viola alba Theoph.*
 - Narcissus Herbaceus Plinii.*
 - Tulipam Turcicum siue Lilionarcissus flore rubro.*
 - Tulipan. Turcicum siue Lilionarcissus luteus.*
- Crocus.*
- Crocus sylvestris Monianus flore albo.*
- Hermoadactylus flore Purpureo siue Ephemerū & Crocum sylvest. vulgi.*
- Hermoadactylus siue Colchicum flore albo Anglicum.*
- Colchicum Syriacum & Alexandrinum.*
- Ephemerum non venenatum Dioscoridi Lilisflorum & fridi solium.*
- an Tralliani, Pauli & officinarum Hermoadactylo idem?*
- Hermoadactyli albi & Rubri Nicolai, Almaris & aliorum, non cathartici sed cordi & venerique amici.*

Ornithogalon candidum, vulgare.
Ornithogalon Lateum, Bulbus Vomitorius Belgarum.
Bulbus cicuti.
Capa.
Capa oblonga.
Squilla, sine Capa maritima.
Pancreatum maritimum, Norbonense.
Escabretus Galis.
Capa Ascalonica.
Ascalonis.
Portium capitatum.
Portium scitile.
Schamoprasum.
Ampeloprasum seu Portium agreste.
Alliporrium, sine Scorodoprasum.
Allium Sylvestre gracile.
Allium latifolium maculosum, Serpentinum.
Allium latifolium Ursinum sine Moly Hippocraticum.
Moly Homericum.
Moly.
Lilium.
Lilium purpureum utrumque, sine Martagon, Chymistaron.
Lilium Sylvestre sine, Hemerocallis.
Lilium Montanum.
Lilium Cenuallium.
Satyrion Geneuense Erythronium.
Satyrion.
Satyrion Erythronium Syriacum.
Testiculiferae Orchides { *Canis, cuius varietates quinque.*
 Hircinus sine Tragorchis.
 Serapiades, cuius varietates quatuor.
 Oderatus minimus.
 Palma Christi due.

ΝΑΨΙΣΟΣ NARCISSI.

Germa. Narzissen Kosslin.
Fland. Spaensche Jeneetten.



EC HYACINTHO à luctu, ut diximus iam, nec Narcisso illi congeneri etiam nomen inuentum ab amante amante adolescente, ut fabulati sunt, sed à vi soporifici, quam *νάρκη* vocarunt, & *νάρκη* torpedinem, quæ eminus stupidam tangentis manum efficit, qualem inesse inimicam nervi, caputque grauante Plinius ac Plutarchus Narcisso huic affirmant. Notissimæ hodie non modò quot differentiz apud antiquos extant, sed multò plures, quas illi non memorant, inter quas nonnullæ, quæ ab Narcissidis ad Lilia degenerant.

POETICUS MEDIOCROCEUS *purpureus.*

Mediopurpureus Dod. 181.
 VULGATISSIMUS omnium Poeticus, cuius croceum florem videre est, *foliis mediis* *um cingentibus albis*, ut citè canit Metamorphosis, estque idem Dioscoridis Narcissus, Narbonènia Gallòque Provinciæ prata Liliaceo Stellarum candore ornans, Februario & Martio. Flores enim habet cādore micantes lacteo, sensu foliolis radiatos, corolla mediū occupāte fimbriata, ex croceo purpurascēte, odore suauissimo & verè soporifero, quasi quiddā Nymphæ florum redolēte, folliculo mēbranco ex nodulo exorto primū occlu-

occlusi in caule glabro rotundo, sed vtrinque compresso vel striato. Semē nigrum in vtriusculis mēbranis Nigellæ, multiplici tunica bulbus cōuolutus, & cute densa obfusus Pan-cratiij marini vel Squillæ admodū simili, sed minore. Folia sunt Porracea, mucore albidoplena, vti Hyacinthi, Cape, & Squilla. Hortis Belgicis, Germanicis & Anglicis inquilinus.

NARCISSVS MEDIO LVTEVS.

ET IAM pratis iisdem sed frequentius vberiorēque ornamento floret hic Narcissus, qui floribus est vno ex pediculo senis, denis, duodcuſue sparsis min⁹ candidis, & circinnato verticis calyculo in luteum languescēte, nigro foris & habitiore bulbo, crassioribusque folijs. Galloprovincia, vbi etiam sunt Gramini detrimento, *Dondu* flores quos corollis inneſcunt, vocitat.

Ded. 183.

TOTVS LVTEVS NARCISSVS *Montanus Theoph.*

{ *Germania.* Vehlblumen, Hornungsblumen, & zeislofen.
 { *Belgia.* Geel Tydeloſen.
 { *Gallia.* Coquelourde.

NEC diſſidet hic à Dioscorideis facie vel viribus, sed tantū floribus, quos admodū speciosos, luteos promit, atque quasi duplicati forent non corona exili, sed nolæ effigie Primulæ Veris duplo maiore, luteo atque insigniore cristatur vtriculus, non tanē dispar, vti nec folia aut bulbus, nisi quod graciliora, minora. Februario & Martio feetet isto forum Londini holitoriū, & nemorosa relique Angliæ Belgiq; prata. Ad Meridiē regiones propiores, vt Norbona, Vasconia, & Hispania, nō nisi editis montibus, & Maio, Iuniōq; florēt, vt in Veganiis, Mindenis Pyrenæis iugis non procul Tholosa, in odoris, ineficacior, nec perinde narcosim inuehit.

Ded. de flo 190

NARCISSVS LVTEVS APHRICANVS, *an Bulbus Vomitorius?*

HVNC quidam chyrurgus barbitonſor triremium Genuensium ostendebat allatum ex Bona, & Argiera, Chartaginique finitimis locis Aphricæ, planē floribus luteis languidis odoris, sed effigie Mediocrocei Narcissi Norbonensis, minoribus tamen, exilioribusque folijs & durioribus, min⁹ mucagineis, sed magis viticeis & sequacibus, & fructu contumacibus, nihil alioqui vlla sui parte à Luteo diſſidentibus. Non procul Athenis sinu asſeruant inueniri, etiāque ex Hispanicis nuper in Belgium & Franciam delatos audimus.

NARCISSVS PURPUREO CERULEVS.

QVINETIAM asserēbant non postremæ fidei amici, se nactos totis floribus purpureis Narcissos prope Lanum fluuium, non procul Monſpellio, quos tamen nos diu sæpēq; inibi & aliis adiectis pratensibus frustra venati sumus, aut studiosos Simplicium, & præceptores nostros, vt indicarent, rogauimus.

NORBONENSIS LILION *Narcissus Luteus Montanus Tulipa species.*

ERVITVM hunc è Dei Paradisij Iugis vocatis Scuenæ Norbonensis, iam plures sunt anni, in Belgium deferendum curauimus amicis Antuerpianis, qui primum Tulipantillum vocarunt, nos verò Narcissolilium luteum audacius forte (vti solemus quò rerum cognitioni distinctiori consulamus) indigitauimus. Flos itidem singulo bulbo & caule Narcissi minore, teneriore, delicatiorē, vnicus luteus, senis folijs constans ad Lilium aut poti⁹ ad Lilij lutei Asphodeli florem, filamentis luteis è medio enatis. Bulbus exilior multo, nucleum oblongum Allij æquat, sibi que sæpius adnatum allium exili filo adnatum habet: folia crassiora pauca è caule medio porracea.

Ded. Tulipa minor de floribus, 189.

LEUCONARCISSO LIRION *Pratenſe Vernum, nomen.*
 VIOLA ALBA THEOPH. *vel Moly Rodelletio?*

Ger. Weiß hornungsblum.

E. ij.

HVIVS

HVIVS coronariz bulboſe triplex è floribus & magnitudine varietas, nam Norbo-
genſis multiſſima, vt cæteris maior, ita multò ſpecioſior æmiorior floribus eſt: ſunt
Narcif. Mult: namque lacteo Ornithogali candore, ſed Liliū parui effigie, è ſinguli caulis ſuperioris mul-
tiplicis nodulo vno ſeni vel ſepteni procumbentes, ſemēque rotundum Pæoniæ nigrum
in folliculo membranæ cohibēt: folia & radices Narcifſi mediolutei in pratis, vel ger-
minofis depreſſis atque lacuſoſis ſcrobibus, non procul Monſpellio & Magalona ad La-
teranum dirutū caltrum plurimus floret, ſemēque ſceniſeciis maturat.

In Germania, Gallia & Belgia viſitur idem niſi paucioribus floribus diſtans,
quos non diſſimiles, ſed ſingulos in ſingulis cauliculis minoribus habet, luteaq;
filamenta è medio exerentibus, ſemine fuſco.

varietas Omnium minimus palmari cauliculo, etiam ſeprentrionalibus plagis, vt An-
uerpiz & in Nortmānia frequentiffimus, paucitate foliorum, quæ terna vt pluri-
mum, vel quaterna, habet, & flore exiliore, qui vnicus illi ineſt herbaceus lacteo-
lus, eoque nonnullis Plinii **NARCISSVS HERBACEVS** putatur, quod ſi ve-
rum foret, verifiſimile eſſet ſuperiorem **LILIONARCISSVM** eiufdem al-
buni nuncupatum, Narcifſum futurum: quibus cunctis nonnullæ ſubtus lineo-
læ exaratz herbidi viridantiſue coloris conſpiciuntur, vnde fortè Plinio cauſa
nominandi.

*An Narcif.
Herbaceus Pl?*

TULIPAN TURCICVM, ſive LILIONAR:
ciffius Sanguineus.

MVLTI ſunt exadi anni cum primū Macedo-
nium ſive Græcum Liliū iſtud Tulipan
à Turcico vernaculo dictū propter amiculum
capitis ab illis geſtari ſolitum, cui flores ſimiles
ſunt effigie, ſanè quāmluculenta purpura Vene-
tiis primū & Patauū vidimus, deinde **LUTEVM**
& Phœniceū flore Florentiz, & Genæ Lyguriz.
Bulbus eſt Narcifſi, folia promens Liliaceo læ-
uore virore, craſſitie, aliquatūm concaua cari-
ra & vndulatis oris, caulem verò ſingularem pe-
dalem & flore Liliacea venuſtate ſpectādū, pur-
pura ſanguinea nitente Pæoniæ floribus conco-
lori, Lilio rubro ſere pari, quinis & ſenis foliolis
craſſis, obtuſo calathi fundo in latius ſeſe pādēte,
veluti violæ Mariæ, porrectis è medio Liliaceis
ſtaminibus. Semen Ariſtolochiæ cſematitidis ſo-
lioſum anguloſum, compreſſum niēbræneo fol-
liculo oblongo clauditur. Medio Vere iā floret nō
modò Iralis, ſed etiā Belgici & Gallici hortis.

LILIONARCISSVS

PORPUREVS. LUTEVS.



NARCISSI DVO A MATH: non deſcripti.

CVLTVRÆ lenociniis hanc amatoriam plantā variatis foliis, floribus & bulbis poſſe
admodum à priſtina effigie deſciscere, & rumor eſt iamdiu apud Venetos quoſdā ſtir-
pium mangones, qui inditis bulbo ſeminibus quibuſdam, vel inſertis pullulationibus,
nouas & viſendas excitari figuras aſſirmant, cuiuſmodi Taraconè Cœpa enata, aliſque,
colorem, & florem, & figuram mutantibus. Eapropter conſultò alias Narcifſi varietates
reticuiimus, tū quod ne viſas quidem planè in memoria habemus, tum etiam quia nullū
operæ pretium ducimus artis oſtenſa & luſus proſequi: ſed dūtaxat naturæ opes in iſtud
album ſedulò digerere & perſpicuè, neutiquā Senenſem imitaturi, cui ſatis picturas, qua-
ſi puer pueris pingeret & illuderet, in numeroſos ſed mutos elenchos ſtabulare. Non ſo-
lūm enim nullum deſcribit è tam multis Narcifſi, ſed neq; diſcernit eos inter ſe, quos
bis inculcat, & an illi duo quorū alterum radice ſquammoſa & nucleis ſtipata, floribus
multiplicibus & folioſis: alterum veri Narcifſi Bulbo, ſed ſlorū foliis prolixioribus, an-
guſtioribus,

gustionibus, porrectioribus staminibus, nō explicat. Vbi & quando & quomodo nascatur artēne an sponte: vt neq; Narbonenses hīc alios flores, quos etiam vt non paucos alibi, fecit Cōstantinopolitanos, iactare potuisset; etenim eius Cōstantinopolitanus Narcissus, nihil aliud esse videtur, quā Maritimū Pancratium à nobis memoratum suo loco.

CROCVS SATIVS.

ῥέκος *Ital. Zaffrano.* *Gal. & Mauris, Safran.*
Ger. Safran. *Angl. Safran.*

GERMANITATIS eiusdem cum Narcissis esse Crocum docent, non modò figura & natales, sed etiam facultates peculiares, quæ vtrique epispasticæ, deinde quadamtenus odoris soporiferi insunt. Nec in Crocum versū adolescentis Croci fabella aliud Ouidius innuit, quā istam abdītā dotem Veneris mysteriis celebrem, cuiusmodi Poëtici Philo-
Inter Icones
Euseb. 249.
sophiæ sunt inuoluta, Hyacinthi, Narcissi, Daphnes & quā plurimorum transformationes. Nam alioqui ῥέκος flum, villūmæ, & tramam signat, cuiusmodi sunt Croci flaua flammeæ stamina, & villi & flocci quæ ῥεωιδες vocantur. Porro notissimum & optimū crocū nō solum regiones ad Meridiē Aphrica, Syrena, Syclia, & Gallia, sed etiā ad Septentriones sitæ Anglia & Hibernia laudatissimum abūdē dant carnosus, lætis, quasiq; oleo delibutis quorūque aureo nitētibz filamentis intensi odoris cum quadam acutē, sed soporiferi, quo Belgia, Germania, aliique vicini cibos condiunt, ac medicamētis miscēt. Rustici radices pangunt admodum viuaces cultūque humanum spretas, vnico hyacinthi Narcissi aut Gladioli bulbo carnosio, siquidem negligantur aut pedibus proterantur florem stamināque elegantiora prodere consueta purpureas calycis in modum, prorsum Hermodactyli pratenfis. Bruma, Ianuario, & Vere virent folia interdū perennia, Autumno leguntur dū nitent nutantq; purpurei phœnici stamina, quæ trita carpis aut sub māmīs adnotata, illitæ vires suas cordi cerebroq; illico transmittunt, quasiq; vertigiherni tenebricosam inuehunt aciem oculorū prestingunt, aut hebetant. Germinosa herbidaq; loca vult, nec apud Italos aut Gallos sponte prouenit, nisi Siluestris, qui diuersus natura est.

CROCVS SYLVESTRIS *Montanus flore albo.*

SYLVESTRIS Syluestri Autumno nisi rariū, sed plurimū primo vere venit flos minor, candidus, interdum purpureus, locis præsertim alsiolis, vbi perpetua perennat uix, vt in Ostensis vallis arduis sunt planities albicantes niue Hyberna & istius floribus purpurascētes & albicātes, non procul à Bernardi monte: radix & caulis satiuo similis, folio angustiore & breuiore. Isto foris dumtaxat vtendum, intus non perinde: illitum pubi vrinas elicit crebras atq; crassas, tumores Hydopicorū discutit, spicula euellit. Isto agrestis facilius abigeret è suis interculis pediculos gens Hibernica, nam virosior est, & penetratior. Verū vulgatior præterquam quod Hibernis miseris tam importunōs hospites, quætiis & famis hostes abigit, etiam colorem floridū, vegetūque calorem vigorem & animorū ferocitatem artubz & alit & auget, illuuiq; sordidas vestes colore commendat, miluiæ idcirco non parum conducibilis.

COLCHICVM sive STRANGVLATORIVM *Ephemerum*
Crociflorum & Bulbiflorum, Hermodactyli vulgares.

QUAM minimū videtur plebis iudicio Pratenfis vulgaris Hermodactylus Ephemerū dictus, à Croco syluestri abesse: vocant enim & putant vbiq; vulgò Syluestrem Crocum propter flores, natales, tempūque florendi non dissimilia. Ac tamēti tum ipse res, tum Dioscorides diuersas esse abundē monēt, tamen iuxta hīc ponendæ fuerunt Crocus & Hermodactylus, deindeq; huius vel species vel varietas Colchicum Ephemerum, quo vtrauis ambas ostendat quærenti. Etenim duas non ita dissimiles est complexus Dioscorides, vt Paulus & Galenus, ex Priscorum descriptione, & sua obseruatione: quorum primam post & proximē fungos collocandam duxit ille, cum quod esculenta gratāque cibo videretur, tum quia non secus ac fungi, vt idem author exprimit, disertē suffocatu enecaret, strangulat namque illa itidem vna diecula: vnde Theoph. huius nominis occasio profecta vīa, longē ante Dioscoridis ætatē, fuit. Hæc autē non alia est quā vulgarissimū plebi PRATENSE CROCV & SYLVESRE vbiq; vocitatum. Floret namq;

E. iij.

Gal. Tū cibum.
Angl. wild
Safran.

Effig. f. 249

74

vti Crocus Autumno flore perquam simili, cōcolore, nec chſpari ritu, iamdiu antea primo Vere orta, & Æſtate amittit folia quæ Porreis latiora Pancratii ſunt æqualia, vel bulbi pinguora, terna aut quaterna, virentia, nitentia ab radice, caule ſeſquipalmari, bulbola, ſemirounda radice, altera parte compreſſa Caſtanæ figura, aut Anacardi: foris tunica ruſſeſcente ex fuſco, ab ima latiorēque baſi ad apicem canaliculum imprimit prima caulis germinatio, intus tota alba, fungoſa, muccida, viroſa, guſtu non ingrata, quam quouis anni cardine erutam à quibuſdā Pharmacopœis pro Hermodactylo habitam vidimus, & ſiccataſ, ſlacidam, victam, rugoſamque, tangenti partim euanidam, partim fungoſam meminimus, vti & Syriacum & Alexandrinum mox deſcribendum venetijs nobis ſæpius viſum, denique nigram & longè diſcretu ſacillimam ab Officinarum Hermodactylis. Sunt enim peregrini hi, neutiſquam exitioſi, vt multis ſæculis plurimus vſus doctos docuit: inque farinam vel pollinem candidum ſacillimè abeunt. Nec veriſimile ſit, quod Colchide vberriſimè ſcatebat (vt ait Dioſcorides) aliud à noſtrate fuiſſe, ſed perneceabili Interimendi facultate cæteris omnibus excelluiſſe, tum quia ſucco magis excocto illic, tum etiam quia ſoli, æriſque prærogatiuam quandam naſtus fuit. Sic fungi non paucis locis exitioſi proueniunt, & niſi lacte iſſdem quibus Colchicum remedijs, euincantur, interimunt: alibi innocui paſſim eſtantur. Sic Taxus Norbonica & Hiſpanica deleteria ſola vmbra prodit antiquitas: in Anglia & alibi neutiſquam malefica. Cicuta & alijs idem vſu venit, vt nouimus alibi. Quapropter quot qualēque varietates in radicibus, floribus, ortu & colore, alia atque alia peperit regio, tales diſcretiſſas facultatum inter Syriacum ruſſeſcentem, & Anglicum flore candidum intercedere certum nobis periculo ſacito ſtat.

COLCHICVM SYRIACVM ALEXANDRINVM.

RADICES & bulbos aliquot huius adhuc habemus munere Dominici Chirurgi Veneti, qui quamplurimas claſſe triremium rediens illinc, vbi ſungebatur vulnerarij officio, à ſe auuſas Venetijs aduexit, quibus utebatur idem, eaſdēque ſæpe miſcebat decoctis Guaiaci, ad Lnem Veneream, aliſſque ſudorificis magno remediorum cōpendio & ægrotum comūdo, edoctus illic à plebecula. Huic bulbola radix non parum à noſtrati diſfert, tametiſ Dioſcorides declinationem non minùs benè refert: non enim canaliculus lateratim depreſſus mittit ad caulem, ſed caulis erumpens medium ſindit bulbum, quaſique geminum Colchici bulbum ab imo coagmentatum, caulemque vtrinque amplexatum oſtendit, nigriōrque noſtrati eua dit intus foriſque, alioqui è Cæpacea nec diſſimili fungoſa concrectione, vti nec totius figura.

COLCHICVM ANGLICVM candido flore.

ISTVD nuſpiam herbarijs memoratum, quia Anglia copioſiſſimum ſpontè fundit, nec alibi ſacillè perierat, Anglicum nuncupauimus. Perpulchra planta, lacteis floribus Ornithogali vel Alſphodeli maioribus, Croci montani Sylueſtris paribus, caulem ornant ſequi palmarè radix & folia, alioqui pratenſis vulgaris ſunt, foris fuſca, intus candida. Londini hortis merſæ radices Hyemè ferunt, Vere emergunt, non ſecus ac in collibus & montioſia prope Briſtoliā & agro Sometſeti, Syluoſis ornatiſſimi armis & literis Generoſi nec parū ſtirpium periti, D. Eduardi Samlooo, cuius humanitati, vt pleraque alia, hanc ferimus acceptam.

*EPHEMERVM non venenatum Dioſc. Lilloſorum, & Iridioſorum æl.
HERMODACTYLO Officinarum, Tralliani & Pauli idem.*

VELVTI Syriacum innocuum medicamētis, aliſſque non paucas plantas varijs locis diuerſas aut contrarias adipiſci facultates dudum in Colchico monuimus: ſic ex nomenclatione delinationēque vtriuſque Ephemeræ apud Dioſcoridem, & perpenſione harum radicum, quaſ vſus diurnus diurnuſque probauit, Hermodactylum ſiue Ephemerum ſalubre, dote duntaxat & leuiore aliqua nota, non item ſpecie ab Officinarum hermodactylo diſſidere certū. Tria tamen quæ obijci poſſunt, partim diluenda, partim diſtingenda ſunt, vt ſaltem doceamur, ſi non illa quidem eadē ſunt, certè admodū aſſinia eſſe

esse: Ac primùm obijciat quis factam seorsim Hermodaetyli & Ephemerì vtriùsque mentionem apud Trallianum & Paulū : fatemur, & arbitramur eos vel quòd vires purgatrices primùm in Ephemerì aliqua specie cōpererint, aliam arbitratos præsertim Trallianū quē Paulus citat, non Galenū, qui Hermodaetyli non meminit. Vel quia Trallianus Ephemerum non venenatum sub nomenclatura Hermodaetyli in remedia arthritica adduxerit, quia in describenda radice Dioscorides digiti siue Daetyli voce vsus sit, quæ admota vel fotu dentium mulceret dolores, deprimeret, tumores, quod Officinarum Hermodaetyli arthriticis adeo plenè præstant, vt nullum præstantius suppetat, ex lacte præsertim subactū remedium. Quippe digerit moderatè nullo aut pusillo calore, aliquanta adstrictione, sed miti emplastica & natium calorem parti reddente. Nec si non meminit Dioscorides vis Catharticz, non ideo necessum iustificandum Ephemerum esse: non pauca siquidem reperiuntur apud antiquos classici Simplicia, quorum vires purgatrices illi siuerunt, ne dicā fortè nec notas habuerunt, vt & alia compluria: quare si non est Ephemerum Dioscoridis noster Hermodaetylus, certè non alio putarim differre modo, quàm quo Colchicum Anglicum & Syriacum. Quare ridiculè æstuant cum Comentatore Senensi plerique, atque doctis Barbaris insultant, qui Officinarum Hermodaetylos purgationibus miscant, enimuerò arrodere interiora, veneno petere, ac nihil aliud quàm Colchicum nimirum deleterium esse. Verùm bis falluntur: & quod Colchicum hermodaetylon nostrate esse dicunt, quum tamē folia non norint, quæ longè minora sunt & humi fusa, quàm vulgaris Colchici: & quia statuunt necatorium, quum Dioscorides id maleficij non cūllet Ephemero, sed Colchico dumtaxat, id est, in Colchide enato, adscripserit. Tum Solidæ huius candidæque tadicis & plenæ concretio, quantum à rugosa, vieta, languida, nostrati & nigra absit satis indicio est. Nullam videas etiā Venetijs, vel Genuæ millibus è multis quantumvis recens allatam, quæ non leuiuscula tusione illico in puluerē farinaceum fluat, colore & sapore planè Turbith, Iridis, vel Agarici, quo etiā modo nec incommodo maiore purgare norunt, qui sæpius vsi sunt nostri practici, quibus vsque dum experimento certo certa ratione nixo, aliud vsurpandum, aut frustra Constantinopolitanum viribus ignotū obtruserit & persuaferit Commentator: & falsò accusarit Serapionem, qui non Pauli, sed Dioscoridis, vt liquidò constat merus versor, quæ in codice antiquo teperit, fida barbarie tetulit, vt alibi semper fermè Hermodaetylon explorādo gustu neutiāquam feruidum, sed ignaui acrimonia pusilla, & vi obruta emplastica potius facultatis purgatricis moderatrice, quàm vlceratrice, quā non parum commodum esse arthriticis purgationibus facillè percipiant, qui medicamentorum miscendorum methodū callent. Nec enim lacte eget vt Turbith, quo minùs adhuc noxiom, quare & Catharticum non repnuendum, vt vociferantur declamatores sed commendandum.

HEMODACTYLI albi, Rubri Nicolai, Aluuarij & aliorum non Cathartici, sed Cordi, Venerig, amici: an sint Behen albus & Rubrum eadem?

VOCEM Hermodaetyli æquiuocam fuisse, & Ephemero Dioscoridis cōparari potuisse, nō modo Caput Pentaphylli indicat (vt cuius tadix Hermodaetylus sit vocata, nō tam similitudine, quàm superstitione & incantatoria expiatione) sed etiā quæ extat apud Actuarium & Nicolaum celebres admodum compositiones arguunt. Quippe Auteam Alexandrinam reginam illam & Diamoscu Hermodaetylo rubro & albo non carent, misceturque alijs apud Arabes compositionibus cordialibus, quibus sunt visi designasse Behen albi & Rubri nōmine, quod etiā defluxisse à Daetylite palmæ fructibus, quibus confert Dioscorides Balanū nucem myrsiticam apud Arabes Ben vocatā. Igitur Arabistarū Hermodaetylus siue sit Behen, vt verisimile sit, siue sit Auicennæ Digiti Citrini Palma Christi (cuius mentio inter Orchides facta, nullum enim Hermodaetylon rubrum habemus, vt cum Rubro & albo Ben confundi possit) eorum compositionibus cardiacis præsertim miscendus: Officinarum vero Catharticis & Topicis vti dictum, capite de Bea & nuce Myrsifica.

ORNITHOGALON candidum vulgare.

EBULBORVM classe cum sit Ornithogalon nec ita ab similibus Hyacinthis, Narcissis, & Hermodaetylo superiori floribus albis, non abs re hic dicendus, vt hinc mox ad

Eliij.

pulbor

Bulbos veniamus, cuius speciem faciunt quidam Ornithogalon luteum vocatum, propter inter hunc & illum ambiguum effigiem. Et tamen Ornithogalo nomē dedit lacteus florū candor, cuiusmodi in Gallinarū alis renidet aut ouis, non earum lacte (quo carent volucrium genus) tamen propter totius figuræ affinitatem nobis erit etiam vocandus alius, qui flore luteo elegātissimus, nec ita frequēs Italix, Norbonæ calidioribūsq; vīsitur.

ORNITHOGALON LVTEVM.

an Bulbus Vomitorius?

Belgic Bulbus
Vomitorius.

IN Auernis & ad Lugdunū pomæria pone & prope suburbium trans Rhodanum vulgo *Aignulietiere* in campis latis & glareosis, etiāque in Borbonio agro, quā ducit regia via Lutetiam, plurimūque Belgic, Angliæ nemorosis Sommerfeti Ornithogalon luteum collegimus. Tota planta minor multo, sed simillima candido Ornithogalo. Martio floret, bulbus vnicus, vel plurimum Allij Scorodoprasi oblongior, inodorus, pauciora sed latiora quā Ornithogali folia: flores prorsum Ornithogali sparsi, & quidem foris herbidi, vt Ornithogali, sed luteoli non candidi, intus verō eleganti luteo nitent.

BVLBVS ESCULENTVS.

NON fecus atque Asphodeli bulbi plerique omnes edi mortalium luxu & mollietate deficiē, præsertim Europæis regionibus, seu fuerint gustu minū cōmendabiles aut vtilēs, quā bulbacea multā, Porri, cepæ, Allia, & similia. Viscidi namq; sunt mucro Pancratij omnes fermē quos nonimus, & plerique insulsi & magis excipiēdo condimēta, vt hyacinthi multi, Galenicus Asphodelus, quā ad condiendū apti. Quando igitur ex Dioscoride coniectari magis, quā asseuerare quicquam licet, videntur bulbi esculenti fuisse capis aut Pancratis simillimi, & præstantiores russi, acres, locis calidis oriundi, vt sunt Lybica littora vel Norbonica. Ascalonicum tamen vix est Cape, nam nec russum vt plurimū, nec acre, saltem vbi nos sæpius esitauimus Lutetiæ & in Flandria, fieri tapotes, vt Ascalonē fuserit acris, russius & maius.

Bulbus ille rubida foris tunica, quem Hyacinthum fecimus, alias putauimus persuasi à doctissimis Monspelliensibus esse esculentum bulbū: quemadmodū hodie nonnulli luteum Ornithogalon nostrum Vomitorium Bulbum credunt.

CAPE.

{ It. Cipole. { Angl. onion. Belg. ayeuyn.
{ Ger. zwibel. { Gal. oignon.

Ensch. lco. 242. BVLBORVM, quantum vsipiam est in naturæ ditione, speciosissima & notissima Capa, vel de Græca appellatione *κεφάλιον* dicente, quia oculorum tunicam pupillamque & folliculos mordaci vapore lancinando, conuiuere, contrahi; cogat, lachrymas eliciēdo, vnde Latinis lachrymosa Capa. Etiamnum hodie varietas è locis, colore, magnitudine, acrimonia, ténacitate, variōque mangonio petenda, fermē cuiusmodi Theophrasti & Dioscoridis æuo. Verū non necesse habemus persequi plures, quā quot hodie nouimus insigniores & digniores vel esu vel fama, quibus cuius olitori quaslibet alias addere integrum per nos erit.

Suauitate & mole omnibus Italicis vel Gallicis, quas nouimus, excellunt Aphricæ ac Hispaniæ, & Hispanicis maiores atque speciosiores Diui Altomari in Gallobelgia satiat, quibus prima commendatio, & magnitudo capitis exuberantis, compressæ vtrinque rotunditatis rapam non mediocrem æquantis. Squamosa cuticula, extimisque tunicis sanguineo saturo colore rubentibus nitentibus, & nihilo secius esui Flandriæ, & Angliæ cunctæ, aliisque Septentrionalibus expetitur: ad quas tamen gentes asportantur quotannis Hispaniæ pō minore copia, aut cōmédatione quæ partim albæ, partim purpurascētes, gustūq; aliquātō aciores, pares ténacitate & mole, cibus & cōdimētis quā medicamētis aptiores. Cæterarum omniumq; nūspiam non gentium in Italix Hetruria, Germania, Anglia, Gallia vasconia prouentus plurimus hortis olitoribus venit, & vt quæque ad hauri bonitatem proximè accedit, ita optima habenda. Omnibus eadem facultas incidendi, & lachrymas ciendi, non odor insuauis, sed vapor & sapor intentior, aut

aut miior nonnullis, quemadmodū *MAIOR* & *MINOR* *BYLEVS* *OBLONGVS* teres, orbiculatus, & turbinatus quibuscū plurimus verò & cōmuniōribus capis à caulis ceruice senfim in cōpessam latiorem, sed à lateribus reductam vtrinq; circumferentiam bulbaceam abeuntibus, quorū *Bulbi* vmboni fibrarum numerosa coma aptata subest, *Hellebori* albi modo, quod *Capis* omnibus cō mune, vt folia *Potreaea* cōcaua glabra, nitēsq; caulis vacuus, & flos in cumulo villosio purpurascēte, senine copioso nigro *Nigellæ*.

SCILLA

SCILLA, siue
CAEPA Marina.
PANCRATIVM.

Ang. Sea onyons.
Germa. Meerzwibel.
Hisp. Cebolla albatrana.
Gall. Oignon marin.

CEPACEO generi tantopere est cōpar *Scilla*, vt multi eam *MARINAM* *CEPAM* vocēt. Quia autem inter hanc & marinū testaceū piscem à tunicea squammarum cōpactili serie *Squillam* vocatum, tanta similitudo intercessit, hæc putatur sic dicta. Potuit etiam à fabuletis maritimis Sole torridis, cuiusmodi sunt in *Hispania* & prope aride *Lusitanie* tesqua maritima. Huius duas differentias colore dumtaxat inter *Hispanicas* tā nultas animaduertere est, quarum extimæ tunice vni rubent, vt *Capis oblongis*, alteri albēt, magnitudine pares. Vtrius maxima *Pomū Assyrium* nō superat: è tam multis autē millibus, quæ quotannis tum *Venetias*, tum *Antuerpiani* deuehuntur, nullam meminimus maiorem, ea quæ lata & perbellè adulta fuit *Monspellii* in horto *Iacob Farges Pharmacopœi*. Vniuersa namque folii carina vel dorsum palmum fermè lata, pedem farges, crassitudo minor quam *Aloes*, crebra è bulbo pullulant squammatim compacta, caulis sesquicubitalis, gracilis, flosculos *Fragrariz* gerit similes sed minores, in spicam postremo deficiens.

Fusch. Iov. 413

Neutiquam mirum *Mathiolum*, post alios neotericos nuperos, sententiam de *Scilla* mutasse, cum nunquam sibi genuinam visam, sed tantum verbis depicta fateatur. Quinetiam si verum *Pancratium* vidisset, nunquam pro illo speciem *Scillæ*, aut potius vietam plantulam aut adolēcentem, cuiusmodi *Venetis* vneunt, subdidisset. Et foliorū gracilitas, à qua se deceptum conqueritur, sanè non aliam speciem constituit *Scillæ*: sed tantū cōtingit habitiora & maiora adolēscere folia, mutatione cœli, soli & cultu. Sic *Cypis* euenit angusto interiecto tractu, sic in foliis *Aloes* & aliis multis obseruatur. His verò bulbis flores, folia, omnia prorsum similia, aliquanto dumtaxat graciliora, vt bulbaceis multis præproperè enatis & aliò transplantatis euenit. In cōignatione suspensæ, dum sabulo merguntur, aut seruantur languidiora promunt folia, & succo seu pabulo cōsueti defraudantur, exilioraq; sunt. Ratio par in *Scillis* tuis pusillis, quas *Pancratium* astruebas.

PANCRATIVM MARINVM.

VT Panaces doloribus placandis, sic ad cunctos morbos affectus profligandos promittit auxiliū benè ominata nomēclatura *Pancratii*, quæ tamen *Scillæ* species maritimūsq; bulbus est. Siquidem plurimū toto littore illo, ab *Aquis Marianis* ad vsq; *Norbonæ* vrbs maritima, sæpius vidimus & eruimus. Radix *Scillæ* cū maxima, quanta maximi *Lilii* aut *Arancii* vel *Limonij*, cortice *Cepæ* obtecta pullo, intus candida *Scillæ* modo. Sabulo arido vndis alluto merfa sesquipalmm altè, folia septena vel octona indidè erumpunt, rigidula surrecta, latitudine & crassitie *Iridis* ferè, nigriora, summis retusa non acuta. Caulis cubitalis crassitie *Asphodeli*, sed tenerior, qui extremo flores ternos quaternosue cādidos *Liliaceos* *narcissi* lutei modo promittit, qui defluentes relinquūt siliquam



oblon-

oblongi, Aristolochiz Clematidis similitudine, & semine compresso, sed nigro. Radices his omnibus albz, non rubrz, quod accidit regionis situ & Superum aspectu, vt in floribus Rhododendri, foliis Cyclaminis, vitis, Caulibus, Atriplicibus, Betis, bulbis, Capis, & Scillis istis Hispanicis, vt Pharmacopœi Antuerpienses satis norunt. Littoris incolz piscatores & prædones raptu interdum visitantes, rati hanc esse Cape, voratam ex sale & pane, quantum famelici, hanc nausebant.

ASCALONITIDES, antiquorum Efealotes Gallici.

ESCALOTTAS Gallicas, quas antiquorum Ascalonitides, siue Palestinas cæpas arbitramur, peculiarem quandam naturam vel figuram habent, vt etiam Theophrastus monet, siquidem, ancipitis & dubiz naturæ inter cæpam, Allium & Porrum, similiores tamen cæpis, sed multo minores sunt, & crudi in lentaculis lautiores frequentioresque: capropter francigenæ *Appetis*, vocitant, quia edendi cupiditatem reuocent. **BULBUS** fortè **SETANIVS**, quem Theoph. & Pl. Cæpe genus quoddam testantur.

SETANIVS
Bulbus.

SCHOENOPRASON.

{ Belgis. bieflaech. }
{ Ger. Bintzenlauch, non Baislauch, quod est sectile.

INCEA illa, quam perperam Commentator Theophrasti Ascalonitidem siue Palestinam dicit, minima sesquipalmi alta est, pusillis Porraceis bulbis oblongis sectilibus simul coherentibus & implexis pullulat, & sata fasciatim magno semper stipatu capitulorum Allij vrsini modo prouenit in hortis vbique, adeoque porrum effigiat, vt quibusdam veri Porri non solum vicem expleat, sed opinionem faciat, flore perpusillo Iunci vel cæpe. Crudæ huius folia acetariis gustum gratissimum addit. Bulbuli, qui ex utris tunicis, vnioues imitantur, videntur apud Gallos nomen secisse cæteris capis, quas illi *Oignons* vocant Germani *Bieslauch*, quasi Iunceum Allium vel Porrum.

PORRVM CAPITATVM & SECTILE.

{ Angl. Leek. }
{ Ger. Lauch. }
{ Gal. Porreau. }
{ Belg. Parage. }

PRASIVM à colore dictum Græcè, & Latine porrum à callosa Porri capitis simillima in ossibus ferruminatis concretionem coniectamur. Non modò est hic bulbus Cæpaceæ affinitate, sed etiam cæpe, tunicarum inuolueris demptis, interius capitulum cor vocatum refert: nec foliis, floribus, caule, aut semine, quod tamen est pullum, differunt. Sapor idem & facultas, sed mitior calor, esus in olere frequens vbiuis.

Holitorum industria in **CAPITATVM** & **SECTILE** diuisit: istud Capitatum porrum vocans: illud quod sæpius ad culinaria iuscula detundi solitum esset, Sectium vel tunfile dixit.

SCORODOPRASON, siue ALLIPORRVM.

VT vocabulo sic effigie Porri atque Allij mixtam plantam signat Scorodoprason, quod sanè non admodum abliudit ab Ampelopraso vel natalibus, vel facultatibus & lineamentis, magis tamen spirat allium: sed exprimit proprius Porrum, ni memoria labat, quod in clinosis vinetis & incultis ericetis Lygurum, Nicæque Sabaudia spontè natum meminimus.

ALLIVM

ALLIUM Satium, vel domesticum.

{Anglicè, Garlicke.

{German. Garten Knoblauch.

KORODON adeo nobilitatur odor, sapor, efus, virêsq; medicatæ, vt nulli non S fuerit semper notissimum. Vibrat namque halitum quendâ æstuosum, atq; tardiosam *Fusch effig. 428.* acrimoniam faucibus inurit, edendo: vaporêsq; excrementitios ad cutem pellendo Pandiculationes vescentibus mouet, quas Græci ideo Σαρδαμωμὶς indeque Scordiô vocarunt. E Capaceo genere, cui accensetur, facilis dignotio: etenim gramineû capaciûve folium, flos & semen in caule inani, tereti, bulbo exiliore emittitur, foris dilutè purpuratibus membraneis cuticulis, nucleos multos vnâ coactos spicatumque coagmêtatos inuoluentibus, è quorum medio vertice fibræ tortiles & graciles porriguntur terræq; inferuntur.

ALLIUM SYLVESTRE tenuifolium.

{German. Wilder Knoblauch.

{Angl. wilde Garlicke.

FRIGIDIS calidisue pratis, macilentis & aruis Syluestre passim oritur inuisum alicubi, vt in Brabantia & Francia colonis, quia segeti innatum tritico prauum odorem & saporem cômunicat, quo deinceps tum farina, tum panes imbuuntur. Pusillus, oblongus *Fusch. 129.* bulbis, non ex nucleis constans, sed vnico læuique capitulo, nonnullis interdum adnatis minoribus sese propagante: luncea pauca foliola in gracili, tenui, pedali caule: flore & semine cæteris non dispari.

ALLIUM VRSINUM Latifolium, suo Moly Hippocraticum.

{German. Waldknoblauch.

{Angl. Ramps.

NORONÆ in editis syluosis, Franciæ verò & Angliæ vmbrosis vel vdis pratensibus *Inter Icones Fusch. 431.* frequentissimum, magis tamen odore quàm habitu præferens Vrsinum Allium vocatum, quare Moly Hippocratico suffecimus, Liliî cõualliû vocati est fermè foliis, minoribus, viridantibus, flaccidis, politis in tenellis caulibus, Hyacinthi minoribus. Flores lactei, stellati complures Ornithogali vel Asphodeli, bulbis aliquot nucleolis oblongis sparsis candicans odorem Allii tardiosum spirat, gustantique saporem acrem, non ingratum præbet. Vires Theriacales & imminuentium morborum hostes inibi diximus.

ALLIUM LATIFOLIUM MACULOSUM

sive Serpentinum. OPHIOSCORODON.

ORTV & habitu non ita huic absimile, Ophioscorodon dictum à caule, foliisq; Serpentariæ modo maculosis, quæ tamen proximè Vrsinum deliniant & redolent: radicis ceruice longiore, rimosa cute obrita, montosis oriunda.

MOLY DIOSCORIDEVM PVTATVM.

MOLIRE, amoliri aut propellere morbos origine Græca τὸ μάλλιν τὰς νόσους dicebant antiqui, vnde μάλλιν vocabulû Superûm nutu & ritu Deorum inditum plantæ Poëtæ canunt: *Moly vocant superi, radice nigra tenetur.* Verùm illud non vni, sed pluribus postea accommodarunt plantis, vt insigni quopiam odore, vigore, & figura non ita dissimili, donatis, vt Rutæ Harmalan, siue syluestri, cui radix nigra, flos candidus autore Dioscoride. Peculiare tamen fuisse certum est plantæ bulbosæ, Alliiq; similiori iudicio est μάλλιν, quæ Hippocra. Galeno explicante, aliisque Græcis Allii caput, est & antiquitûs celebris ad venenata, adeoque fascinationes, non secus ac Moly, cui fortè nomē mutatuû est: nam Dioscorides inquit habere quippiam in cacumine Allii figura, præter reliquas.

liquam similitudinem, qualis videtur ea quā Itali patauini & Bononienfes iamdiu, nunc etiam Belgæ geminā Moly speciem alunt, cui bulbus exiguus, oblongus ferme Porni al-bicans, Triticeis aut Gramineis folijs, flos in caulculis cubitum altis lacteus Ornitho-gali aut allij vrsini æmulus, semen in filiqua, istud Dioscoridis faciunt.

M O L Y Liliflorum Homericum fortè.

HOMERICVM verò putant alterū quod bulbo donatur, Narcissū, Caprée Ascalo-niticum æquans. Folia illi Porri vel Pancratij minorā septena octonāue: caulis ses-quicubitalis aut bicubitalis: flos candidus & Lilij figura, sed minor: hūc nos donarat Ircuisanus Patauinus Doctōr.

HIPPOCRATIS Moly in Alio Vrsino.

*Angl.
Ramonis.*

AN Sit allium Vrsinum Hippocratis Moly, cuiusmodi Galenus interpretatus videtur, haud certum est, certum est tamē mulierculis Anglis, ineunte præsertim Vere frequēs cistari & quasi amuletum non modò corporis aduersę valetudinis, sed etiam falcinatio-nis auerruncandę auertendęque causā præsumi, tametşi intinctibus non vulgarem inuit cum plebecula gratiam.

LILIVM CANDIDVM.

Κρίνον

*Ital. Giglio.
Gall. lis blanc;
Ger. Silgen seu lilgey.
Hispa. Lario blanco.*

EXIMIVM florum par & ἄθος ἄνθεον vt Græci dicunt, Rosa & Lilium, quod etiam cecinere Veneris gaudiū voluptuę & Iunonis Rosam: vt è cuius lacte effuso Galaxia via siue lactea in æthere, Lilij aut flos sidereo candore visendus in tellure diuinam duxe-riunt originem, cuius indicium esse perennem illam ῥοήν ἐκφυλάττω, diuini, quem ha-bant, odoris, vnde Rosę vox & ῥοήν ῥοήν suauē, blandum aut concupitum sonat, complu-ręque flores & bulbaceas herbas notat, vt Narcissos, hoc tamen nomine signatur per-quam nobilis flos Francigenis sceptris auspiciatissimum Symbolum, intaminati candoris fulgens honoribus, sapientis Solomonis folio insidentis gloria magis conspicuus. Reo nāmque caule & erecto Hastulę Regię, bulbo nucleolis squāmatim compacto, floribus concolore. Folia pallido virore nitentia, carnosā, secundum longitudinem striolas ha-bentia, rotundus caulis cubitalis in cuius summitate Asphodeli flores aut Croci, sed ma-iores, candidi, odorati, senis vt plurimum foliolis dispositi repandis, effigiem quasilli vel nolę exprimētibus, fibrę è medio Crocęuē stamina educūtur, vt in Colchico: vniuer-sa planta mucagineo turget succo, immensū tota commodi medici, estque vna è bulba-ceis notissima.

LILIVM Purpureum utrumque siue Chymistarum Martagon.

*Ital. Giglio Rosso.
Gal. Lis orangé.*

COLORES Lilio candido quęstos mangonio fuisse & si ex Rei Rusticę scriptoribus Plinius asseueret, tamen purpurei lilij duo genera spontē non arte oriri cum Dios-coride quā plurimi montes hodie testantur. Verum nihil ab illo prorsum disidere vi-dentur nisi angustioribus, longis, obscuriūque ruentibus, & numerosioribus, quibus do-nantur folijs. Nec flores dispares à candidis, sed hilari in flauum coruscant purpura, non-nullis rubiginosis maculis aspersi & lineolis intus nonnullis inscripti, vt in iride: bulbi etiam similes, sed luteoli aut pallentes.

LILIVM Purpureum minus.

EADEM

EADEM fermè, sed minor, minorique elegantiâ hæc purpurea planta, paucioribus floribus, Liliij diuisura, & bulbis iisdem, infra, supraque quos appenduntur fibræ plufculæ.

LILIVM MONTANVM.

RADICE ac bulbo haud abfimili Liliū frequens montibus oriundum, sed caulis procerior, quàm Purpurei liliij minoris: è geniculis folia exerens stellatim Gentianellæ magnitudine & figura Liliij, purpurei item flores vel asphodeli, sed ad extrema pediculi apiculis reflexi, vt in Cyclamine. Color ferrugineus, pusillis variis notulis, purpureis staminibus concoloribus foras prodeuntibus, & reflexis deorsum.

HEMEROCALLIS, sine Sylvestre Liliū.

Gal. Giglio saluatico.
Gal. Lis sauage.

SI cui libet accuratiùs expèdere Liliū & Hemerocallidem, cèrtò constabit nihil Saliud quàm illius speciem esse hanc, quâ idcirco Sylvestre Liliū, seu Coronariū vocarunt, liliique vires eadem fermè omnes illi reddidit Dioscorides: quin valdè verisimile fit, quod Liliū Purpureum in Syria orti auditione acceperat, vnum saltem ex hisce tribus hic descriptis fuisse. Nulla igitur magis accedit Lilio aut Hemerocallidi Sylvestri, quàm primum illud Puniceum, seu Phœniceum, purpureūmue, cuius etiam bulbos eadē posse, quæ Dioscorides vult, scimus: idq; vocitarūt meritò *ΒΥΛΕΥΜ CRYENTVM*, flore Liliaceo & Purpureo Hippocratis, eōq; vertendum non pallidum valdè, sed ochreū, cuiusmodi videmus in Ochra saturati lutei, quæ purpureæ aut phœniceæ Anagallidis colore visitur. Hinc sedulitas & candor Commentatoris Senenlis, quantus fuerit, meminisse iuuabit, qui vocis huius ignarus, plausui magis, quàm cognitioni verè studēs, phœniceum Liliū valdè alioquin notū, dicit esse colore perquam pallido, Dioscoride falsò teste adducto. Ecquis color est perquā pallidus, nisi sit albus, cui proximus pallens aut pallidus? Leuiusculi momenti est argutatio illa de appendiculis & florū numero, quæ nonnulli desiderare videntur. Sed si quis animaduertat Liliū candidum interdum exortus istos facere, in quibus cōplures flores congesti interdum singuli sunt, non magnopere refragabitur. Cæterum folia quod longè plura purpureo isti inesse dicunt, id accedere cultu verisimile fit: quippe purpureo vtrius & montano multò pauciora sunt. Eoq; si cui horū vtrumuis magis pro Hemerocallide allubescit, per nos liceat sane, quia nescio quid tetri aut virosi halat. Quod huius vero florē Atheni cōiuiæ tabescere Sole cadēte & rursus oriente pullulare dixerint, sic accipiendū: non quidē prorsum marcescere aut defluere, sed occurso humentis noctis & frigidiusculæ contrahi collabique in sese flores, qui proxima luce & radiis Solis collustrati, explicantur, & quasi reuiuiscunt, veluti Tragopogo, Solisæquis & Heliotropiis cæteris accidit.

LILIVM CONVALLIVM, vel vernum. Theophr.

Germanis. Mergblumlin.
Gallicis. Grand mugnet.

ITIDEM hanc peramœnam aspectu & odore pusillam herbā antiquis Græcis indiçtā, Liliū Conuallium vocauit recentior ætas, putaruntque quidam Liliū inter spinas memoratum In Salomone, propter folia, suauissimum odore, etiamq; florem Liliij, qui niueus, pulchellus, Liliij similis quadatenus, & odore suauissimus, Maio præsertim inter fœticolâ nemorum, vmbrosq; conualliū emicat, eōq; Germana plebs vocat *Wienris*. Prodeūt è caule palmū alto exiles medio sumo tenus in pedicellis nolæ Cytini ue pusilli, penduli, niuei, in summa ora crenati, relinquētes bacculas rubellas minores nō dissimiles Asparagi, duriusculas, amaras. Folia Liliij, Allij vrsini, aut Satyrij leuore viridatā, bina aut terna: radices reptant exiles, geniculatæ. Hortisque nota & expetita planta

F. i. pari

pari nomine & commendatione, eoque nos inter Lilia inferuimus, quando alicubi conuenientius non potuimus.

TESTICVLI, sive ORCHIDES.

CYNOSORCHIS.

Ital. Testicolo di cane.
Hisp. Coyon de perro.
Ger. Knaben frant.
Gall. Couillon de chien.

EADEM in generis tribu cum bulbis, Cypaceis, Hyacinthis & aliis plerisque reponenda Testiculi differentia: atque Satyrii, quae longè plures sunt, quam quot priscis memorat: omnèsq; ab effigie radices Orchis, ab effectu nonnullae Satyrii vocatæ, quòd Veneris incentiuu essent præ cæteris bulbis, uti postea apud Latinos Plinium & Apuleium Veneris dicerentur: è radice tamen bulbo inita est distinctio. Vnicus namq; bulbus Satyrii est, geminus vel didymi specie orchidi, quorū Caninus, vulpinus, & Hircinus sunt & insigniores indidè petitz varietates, Opacis, siluosis, & fabulosis, vdisque pratis passim peruiæ. Cynosorchis varietas multiplex: omnium notissimus magnitudine, in pratis frequentissimus riguis primo pullulatu speciem Ellebori erumpentis, vel Colchici, deinde Lili couallu, aut vulgaris folia exerit terna & quaterna, lenta, crassa, & mucore turgentia. Caulem vero sesquipedem longum, glabrum, nitidum cauum in summo, spicato flore conspicuum, odoratum, purpureum, maculis albicantibus, atque pullis variegatum. Radix geminis constat bulbis effigie testiculorum, quos quasi pubes supernè multæ ambiunt fibræ, quibus, non secus atq; ipsa planta superior, bulbi alimoniam adipiscuntur, & alternè perennem: alteri nempe iam flaccido & vacuo, altero succedente turgido & succi viscidu limpidi pleno albuminis oui, quasi foret semen genitale, magnitudo quanta maior dactylus, interdum nucis inglandis adulto: victo vero, & rugoso multo minor & situs inferior. Dulcis sapor, mucagineus, emplastricus, insulsius, color candidus, pellucidus.

Discrimen huius & varietas obseruatur in magnitudine & foliorum numero, quod non magni est momèti ad obseruandū & cognoscendū: aliquatò maioris istud, & euidentior: aliud est foliis maculatis & paucioribus longioribus neruulis: vnde maculatu vocis licet cæteræ distinctiones obscure nisi exercitatis, nec ita vtiq; cōstantes sunt, ut certū quid generice differentia statui queat. Colore nēpe remissiore, dilutiore, vegetiore, mixto variegato, nitente, languido, paulum quid distantibus item testiculis & foliis, primū Cynosorchin inuentui offerentibus, iisdem natalibus Sole Geminis ingressuro florēt omnes.

TESTICVLVS Hircinus, seu Tragorchis & Leporis testiculus,

AD commodiorem notionem vnā è summis differentiis constituit testiculus Hircinus & spyrillis aruncis barbā caprillā ementiens. Iisdem locis exit foliis pluribus, & itidem liliaceis amplexatis imū pedalem caulem, leuè à medio summo tenuis, perpulchra serie florum spicatum vtriculis vel galeatis floribus, qui dehiscentes caudicellam singuli singula purpureis distinctam punctis, cuncti Hyrcinæ barbz aruncos cirrōse effigiantes, obtinent: odore graui & viroso: semine pusillo in capsulis, hæc huius vnica differentia.

VULPINI TESTICVLI.

AT quadruplicem vulpinū testiculū meminimus è floribus quesitū: Papilionis nempe, fuci, muscæ, postremi è colore qui luteus totus & cæteris rarior multo nec descriptus. Eruius hunc Norbonæ æstuosis & aridis sterilibus, decliuibus inter Cistum marē & Illacem Cocciferā, prope specū vastam, quæ redeunt Frontignana MonsPELLI lœua est: etiāque in herbidis aridis Grāmuntiz syluæ vicinis. Istis verò minor, qui foliis paucioribus binis nēpe aut ternis caule spithameū imū ambientibus, summū floribus luteo fuluis paucis Afilonem aut potius Fuci colore & effigie præ se ferentibus: exigui subsunt bini testiculi.

HVIC per similes duo sunt, quorum vnus est magnitudine semē par floribus muscam, sed colore rubiginoso, obsoletorq; & inamœna fuscædine purpurascēte, exprimētibus.

ALTER maioribus, latoribus foliis Phalangineis, venosis, repandis, reflexis: caule interdum palmari, interdum sesquipalmo alto, nonnihil purpureo: floribus colore ita aspectu fædo non dissimilibus.

Discernitur facillimè postremus foliis latiusculis, & toto caule appressis, floribus Papilionibus volantes, alifue pâlisis se librantès æmulantibus.

TESTICVLVS ODORATVS.

MINIMVS omnium sabulosis, arenis, atq; squallidis locis Norbonæ maritimis & Angliæ mediterraneis nascitur: folia exerit breuia, pusilla & subpallida, venosa vna collecta minoris Plantaginis: cauliculum palmarem, gracilem & flosculis odore Lilij conuallii & involutæ modò clauiculatim caulè ambrientes: Bulbi pusilli, vt superius.

PALMÆ dua Christiader.

SERAPIADES.

HIS cæ accenset Thiorchim Serapiada Ægineta (addere enim tertiam quandam videtur) terno donatum didymo, quem alias Palmam Christi opinabamur: tum quia succulenta minus, sicciorq; est, & vehementer deterget iatro, forisq; vlcenbus admota: tum etiam quod Melancholicis, Quartanariis, Epilepticis, neruorum offarctu & pituitosa saburra oppressis miram præstet opem, fluxum dysentericum sistat, quot qualèsq; Palmæ Christi recentiores vindicant (ne cuiquã imponat Palmæ Christi vehemèter purgantis homonymia) dignandas sanè Egyptiis Veneradæ Serapiadis deæ Augusto cognomine: alio quin nihil attinuit à cæteris feceruisse, & Serapiadas nuncupasse. Rationibus hæc fauebat ex lectione coniectura, nam vbi *παλύνουσα* multi vsus, legendum *παλύνουσα* multifidam radicem: & fortè vtrumque, multifidum multique vsus radicem innuebat, & mox inferus vbi Diosco. *ρίζα διὰ τῆς ἐπεχιδνίας ὁμοία* id est, Radix subest testicellis similis aut pusillis testiculis, legebam multifida, leuiore methathesi multò, quã in superiore capite, vbi pro olea suffecerunt meritò quidã Squillam teneram pancreatiũ. Verum tamen si cui hæc minus alubescant Serapiades exploret superiorum Orchium facultates, quæ multò tamen ignauiores & mucore elumbes magis videntur, aut alias aptiores adducat, & lubenter vitrò indicas istas palmatas antiquis proficibimur.

Herbidos pratensèsq; colles frigidiore amant tum minor tum maior, legimus etiam in alpinis Rauisburgi & Nozoreti Germaniæ. Maio flore & foliis exit: maior foliis similibus, sed latoribus porri mucronatis, ad terrã reflexis, crassis, interdum maculatis, fuscis, & nigricantibus notulis: flores purpurascens cynosorchis adeò similes sunt, vt nisi propius spectes easdem putes. Radici itè geminus est bulbus, altero euanido, altero pregnante & succulento, vtroque tamen oblongiore, nonnihil compresso, & ima sui parte in fibras inæquales ternas aut quaternas veluti digitatas abeunte. Hunc marem apellant.

FÆMINA verò floribus candidis, vel è purpura rubentibus, dilutè cæruleis cuculatis crebriores maculas purpureas, & rictum ostendentes habentibus: foliis minoribus & inspersis punctulis: radice consimili.

MINOR ORCHIS ODORATVS.

HVIVS suauem efflant odorè flores mucrone spicati, purpurei amaranthi, qui foliis augustioribus, porraceis, vel croceis, caule palmari & leui, radicibus minoribus dumtaxat differt, vtraque radix orchin odorem & saporem dat gustanti, & Dioscoridi ad eadem facit, minus tamen modestè facit Senensis, qui hærentibus aut inficiantibus citrinis Digitos Auicennæ esse hæc Monachis conuiciatur, nullamq; allatam rationem cõqueritur: cum ipse nè vmbra quidem adferat vilius. Et vides Digiti citrini huic afferit, magno incommodo eorũ, qui fidem forent sequuturi: Citrini verò fuere Hermodactyli, vt nomen & color docent.

ERYTHRONIUM.

NOn multis ab hinc annis innotuit bulbus perelegans, cui amici nostri Satyrion nomen fecerunt, is consultis Medicarum materiarum Lugdunenſibus, qui condendum curaffent, & exploratum habuiſſent, viſus eſt Dioſcor. genuinus: multo quidē periculo factō cōditz multam copiam Lutetiam, aliāſque Galliarum vrbes aſportatā ſcimus, nulla interim deſiderata nota præterquā coloris, qui valdē variat loci varietate, vt in Squilla, Cæpis & aliis bulbaceis videre eſt. Alij vſini, aut Lilij ſimilia folia bina, plurimū terna in humum deuexa, minora: caulem tenellum palmum altum, nudum humi foliis tenuis merſum & Cyclaminis modo pediculum porrigentē exilem, flexilem: florē Croci vel Lilij, radiatum ex albo purpureſcentē: radix dactyli æquat & aſſimilat, Orchidis concolor, cui nōnullæ fibrillæ appenſæ ſunt, & p. alius ſemirotundus compreſſus bulbus exiguus lateri imo hæret, aut ſubeſt, vt in gladioli radice videre eſt. Lugduni florebat Aprili in horto Valerandi Dಂತez è Iura monte cuius ſedulitate primum nobis innotuit, cruta Alpibus Lemano finitimis: & poſtea in collibus Taurinenſi Padoſeq̃ uileucam diſſitis, eandem eruiſus.



SATYRION ERYTHRONIUM.

DVm eſſemus venetiis, ſuperioribus annis, vidimus nō ſemel in Angeli Symbolo Alberti Martinelli officina, radices ſubrotundas, magnas ruſoſo tuberoſoq; cortice ex fuſco rubello, effigiē & magnitudinē Cyclaminis vel potiùs Ariſtolochiæ rotundæ & prægrandis aſſequutas, carne intus albida eduli, dulci & Bulbocasto bunio dicto adeo accedente, vt eadem, nimirum ſolo latiorē & peregrino enutritam, ſuſpicaremur. Sed illicò Martinellus aliquot miſſas Alepo Syriz à fratre Cequino, qui vt erat explorator nō minùs audus, quā peritus exoticarū ſtirpiū, Erythronium Satyrion iudicabat. Harum vnā celebris ille Leo Scamnidicus magnus. Marci fori Veneti tympanum, popularis philoſophiæ, cuius nec imperitus, nec parū ſtudioſus fuit, amans aluit aliquādiu, cuius folio la minis prodere audent, quia parū meminimus. Earundē Iacobo Cortuſio alteram dedit idē Phamacopœus, quā multò poſt, quaſi nunquā vidiffemus, munificus ille Patavinus oſtentabat nobis, & penē inuitis riſum exercebat, qui diceret ſemanibus dumtaxat atrectando totum turgere Venereis libidinibus. Hanc ipſam Mathiolo poſtea miſit, non Cequinus, vt audiuiſus. Is ſolitus namque fuit etiam minùs peritis quantum poterat, plenē deſcriptiones addere rebus peregrinis, quæ in Mathiolo nullę niſi radicis ſunt.





ACTENVS comparando quot potuimus plantarum genera, quarum effigies & naturæ ordinis consequutione ita sibi mutuo hæreret, vt & facillimè noscerentur, & memoriæ mandarètur, à Gramineis, Segetibus, Harundinibus ad Acoros, Irides, Cyperos, hincq; Asphodelos bulborum tuniceorū Capaceorūque naturam præteruecti sumus. Ac eorū quidem maximæ parti folia consimilia, vniუსmodi mucronata, angusta, rigida, nec vsquam intercisæ erant, iam verò supersunt alia τὰν κεφαλῶν ῥότων siue latinis capitatorum illisque consimilium genera, vt plurimum sinuata & laciniosa, quæ ipsa & quia holera maxima ex parte sunt, & cuilibet ad cognoscendū in oculis, ad vescendum in cibis quotidie sunt, non incommodè illa expediemus, nusquam alioqui aptiorem locum nacturi in vniuersa plantarum familia.

Rapum turbinatum maius.

Rapum oblongum minus.

Rapum Syluestre non bulbosum.

Rapistrum aruorum Erysimum Math: & recentiorum.

Rapi gemina Varietas.

Bunij & Buniadis discrimen.

Bunias sine Napus.

Bunias syluestris siue Napus syluestris.

βένιον siue Rapula folia non Bunij vt Dioscori, sed napi fortè in Plinio falso attribuit suo loco.

Raphanus magnus &

Raphanus parvus perperens.

Raphani varietas.

Synapi sativum. Eruca, aut Rapifolium.

Synapi sativum alterum.

Synapi agreste Apii, aut potius Laueris folio.

Synapi syluestre minus Ironic Dioscorides aut Bursa Pastoris folio.

Lampasana.

Barbarea Pseudobunias potius quàm Pseudobunium.

Alterum Pseudobunium quia ferulaceum inter ferulacea.

Rapunculus siue Rapuntium paruum vulgo Pes Locusta Anicenna } cum Trachelis.
 Rapuntium maius Alopecuri comoso flore

Eruca satina.

Eruca maior Hispanica.

Eruca sylvestris.

Trifolium Erysimum.

Erysimum. Theophr. folio Similecis aut Atriplicis suo loco.

Simum siue Lauer Dioscoridis Olusatrifolium.

Simum siue Lauer Crataea Nasturifolium. aut Erucasolium.

Cardamine Sisymbrium siue Nasturtia aquatica.

Sinapi & Thlaspi media Prouincialis planta.

Nasturtium hortense.

Thlaspi genus omne.

Iberis.

Lepidium Pauli duplex.

Draba.

Dentillaria Rondel. siue Mo-

hybena herba neoteritorum.

Bursa Pastoris.

Senecio.

Senecio Iacoba.

Senecio Iacoba marina.

Ulgatissimum.

Dioscorideum. Draba folium.

Gracum. fortè Dioscori.

Syracum. anguloso bifori pericarpio.

Oxyridis folio hortense.

Hieracis folium Lunaria Lutea Monst.

Alterum chypeatum Serpillis folium Noib.

Centunculi folium Albus Italorum.

Candia umbellatum.

Umbellatum alterum.

Crataeus suo loco.

MAIUS ORBICVLATVM, seu turbinatum Rapum.

Ρογγυνιάς Ρογγυνιάς

Gallis. Naueau Rond.

Germ. Rueben.

Ital. Rapo.

Belg. Rapen. Ang. Turnpe.

CVLIBET regioni abundè crescit Raporum omne genus, quod Græci vna voce designarunt Ρογγυνιάς, quæ rotunditatem orbiculatæue globosæ radicis figuram docet, vnde notitiz est plebeiz, inque cibos egestati amicos per Hyemem multum accommodum, crudum, & coctum. Fronde perampla, laciniosa Eruce, aut potius Rhaphani, etiâ siliquis adeo simile, vt radice globosa, floribusque luteis, & minore semine, vt Sinapi nigricante exceptis, eadem putes.

varietas { Radice dumtaxat à superiori distare videtur, quæ teres atq; rotunda oblongior est, & Napo similior effigie, sed maior triplò, etiam vbiuis notissima.
 Hæc eadem, aut certè simillima Venetis olitoribus venum fertur in forum, Hyeme purpura nitida & pellucida radice, gustu teneriore, suauiore, in acetariis cruda cum Eruca, Lactuca, & ahis illic elitari solita.

RAPVM SYLVESTRE non. bulbosum.

ES& etiam frequentissimū Sylvestre Rapum, præsertim apud Flandros, Germanos, qui serunt hoc, quò folia bobus pabulo cedant. Luxuriat enim tanto foliorū numero, vt radix iam non tuberosa aut Raposa, sed exilis, nec ventriosa vsquam sit, alioqui satius rotunda turbinatæ non ab similibus, sed discretu facilis, crispior, rugosiorq; & vberiore folio.

RAPISTRVM ARVORVM.

ERAPORVM sylvestrium censu etiam est Rapistrum vulgo vocatum, passim viarum margines & segetes ornans, vbiq; præsertim Septentrionaliū floribus luteis numerosis Brasicæ aut Rapæ, in caulibus sesquibitalibus folia insunt Lappanz. aut Rapi Sylvestris. Bra.

Brassicæ virore & lzuore, non Erucæ, vt debentur Irioni Dioscoridis. Radice, tenui heuti-
quam fibrosa, gustu item Rapi Sylvestris, cuius facultates propè sortita est, sed vehemen-
tiores, tamen vsus neglecti aut ignoti. Neutiquam est Erysimum Dioscoridis; certè ad-
modum affinis est Napis & Sinapi: tusum namque semen Sinapi ementitur, & vsus ex-
plet rusticis.

βυνιάς siue *NAPVS*.

{ *German. Steckruten.*
Belg. Steckrapen, & Parische Rapen.
Ital. Naps.
Gallis. Nautet. Ang. Nape.

QUENADMODVM Antuerpianum solum, vtpote sabulosum, tuberosæ & turbinatæ
Rapæ feracissimū, sic Lutetianum lutosum Napi fertilissimum. Vtrique plantæ con-
gener, imò & similis adeò Rapæ oblongæ est Bunias, vt eadem prorsum dicas, nisi Napi
folia minus scabra forent, radixq; media sui parte minùs ventriosa, imòq; exiliore multò
esset, sapore suauiore, cibisq; delicatior, præsertim Francigena, quæ plenius doliis vœnū
in Belgium est ferri solita.

BUNIAS SYLVESTRIS NAPVS.

SE C V S agrorum amniūq; ripas hæc lubens oritur, præsertim regionū frigidiorum, cu-
iusmodi Angliæ, Nortmāniæ Germaniæq; Alpina & similium siliqua, semine, flore &
folio ex satius Buniadis inspectione admodum cognita facilis, quia per similis, sed minor
tota, foliorumq; profundiore lacinia & radice rotundior, breuiore, ficum aut Sorbū æ-
quante. Huius napi, aut Satiui semen antidotis & eximius antiquorū compositionibus ad-
dendum, vt Theriacæ Andromachi & aliis, non B V N I semē, quod nominis propter ra-
dicem raposam siue turbinatā Bunij & Buniadis affinitate multis imposuit, vt Plinio qui
vtrāque Rapum appellat, & Senensī comētatori admodum ieiuno & sæpius decepto, nec
melius in Dioscoridæ quàm Pliniana lectione versato. At Bunii neq; bunias est, neque
eadem figura, viribus, aut classe cum Buniade descripta est, vt paulò inferius dicemus.

BUNIVM.

RHAPHANVS MAGNVS & parui Purpureus.

Ραφανίς { *Gall. Raifort. Angl. Raddyshe*
Ger. Rettich. Rabon.
Belg. Radiis.

VEL nomēclatura Rhaphani vnde Rapum latinis deductum fuit, indicat Rapi speciem
esse Rhaphanū, quippe omnia Rapi habet, si longiorem, graciliorem excipias radicē,
flores similes, sed purpura obsoleta, siliquam celsiorem pyxidatim effigiatā seminis rus-
si maioris Rapi: efficacior medicamentis, quàm vtilior alimentis, expetita tamen ferme
vbique & notissima radix.

PL V R J B V S hortis Italiæ præsertim rubello colore colunt & esitant Rhapha-
nos: vt minores (quod de Rapo Rubro monuimus) sic esu suauiores, minus acres, laetio-
resq; ex aqua salita excitandæ appetentiæ, quam cocta prorsum euertit: fortet namque
admodum siue per se, siue carnibus incocta, tum hæc, tum alba, eoque sale & de prima
mensa consultius est vt edantur.

VARIETAS

SINAPI SATIUM Erucæ, aut Rapifolium.

{ *Gall. Senene domestique. Belg. Mothaert.*
German. Senff. Ang. Musterd, Senbeye,
Ital. Senape Mossarda.

F. iiii.

Ma-

MA G I s abest Sinapi à napo virium acrimonia, quam specie, facie, vel nomine, quod quidem tum liniamenta plantæ, tum effrenis acrimonia insinuant. Napi enim immitte aut vehemens interpretantur; cuiusmodi est Sinapi semen vrendo, sternutamenta lachrymâque ciendo: vnde notissimum siue diuitum, siue pauperum mensis, præsertim satinum, caule, fronde, flore, siliquâq; Rapacea, semine minore acerrimo, oleoso, copioso, aruis mandari solito, non secus atque rapæ. Folia etiam tenera in acetaria veniunt.

SINAPI ALTERVM Satinum.

Gall. Seneue blanc.
Belg. wyt mostaert.
Ger. Weisser Saff.

ER V C A albo semine est satium Sinapi alterum, cuius vsus Officinis ad compositiones vt Diasatyrione, Elect. de Ovo. Prorsus figura & semine Napi vulgaris, sed albo natiore duplo.

SINAPI AGRESTE Apij, aut potius Laueris folia.

Gall. Seneue sauage.
Ger. Wilder Saff.
Belg. wilden mostaert.

HV I v s haud admodum dispar figura aut seminis acrimonia, tametsi folia incisura situtque & natalibus, magis Lauerem vel Apium exprimant, nec non ruribus semen nigrum penuriam satui resarciat, quod ostendit flore & siliquis ad satorum viarumque riuulos & depletas fossas luxuriare solitum.

SINAPI STLVES. minus Iriensis veri folio, aut Bursa pastoris

AR I D I s tamen locis iuxta margines, & rudera, propè vrbes nascitur, foliis laciniosis admodum burse pastoris similibus, sed acutioribus minutioribusque laciniiis. Umbelloso flores & siliquæ secundum summitates Iriensis Dioscoridis, caulis pedalis, minore multo, sed tota planta gustu Synapi feruidissima.

ERVCA, & IRIONES seu Erysimi.

DV M postremò in Iriones commentabatur Senensis dictator, augurabatur non defuturos canes (sic enim modestè omnes etiam se doctiores solitus nuncupare) qui se ita ambiguum & conscium suæ hic imperitiæ allatrarent. Vtinam habuisset ille canes similes non ad latradum sed vestigandum Erysimum, quod vel pharmacopœorum MonsPELLIENSIS lixæ possent illi hodie in triuijs & ruderibus passim indicare; est enim ibi doctus & indoctis vt vsu frequentissimum, ita multiplici & felici successu notissimū. Ac vt perspicuū fiat vniuersum hoc *Erycarum & Iriensis genus*, vno nos capite omnia complectemur.

ERVCA SATIVÆ DVÆ.

Gall. Roquette.
Belg. Rakette & Koomsche Rakette.
Ang. Great Rocket.

ERVCA SATIVÆ duæ cibus gratiores & nobiliores: Maior Hispanica vocata, à nostri maioribus foliis Silymbrii & semine nigro, floribus luteis, corniculo Sinapi maiore, distat. Hæc vel quia in condimentis lauior, vel ad Venerem vegetior erat Gentilis vulgò vocata fuit: quo vocabulo Hispanica & Itala gens designat quamlibet rem aptam reddere hominem lætum & expectatum ad munia vulgò pausibilia, vt ioca, ludicra & Venerem. Quæ commoda vt ex ea perciperet Monachorū Saginata cæterua in perquam amœna Magalonæ insula maris Norbonensis, huius Gentilis Eruce semine à fratre quodam Hispano

spano ambulone donata, quotānis hocce serebat & in mensis cullibet vel maximo gulæ irritamento vel blandimento præferebat: nimirum vsu gnara quantū frequens esus conferret ad calorem Venereū in illis otio & frequenti crapula obrutum, ad vigorem animi excitandum, & præsertim corpus obesum extenuandum, somnumque excutiendum, quo illi veluti vrsi glycéfue tota hyeme saginati, fermè adipe suffocabantur. Verū istò Hispanico remedio adeo hilarescebant & gentiles siebant, vt plerumq; recinctis lumbis castitate, coacti essent vota & cœnobii mœnia transilire, & aliquid solatii Venerei ab vicinis plebanis efflagitaret: nobis hæc visa & risa. Eruca verò inibi superflua est copiosissima, monumentum futura Monasticæ castitatis & rei veritatis, nec eget vtrius fustoris descriptionis, cum vulgaris sit notissima & ex illa facillimè percipiatur hispanica,

ERUCA SYLVESTRIS,

Belgic. wild Klette.

SYLVESTRISerratæ squallido solo vel parietinis passim oriens, Dentis leonis diu *Eruca sylvestris*
sura, floribus luteis brasicæ, notior etiam quàm depingatur. Et hæcenus tres species
priores & notissimæ Erucæ.

IRIO, sive ERYSIMVM. Diosc.

Anglic. Cadlock, kedlock.

His proxime accedunt Iriones. Dioscoridis Irio, quem medici docti notis & experimentis commendant, est radice lignosa, foliis Erucæ sylvestris, quæ primū erumpentia non nisi ab oculis exercitatis possūt à Burfæ pastoris foliis discerni, quæ huic non ita viridia, & in extremo magis acuta sunt: illi erysimo verò lacinia gradior & in summo rotundū retusiusque foliū subpingue, quod multiplex in imo solum operir, Caulis sesquicubitalis, interdum maior: semen in siliquis Erucæ sylvestris multo minoribus, acre, seruidum: flosculi in summo lutei. In compitis, sepulchretis, & ruinosis locis frequens, multis Gallie regionibus notissima, sed in Angliā nō ita, quamuis nō minū obuia. Nā ne Medicis quidem aut pharmacopœis peritioribus certū stat, quæ sit Irio: hoc factū, aut quia in vsu Medicū nondū fuit hic deductus, aut quia à Mathiolo, cuius cōmentaria pleriq; sunt veluti Sybillæ folia, Rapisitrum vulgi à sapore Rapæ, & nonnulla foliorum similitudine, loco Irionis acceperunt. Quod neque Dioscoridi respōdet, neque cum Mathioli erucæ sylvestris foliis similitudinē inir, tum sapor, odor rapæ, nec adeo vt Irionis acris, nec proinde ab hac spectandæ eximie genuini Erysimi dotes quæ asthmaticis & sæctui Pulmonum vocique rauæ etiā diuturnæ & prope inuictæ sūt adeo præsentī præsidio, vt fidē fermè superēt. Est enī moderata quædā tenuis substantiæ & incidentis, cum humidis abstergentibus partibus permixtio, cuius beneficio crassæ blennosque pituitæ citra exsiccationem nimiam inciduntur, & incisæ propter flatum nonnihil commixtum non magno conatu expectorantur, & absteruntur. Arteriacum igitur est laudatissimum, nempe idem vnum præparas & educens. Exemplâ succurrunt quamplurima, quæ secundissimè tum præceptoribus, tum nobis postea successerunt. Phonnasos memini tum iuuenes, tum ætatis prouectæ, quibus fermè iam amissa voce & spiritu, limpida sonoræque vox pauculis diebus restituta



Irio.

Rapisitrum.

fuit, vnus Erysimi & opera eximii præceptoris Rondelletij qui primus vsum monuit. Mathioli æquanimis, quali suæ imbecillitatis cōscia primo suo Irioni subdidit aliū in postremo auctario, quem pot. orem primo putat, quia folia minora, & cornicula paulò vegetiora sint, vt ex iconibus, inquit cōmentator, patet. Sic nos audios discendi huius mutatz sententiz causam aliquam, vt solutus est, in sicco deferit. Quid hic folia minora, & cornicula vegetiora agant, nescimus: vt vt sit, nos benignè omnia interpretamur, nēpe tantum virum (vt constantis & grauis animi opinionem, quam de se doctis viris istis cōmētariis excitauit, retineret & foueret) noluisse quicquam demere, aut demendum esse suspicionem dare, sed humano more & prudentia tacitè meliora, quæ à meliore tum suo tum aliorum iudicio profecta essent, deterioribus prioribus subdere, quasque vniuersum opus de integro recoquere, Magni Ciceronis exemplo, qui se dedit recoquendum Molonio Rhodio oratori: id videre hic est, capite de Mēo, Sefeli, Cumino Syluestri, ac passim hoc nouo opere magno sculptorum & bibliopolarum applausu.

Λάμψανα LAMP SAN A,

{Ital. Di landri, & ai Lasana.

{Gall. Sanues blanches quasi sinapistrum album.

Erysimū Theop.
Dod. sed fallitur
fol. 431.

ETIAM Napis & synapi reddenda Lampšana, vt quam olim Romani Napum syluestrem vocarunt, vulgus etiamnum in Gallia *Sanues blanches*, quasi Sinapistrum album dicit, a foliorum mollitie caduca, decubitūe in humum, quam quia lambere videntur Lampšana dicta putatur: nisi potius fuerit à Lasana matella nempe, siue ventris oneri excipiendo vase contemptus causa sic vocitata. Etenim olus olim fuisse Lampšanam admodum contemptibile, sed non parum vtile, præsertim plebeculæ, pauperum, & esuritioni militum annona deficiente, vel diui Iulij Cæsaris milites carminibus testatum fecere, qui exprobauerunt ea se vixisse apud Dirthachium præmiorum parcimoniam cauillantes, vt narrat Plinius, qui olus Syluestre pedalis altitudinis trium foliorum Napi simillimorum candidiore flore & in cibo coqui eam describit: vnde satis liquet esse istud olus syluestre vique aruorum, satorum præsertim margines, foliorum florūque luteorum vberimo luxu claudere solitum, perperam Theophrasti Erysimū putatum, à Doct. Do. qui aliam plantā parietinis, ruderibus, & aruorum marginibus frequentem statuit lampšanam. Sed neutiquam est hæc Synapi Napis aut Brassicis congener, potius Hieracii, floribus nimirum luteis stellatis, non brassicæ. Folia item Cichorii syluestris Hieracii laciniis sesquipedem & binos pedes altos, grandes caules è fibrosa radice exigua emittit, semine pusillo, nec vlla sui parte planta in olera mandī putamus. Eapropter vera existimanda lampšana rapistrum post Rapas superius descriptum, vt quod per egestatem in vsu venerat, & è cuius floribus apes mellificant & oblectantur, qualem intellexit Columella Lampšanam. Senensis verò comentator interfert alienis plumis, ac multis Plinij verbis ambiguus ipse ambiguus, quod statuerit nos deferens, euolat. Cum saltem fuit nudi recitatoris plantam quam intellexit verbis exprimere, & boni cōmētatoris explicare, non truncare verba Plinii triuni foliorum simillimorum Napi, quibus videtur Plinius innuere cum Iriones & Napi huic congeneres multis foliis insternant operiantque humum, Lampšanam vt plurimū tribus foliis extremis cespitem tangere, aut tegere, eaque nota vocatam sic esse, & ab illis discedere.

Lampšan. Dod.
pag. 385.

PSEUDOVNIAS potius quam.

PSEUDOVNIUM, BARBAREA

sive Herba S. Barbara vulgi.

Hyst. dod. 435.

POSTERAM quam docuimus plurimū abesse Buninum à Buniade in promptu cuiuslibet est, Barbaram vulgo dictā neutiquā Pseudobunium esse, sed potius Pseudobuniadē, si cui libuerit, dici posse. Est quippe incursa, magnitudine, floribus, & siliqua Napi siue

Bunia-

Buniadis, qualem descripsimus, in aruis humidis & veruacis depressioribus, tota nitet virore atro: sapore aliquantū acri rapaceo, sed interpres hallucinatus nominum asinitate, folia non bunii, vt Dioscorides, sed Napi, siue Buniadis fortē ex Plinio falsū attribuit.

Nisi itaque verū sit Bunium, ea quam censuimus bulbocastanon dicta planta, nulla prorsum succurrit, quæ Bunii adumbret vel nomenclaturarū, tantō minū ostēdat aliam plantam, nisi sit solius Cræte, quæ Pseudobunii Dioscoridis folia, ramulōque ferat: sin autem sit, vti non paucis visum, non nos fallit coniectura de illa noua planta ferulacea, quam Pseudobunium Dioscoridis fecimus, & suo loco piatam descriptamque dedimus.

SIVM SIVE LAVER DIOSCORIDIS

Olusatii folio, siue aquatica pastinaca.

BVNIADVM, Napi, Sinapi, Erucarumq; generi, quia ortus, vultus, vsusq; oleraceus Sionis, Syfimbrii & nasturtii non multum sunt diuersa, hic succedent demum annexenda Thlaspi, Ibiridi, Drabis, & similibus, quæ paucioribus & facilius postea addiscentur.

Dodo, de sion. libello, 240.

Duabus diuersæ figuræ plātis aquaticis indidēre nomē Sionis, & τοῦ σιων quia quatiuntur, vacillandōque in aquis iugiter succutiuntur præterlabentibus vndis, atque iugiter alluentibus: vnde etiam Laueris Latinis nomenclatio, nisi quis malit suspicari ab vrinis calculisque ciendis, & excutiendis dictam, Earum alteram, quam Dioscorides lato olusatii folio minore, odorato, erectā fruticulā esculentam depingit, herbarii pharmacopœi Pastinacam aquaticam ab odore & foliorum effigie, propterquam etiam Germania *Epfigh wasser* id est, apium aquaticum, quod diuersum simile tamen paludapio est, vocitat. Quo fit vt quin hæc sit verum Dioscoridis Sion nulli dubitandum sit, & si perbonus & doctus medicus Dodon. hallucinans Crateuz Sion fecerit, quod neque notas ē Dioscoride, neque Germanicam appellationem perperenderit.

CRATEVÆ SION ERVCÆFOLIVM.

ET ENIM Crateuz Sion esse nasturtium nostrum vulgi vbiq; iisdem riualis fonticulisue lymphidis fruticās, cunctæ descriptionis partes testantur: sunt namq; ipsa folia singula, rotundiora & latiora quā Minthæ nigricātia, & extremis oris incisuris profundioribus Erucæ sylvestris similibus, gustu non perinde odorato, vt Dioscoridis Sion, minūsq; medicato & acri sapore, idcirco plebecula in quadrageno Veris ieiunio multū huius in acetariis vorat, vocatq; Nasturtiū aquaticū. Videtur etiam eadē de causā Crateuas hanc vocasse ὀλυσσῶ id est, vilem, aut paruificiendam, vt quidam interpretantur, si cum priore viribus efficaciori & medicatiori cōferatur, tametsi vires non instrenuas exerat ad quosdam morbos, præsertim ad eos qui Stomacace morbo difficili, siue Scorbuto vexantur: vnde pari ratione & notione ac Cochlearea & Becabunga *Scorbuyck* & *Scorbuck* vocatur.

Matheol. 287.

Huius varietas duplex ē magnitudine, siquidē riualis altioribus enata fruticat, foliis ferme Terebinthi magnitudine: aliis verō exiguis & penē arentibus riualis, triplō minor, æquali ferme Diosc. Sioni siue Laueri, cui conuictor, & similis eatenus, vt non rarō rustici vtramvis pro vtralibet accipiant in acetariis, & potionibus ad calculum, nec malē cedit imperitiis illis, nam vtriusvis vires parīs sunt commodi.

CARDAMINE siue NASTVRTIA AQUATI-

ca, siue alterum Sisymbrium, Dioscor.

ACARDAMO, cuius acrimoniam vscētibz refert, dicta Cardamine fuit, veluti Hel-leborine ab Helleboro, tametsi propius accedit Crateuz Laueri, siue Nasturtio vulga-
ri aut vero, quā Dioscoridis Sio, aut etiam quā Sisymbrio: etsi Dioscorides Sisymbri fecerit speciem tribueritque idem nominis plantę menthe hortensi simillimę, atq; huic aquaticę, asanq; Plinio confundendi vires laueris atq; huius Sisymbrii, quod Sion etiā

Matheol. 488.

vocarint. Est enim fontium lymphidorumque riuiolorum fœditrix hæc vbi Sion, sed tota tenella, gracilisq; folia promēs ima strata latius, in nervcis cauliculis rotundæ Erucæ, aut aquatici Nasturcij vulgaris: quæ autē in caule sesquipalmari vel pedali angustiora multo sunt, etiamq; hortēlis Nasturtij diuisura: floribus sumis albidis, acri gustu, ac in acetariis tamen minoris commendationis. Sed enim primum illud Sisymbrium apud Diosc. in familiā potius Menthæ & Menthastræ relegandū, cum quibus tantopere illi convenit, vt quasi naturę symbolo mutuo, altera in alterā abeat, nempe mentha in Sisymbriū, hoc in illam, propter confusa naturę principia in semine.

SINAPI & THLASPI media Provincialis planta.

ET hanc nouā visum fuit hisce inferere, propter cōmunes inter Sinapi, Buniadē, & Thlaspi figuram & vires, Prouenit ea nō procul Magdalens fano, & cautibus illis celsissimis famigeratissimis Galloprovinciæ, florēsq; Augusto promit luteos Erysimi, nec filiquas dispares: in gracilibus ramis ad summū & imū vna ē radice digitū crassa, fibrosa, pedē lōga, Rapistrī folia, Thlaspi, aut Drabæ, leuiter laciniata, albida & hirsuta, sapore erysimi, aut Buniadis Barbareæ.



Καρεδάμω NASTURCIUM HORTENSE.

Ger. Garten kress.
 Angl. Garden cressys and Towne cressys.
 Ital. Nasturtio & Agretto.
 Gal. Nasitort & Cresson Alnoys, siue Cresson de Iardin.

Math. 368.

ACRIMONIÆ vehementia os narsq; vellicando Sinapi inuitatum nasturtiū, è Græco Καρεδάμω dictum fuit: etenim nars rugare siue cōnuendo cōtrahere assolent, qui acrius capæ edūt, aut Sinapi multum carnes intingūt: vnde factū verbū καρεδάμωτις id est connuere, tametsi quia cordi vitam vigorēque tueretur præfentiorē, Cardamū dictum putant, Persis præsertim & Lacedæmonibus, apud quos olim olus istud multo celeberrimum fuit obsonium: nihil enim addere ad panem præterquam nasturtium solita fuit Spartana iuuenta, vt apud Xenophontem, & Plutarchum, & in Tusculanis legitur. Hodie autem in acetariis & medicamentis vsus plurimus, & notissima planta plebi nomine Cresson, fortē quia perenni sobole, summis feruoribus, vel etiam Brumæ rigoribus spretis, crescit. Francigenæ etiam Cresson d'Alenois ab alendo fortē vocant. Notissima planta, laciniolis, angustis Erucæ foliis & Coriandri adultis non ita dissimilibus, acri sapore Thlaspi, seminēque secundum thyrsulos Iberidis multiplici.

Ded. Histo.

436.

THLASPI, siue Nasturtium testorum, Nasturtium Syl. Scandulacenn, Capella.
 Θλάπι Θλάπιον ἢ Σινκι ἄγριον Germ. Baurtsenff u kress Bisemistrai. Ital. Thlaspi.

Gallia, Seneue sauauge. Belgia. Woerten kressc.

QVEM-

QUEMADMODVM Phyteumati, Echio, Psyllio alijsq; nō paucis herbis ob quampiā notam cōspiciuam feminis nomen adscitum fuit, sic & Thlaspi transfertim per mediūmue incusso aut diffracto feminis inuolucro foliaceo appellatio data: tametsi dici potuit Thlaspidium quasi fractum clypeolū, qualem adumbrant folioſæ circinnatæ peltæ semen cohibentes Nasturtij, cui succedit ordinis conſequutione.

DIOSCORIDIS Thlaspi Draba & Chameline folie.

EMVLTIſ Thlaſpi differentijs adeōq; longē pluribus quā quot antiqui meminerint nulla ſit obuia, quæ equē congruat Dioſcoridis deliniationi ac illud Thlaſpi nuſquam non in aruiſ copioſum proueniens Gallię, Germaniæ, Angliæ, folijs lōgioribus, anguſtiſ, mollioribus, leuiter lacinioſis Drabę, Iberidis, Chamelinę ſiue Myagri, caulēq; multis aliſ circa inum diuiſo lentis, ſequacibus, gracilibus, flores albidos Iunio ferentibus puſillos, deinde cōpreſſa copioſa foliacea inuolucra exactē circinnata præterquam ſupernē, quā parum depreſſa & hiſa ſunt, ſemenq; continent puſillum, rotundum, oblongum, nigrum Naſturtij, fauces adurens mundendo, ac quiddam Allij, Sinapi aut Cæpe ſapore exhibendo: vnde vulgus Sinapi agreſte vocat & Naſturtium Teſtorum, quia non rarō in mace-rijs vetuſtioribus viſitur. Quare quin ſit Thlaſpi ſpecies nulli negandū, an autem ſit folijs *ῥαβδωδὴς* Aſci non proſum videtur: ſunt enim vno ductu ferē linuata tota, non diuiſa, proindeq; illa verba (in ſummiſ diuiſa) ſi quis de thyrfulorum, ramulorum aut ſemiſ diuiſura accipiat, nec Naturæ aduerſaturus videtur, nec Græcæ deſcriptioni vim vllā facturū: verū ſic forent alię ſpecies Thlaſpi mox dicendę, quæ ſeminis effigie & acrimonia propiūſ vero accedent.

THLASPI Gracum propinquius fortē Dioſcor. Poligonari folio, aut Oleæ, Lentis ſemine,

ETENTIM iſtud dumtaxat calidarū regionum Syrię, Candię, etiamq; Prouincię Norbo-nenſis indigena eſt, ramuliſ multiſ in ſummo diuiſiſ, & ſemine ſecundū longitudi-nē bina ſerie digeſto, planę lentis effigie compreſſe, ſed nonnihil depreſſi inſtar vmbili-celli medio oſtente, & quaſi incuſſum cōcuſumue ſcutulum aut Thlaſpidiō exactiſ effigiatē, ſemēq; cohibet Naſturtij acre, vehemens, ſecundū totos ramuloſ lentos, obſequioſoſ, cōpactioſ, albidioſ, in caule ſarmentoſo rotundo folia puſilla, glauca albidāue habente Leucoij Lutei ſed multō minora, radice exili lignoſa etiam in hortis Itali-cis.

THLASPI SYRIACVM vel Gracum alterum anguloſo bifori pericarpio lentifolio.

FERYNT & alterū eſſe Syriacum aut Græcum illud, quod noſ habuimꝯ Venetijs & in hortis vidimꝯ minoribuſ ramuliſ, minꝯq; compactiſ, albidioſ geminaq; donatiſ ſerie, feminis anguloſiſ, aceroſiſ, rotūdiſ, compreſſiſ, medioq; ſui fiſiliſ in duaſ glumaſ mino-riſ acriora ſemina terna aut quaterna amplexaſ, folijs non ita diſſimilibuſ ſuperiori. Nuſquam niſi inquilinam hortis putamus naſci, nec ſcimus ſitne illud tertium Mathio-li, quod ille nulla apta deſcriptione genera diſlinxerit, ſed in chartaſ tantum negligē-ter picturaſ congeſſerit.

THLASPI Vulgaſiſſimum Vaccarię folio aut Myagri pinnato.

MVLTO vberimē prouenit cultiſ & incultiſ aruiſ Italię, Germaniæ, Gallię & Anglię iſtud omnibuſ Thlaſpi vocatū & receptū, cuiuſ folia una lōgiora, maioraq; quā pri-miſ noſtratiſ, parum crenata, ſuperiora autem anguſtiora in acutum ſenſim deſinentia, baſimq; habentia vtrinꝯ pinnula aut ligula porrectiorem non quaſi appendice addi-ta, ſed continuata, multoſ ē caule ſequipedali ramuloſ ambientia ſtipatoſ floribuſ albidioſ, ſubq; æſtatem crebriſ paſtorię Burſę non diſſimilibuſ in duaſ glumaſ

G.j. hiantibuſ

hiantibus inuolucris, ac si semine & sapore Sinapi aut Nasturcij, officinis in usu ad antidota pro vero accipitur.

*Oxyridis folio THLASPI minus Hortense vulgare,
acerrimum Luteum & album.*

PAULO diligentiores Pharmacopœi & Herbarij Angliæ & Germaniæ istam minorem speciem Thlaspi vocant, & alunt in hortis ad medicum usum, quia sit feruidioris gustus. Eius cæteroquin tota facies, ramulis multis floribus & foliolis Thlaspi fatetur, eatenusque differre videtur, quia tota minor & tantopere sarmentosa, ut scoparum vice sit ad verrendum, non secus ac Iberis, cuius etiam & floribus, albidis, crebribus, paruis. Eadem in horto Morgani nostri, etiam luteis floribus visebatur hoc in ense Iunio.

*THLASPI paruum Hieracifolium, sine Lunaria lutea
Monspel. & Leucoium luteum marinum.*

IN prata Monspellensia secus Lanum amnem & Gramuntium lucum studiosi ludibundi prodeuntes, nos comilitonesque nostri sepius in hoc collegimus, & minorem alteram Lunariam, propter lunatos folliculos elegantes, vocitabamus. Sed attentius perpendentes, huic nullus locus certior, aut aptior, quam inter Thlaspi omnium iudicio, putabatur. Radix qualis Bursæ Pastoris aut Maluæ, folia mox a radice crebra sibi mutuo incumbunt, albet colore Hieracij aut Leucoij sed minora, undulata, laciniosaque in terram dehiscunt. Caulis folijs exutus, exilis, cubitalis & pedalis, qui in cauliculos exit onustos multis clypeolis foliaceis pallescentibus Lentis compressæ effigie qui prætenues sunt & ferme pellucidi, quibus inest semine singulum singulo foliolo, Leucoij purpurei & albi sapore & effigie, potius quam Nasturtij. Flos in summo paruus, luteus aut pallidus. Hæc primum culta in hortis Italicis & peregrina credita, vocabatur ab illis nomenclatoribus Leucoium luteum marinum, non ita magna similitudine: maioræ sanè multò sortita est cum Thlaspi. Sed etiam cum Thlaspi non nihil folijs & viribus cognationis habent Leucoij, præsertim purpurei & albi.



*THLASPI alterum minus clypeatum Serpilli folio
etiam Norbonense.*

NEC vspiciamus nobis istud visum, nisi in agro Norbonensi Monspellensiq; locis squallidis, sabulosis prope pusillas Anchusas: folia, flores, seminaque ex luteo pallent, & peltæ superioris aut Tordyllij sunt sed penè pargamene instar pellucida sunt tenuia, similitudine, sapore, Leucoij, unde quidam Leucoium luteum marinum autumabant: ramuli sunt exiles, palmares, nitidi, foliolis albicantibus Thymi non ita numerosis.



THLASPI

FECERANT iamdiu hanc Itali Alysson quodpiâ, eoſque Cômmentator ſequutus, lubenter, inquit, poſuiſſe, ſi habuiſſem: igitur factum benè quod nò habuent, quippe doctiorum oninium Monſpellienſium, apud quos frequèſ oritur, ſuffragio, Thlaſpi hæc annueràda eſt, nò Alyſſo: cui aliâ multò aptiorem iamdiu compararūt ſeduli veſtigatores Belgæ & Franci, quâ in hortis alunt: in Italia non niſi aridam vidimus. Iſtud verò puſillū Thlaſpi prope Monſpel. Nouū Caſtr. cis Lanum amnè, aridiſq; viarū crepidinibus, in ramulis multis ſparſis rectis vimizeis, palmaribus & ſesquipalmaribus albidis, Thlaſpi: foliola Polygonati minora aut Centūculi, aut lauèdulæ: & ſtoſculos albidos Iberidis, Thlaſpi Cretici, aut Syriaci, Chypeolis nò diſſimiles, ſed duplò minores fert: tota planta albicat, guſtūque Thlaſpi aut Naſturtium indicat.



THLASPI CANDIÆ umbellatum Iberidis folio.

ALTERVM deſcripſerunt & vocarunt iamdiu Belgii herbarii *THLASPI CANDIZ*, foliis eſt ſerratis vulgatæ Iberidis, ſed maioribus, caulis cubitalis multos cauliculos fundens, in quorum extremis umbellæ & flores Sambuci paluſtris ſimiles, ex candido purpureſcentes, Iulio vel Auguſto: tūcque ſemen aſſatim cernitur in folliculis Thlaſpi minoris ſimilibus, acre guſtūque ſeruens. Quæ affinitas erudito & modeſto medico Dodo- nęo hac naturæ parte exercitatiſſimo videtur perſuaſiſſe, vt Drabam hanc cenſuerit: nempe umbellæ Sambucinz & ſeminis acrimonia, quæ non magni momenti ſunt notæ. Cognita quibus eſt Lepidii foliis, umbellis albetibus vera Draba, non opus eſt pluribus ad demonſtrandum, tum errorem, tum diſcrimen.

Hiſtor. Dodo, 438.

THLASPI ALTERVM MINVS VMBELLATVM. Naſturtii hortenſis folio, Norbonenſe.

MONTOSIS ſatis Norbonæ ad Lupi montis radices Maio & Iunio hæc copioſa flores muſcoſos vmbelliſq; cōfertos, ſuperioris nò abſimiles edit, ſed albidos, ſemēnq; minus multò, ſed admodū acre, ſolia exiliora, diuiſura Naſturtii hortēſis per totos cauliculos numerosos, grandes è radice non profunda, nec multum fibroſa, ſapore acerrimo Thlaſpi: verūm non magis hæc quam ſuperior vſu recepta.



AN THLASPICRATEÆ, SINAPI Perſicum. vocatum latifolius, radicibus magnis, ſchiadicis vile, ſu noster Rhabarbarus aggreſſus, qui & Lepidium Pauli in Lepideo dictum?

G.ij.

D.

DE Crateuz Thlapi admodū difficilis assertio: si quis tamen de paucis à Dioscori. recensitis notis, sit certæ coniecturæ locus, nulla aptius statuatur planta, quā illa, quæ nonnullis Sinapi, propter radicis in condimentis vsum, nonnullis Rhaphanus Sylvestris propter nonnullam similitudinem, nuncupatur. Folius est amplius Lepidii aut Piperitidis maioris, plerumque latioribus: radicibus etiā prægrandibus, glomeratis, albicantibus. Semen illi in siliquis Sinapi modo: flores Thlapi conferti & elegantes magis quadrare videtur, quā Lunariz vulgò nuncupatæ Rhaphanitis, quæ à nonnullis istud Crateuz Thlapi credebatur, cuius acrimonia ad Ichiaticos multò inefficacior, radix & vsum dispar.

Lunaria Raphanitis,

BURSA PASTORIS.

Germa. Tofchel Kraut.
Gall. Bourſe de Paſteur, ou berger.
Bel. Boſſekens.

Effig. Mathiol.
569.

RECENTIORVM fuit planta & nomenclatura Pastoria burſa dicta à marſupiolis, ſiue theculis compreſſis, cordis aut crumenæ effigiem referentibus, thlaſpi quadamtenus, cui etiam congener eſt, cuius copioſiſſima & notiſſima, ſecus vrbium areas, & moeniorū ambulacra: foliis & facie Iriſonis aut Erucæ: floribus albicantibus thlaſpi non diſſimilibus, tamenſi guſtu nō perinde acri, ſed exiccante potiùs quā refrigerante. Nam qui quia ſanguinem ſilāt (ſilāt autem ſtrenuè) frigidam faciunt, inſolici argumento nituntur, etenim vmbellæ, florefq; guſtanti aliquid acrimoniæ inurunt, indicioque ſunt ſiccandò colligendòque ſiltere, vt porri ſuccus, Vitriololum, vrtica, non refrigerando.

RHESED A PLINII NEOTERICORVM

Belgiſ vulgò Eruca peregrina, Italica vel Cantabrica.

SVPERIORIBVS annis diligēter perſcunctati ſumus Bononiæ dum verſaremur, clariſſimum Mediæ materiæ profefſorem Cęſarem Odonem & D. Aldroandum, atque indefeſſum querendo doctū Anguillariæ Ferrarię quænam planta illa eſſet, quæ apud Rauēnam, Rimanum, locaque Peſaro finitima; Plinio memorata propter miram ſuperſtitioſamque opem morbis ritu præſtare ſolita?, qui eadem eſſe coniectabant (vt etiamnum pleriq; omnes herbarii) quam nos non modò in Italia non procul Rauēna, Arminio, etiāmq; toto illo littore maritimo innemuſ, ſed etiam in Gallia Lugduni & Veſuntii in Burgundia, etiāmq; hortis Belgiſ & Angliſ, vbi quidam vocitabant Erucam Italicam. Eſt namque foliis albidis vel pullis, & diuiſura Erucę Sylveſtris, Sinapi Sylveſtris, vel Cakile Serapionis, ab ima, tenui, longa, albicāte radice profunda, cauliculis graciles cubitales, ad medium vſque ambientibus, vbi flores thyrfuſiue denſe ſpicati Oleæ ſummos ambiunt cauliculos, elegantēſque relinquunt per Auguſtum & Septembrem theculas membraneas, inſtar calicis ſupernè hiulcas, ſemen nigricans, pullum, puſillum Hyoſciami continentes, tota guſtu & nonnulla tenui acrimonia Luteolæ adſtringente: vnde non abs re do-



doctissimi illi putarunt ex Plinio hanc Resedam esse, possēq; collectiones & inflammationes discutere : nec tamen putarim opus esse additis illis verbulis, aut murmurillis anulis dementiā cōmentis ad efficacitatis commendationem fucatam, nempe hæc sunt. *Reseda morbos reseda, scisné, scisné, quis hic pullos egerit radices, nec pedes, nec caput habeant? Hæc ter dicunt, coriēs, respuunt, inquit Plinius.* Cui nos malumus eum assensum præstare, qualem merentur balbutiones carminum iacturæ brassicæ apud Caronem, quā excipiendo vel ineptire, vel asserendo fidem temerare nostram & alienam.

*CAKILE SERAPIONIS, Eruca folio, Napi flore,
Vulgo Eruca Marina.*

NVSPIAM hæc nisi littoreis maritimis, aut Inde in hortis culta visitur, plurima autē prope Venetias, Magalonā, etiamq; Angliæ insulā meridionalem Vectim. Folijs hæc sinuatis, diuisura crebra Senccionē vel Erucam, nisi crassiora albidioraq; essent, præfert. Flores autem purpureos iuxta caulii ramulos sparsos magnitudine & similitudine Napi habet, semine est oblongo mucronato fungoso ex singulo flore secundum caulem, bino sibiq; mutuo apicum duntaxat cohzsu iuncto, gustu Erucæ aut Napi salso & purgante. Radice lignosa καλή, propter quā plurima nascitur, putaturq; ea, quam Serapio Cakila vocauit.

LEPIDIUM *Herbula Dioscoridi, Damocrati & Galeno* *IBERIS* *CARDAMANTICE* *Nasturtij folia, siue alterum Pauli* *LEPIDIUM* *IBERIS* *IAS, quæ irrepsit alienissimo loco Dioscoridis codici. Lib. 1. cap. vltimo.*

Eadem Aëtij Lepidio Seridis angustifoliæ Holeraceo quod cum lacte conditum seruandum Tetrabibl. 4. Sermone. 2. Cap. 133.

Sed Lepidium primum Pauli superiore Cardamantice multo maius, vrentius, minus aptum cibo, Rhaphanus Syluestris Francis & Belgis Pharmacopœis.

FECIT vis vrida cutiq; deglubendæ & squammis excitandis (quod contingit fieri plerumq; inter curandum Coxendico morbo affectos) apta, vt nomē Lepidium hūc leuicidius plantis fecerint antiqui: λεπίδες enim etiam squammas è cute deciduas significant, vnde etiam lepra dicta. Ne porro tædio lectori sinus, ad recentiorū conuiueniā pleraq; quæ diu nos sefefellerūt, & animaduersionis & castigationis egerent. Nūc stat animus, non vt illi morosi declamatores, potius latratores, perorādo authores quoslibet proscindere, sed quantum plurimum possimus amico lectori perspicuè & candidè communicare. Iberis & Lepidium nomina sunt τοῖς ἰσχυρὰ id est diuersas res vnius generis designantia, Dialecticis & quiuoca, & imponere solita, nisi prius finibus secernantur, quod hic faciendum. Iberis vel Dioscoridi Herbam insinuat folijs Nasturtij cubitaleni, flore lacteo, radice nasturtij, hæc notissima Lepidio Dioscoridis eadem, quantū ex Galeno & Egineta colligitur, qui Lib. tertio, Cap. de Coxendico, eam Iberidem Lepidiū vel agreste Nasturtium nuncupari scribit: vel indigitat fruticantem quandam plantam folijs Laurinis, sed multo maioribus, cuius antiqui medici in coxendico atq; affectibus chronicis multū periculum fecerint: verno tempore vegetior, frequens in Eginetæ patria, cuius foliorum si desit copia, inquit idem, radicis corticem deglubito, & ex adipe subactum in cataplasma effingito. Idem in Simplicium elencho, Iberiadem seu Lepidium recenset ex quarto calascientium ordine vnum, alterum verò Lepidium nasturtio viribus simile, minus siccando pollere. Hic igitur paucis verbis cui plantæ sunt notæ ab oculis pepulit caliginem. Vides Iberidem Dioscoridis & Lepidium eiusdem eandem esse plantam, rursum & Iberiadem alteram, qua de Lib. 3. Capite de Coxendico, Paul. agit eiusdē Pauli esse Lepidium: id multis vsuuenit plantis vt re eedem sint, nomenclaturis variz. Ac nequis arguetur Gingidio assimulatū Dioscoridis Lepidium, sciēdum Gingidium vel authoris assiduū simile Nasturtio esse. Iam haud arduū componere istorū procerū fastidiosas lites, cum & Iberis seu Lepidiū Dioscoridis notissimū sit, & Pyperitis Galliz plebi *Passiæ*: plusquam rabida à feruido gustu Pauli etiāq; Plinij Iberidis siue Lepidij notas expleat. Futilliter igitur & impiè tenebricosus diātor Senensis viris eximij Barbaro & Ruellio insultat, quum lapsos dicit, vt putarint *Raphano* Italiz dictum Lepidium esse:

G. iij.

perspicuè

*Effig. Mab.
608. & 609.*

perspicue Ruellius hunc errorem detexit. Sed hunc fortè tunc Mathiolus Italus non intellexit, terrior enim & nitidior scriptor erat, quàm ab Herbario latine vix balbutiente percipi probè posset. Id res ipsa docet multis locis. Sed hic probè quemlibet offensione vexat: illi primum posteris secuerunt glaciem, & scipionem ad vadium transmittendum porrexerunt ingratis ambitioni, cuius postea proditoriis ictibus posternerentur. Cumq; Authorū sparsas falsim sententias nobis suis immensis vigiliis collegissent, Cōmentator neque illis intellectis, & illis spretis, nesciuit ex Pauli perspicuis locis distinguere duo Lepidida, totidemque Iberides, sed vt consueuit, re infecta ad calumniam deflexit, quam tandem, cum futilem & scutica dignam esse conscientia moneret, istis fomentis leniuit: nimirum fortasse illos Piperitum Plinianum Pauli Lepidium intellexisse, quod illi illic monuerant herbarios Lutetianos pharmacopœos & Antuerpianos, te nondum nato herbario. Hodierna enim die vocatur Rhaphanus agrestis officinis & mulierculis Belgis. Hæc Piperitis Lepidium secus ripas aquarū fruticat, radice oblonga indicè æquatè, vel maiore, caule cubitali & bicubitali, durioribus foliis Cossi hortensis vel Lauri, sed multò maioribus, molliusculis, ambitu leniter crenatis, colore ex viridi pallefcēte, flore exiguo musco candido Iberidis. Dolendū tantum virum deceptum à Plebecula sua, nam illa pro Rhaphano maximā illam plantā, quam Verbasco comparabas intelligit: Gallica verò nonine Rhaphani Syluestris Piperitum seu Lepidiū vocitat, vt monet Ruellius te decipiens, neutiquam deceptus.

Αραβία

ARABIS sive DRABA, & Nasturtium Babylonicum.

αράβη

Gall. Drauc.

Efig. Arab.
M.

QUIS QVIS ille fuerit doctus, qui Iberidem Cardamantice adiectam primi libri Dioscoridis calci descripsit, videtur vsus fuisse verbis compertioribus, & oratione floridiore, quā consueuerit Dioscorid. & ex verbo Αραβικώτερον occasionem nominis Drabæ suggestisse quā enim διπλῶς γλαυκῶδες ἔνθος περιβέλλεται (vides phrasim neutiquā Dioscoridicā) id est cum ætate promit florē lacteū καὶ τότε Αραβικώτερον, tunc efficacior est, inquit. Quo ex epitheto potuit nominare alius quispiā Drabam: & comparare partim cum cardamine, siue Iberide Lepidio vocato, vtpote quæ etiam holeracea esset & cubitalis: partim cum Lepidij Æginetæ & Plinij foliis, apud quos, quamuis multò plura quàm Dioscorides collegerint, nulla mentio fit Drabæ. Quæ si minus placeat coniectura, certè valdè consentaneum rationi videtur quempiam fuisse non imperitum, sed ætate posteriorem, qui hanc Drabā sibi de facie & viribus notam descripserit, Lepidiōq; Æginetæ vel Plinii foliis similem fecerit: neutra enim à Dioscoride descripta, nescitur an cognita: aut demū huc inserta fuerit, nullo alterius alicuius iudicio. Nā aliōqui ista Drabæ plenè satis expresse, & in vsū iamdiu deductæ folia, Lepidij forma & aliquantum incisura, mollicella colore albescente hirsuta radice ab ima vmbellis tenus vestientia caulem cubitalem fermè exilē, quæ albicant lacteolis floribus Sambuco minoribus: semen acre subrotundum, albidum Milij magnitudinē, acriore & seruentiore gustu, quàm planta. Radice albida & nonnihil tuberculis interdum extantibus. Optandum hic, vt Senensis cōmentator nos docuisset, posteaquam reiecit hanc è Dioscoridis familia, quibus rationibus indubitatum sit illi (vt loquitur) hanc vnā esse legitimā Drabam: tam multis frustra inculcatis, quid non addit pauca necessaria? An non posset Piperitis, an non Dentillaria Rondel. Lepidium Pauli hic recens, innuere? quid si idem Lepidium Dioscoridis similem fecit, lōgè magis vr aberres, fecit enim Gingidio aut Nasturtio. Variæ sunt plantæ adhuc Recentiorum, quæ Lepidium dici possunt vaga illa nomenclatura, & facultate cutem vlcera, squammæ excutandi, quas ne nostro instituto officiant, suis quaq; popularibus & similioribus subdemus, vt Dentillariā Rondelletij, Cōstium Hortense, Rhaphanum magnum.

Μάγνητος

MYAGRVM.

Germ. & }

Gall. }

Camelote.

Apud

APV D Æginetam in clencho M duæ leguntur plantæ, nomine & oleoso succo vel semine quadatē affines : quarū hæc rectius videtur inibi vocata *μύαρον* quā *μύαρον* : *μύαρον* namq; sonat prauum, impurum, sordidum, cuiusmodi est Melampyrum, multum vicinam segetem lædens, & d: terius multo, si conferatur cum reliquis triticis existens. Alteram verò *μύαρον* scite effectus argumento dictam istam nouā & perelegantē muscipulam siue muscarum putamus, quia adsidentes aut se præteruolantes muscas ramulis & glutine suo implicet, vt alibi diximus.

Neglectis etiam aruis, nec Segetum mediocri dispendio nascens vitium Myagros, ea *Ded. fig. 117.* est quam minus Sesamum putarunt, vt cuius è semine Sesami persimili oleum multū multis in locis prematur, lucernis & cibis idem æquē aptū. Exit hæc sesquicubitum alta & multis angustis folijs Rubiz vel potius Lithospermi septa latioribus, perpaucis vt Thlaspi in ambitu denticellis eminetibus, mollibus & albicantibus folijs. Secundum extrema flosculi lutei Alysi, aut Erysimi, quibus propagantur capsulæ compressæ Drabæ aut Lini, semen Sesamo aut scenogræco solum, sed duplō minus & oblongum. Emendauit sedulitas recentiorum, vbi legebatur *τῆς χυλοῦ καὶ τῶν ὡρίων*, non scenogræco simile, tamen si de toto calyculo dictum accipi potuit, intus namque semina condita situ, & appressu inter se verticillatum quid & oblongum videtur efformare: sed ista leuiora sunt. Leuissimè vrò ineptit hic & balbutit Senecis dum doctis nulla rationis vmbra, aut rei cognitione, aut melioris historię commutatione aduersatur. Nempe si in Angliæ, Galliæ, Bataviæ, Lotharingiæ & Leodij aruis prouentum & compedium mercatorū, huius nouisset, eam potius agnouisset quàm Pseudo nescio quid semper, vt solitus est, quæ vaccaria videtur perperam intrussisset.

Ἡερύρεον SENECIO, siue Erigeron.

<i>Italis cardinalis</i>	} Gallis seuillon
<i>Ger. Crenitz Witz</i>	
<i>En Grindstraut.</i>	
	} Belgis Crupscrupe
	} Angl. Grownswell.

CV I V I S regioni & soli conditioni innascitur Senecio, æstus æquē ac frigoris patiens, *Effig. Math. 1132.* qualibet fermè Luna flores luteos instaurans nouos, qui in pappos breui abeunt Dē-
tis Leonis modo. Calyculi teneri virides, Cicerbitæ minores, nonnihil rubentes, quos folia infernè amplectuntur oblonga laciniosa Eruce, Cichorifiue diuisura. Phlegmonum initij atq; Eryipelatibus optimè facit: peptica namq; est, pauca adstrictione, moderatiore calore, aut digerit aut suppurationem promouet. Sapor insulsus & oleraceus.

IACOBÆA SENECIO.

Herba Sancti Iacobi
} Belgis & Ger. *St. Jacobs bluom.*

NV L I I quàm Senecioni propior videtur Iacobæa vocata recētionibus inuestigatori-
bus. Locis lætatur amœnis, vt pratis & collibus riguis: quam Senecio maior multò, virgas rectiores firmiores striatas, & interdum subrubentes, sesquicubitales & cubitales radice fibrosa emergentes, emittit. Folia Senecionis Artemisifæ situ & diuisura ex atro vi-
rentia. Flores stellati lutei, papposi, idem Senecionis vel Tripolij: odor nullus, sapor amarus adstringens, non tamen ita calidus succus est.

MARINA IACOBÆA, vel Chrysanthemum & Artemisia marina sericorum.

Cineraia.

RARIOR hæc etiam littoreis tractibus, quorum est indigena: maior fruticosiorq; Senecione, pluribus virgis duris, & folijs maioribus profundiusq; incisis & sinuatis, vt Artemisiz, rigidioribus, crassioribus, cinereo tomento obdusis, vt reliquæ partes: vnde nomen illi Cineraia inditum. Flores item melini Iacobæ Senecionis pappis diffuentes. Exiccat valde, digerit, & inodora est. Cætera nōdum comperta. Colunt Belgici Horti de Mediterraneo littore leam.

*BOTRIS.*

Angl. Oke of Hierusalem
Ger. Traubenkraut
Gal. Pymet
Belg. Wyguckkraut

Fuchs. 100.

IN Oliuetis Namausij cæterisq; tepidioribus & apricis aruis agri Norbonësis, vel Nitobrigi suapte sponte fruticat Botrys: Flandris, Germanis & Anglis in Hortis. Radice est sparsa inq; diuersum acta mutuo fibrarū implexu, ramulos complures ab vno scapo emittit holeraceos striatosq; internodijs folia tres vncias longa, vnciamq; lata, per ambitum angulosi lacinijs profundè sinuatis Cichorij, potius Hieracij, vel Erucæ haud disparibus, flosculorum innumera fœtura onusti ramuli, secus, pone, supràq; folia speciem primulū florentis vix exhibentes (vnde nomen illi) sed languidè lutei, vt tota plāta ex luteo viret. Pertinacis odoris gratia fragrat, odoremq; haud ita dissimilem Ambrosiæ, sed multò vegetiorem vibrat. Condiunt recentiores hanc Saccharo, vtunturq; ad Cordis affectus.

SERIDES siue ꝑ NTYBA.

ADducenda & huc intubacea, quorum cunctas familias aptè & singillatim Herciscere, etsi maioris est molestiæ, quàm laudis, non contemnendæ tamē erit vtilitatis, quando videmus plerosq; Pharmacopœos, vtinā non & celeberrimos Medicos senio confectos, etiamnum valde anxios, quid in suis, quidue in Nicolai compositionibus quotidiano vsu tritis, pro Intybis, vtroq; Soncho, Cicerbita, Taraxacone, Lactuca agrestī & similibus, sint accepturi. Quare nobis, tametsi hanc opellam successus Horis & furtiuis cudentibus, non licet esse tam ociosis: tamen amicæ quorundam petitioni, & memoriæ nostræ subsidio paucis & perspicuis hæc discernere, atq; in seriem cocciniorem digerere lubitum fuit, additis insuper, quas noueram rarioris huius cognationis plantis.

Syluestrem

Sylvestrem Picram sine Cichoriū Sonchi asperi vel Dēti Leonis folio
Cultram altitem eandem, qua latioribus, habetioribusque foliis Inrybi
Scariole fit, & aliquanto gravior.

Ploniam Hedipnium sine Picram lateam pratensem dentis Leo-
nis flore Hieracii folio, an, eadem Verrucaria Cichoracea luteo flo-
re & sulcatis capitulis sylvestris Cichoriū folio.

Pusillum bulbosum Hieracium marinum Diāscoridis alterum, an,
Theoph. Perdion ?

Condrillā Belgicam, flore caruleo Cichoriū, Folio multum lacini-
sō Cichoriū agrestis aut Eruca sylvestris, Taraxacon Officinariū,

SER. SYL.

Condrillam vulgārē lateam maiorem } folio dentis Leonis,
& minorem }

Dentem Leonis sine urinarium, vulgi, Tragopogi flore & semine,
folio Cichoriū dentatis pinnis.

Dentem Leonis Norbonensium, Aphroditi aut Lencacantha bul-
billis.

Condrillā viminosam viscidam vinearum, Norbonensium.

Condrillā Syriacā, etiamque in Norbonensi & Galloprovincijs obuiā
Cyani aut Eruca sylvestris diuisura,

Inrybolacana, que Gale-
nu ex antiquis vocat,
sine Serides sunt multi-
pliciū differentie, quarū
summa tres, nobis do-
ctrina causa erunt: Syl-
vestris Picris, hortensis,
atque Sonchus: illa ut
natura prior sic plures
habet species nempe

SER. DO.

Seridem, Endiviam horten-
sem communem flore Ciche-
riū hortensis folio Lactuce,
Habet varietatem,

Angustifoliam vocatam Endiviam,
Sylvestrem, Officinis flore Lactuce,

Alterā varietatem Crispam folio Cī-
chori, folio Lactuce crispā,

Tertiā varietatem satiuam Serio-
lam: parnam Seridem vocatam Cī-
chori hortensis folio & flore.

SONCH.

Asperam viarum folio laciniato Cichoriū aut Hieracii.
Leucom maiorem altioribus foliorum laciniis Papaneris corniculatū
flore luteo Cicerbitā, Officinarium sine Rostrum porcinum.
Alterū leucom minorē Rheadus papaneris folio flore luteo Senecionis,
Isqueque congener, simileque Hieraciū manus vnicaulis, non, dispa-
ri folio & flore, spinulis asperum.

Hieracium minus premorsa radice Diaboli vulgō Hibernie, acutis
lacinijs folijs, paruis, paucis ē radice, flore luteo minore.

Hieracium alterum pusillum non lacinosum folijs, Psiofella.

Hieracium longius radicatum, caule numero nudo folijs humi in-
orbem accubantibus, obtusē laciniatus flore Dentis Leonis.

Hieracium montanū Sabaudum grandium folijs & lacinijs Condril-
la Carulea, flore lutea.

Hieracium montanum folio Lycopsis, Cirsii Sequanorum flore,

SERIDIBVS INTTBACEOVE GNERI

cognata Tridaces, sine Lactuca merito accensentur: quippe quoniam
agrestis sit mixta ē Seridum & Papanerum natura,

Agrestis Scariola hortensis folio Laetuca, flore Opij odore uicemmens,
superfeto, & uirido.
Laetuca { *Sativa vulgaris Rctonidifolia Brasica.*
Sativa Romana dulcis, nigrior & Scariola hortensis folio, semine nigro.
Sativa Sefilus sine Capitata rugosus crispis Brasica folijs.

SERIS SYLVESTRIS PICRIS, (CICHORIUM.

Exspidus micpidus { *Galli. Cichoree lanuage.* { *Ang. Wild Cyborge.*
Germ. Wilde megwartien. { *Belgus. Wilde Cicoepe.*
Ital. Cicoreasaluatica.

Ambubcia **SERIS** siue Intybum est, aut potest esse, summum genus, ad omnia quæ Galenus nomine con-
 flato Latinograeco Intybolachana, id est intybo-olera appellat coniectetq; quispiam fefqui-
 Varro nomen inde ductum, quia Seridi natura agrestis cumellet, mitioris in hortis oleris causa
 fereretur, quod verbum etiam è Græco σάργα manauit, & eodem videtur alludere Varonis ver-
 ba, Lib. 3. de re rustica: ubi ferunt, inquit, herbani quæ seris vocatur. Intyba autem à cauo tubæ
 specie caule videntur dixisse: nam Cichorium & Ambubcia Egyptia sunt vocabula, picris ama-
 ræue insignem connotat amarorē præsertim Seridis, quæ cæteris est amarore prior, nusquā non
 frequentissima, saluberrima, celeberrimāq; apud omnes gentes cōmendatione, quam à satiaua
 Seride Scariola dignosces facile de laciniosis magis, minūque obscure viridantibus, angustiori-
 bus folijs, & amarore ingratiore, totiusq; plantæ habitu, & radice scabriore, duriore, exustiore.

CICHORIUM satinum, cæruleum, picris eadem,
 sed cultu variatum.

{ *Germ. Sam Blauegwart.*
 { *Gal. Cichoree des lardins.*
 { *Belg. Samme Cicoepe.*
 { *An. Cyborge.*

NOn nisi cultu & solo istud distare inde manifestum, quia in Taurinensi agro, Sabauo, in-
 que vinetis Burgundiæ latiores foli nec liniamentis, nec sapore, aliæue nota distet à supe-
 riore. Brugis ac Antuerpiæ in Flandria depungunt tenellas plantas in patentibus aruis, quas
 seuerint post Solstitium, aut festum S. Ioannis, ne in florem luxurient: vt per hyemen maiores
 tenerioresque radices foueant ad vescendum: minùs tamen laciniosa & similis illi est, ubi multū
 colitur, illique abundè suggeritur alimenti in hortis: alioqui flore & femine non dispari.

HEDYPNOIS Plani, Cichorium, luteum pratense, Dentis Leonis
 Flore, Hieracij folio: & an eadem sit Verrucarium Cichorium,
 luteo flore, & sulcatis capitulis?

SI vt peritioribus visum est, hæc sit Plinii Hedypnois, quam suauiter halantem vel som-
 num conciliantem interpretantur, quin sit Cichorii species, haud dubium: quippe domestici
 Cichorii radix, foliorum ortus positus & numerus, caulis & flores, vniuersūq; habitus, planè
 Cichorium Syluestre imitantur. Hoc tamen dignoscuntur, quod huic omnia maiora sunt, fo-
 lia albidiora, latiora leniusq; laciniosa, & toti ramofo cauli adnata, luteique flores, papposi glo-
 bi longè maiores, & succo amaro pedalis radix turget: in pratorum, vrbiūque aggeribus
 passim occurrit, vocata Germanis *Gedward*, Gallis luteum Cichorium.

BELGARVM Condrilla cærulea Cichorij sylue, aut Eræca syl. dimisera.

CONDRILLA differentias esse Seridi subalternas, atque simillimas, vel hæc indicio est, quæ
 dumtaxat à Cichorio syluestri videtur differre exilitate foliorum, cauliumq; nitidorum e-
 legantia: pauciores etiā alas habet, sed flores non dispares, vt nec radices, quæ similes similiter
 Cichorio eduntur, tamen non nisi hortis Gallicis & Belgicis nobis visæ, quia rara.

CON-

CONDRILLA pusilla Marina lutea Bulbosa, an Diosc. radice rotunda
orbiculata σεργύλλα & an Theophr. Cichorium Perdiōnus?

SA N E quam rara Seridis species illa Cichoracea bul-
bosa, quam videtur Theophrast⁹ innuere. Folia sunt Se-
rydis syluestris diuisura, aliquanto minora. Caule fermè
nudo tenero, in cuius summo vnicus flos luteus Dētis Le-
onis, minor tamen, & itidem in pappos euanescentes: imo
cauli subsunt filamenta terna vel quaterna, quibus toti-
dem pluresue interdum bulbi appensi sunt perlucidi ex
albo purpurascētes, solidi & succi pleni, quæ carnē Rha-
phani fermè præferunt colore & pelluciditate. In locis
paucis, sed tamen magno prouentu oritur. In Italia docti-
orum nullus se vidisse nos monuit, neq; vidimus ipsi alio
loco, quàm secus insulam & lacustres tractus Montis Cœ-
ti Narbonæ ad piscatorum attegias. Hæc merita est argu-
tam pictoris manum, vt sit Diuini philosophi Theophra-
sti monumentum, qui nos illius monuit, recentiorum nullus. Quæ si Athenis nobis do-
no missa fuisset, haud tamen continuò magis Atheniēsiū, quàm Monspellēsiū, Nar-
bonēsiūue cichorium nuncupanda fuisset.



Monspellēsiū Dens Leonis Aphroditi vel Leucacantha bulbis
oblongis an Condrilla altera Dioscoridis?

N I S I illud Bulbosum Cichorium nostræ ætati innotuisset, meritò quis putasset hanc
esse Condriillam Dioscoridis oblongis & circumscissis folijs, humi sparsis: radice ro-
tunda, quam etiam Plinius radice fabæ simili aliquando numerosa describit. Verum y-
trouitis modo accipias, è Pliniana designatione, aut Dioscoridis codice certum est, illi Cō-
drillæ melius congruere vel bulbosum Cichorium nostrum, vel Dentem Leonis vulga-
rem: etenim si Pliniū sequaris, nostrum Bulbosum dicas illum exscripsisse ex Theophras-
to, cuius quidam Perdion Herbam esse augurantur, aut alio quopiam Botanico.
Sin non legas apud Dioscoridem radicem *κωνία καὶ σεργύλλω* non perperam Den-
tem Leonis vulgarem statues esse secundam veram Condriillam, atq; intelliges depraua-
tam fuisse lectionem, fortèq; legendum, non *κόνια*, sed *κονίω* σεργύλλω, quæ videtur
doctissimus Ruellius interpretatus. Quippe minùs aptè quadraret, radicem Sonchi
huius benè adultam esse & succo plenâ dicere, eandemq; leuem aut minùs ponderosam.
At sic etiam aptior foret hæc, quam vtrius illarum ex hac & Pliniana interpretatione.
Radices namque huius plantæ tenues sunt, carnosæ, succo refertæ, rotundæ in mucro-
nem ad verticem, oblongæ fabæ quadamtenus similes, vt Plinius notat, quem hal-
lucinatum, vt alias putasemus in collatione primi Sonchi Dioscoridis (cui adnascuntur
grumi, nodiue gummi circum caulem fabæ tuberculo similes) nisi Plinius non pri-
mam, sed secundam Condriillam describeret hîc verbum de verbo fermè è Dioscoride,
aut consimili clàsico autore. Huius facili prouentus in Hetruriæ, Galloprovinciæ. &
Narbonæ marginibus satorum & pratorum Iunio & Iulio flores luteos, papposq; gestat
multò maiores, pallidiores quàm Dentis Leonis: nec tubi caulium absimiles multum,
folia etiam humi strata, sed minùs altè incisa, aliquantum glauca & hirsuta propius Ci-
chorium Syluestre referentia, sed multò latiora. Gustu amaro acri & Dentis Leonis: vi-
res, quas dicemus alibi opportunius, latuere nostrum Commentatorem, qui hunc Dētem
Leonis nouitatis & peregrinitatis titulo iactat Constantinopolitanum Cichorium,
cum tamen Sienæ illius patriz, inque Hetruriæ, Liguriæ, Galloprovinciæ & Naboronæ
pratris non parum copiosum istud proueniat. Neq; enim si flores sunt huic duplò fermè
maiores niagisq; pallentes, quàm communis, propterea putadum sit felicius prouenire
aut frequentius Constantinopoli, quàm Malsiæ, aut Monspellij, vnde scimus tum
Commentatori, tum alijs non paucis scriptoribus hodiernis missas & obtrusas ple-
rasq; plantas pro Aphricis, Syriacis & Constantinopolitanis. Sic res cadit pigris & ambi-
tiosis ingenijs, quos res nondum visæ oblectant, vt pueros picturæ capiunt & decipiunt.

An

An putat peritos illic istud Cichorium admiraturos, quia Constantinopolitanum erat & à Casareo oratore missum? An non pudet tantum rei Herbariz scrutatorem non dum nosse Cichorium patrum, & plus credere oratori occupato muneribus aulicis, quàm exercitato ad discendas varias species Seridis.

VVLGIDENS Leonis, siue Vrinaria, Tragopogi flore & semine,
folio pinnis dentato.

Ger. Korikraut et Phaffenblat.
Belg. pappen cruyt.
Ang. Dente de Lyon.
Gall. Pissenlit & Dent de Lyon.

NEQUE hæc sit Chodrilla, ut cui prorsus absint tuberculi, tum radices, quales Plinius & Dioscorides innuere videntur, tum cauli imo grami desunt quos nomen designat: *χρόνιον* enim grami sunt, concretionisue nodosæ, cuiusmodi in mammis, in quibus lac coaluerit, inq; duritiæ cōcreuerit, quas *μακρὸς χρόνιος ὄζων* Græci dicūt nisi Dēti Leonis contigerit idem quod Drabæ, cuius radici interdū inest tuberculus, interdū nullus, atq; nostrati idē quod fœniculo, Tragacanthæ, Rutæ & mastichæ, quæ quibuscū in regionib⁹ micæ Gummi, lactæzue concretionis tuberculos habent: in nostris tractibus ut plurimū tale nihil. Etenim secundum illam plantam cœruleam & Cichoreaceam, quam priorem Condrillam posuimus, nō parum refert Cichorium & Condrillam Dens Leonis vocata, siue Vrinaria Herba *Pissenlit* Gallis pueris dicta, quasi Leſtīmīnga: aluum namq; supprimendo, obstructionēq; referendo Meſeraicarum plus lotij deriuat in vesicam, quàm quantum pueruli retinendo sint, præsertim inter dormiendum, eoq; tunc imprudentes & inuiti stragula permingunt. Siquidem mulierculæ medicæ & pueruli rustici in pratis, prope tumulos aggerulosue Talparum terra semiobruta cōq; (veluti Endiuiz cōtingit) germina suauiora minūq; amara, candidiora effossa in acetarijs vorant, aut iusculis indunt. Alit, vrinas ciet & somnum conciliat, quapropter Hedypnoin quidam maluerunt dicere, quam superius Luteum Cichorium: tameti appellation pluribus Intybaceis & Condrillis congruere potest. Cuilibet genti hæc multō notissima, solijs Cichorij syluestris, latiorib⁹ & lacinijs altiorib⁹ vtrinq; dentatim, serratis, humiq; serrē stratis. E radice Cichorij digitum crassa, aliquantum lutea, & lacteum succum, dum vulneratur, fundente, pediculorum tubuli potius quam caules tenelli nitescentes, lacteq; turgentes florem speciosum, luteū, multipolum Tragopogi vel Scorfoneræ promūt, vere & æstate partuculatum, obſarie papposa dilapsa, capitula instar Monachi capitis glabri aut calui visūtur.

CONDRILLA Coronopi aut Cyani tenuifolia,
lutea vinearum.

PVTARVNT etiam nonnulli doctissimi hanc esse alteram Condrillam Dioscoridis, ut qui superiores nodum nossent, nec hæc sanē ita abſimilis, turget enim amariore & pluri lacte quàm Cichorium. Sponte tota æstate calidiorum regionum vinetis & oliuetis glareosis obuia passim est, solijs palmum & sesquipalmum longis angustis acutisq; laciniarū ligulis vtrinq; detatis, crassiorib⁹, pallidis Refedæ magnitudine, similitudine & situ, caluem stipantibus striatum Cichorij agrestis, luteum diuisum albis flore Hieracij aut Lactuæ gerentibus, inq; pappos diffluentibus, amariore & acriore sapore.

CONDRILLA viminea viscosa
vinearum.

Iisdem

ISDEM ferme natalibus agri Linguotici est quædam Condrilla visu pulcherrima, Plurima Iunio & Iulio floret cis pontē Castrinoui à Monspellio vix sesquimilare. Radix vniuersaq; planta lacte turgēt, & viscida est tactui, creberrimis vimineis viticulis, flexu mollibus, candidis, rectis, cōfertis, assurgit, duorum altitudine cubitorum, folia in imò Cichorij aut Cyani incisura, sed valde exilia & tenera, reliqua foliola secundum viticulorum longitudinem certis & æquis distincta interuallis ad fastigium vsq; porriguntur, speciemq; virgarum viridi albdq; variegatarum præbent, summis viticulis prodeunt, flosculi lutei in pappos dehiscētes. Hic pictura adest.



Verruca CONDRILLA.

Cæterum Condrillam Cichoriumuē illud Syluestre quod Zacyntham vsq; peregrinitatem affectans vocat Commentator: tam certum est oriri in Italia, (ne è Zacyntho insula Græca eam euocet) quam parum certum semel voratam, quod aut idem, vt multi de alijs quam plurimis fabulantur, delere verrucas: Illita verò posse, certum & commune illi est cum quamplurimis, quarum succo exurantur aut exsiccantur verrucarum radices & appendices tum calidis vt Tithymalo, tum frigidis vt Plantagine equiseti, intermedijs vt Heliotropijs de quo nomen verrucariz testatur idem.

SERIS, sine INTYBUM Satium, Latifolium, ENDIUIA,
& SCAROLA officinaria.

Ger. Scariol & Endiuia.
Gall. Endiu.
Belg. witte Endiue.
Ang. White Endine.

QVAMVIS Intubi nomen Latinis cunctas complexum esset Seridis differentiæ, tamen postea Græca prolatio ex Intubo Endibion, quasi Intubion detorsit, atq; dūtaxat vni speciei domesticæ Seridis adstrinxit, quā Endiuia & Scariolam (pariter è Seride deprauatam) dicimus vulgo. Ea gratioris amaroris, præsertim si mitecat Holitorum industria, sed frigidioris facultatis est quam Cichorium, à quo non tantū cultu gra du, agriue bonitate, sed etiam generica differentia distat: nullo enim neglectu, transmutatione alioue incommodo visa fuit vnquam in Syluestrem aut picram Cichorium degenerate, aut hæc ad speciem huius Seridis promouisse. Et manifesta radicum differentia, est enim Cichorij bene habita carnosā admodum grata: Endiuia verò fibrosa penè nulla nulliusq; vsus in cibis, alicubi tamen in quibusdam compositionibus, Et tamen non negari omnia summa genera in naturæ ditione fuisse Syluestria, antequam feri, aut colācepta fuissent: tamen certum est tum placitis, tum obseruationibus rei Rusticæ multis, quamplurimas plantas esse quæ nunquam nostro saltē orbi Europæo fuerunt, aut fieri potuerunt Syluestres: tamen aliquantū varient vt hæc, angustioribus iam, iamq; latioribus folijs, & lætiora habitu: verum semper ideam suā sibi aut retinet, aut interit.

H. j.

Lacior

Lætiore multò exit è semine Italico, aut cuiuspiam regionis meridionalis, vnde solent ferere quidam Brabantii, Angli, & Germani holitores: simul ac terna, quaternauè foliola eruperunt, in solum pinguius lætamine multo transmouetur, lateritioq; frustra media oneratur folia, quo latius se porrigit luxurientq; qua industria amarorem exuit, gratiamq; initum Hybernæ mensis ad acetaria, seruat obruta terra, sime to, straminèq; infimæ plebeculæ notissima, nomine *Alba Endiuia*, quando folia sunt candorem assequuta, per Autumnū, & Hyemen virens, folijs latis oblongis, ex candore viridantibus initio est, Lactuceacis proximis, proximum caulem amplexis, in quo flores cærulei Seridis, Cichorii semina, (& interdum flos) alba, non secus atq; Cichorium intetdum meminimus: radice albida, proluxa, marcescente, dum semen maturuit.

Crispa.

Varietas.

HANC (quod idem Lactucis & Brassicæ contigit) apud cultiores Romanos holitores videre meminimus: folijs amplioribus, rugosis, inq; plicis contractis, crispantibus, Brassicæ in morem, caulem, flores, & semen non disparia alentibus.

Seriola aut Endiuola.

EANDEM hanc acutis, non altis lacinijs, folijs angustioribus, nec diuersam caule, flore, semine, & radice alunt, quidam Horti Ligurum, Tuschorum, & Gallorum, vocantq; Endiuolam, & Seriolam, quia minor tota sit.

SERIS DOMESTICA, altera Lactucina Diofco. amara, angustifolia, Officinis iam olim, sola **ENDIUIA** Agnita & recepta, perperam recentioribus Lactuca Sylvestris putata.

SPECIEM hanc incultam Seridis satiuæ, non varietatem facimus. Est enim folijs dum primulam pullulant, & emergunt altius, Scariolæ hortensis: postea adultiora in effigiem Dentis Leonis sinuantur dentatis oris, & nonnullis quasi in dorsi spina aculeis uti in nostra vera Sylvestri Lactuca: Caulis quaternum cubitorum, hispida, vnicus, rectus, lacte turgidus, floribus luteis, pallidis Lactucæ donatus: amaro gustu, & præsertim vetustioris, acri radice, pusilla, fibrosa, Seridis hortensis, Syrupo de radicibus miscenda consuetudine Practicantium, quos doctissimos barbaros, tam proteruè quam inscitè, quidā declamatores putidi rident, & sputis conuicijs lacerant, quod hanc plantam Endiuiam veram putarint, & etiamnū vsurpent nō modo ad Syrupos de radicibus, de succo Endiuiz & alios Nicolai, sed etiam stillatitias ex ea eliciant, quibus suas Rhabbarbari macerationes parent. Esse quippe nimis calidam, amaram, ingratham, quidam illorum reprehensorum, alij autem esse Sylvestrem Lactucam, nec aliam se nosse dicunt. Sed enim qui institutum perpenderit veteris Barbarorum nostrorum scholæ, animaduertet illos magna ratione & experimento neutiquam contemnendo fultos. Quippe non solum hanc Endiuiam, aptiorem esse decocto suceo, & stillatitia ad intemperies, obturationes Hepatis, & primarum venarum, sed etiam macerationes Rhabbarbari, Myrobalanorum, & similium medicamentorum: cum enim sit paulo tenuiore & minus excrementoso humido, melius referat, & abstergit: tum etiam intima rerum macerandarum peruat, nec calore exuperat, aut amarore nocet, cum eius amaror non sit à calido, aut saltem non calidus, ut norunt cultioris Philosophiz periti, & studiosi conciliare apud Galenum, & Auerroem, questionem de Opio, Meconio, Papauere, Lactuca, Mædragora, & non parum multis alijs amaris, multum tamen frigidis, quæ accurate in remedijs dicuntur. Quin Diofcori. docete, Sylvestria Intuba, siue Serides Sylvestres, stomacho meliores satiuæ, quia ipsum estuantem & tenore resolutum resocillet: in cibis voratæ, & foris admotæ. Et notæ huius melius congruunt Endiuie siue Seridi amare angustifoliæ, quam Lactucæ Sylvestri, cui nostra paulo inferius describenda, paucis adhuc cognita & nulli depicta plenè quadrat.

SONCHVS ASPERA Vulgi flore Hieracij, folijs Dentis Leonis, aliam
Dipsaci & Lactuca, an Dioscoridis ARBORESCENS
SONCHVS tenerior latifolia?

{ Germ. Senß distel.
Ang. Sow thistle.
Ital. Cicerbita.
Gall. Laitseron & Laiteron.
Bel. Wansen distel & Wietkewep.

PROXIMA adeo est Sonchi natura Endiujs, vt multi etiam hodie putent spinosam Endiuam nostram, esse Sonchum asperam: verum tres, cum notissimas habeamus Sonchos, illam Endiuam vt Officinarum retinuiimus. Sunt autē hę tres lacte pregnantiores verę Sonchi Gręci $\omega\alpha\pi\epsilon\delta\ \tau\omicron\ \sigma\omega\gamma\ \chi\lambda\upsilon$ quia salubrem succum de se fundant, ad estuosos stomachi lincinationes & Hepatis biliosas obstructions vtilissimam, *Cicerbitam* Latini & Itali etiamnum vocant *Senß distel* Germani: siue spinā asperinā, spinosę namq; sunt omnes Sonchi, sed quędam horridiuscula aculeis, quędam perpusillis aut nullis ferē visitur. Quarum duę frequentiores maiores sponte, cultis & incultis, segetibus & vinetis: minor, minus obuiā & nota. Aspera quę vocatur, ē radice proluxa, subflaua, stipatu fibrarum comosa, caulem erigit concauum, quaternum & senum cubitorū, bene adultum, alatum, & floribus donatū, luteis papposis, Senecionis, aut Hieracij minoribus. Folia ab imō numerosa, laciniosa, Dentis Leonis vbi solo squalidior oritur, sin verō latiore aruo & pingui, lactucacea sunt: Dipsaci magnitudine leuiusculis, per ambitum lacinijs & spinulis aspera, cunctisq; sui partibus adeo tenerescit & fruticat, vt arboream senum, septenumuē cubitorum proceritatem æquet, cibo etiamq; tunc sit mitior & aptior: quare multo commodius statuissent, istam esse Dioscoridis arboream, cum duę sint adhuc notiores, & aptiores ad explendum Dioscoridis trium Sonchi differentiarum descriptiones, quam Endiuam illam Officinarum, de qua superius. Et faueret coniecturę plantę huius teneritudo, ac foliorum latitudo, quam dicimus contingere. Soli bonitate acrisuē & regionis varietate, quemadmodū in Cichorijs & lactucis, quę cum agrestes sunt, hirsutiores & spinosiores proueniunt: cum verō foecius adolescūt, tenerascunt, minuscq; horridę fiunt. Verum Endiuia illa nec tenerescit, nec vnquam esculenta fit, potius amarescit, & samentosa euadit, simul ac floruit.

SONCHVS LEVIS, laciniosis folijs.

{ Ger. Rosenkol.
Bel. Wafen lactauwe ende Cauyentkrupt.
Ital. Cicerbita liscia.

ALTERAM vero leuem dixerūt, etsi folijs sit magis scabris altioribus, angustioribus & inconditis lacinijs, longioribus, minus tamen multo spinis horridis caule ambiētibus: per quosdam quasi genicularū exortus rectū stratam, rubellum, concavum, lacte turgidum, floribus papposis Senecionis aut Iacobę habitu ipso, foliorum quadamtenus Papauer Corniculatum prefert: Oleracea tametsi esse potest, tamen quia non colitur non mandatur.

Varietas.

Diuerſam quandam ab vtraque superiore, passim iisdem in locis, vinetis & segetibus obseruauimus: tenuiorem totam & foliorum incisura, atq; similitudinē Papaueris erratici (quemadmodum superior cornuti) circumfusa, imo cauli ē Radice parua fibrosa, pedali & cubitali Hieracij modo alata & floribus luteis non diuersis,

NON secus ac Elaphobosum à Ceruo, Chelidonia ab Hirundine, Perdicias à Perdice, permultaq; alix plantæ mutuatum est nomen Hieracium ab aue cognomine, quæ sibi huius succo aciem calliginosam collustrare consueffer, aliòquin è genere Sonchis non diuerso sed proximo est omne Hieracium, cuius multæ vel differētiz, vel varietates sunt: & omnium frequentissima quæ maius vocatur.

Maius.

EST itaq; Maius vocatum ubiq; vinetis, agrorum marginibus, & pratis siccioribus frequentissimum, è radice fibrosa, Endiuiz vel Sonchi aspera, folia laciniata pinnata Dentis Leonis vel Sonchi diuisura promit, caulis inanis striatus nonnihil interdum rubens pedalis & sesquicubitalis flores Senecionis vel Sonchi ex luteo pallentes sunr. Tota lacte turgēt non secus ac Lactuca & Sonchi.

HIERACIUM minus præmorsa radice, folijs acutè laciniatis flore luteo.

MI NUS Hieracium pratis montosis Angliæ admodum familiarè, cauliculos fundit iunceos, læues, graciles, sesquipalmares: è radice parua fibrosa, plantaginis aut Succisæ modo præmorsa, eoq; plebeculæ Hybernæ, Morum Diaboli vocatū. Folia pinnata angustius laciniosa, delicatiora, minora, vti etiam flores luteoli, in pappos euolantes.

HIERACIUM aliud minus non lacinosum folijs Pilosella.

AL IVD etiam in squallidis, sterilibus, saxosis, glariosis, ericetis agri Norbonensis hirsutis, palmaribus, cauliculis, exir & sesquipalmaribus folijs pusillis pilosellæ aurpotius Hieraci Bulbosi: & Dioscoridis, radice perpusillis capillamentis fibrosa, floribus item papposis paruis non dissimilibus.

Varietas. *HIERACIUM longius radicatum, caule numero nudo folijs humi in orbem accubantibus, obtuse laciniatis flore Dentis Leonis.*

Q VOD in sabuletis Belgicis & Northmanicis passim obuïu agris vt plurimū folia in orbè humi strata crassiora edit, magis quā burse pastoriz, circinnatis lacinijs Erucz, cauliculos, graciliores glabros mucrona os, alis multis diuisos, floribus donatos, Dentis Leonis sed minoribus inq; pappos euolantibus, radice nuda nec fibrosa caulem longitudine æquante.

HIERACIUM montanum folio Lycopis, Cirsij, Sequanarum flore.

MA IUS & rarius cæteris istud in montosis Sabaudiz, Allobrogum; & Turæ finitimis: quod in vireto Stirpium delicijs ditissimo ciuis Londinensis & Pharmacopœi peritissimi Hugonis Morgani flores edidit Iunio Cirsij lutzos semenq; hirsutum Tragopogi, ortus & caulis aliquantum Carduum Benedictum asimulant aur Cirsium, cuius etiam est folijs obscuris per ambitum crenulis peracutis asperatum & acrius, nec perinde vt superiora lacteum.

HIERACIUM Sabaudum & Montanum folijs & lacinijs Condrilla caruleæ flore luteo Dentis Leonis.

Eidem

ET DEM Morgano floruit altera Hieracij species Iulio & Iunio, Condriillæ cæruleæ folijs altius incis, viridibus, in caule flaccido & molli glabro. Flores Dentis Leonis ali-
quantò minores, radice Tragopogi.

TRIDACHES: sive LACTVCAE.

QVemadmodum Seridis recensuimus multas species subalternas quarum quædam longius, quædam verò propius à se ipsis absunt, sic possumus constituere lactucam illius Endiuiz speciem quam Lactuceis folijs donatam ex dioscoride descripsimus. Quippe Lactucæ vel nomenclatio. Sed à lacte ducta & distincta fuit nomenclatio speciei huius, quia plus lactis resudaret cæteris Endiuiz & vescentibus mulierculis augetet. Ea propter Græc Τειδαξ dicta, τὰ γὰρ τὰ θεία quæ folio ficulneo (vt videtur) vocarūt, vtpote, lactis non expertia. Cum autem lactuca horten-
tensi esculenta nullum olus frequentius aut notius sit de cuius collatione Syluestris lactuca noscenda fuit & censenda recentioribus.

LACTUCA AGRESTIS: Scariola hortensis folio, Lactuca flore,
Opy Odore subementi, soporifero & viroso.

NAM ea Seridis species quæ folia habet Dentis Leonis ritu incisa, quam propter & proceros caules & frequentes aculeos Sonchum arboream Syluestremue quidā putarunt, nihil lactucæ simile habet præterquam lac & semen. Folia adeò intybacea sunt vt Pharmacopœos vbiq; etiamnum ea in pertinacia alat qui hanc pro Syluestri Endiuia agnoscunt & vsurpant, tum Syrupis, tum Syllatitij liquoribus. Horum plerisq; adeoq; etiam Doctis præceptoribus nostris, vt Rondelletio & Assatio maximo styrium Norbonensium indagatori, altera lactuca non minus præsertim hic in Anglia frequens quam illa, sed longe proprius accedens qualibet sui parte ad lactucam vel ad seridis latifolij vulgo Scariolam lactucæ simillimam, feruentibus foliis Norbonæ locis apricis huius lacteum succum exuberantis & præ copia transluentis dum colligeremus, vix soporiferum ferre poteram odorem qui teter & ingratus vt opij. Caulis bicubitalis, glutinosus, Flores lactucæ, semen aliquantò minus nigricans. Eandem seuit in horto Morganus Londinensis Pharmacopœus peritus, vbi à satia specie diuersam facile discere ac meminisse par est, ne cultæ quidem foliorum rotundam oram, ac pro sui magnitudine latam, amplam, nec laciniatam, (qualem vult Theophrastus & Dioscorides) Dentis Leonis modo incisæ, vt Endiuiz Officinarum præsertim adultæ.



Lactuca Sylvestris vera.

LACTUCA SATIVA, Folio Scariolæ.

ET satia quidē lactucæ notius nihil, cuius varietates complures sunt nō secus ac Brasicæ. E Radice fibrosa Endiuiz caulem, cubitalem & sesquicubitalem, rectum alis diuisum, & lacte pregnantem edit, cui insunt folia seridis satiax similia. Flores copiosi
H. iij. pusilli

pufilli luteolj in pappos abeunt. Semen pufillum album teres compressum Phalaridis leuius, angustius.

LACTUCA CRISPA, non capitata.

ELEGANTIAE studiosi Olitores, in hortis colūt: quamplures huius Lactucæ varietates, nempe Crispam, quæ eadem cum superiore esset, nisi illi essent folia reduciōra, contractiora & bullatis, rugis crispata: vnde tota tenerior & olere gravior habetur. Semine alioqui & reliquis partibus, à superiore non differt.

*LACTUCA, ROMANA dulcior, nigriore & Scario-
la hortensis folio, semine nigro.*

Satine varietates.

RARIUS hæc in Gallicis & Germanicis hortis colitur, frequentissima tamen Italicis, Romanis præsertim, vnde Romana vocata fuit: nec à vulgari distat, nisi quia nigriore folio, nec perinde scabro semine nigro, tenella tota, gustu dulcior, coq; gravior, aptior ventri mouendo, quam merito putet quis scitè illo Martialis carmine designatam. *Prima tibi dabitur, ventri Lactuca monendo.*

*LACTUCA satina, sessilis, sine capitata, rugosis
crispis Brassica folijs.*

CAPITATA verò quæ vocatur, propter glomum foliorum conuolutorum, atq; stipitorū in sese, quasi multæ tunicæ mutuò appressæ, ad æmulationem Brassicæ capitatæ & sessilis vocatæ, quia vixdum à radice exiens foliorū globo, insideat humi, qua de nota est cuius notissima, ac tenerrima: primæ in acetarijs commendationis, albicat. Si quæ sunt præter ea Lactucæ min⁹ verè dictæ nomine, vt Theophrasti marina, vel lacte, vt Tithymali, suis locis dicentur. Per multa aliā experiuntur Lactucæ mangonia scitè conuenta veluti & Brassicæ, quibus facies & fructio, in olere non admodum dispat.

BRASSICÆ.

*Caulis sine Brassica
diuersa.*

- Alba, Sessilis, glomerosa, aut capitata, Lactuca habitus.*
- Eadem conuoluta & arctè occlusa, apud Belgas, rubro colore, enematis aprior.*
- Sabauda, Vulgo Sauoye, patula & minus occlusa, foris virens, intus albicans.*
- Racemosa, non globosa, vulgo Ital. Cauli fiore, sine florida Pompeiana.*
- Laciniosa alba, & Rubra Cumana, vulgarior.*
- Nigra vndantibus, crispis & laciniosis folijs.*
- Marina multiflora, Sylvestris, monosperma.*
- Caulisapa, brassica peregrina, medio caule turbinata & rapata.*

VOLUITVS superius Raporum generi comparare & subdere Brassicas, propterea quia mutua sit quadam amicitia & affinitas vtriusvis feminis, vetustioris præsertim, vtramvis plantam generandi, vnde antiqui Græci Raphanum Brassicam, vel hanc Raphanum vocitabant. Attamen commodior occurfus, aliarum plantarum fecit, vt huc post Lactucam distulerimus, historiam, Brassicæ quam κρότῃ βραχῶν à vorando & Græco dictam

dictâ verissimilè est. Estur namq; tota à plebecula tû cruda, tum cocta, vel muria seruata, etiamnum hodie apud Germanos & Italos: dictam etiam *νεζυμι* quasi *νεαμι* aut pupillas oculorum lederent, Columellæ hortus & vericulus statuit. *Νunc veniat quamuis oculis inimica corambe.* Tametsi placuit nonnullis à *νεζο* & *αττιβη*, quia ebrietati aduersetur: qua quidem viget commendatione apud Germanos, si vspiam alibi. Sed vbiq; notissimum, quare nullum est opere pretium tam vulgarem exactius notis designare, satis futurum, quòt cultu vel euctu alio varios subit habitus & varietates, summatim perstringere. Est quippe omnis Brassica caule meduloso, rugoso, squammatim & geniculatim scabro, radice lignosa, fibrosa, floribus, semine & siliqua Rapæ: folia ortu & aspectu Lactucæ, cuius etiam varietates imitatur.

Cæterum Brassicam marinam siue Soldonellam, magis vsu & nomine quam re similem, inter volubiles dicemus.

BRASSICA alba Sefilis glomerosa, aut capitata Lactuca habin,

νεζυμι

Gall. Chou cabu, blanc.
Ger. Rappistraut
Belg. witte Surtkoolen & Lattuskschoolen,
Ang. Cabbage.

NIT 1 similius Crispæ capitata Lactucæ quam hæc Brassica: folijs etenim admodum crispis, densè inter se conuolutis, intus forisq; albis teneris, intrinseca parte concavis carinatis & quasi media costa, exterius verò neruis venosis, digitum crassis medijs & secundum longitudinem hinc inde cursantibus, aut obliquantibus, cuius in olere apud Italos & Gallos prima commendatio.

Eandem conuoluta & arcta ocellata, apud Belgas, RYBRO colore, enematis, aptior.

HÆc nisi colore, à superiore qui ex purpureo clampelino, in cœruleum languet differt. Vtriusq; nusquam maior prouentus & setura quam apud Belgas visitur, qui naues onustas in vicinas Germaniæ, Angliæ & Hispaniæ, regiones deuehunt. Hyeme cibis sunt gratiores, enematis valdè accommoda, quare sepiissime miscent, Germani & Belgæ medici. Vere primo panduntur folia & in caule bicubitali, tricubitali vnciam crasso erumpunt flores, siliquæ & cornicula Rapi similia.

BRASSICA PATULA, Sabauda vulg. Savoys, Intus Albidis, foris virentibus folijs.

NEc minus speciosa quam Sabandam recentiores hodie vocant, à selsili Capitata dissidet tantum colore. Capitula patulo, minus clauso, & floribus albis. Impatiens frigoris admodum, quare in Italia, Sabauda, maritima plurima, rarior ad Septentrionem, vbi reliquæ brassicæ frequentissimè coluntur & eduntur.

BRASSICA florida.

ELIGANTIÆ peregrinæ est quæ vocatur florida, aut potius racemosa, vel botritis: sunt enim quædam germinula florum, quæ densissimis, muscolisq; albidis, olæ erumpunt: oblongis racemis è medio quasi foliorum centro, vbi quasi vtero, conduntur & fouentur, semine Rapæ, gustu in olere delicatiore.

EA quæ vulgarissima Brassica folijs Rapæ laciniosis nec inter se implexis est: vt plurimum ex albido & pullo albicat.

Eademq; in hortis Rubro colore ex cæsis, crebra visitur. Cui interdum carneæ costæ carinæ uē dorsū foliorum rubent folz: Interdum folz albæ sunt, reliqua foliorum tunica purpurante, aut vndante, oris & fimbrijs crispantibus.

ANGLICA MINIMA BRASSICA.

MEMINIMVS, etiam in Angliæ hortis pugillam brasicellam, totam niuem præterquam extremas oras laciniosas fimbriatâq; plicis crispantibus, & vndulis rugosis, Purpureis, asperfas maculis, quas etiam ad corollas & olfactoriola nectenda: dum tenella adhuc est in hortis colunt,

REGIONIBVS ad meridiem quibus præsertim oleum abundat, hæc multum familiaris in olera quia suauissimo gustu est, oleo præsertim vel condita, vel elixa, aqua mixta: folijs est quam superiore vulgata, nigrioribus, viridioribus, & rugosioribus.

Brassica, MARINA, SILVESTRIS, multiflora, monosperma.

PRÆTER hæc elegantias, fimbriatæ, crispæ, & Floridæ, Brassicæ: quæ in Belgio, Francia & Anglia, magna copia seruntur. Est etiam perquam pulchra Brassica Sylvestris, Dioscoridis specie diuersa, locis oriunda Angliæ maritimis, ad Portlandiam insulam: sed quia inculta, neglecta, Hispidior tota & predura est, cymæ ingratiores multo, cibo toleranda tamē. Cuius semine iam diu Medicus Anglus hac parte exercitatisimus, Turneris nos donarat, eâq; monocaulû & *μονοκαύμον* vocandam, à semine singulari volebat. Sunt enim in florum pallentium alborum congerie eleganti, densa & umbellosa, multis in ramis siliquæ breuioribus crassiusculæ, quibus singulis singulum inest semen, paulo minus Pisô, Soldonellæ, aut Orobi æquale. Folia eadem fermè quæ Brassicæ nigre, sed crassiora & lætiore aspectu, & fimbrijs vndulatis plicisq; admodum artificiosis.



CAULORAPA, BRASSICA peregrina, medio caule turbinata & Rapum.

SVPEREST mirificæ illæ Naturæ lusus recentioribus, Caulorapum vocata, planta peregrina, è Græcis, hortis nostris inquilina: Rarior Septentrionalibus, vtpote, cælo rigidiore minime affueta. In Italia nobis, Florētiz, Patauij, alijsq; locis visâ, folia illi vulgaris albæ tum aquatæ Brassicæ, per ambitum latius sinuata, radicæ lignosiore caulem effert: non altiore pedem, quæ folia oriuntur, quorum exortus ambiunt & inuoluunt: pro tuberantem bulbi instar capitatû, fungosa carne Rapum, vnde nomen Caulorapum cōflatum, vt natura ipsa. Quod tuberosum Rapum, Cauli reliquoc oncolor est, & sapore, medullæ eodem quo caulis.

- Beta alba* Lactuca & Rumicis folio, flosculis luteolis *CICLA* Officinarum
Sicula Theophrasti.
Beta nigra folia.
Beta rubra sine purpurea, *Amaranthi* & *Blitifolia* radice turbinata.
Beta rubra vulgaris, non turbinata.
Blitum album, folia *Beta*, *Atriplicis* flore.
Nigrifolium rubrum *Blitum*.
Blitum patrum angustifolium.
Amaranthi purpurea satua coccinea.
Amaranthi maior floribus & pediculis candidis purpureis.
Amaranthi tricolor, vulgo *Papagalli*.
Amaranthi holosericeis, sanguineis, variatis, reticulatis floribus, hilarioris as-
 petu.

BETA ALBA. τεῦτλον, ἁσῦτλον

- Gal.* Bete, lôte, blanche.
Germ. Weisses Mangold.
Belg. witte Bette.
An. White Betis.

QVO modo non frustra optent probi primates, in qualibet re publica bene instituta, vt Pharmacopœi sint non modo fidi & industrij, sed etiam simplicium cognitione exercitati, qua sine eorum ars fucus est aut scelus, quando hodie videas eorum peritissimos qui se vocari cupiūt, & quasi medici cui famulātur Thefeos qui quid intersit inter Blitum & Betam, nec legendo in libro aut horto oculis manuē discernere nequeāt. Sed vtrumlibet pro altero accipiunt, proter geminam nempe nominum & foliorum similitudinē, tamen non parum distent inter se.

Betam etenim a litera Græca β ita sic dictam volunt, & canit Lucius Columella, seu litera proxima prima, deprimitur folio viridis pede candida Beta. τεῦτλον etiam opinantur vocatam, quia in proceritatem amplissimumq; ambitum impellantur folia & caulis à radice, presertim albę Betę, quę maior, vtilior & vltatior, ceteris est, vocaturq; Officinis Cicla detorto nomine à Sicula siue Scicilia insula vnde primum nomen habuit. Nullus hortus caret hac, folijs Lactuce per initia magna similitudine, deinde Rumicis aut Plantaginis maioris, Caule pedali & sesquipedali striato anguloso alis diuiso in quo flores copiosi ex viridi luteoli & semen nigrum lucidum inuolucro herbaceo Isatidis Sylvestris modo oclusum, Radix digitum crassa sesquipalmū longa fibrosa. Hęc quam reliquę multò nitrosior & mordacior est, mucum elicit naribus seccus: gustu quia mordacior discerni potest à Blitis, quę sunt ignauiore, insulso gustu, magis humentes, et Choleram faciunt quemadmodum Cucurbitę, Pepones, quę dum nequeunt excitare facultatem expultricem cunctando corrumpunt cibum, ipsiq; corrupti vomitiones turbidassq; ventriculi motiones excitant, flatu multo mixto.

NIGRA BETA.

EA D E M est & hæc, sed Nigram vocant, à foliorum colore, ex obscuro niagis virentium.

RUBRA.

Ang.

Ang. Redde Betis.
Gall. Bete rouge.
Ger. Roter Mangolt.
Belg. Roode Bette.

AB illis duabus distat hæc radice effigie, medio sui ventriosa & turbinata, Napi modo, foris intusq; tota rubet, sanguineo cruore suffusa, edendo suauior, nec perinde falsa est folijs, caule, floribus & semine superioribus non dissimilibus. Hæc rarior.

BETA RVBRA Vulgatior.

NEc hæc differt ab alba siue Cicla, nisi colore saturo rubente.

BLITVM Maius album.

βλῖτον

Gall. Blette.
Ger. Mayen.
Ang. Wilde sine errage.

Maib. 434.

HISC nature & figura finiti ma Bliti ab insulso satiuoue sapore qui in eo percipitur nomen indepti, siquidem βλῆξ inertem, stolidum, stupidumq; signat, & antiqui βλῆτες quos Latini murcidos, stolidos, bardos, fatuos, bliteosq; dixerūt: indeq; Gallis conuicium, *Belitre* & *Blitre*, in nullius frugis aut ingenij homines: tamen videtur etiam Latini Betam, pro specie Bliti aut pro Blito ipso accepisse, nisi lepidissimus Martialis non bene norit discrimen illo disticho.

Ut sapiant satue fabrorum prandia Beta,
O quam sape petes vna, piperq; coquus.

MAIORI & vulgatori radix gracilior est, folia fere Ocimi, aut Atriplicis glabra, cinereo colore, floribus item Atriplicis & semine pusillis Vrticæ, compressis pericarpis Betæ incluso in caule trium quaternumue pedum, inuisa aut contempta Olitoribus, qui eam eruncant extruduntq; è suis hortis.

BLITVM MINVS album.

EST etiam hæc minor aliquantò in hortis, caule viridante, multis alis diuiso, angustis folijs triplo, quam Betæ minoribus, rubidis ex nigro floribus, radix multis fibris, semen aggestum vt in Atriplice.

BLITVM RVBRVM.

Mat. offig. 433 NEc diuersa ab illa est Rubrum Blitum, nisi quia intense rutilant sanguineo Caules, & folia ex rubro lucent: Semine ferme concolori.

BLITVM RVBVM MINVS.

MINOR hæc sponte etiam inter olera, sed puriorem & saturiorem fundit cruorem, quo exarantur characteres, non dispari nitore & rubore, atq; è Brasilio aut Coccinis baccis. Folia etiam Xerampelino exuperantissimo commendantur colore.

AMARANTHVS Purpureus, saturo Coccineo.

Ital. Fior velluto,
 Ger. Samat blum & dausent schoon.
 Gal. Passévelours.
 Ang. Flower gentill.
 Belg. Krouwelbloemen.

Nonienclatio Amaranthi ἀπὸ τοῦ μὴ μελεῖν ἵσθαι, cunctis cōgruit floribus, qui perennes ac immarcescibiles diutius perstant, quare & Chrysocome, Heranthemo, agerato, alijsq; pertinacis coloris & decoris attributum fuit, cuiusmodi est istud Blitum: perpulchra florum purpura nitidum, nec senis, aut septenis annis victum, decolorq; futurū, eoq; *Passévelours* Gallis vocatur. Quod an Theophrasti, Diosanthos, & Phlox, in Adonide herba dictum.

Effig. Math.
 1047.

Vulgarior.

Elegantiz studio apud Italos, Gallos, Germanos, & Anglos, in hortis multis seruntur, & coluntur, quę non difficile ē supetiorum effigie petcipi possunt. Hęc autem est latis Bliti Solani, aut Ocymo longioribus folijs, per interualla binis, secundum quę spicę pannularum oriuntur aspectu blandę, holosericum mollitię, vellere, ac nitore prouocantes, semine nigro, pusillo nitente.

AMARANTHVS MAIOR, floribus pannulis
 spicatis purpureis.

Nec huic dissimilem, sed floribus superna parte luxuriantibus, multis pannulis spicatis inflexis, se mutuo implicantibus, iucundissimo spectaculo, sed obsoletiore coccina: cuncta reliqua non dissimilia sed maiora, caulis octuum aut denum pedum striatus, & folia maiora multo.

Blitum maius
 Ma. 452, effig.

AMARANTHVS tricolor, vulgo Papagalli sunt, THEOMBROTVM Persarum apud Plinium.

Huius venustas non de flore sed ē foliorum triplicis coloris, maculis scitē distinctis, pendetur. Sunt enim Ocymi, aut Bliti, interdum luteo viuido, vel purpureo, nunquam etiam triplici viridi, luteo & sanguineo concolori, Psitacorum alis: quare plebecula Flandra Papagalli vocant. Semē & flores Atriplicis aut Bliti: Hęc omniū rarissima,

AMARANTHVS Holosericeis, sanguineis, taniatis, reticulatis
 floribus, inferiore aspectu.

Seu venustatis eximie illa quę rarior in hortis Italicis, vberem prouentum florum fundit maioribus, in arcum flexis, & quasi se mutuo decussantibus ligularum, vel pannularum, caudis vegeto, & pleno rubro cruentatis, semine plurimo pregnantibus. Magnę apud mulierculas commendationis non modo voluptatis Coronarę ergo, sed etiam matricis renunq; profluua sanguinea & vlcera sanie manantia.

ATRIPLICES.

Atriplex. { Satiya albida & veluti farina aspersa.
 Satiya folio & flore purpurea luens.
 Sylvestris sinuata.
 Sylvestris siue Anserinus pes latifolia lacris lacinijs.
 Marina repens lutea & Xerampelina.
 Pusilla olida hircina & vuluaria vocata, garum olens & polline argenteo aspersa.
 Tota bona Spinacia facie.
 Spinacia.
 Atriplex Sylvestris, Polygoni, aut Helxinet folia.

Helxine

Helxine Parietaria.
Helxine Cysampelos inter Volubiles.

Phyllon thelygenum,
Phyllon arthenogonum. }
Mercurialis { *mas,*
 femina. }
Cynocrambe.

Heliotropium { *maius,*
 minus repens. }

Ternstroem, vulgaris *Verrucaria*, & *Tricoccum Heliotropium Pl.*

Hortense siue *Holeraceum.*
Vesicarium siue *Halicacabum.*
Vesicarium leguminosum siue *cordatum pisum inter legumina.*
Somniferum & *Lethale.*
Furiosum.

Solanum { *Somniferum Math: Verticillatum.*
 Arboreum siue *Amanum Italicum,*
 Mariacum, an Stramonium?
 Cacubalum Plinij, quasi maleficum.
 Circæa.
 Vna Paris.

Mandragora { *mas,*
 femina. }
Melangea siue *Melazana.*

Hyoschianus { *albus,*
 luteus. }
 niger. }

ἄτριπλεξ. **ATRIplex SATIVA.**

{ *Gall. Arroche.*
 Ital. Atriplex.
 Hisp. Armoles.
 Ger. zam Mollen siue *Millen.*
 Belg. Tame melbe.
 Ang. Orrage.

NON minus multiplex Atriplicum genus, nec illi adeo dissimile est ortu, facie, sapore, olere, & incrementi celeritate, vnde retinuit nomen è Græcis apud Latinos, ἀτρίπλεξ ἄτρυψ quia suā celeritatem assequatur amplitudinē: cuius vnam speciem aut varietatem Chrysolachanon vocarunt Dioscorides tum antiquiores, tum posteriores cui folia quia marcescentia è luteo vel flauo in aureum vergunt, aut x erampelino corruscant. Tametsi hæc aptius congrueret marino, cuius multa facta mentio apud Dioscoridem, quem & eius cozuos scriptores tacitè videtur negligentia arcessere Plinius in Chrysolachano flore aureo, folijs oleris tantum indicato. De Chrysolachano (inquit) non satis dici scio, nec plura reperio. Hodie tamen notissimæ quæ plurimæ Atriplicis differentia, Syluestris, domestica, maritima. Cunctis tamen quadantenus Bliti folia, ortus, modus, præsertim domesticæ sunt: radix fibris capillata, rectos scapos emittens, proceritate hominis striatos, in imo teretes, superius angulosos, ramulis diuisos, latidis foliis semine onystis: postquam lutei flosculi numerosi Æstate & Autumno defuerint, folia sunt latiora ad basim quam Betæ, sed albida atq; farinacea, puluere muscido obducta.

ARTIPLEX SATIVA altera, folio & flore purpurea, iuueni.

Huic domesticæ prorsus eadem est ea quæ ex liuido purpurascit, aut rubet, caule & flore, alioqui non vlla sui partē dissimilis.

ARTI.

ATRIPLEX Syluestris sinuata.

{ Germa. Wilder Molten.
 Gallie. Arroches sauuages.
 Belgis. wilde Eydece.
 Ang. Wilde orange.

SYLVESTRUM distare specie à domestica, præter cultum frustra tentatum, folia etiã docent, quæ nigricant plumbeo colore Solani (qui cum lubens sociatur in viarum marginibus) ideoque antiquis atrum olus putabatur dicta: vbiq; locorum circum moenia & fineta multa, nota & neglecta syluestris Atriplex: luxuriat foliis minoribus, angustioribus obtuse per ambitum sinuatis vel dentatis, floribus item ex luteo herbidis.

ATRIPLEX Syluest. sine Pes Anserinus latifolia,
laceris lacinijs.

{ Ger. Gensfuß, & Schweinfuß, & Semtodd, quod fues interimat.
 Gal. Pied d'Oye.
 Ital. Pede di Ocha.
 Ang. Goose foot.
 Belgis. Gansen voet.

ANSERINUS pes, vulgò dictus, folio Solani, Atriplicis, & instar pedis Anserini laciniato est: Flore & semine racemoso xerampelino colore, radice fibris capillata, & circa hortorum & viarum fineta passim non secus ac Atriplex obuia. Nullius in Officinis vsus; fues intetimere fertur. Fusch. ico. 371.

ATRIPLEX MARINA REPENS,
lutea, & xerampelina.

MARITIMUS Mediterraneis, & Adriaticis nusquã nò obuia humi strata Atriplex, Caulc, semine foliis laciniatis Syluestris Atriplicis & Spinaciz, interdum colore, sed crassioribus, latioribus xerampelino, interdum & luteo, sapore salso nitrofiore.

PVSILLA ATRIPLEX OLIDA

Hircina, Vulvaria vocata, garum olenti,
 polline argenteo aspersa.

EST in Nitiobrigum agro, alijsque locis quàm plurimis herbula Atriplici censenda, si fecus vias frequentissima, tenera, paruula: humi demissa folia cãdore micant quasi polline interpersa. Hanc notissimam fecit odor, & fermè infamem: odoratu namque Hircus teterque spiritus oplet nares, quo imbuti quærantur permulti se meretricum impuros loculos subodoratos esse: planèque refert odorem illum virosum quem prostitutz libidinis scorta ex impura colluue congesta spirant. Inde vulgò futuariam dicunt: atque autumnant, hac illitas vestium muliebrium plicas canes sagire, atque arrecto veretro Veneris æstu actos illas amplexos cupere inire, præsertim in templis vbi tetrius odor spirat, & minus ventis diffatur. Hæc vulgi sunt, tota cibis abdicanda. Atriplicem caninam quidem dixerunt, qui eã ex urina Canis enasci arbitrantur.

TOTA BONA, Spinaciz facie,
Bonus Henricus.

{ Germa. Guter Zeintich.
 Ang. English Mercury.

SED TOTA BONA petquàm optima, magisque vsu quam vlla peticia recepta, Mercurialis credita fuit iamdiu à plebe muliercularum, aut illis non multo peritioribus Pharmacopœis Anglis, quam adhuc infcitiam magis pertinatia quàm vlla ratione fouent, quia fauit illis euentus. Siquidem est huic plantæ Fusch. Rumicis tertium ocinus.
Icon. 262:

I. i. deter-

deterforia facultas multò quàm Mercuriali, tutior in morbis feruidis, nec tamen est igna-
uz in attrahendo facultatis, cibus, verò multò Mercuriali gratior, tametsi plusculum
flatuum habet, & non ita procùl à Spinacis natura abesse videtur.

SPINACIA.

*Germs. Spinat siue Spinnet,
Gallis. Espinars.
Italus. Spinacci.
Belgis. Spinagie.
Ang. Spynache.*

SPINACIA siue Spinaceum olus à spinosis seminum aculeis dictum Latinis videtur.
Foliis est primo pullulatu triangularibus & sagittæ modo cuspidatis, deinde laciniiis
& pinnis dentatis Atriplicis longioribus, sapore Betæ, semine aculeato, flosculo cada-
co viridante Blitti, cibo quàm Beta alimentum suauius præbet.

ATRIPLEX SYLVESTRIS POLYGONI
aut Helxines folia.

IN vinetis & agrorum marginibus non rarò occurrit angustis foliis Lithospermi æ-
qualibus Sylvestris Atriplex, spargens humi ramulos striatos, cubitales & sesquicubi-
tales, follioso semine lætidis, aut Atriplicis hortensis, & flore moschofo onu-
flos.

HELXINE PARIETARIA, VITRIO-
la, siue Perdicium.

*Germs. Tag vnd nach, maustrant. Gallis. Parietoire & parietaire.
Ita. Parietaria. Belgis. parietarie &
Hisp. Yerua del muro. glascruyt,
Ang. Pellitory of the wall.*

*Maabe. effigi.
1112.*

NOTISSIMA de facie natalibus, & hærente vestibus, semine & foliis, vnde nomi-
nis occasio, Helxine. Nullius enim regiones parietes muscidi vetustioræque rudera
hac non scatent: quæ etiam femel hortis adulta vix exigi potest, folium & facies A-
maranthi, aut Mercurialis, cauliculis è radice fibrosa rubellis teneris succulentis, foliis a-
spersa hirsutæ pilorum, & semina Betæ, obuuium quemlibet pannum arripiunt. Floscu-
li muscosi herbidi pallentes, multi vsus tota ad enemata, & balnea abstersioni accom-
moda, gustu item vt superficie abstergente nitroso bliteo, cui admodum similis. Cissam-
pelos vero Helxine in conuoluulis dicitur.

PHYLLON ὄνυχος siue Faemniparum.

TAMETSIDI vexarit exercitiores illa disquisitio nempè foretne idem Phyllon
vtrumque cum vtrâque *Lamæstide* seu Mercuriali herba, tamen cum iamdiu ex stir-
pium cognitione descriptionibus collata satis liqueat in cognata generis classe multum
ipsas inter se differre, hic commodum omnes vtpotè congeneres subdemus. Nec enim
aptiori loco possunt hæc duæ quas damus Phylli species, imò ferè nullo alio collocari
quæunt: adeo namque sunt simili structura & partium partibus habitu responsiue vt
minus mirum sit autores ad res consimiles designandas isdem ferè vsos comparatio-
nibus & vocibus quæ opinionem fecerint recentioribus (nondum repertis plantis,)
bis eiusdem rei inculcatæ mentionis. Atqui secus est multò, nec istud caput, irreptiti-
um, deprauatumue esse magis videtur, quàm alia multa, quæ non minus negotij pro-
pter ambiguitatem faciunt. Enimvero Dioscorides non plantas quin sint, qualisue
sint in dubium reuocat: sed dumtaxat ambigit num, sexus optionis compotem quem-
piam

piam facere potis sit earum vtrâuis, nempe maris aut foeminæ, quod Crateuas prodiderat, & fabulæ affine esse Theophrastus monuerat. Dioscoridis igitur sunt descriptiones non Crateuz, aut saltem non solius, sed ex alijs Dioscoride mutuante autoribus. Differentia verò conspicua satis, cum vtriusq; inter se, tum potissimum cum vtrâq; Linosyrtide, cui folia Ocimi superficie & crenulis in ambitu, habitus & facies Parietariæ vt scitè autor dicit: At Phyllo quod & leophyllon, oleæ folium nuncupat & itidem florum eruptionis argumento Bryoniam, asperi saxei & aridi cliui & margines sunt plurimum natales, Galliæ Norbonensis Monspelij, secus vias & ad collem squallidum & glareosum suspendij pauloq; vltius, cis Pontem Castrî noui, alijsq; quàm plurimis locis, frequentissimum Phyllon cuius perquàm manifestæ duæ differentię, vtriq; Mercuriali apprimè & singillatim obuersæ sunt: nempe maris & foeminæ, quæ folia planè oleæ colore crassitie & figura: Portulacæ marinæ magnitudine, glauca & quàm oleæ vel salicis pallidiora incaua numerosa: Caules item rigidos quadratos habet, cubitum altos & concolores in multas diductos Polij modo alas, quas iuxta & folia flores muscosi oliueq; in modum pusilli palliduli erumpunt, è pedicellis breuioribus gemina prodeunt marispiola testiculorum ritu & in speciem iuncta bina Cynocrambe aut maris Mercurialis modo, quibus per Augustum & Iulium, dehilcentibus & vt minoris Heliotropij exiliunt femina immatura albida, matura vero Cyaneo nitent colore rotunda, & quâ pa paucrius maiora, gustu feruida & nonnihil pingua. Radix lignosa exilis.

PHYLLON Mas seu Arrhenogonum Mariparum.

*PHYLLON θαύγονον sunt
Feminarum.*

MAS.

FOEMINA.



HVIUS sæpius frustra conati sumus semen aut intueri, aut excipere, & mirati sumus racemulos muscosos in pediculis porrectis oblongis, oleæ floribus, iam marcidis & caducis non absimiles pallentes vel potius Mercurialis foeminæ, ex luteo instar nucamenti columni aut Phylereæ, nullo conspecto seminis vestigio defluxisse. Ceteròquin eadem planè foeminæ est hæc, nec minus calida acris gustanti folia, aut deglutienti vel tantillum, tamen si non perindè feruorem primoribus labris, & linguz atq; gutturi inurit: Quæ omnia indicio sunt nobis haud temerè antiquos hæcè varijs nomenclaturis & orationis picturis representasse. Hincq; vires subducendi aluum, quas in Mercuriali nouerant minimè assignasse, natalisq; longè diuersos, & si quid huc facit, etiam Phyllon semine donatum, feminificum fecisse. Marem verò scû Marificum semine cassum & orbatum & frugiperdum, non secus atq; oleæ floribus & Mercuriali foeminæ floribus contingit: & tamen contra euenit Mercuriali foeminæ, quippè cui semen nullum aut fluxum, mari verò probè maturum, a Phyllo tamen non parum diuersum inest.

Senensis planta nutanti coniectura, & descriptione mutilla huc adducta an sit *Noli me tangere* Italorum, videndum. Sed quòrum ferratum folium, & Mercuriali breuius asserendo Arrhenogono oleæ folio inesse? Deindè si non noris primum & præcipuum nempe Theliogonum, qui potes asseruare & dicere: quasi iam non dubitet, plantam aut quam reperi esse legitimum Arrhenogonum. Saltem accurata descriptione & icone patefecisset, sed plerâq; alias vel notissimas alienissimo loco apposuit: vel quæ nusquam fuere in natum, vel illi nusquam notæ fuerunt, præterquam de cõmentariorum figura, lectione vel auditiõne mera.

THΕΟΡΗΑΣΤΙ verò Phyllon ob prolem masculam, fœminâmq; propagandam, vt idem inquit, sic vocatum videtur Mercuriale proprius designare, quam Crateuz vel Dioforidis Eleophyllon cum quo præter prolificas illas & mirificas communes vtriq; dotes commune nomen sit sortitum, vt alia pàsîm non parùm multa in authoribus : & aliòquin Ocimi folia, semênq; dydimon, non fœmine vti Phyllo Dioforidis attribuit, etiâq; proximo capite *ἑρποντοφυτον* vocat Satyrimon maiusculi Bulbo, *μινον* οὐλοῦ γονο. Sed mari vti mercuriali vindicat verum vbi fœminificæ Mercurialis femē *καλοῦσιν* *ἡ λαιος βέρου ὡχρότερος* Δέ addit, id est, instar Oleæ florentis musci, pallidius tamen esse, & verba & res Eleophyllon Dioforidis magis accedunt, neq; enim Mercurialis semen *χρότερος*; fue pallidius, sed *χλωροτέρως* seu herbaceum magis & viridans est. Mox masculificij semen oleæ primulæ est muscoso flore emergente *οὐκ ἔστιν ἡ λαια ὅταν ἄρτι γίνῃται* *ἐκ τῶ βέρου* iisdem penè verbis quibus hic seu Crateaus seu Dioforides designant suum; Eoq; dignior venia Plinius, eumq; recentiores sequuti, si ex ancipiti & fortè in vnam cōflatam diuersa geminâq; descriptione vnam confarcinarint, & notionem confunderint.

ΛΥΣΙΣ. MERCVRIALIS MAS & Famina.

Ital. Mercorella.
Ang. French Mercury.
Ger. Bingeltraut.

Gal. Vignoble, seu Mercuriale.
Belg. Singelcruyt & Mercurial.

Dod. effig. 59.

LINOSOSTIDEM seu Parthenium & Mercurij herbam alterutram qui norit am-
bas cognorit, adeo sunt per omnia similes & duntaxat femine diuersæ, Ocimi & pari-
etariz folio, plurimis geniculis maiusculis perficarice, multos teneros holeraeeos caules
quadratos & alas cingentibus: subnitrofo sapore & nonnihil virolo fuceo multo porra-
ceo purgante & medicato, ad multa perquam vtili vti tota herba vbiuis gentium notif-
sima & vsu maximè recepta, vt pluribus ad cognoscendum nihil sit opus cum id abundè
dudum capite de Phyllo quænam foret & quantum differret sit dictum. Linguagotiz
Monspellij præsertim Pharmacopœi multum vtuntur melle Mercuriato vocato, nem-
pe succi expressi libris tribus incoquant mellis boni ℥. ii. vel. ℥. ij. ad enemata &
muliebria encathismata. Huius loco hic in Anglia vbi non minus frequens, sed tamen
non quæ nota supersiore seculo vtebantur. Tota bona vsu bbono Henrico dicto quem e-
tiamnum vulgus Mercurialem appellat & putat errore quidem non paruo, sed ad vsu
non magno incommodo, præsertim si ad enemata tantum addatur, minus enim calefa-
cit, lenius lubricat: at olere vel ore, aliouè sumpta modo nonnullus multum torsioni-
bus, vexat vti dictum inter Atriplices.

Tota bona Anglia Mercenaria

*CTNOCRAMBE, quasi dicat Caninum Brasiliense.
Mercurialis mas, Sylvestris.*

Ded. effig. 59.

Quæ passim in Europa tota fecus vmbrosas vias & in Syluis vdiuè locis præsertim septentrionalibus & minus calidis copiosissima oritur & vulgò Syluestris Mercurialis vocatur, tantum cum mari tota habet similitudinem, folijs per intervalla binis in geniculis indidènt; semine didymo è pediculis lógis, caulibus quadratis tenellis, vt quin vera sit nulli dubium: rectis tamen binis, ternis & interdum quaternis, non alatis cauliculis prouenit: folia subpallida sunt Mercuriali longiora, fapor, odor, holle ræcæ & subuirosus. Radix latior humiq; serpens sparsa, toti facies Mercuriale docet: vñ nullus tametiq; optimus futurus ad sèrofos & Melancholicos humores educendos.

HELIOTROPIVM, ἡλιοτροπιου, officinis *Verrucaria scorpioides*.

Quartz

QVAMVIS permultæ sint stirpes quæ Heliotropiz, & Helioscopiz dici merentur, quia Sole puro collustratæ, quasi illius fruendi auidæ hient: eoque Cæli medium tenente panduntur prostrum, deinde abeunt gyratione quâpiam, atque quasi in eum nutu pronæ & conuiuentibus floribus prosequantur; illius abitu & desiderio sese mo- tantes (quod in Narcisso Calendula, Tragopogo, Cichoriis & quamplurimis aliis cer- nere est.) Tamen hæc Dioscoridis Heliotropiis, id nominis particulatim congruere vi- detur, quia Solstitio tantum florere author est Theophrastus, & obseruatio. Serius quip- pe sponte prodeunt & florent.

*HELIOTROPIVM maius, Solanifolia, flore Echij,
adunco, caudato scorpioidis.*

HORVM maius vocatum vbiq; Lugdunensis, & Norbonensis Galliz, cultis & incul- tis marginibus aridis obuium, nec non in Italia & Pedemonte. Pedem altos, caules erectos, foliis donatos, Ocimo aut Calamethi montani, Solani maioribus, albidioribus, hirsutioribus, quibus singulis in summo elegantes insunt florum series, fastigiatae rac- mosa, caudicellas inflexas scorpionis, aut Echij scorpioidis imitatur albidæ, seminis plene miliacei oblongi pusilli virentis, ad tumores stumosos verrucas & vlcera phadagenicæ veluti est tota planta magni experimenti. Angliæ in hortis & Franciæ.

*Mathæo, effig.
1300.*

MINVS HELIOTROPIVM repens.

NON facile reperitur istud nisi paucis in locis & scrobibus lutulentis, Grammontiz syluz, MonsPELLIACZ inter Pulegios ceruinos subter Tha- mariscos, & Lunellam inter & D. Egidium: qui- busdam paludosis scrobibus, Surculis multis flexi- libus, teneris, gracilioribus reptat: folia roron- diora, triplo minora quam magni Heliotropii, numerosa & simillima floræque asimiles breuioribus multo glomeratisq; sed minus reflexis cau- dicellis nulla serie, iam intra, iam subter folia pen- dulis vt in Tornesole, nec per intervalla foliorum singuli totis ramis alternato situ qualem non descriptum, sed male pictum, aut multo à vero diuersum Commentator habet, radice pu- silla simplici vsu incognita adhuc, etiamque de facie, nisi amicis quibusdam Lugdunen- sibus, & Antuerpianis, quibus eam eiusque magnam seminis copiam misimus, non valde dissimile à maiore Heliotropio, an autè illis satum creuerit incertum habemus. Hic Lon- dini nobis Brunia sequente perijt & Morgano nostro.



*HELIOTROPIVM Vulgare TORNESOL Gallorum, sine
Plum tricocon.*

NON modo de vernacula voce Gallorum qui Tornesol hanc vocat, sed etiam Plinia- na lectione qui eandem Tricocon Heliotropion appellat, cuiuslibet innotescere po- test huius plantæ figuram, & Historiam Heliotropiis debere: tamen Dioscoridi videtur præterita, aut cum minore in vnam descriptionem contracta. Folia huic facièsque tota maioris Heliotropii, nigriora viridiora folia Calamethi montani, aut potius Solani flo- res lutei exiles, oleæ, facile defluentes. Seminæque tricocon capsula Tithymali aut Cha- mæleæ proxima, sed scabra, ex viridi nigricante affrictæque pannis, aut chartis, viro- rem viuacem impertiente, qui mot in cœruleum hilarem & purpureum mutat: ma- gno questu colligit rusticæ Lunellæ, Mafsilarges aliisque Norbonæ tractibus oliueto- rum, vbi plurima maturæque Septembri sunt, quæ distrahunt insectoribus, & Chirur- gis nonnullis, huius plantæ vires ad medica præidia supra quæ dici potest esserentibus,

de quibus nos in selectis remediis dicemus, duce & auspice Christo. Romani agri vine-
tis etiam familiare, Belgis, Francis, Germanis, & Anglis in hortis. Pannosæ laciniz,
quæ in Officinis nomine Tornefolis veneunt, ad vinum gelatinas & alia medicamen-
ta coloranda, pereleganti purpura huius sucto vinoque remisso creduntur imbutæ.

SOLANI GENERA.

STRYCHNON viteum, capreolum, vitem vel acinum, aut tale quidam signat, in So-
lanotum classe quibus cunctis proprium acinos plures vel pauciores habere, nisi quis
malit $\sigma\epsilon\lambda\chi\iota\upsilon$ è Theophrasto suspicari, aut $\beta\omicron\sigma\epsilon\lambda\chi\iota\upsilon$ in $\sigma\epsilon\lambda\chi\iota\upsilon$ mutatum.

PLURA quam Dioscoridi reperta hodie genera, verūtamen non Dioscoridis om-
nia: nullū enim manicum foliis Erucæ ad Pæderôtæ Acanthi similitudinem & corym-
bosum, quale est apud eundem vsipiam auditione vel inspectione innotuit nobis, nisi
sit Scramonium vocatum quod inferius post Somniferum perpendetur.

$\sigma\epsilon\lambda\chi\iota\upsilon$ κικαῖος, **SOLANVM HORTENSE, CIRCEÆ,**
aut Phascoli folio.

{ Germ. Nachtschade.
Galli. Morelle.
Ital. Solatro.
Belg. Nalcaye & nachtschade.
Ang. Nightshade, morell, petye morell, hotwades berry.

Euse. ico 395.

CETERORVM omnium holeraceum dictum hortense vulgatissimum siue Meri-
dianæ, siue Septentrionalis gentis viarum & hortorū, cultis incultis scrobibus mar-
ginibus & areis ramulos edit multiplices, lentos, fruticosos, pedē & cubitū longos, fo-
liis latioribus flaccidis succulentis, Basiliis vel Attriplicis sylu. nigricantibus, donatos Iu-
nio & Iulio flosculi, albidī, stellati, plusculi præeunt, bacculis succulentis quasi in corym-
bum Circeæ nostræ collectis, initio viridantibus, deinde nigris, fuscis, aliæ rubris pur-
pureis, alias fuluis rutilis. Pusilla in summo cespite radice albida, fibrosa, sub hyemem
moribunda.

$\sigma\epsilon\lambda\chi\iota\upsilon$ ἡλικακάκος, **SOLANVM HALICACABVM** Alkekengi.

{ Germ. Juden dachlin & Tiesen. Ital. Halicacabo.
Ang. Wynter cherye. Galli. Baguenaudes, & cerises
Belg. Briené van ouer yet. doutremet.

Euse. ico. 396.

VBIUS vel pueri: notissimum qui etiā in Heluetia, Sabaudia, & Pedemontium se-
cus serpes & in squalidis dumetis huius vvas lectas mandunt: Augusto & Septem-
bri, etiāque hyeme ineunte septentrionalibus, quibus idēo Hyberna Cerafa Winter
Cera dicuntur: acini qui semine latiusculo, compresso, subfuluo, Leucoii, vel potius Si-
liquaestri pregnant. Folia item Solani hortensis, aut Phascoli maiora viridantia
in farmentosis caulibus sesquicubitum altis, flores maiores pallidiores Solani folliculis
herbaceis, deinde phœniceis cordato Piso peregrino similibus, quibus acinum sin-
gulum inclusum ceraso parem & similem descripsimus: repretice radice, & restibili so-
bole sese quotannis reparante, Celeberrimus huius ad calculosos lotiumque ciendum
vſus.

SOMNIFERVM, & LETHALÆ. An Mandra-
gora Theophrasti, Belladonna Italorum..

{ Germ. Dostman, Scutnant.
Belg. Groote nalcaye & Dulcrupt.
Angl. Dnale, greate Morell.

MERIDIONALIBVS magna huius paucitas, apud Germanos verò & maximè in Anglia vbique obuiò prouentu fructat: tota Solani facie virgis longis, rectis nigricantibus ternos & quater nos cubitos longis, digitum minimum æquantibus, foliaque gerentibus atra aliquantum hirsuta, & utròvis Solano maiora, nonnihil ad Mandragoram florum calathis fuscis, aspectu mæstis & obsoletis, è quorum singulorum cauo emicat bacca nitida cerasæ, aut potius vix Paradisi par & concolor.

Radice non modo annotina sobole rediuiua, sed etiam adeo viuaci & importuna vt semel in hortos ascita, vix exigi deleriuè queat: imò vel tantillo frustillo relicto, aut infosso repullulet. Præsens nex esu hec cerasa, vt multi nostra memoria morte sunt experti, pueri præsertim: namque Angli adolefcentuli qui per imprudentiam peregrè sitibundi in via esitassent, lymphatici sed somno semi sepulti interiere. Etiamque Antuerpiæ non multis abhinc annis quidam impuberes, huius æsum mortem luebant. Memoranda huius radices facultas quæ nugiuendi Agyrtæ in Italia plebeculæ attonitæ concursum plauum & pecuniam captant: tantillum namque radices admodum sitibundis conferuæ Saccharatæ Rosarum, violarum ue cui libet addunt, atque deglutienda dant citissimo aduersum sitim, etiam si quis ea propemodum enectus foret leuamento & refocillamento, sed nequissimo: stupefactis namque vt reor faucium interioribus neruulis ad æsophagum imum, languet prorsum appetentia præsertim potus & interdum cibi, vnde postea malè habent nisi tepentè colluant aceto guttur, & quippiam Absynthites vini, aut Theriacæ deglutiant. Cæterum ridiculum iuxta ac pertinacem commentatorem se præbuit Senensis, qui dono acceptum, nec vel verbulo declaratum Solanum; nêdum probatum studiosis obtulit, verticillatis floribus, aliisque quàm plurimis indiis, quiduis potiùs quam Solanum exprimentibus, nec viribus alioquin similibus: idq; (sed Musis botanicis iratis) nostrati vulgato quod imprimè congruere nullus inficias it, prætulit.

Solanum. Semoniferum.
Mabrol. Foll.
1071.

STRAMONIUM PEREGRINUM AN SOLANUM

Manicum, ? sine Poma spinosa Recentiorum,
Metel Italorum.

IAm quamuis putarint Stramonium, vel Strychmonium illud peregrinum ab Strychno deductum & idem esse cum Dioscoridis Solano Manico, ducti nonnulla pilulæ, aut ponu echinati similitudine, tamen non parum differre vel ipsadocent folia, nêdum fructus pilulæ, (Sunt enim hortensis Solani leuius per ambitum sinnata nonnihil) quæ squamulis spinosis multis compactæ sunt, quadatenus nuctis Metel Officinarum, vel nnculæ Cupressi, aut rugosæ gallæ immaturæ similes, sed echinatæ spinulis. Folia autem pilosa & ad Solanum hortensem accedentia, florum calathis volubilis maioris, aut Scammonij albis ex folliculo Hyoscyami, sed odorem suauem huius halantibus, vnde pilula in caule pedem & sesquipedem alto, hirsuta, non profunda nec magna radice, florentem vidimus plûsq; duodecim abhinc annis in orto Patauino & in Belgio. Verûtamen multa defunt huic ad explendâ reliquam deliniationem, nisi sit illa luata, vt quidam suspicantur, qui in Stramoniz foliis veteros quiddam agrestis Lactucæ, aut Meconij odorantur, affectusque non discrepantes experiantur, verum ne sic quidem vnquam facient fidem, & multo minùs persuadebunt, qui Christophorianam, tamen si Corymbaceis floribus & baccis, folio multum diffecto sit, cuius venenata facultas maiorem opinionem huius Solani, quàm Stramoniz facere potuit, vt in Elleboris dicemus;

Fals. ino. 399.

STRICNODENDRON & AMOMUM

Pli: vulgo Italorum putatum.

Solanum arborescens Belgarum, an Theophrast. Solanum folijs
Tubymali fructu rubro, radice rubra.

PLERIQUE Itali, Galli, Germani, Belgæq; in viretis aut Adonidis pensilibus hortis voluptatis causa ferunt peregrinam Indicam baccam, ex qua fruticat pumilla trinum & quaternum cubitorū planta arborea Persici, aut Amygdalæ facie, & fronde, flore per Æstatem & Autumnum, Solani hortensis, & baccis nitidis coccineis, aut miniatis paribus & concoloribus Alkekengi, nec intus gygartis diuersis in Brumam etiam & Ianuarium mensē vsque aduersus frigoris sæuitiam edurantibus, colorēque taentibus. Amomum quidam Plinii putarunt: rectius alij Strychnodendrum vocarunt.

Recentiorum planta, Afoies maioris facie baccis Solani,

an Κακὸς δάκρυ, CACVBALVM quasi malsicium, Plinij.

EST VOSTIS vdis Germaniz, Flandriz, & Angliz, in hortos transmouerunt Herbarij quandam fruticosam plantam, reptantem humi, ortu Rubiz tenellis ramulis & fractu facilibus. Folijs per interualla geniculata pallentibus, Rubiz, & Coniæ mediz quadatenus. Flosculis albis, Holoſtij aut Alſines, fructu nigro, Solani hortēſis: radices im portuna viuacitate etiam erutę repullulat, non secus ac Solani Somniferi, & nihilo fecius manſu interficere dicunt.

CIRCÆA.

*Germ. Te lenger ie lieber & Zynſchfrout.
Gall. Solanum lignosum.
Belg. Alfranke.*

{ Lai. Amara dulcis,

EST NEQUAM Solanum ligneum vel lignosum vulgò, Herbarum studiosi Lutetiz, & Monſpellij præſertim vocitabant. Videtur sane eadem, nec nulladum cognita nobis, propius accedit. Et vt non eſſet, tamen merita eſt huc ſuffici, tum ob faciē haud ita diſparem, tum propter vires non contemnendas & illi cum Circææ communes: deinde quia notiffima, & plurima vbique regionum ſecus sæpes, viſq; viginofas luxuriat & Monſpellij etiam in ruderibus, macerij & macilentis, portæ Latēſis Solanis ad iungenda fruticat, ſtagellis multis ſarmentofis non prolixo reptatu; ſed innixu hærentibus ternos quaternosque cubitos æquantibus, rotundis, lignoſis: folia Solani & vt Similacis, vel Sigilli mariz, ſenſim acuminata obſcurè virentia, Solani ſuperficie quibus infernè vtrinque appendicula vna quaſi auricula vel pinnula ineſt, acetofæ minoris, aut Saluiz nobilis modo. Flores quamplures violaceis ſaturiores Sycomori Venetorū, aut Alſarch daracę, quinq; partitę appicello in medio luteolo, vnde acinuli conſerti primulum virides, deinde maturi hortēſis Solani rubri oblongi, & teretes granulis intus miliaceis compreſſis, iua racematim conditi: qui ſoli quominus hanc planè audeamus aſſerere Circæam, diſſuadent: tamenſi non dicit Dioſcorides cornicula, ſed veluti in corniculis ſemina, nos tamen vt cuius exploratam habemus naturam, hanc malumus quam nullam, nec vnus aut alterius notulæ penuria, forſè peruerſione, aut metatheſi vnus vocalæ apud Dioſcoridem lubet illicò reſpuere, dum facultates quadrant. Eſt quippè nonnihil ſicca, moderatè calida, aut potius frigidiuscula, nædum vt feruida ſit quod nonnulli rentur, & Dioſco. perſuaſus fuit, forſtè propter amarorē, & tantillum acrimoniæ. Nam ſi pluſculum amaroris primum guſtanti exhibet, non proinde ſit calida magis quam Endiuia, Cichoria, Hyeracia, & Roſa: eius quippè quantū percepiſimus, calor & acrimonia illicò abeſſunt, perſt inte dulciculo & imbecillo quopiā ſapore manendo radices & virgulta, ſarmentofa, lignoſa, medulla albidā, amarorē ingrato, primū & diu linguam afficiunt: tandem dulcedine multa Glycirrhizę ingratiore ſaſtidium pariunt, magis, niſi quæ dulcorē offunden-do, idcirco Germanis vocata Te lenger ie lieber, Anglicè *Snybiter*, Latinis Dulciamara. Vnde vires miſtificas & penè Circæas coniciās: nam admotum foris inflammationibus, & decoſtionibus epotam Solani vires expleuiſſe ſcimus: ad internos autem affectus refrigerata caſſacit, caſſaſtāque refrigerat, eadem etiam qua Alkekengi ſive Halicacabus pollet facultate, moderatè enim citra virium

diſpen-

dispendium visceruū incendium egerit per sudores vrināsq; aquas, atq; obstructions demolitur quæ sūt Icteridis & Hydropisis præuij & alumnæ, qua item facultate lac māmī suggerere fructus potis est, non secus atq; multa quæ exsiccano serum & defæcan do sanguinem illuc vrgent puriores benignioresq; partes. Sic sceniculum, sic Bryoniz turiones tenelli cum sisdem duriore & acriore potius lac populentur, & absumant, quod discrimen est inter menses cientia & lac generantia. Eoq; sorbitiones parandas iubet Dioscorides, non iussurus nisi vesca foret. Et Circæam dixerūt nonnulla vt par est cum Mandragorā similitudine virium: quippe Circæa Mandragoræ nomen fuit, & forsū vtriūsq; ad amatoria vsus fuit veluti Dioscorides de Mandragora innuit, nempe Phyltro illo frigiditati odoræ coniuncto, cuius ad amorem amicitiasq; ferruminandas vis mira & adamantea vel magnetica. Hæc interfuit Commentatoris Senensis enucleare, at hic vbi quid cōmentetur oblitus nobis elapsus est in Plinij perorat lapsum iamdiu notatum & confossum aliorū criticorum obellis, & sortē immeritō fieri enim potuit vt ita legerit & verterit ex quōpiam Botanicorum: nec enim, vt vult Senensis, ex Dioscoride semper necessum aut consuetum fuit illi mutare, nec verisimilē vt cuius nusquam mentionem facit, aliōqui candidus & multus in ciendis & laudandis suis authoribus, & non raro Dioscorides Galenus plurimū atq; ex vtrōq; Ægineta cæteri; Græci meri sunt, dumtaxat aliorū recitatores, non secus atq; Plinius, qui seū ex alio quā Dioscoride accepit, vel quā mē Dioscoride verterit, seu aliquid peruerterit, ferendus homo Romanus & aulicus non minus quam Dioscorid. qui Saluiam extingere semen, contra quam Aristoteles & antequi in Problemat. prodidit: & alioqui pronus valde est lapsus in virium attributis, quod vulgō quotidiē euenire videmus: sic Calsiam siliquam propter affinitatē nominis, ducere menses putarunt, at silit, vt si quis Circæam, Mandragoram lac inhibere audiuiſſet, & idem huic qua de mentio sit Circææ cognomini similitudine deceptus attribuiſſet. Doctus Plinianus Ecclesiastes sic Plinij verba legebat. Semine lac mouet (vulgati codices minuit) vino aut mullā aqua pota, sic Dioscorides ἀραιώζῃ trahere, allicere, vel mouere extremis nām; tantum non item re differunt, tractio & protrusio. Nos hæc his senel tametsi pluribus quā volumus, quō faceſſant isti maleferiati Aristarchi, adq; rerum commentationem cognitionēq; accuratiorem vires ingenij contendant.

Math. 1282.
100. pro Vitis
Syl.

Calsia siliqua nū
ducit menses.

• SOLANVM TETRAPHYLLVM, sive HERBA PARIS.

Vna Lupina, Pardalianche putata.

QUIBUS nondū notæ essent primi Aconiti differētiz non abs re vna Lupina versauit à recetioribus dicta, Pardalianche Dioscoridis credita fuit: quaternis nām; est vti-
q; herbula folijs decussatim aut ex aduerso sibi, mutuo exortis, summo fermē ē caule enatis nigricantibus rotūdis oblōgis, tenuib; cauli rotūdo gracili, sesquipedalmū alto subest fibrosa variē; sparsa cespite summo radix, vnico in flore stellato, & ex luteo herbaceo, aciuo Solani Maniaci similis, nec dispar est. Natales amat vmbrosos, frigidiusculos Septentrionales, cuiusmodi Germaniz propē Basileā, aliisq; Galliz, Belgiz, & Angliz syluosis. Hæc qui Aconiti coniectabāt venenatā prodiderūt: noxiāne sit nondū certū habemus, tametsi sæpius collegimus sæpissimē dedimus canibus & agnis nullo percepto incommodo, quin potius raro & perquam iucundo spectaculo meminimus fuisse nobis amicisq; nostris Bathoniæ Helueticorū, dum Thermas illic inuiserimus: Etiamq; Lugduni antidotum qualeni mox describemus ex hac potissimū aliisq; nonnullis constat. Canum par vinctum lorīs meminimus, vtriq; vi & bacillo in fauces intimas indita fuit Arsenici & Mercurij sublimati ass. 3. f. carnibus aditam (neq; enim nisi inuiti vorarunt) ē vestigio vtrūq; canum ore patulo aerem caprabant, spumas elidebāt, anxio; & crebro conatu sed irritō vomere nitabantur: latratus edebant ore & assultu rabido, ructūq; minaci proximum quēnq; inuasuri videbantur. Hora vix exacta ceptus vtrūq; frigidior & onietior fieri decubuit moribundus. Tum pulueris huius 3. ij. ex Rubello vino infusus fuerunt in fauces vnus, ac nec tum quidem quicquam euomuit, quin potius aliquantō

Ensch. 48.
Math. 1093.

quantò post quàm socius periculi iam enectus esset hic nobis attractantibus visus fuit calescere itaq; cœpit ore reptare, oculos referare & animum virēsq; adeò repentē recipere, vt hilaris & ludibundus aliquòt horis post cœnam sub mensa cœperit, planēq; conualuerit, Idem euenit ad Badēsēs Thermas canibus quibus data fuisset cum Arsenico mixta nux vomica: sed hi vertigine ventrisq; diuis cruciatibus acti sese in gyrum indefinenter versabant. Pulueris hæc descriptio.

Rer.	{	Vtriūsq; Angelicæ (innuit) domesticam, & Syluestrem.	} asi. drach. iiii.
		Vicetoxici.	
		Valerianæ domesticæ.	
		Polypodij querni.	
		Radicum Althææ & vrticæ.	

Corticis Mezerei Germanici. drach. ij.

Granorum Herbæ Paridis. N. 24.

Foliorum eiusdem cum toto N. 36.

Ex maceratis in aceto radicibus & siccatis fit omnium puluis.

Herba Paris refrigerat insigniter, ideo Arsenici vim reprimīt.

μανδράγωρος. MANDRAGORAS MAS,

{	Ger. Meeran meunlin.
	Gall. Mandragore ou Mandegloyre.
	Ang. Mandrakes.
	Belg. Mandragora manneken.

Mas. Ico. 1076 **Q**UIA antra atq; specus vmbrosos vtpote Solis feruidioris impatiens, lubens sectaretur Mandragoras dicta fuit. *Mandre* enim aprica loca quò se recipiunt & stabulantur armenta etiam hodiè Itali è Græco significant, & ad amatoria non parum posse olim credita fuit & vocitata Circe à Circe inuentrice magica Solis filia Pytagoreis etiam ἀνδροπύκνοστος, quod humanum truncum & artus nonnihil adumbrarent radices implexæ crura bina & clunes quasi disparata ostentantes, quàm ad interpretationem alludit non inscitè Septentrionalis nomenclatio, quæ Mandragoram quasi Man & draghen: virigeram suæ homigeram cōnotat. Duum generum hodiè Italiæ, Prouinciæ, Norbonæ, & Hispaniæ hortis. florem malāq; maturat, semine aut radicibus ex Candia & Cydadibus infusilis aduectis. In reliqua Gallia non peringē tameti superiore anno florem pomāq; apprimè matura nobis dederunt Bristolæ Occiduo Angliæ aprico & tepidiusculo horto, trima aut quadrima non fert, sed iam anicula poma dat aurea odore suauī sopiente Mas, Mespilo paria medulla etiāq; fermè granis lationibus compressis pullis, folia humi strata numerosa Betæ, aut Lactucæ, virētia, rugosa, crispā Dipsaci olida: flores in gracilibus pediculis Bellidis, (caule namq; vacat) candidicant, vel purpurascent, Maliniani non dissimiles.

MANDRAGORAS FOEMINA:

Mas. Ico. 1077 **F**OEMINAM quasi minorem, vel imbecilliozem sexu, hanc propter pallidius malum atq; altero tanto minus Sorbo pusillo lutescenti par & concolor rotundius, radice minore, duobus tribusq; Empusæ caudiculis crurum ritu humanorum claniculatim comisis & intortis. Folia vt omnia mari minora. Augusto maturant Francis, Angliæ, tametsi multo longius ab æqualore absit Iulio & Iunio meminimus.

MELONGENA, vel Mala insana, exotica.

{	Gall. &	}	} Ger. Melantzan g
	Belg.		

Affinita

AFFINIA cum essent Mandragoris hæc cœrulo purpurea poma suæ aliud ab Etii Malozeno, ex fusco violacea, effigie quanta oui oblongi subit quibusdam recentiorum suspicari esse marem Theophrastu Mandragoram, eoque esu lethalem rati, insana mala vocarunt. Sed apud Theophrastum multa lectionis labes, fortè non distincta stirpium delinatio, ne dicâ farrago omnium congenerum, è quibus hæc eximenda est & Cucumerum familiaris, aut potius Mandragoris & Hyoscyamis ascribenda: foliis Cucumeris est asinini hirsutæ molliore Solano Somnifero Hyoscyamo albo, vel Mandragoræ proxima in caule hirsuto pedem alto recto, cui medio sursum versus è pediculo breui appensa flores & mala sunt semine paruo congesto pullo vel fuluescente & fusco. Radix summum cæspitè fibris amplexa colitur, viridiorum voluptati & galonum auiditati, qui interdum hosce fructus uti Cucumeres in acetariis helluantur, uti Romæ, Genæ, Neapoli, maiore voluptate quam utilitate: deterioris enim succo vel quolibet Pepone, aut Cucumere est.

Matheol. effig.
1078.

Υ ονόβομυρ **HYOSCYAMVS NIGER**, sive Apollinaris herba.

ARABIVS
Altercum.

Germ. Bilsenen Gewon.
Ital. Iusquiamo.
Gall. Iusquame, & Hanebane.
Belg. Bilsen, & Bilsenrupt.
An. Henebane, Hennequale.

SVILLAM fabam dixere ut cuius esu olfactuque sues prostrati resoluantur: opplet namque cuiuslibet animalis cerebrum viroso, foetidoque halitu, multo quam qui è suis comestis deteriore hominibus, quibus mentem percillit quasi Apollinis æstro, unde Apollinaris herba dicta & Altercum quia altercando, rixandoque setorqueant Hyoscyamo demetati: tamen memini mulierculam iuuenem cui dentium dolor fortu Hyoscyami sedatus fuisset triduum penè totum lætam & temulentem, non tamen morose, simillimam fuisse. Admodum notæ iam sunt tres Hyoscyami Dioscoridei differentias, quarum familiarissima calidis & frigidis campestribus vbiuis Europæorum niger: per amplius foliis hirsutis verbasci, sed Acanthi laciniosis, pedis Anserini diuisuris flaccidis crassis, succulentis, in ramo frutescente caule sparso, hirsuto bicubitali, tricubitali numero, qui medio sui flores è fusco pallescentes in purpuram cæruleam tristem vergentes (frustra negante Comentatore) calathi similes promit, quibus mense Augusto seminum pulorum Papaueris plenæ pixidulæ succedunt, cytini effigie præsepiliolis disceptæ & superne, asperæ cuspidatæ: radix albicat crassa erutu facilis, & perquam ad anodina utilis, minusque quam folia fortens, & obnoxia putredini.

Sciut. effig. Ma
theol. 1084.

HYOSCYAMVS Albus, mitior, hirsutior.

NON æquè notus albus, ac proinde in hortis Pharmacopæorum colendus. Ei penè eadem facies & magnitudo, nisi frondes latiores, rotundiores, molliores, & albidiores, & hirsutiores forent. Floribus iuxta folia & in summitate non versiculo, colore albo, languido, alabastriculis minus asperis, etiam semen albius alterius fouentibus: radice minorè minusque viuaci. In Norbongad Aurantium, siue Auracum & inferius cis transq; Rhodani ostia variis satorum & veruacorum secus vias marginibus spontè adolescit. Belgio, Angliæ, & Franciæ in hortis seritur & moritur quodannis. Mitior & tutior multo huius usus.

Matheol. effig.
Sciut. 1065.

DVBIVS HYOSCYAMVS luteus Solanifolius.

AMBIGIT hæc inter Hyoscyamum & Solanum furiosum, cuius folia similia sunt, sed huius aliquantò maiora, molliora, albidiora, neutiquam per ambitum incisa pallentes luteoli flores Saponariæ, calices relinquunt: Hyoscyami nigri minores, rotundiores, tenebriores, semen sublauium Irionis & pusillum: radice tenella, & quodannis instauranda in hortis vbi dumtaxat vidimus, neutiquam usu recepta, aut explorata: gustu tamen acre semen nec odore, aut calice videtur Hyoscyamum præferre.

Matheol. effig.
2066.

GAL-

Glaucium, sine *Poma amoris*.

Papaueris corniculati species una, gemina varietas.

Papaueris capitati species quatuor, varietates septem, nempe

Papaueris albi, & flore *Malua hortensis*.

Sativum album { semine albo, & flore sinbrato.

Papauer { *Sativum nigrum* ex quo *Opium* { flore *Malua hortensis*, aut *Pauonia*.
& *Meconium Officinarium* { flore simili, sed cristato.

{ *Spontanum*, hortense, *Sylvestre album*.

{ *Idem nigrum*, alterum, flore *Phœniceo*.

Rhœas sine *Caduco* flore puniceo *Papauer*.

Papauer spumescens, apud *Hysopum*.

Argemone Rhœadis prorsum effug.

Anemone bulbosa radice.

Anemone Norbanensis corniculata.

Anemone minor *Coriandri* folia flore *Pulsatilla*, capitulis hirsutis,
nec ut *Papauer* corolla donatis.

An. Galeni Anemone lutea eadem, sit cum *Germanica*?

Anemone Math:

Pulsatilla { *Alba.*
 { *Lutea.*
 { *Rubra.*

Adonis.

POMA AMORIS, & *Pomum aureum* *Lycopersicum* quorundam,
an *Glaucium* *Dioscoridi*?

{ *Germ. Golt opffel.*

{ *Belg. Gouden appelen.*

{ *Gal. Pommes dorées.*

{ *An. Gold apel.*

PARTITER & hæc peregrina duplicis vel ancipitis naturæ habetur, *Mandragoræ* nempe, *Solani* & *Cornuti* *Papaueris*, inter quæ igitur fuit adducenda, vel etiam quia tû hanc, tum *Papauer Cornutum*, nonnulli *Glaciû* putarunt, tametsi si non sit hæc: *Glaciû*, nequit esse earum vlla quas crocei succum fundere nouimus: non *Cornutum Papauer* *Dioscoride* monente, non maius *Chelidonium* facultate exulceratrice refragante: Et inter *œnanthæ* species quæ maxima ex radicibus succum luteum remittens, calore etiam poller. An vero porius sit quæ *Amoris mala Pomæ* vocata fert? nè id quidem satis liquet: non enim ex *Dioscoride* nisi vna, aut altera nota suppetit, foliorum & succi. Ac succus huius quidem valdequàm oportunos incipienti *epiphoræ* fluxionibusue oculorum feruidis glaucoma facturis, si per iniria admoneantur, vnde nomen *Glaciû*: nisi ut *Plinio* placet, à foliorum superficie æquori & afflatu maritimo concolori dicta fuerit. Non modo enim irruentis humoris insultum compescit, sed etiam calorem moderatur, sæpius periculo à recentioribus facto. Quinetiam crispelatis, ignibusque facris vehementer oblectatur, vnde frigida nimium & penè narcotica putatur etiam ipsa tusa: verum succus eductus è concrematis furculis enatis in *Syriaco* solo & feruido, fieri

fieri potest vt tum mitior, tum crassior & colore satutiore euadat : est enim aqueus & dilutus pomi præsertim sublaues cuiusmodi Meloni, & alioqui folia haud ita dissimilia, aut niale quadrant : sunt enim prælonga, alata, crassa, & pingua, fractu facilia, colore glauco vel castreo, incisura ferrata, sinuata, & laciniosa Papaueris Rhœadis Corniculati ritu. Teneriuscula vniuersa planta, succulenta & humi reptans, Cucumeris agrestis in modum, cuius similes flores luteos ex alis promit : fructus verò cum maximus Aurantij magnitudine & modo visitur, torulis radiatim deductis in ambitum quasi scætiunculis à pediculi centro ad apicem porrectis. Color renidet nonnunquam fuluus, interdum & purpureus, cuiusmodi Charantiz, vel Alkekengi, cuius etiam semina compressa, flauetia, sunt similia. Italis nonnullis esitantur poma, non secus atq; Melones : sed quem halar vniuersa plantæ teter spiritus, paruo emolumeto, & parum tuto in cibos venire satis prodit. S & D

Poma aurata.

Glauco Succedaneum.

Glauco Venerum.

μικρὸν κερκίττης. PAPAVER CORNICULATVM.

{ *Ang.* Horne poppie.
Hisp. Domidra marina.
Belg. Brel huel & Boquehuel.
Ger. Seibolmag ende Sehornier Magfamen, Moen & Brel Magfamen.
Gall. Pavot cornu.

NISI monuisset Dioscorides, quosdam deceptos foliorum similitudine ex isto Papauere fieri Glaucium putasse, putassemus & nos & Papauerum genere esse Glaucium, quod Plinius congener Rhœadi, siue erratico fecit, eorum fortè persuasus lectione quos Dioscorides hallucinatos dixerat nascitur (inquit) in afflatu maris, aut nitroso loco, vnde nomen Parallion, etiam alio nomine assumpsit. At Dioscorides inter Papauera, aut post non tacuisset : aut suo capite omisisset. Istius autem Papaueris natales sunt squallida maritima, cuiuslibet oris siue Oceani siue Mediterranei, tum ad calidos Hispaniæ, Norbonæ Prouinciæ, & Genuæ : tum ad frigidos Angliæ, & Hiberniæ tractus : vbi flores colore iam luteo, iam phæniceo, purpureo legimus sæpius. Et enim vulgatus dictum cornutum siliquis Leucoij, aut Chelidoniij maioris, feminis nigri Plantaginis plenius Iunio solet. Folij diuisura papaueris Rhœadis, aut Argemones, crassi, hirsuti, rugosi, crispati, sparsio scapo multis alis, glauco, vti tota planta colore, & succo croceo foetido,

PAPAVER CORNUTVM flore Phæniceo.

Varietas. { Ad Frontignanam Norbonæ, & portlandiam Angliæ, aliâq; in afflatu maritimo loca, flores fert aliquanto minores, colore non luteo pallente, sed phæniceo in purpureum languente, succo, nec alia sui parte dissimili, nisi quia tota delicatior est planta.

K.j.

Papauer

μύκων ήμερος. PAPAVER ALBUM.

Ital. Papauero domestico.
Ang. White garden Poppie.
Gal. Pauot blanc, & Pauot priué.
Belg. Tamen ende witte Ducl & Mancop.
Ger. James Massgomen.
Hisp. Dormidera.

QVAMVIS hanc Papauerum recensionem concinnius Lactucis annexi potuit, quibus adeo coniuncta est genere, ut apud Galenum κατὰ τὴν φύσιν quaedam Lactuca atra, & amara ob lactis sporiferi copiam μύκων siue papaueracea vocetur: tamen nec intempestiuè hic succedet, & nos plerumq; nolentes auferit commodior aliarum occur-
 sus, nullibi equè oportunus postea ad seriem plantarum continuandam futurus, eoque huc hæc dilata est tractatio Papaueris, Græcis μύκων dicti παρὰ τὴν μὴ κοτὴν quia vineti papauereo sopore sensus, membrâq; stupefacta, nequeant quicquam agere: nisi dictum sit eadem quæ Cicuta notione: κνήκου enim à vertigine & calligine quam inuehit utrûmq; ut de Cicuta liquet, & de succo huius dicebat Andreas apud Pliniû, excæcari protinus oculos, nisi is fuerit adulteratus Alexâdriæ. Tritæ admodum cognitionis omne papaueris genus, sed difficilis dignotio ab anemone, cui similitudine tanta coniungitur Rhœas ut planè eadè iudicio multitudinis sint, nisi sic distingantur. Calidorû, & frigidarû regionû satu in hortis maximus Papaueris proventus, præsertim aruis maritimis aut afflatu maritimo obnoxij, quibus impendio oblectatur, ut ad Lio insulam Venetijs vicinâ, & Septentrionalibus in Hollandiæ propè Oceanû aggeribus, ubi totæ habitiores lacte plurimo scatent ad Meconium conficiendum: capitâq; ferunt magnitudinis conspicuæ maioris pomi Nymphetæ, malum Granatum non mediocre etiam æquantia, dissepientibus interdum calicem membranulis transfuerim se decussantibus, semen copiosum, album, rotundû, suauè amigdale, aut Melonis sapore ad placentas & medicaméta vtilissimû factis. Oleum etiam premunt Officinæ dulce nec amygdalino absimile, albidius tamè & tabidis commodius: Iunio flores latioribus quaternis plurimum folijs candidis, Maluæ horten-
 sis aut Rhœadis Papaueris caule vnico: sed alii diuiso insunt, recto, ternum & quaternum cubitorum, quem totum folia ambiunt Scariolæ horten-
 sis, aut Hyoscyami nigri lacinijis tenera, succum lacteum fractu remittentia: qui effusus vna aut altera diecula post flauescit, radice exigua Lactucæ.

Fimbriatum album.

Varietas. } SEPTUOR & hæc eadem & oritur apud Belgas: flore speciosiore, oris cristatis & fimbriatis, capitis etiam quæ operculo inest corolla, radiolis multo argutioribus & dentatim crenato ambitu visitur.

PAPAVER Nigrum Sativum, flore Maluæ horten-
 sis aut Pæonia.

ALIIVS alteram speciem alunt, nigrumq; à semine vocant nigricante, tutiore in Sydrupum de Papauere quam spontanei horten-
 sis semen, quod virosius est. Flores emicant sanguineo saturo Peroniz, non diuerso tempore, folia autem & capita tanta sunt similitudine, ut ea nisi effracta nesciant dignoscere Pharmacopœi qui feuerint.

SATIVVM NIGRVN CRISTATVM.

Quam

QUAM in satiuo albo notauimus florum orę cristatę & capitulorum corollę, eadem planę cernere est in nigro satiuo, quod non dissimile colore, aut magnitudine.

varietas

PAP AVER PATVLVM.

INTER superius album & istud rubrum vulgare, etiam quoddam est Officinis notum, quod nulla re discrepat, nisi foraminulis parulis in suprema parte capitis, vnde operculo diducto ę comissura peripherię rimas agente, elabitur semen.

OPIVM,

PAP AVERVM est lachryma liquore, gummeus, vulnere aut sponte emanans; quem *ῥαυὶς ἰσχυρὸν ὄστρον* & *ὄστρον* antiqui vocarunt viribus ad dolorum immanitatem placandam summamq; conciliandam, & stupefaciendum decantatissimis, & verissimis, etiamnum hodie, præsertim apud Turchas, Mauros, & Persas, vbi vsus tam frequens & securus, vt id quasi quoppia nepenthe ad animi corporisque exhilarandas facultates, largius & sæpius elisent, qui verò assueuerint eiui, si prorsum abstineant, moriuntur, aut periclitantur valde: ac rursus si largius elisent, vt scitantes fontes quos tædet vite, aut manet grauius, supplicium mancipia: extinguuntur. Esse verum & merum istud quod Officinæ ex Syria & Alexandria habent, nec Glaucio addito calidius acriusue & amarius factum, vt (Commentator somniat) certum est: nam quidam Pharmacopœi Veneti, & alii non pauci alibi, ad Theriacis simplicium delectum exceperunt Opium ę satiuo Papauere albo, prorsum idem cum peregrino Asiano, vbi ex albo tum ex nigro satiuo fit: quare eorum Amphiam esse Opium Græcorum, liquido patet, nomēque indidem commutatum fuisse vtrūque perquam amarum: vehemens odore, acre gultu, & fauces quadatenus accendens, luminibus obiectum flagrat; etiam deterius & nigrius istud in Officinis nostratibus. Nam illud Venetum, purius & vt Aloe pellucidum, sed glutinosum fuit, lacteum eximii viribus, acrimonia & amarore, insigni. Quo minus sunt cominiscendum Senensi propter immistum Glaucium, acrius & feruidius Opium esse; etenim Glaucium nullum verum hodie cognoscitur, nec etiam calidum sed frigidum à Dioscoride proditur.

MECONIVM.

MECONIVM verò non modo ex vtrōque Nigro & Albo satiuo, sed etiā Lactuce sylvestris confusis foliis & expressis, partim habuimus, partim etiam parandum curauimus; facultates comparabuntur & expenduntur cum opij viribus, inter lecta remedia nostra.

PAP AVER SPONTANEVM Hortensę Syl: Semine interdum, nigro, alias albo,

PRÆTEREA sponte in hortis prouenit, quædam species foliis minoribus, floribus dilute rubentibus, obsoleto aspectu, capitulis triplo minoribus numerosis, semine interdum nigro, alias albo, quandoque huius oculis, quandoque oclusis, cohibentibus semen, quod parum gratum, aut probatum habetur, præsertim nigrum.

Μήικον ῥόδιος. RHOEAS, sine caduco flore ponicæ Papauer.

*Græca, Klapper Rosen.
Gallia, Paut sauage, consanons, Poncean, & Coquelicot.
Ital. Papauero.
Belg. Root Solbloemen quasi Roombloemē & Doynroosen.
An. Wild redæ poppy and Red weeds.*

NITIL frequentius isto in segetibus, quod vocarunt authore Dioscoride *ῥόδιος*, à conditione fluxa floris quem parum diu seruat. Folia hirsuta, incisa, altius laciniosa, K. ij. Erucæ

Eruce, Ambrosie, aut Bursa pastoris, ambitu rutilant ex atro cruenlati flores minores, tenuiores, flaccidiores, satius, nigris, in medio apiculis villosis, per initia oculo si inuolucro hirsuto herbaceo Cucumeris Asinini pusilli effigie, Capitula sunt Pseudo melanthii magnitudine, similitudine, & supernè etiam vertice coronato, seminis plena Hyoscyami, aut Pseudomelanthij. Caulis asper cubitalis & sesquicubitalis; radice non magna, quæ attritendo quippiam illinquit manibus cruenti, aut subpurpurei, ad morbos eodem proficui quos iuuant Symplicis est floribus, & stillaticia, magnæ apud nonnullos Medicos, & Officinas commendationis.

ARGEMONE.

QUI A huius succus argemas & nubeculas oculis dispelleret Argemone vocata fuit, cui cum syluestri Papauere, & Anemone perquã similis tota facies, folia, color, modus: has tamen vt inuicem discernemus, fecit natura dissimilitudinem quãdam, & varietatem in similitudine, quæ exercitatis oculis, tametsi notis adductis à Dioscoride, tum intuitu facili inotescunt, tamè quoniam potius antiquorum quàm nostro statim est iudicio, nunquam perciperemus planè aut rem, aut eius dissimilitudinem, nisi verba quæ sunt rerum indicia intelligamus. At illa videntur hic vno, aut altero loco, aut mæca, aut minimè vera: nã quorsum hic de Eupatorio cum illis spectat collatio, nesciunt docti: proinde ex rationis illatione satis liquet non Eupatorium, neuè Agri- moniam, sed Argemonem eo loci legendum. Sic enim ait, *Anemone, & Rheadi capitula syluestris Papaueris, sed illi supernè crassiusculum, huic subangustius*, tum paulo mox, *Anemones nodosius carere*. Iam si codicem est capitulum, aut pixidula qua clauduntur semina: (quod DIACODIUM nomen videtur insinuare) negabit eidè adesse Capitulum, quod illi paulo superius asserbat. Ergo sic habendum, κατὰ δὲ αὐτὰ capitula hic aliud esse quàm Codia (quod interdum etiam Theophrasto Fabæ crassius gibbum indicat) natura magis quam vocum vsu docente: vt in Papauere, vides caule summo Capsulam rotundam tere- rem, cui summo superficiali medio erigitur cupulus caliculatus Punci mali in modum. Istum hic Dioscorides codion nuncupat, eoque magis vera quam scita distinctione eundem Anemone abesse indicat, vt inspectio etiam testatur, quæ quemlibet hæc monitum faciliè germanam differentiam docebit. Ista Intererat accurati & probi interpretis potius extricare, quàm meras aliorum icones congerere, aut Ruellio huius historiz parenti bene- mentò notas imperitiæ inurere.

Esse quãdam Papaueris, Rheadis speciem, cui succus flauescens pressu extillet in Plantarum diaris, & memoria habemus: an verò radix illi rotunda haud succurrit memorie, nec tamen cuiuslibet se prodit intuenti color istius Papaueris, quam Argemonem putamus; vt neque in Rheadis radicibus, quas si digitis fregeris, aut Papyro affricueris, non nisi vna est: non in radice sed in cute colorem purpureum, vel sanguineum intueberis: hanc quilibet sed altera plantã, paulo gnauior, qui multas Rheadis plantas collegerit faciliè animaduertet. Flores vè altera pars vireos interdum adeo saturi flammæque coloris sunt, vt atrorem præferant Adonidis floribus parem.

ANEMONE.

PER SIMILIS Rheadi Papaueris, Anemone, quàm quia primo cuius; afflatui venti flores pandat & referet, sic appellatam volunt. Potuit etiam non inconcinne à cognati affectu Rheadis floris persimilis, cui desunt folia cito, siue statu, siue spontè, vnde vulgò dicebant Pulsatille, & Herbã Venti: nam hiare patereque flantibus ventis per æstatem, permultis vsu venit herbis. Deinde quotquot Anemones vel cultis, vel neglectis locis legitimas agnoscimus; oportet perquam similes esse floribus, præsertim Rheadi Papaueris, & Argemone, Dioscoride monente: alioqui frustra solito diligentius Dioscorides hæc inter se collatas discreuisset, monuissetque Anemone succum & calycem deesse, dumtaxat Asparagi pullulationem eum cæcum nosam inesse. At Rheadi & Argemone succum tum Codion siue calycem suum esse, quæ cunctas differentias, qui

in Romano agro Norbonensi voluerint animaduertere, illicò deprehèdend. Tametsi radices non sint tuberosæ harum nonnullis, quæ tamen certiores & notiores multò sunt illis Ranunculis, & Napellis, quas quidã falsò Anemonas iactant: illo excepto quem Venetijs virentem è Syrio semine prognatum euulsumus.

ANEMONE, Bulbosa radice.

FLORÆ sunt Papaueris Rhœadis aut Monspelliacæ Anemone pares, sed colore saturatiore viuidiore qualis Adonidis, cauliculis multis sesquipalmaribus & pedalibus, teneris hirsutis, folia Coriandri aut Pulsatillæ, radix tuberculus est quâtuor Doronici oblongus, aliquam multis fibris capillarus.)

NORBONENSIS Anemone maior, corniculata.

NOTISSIMÆ verò apud Norbonenses dux, primo intuitu Papaueris Rhœadis florem ostentant, in cultis præsertim, quarum maior folia habet etiam Coriandri diuisura: sed Papaueris Rhœadis modo hirsuta, in caule pedali & sesquipedali: flores verò ex rubro in purpureum violaceum deficiunt, quos perquam tenellos Papaueris Rhœadis ritu vel lenissimus autæ appulsus celeriter aufert, remanente tereti hirsuto longiore corniculo, cornuti Papaueris non dissimili, sed minore & gracili ore: quasi natura alludere voluisset, isto descripto ad Papaueris cornuti reliquas, & altero ad Argemonæ glomerata capitula, in acutum fastigiata non operculo munita, vt Papauera omnia sunt,



MINOR ANEMONE, CORIANDRI folia,

flore Pulsatille capitulis hirsutis, nec vt Papauer corolla donatis.

MINOR autem delicatiore caule non dissimili, minutiore folio & diuisura quam Coriandri, valdè quàm hirsutis, & satis rigidis, hirsuta capitula, flore eleganti relinquente multò minora quadantenus similia Rhœadis Papaueris, semine nigro Hyoscyami, radice pusilla superiori haud dispari, quibus si tuberculum adesset, nullæ notæ deessent: ac si non sint Anemones, sanè vix sint vllæ propriiores aut illis, aut Argemonæ, aut nouæ putandæ sint, vel suspicandam capite de Anemone duo genera descripsisse Dioscoridem. Quorum vnum radice sit tuberosa, alteram non dissimili Rhœadi, quod videntur inuere verba initio, deinde confirmare, vbi discrimen ponit Papaueris, Argemonæ & Anemone, huius tuberculi nulla interim facta mentione, cum tamen maxime oportuit: quare fortè idem illi contigit, quod Drabæ radici, quæ alicubi tuberosa, aliubi plana & æquabilis visitur. Idcirco



An. Gal. Ane-
mo Lutea lib. 2.
καὶ τὸ πρῶτον
eandem sit Ger-
manica.

à Monspeliaceis Medicis verè putantur, frequentèsq; inibi oriuntur in vinetis ac veru-
ctis, præsertim iuxta prædium præceptoris & harum seduli vestigatoris D. Asclaj, qui
cum alijs multis opinabatur illam Germanicam & recentiorem Anemonem, stella-
tis luteis Ranunculi floribus & semine, radice multis bulbilibus tuberosis Bulbocastani
donatam, speciem esse Bulbosam Batrachij: nam tametsi eiusdem flores interdum al-
bidi aut purpurei sint, tamen nihil sermè habet tota quòd quadantenus præferat Papa-
uer Rhœas: sunt enim folia Getacij columbini aut Ranunculi, cuius vrentem facultatem
itidem habet: qua propter illuc nos referendum duxissemus, nisi à Galeno memorata A-
nemone luteo flore nos suspensos sententiæ de hac planta magis quàm certos retinu-
isset.

ANEMONES Mathioli.

M. icones. 617.
618. 619.

PO RRO còplures Anemones vt non necessarias, ita parum notis & locis expressas ad-
ducit Mathiolus, quarum partem nunquam vidimus, partem verò bis inculcatam puta-
mus, nempe hic & in Ranunculis; quas tamè vltimas ponit, veriores intermedijs conie-
ctamur, potius quam asserimus: quia ex illo profuso magis quàm profuturo picturarum
apparatu, nullò aut perperca verborum explicatione, locorù designatione, & stirpiù di-
stinctione subnixo, nihil penè certi capere valemus. Vtinam tantus Herbariorum dicta-
tor, potius posuisset operam nostro desiderio discendi explèdo, quam Ruellio, Fuschio,
Brafauola, Manardo alijsq; viris meritisimis carpendis cum alibi crebro & falso tum hic
in Pulsatille & Venti herba quæ apud vulgus complures herbas denotat, Othonnaz pan-
nosa arrosa folia, Solidaginem minorem, Pulsatillum, & alias.

PULSATILLA, an Sylvestris Anemone.

HVIUS comosi & tremuli feminum pappi quia huc atq; illuc vel leuissimo quòq; fla-
tu pultaretur, Pulsatillam barbari vocarunt, Anemonemq; coniectantes & verten-
tes Vēti herbam pleriq; dixerunt: & sanè meritò non multum visa fuit abesse à Sylvestri
quibusdam doctissimis. Quippè folijs est Anemones tuberosa, Bulbocastani aut Cori-
andri, rigidioribus, hirsutioribus, nigricantibus, crassioribus, durioribus, caulem palma-
rem & sesquipedalem hirsutum Geranij amplexis, in quibus flotes Papaueris Rhœadis
aut potius Anemones, quin & senis folijs purpureo cæruleis, è medio quorum exerūt
apiculi staminæ lutea Aquilegiz aut herbæ Trinitatis siue trifolij Hepatici, à quorum
delapsu se prodit cæsaribus villosa, cirris crebribus, & cincinnis calamistratis pennas delica-
tiores sericeas pulli coloris implexas, aut carminatum bombacis pensum referentibus,
cuiusmodi in Caryophyllata, Scotino, & spongia Bedeguari: quibus conditur semen ex-
iguum Asclepiadis: Radice digitum crassa non admodum acri nec feruida. Quare inue-
tenda ratione inculcat Fuschium erroris Commentator, hancq; recusât quia cum pri-
mum erumpit, emittat hirsuta folia laciniata, quæ acrimonia sint Ranunculi aut Flam-
nulæ: inferius tamen paulò, dulcem saporem radices idem Senensis agnoscit, non acrem
cuiusmodi in caule & folijs: At Dioscorides vult utramq; Anemonem acrem & acriorem
illam cui folia nigra sunt, qualia sunt huius Pulsatillæ, quæ crustas ematginat admotis fo-
lijs, quemadmodum de Anemone dicit Dioscorides, qui into sumenda folia ptisana e-
linoxat, quò deponant acrimoniam: ipsa verò radice vt puta mitiore cruda mansa, pituitâ
extrahit. Flore albidam, pallentem, Mendini montes, & Auerniz, dant. Pedemontii Tau-
rinenses, interdum luteam ferunt: ex Alepo Syriæ rubram etiam habuimus. Non procul
Basilea in Heluetia meminimus frequentem hanc cæruleam & purpuream, quæ propter
qui Ritus Apium Dioscoridis hanc autumant, risum potius quam responsum merentur.

Mathe. icon.
620.

RECENTIORVM ADONIS, aut ADONIVM Poetarum,
species Anemone non Eranthemi.

Belgiæ

Belgi. Brunettekens.

CERTVS etiam augurarentur, si eximie pulchritudinis florem istum vulgò adonidis vocatum, vel adonium qui etiam inter segetes passim in Gallia, Germania, & Anglia reperitur, & in hortis coronaria habetur, ad anemonas retulissent: Etenim Eranthemum cur non sit, diximus inibi, cur autem anemones sit, & eadem cum Poetarum Adonide videatur, faciunt flores puniceæ anemones Galenicæ aut Germanicæ, intenso cruore saturati & aliquantum nigricando lucidi. Folia, caulis, ramuli, & radices Cotulæ, aut anemone Monspeliacæ: semen in pusillis oblongis racemosis, Ranunculi longioribus fastigiolis, asparagi primum pullulantis, vt signanter monuit Dioscorides in anemone: tota gustu subacri, vnde Monspellienses eruditi pleriq; in anemones potius quàm Eranthemum ducendam voluerunt. Sententiæ quorum fauent etiam è Nicandri Theriaco cōiecturæ, vt qui hanc Adonidis cruore genitam, anemonem vocent, & Ouidius itidem

Effig. Math.
906.Eranthemum
Ded. Fel. 140.

*Cum flos de sanguine concolor artus,
Qualem qua lento celant sub cortice granum
Punica ferre solent;*

*Nimiam leuitate caducum,
Excitant ydem, qui perstant omnia, venti.*

Vbi vides anemonem, & vulgi nomenclaturam, herbam venti adumbratam.

LAPATHI, siue RVMICVM genera.

CVM Paulo superius Lapatij differentias cunctas Atriplicibus & Betis, inferere consiliū fuisset: Nec tamē id apte fieri potuisset, quod nunc possumus proxime eas hic adiungemus: Deinde vt quæq; sese offerent simillima, ita proxima serie ad hunc modum erunt collocanda.

LAPATHVM.

*Oxylapathum pratense, & Paludosum folio acutè mucronato.
Pratense alterum obtusiore folio.
Lapatholum siue paruum fontinum,
Hydrolapathum magnum.
Hippolapathum hortense, Patientia vulgi, & Rhabarbarum Monachorum.
Hippolapathum rotundi folium, Pseudo Rha Recentiorum.
Alterum Rha spurium acutifolium,
Rha { Ponticum,
Barbarum.
Lapathum sanguineum, siue Sanguis Draconis Recentiorum.
Lapathum Oxalida, siue Oxalis.
Oxalis Gallica rotundiore folio.
Oxalis minima.*

*Bistorta. { Maior } Draguntia Plinij querendam an Britannica?
{ Minor }
{ Minima }*

K. iij.

Rha.

Rha capitatum Centaurij maioris facie, Enule folio.

Pulmonaria maculosis Betæ folijs, an *Britannica*?

Britannica altera Gesneri.

Herba Dorica.

Verga Aurea.

Solidago Saracenicæ.

Tripolum.

Limonium utrumq;

Pyrola.

Sanicula altera *Primula veris.*

Cochlearia cum *Frisia* & *Anglia.*

Alisma siue *Damasianum* qua *Plantago aquatica.*

Sagittaria.

Alisma recentiorum, & *H. Morgani.*

Calceolus Mariae.

Ophris siue *Bisfolium.*

Vinsolium.

Plantago. { *Maior* *lenis.*
Maior pullosa.
Quinq; pernia.
Rosca.
marina.

Potamogeton.

Folium Indum *Diosc.*

Folium Malabari.

Tembul.

Betre.

Gentiana. { *Maior.*
Minor *Cruciata.*
Gentianellatres.

Nardum { *Celticum.*
Celticum alterum;

Nardum montanum cum *valeriana.*

Elleborus albus. { *Flore racemoso albo,*
& *rubro.*

Elleborine alba.

Sapenarius.

Perficaria inuis.

Perficaria Hydropiper.

Capficum siue *Piper indicum maius,* }
minus.

Balsamine fermina.

Costus bortenſis, vulgo *Cocq* & *Baume*, *Tragi Alisma.*

Noli me tangere recentiorum.

Lepidium Aegineta siue *Raphanus fil.*, vulgi *Gallorum*, & *Belgarum.*

Raphanus magnus *Rusticanus.*

Belbonac siue *Raphanus agreſtis recentiorum* non eſt *Diosc.* *Armoracia.*

Viola matronalis.

Viola Mariana, an *Medium antiquorum?*

Trachelion flore. { *cæruleo.* } *maius* & *minus.*
albo.

Campanula bortenſis, *Phyteuma* *Mathioli falſo.*

Pes Lucſta *Aucenna*, siue *Rapunculus minor.*

Rapuntium maius, *Alpeperi comoso flore.*

LAPATHVM ACVTVM.

QVO Latinī aliuū mollire, lenire, exinanire, ἰδλατῆρ' ἔιν Græci dicunt: vnde Lapathum & ἀλέπατα, vt quidam legebant, vocatæ fuerunt. Herbz notissimæ & uiridantibus vi donatæ holeracæ, cuius permultæ sunt differentiz, cunctæ vbiuis abundè prouenientes: vt est ea quam adhuc hodie LAPATHVM ACVTVM sine acutifolium vocant. Pratis nusquam deficit, folius Acetosæ nigrioribus, Betæ longioribus, angustioribus in caule cubitum & sesquicubitum alto, rotundo, profundè striato, purpurascente, alis pluribus donato, quibus flores muscosi, & semen triquetrum in folliculis Atroplicis, vel Acetosæ concoloribus paribus non dissimilibus. Radix subest pedem longa, vnciam crassa, flaua vel fulua, foris ad lotiones, totus & linimenta, etiâque, in trō in decoctis vsurpari Officinis solita, totius nomine Lapathū acuti, non reiectis ramulis vel foliis.

LAPATHVM FOLIO RETVSO,

ἰσχυρὸν ἀκνίον.

NON diuersi generis, Officinæ vocant non acutum, quoddam Lapathium foliis superne retusis, breuioribus, rotundioribus, iisdem locis circa rudera & areas æquè familiare, ac semine, caule, flore, & radice à superiore vix discernendum: vsu minus receptum, propter superius acutum vocatum.

HYDROLAPATHVM MAGNVM

sive aquaticum.

QUIA frequens in aquis, nec alibi sponte exiret Hydrolapathū vocarunt istud, etiâ tota facie Hippolapathum satium referens: folio nigriore, non dispari, vt neque caule & semine; radice dumtaxat breuiore, fibrosiore, foris nigriore, intus vero rubriore, eoque ad Behen Rubrum ementiendum aptiore; Hanc enim quidem Antuerpiani, & Galli audeant Sepalsiari ad Medicos vsus sufficiebant, Behen rubro, cuius facultates & notas non minus adumbrat quam Limonium.

PVSILLVM FONTILAPATHVM,

& Lapatholum vocatum, tenuillum.

ISTÆ etiam aquæ sunt natales, sed non nisi lympidæ & fontanæ, trans quas è fundo exerit cauliculos teneriusculos, l'acidos, graciles, non absquæ hinc inde filamentis, vt cæteræ aquaticæ, stipantibus & pendulis: folia sunt item admodum tenuia & mollicella, nec tamen aquæ innatantia ritu Potamogetonis, sed erecta viridantia ex atro Læceolæ, angustiora multò quam Potamogetonis, quæ miscenda colligebant sedulo, quidam Pharmacopœi Norbonenses, præsertim Nemausi (vbi hæc, nec temere alibi, reperitur) ad vnguenti Martiati nominem & rerum farraginem confusissimam; tuebanturque semper idem noui aliud generis Lapathii miscendum esse illi vnguento.

SATIVM Hippolapathum, Latifolium, vulgi,

Rhabarbarum, Monachorum.

AD quæ familiaris notitæ istud est, vt in medicamentis familias ad emolliendum ventrem & olere ad vescendum habeant plerique horti; alioqui rarò sponte prouenit. Folia sunt Hydrolapatho paria, vel latiora, minus acuta, & rigida, in caule triū, aut quatuor cubitorum, radice adultiore, flauiore & gustu atque facultate deiectoria Rhabarbarum imitante, idcirco Rheum Barbarum Monachorum, apud quos coleretur & cum vulgari Rhabarbarum putaretur, propter commodum consimile flauam bilem, & ferossos humores educendos nequaquam aspernendum dictum fuit; tametsi & aliud sex hoc subdendū etiam Monachorum sit vocatum Rha.

PAVCI, & diligentiores Herbarii vt Antuerpienses Pharmacopœi istud colunt, & agnoscunt, quasi multo cognatius vero Rheo Barbaro, quia folio sit rotundiore, & superno ambitu retusiore, propiorêque ad Personatam, aut Petasitem, quibus fermè magnitudine æquiparatur, nec tamen maiore, aut ita diuersa radice Hippolapatho, vssue, aut natura dissimili.

RHACAPITATVM Centaurij maioris facie, Enule folio.

MVLTI etiam abhinc annis aliud Rha ex semine Turcico habuerunt nonnulli, in hortis Galliz & Flandriz, quod magno studio cultum, non parum diui inibi perrennauit, foliis etiam Bardanz, sed non perinde latis, longioribus, Enulz, vel Phlomi, ambitu serratis, & simbratis, læua & aduersa superficie virentibus, auersa autem glauca lanugine pullis, caulem rectum sesquipedem & cubitum amplexis, capite fastigiatum, foris squamulis loricato, ac per maturitatem flamine purpureo pleno, cuiusmodi in Cynaris, Carduis purpureis: semine dum circa Iunium & Iuliu maturuit, Cetauri maioris, vel Carthami longiore: Radix etiam fungosior, maior, & Rhabarbaro similior quam Centaureo.

PONTICVM RHA Antiquorum.

RHA à Pontiflumine cognomine Rha, RHAYED Seni à Chinarrum Indica seu Rhabarbarum Chologorum.

APVD Arabes & recetiores, duplex radix peregrina nomine Rha designatur; sed quia cuiusnam vtrius, stirpis sit, hæcenus doctis ignoratur, & numnam eiusdem ambæ sint plantæ ambigitur, paucis & perspicuis resectis turbulentis argutationum acerbis, & autoritatibus, his ex rerum inspectione & accurata collatione dirimenda. Qui sæpius manibus & ore versarit radices hæc quinque nimirum Rhapontici, Rhacedseni, Centaurei maioris vtriusque, & Hippolapathi Monastici, facillè percipiet omnes pariter & vnam quamlibet inter se, tum similes esse, tum etiam non parum discrepare. Quod si harum tres istæ indigenæ, nobis tam parum notæ forent, ac illæ duæ peregrinæ sunt, Pontici & Barbarici Rha, facillè quis læuiscula coniectura addita adduci posset, vt Centaurium Rha Ponticum crederet, atque Hippolapathum Rhabarbaro idem, aut congener faceret. Nunc cum hæc diuersa esse satis constet, nullus nisi apprimè veris argumentis fretus, asserere debet, Rhaponticum idem esse Barbaro Rha. Est enim illud non modo molestum tyroni lectori, sed etiam impedimentum ad simplicium percipiendas qualitates notas, varietates, differentias, & vsum; quin cauillis & ad ostentationem concinnatis sophismatis contrariæ, fermè naturæ res eadem esse probantur. Quippe si quis istud Rha Dioscorideum, nunc postremo cognitum gustu exploret, primum pauculum amarorem, vehementem astrictionem, glutinosum viscidumue quippiam adiunctum, acrimoniz expers, inodorum, leue, mansu; nõ cuiusmodi Rhabarbarari Crocei deprehēdet sed croceoru, tramitum, colorem, atriozem tamen & ferruginem aceto dilutam ostendentem, fractu facillè, adeo vt minutum etiam non attritu in frustula diuellatur; intus neūtiqum RHABARBARI colore, sed textura & fibris tenuissimis, longè quam Rhabarbari delicatioribus, à centro inambitum radiatis, colore cinericio pulloue, venulis trāuersis pallei coloris. Crassitudo radiciis maximæ nobis visæ quæta Cetauri maioris, mediocres pollicè æquant; recens laxioris selutiorisque; substantiæ magis quā Rhabarbarum, etiam vetustate cariolum & minus graue. Longè aliud est ab illo quod Mathio. innuit; Anguillaræ Appolinis; monitu, nam merito hi cōiectabant; vt res erat, suam illam radicem esse tantū crocè & præcisam à iuuenula Rhabarbari planta: etenim anno ferme 1561, miserāt copiam istius in Italiā, & Rhabarbari Pontici nomine donarant: flaua erat grauis & gracilis radix, sed vetustior, & teredenibus exesa, lenior, pallidior, magnū tamē tunc habebatur, quia in Math. cōmentariis celebrabatur, etiāq; vt asserbāt nõnulli purgabatur, plufculū sumpta, vt videre meminimus Florētiz in Nosontrophii officina; & etiam

Rhabarbari & Rhapontici discrimen.

etiā Venetijs plerisq; locis alijs. Quo verò anno 1564. Math. in Bohemia, eius verò com mētaria prālijs Valgrisiānis Venetijs hærebāt Sequinus Martinello doctus & perquā in hac Palæstra versatus, istum alterum postremum fratri Alberto ad Angelī symbolū mī sit: quod Medici Veneti nulla nota reclamante Theriacis addiderunt, & ad ceteros affe ctus in vsum deduxerunt: præsertim Lugduni in Gallia, Medicus singularis Dalescam pius: neūtiqum purgabat, sed astringebat & duntaxat præstabat ea quæ de eodem pro diderant antiqui. Sic & Pharmacopœi nonnulli, vt Valerandus Donrez insulanus valde ingeniosus, huius non semel fecit, & vidit periculum factum. Cæterum parum solidis pe dicis fulcit Anguillara spuriam illam Ponticam radicem, quam si quis huic nostræ vellet aptare, longē magis aberraret: hanc etiam cum magna copia recentem habuerimus (pendebant tamen & in singulas vncias ducatum ad Theriacæ compositionem Pharma copœi) semper leuiusculam corticibus crassioribus, & absolutis, vt supra dictum obserua uimus: cum potius debuit grauior esse recens quā adulta, aut arida, contra quā Anguillara putat Rauen istud purgans. Frustra & ridicule facessunt negotium, dum quibus ex orbis regionib; aut emporijs Venetias aduehatur anxie inquirūt: nam alijs nauigationi bus ex Iudijs Orientalibus, ad Septentriones a cœli volucribus & Neptunis Hispanis Vlisiponem indeq; Antuerpiam deuehitur: venumq; exponitur dimidio fermē mino ris quā Venetijs. Magnus Mathiolus magna prosequitur veneratione, Apollinem istum Iambicum, qui æquo animo ferat illius falsā & asperiuscula monita, nec conuicium in il lum regeat, quæ tamen nec læcessit in alios doctissimos solitus est congerere: verū pru denter & catē sic factum nē siluerit: & vt puto ne istam Mathioli laternam lustraret, aut vasta commentaria suis illis radijs Iambicis conficeret, & rereet.

LAPATHVM sanguineum.

Belg. Dyaken blœt, aut sanguis Draconis vulg.

Gall. Sang de Dragon.

SEPTENTRIONIS hōrtis sponte hæcetiam oritur, rariū in calidis plagis, quā quispiam putasset Limonium, cum quia Blitea illi sint folia, tum etiam quod neruulis, & venis crebribus sanguineis eadem sint intertexta: qualia quidam in Limonio deside rant, cum apud Dioscoridem *νευρωδης* nuncupatum legunt, id est, nerueam, aut neruis donatam: verum ē Lapathorum est hæc genere, quod habitu toto ipso præfert, tametsi nitrofiore gustu, & Bliteo folio & facie, vel Lapathij acuti angustiore, longiore, numeroso sanguineis, purpureis, saturatis extantibus neruulis, aut venis cruore plenis, quoquo uer sum sparsis, & labyrinthis ductibus, folij fuscum virorem maculantibus. Reliquaq; om nia sunt prorsum Lapathij acuti, aluumq; cient iusculo, aut expresso succo sanguineo to tius plantæ, quā idcirco *Dyaken blœt* Germani vocant.

OXALIS, sive LAPATHVM OXALIDA, Acetosa effi.

{ Gall. Oseille.	{ Ang. Sorrell.
{ Ger. Saurampfer.	{ Ital. Acetosola.
{ Belg. Surtele.	

OXALIDES tametsi non petinde nisi nomine expresse fuerint à Dioscoride, tamen quin fuerint Lapathi quartum genus constitutæ nulli dubium: nam quod cuiuspiam minus placere posset, semen *Απειδης* inibi dici, sic accipiendum, vt vulgò interdum loqui tur, acidum siue *aigre* cum acri confundens: alioqui cur illi notissimum, vt semper fuit vel mulierculis, non putemus? & Oxys seu Oxalidis vox, non modo foliū, sed etiam sapore connotat, qui acutus ab acie cultorum proportionē & similitudine dicitur, Oxis siue acutus, quibus etiam Lapathum vocatur Oxalis, vt sane est: folijs quippe acuti Lapathij tenuioribus, delicatesioribus, & magis holeraceis, imā basi latioribus, lunatis & pinnatis Spinaciam, & Atriplicem referentibus: caulem multum striatum, rubellum, succulentum

am-

Effig. Dod. 383

ambientibus admodum acidis : radice ex Crocco flauet fibrosa, semen angulosum acutum, in folliculis Lapathijs cæteris non dissimilibus. Vbiq; pratis & hortis quolibet anni tempore viget, suppetit Officinis & culinis ad embamata.

Oxalis TENVIFOLIA, sinuata Veruecina.

{ Belg. *Scaeps surkel.*

{ Gall. *Surelle, ou Oseille de brebis.*

PERSIMILI huic, & tanto luxu sabbulosi Brabantiz, Picardiz, Nortmaniz, & Angliz importuna, vt segetes enecet, vires aut incrementum præpediat, fusco purpureo seminum caulium, & foliorum colore solum ipsum operiens. Gustu etiam acida pecori non ingrata, eoque fortè vocata Belgis *Scaeps surkel*, id est, Acetosa veruecina. Minor tota & gracilior, palmum & sesquipalmum alta : radice exili & tenella, plurima etiam in collibus quibuscumque squalidis & macilentis.

Sativa FRANCA, rotundifolia repens.

GRATISSIMA & tenerissima in holere hæc in Fræcia Lutetiam, & Aureliam circum: tam hortis ad intinctus ciborum & medicamenta, quam superiores duæ reliquis regionibus frequens : acideò Romana vocata, quia cunctis præferretur, gustu & acciditate delicatior. Quamuis & in montibus Gallo-Prouinciz glæreosis multa scateat, ferpatq; flexis pediculis & cauliculis pedalibus & sesquipedalibus, in quibus folia circinata supernè, pusilla carnosa Soldanellez, sed reductis, ad imum sinuatis lateribus, aliquantum pinnatis : semine & flore pusillis non diuersis à superiore Oxalide.

*Pliniana Oxis
inter trifolium di-
citur.*

*Triplex BISTORT A, quæcumque quauis asserunt
BRITANNICA.*

PRIMUM intuenti vtrâque Bistortam, videntur illæ à Rumicæ syluestri fami-
lia, quare & de Dioscoridis soliorumq; comparatione Britannica iudicata fuit. Sed maioris multò commendationis antiquorum Pliniiq; elogio Britannica olim fuit, quam hodie sit exploratæ notitiæ. Factum quippè videtur negligentiuscula recensione, fortè & vna immutata vocula, aut sanè labecula in radice exprimenda, quod vsu venit nostra & auorum memoria, vt quam perditam aut ignotam duceremus, vsu tritam quotidiano, nomine sub alio inuulgatam, familiarem admodum habeamus. Quare qui Bistortam nolunt, propter radicem *Αερίην*, id est, tenuem memoratum, neq; nihil penitus dicunt: neq; tamen tantum incommodum adducunt, vt cum cætera omnia exquisitè ei faueant tum figuræ, tum virium signa : cum ipsi nihil æquè commodum, nedum melius afferant, sit illis illic credendum: totum quippè disceptationis momentum in radice vertitur: alioqui Rumici agrestis adeo est similis facie, vt nò pauci Rumicem diſtinent. *μελαντέρα καὶ δασύ τερα* si vellicant, in Græcula notione trita calligat : saturiore quippè & quasi purpura nigricante vt in viola quam *μελαίαν* vocat, Martia esse folia interiora innuit *δασύ τερα* nò pilosiora, neq; enim de pilosis hic comparatio est, neq; notio ea commoda hic est, sed rigidiora, hirta, & firmiora. *βραχέα*, id est, breuem, sanè videre licet etiam cum Lapatho, aut minoribus collata. *Αερίην*, tenuem sanè, vt non lubet, ita inuitus dico, fortè quod verissimum est : aut illum minoris Bistortæ radicem intellexisse, quæ non admodum crassa est, aut quæpiam amanuësem, qui breuem radicem legisset, tenuem è crasso mutasse *ωάριν* in *Αερίην*, nempe rei ignarus, ratus id aptius congruere, quia quæ sunt breues radices vt plurimum sunt tenues : tamen si ipsis etiam autoribus eadem excidere possunt errata leuiuscula, humanæ Mineræ. Vt vt sit, vsus & fructus Bistortæ nequit extorqueri illis, quos viginti annos, eoque plus torſit Britannicæ sedula disquisitio : qui sciunt ipsæ planè viribus, & longè pluribus, quâ quot attribuerit Dioscorides Britannicæ, pollere. Quarum expensio retinet nos in eadem sententia eo lubentius, quod nullam planè videamus, quæ æquè congruat.

Maior.

MAIOR enim promit folia, Rumicis acuti simillima, aliquanto minora, nigriora, ple-
noria, rigidiora, ambitu tantillum lacinoso, aut alicubi reducto, aucta cæcia, te-
neros, glabros, pedales exiles, & in summo spicatos flores purpureos Betonice, aut Per-
ficariz, caules edit. Radix nigra, instar contorti, intróque reflexi pollicis digiti manus, in-
tus rufescens, sapore perquam austero, astringente, quandantenus Tormentillæ, foris fi-
brofa, nigra.

Bulbota MINOR, & MINIMA.

PORSVM eadem primæ minor & minima, etiam quò loci omnes vnà sponte oriun-
tur, sed hinc folia angustiora, leuiora, continuifq; oris: breuiore item implexu conuo-
luta, minorque radix, & nullis penè fibrillis. Celsi mótes & frigida præfía has alunt om-
nes, vt Baldus Veronenfis, & colles herbidi multi in Anglia Occidua. Vbiuis etiam colunt
horti Pharmacopœorù efficacissimas omnes ad vulcera effrenè serpentina, & ad fungolos
polyporù in naribus, & palato interiore flagellos absumendos, aqua stillatitia, quæ etiã
ad hepaticam sanguineamque resudationem plurimum pollet epota.

BRITANNICA GESNERI & Lugdunensium.

QVÆ enim nobis primum indicata, ab exercitatisimæ cognitionis Valerando Don-
reꝝ Insulano, vt non parum folijs, & radice responderere videtur, ita plurimum il-
lis astringendi viribus & oris fauciumq; vel tonsillarù vlcera iuuandi, defici, haud obicu-
rũ: & vehemèter amara, atq; nonnihil calida est:
Conizæ quiddam odore, & sapore testatur. Ma-
gna copia Lugduni etiam ad mœnia, & intra pó-
meria peninsulæ herbidis. amœnz, quã alluuit, &
dilectissimè duo nobilissima flumina; hinc Rho-
danus ab Oriente, illinc Arar ab Occidente, &
vocat vernaculè *Ameꝝ*. Caule plurimum sin-
gulari, rotundo, duriori, pallente, cubitũ alto:
in geniculis folia ima nonnulla emittente Morfus
Diaboli minora, aut Conizæ maioris, Bellidis,
nonnihil nigricantia. Flores in pusillis alis summis
lutei, circumati, Conizæ maiores, sed non absin-
thes, abeutes, maturo semine, in pappos: nec semè
dissimile Conizæ maioris. Radix brevis, tenuis,
albicans, fibrosa, minor, radice Succizæ aut Bel-
lidis par. Qualitates quales diximus, vsum
nescimus. Hanc tamen non displicuisse Gesne-
ro & Dalescampio, magni nominis medicis,
forte de facie dumtaxat, eandem iudicantibus certum.



Pulmonariã recentiori Britannicã hodie putatam; quia folio, effigie, floribus atq; muc. *Pulmonaria ara-*
co Symphiti est, rectius illic ponemus, & disquiremus, ecquid à Britannica vera discrepet. *Britannica.*

COCHLEARIA duplex, Britannica, & Batava.

NEQVÆ nescimus, etiã non paucis eruditissimis Britannicã verã visam fuisse, inferiori *Effig. Hist. Do-*
Germani; & præsertim Oceano finitimis Frisiz & Hollandiz frequētissimam, quã *89.*
Germani *Leffelkraut*, Belgii *Lepelecruyt*, id est, herbã Cochlearis siue Cochleariã, à foliorũ
circinata, cauãq; rotunditate cochlearis cõuexum intusq; superficiẽ exprimẽte, voca- *AN BRITAN-*
runt; Pliniquẽ *Britannicam, censuerunt*: quia eodem loci, iisdẽque dotibus comperi- *nica Plinij l.*
antur, quas Cæsaris milites trans Rhenum promotis castris aduersus luem illam, &
dentium, nervorũque noxam, edocti à Frisiz colonis experti sunt: vt idem fufius
narrat. Verũ cum hæc neutiq; illius Plinianæ descriptioni congruat, & per-
multæ aliæ sint plantæ aquaticæ, vt Nasturtia & Sion Cardamine eidem persimi-

les gustu , nec admodum dissimiles habitu, idem remediū dent , nullum inde certum suppetit argumentum, quo hanc Britannicam asseuerent. Sunt enim prima pul- lulatione oblonga Pyrolæ, aut Ophioglossi, mōxque crassiora, & vmblicata, euadunt, & nonnihil caua, Rorellæ Solis modo, sed magnitudine Soldanellæ, nonnihil ambitu angulosa, cochlear aliquantum præferta; Rosculus Cardamine albidis, in cauliculis pal- mum & sesquipalmum altis; per æstatem semen serie gemina, in vtriculis siliquosis con- ditum, Thlapsi minus fuscum, compressum: radix tenuis albicans, parum siccata, gustu acri, herbaceo, Nasturtij, aut Sisymbrii Cardamine.

COCHLEARIA Anglica, Atriplicis folia.

QVI Frisiam Cochleatiam antiquorum Britannicam profitentur, cōmodius suam opiūonem tuerentur, si scirent in Anglia ad amœnissimū Tamefis fluenta, quā Londinum præterlapsus est, etiāque in Bristoiæ sinu Occidui Oceani, quō allidunt per statā incrementā vnde, aliam esse congenerem, & similem illi, flore semine, & sapo- re; sed foliis non æquē vmblicatis, aut cochleatis, potius Atriplicem, aut Lapathio- lum effigiantibus, vnciam latis, inque sesquiunciz, aut vnciarum duarum longitudinē porrectis, crassis, densis, & succulentis, gustu & colore alterius Cochleariæ; Radice ma- iore, vt qualibet sui parte, minus tamen altringente, nec commoda ad ea quæ suæ Britan- nicæ Dioscorides attribuit: tametsi æquē vt superior, laudata ad Stomachacem, Scorbu- tum: quibus vehementer afflictos ægros aliquot huius ope intos vidimus, superiore Vtre.

PYROLA à Pyrisolis: LIMONIVM Germanicum.

Germa. Wald mangoß, à syluestri Betæ,
cui similis.

NON defuerunt etiam qui aliā istis similem, superiori, & inferiori Germaniis adeo- que vniuerso Septétrioni notā, Britannicam deuinarint: quōd esset foliis Betæ & lapa- thioi: obī dque Limonium hodie autumant, nomine etiam vindictatis perennis suffra- gante, wint ergruyn Germanicē, siue hyemis virorem sonante, quippe æterno virore penē atro aduersum Brumæ rugores perstat, montosis syluosis, & frigidis vdis, præ quibus te- pidos hortorum recessus, locāque vrbana, & mitiora viridaria aspernit; inque illis quasi in- uita ægrotat, ac tandem emoritur. Proinde Chirurgi, Germanici præsertim Theophrasti- ni Helueticj, & Lansqueneti, ad potiones vulnerarias sibi de Alpibus finitimis, aut mon- tosis lectam curant, principemq; vnam ē vulnerariis ænemis, & vulneribus ferruminan- dis addunt, Brabantis in Berchem Sylua Antuerpiæ contermina, aliisque Belgii syluosis, rarior Italis, & Gallis meridionalibus. Exigua de radice & tenera, subruffa, nonnihil ru- gosa, caulem dodrantalem & pedalem magnitudine promit, floribus in summo albis, & ē medio stamina, apicēque emittentibus, odoris Lili Conuallii haud disparibus: & in imo compluria quina, septena, octonāue folia, rotundiora, minora multō Betæ, Pyro pro- piora, nigriora, viridiora, non secus ac cunctæ partes siccitatis, & alstrictionis vehemē- tissimæ, euidentis frige factionis. Vnde non defunt coniecturæ quibus sententiam Li- monij foueant Docti nonnulli, qui illud prius *Beben* descriptum non norunt; propterea quia minus in pratibus, aut littoribus herbis, totius Oceani Germanici, aut Anglici re- peritur.

Λιμόνιον. LIMONIVM.

Effig. Martius.
980.

HERBIVSVIROR, pratensēque, & palustres natales Limonio nomen dederunt; quasi tu pratensē dicas herbā, aut cū Plinio Syluestre pratensē Blitū, huius quippe etiam videtur, aut species, aut perquā affinis nigræ Betæ, quā esu etiam siliere aluū Dio- sco. auctor est. Verūm recentiorū sedulitas complures huic descriptioni aptauit pratenses pallustresque plantas, forte non incitē: tamen nulli congruit magis Limonij & nomen &

& notio, quam isti pratenſi & maritimo recepto: cui folia ſunt Betæ nigræ magis affinia: Senem copioſum, oblongum, ruſſeſcens ex cæruleo: flores purpurei, cærulei coloris tenaces: caules tenues, radixq; rubeſcunt, magnitudine Lapathi acuti, cui totus accedit, & guſtu ſubſtringunt, vnde Pharmacopœis anſa porrecta, vt Behen rubrū nuncuparint, & qui vñum Lugdunum duxiſſent, alijs quorum in patria, & præ pedibus erat, quaſi rarum non paruo pretio & noſtro riſu diſtraxerint, vt alias factum diximus, in radice Hydrolapathi. Non niſi locis herbidis, & vdis maritimis prætis, vidimus, vt Adriaticis & Norbonenſibus littoribus vbi maxima copia. Hic magis vt Behen ridemus, quam recenſemus: tantum indagare volumus, quid cæteris diſcreparet: quæ internotiones, ſunt in re herbaria multò vtiliſſimæ.

PARVVM LIMONIVM *Norbonenſe, Oleæ folium.*

HVI c alterum proſum ſimile, ſed minus multò, inter ſalebrola littora, & rupes montis Ceti, & alibi Norbonæ, & GalloProuinciæ ſaxoſis oritur frequẽs, quod Empetri ſeu fœniculi marini ſociatur lubepſ, folijs minoribus Oleæ, aut Myrthi paribus, humi radici proximis: circũ pedales caules, & cauliculos graciles inflexos, cæruleis muſcoſis floribus ſuperioris non diſſimilibus onuſtos, folia lōgeminora fœniculum Marinum, ſiue Empetrum ſatis exprimunt.



Marthioli Secundum LIMONIUM.

DVO namq; cum appinxerit, nihil diſtingit, ac ne quidem monuit, neutrumnẽ, an v-*Marb. 981.*trum eſſet verum: ſed quaſi rerum neſcius, ne verbo quidem explicat: & tamen certò doctis conſtat ſecundi ab illo deſcripti, flores non ita paſſim videri inter multa millena plantarum.

τριπόλιον. *Littorum* TRIPOLIUM.

FERVN t ſic vocatum à ter, ſingula die, mutato ſorum colore, quod quidem fieri poſſe equidem iam lubet credere, qui videamus è naturæ Officina multò mirabiliora euenire: an verò fiat, equidem neſcimus: illud ſcimus, in Maris Mediterranei, & Occidui vniuerſi penè littoribus, & fluminum oſtijs: plantam copioſe prouenire, non ita ſolijs aſimilem Limonio primo: cæterò qui Tripolio exquisitè congruentem, quæ non quidẽ ternā coloris interdiu mutuationẽ experiatur: ſed quia duplicis eſt ſloris, nempe lutei, & purpurei in Phœniceū, interdum & cæruleum vergētis, lutea foliola radiatim aſita ſu-*An ſit Damaſonum, Phlegmaceum & Chelidonium* pernè deſuete primum ſolita, admodum ſtudioſe obſeruauimus, partim verò introſpectibus albidis, & purpureis ſuperſtitibus, quæ plebeculæ opinionẽ faciūt, ter die mutati coloris: quod idem nonnullis ſtirpiū noſtratiū alio cōtingere modo, iamdiu obſeruauimus. Scatent hac Norbonica, & Anglica littora, & fluminū crepidines, quas reſluxus, & Maris eſtus, inundant vbi ſermẽ nulla alia herba comparet, folijs Glaſti aut Limonij, minoribus, dẽſis, leuib; ſuſcis, craſſis, circa caules ſeſquipedales & ſeſquicubitales in ſummo ramulos diuiſos, multos herbæ Doræ nō magnitudine, ſed nōnulla ſimilitudine, radice etiā craſſa, fibrōſa, ſtores medijs ſubterq; lutej & ambitu purpurej perelegātes, vt plātavni uerſa multũ Aſteri Attico mōtano ſimilis ſlorū exortu & eſſigie, vt latius monuim' eap.*Macell. empi?*

de Aſtere Attico & alibi : In Turbith diximus eſſe Serapionis Turbith. Radix depaſſa
fibris craſſa, non tamen aluum ciet decocto & ſucco pota, nec apud nos Gummofa.

Norbonenſium DOREA quaſi aurea, quam perperam DORIAM vocant,
folijs Limoniij aut Rurmicis, flore luteo Tripolij, aut Iacoba : an Thea-
phaſti PANAX Chironium & Plinij PHAR-
NACEVM?

NEVTIQVAM Doriz duci tiremum claſſis Gallicæ, & Imperatoriz præfecto, qua
ſi exoticæ huius reptæz laudem verè aſſerunt Herbarij quidam: cum hæc ſit Gal-
lo Prouinciæ & Norbonæ amnibus non admodum rapidis, & iſdem etiam natalibus ori-
unda, quibus Limoni-
um, cuius multa ſimi-
lia habet, & inde in
hortos Belgij & An-
gliz tranſlata fuit, vbi
etiam hæc æſtate, Lō-
dini Morgano noſtro
creuit: perquam pro-
cera & elegans ſepte-
num & octonum cu-
bitorum ſcapo recto:
radix quam pro ſtir-
pis magnitudine mi-
nor, maximam Helle-
bori albi æquat radi-
cem: cui etiam com-
pluribus ſilamētis, re-
cta proluxa queſparſis,
& habitu toto ſimilis
eſt: à qua, & reliquo
caule mox ſupernè
ſurritur numerofa
ſoboles foliorum, Hy-
drolapathi longitudi-
ne, craſſis & oblique
extantibus purpuraſ-
cētibus neruis trāſuer-
ſim: & quæ valde an-
guſta in imo ſunt, pal-
ma latitudinē, ſed me-
dia ſui partē æquant,
viore intenſo, rigida,
& craſſa vt Limoniij,
aut Tripolij præſertim
in ſummo caule, qui
procero homine pro-
cerior eſt, rotundus,
craſſus digitū, Lapathi modo in ſummo turiones habet variz lōgitudinis, quibus flores
Senecionis aut Tripolij marini, in pappos abeuntibus. Sapor, odor, radici & folijs aroma-
tus & medicatus Angelicæ Syl. & nō nihil nitroſi, minimè acris. Plurimum hac vtūtur vul-
nerarij cuſtores, plurimiq; faciunt quidam Medici: quæ coniectura cæteris congruenti-
bus notis, magis perſuadet eſſe Theophraſti Chironium, Lapathi ſimile: aut ſanè vnum
eorum, quæ ad Theophraſtum Plinius retulit, vt Pharmaceum.



CONSOLIDA AUREA Nemorum, Limonii folio,
non Alisma montanica.

IN AURELIÆ Gallicæ syluosis densissimis
est quæ nostrò H. Moirano perelegans floruit
hoc mense Iunio Londini, radiatis multis in
ambitu foliolis, Nardi Montanæ, aut Doronici flo-
rem & colorem similem habentibus, foliis nigre
Betæ, aut potius Limonii, atrius virentibus, car-
nosius, aliquantum hirsutis, crassis, venosis; Doreæ
similibus, amplexis pedales Doronici cauliculos
binos, aut ternos, floribus radiatis Doronici, aut
Calendule, & concoloribus scitè pectinatim con-
sertis, & comisissis foliolis, aut equam pandantur,
elegantè spectaculo, radice multis filamentis al-
bidis sparsa in cespitem summum, Bellidis modo:
sapore Medicæ Consolidæ, tantillum acrimoniæ
prodentis, aut Herbæ Doreæ, cuius etiam vires &
quandam aromaticitatem æmulatur.



AUREA VIRGA Villanouani, Limonii, aut Cestri hortensis folij,
Doria floribus, aut Leucographis Plorij?

NE c minus celebris hæc apud vulnerarios Aurea Virga vocata, nec non multum si-
milis sapientioris multo frequentior & notior, præsertim Germaniæ, Franciæ, Ang-
liæ, atque cæteris Septemtrionalibus nemorosis & saltuosis opacis, vbi multo maxima
copia. Causam gracilem læuem, leniter rubentem, cubitalem & sesquicubitalem foliis
ambientibus immixta latioribus, tenuibus, tantillè crenatis, Colti hortensis modo,
multo angustioribus, & reliquo carissimè multos in ramulos diuisus visitur, floribus cõser-
tim ornatos aureis Doriæ, vel Consolidæ Saraceniæ, in pappos dispersètib; radice fusca
fibrosa: superne rubella Colti hortensis. Coniæz semine, vi attingendo efficaci, sed siccã-
do multo efficaciorè, misum quantum calculo extergendo laudata, atque sanguini sisten-
do vltèribus vulnerib; coeundis; propter persuasum nonnullis hodie Leucographin
esse Plinii; qui tamen sibi notam non modo negat, sed ne lectam quidem apud quem-
piam autorem, miratur; quò (inquit) adeo esset utilis. Et Virgæ aureæ nulla vspiciã linea-
rum vestigia infant, quæ nominis argumento respondeant: vires autem non tam ad si-
stendum sanguinem intro compertas habemus, quam ad alios affectus admirabilem ex-
pèrti sumus.

Dodon. 108.

SOLIDAGO Saraceniæ.

CLAUDE Jungeræue, aut cõferruminare, vulneris labra, consolidare Barbari Chi-
rurgi dicunt, vnde hæc vocata Consolida, cognomento Saraceniæ; quod Turcæ
& Saraceni opinionem magnæ peritæ, in medicamentis vulnerariis præsertim, essent ap-
ud Europos assequuti. Et sine hæc est perquam accommodata renibus, hepati, intesti-
nis; vlcèratis, atq; dissolutis. Fors verò nihilo scius ad vulnera vtilissimã. Iisdem fermè
natalibus nemorosis, quibus Aurea Virga, sed magis vdis & depressis, apud Septemtrio-
nales: apud vero Meridionales, montosis vdis, inter Valerianas syluestres fruticat, è ra-
dice pluribus & erasioribus fibris capillata, caulem rectum erigit, trium, aut, quatuor
cubitum, rubellum, rotundum, cauum, secundum quem totum, folia Lysimachiz luteæ, aut A-
mygdali longiora, parum quid crenata: summis aliis & floribus palidis virgæ Auræ æmulatur

Dodon. 107.

L. i. j. in

in pappos etiam perduntur, vñ cum Coniæ semine. Vuluerariis in hortis viret.

AQUATICA Plantago foliis Betæ, aut Plantaginis
flore Gabi albi, Est. *ALISMIVM*, aut *potius*
ALISMA?

*German. Wasser wegrich.
Gallis. Plantain d'eau.
Belgis. water wegedye.
An. Water plantaine.*

Ve in sumaria.
QUÏSTAM possit interpretari dictum *ἄλσμα*, quia in aquis nasceretur & iactaretur, siquidem *ἄλσμα* etiam apud Dioscoridem Maris est alusio, atque iactatio, qualis vulgari aquatica Plantagini contigit. Sed enim Recentiorum satagentia maluit quippiam diuinare, quàm quod certius erat sequi, aut tantisper retinere, dum quid melius obuium haberet. Itaque aquatica Plantagine contempta intruserunt Bisolium, seu Ophrin alii, alii verò Lumbini, nonnulli Saponar am; quidam Calceolum Maris vocatum, est qui Epipactidem Hellebori foliis, ac non nemo Commentator, sed Musis plane ignotis Botanici, quæ se yti nos quæruntur delusas, quasi præstigiator quidam, visus aliquid (fastiditis cæterorū iudicijs) & reiecto Alismate suffecisse, nihil tādē nisi mutā plantæ umbrā, id est picturā plantæ indicte, nescitur cuius, reliquit nobis hiātibus, atq; aliquid saltē noui, si non veri, audiēdi auidis, & repēte se subduxit. Cui autē animo fuerit, hæc omnes stirpēs de vērīs cunctis notis & accurata collatione expendere, nullā non poculā Damasonū delinuatione literaria Diosc, tū verò & natura, & facultate aēdi abesse, præterquā vñ istā aquaticā Plantaginē vocatā, quæ minus istis morosulis placet, quia fortē Græca litera nonnihil labis, aut hiatus perpessa est, veluti vbi *συνετρα* id est, angustiora folia habētur, idē potuit esse significatus, & vocalæ permutatio; cuiusmodi in Helenio, Meo, alijsq; nō paucis. Quin locus aquaticis, quorū indigenā facit hanc Plantaginē, nusquā gentiū aliā videas plantā, quæ quicquā ferē aut vultus, aut viriū expleat: vires si quidē perquā congruunt ferē omnes, verū Galenus qui legisset, radices huius acres eōq; ædemata discutere; suo more nōnihil Dioscorid. tacitē aduersatur: de cætero verò illi assentitur, sēque reliquarū facultatum, vt frangendi calculi, periculum fecisse testatur: eōque non acrimoniz, sed abstersioni, calculi expulsionem acceptam fert, quæ de radice verū esse experimento & ipsi scimus, equidē m dius quā Plantagina, cuius folia, & radices similes habet, quæ cōferuntur Helleboro; ac ē foliis etiam quæ *καλμύνα* *ἐκ γίνε* id est, deorsum versus reflexa, vti huius non rarō sunt; *καλμύνα* *λεπτός ἀπλός*, aut vt quidā doctus legit *καλμύνα ἀπλός*, nō *ἀπλός*, sed *ἀπλός*, id est caules pluralit̄ numero, tennes seu graciles, teneros, cubitū altos: Sic etiā sunt huius *ἐχάρ* *κατάλια* *θύρσοι* *ἰατρ* habens Thyrsi speciei capitula, cuiusmodi sanē habet, nondūm exolicatis, egressusue floribus, pusillos rotundos acinulos, Perficariz modo. Tandem *ἐνθ* *λεπτά* *καὶ λευκά καὶ* *Quidā βοτάνων* *ἴσχυε* flores tennes, albidos, & pallentes adeo congruunt, vt vel hac nota, nulli ignota esse debeat: quæ in nullam cæterarum prorsum superius propositarum, conueniunt.

Quidā βοτάνων *ἴσχυε* flores tennes, albidos, & pallentes adeo congruunt, vt vel hac nota, nulli ignota esse debeat: quæ in nullam cæterarum prorsum superius propositarum, conueniunt.

PISTANA Magonis, sine Plinii, *SAGITTARIA*
aquatica: an. *Stæbe famina?*

Matheo. effigie.
1138.

PERMVLTIIS hæc annibus ac leniter labentibus in Italia, Gallia, Germaniā, & Angliā, subter aquas ē fundo vadoso, radice multum capillosa, & proluxa, albida, nonnullis oblongis fibris crassius & bulbosis adnatis, pediculos prægrandes, triquetros viridantes glabros exerit: singulos singulo folio donatos triquetro, vtrinque pinuato, reductus latēribus inque mucronem deficientibus, & prorsum harundinem cuspidatam effigiantibus, cauli seliquicubitali medio læui cauo, molli, ternæ aut quaternæ pilulæ echinatæ Vnedonis, aut Ricini nōn dissimiles, aut Carici, quibus affinis videtur post florum delapsū, qui terna fœtura, prodeunt, totidēque foliolis constant cædidis, ē medio pauca stamina emittentibus, Maio & Iunio in Anglia prope Oxonia

nium, ponē moenia, in amoenissimis illic residibus, sed lymphidissimis aquis: etiam Londini ad arcis Regiæ vallum, & in Tameſis crepidinibus palluſoſis guſtu aſtringente: ſicco, non ingrato.

SAGITTA Minor.

Varia. **N**O ſecus atque a quatica Plantago, interdū, multò anguſtiora ſolis, & acutioribus viſitur: ſic hæc reperitur aliſ acutioribus, longioribus, latioribuſque ſoliſ, magis vtrinque ex hauſſis, acutioribuſcuſpidatis, tota cæterū minor. Matheo. effigie. 1139.

BIFOLIUM NON EST ALISMA,

videtur Ophris Plani:

ET hæc quod eſſet ſoliſ Plantagineiſ, lociſque humientibuſ familiaris, opinionem Damafonii quibuſdam fecit: aliſ, & quidē aptiſ, Miniana Ophris dicta fuit; nō quia ſuperciliſ fucandiſ, aut lenocinio apta comperta hætenuſ ſit, ſed à binis vtriſque ſoliſ vnde ſuppliat, id eſt, Biſolum dicit Germania, vbi ſyluoſiſ in pratiſ, & vdiſ frigidioniſ plurima, caule rotundo, glabro ſeſquipalmari, cuiuſ ab imo duo ſibi vtrinſque vnum ex aduerſo ſurſurguntur ſolia Orchid, & Plantaginiſ aquaticæ, viridantiæ, & ſecundum longitudinem neruuliſ intexta; deinde à medio ſermē, ſummo tenuſ flores ſunt deinceps, vtrinſque gemina ſerie, ex pallido herbaceiſ, muſcæ, aut volucellæ pluſmiſ exutæ, nō multum ab Orchid diuerſi; radice huc & illuc multiſ fibrilſ ſparſa, facultate nec aſtringente, vt ſit Damafonium, tametſi alia dote vulneribuſ & fracturiſ proſpicua ſit, & Aliſma & Ophrid aliquantūm adumbret, neutra tamen aſſeri poteſt.

Μορίφυλλον, RECENTIORVM.

OR T V Biſolii ſoliſque Plantagineſ eſt, etiam Einbladi, ſue vniſolium Germanorum nulli opaco luco, vel nemori non occurrenſ, per Maſum ſoſculos promit albiduſ, Galii & ſimiliter odor, vnde acinuli pallidi rotundi rubelli, dum maturuerint, guſtu amaro & ingrato, ſed facultate ad neruorum ſarctuſ eximia. Folium vnum per initia in imo, deinde ſemine iam perfectu, aliud ſe prodit ſolium minuſ in ſummo; vtrūq; Plantagineum & neruuliſ donatuſ eſt, ſuperne acutiſ, & nonnihil ad volubilem accedentiſ; cætera proſum ſimilia Lilio Conuallio dicto, antiquiſ nō memorata: tranſuerſim radix graciliſ geniculata excurrit.

Recentiorum, CALCEOLVS Maria, ſue

{Germa. Jauernſchub.

{Belgiſ. Brouwen ſchoen, & papen ſchoen.

PR T S C T etiam præterita videtur illa ſloriſ larua perquam ſpectabiliſ, etiam Plantagineiſ ſoliſ, aut Biſolii, quam nonnulli Aliſma opinati ſunt, vulguſ Septemtrionalium, *Weyer brouwen ſchoen, vel papen ſchoen*, id eſt, Virginis calceum, vel Sacerdotiſ crepidam vocitat, à ſloriſ effigie, quæ quatuor conſtat ſoliſ dilutè purpurantibuſ, & rubentibuſ, ſui è medio promentibuſ vtriculum quandam purpurenm, intuſ vacuum, rotundum Fuci, aut Aſyloniſ cadauer, vel Vnedoniæ caliculuſ ſlorum nonnihil reſerens, ſed ſuperne, aut latere vno patulum, inſtar crepidæ ſæ patulæ, quæ inferitur peſ, ſoliſ Plantaginiſ, aut Aliſmatiſ in longitudinem venoſiſ; radice tranſuerſa, nec altè depacta, nec multū fibroſa. In Heluetia & Oenoponti finitimiſ Alpinis opaciſ, habuimur.

Effigie. Dod. de ſto: 77.

ἀπρυλασα PLANTAGO latifolia leuſ.

{Germa. Wegerich.

{Ital. Plantagine.

{Galliſ. Plantain.

{An. Plantayne.

Liii.

Va-

VELUTI Ophioglosson, Cynoglosson, sic Arneglosson, quasi Agniam tu dicas ligum, vocarunt Plantaginem Graeci: ab omni memoria peruagata notionis, ex utilitate & feracitate vbiuis gentium penè immensa, cuius varietates & nomenclaturae, superiorum magnitudo, & modus, diuersas constituit.

MAIOR LATI-FOLIA.

QUAMQUE latifolia maiorue Plantago, nulli negata regioni rotundioribus est foliis, & sui medio plenioribus, latioribus, humi accumbatibus, è radice lateratim fibrosa, candida, & in medio praecisa, siue mutilata, Morfus Diaboli fermè modo: floribus spicatis, caudicellas murum imitantibus, obscurè purpureis & pullis: Semine Portulacae pusillo, fusco, aut rubigineo.

PLANTAGO Itcana.

CVI verò folia incana superficie pubent, rigidiora, crassiora, inque ambitum humi neruulis magis extantibus refracta: radix crassior, longior, minusque fibrata, rectoribus, altioribus cauliculis, floribus brevioribus, sed magis sparsis & speciosis, albidis caudatis, Iunio & Iulio defluentibus.

PLANTAGO Rosea.

QUADAM autem voluptatis ergò in hortis Belgicis; & Anglis colitur, merita quæ posteritati scripto, & icone innotescat: Ei omnia Plantagini maioris similia, præterquam cauliculus summus, eleganti ambitu, multis foliolis sibi æqua serie mutuo incumbentibus, atque sensim in fastigium cœuntibus, vbi quasi imbricatum, squammatimue sese decussantia folia, umbellam elegantem, quasi florem constituunt herbidum, vti in quadam specie Primulæ Veris ferme cernere est. Semen è medijs foliorum interstitiis exilit, sed priori simile.



PLANTAGO Quinque Neruia, Lanceola,

Germa. Spitzger wegrich.

Belg. Bontridden.

An. Ribbe Worte.

Euschi, ico. 23.

QUINQUENERVIAM siue *πεντάριον* vocarunt hanc, cuius folia neruuli quinni percurrunt, nonnullis raris per ambitum denticulis, angustiora, rigidiora reductiora, strigine lateribus & mucronata, vnde Lanceolam vocant Barbari. Radix, rotundior, breuior, pluribus capillamentis depacta, emittit iuncea angulosos cauliculos, floribus albidis stipatos, in glomerosis & breuioribus spicis. Siccior est hæc, & commendatior dote ad vulnerarias potiones, vnguenta, & hemids: nec minus vbiq; obuia cæteris.

PLANTAGO Marina.

Dodo, 7. com. 70.

ALIAM Plantaginem putant, Marinam quandam herbulam, folijs crebribus angustis, exilibus, Porraceis, tum colore, tum consistentia; Etsi sæpe littoreis Norbonæ, & Angliæ visa & animaduersa, nullidum certò quænam sit asseuerare liceat; nulli tamè similior umbellis, quam Plantagini, aut Coronopo.

POTAMOGETON, siue Fontalis, & spicata.

saxatilis. Gal. Esfy de aque.

NON solum fluuiorum est hæc vicina, vt eius nomenclatura sonat, sed etiam alumna stagnantium lacustriumque & torpentium aquarum, aut fegnus labentium, earum superficie strata, quasi humo viseretur, folijs Plantaginis aquaticæ, aut Betæ minoribus, aut Persicariæ, duriusculis, nervosis, in pediculis à multis flexilibus geniculatis cauliculis caducis, quibus spicati insunt flores Bistortæ, aut Persicariæ similes, obsoleta purpura Iunio & Iulio. Radice flexuosa anfractu excurrit è geniculis, multas propagans fibras, trans aquam fundo immerfas, è quo alimentum fugit, vt in Malabatro statim dicitur: gustu astringente siccante.

Noltrate FOLIUM, MALABATRYM est.

NIL lubet aut licet asserere de Malabatro antiquorum, quando ex eorum monumentis, Dioscorides prodidit sine radice innatare paludibus: cum tamen nullo vspiam angulo totius Indix illius, quæ nostræ ætati multo notior est, quam illis fuerit sua Græcia, comparuit hætenus istud folium, quod nec expressit satis Dioscorides: vnde gemina hæsitandi occasio, primum notumne habuerit: deinde qui posuit fieri, vllum vt sit folium non modo sine caulis adiunículo, sed etiam sine radice, id est, sine ore: & tamen solitum sit filo trajici, quia odor, magnum, crassum, & humentis naturæ: id eo solitum filo transui ad siccandum. Quare satius sit de illo fateri nos nescire quam de Priscis minus bene sentire, aut à nuperis parum gratiæ inire. Illi namque adeo laxa notione rem signarunt, vt quid capias, nescias: & hi dum vt cumulo fidem faciant, autoritates acervant, plus potè quærendum relinquunt, nosque inopes inter ignotas opes deferunt. Nam quid obstat quò minus vnū sit è tam multis, præsertim quatuor nobilioribus, illud Malabatrum imitantibus. Quod sit quidem verum, sed eius ortus & natales aliquantum deprauatè tradatur, vt in Ægarico videre est. Quare id sanè fuit istud nostrate Malabatrum, iamdiu Arabibus cognitum & hodie Italici medicis vsu receptum, non modo quia in Malabar Indix regione cognomine oritur, sed etiam quod propter eximias vires, plus proportionis habet cum plantis aquaticis, quam illa folia Cinnamonii, aut Caryophylli, quibus folium laurinum ferè est. At illud folium crassiusculum cuiusmodi Nymphææ est: fibre verò secundum dorsum longitudinem ductæ, cuiusmodi Potamogetoni, qui propter figuræ & natalitium similitudinem, nonnullis inepè folium putabatur: Nobis secus, cum huius folia apud Anguillaram & alios harum rerum consultissimos, non multis abhinc annis vidissemus, quibus adhuc hærebant lignæ pedicelli: & quasi surculi è ramis cfracti (quin potius integros ramos meminimus). Cinnamonii autè folio & Caryophyllis facies ferè eadè, nitidus læuor, aromaticus, suauissimusque odor. Temperamentum, crasis, modus & vsus non ita disparia sunt, & halitum commendant omnia vt Dioscorides Malabatro attribuit, de quibus commodius alibi. Obijcient literatores nobis Dioscoridis verba. FOLIUM AQVIS INNATANS SINE RADICE. An vllum folium, aut oriri, aut viuere sine radice, id est, sine ore, queat, quilibet nouit: nam Lenticula, Sempervinum, & etiam Muha, seu Opontia, aut radicem habent, aut quippiam radicis loco. Quin & Lenticule plantarum minivæ, nec radicellæ suæ desunt, & illis subsunt quædam terræ sordes & quisquilæ, quibus aluntur & fulciuntur.

γέντιανη GENTIANA maior.

{ Germ. Gentziam, Bitter Wetz.
Belgiæ } Gentiane & Felworte.
Ang.
Gall. Gentiane.
Ita. Gentiana.

VSUS & celebritatis notissimæ à Gentio rege Gentiana Illyrica, Helleboro albo folijs & natalibus adeo proxima, vt minus exercitatum eminus eludat: uti nos admodum inuenes qui defessi & potaturi, cum in poculum vino plenum radicem Gentianæ quam

Dod. 229.

Fusc. ico. 111.

ad

ad lassitudinem discutiendam, & appetitum excitandum commendare audissemus. Huius loco Hellebori radicem similitudine foliorum hallucinati immisimus, at penè perijimus. Putredinis hæc hostis infestissima, & veneni mors: Pesti adeò remedium præfens, vt non modo homini, sed etiam brutis incolumitatē tueatur: & amissam instauret, eoque solita Heluetia plebs istam cum flāmula porcis, & olim Monachis propinare, ne anima in vivo cadauere puteret.

Non nisi in montosis querenda sponte exiens Gentiana, quæ aliòqui repertu facilis: & frequens, planè fronde & aspectu ante quā floreat, similis Plantaginis, viridatā, aut rubetia folia, venosis striatum plicis extantibus, è radice crassā pedem longa, intus flaua, sapore perquam amaro: caulem cubitalem, quem summo ornant flores, verticillati, lutei, oblongis Saponarie caliculis, Leucij semine rufius, exilius, nec medulosum.

Gentiana MINOR, CRUCIATA, recentiorum.

{ Ger. Modelgeer & Speerenfuch.
{ Bel. Modelgeer.

Dod. 224.

HANC DOCTI non pauci Gentianæ speciem faciunt, facie & facultatibus ducti. Locis tamen non ita arduis, ac Gentiana, multa & passim oritur, vti propè Basileam, & Maconium Burgundiz Gallicæ, depressis collibus inter Chamædrin exuberans. Huius tamen non flores lutei, sed cærulei diluti, radix verò secundum longitudinem tripartitè aut quadripartitè fissa, vnde cruciatam putant, sed folijs potius crutiati cauli incumbentibus, nominis etymon debetur.

PNEVMONANTE Cordi. Gentiana minoris species.

Ger. Lungrublume.

Cordi. 162.

CRUTIATA similis aut eadem quæ in pratis etiam montosis oritur, folijs angustioribus, minorib. flore cæruleo Calathi modo, radice fibrosa, nequiquam incisa: à Mathiolo graphicè descripta. In Pedemontanis pratis propè Susani, & Riuoli multā.

GENTIANELLA CAMPANYLÆ FLORE

purpureo, Heluetia.

DVA: verò hic exhibemus, quia nondum descriptæ tamen elegantes sūt. Altera est radice exigua flauescente fibrosa, foliola conferta numerosa, imò caule ambiūt circinatim folijs Oleæ, aut Plātaginis similia, minimæ Gentianæ colore & modo. Cauliculo vix palmum alto, folijs fermè exnto, nisi proximè florem: vbi minuta bina ternæue visuntur. Purpurascit calathus figura & magnitudine, & colore Violæ Marianæ, valde quam amara. In Patauinis collibus & decliuibus, vbi vix capri solitæ sunt etiamq; in Heluetia.



GENTIANA minima.

MINIMA quæ omnium speciosissima in montibus arduis fruticat, Centaurij minoris modo, quem vtcumq; refert, plurima in cellis verticibus montium qui Dannubio in Sep-

Septentrionem, Orientalem, & Athesi rapido in Italiam præcipitante originem dant; prope lacustres voragine, & montem Nicolai, pusilla tota, palmo procerior, foliolis, & radice Centaurei minoris, multo minoribus, & modo, ex internodiis geminatim oriuntur: & cauliculos exiles stipant; partim ab imo, partimque medio exortos, quorum summis caliculus foliaceus Caryophylleæ forma, & flosculus cæruleus, cælesti atque incomparabili purpura. Amarissima & hæc, vulnerebus commendata, & idcirco consensu cursorum Gentianella dicta, nobis aliqui Centaureo minori, aut eadem, aut æmula.



Ἑλέβορος λευκός. *HELLEBORVM ALBVM, sine Veratrum.*

{	<i>Germa.</i> Weiß Stiefwurz.	<i>Hisp.</i> Yerua de baleste.
	<i>Gallis.</i> Helleboire blanc.	
	<i>Italis.</i> Helleboro bianco.	
	<i>Belgiis.</i> wit Stieffwurt.	

V D A M O N T I V M Alpiūque iuga, huius sunt sceracissima, præsertim quæ frigidissima, celsa, & prætesia, quibus Gætiana maior gaudet; vti alibi Hellebori stipatu & cōuictu, cui adeo similis folia eminus intuēti, vt non raro oculis illudat: præsertim cum æstate cætero prosum gramine arefacto, vel manso, vtrique pecus præ amarore (puta) parcat. Radix quamplurimis sparsa humi fibris, quæ supernè medio quasi trunco, vel nodulo collectæ sunt, non absimiles Plantaginis, sed maiores, cui etiam folia multum accedunt, tametsi maiora, rigidiora, striatisque secundum longitudinem liris acutioribus, & media cæsia eunte linea, mutuò implexu, quasi tunicæ conuoluta, humi strata, partimque amplexa caulem concavum, glabrum succulentum bipedale, è cuius medio, summo tenus, alternis pediculis surrecti florū thyrsi hapsiue, Botrys modo, racemosis floribus onusti, colore albicante visuntur. Quibusdam in hortis Belgicis videre est, floribus purpureis: Maximi atque certissimi vsus, herba vniuersæ Europæ fatis nota, vulgo *Veratrum*.

EPIPACTIS, sine HELLEBORINE.

N O N inde quia similis foret Helleboro videtur Epipactis dicta Helleborine, sed propterea quod Helleboris misceretur, & iisdem locis nasceretur, foretque: quasi frenum impressioni vehementissimæ pharmaci Helleborati: eoque Dioscorides ad venenata commendat, iecorique amicum ait: nōque vtri Helleboro similem fecerit constat, imo ne fecisse quidem, non magis quam de neutra Sesamoide. Eapropter quid hic Commentator harioletur, qui volet videat, & rideat. Eius nos commentitiam Helleborinē, quam è Tragio mutuatus fuit, nec talem esse docuit, commodiori loco ponemus.

Nec alia de re Helleborinæ vocata fuit, quam quod illius semine Hellebori albo addito vomitus commodus cieretur, vti de verbis Theophrasti liquet Libr. 9 Capit vndecimo, vbi Helleborinem istius commodi vocat herbulam, vnde nonnulli nostratem Herniariā autumabant. Semen cuius, succus, & folia, hepatis obstructioni & renum lapillis, magna dote pollet: quin si quid huc facit, minus comperta qualitate sternutamenta ciet foliorum pollen. Quod fieri potuit, vt mixto cum Helleboro fuerit stimuli vice ad facultatē proritandam: quemadmodum proditum est, antiquos solitos miscere salem & acetum, quo celerius exigeretur Helleborus.

*Herniaria. Mil-
leriana. Centa-
urea.*

EPI.

AT Recentiores nominis sono illeſti, putarunt herbulam Helleboro facie ſimilem interpretandum, eoque duplicem vtrique nimirũ albo, & nigro Helleboro ſuam affinxerunt: qui ſi quam præcipites ad aſſerendum, tam ſeduli ad inueſtigandum fuiſſent, habuiſſent ex Theophræſt. quo ſe ab errore vindicaſſent: Is quippe Lib 9. Cap. 11. huius ſemen Helleboriſmiſ propotiſmiſque addi ſolitum ait, quali calcar futurum vomitorio medicamento, vocatque herbulam *Βοτάνη*, quare vti dudum monuimus: Helleborine quaſi veratrulũ, nõ perinde vt Cardamine à Cardamo ſimili, dicta fuit, ſed Epithymũ, & Seſamoidem, non propter ſimilitudinem, ſed propter uſum, Helleborum vocitarunt præſci. Et Senenſis arbiter, decernit nobis Epipactidẽ pictam, nec deſcriptam; vt ſolet innumeris locis, vtpote aliunde mutuatus, nec ſtirpem conſpicatus: at ſicubi fuerit naſtus braſſicæ aut vrticæ deſcribendas, vel alienas inuaſerit deliniationes, enecat verbis, aut Crambe re cocta. Sed rariores, & cognitu digniores, pictori mandat; & illico elogio illo centies inculcato addit, *Eſt ſimilis proſus nullis reclamantibus notis*: ſubditq; non ad noſtram cognitionem, ſed ad ſui oſtentationem, non quidem ſe ſcire num Helleborine ſit, ſed tamen Epipactida eſſe: ridiculè perinde ac ſi dicat quis, incertum eſſe num ſit Helleborum, ſed tamen certum eſſe Veratrum. Quin etſi quis largiatur illud, nimirum propter ſimilitudinem ſuperius collatã, Dioſ. intellectum fuiſſe Helleborum, quis diuinabit? cum nè nunc qui dem vti docuimus, Hellebori nigri uſquequãque deſcriptio congruat. Verũ nos quo conſulamur cognitionis audis vtrãmque; recentiorum ſubdemus, albo affine hic, alteram commodius nigro Helleboro inferius.

HELLEBORINE siue EPIPACTIS,

Recentiorum & Belgarum.

Germa. & Belgis, *wilde wit Gieskruid.*

Dod. Hiſt 235.

MVLLO propius ſaltem facie ad album Helleborum accedit, quæ Galliz, Belgicæque locis, nemoroſis, vmbroſis, prouenit: caulẽ rectum, pedalem, inuolutũ Arnogloſſi, vel albi Hellebori foliis anguſtioribus, floribus ſummũ conueſſentibus, albidis, vel purpura obſoleta, medio pertuſis, notisque partum luteis, partimque coccineis diſtinctis, cuiusmodi in Digitali interiore, quã etiam repræſentat. In ſiliquis ſemen puſillum Digitalis: Radice quã Hellebori albi fibris paucioribus, variè vagantibus, nigricantibus, duro libro, & amaro.

NARDVS CELTICA, Saluunca.

ITIDEM montofiſ iſſdem ſemẽ Gaudet Celtica, aut potius hodie nuncupanda Lyguſtica Nardus, nec Gentianelliſ admodum abſimiliſ foliũ aromaticitate, ipſoque habitu, quã *SELLEGA*, valleſi vernaculè quaſi Saluuncam dicunt: nec dubium quin ſit ea, quã Maroniſ verſus innuunt: *Puſicciſ humiliſ quantum Saluunca roſetis, Iudicio noſtro, tantum tibi cedit Amynta.* Puſilla nãmque herbula, aliquantum proſerpens, deinde ſe ſurrigens, cauliculo palmum & ſequipalium alto, ad quem imum folia ceſpites ſummos conſtant, exigua tenuia Gnaphalii montani, aut Gentianellæ minimæ, pallida & ſublutea, infernè anguſta, quã radicis ceruicis ſquaroſæ, aut ſquamuliſ tuniceis obſtæ, ſpicatim digeſtæ innituntur, ſubterque multæ fibræ, ſuſcæ, villoſæque propagines Afari odore, & modo in terram ſparguntur: acri, amaricante, aromatico Spicam Nardi ſpirante: in Genuenſibus, Lygurizque Alpinis ſterilibus, non procul Sauona vrbe, vnde Genuam lucelli cauſa ſerunt Coloni.



CEL-

MVLTRO elegantior, nec parum similior Gentianæ Cruciatæ folijs, alia nobis reperta est prope Cœnobium quoddam, inter Dei viridarium & Calcaris môtēs, in agro Narbonensi, magni & vulgati nominis. Radice est Valerianæ maioris, paulò minore, geniculis Doronici modo distincta, humi strata, acri sapore, erodente, aromatico & amaro, Nardi æmulo, folijs Saponariæ vulgaris flaccidis, ex flauo pallescentibus, senis, septennifue, Gentianellæ ad eò cognatis, vt primo intuitu eandem putes. Caulis cum maximus cubitum altus, mediocris sesquipalmum : flore radiato, aureo, Bupthalmi æmulo. Hanc Roudelletius Nardi Gallicæ speciem esse coniecit: tunc temporis cum Cœnobium fortè esset nobis hospitium in illis desitis locis, cuidam è lignipedum Canoniorum dysuria laboranti, & nostram opem obnixè poscenti, potiunculam ex huius Meiç radicibus decocto parandam iussimus, vrinæq; copiam eluimus.



HIRCVLVVS.

RARIOR multò Hirculus, quem nunquam nobis recens visum fatemur, & lubenter assentimur, gratiamq; habemus de illius assertione, stirpiù exoticarum peritissimo, Carolo Clusio, qui hunc nactus inter Spicæ Celticæ fasciculos, posteritati scitè patefecit, in suis è Garcia Lusitano Medico versionibus.

SAPONARIA vulg. folijs Plantaginis, aut Gentianæ, floribus OCIMOIDIS non est STRUTHIUM DIOSC. SIVE ARAB. CONDISI, de quo in Hippocrasso, & Hippo:

QUAMVIS permultæ plantæ etiãnum Struthia vocari queant, à facultate vsq; Lanæ proluendæ, & candidæ faciendæ, quod sesquialtera Græci dicebant: tamen nostram Saponariam non esse Antiquorum Struthium Theophrasti verba monent : esse quippe esculentum caulem, lanuginosum, & ferulaceum, nasci vbiq; Asiæ præsertim, spontè & cultam, saxosis & asperis, spinosam folio Oleæ inodorâ, seruine nullo: radice magna, quæ conditur ad proluendas, curandas, & emaculandas lanas: Deinde quia nunquã inoleuit, aut certè iãdiu exoleuit cõsuetudo apud nostros fullones, lanas radice aut sicco herbarum curandi, nescitur iam quodnam illud fuerit sesquialtera. Et sedula plebecula lotorum apud Belgas hodie, non herbis aut fuccis, sed Sapone, Lanæ primò carminatæ, Oleoq; aut Butyro delibutæ, candorem niueum, & sericeam molliem conciliat. Nonnulli conieciunt hodie Ocimoidem illam, quam Papauer spumeum etiã dicitur, quia sit folijs Oleæ, esse Struthium: verum abest à facultatibus, & plurimùm discrepat reliquis indicijs. Hæc verò vulgi Saponaria, quasi quis dicat lotricem, aut purgatricem, tametsi nitrosum extergendæ pressu remittat succum, emundandis pannis aptum, tamen non in asperis aut squalidis, sed secus herbidas amnium conualles, & depressos apricorum viderum margines fruticat : multis virgis crebrò genicatis, teretibus, gracilibus, cubitum, sesquicubitum surrectis, multis binis è geniculis stipantibus, folijsq; venosis, crassis, plumbis, Gentianæ cruciatæ dictæ, aut Plantaginis, horum reflexis, speciosis florum oblongis caliculis Lychnidis, aut floris Constantinopolitanj obsoletè purpurantibus, & albidis flaminulis egressis inter quina florum foliola: radicibus multum diuisis, & sparsis, diu durantibus, quando in hortis colitur Regionum Septentrionalium, vbi non perinde spontè obuia sit. Non igitur sit Arabum Condisi, si non sit Græcorum Struthium: quia hæc duo nomina, eandem designant plantam.

Dod. ice.

PEREGRINA voce Piperis cum vernacula apud Græcos ὑδαρ, conflatum nomen Hydropiperi fuit, seu tu dicas aquarum Piper: prouenit etenim ubiq; scrobibus aque stillantibus in herbidis vdis, caulibus innumerosis, inq; ramulos diuisi. Perfici fronde nigricante ex virore: id geniculis sinuq; foliorum & alarum flores Iunio, & Augusto permulti, albi & purpurascētes, caudatis spicis, racemosis Bistortæ, aut Potamogetonis, radicibus plurimum fibrosis: semen subnigricans, latiusculum, minutum acre Sinapi, aut Piperis sapore, ubiq; notissimū: Gallis *Cubrage* vocatū, vt cuius folia quæ quis podici (honos sit auribus) abstergendi causā affricuerit, inurāt rabiem chunibus, siue vt loquūtur Legulei, culo. Vnam hanc Parascelus ille ter maximus, per aquam frigidam traiectam, quibuslibet vicerum laniationibus, & laniationibus remedio summo calitis parato fore affirmat: Cui cum fidem habuisset nuper quidā amicus, dicebat illum Apollonij Thianzi apud Philostratum φιλομήδην, aut potius φιλομήδειαν furatum fuisse.

PERSICARIA *mitis*.Dod. ico. de
flor. 269.

ALTERA Dioscoridi, vt verisimile sit præterita, tantopere huic effigie, loco habitūq; toto cōuenit, vt neutra ab altera queas discernere, nisi sapore: qui planē facit, vt diuerse sint, nec eadem planē putentur: est namq; is frigidus, siccus, & nonnihil acidus: in folij superficie media nonnullæ maculæ conspiciuntur nigre.

CAPSICVM *καψικον* *Althæarj* siue *Caminum* Zingiber
Auicenna, *Calicutium* Recentiorib.Eff. Dod. 441.
442.

COEPIIT nostra memoria ista perpulchra planta adferri ex Goa, & Calcutijs oris in Europam, vbi Piperis vicem explet, & voluptati in hortis, pensilibusq; vasis apud Gallos, & Germanos est spectatori triplicis differentia, non tamen admodū magni discriminis, nisi fructu. Est enim caule quadrangulo, pedali, sesquipedali, fusco, sparso, folia in pedicellis habente Solani, aut Persicariæ, aut Amomi Pliniani: nigrioribus, acutioribus, horibus cādids, pusillis, Solani, vel Vincæ Peruinæ, exiguis foliolis, quorum cētrum tenet, asteriscus, herbidus, exiguus: deinde siliqua succrescit nitido virore & laeuore, per maturitatem rubidæ & miniatæ, purpureæ, oblonga, mucronata, crassiora, coriacea, cui insunt multa granula lata, compressa, ex luteo pallida: fuscula, & condimenta colore croceo, & gustu Pipereo commendat.

Varietas. { Vaginulis non disparibus siliquosis, sed minus crassis, longioribus accutioribusq; rostris, eandem planē, tamen ipsam in vasis alunt hanc.
Interdum & multo breuiores, rotundas, turbinatas, eodem semine prægnantes, Augusto & Septembri maturat siliquas.

BALSAMINA *femina*, *Persicifolia*.

ASCIVIT hæc peregrina vulneraria credita, eandem quam Balsamine Cucumerina nomenclationem, propter easdem facultates, & fructum nonnihil similem. Alioqui stipites crassi, turgentessq; succo, Mercurialis habitiores sūt, folia & facies admodum Persicariam vtrāvis referunt, quare etiam hanc Persicariam nonnulli dicunt: tamen non minus propter vires consimiles & vulnerarias, quales in Persicaria rectiores agnouerūt, dicta putari possit. Flores subter folia per intervalla penduli, purpurei, diluti, incærumulum vergētis, Delphinij Cōsolidæ effigie caudatæ, vel Nolime tāgere vocatæ, quæ etiam multum huic similis: pusilli fructus penduli, etiā sunt Augusto nuclei Pruni vtrināq; acuminari

nati similitudine, primū viridante, deinde luteolo, & foris scabro dehiscēte, per maturitatem se men eruū, aut Rapi elidente vix digitis summis tacto, ritu Noli me tangere herba.

PERSICARIA Silicosa, sive Noli me tangere.

INDIGENA hęc montium colliumque asperiorū Germanię, & Gallię Sabaudę, quam Belgę alunt frequens, vocantque vt Germani *Spincl Fraut*, quasi eruptricem siue salientē, aut subsalientē herbam, propter siliquā, quę teres, gracilis, lōga, pēdula Chelidonij, seminā parua, rotūda, Balsaminę fēminę claudit, quibus turget, simul ac tantillū tangitur in vultū proximi cuiusq; quasi impetu vindicabūda, & se tangi quęribūda excludit. Idcirco *Noli me tangere*, vulgus herbariorū vocat, qua nota & nomine notissima iamdiu. Folia, faciēsq; & virgulta Balsaminę, Mercurialē, & Amaranthū exprimit: quare cauendū ne quis Mercurialē putet, eamque in vsus eosdē legat, vt nonnulli hallucinati fecerunt: quippe venenatam quidam autumant, pręstareque exploratis, quam incerta hac vti monēt. Tametū alios ad effectus merito laudent.



RAPHANVS Syl: Officinis Francis, & Belgis.

LEPIDIVM *Aegineta*, folijs quāvis Laurinis maioribus floribus, racemosis Galij albi.

{ *Lepidium Peperitis.* Gal. Passerage.
Ang. Dittammer.
Germ. Pfefferkraut.
Belg. Pfeffercruyt.

QUAM potuimus aptē ab altero Pauli ex Dioscoride Lepidio minore, siue Cardamantice discreuimus istud pagina 77. ostendimusque multo vrentius esse, & efficacius illo Democratæ carminibus celebri. Perquam notum est istud regionibus calidis, & frigidis, vt Norbonę, Belgię, & Anglię, ad decliua riparum fruticare solitum, plebeculęque Raphanus syl. & *Passerage* vocatum, id est, extrema rabies, propter feruorem igneum, qui etiam testatur hanc legitimū Lepidiū: folijs namq; Laurinis, latoribus tantūlūm crenatis, ex pallido virentibus, Hyoscyami quadātenus lutei, aut Costi hortēsis, in flexilibus, ramosis virgis, cubitum & sesquicubitum altis: flores albidos muscosos, Iunio & Iulio edentibus, semēnque pusillum: perreptat subter humū radix, & quotannis noua pullulatione se reparat, ad ischiadicum dolorem efficacissima tusa, & axungia excepta.

Effig. Martius.
609.

Crassradice, RAPHANVS RUSTICANVS, Laparhii folio,
videtur MOLYBDENA Plinij.

Sinapi Persicum. *Germa. Meerrettich & Kern.*

POTESTHYDROPIPER dici etiam hęc, aquaticis, & substillis pratensibus fruticans, quam multi Lepidium Pauli, & Plinii dixerunt: vt cui sint folia latoria, circinata, serrata, longioraque Laurinis, & rigidiora, viciniora tamen M.ij. Hip-

Hippolapatho, à radice crassa longa, acrique tufa vefcendo in condimentis Sinapi fapore. Floribus albidis, Sinapi aut Brafficæ minoribus, in ramulis, fecundû quos harent filiquulæ Eriſimi, aut Rhaphani, cum quo ſimilitudinem quandam habet, eoque vocatus fuit Raphanus ruſticanus à Plebecula.

DENTARIA, vel Dentillaria RONDELLETII, & Norbonenſium, ÆGINETA LEPIDIUM iſidem putatum.

NEc abs re Lepidium quoppia fecerunt perelegantem iſtam plantam, Norbonenſes præceptores noſtri. Fruticat ea paſſim in Romano, & Moſpelliaco agro prope ſepes & ſata, radice lœgiuſcula, caule bicubitali, turionibus multiſida, folia ima maioria caulû iſtatis, Drabæ ritu incumbencia, puſillæ violæ modo. Floribus purpureis, dilutis, extremo caulû ambitui confertim aggeſtis, quibus deſluentibus, ſemina gemmeis, & vilofis hiriſutis, & aliquatun tenacibus pericarpis includuntur nigra, acri vniuerſa planta guſtu, & vrentis facultatis, qua tantopere pollet, vt etiam volæ manui vibicem callumue inurat furuum, aut plumbeum, vnde viros Doctos in opinione duxit Molibdenâ eſſe Plinii, aut Lepidium Æginetæ. Dentilariam, aut potius Dêtariam vulgus ſtudioſorum putabat vocatâ à Ronelletio, qui vt Pyrethris, aut ſimilibus vrentibus utebatur, ad rabidum dentium cruciatum placandum; etiâmq; in Balneis filius Regis ſapor.



HORTORYM Coſtus Caſſiani Baſis, Mentha folio, aut Lepidij.

{ Germ. ſtrauementum id eſt, Herba D. Mariz.
{ Gal. Coq.
{ Belgi. Balfeme, id eſt, Balfamum.

Offic. Mentha Græca, & Sarracenicæ.

Dodo. 175.

SCIMVS, & hanc quod ſeruido eſſet Coſti, aut Lepidij guſtu, à nonnullis Recetiorum Lepidium putatam, quam Mentham Græcam Pharmacopœi, & Sarracenicam quidam è libro πλεῖς δυνάμειν dicunt vtrique non abſque planſibili coniectura: Eſt enim folijs Lauri, ſed interdum maioribus, ſerratis, viridibus, pallentibus, molliuſculis, radice fibroſa, inſlexa, & ſummo ceſpite ſparſa, caule cubitali, floribus luteis Tanacetii: horis familiaris, & nota conſpicua amaritudine, ſeruoretamen non ſuperioribus inferior. Vulnetariam curſores Chirurgi, & mulierculæ citiſſimæ opis experimuntur: eoque Baume apud Gallos, id eſt, Balfamum vocitant.

BVLBOS A foliata, Officinarum BOLBANAC, LYNNARIA
Græca Recentiorum, non eſt ARMORACIA, ſine ſyl. RAPHANVS
Dioſcori. aut THLAſPI lat. folium Crætae:

vt è pagina 75. liquet.

CVm hæc in Alpibus, Galloprovinciæ conterminisq; Pedemontij oriatur, apud Flan- Dod. de flor. 26.
 dros verò Francos & Anglos tantum hortis colatur, rectius videntur Bolbanac dixisse
 Barbari, à radicibus bulbosis, esculētis, oblongis, crassis, longius porrectis, porosis qua-
 dantenus Asphodeli, aut Poroniz, sed minus protuberantibus, quam Græcam Lunariam,
 aut Violam latifoliam, nuperi quidam. Erutam enim è montibus Alpibus Galloprovinci-
 cæ & Pedemontij conterminis scimus, & indidem fortè colli in Flandria, Francia, & Ang-
 lia, radicibus exilioribus, staccidioribus minusq; protuberantibus, sed similibus & sparsis
 Asphodeli Lutei, aut Leucacanthæ Monspelliacæ, albidis prorsus carnosis, caules teretes,
 ramis multis donatos, foliaq; pauca prominentibus, oblonga, latiora multò quàm Violæ Ma-
 tronalis, virètia, in ambitu parum crenata, floribus, primo Vere, Dentillariz aut Violæ al-
 bæ purpureis, & subcæruleis, post quæ orbes siliquosi, aut foliacei oruntur, ex triplici
 quasi membranula cōpacti, pellucidi, semina quaterna aut quina complexi, media nempe
 dissipiente, candida cuticula sericea ipsa Lentis effigie semina, non secus atq; in Alyf-
 so cernitur, vnde P L I N I U S Brabantij id est, nummi florem vocant, & quidam Lu-
 nariam. Calido, acrisq; gustu est, præsertim semine, sed tamen radices acetarijs, vt Rapun-
 tia, manduntur, nec perinde sunt acres, vt Crateuz Thlaspi radices traduntur.

Varietas. { Non diu est cum, aliam vidimus siccam, huic non ita diuersam, duntaxat tota
 minor est, & Hymæ perennis virescit, durioribus caulibus, breuioribus, flori-
 bus dilutioribus, folijs aliquot non disparibus, radice rediuiua.

MATRONALIS Viola, aut Damascena.

{ Bel. Dames blommen & winter violen, id est, Hyberna viola.
 { Gal. Violas des Dames & Girofles des Dames, id est, Matronalis viola.

N E c consultius faciunt, qui istam similem illis plantam, Marinam violam, Damascen- Dod. de flor. 24.
 nam, & exoticam vocitant, cum in Nitiobrigum montosis & Veganij syluosis, eti-
 amq; Angliæ in pratis fruticet, vnde horti habuerunt: è radice fibrosa, densa, ampla fo-
 lijs est Drabæ, aut Erucæ, minus laciniosis, nigris, crebribus, ab imo caules rectos, cubita-
 les & sequicubitalis ambientibus Aprili, Maio, & Iunio, florum caliculos multos exca-
 dido purpureos, & rubellos edētib; Saponariz aut Dentariz: corniculi siliquarum Syna-
 pi sunt, vbi semen acre, fuscum, aut rufescens, & Erucam, Thlaspi, aut Rapunium gustu
 tota sapit, quibus idcirco affinis naturā putatur.

MEDIUM, anse MARIANA VIOLA?

M I N V S mirum etiā nūc Medium esse nullius aut ambiguz lectionis, cū codices &
 autores fuerint valde variz lectionis. Qui namq; cū vulgatis Dioscoridis codicibus, Effig. Hist. 129.
 & Plinianis, Iridis folia legebant, superioribus illam maritimam Iridē, cuius vt noue mē-
 tionem in Meo fecimus, & iconem, plenamq; descriptionē in Iride dedimus, statuebant:
 inter quos præceptor, & D. Aflātius, Callotus, atq; Dioscorides Barallius Monspelliæses.
 Sed nonnullæ notæ magnitudinis & figure, potius quam virium, refragari visa sunt. At
 candidissimus Gesnerus, & deinde Itatorum doctissimi nonnulli, qui alijs in codici-
 bus, & hos secutis Græcis authoribus Seridis folia haberent, iam plusquam octenium
 abhine monebant nos, Violam M^A R T A N A M dictam, vulgatissimam plantam, quam
 tamen postremo sibi notam seruitot Commētator Cortusij optimi munere gratulatur,
 Medium, vt si quæ alia planta referre, quorum lectioni & sententiæ nos eo libentius as-
 sentiebamur, quia Iridis syluestris nullius meminerit Dioscorides, nec syluestris folia
 à fatiua, nisi magnitudine diuersa sint, nonnulliq; Theophrastū negasse vllā Syluestre Iridē
 extare Matthiæolus scribāt. Seridis verò Syluestris nectipse atq; Dioscorides meminerint.
 Violæ autē Mariæ, & Mariæ dictæ à Belgis (qui muni elegantiæ flori causa, primi de-
 derunt Mariæ Hungariæ viragini illi Heroinæ bellicis fascinoribus, & incendijs nobili-
 tatæ) nostra etiam memoria, cultu hortensi flori calathis longè speciosissimis tantā mag-
 nitudinem

nitudinē assequitur, vt instar calycis aut poculi poturis voluptatis causa, vinū contineat. Sunt namq; nolæ oblongæ effigie, nonnullis laciniosis crenis, cærule hilari interdū purpura scēte, interdū dilutiore, & candicāte, emergentibus ab imo calyce, quibus reflexis, aut e-lapsis in ytriculi, & florū bali Rapūtio, aut Trachelio asimili claudūtur: triquetra numero sa femina Acetosa, colore, & parilitate. Bicubitales caules toti, & alæ hirsutæ, & hirtæ ab imo folia habent longiora, latiora, tunicis hirsuta, rigida minus quā Syluestris, quæ laciniosa est. Radix autem candida, tenera, esculenta palmum longa Rapūtij similitudine, vti semen & flores sed duplo maior, nec gustu multum dispari: siquidem in acetarijs Rapantij modo esitauimus verna quadragesima Belgicæ præsertim, & Couentrix Angliæ, vbi etiam in Syluosis quā plurimis enata, sed minor & strigosior, eò postea incrementi progreditur, cultu in hortis passim, vt longè maior adultior, suauiorq; edendo sit, Calidioribus Italiæ, & Galliæ inferiori infrequens, magis figura ad Medium quam facultatibus alludit, siquidem dulcis ac riuuscula minime altringens percipitur.

Επιπέτρον. *EPIMEDIUM.*

an *Epipetron* & *Epimetron* Plin?

*Æ*QUUM arduum statuere Epimedium quænam sit Planta, & an hodiè nostro orbi Europæo cognita. Quippe perpaucæ sunt plantæ caule donatæ, quin flores, aut quædam eorum rudimēta ædant, vti Filix, Ficus arbor, & alia nonnulla. Qua de nota si in hisce regionibus nasceretur, facilè cognosceretur Epimedium quod suspicamur, esse Epipetrum, vt Plinius legisse videtur Theophrasto memoratum libro 7. capite octauo (non vt vulgo legunt Epimetrum.) Siquidem saxis, & petris innasci affirmat Dioscorides. Cui si idem vsu venit hic atq; in Bechio, Dictamnō, Onosinate, sortè & Cynoglossō, iam facilius accedemus peritiorū Herbariorum sententiæ, quam non semel super Epimedio (atq; de hac eleganti, & noua quā pictam damus planta) rogauimus. Antequam in fœnicetijs inter cremia enatam sponte, non procul Pistoia, in Florētina præfectura vidissemus, virentem dono acceperamus à Ioanne Pomello Veneto Pharmacopœo non vulgaris peritiæ, ad Buccentoris symbolum, qui in hortis colebat, & alicunde è proximis Vincentiæ, aut Patavij agris habuerat. Hac etiam nos donauit clarissimus Bononiensis Doctor, & professor medicus Cæsar Odonus. Viticulus est quasi iuncea, non crassis, sed nitidis, albidis, prolixioribus, tenellis cubiti, & sesquicubiti exilibus nutratus, sparsis per summam singuli in ternos, quasi pediculos diuisis, in quibus summis quasi in alis multo tenerioribus ternis pedicellis, terna infunt folia, id est nouè, aut decem magnitudine, colore, leuore Hederaceo, sed teneriora, ad Theophrasti Libanotidè accedentia, auersa parte glauca vel albicantia, & extrema ora nonnullis denticellis spinosis serratim extantibus: radicem non vidimus, sed ab ipsdē auditione accepimus: iam tum defloruisse femēq; amisisse, virolo odore: & prolixis ambagibus radicem incuruari atq; in latera diffundi, subaltingentis, & siccantis gustus esse: etiam nunc postremū dum literis mandaremus nobis gustantibus folia multum amara, gustu feruè Chamælez percipiebantur, per quam rara nec nobis vsipiam, præterquam in Italia visa.



Et vna cum fructu
et floribus sponte
prodigere.

Epipetrum.

Τραχήλειον. *TRACHELIVM*, sine *Cernicaria* & *Vunleria*.

{ *Bele. & Gæ.* } *Dall. kraut.*

DVÆ sunt præterea quæ non parum folijs, & qualitatibus illas designant, veteribus *Eff. Dod. 127.*
 indiçtz, nostra memoria nuncupatz Tracheliũ, Germanis, *Balkkraut*, siue Ceruicariæ, à ceruicibus colliq; partibus vicinis, internis & externis, quibus tumefactis, & vice-
 ratis multum opitulantur: vnde Vuularia ab vuula etiam dicitur. Maiori harum folia
 sunt quadantenus Bolbonac aut Vrticę, Hispidæ, rigida, latiora, ad Imum, supernè acuta
 & ambitu crenatà, Vrticę habitu & superficie: floribus albidis, plurimùm cæruleis Violę
 Marianę minoribus: radice alba tenera Rapuculi in acetarijs apta ieiunio Vernoprerfer-
 tim.

TRACHELIVM, minus.

MIMORI CERVICARIÆ, iidem natales squalidorum marginũ, & Montium Prætorum *Eff. Dod. 127.*
 Germaniæ, & Angliæ Occiduz sunt: Caules breuiores, folia item aspera Ra-
 puntij aut Saluiz, pilosa, flores densi pulcelli superioris sunt, Rapuntij sapore, primòq;
 vere acetarijs etiam adduntur.

Varietas. Quandoq; in Maritimis, & cliuosis aridis quædam non absimilis, Ceruicariæ
 maioris folijs, leuiora minus rigida, aut ambitu dentata, in breuioribus cauli-
 culis, quibus subsunt radices latius vagantes albidz, Flores Junio & Iulio, æ-
 lis pusillis purpurę languidz.

Næstrates CAMPANVLÆ dua hortensæ, Persicifoliæ lacticiuosæ flore
 volubilis, an ? ASIONE Theoph.

OB LONGA, angusta, & obscure virentia folia, imum caulem capitalem, atq; radicem *Eff. Dod. 130.*
 stipantia sunt caules recti in longitudinem striati in quibus totis insunt florum ca-
 lathi, vel nolę Cæruleæ, albide, cæruleis etiam vel albis explicantibus sese nonnullis sta-
 minibus, ambitu constantes & quasi vnico folio, sexangulo, idcirco putatur meritò
 Theophrasti Iasione: capitula insunt foraminulis peruia, quod imposuit Commentatori
 Senensi, qui idcirco illicò pytauit, & sanxit esse Phyteuma. Horti voluptatis causâ habet,
 tametsi in olerè mandî queat.

CAMPANVLA Minor.

EADÈM sponte propè scrobes, & sepes prouenit: multò minor, caule breuiore: folia
 sunt ad imum strata, rotundiora, & volubilem viarum propius accidentia, flores pur-
 purei, & radices exilliores.

RAPVNTIVM paruum, vulgò Pes Locustæ Auicenna.

{ Gal. Responce petit.
 { Ger. Klein Rapunzlein.
 { Ed. Klein Raponcelletu.

QUENADMODVM propter radices & vsus non valdè dissimiles, antiqui Bunium, *Dod. 412.*
 id est Napulam à Buniade diriuasse videntur, sic etas sequuta iam inde ab Auicen-
 næ temporibus Rapuntium siue Rapulum illam vocauit: siue quia putarit plebecula eã-
 dem aut congenerem, siue quia ad vscendũ, & ad aspectũ, Napum aut Rapulam præ se
 fert radix: Est enim pollicis lógitudine & crassitie Rapi in morem, aut Raphani oblon-
 ga, & medio sũt nonnihil ventriosa: sed multò minor pellucida, candida, tenera, acetar-
 ijs vernæ Quadragenæ longè quouls Rapo aut Raphano delicatior. Inter namq; pri-
 mæ, prima tum erumpit, folijs Oleæ, Gentianellæ, aut Campanulæ hortensis breuioribus,
 in caule gracili, nec huc dissimili flores cærulei quatuor foliolis, vt Lini, cõpacti sed reflex
 is campanulę modo: semine in oblongis theculis pusillo. Non modo hortis & satis fa-
 miliare vbinis, sed etiam syluosis & sepibus tum frigidarum, tum calidarum regionum.

M. iiii.

Rapun:

Dad. Hist. 4. 12 **M**INVS istud obuium multis locis, nec nisi montosis aut alsiosis pratis, & cōuallibus, vti sunt Mindeni, & Norbonæ Aquitanicæ vicinis pinguibus, etiam Belgij & Angliæ nemorosis. Figura, radicēq; maiore Rapuntium imitante, & comoso flore purpureo cæruleo multum diuerso à Rapis, Napis & minore Rapuntio. Folia enim per initia latiora imò, superne acuta Hedera, aut Trachelij, sed longiora in caule recto, pedem sesquipedemq; alto, gestante densum comosumq; spicatum, ex corniculis crebribus in quatuor foliola superne dehiscenribus, Melampyri florem cæruleum purpurantem, iam glaucum, iam pallidum. Iulio, & Augusto theculas relinquire rotundas, Rapuntij marsupiolis non dissimiles, vti & radix non dissimili gustu & figura est, vnde dicta videtur Rapuntium, tametsi neutra inter Rapos collocanda.

Leucoium { *Album,*
Purpureum,
Luteum,
Maritimum { *maius,*
minus, } *purpureum.*
Duplicato flore.
Lychmides { *Agrestis.*
Agrestis altera.
Agrestis multiflora Anglica.
Coronaria.
Lichnis Chalcædonia.
Marina Anglica.
Ocimoides sive Ocimastrum.
Ocimastrum alterum.
Ocimastrum Valerianæ bos.
Ocimoides repens Peligonij folia, flora Saponaria.
Lysimachia { *Lutea.*
Pliniana sortis.
Siliquosa, filius ante patrem;
eiusdem gemina varietas.
Cerulea hortensis.
Conisa. { *Maior Monspelliensis vera.*
Media, qua Calaminbatertia Fusch. vulgo grec. Asymte,
Minor Monspel. Fusch. Media.
Minima.
Aster sive Hel. la Attica. { *Monspelliensis aureo flore.*
Stalorum fruticosus, Iusco Olea folio, Conisa facie.
Aster minor Monspel. Tripoly flore, medio purpureo, Linaria folio.
Aster Montanus duplex, prae grandi Conisa aut Helenij flore.
Glastrum sive Isatis. { *Sativa.*
Sylvestris.
Luteola.
Vaccaria.

Λευκοῖον. **LEUCOION, VIOLA alba.**

{	Bel. Wiolieren.	{	Ger. Weiß garden Viole.
	Ang. White Gillower, or stocke Gillower.		Gd. Violiers blancs.
	Hisp. Violetas amarillas, seu violetas blâquas		Ital. Viola bianca.

Violz

VIOLE nomen ἀπὸ τῆς ἰώας, quasi ire, aut prouenire, aut primum prorūpere dixeret: Veris namque prziua viola, & Lutea *Keiri* dicta, quarum capti venustate, & fragrantia, vt vsum ad coronamenta sic nomen commune sanxere, posteaque magis consuetudinem, aut florum similitudinem, quam rationem sequuti, multos & varios flores Violas nuncuparunt. Idem nomen variis atque longē diuersis plantis inditum: quippe apud Theophrastum Viola est bulbosa, nigra & alba: quas nōs suis quāque locis exequuti sumus. Hic vero Leucioium speciem dumtaxat leuiter perstringemus, quz non ā florum albedine, sed foliorum canitie, cinericioue colore dicta alba videtur. Etiamnum hodie, vt Dioscoridis xuo, vulgarissimz cognitionis illa triplex ē floribus varietas: vbiuis propemodum gentium. Ditissima perzquē omnium florum fctura. Sed alba & purpurea cærulea non nisi satū.

LEVCOIVM LVTEVM, *Keiri Arab.*

*Germa. Geel garden violet.
Ital. Viola lilla:
Gal. Violes de muretz.
An. Walle Gyllofer.*

LVTEA verō parietinis præsertim, etiam spontē lcta florēt & vernat, Februario & Martio, hæcque vt frequentior, & odoratior, ita nō parum vtilior Medico vsui, cuius semen etiam efficacissimum compressum in siliquis, sed minoribus multō, atque Erucæ sylvestris paribus. Folia etiam angustiora, virentia Ligustri, vel Phylereæ. Caules farmentosi, recti, complures, radice lignosa, fibrosa cōmissuris & rimis parietum incuneata. Hic in Anglia vti plerāsq̃ alias Nataliciis Christi sapius floribus luxuriantē vidimus, etiā hoc anno: non tamen perennat.

SV I similis & vnā dumtaxat, quz plurimum albos, sæpe purpureos, interdum, præsertim arctina flores, exoleti coloris in cæruleum vinaceū languescentis fert: Cornicula quanta & cuiusmodi cornuti Papaueris, geminū item seminum ordinem, membranula secundū longitudinem intercurrit. Folia accedunt ad Calendulam albicantia, ē radice lignosa: Hæc non perinde feruet gulfu.

LEVCOIVM MARITIMVM *Mains.*

SED Maritima, quz plurima Mediterraneis Norbonz littoribus, rarior multō, Thlaspi gustu & sapore videtur. Flosculi æstate quaternis foliolis dilutæ purpuræ: siliqua & semine similis, sed folio ad Cichorij, vel Erucæ modum dimiso, crasso albido, cōcolori, & pari hortēsis.

LEVCOIVM MARI-

HYMEL., HYMEL.

IS D R M locis non raro pusilla duplōque minor oritur, & ab hæc differt videtur: vti Thlaspi minimū, ā mediocri: vehementius tamen æ credine vellicat linguam.



LEVCOIA DVPLIS FLORIBVS.

MAN-

MANGONIO holitorio repetitâq; crebriore transplantatione, tum lutei, tum purpurei, flores magnitudinē luculentam assequuntur: multiplici singuli prægnanti foliorum fœtura, Rosam moschatâ æquante: Sed vti viola Martia floribus donata, semine orba fit.

AVVIC. LYCHNIS Coronaria.

Ger. Grauen Kossin, Marien Kossin, & Himmel Kossin, siue Coelestis Rosula.
Gal. Oeillets, & Oeillets Dieu.
Bel. *Chyffus ooghen*.
An. *Rose Campion*.

Iouis flos Theophr. non Phlox, siue flammula Plin.

CERTVM liquet de authorum monumentis & comparatione cum Rosæ, Violæ atque Anthyrhini floribus, flimeo colore, lucidâq; aut sanguinea, purpura fulgentibus, dictas fuisse Lychnides, quasi lucidos luculentosq; flores, qui elegantiz illecebri in coronamenta venerint. Eiusmodi est Viridiorū deliciz lectissimus flos, Ocellus vocatus, Gallice *Oeillet*, *Chyffus ooghen* Flâdrice, cuius tres quatuorūq; numerantur differentiz: quas omnes huius arcto notionis ambitu cōplexi sumus: Satiæ radix fibrosa, longiuscula, folia flaccida, crassiora, tomentosa, vti *Æthyopis*, magnitudinē *Leucoii*, vel *Saluiz* æquante. Incani item caules surrecti, teretes, geniculis atque ramulis pluribus donati, qui singuli, flores explicant, è calycibus *Pseudomelanthii* æmulis, Rosæ purpura rutilos, atque nitore flammantes, oculorūq; aciem interdum perstringentes, *Pyropi*, aut lapidis *Lychnidis* modo, vnde nomen vtrique cōmune fuit. Hæc vt omnium pulcherrimâ, ita colitur sola, eoque flores adeo confertos & ingeminatos fert: vt semine postea orba sit, exhausta nimirum formæ vi, & pabulo in florum cōmodum absumpto: cuiusmodi in *Viola Martia* exemplum videre est. Haud dispar natura earum quæ ruri, interdum sponte oriuntur, aut in hortis negliguntur. Præterquam quod floribus candidis paucioribus, minoribus, & semine donantur.

Varietas.

LYCHNIDES SYLVESTRES.

AFRINES etiamnum tres, quarum duæ passim secus satorum sepes exant: radice non ita magna, gracilioribus, ac paucioribus, tum cauliculis, tum foliis, & mollioribus, nec perinde tomentosis, sed ex pallido herbaceis. Alteri flores rubelli dilutiorisue Rosæ, alteri vero niueo candore renident.

Ang. *Doble Rose Campion*.

MULTIFLORA.

Varietas

TRANSVECTA vtriūque in hortos cultu adeo flores fœtura luxuriant, vt maximum *Africanum* florem, vel *Rosam* æquent, aut superent.



LYCHNIS MARINA, ANGLICA.

ALTE-

ALTERA quam hic pictam damus, in aggeribus maritimis Vectis Insulae Angliae, totòq; illo littore frequens. Herbula est ab una radice multis folijs cincta, crassius, minoribus, & angustioribus quàm Portulacae Marinae. Caules creberrimi, flexiles, humi fissi, cubitales & sesquicubitales: in quorum summo caliculus albus Ocimastris, aut Lychnidis est, cui haerent flosculi candidi perquam elegantes, Ocimastris non dissimiles, apiculis intus nigris. Semen in folliculis fuscum Lychnidis, aut Ocimastris. Salso est gustu, non tamè insuauis, esu tenera: non nisi inter filices & Brassicas marinas quàm ferme vendæ alluunt enatam videas. Floret mense Iunio, Iulio, Augusto, & Septembri.



LYCHNIS Chalcedonica, sive Constantinopolitana miniata.

FACILE harum pulcherrimam elegantia prouocat, aut superat florum deliciae plantae Chalcedonia illa, cui florem Constantinopolitanum nomen indiderunt. Huius radices exiles, fibrosae, aliquantum acres, caules exerunt numerosos, teneros, graciles, geniculis & aspredine cinctos, è quibus singulis folia bina, quadantenus Syluestris Lychnidis, sed nonnihil viridiora, hirsutiora, & asperiora, semen in cauliculis oblongis nigrum Papaueris Rhœadis. Flores in umbellis radiatis, latiusculis concinnè dispositi, & minio purpureo, rutilo fulgentibus, viuidioribus, quàm in Martagone vel Canna Indica, adeò ut quia inodores sunt isti coronarij omnes, proindeq; florum voluptate duntaxat asciti, merito hic Lychnis multò omnium pulcherrima sit habenda.

*OCIMOIDES sive Ocimastrum, facies alba Monspel.
Herba Tinnica Gordonij.*

NON tantum propter foliorum cum Ocymo similitudinem, sed etiam adeòq; multò aptius ob vires aduersum viperinos morsus exploratas, cui maximè confert Ocimum, Ocimoides, aut Ocimastrum vocasse videntur. Cuius non parum plenè omnes explet notas ista planta vulgatz cognitionis, quæ nusquam non inter segetes, & viarum marginumq; gramina vberè luxuriat. Radix alba crassitie in digiti æquans, tenera nonnullis fibris sparsa: exiles rectosq; nonnihil hirsutos, cubitales exerens caules, per intervalla geniculos habentes, è quibus singulis folia maiuscula Ocymi, aut Lychnidis syluestris hirsuta bina, & plerumq; quaterna, nouis succrescentibus binis pusillis, in summo ternos, aut quaternos foliosos calyces ventriosos superne angustos fert: ubi semen fuscum Pseudomelanthij, flores Lychnidis syluestris albi.

SPUMEVM Papauer vulgò, est Ocimastrum alterum.

NEC minore prouentu, nec alijs locis oritur hæc, vulgò Norbenensium notissima, & propter spumeam sputeamue asperginem, quæ non rarò albicans foliorum, & geniculorum sinibus insidet, spumecum Papauer putata: superiori Ocimaastro admodum similis, cunctis sui partibus, sed caules leues nitidi hirsuta, ad Tunicem magis accidentia: vnde nonnullis practicis ut Gordonio, Tinnica herba dicta, radix nec folia fractum, facilis, nitida & pellucida magis.

*Narcissus Vir-
gili & Columel-
la fortè.*

*Valeriana rubra
Belgarum.*

LONGE hac floribus pulchriorem, alioquin folijs, caule, & facie non ita dissimilem, alunt herbarij Belgæ: radice tamen aliquantum crassiore, habitiore, & magis tereti æquè alba, odoratiore. Longiora, maioraq; aliquatò tum folia, tum caules sunt. Flores verò creberrimi, elegantissimi affatim in muscarijs propendentibus, & ex pusillis caliculis oblongis congesti, Valerianæ partim, & Iasmini. Vnde illuc Valeriana Rubra vocatur. Purpurea namq; diluta nitent flores, Iunio exeunte. Vnde etiam Rubrum Behen vocitarunt idem: non nisi in hortis pensilibusq; puluinis, & figlinis enatam vidimus.

OCIMOIDES REPENS. *Polugonifolia, flore Saponaria.*

NO modo Taurinensium ad Padum collium vmbrosis, Syluosis, & iuxta sæpes hæc frequens oritur, sed etiam Seuenz Veganiij herbidis, & vmbrosis marginibus, secus riuulos & fluuenta proximè Asarinam in saxorum commissuris. E cauliculis gracilibus, geniculatis, reptantibus, teneris, flexuosis Alsines maioris, folia exeunt bina, iuxta geniculos Oleæ syluestris, Myrthi, aut Polygoni, sed paulò latiora. Flores vetò in caliculis oblongis Saponariæ concoloribus, multò minoribus: radix exilis, vsus hodie incomperiti & neglecti.

λυσιμάχιον καὶ λύτερον **LYSIMACHIA LUTEA**, sine Salicaria,
 { Gal. Perce bossé. Soufy d'eaue. Corneille.
 { Ger. Erri Weidrich.

HVC laus nomenq; à pugna dirimenda, id enim est: λύνω τὴν μάχην, certamen dirimere vel pacè componere, quod nominis Reginam etiam Lysimachia imposuisse dixerunt. Est tamen ea plantæ vis, vt etiam belluarum animos feroces, & mutuos hostiles congressus pacet. Faceret vtinam rerum arbitra, & hera Prouidentia, vt quàm nota est hodie herba Lysimachia, tam esset nobis copia illius cœlestis Lysimachiz, quæ est Paracleti interpres, & alumna pacis gratia, qua rabies, & rerum humanarum ætus, atq; insania plusquàm Cerberæ, ad lenitatè perpetuumq; perennis amicitiz fœdus, reducerentur. Tametsi tres posteritatis sedulitate animaduersæ sunt Lysimachiz species, Dioscoridi indistinctæ, tamè vix vlla earù vsu hæcenus recepta fuit. Eapropter lutea notissima, vsq; frequentior. Melsibus flores luteos elegantia visendos, in ramulis, Hypericonis modo edit, inodoros, multos, còsertos, folia autè frondis Salignæ, aut Perficariæ, pallentia, in caule bicubitali parum anguloso, geniculato, quaternà ternaq; sibi ex aduerso sita. Radix cespitem vagatur, laticus sparsa, editq; teneram sobolem purpurascensium turionum. Semen rotundum Coriandri, pallidum. Marginibus hæc & ripis minus vdis, atq; inersis, quàm reliquæ tres aquaticæ. Vbiq; Angliæ, Galliæ, Germaniæ, peruiæ, quâ Officinæ multam ad gargarisinata, & parulides exesalq; oris inflammationes vsurpant. Gustu astringit & desiccatur.

LYSIMACHIAE fortè *Pliniana.*

SVNT qui Plinio mentionatam Lysimachiam diuersam illi specie arbitrâtur, quippe qui flore purpureo, & odore graui eas discreuisse videtur: earûq; vnâ proinde inuuisse, quæ nusquàm emerisse conspicitur: è riuulis pigris, & palludosis lacunis, floribus, spicatis, intè se purpureis, palmum & sesquipalmû longa, è Sertis purpureis semine concluso in angustum deficientibus, Vitis aut Lauendulæ ritu. Caules geniculatos, & folia Luteæ similia, aut Salicis angustifoliæ sunt, ex internodiis bina subpurpurea. Radix maior quàm Luteæ, & similiter turiones, quotannis teneros promès, lignosa, nigricans: nò tamè odore tetro. Quare tametsi non magni nostra referat cuius sit Plinianæ an Dioscoridicæ, tamen subodorati quibusque, Pliniû non aliam interpretatû, à Luteæ. Sed πύρερον, siue purpureû vertisse, aut πύρερον legisse: & grauem odorem habere, quod quando a doletur, verum asserit Dioscorides.

LYSI-

LYSIMACHIA Siliquosa, Filius ante patrem.

EST etiam vulgarior hæc à siliquato fœtu præcoci, qui auctu & incremento florū eruptioni antecurrit, quasi proles parente prior, Filius ante patrē vocitata. Non aliis hæc natalibus, sed multo vberiore & variato prouentu oriunda, caule & foliis haud diuersa, nisi quia angustiora & leuiter crenata. Flosculos foliolis quaternis constantes purpureos, patulos: Geranii colubini, quibus quasi caliculus foret, subsunt teretia exilia & longiuscula cornicula, quæ femine perquam minuto Conizæ, aut Dentis leonis, vñ cum papposis inuolucris, dum siliquæ huius & bisidæ disparantur, perduntur.

Varia { **H**VIUS filii ante patrem in Belgio, sed in Anglia facillimè, varietas duplex obseruatur, non iisdem tamen locis semper, attamen vmbrosis, saxosis, aut minus vdis. Frequentior est omnino folio, siliqua, caule iisdem, sed magnitudine inferior, & tenera adeo, vt vix siliquam florētem; fulcire queat. Flos verò proprius Caryophylleam Tunicā dictam, paulò minorem, rubeam exprimit.

ALTERA varietas cernitur in floribus, pallidioribus, quadripartitis, angustioribus foliolis, ex aduersa cruciatim, aut decussatim assitis, in parli siliqua, cui cetera omnia subsunt similia.

LYSIMACHIA CÆRVLEA *hortensis, Veronica*
RECTA *quorundam.*

ET hæc non absimilis folio, Filii ante Patrem, aut maioris Veronicæ, sed longiorē, crassiore, sed tota minor, cubitum & pedem alta, & quasi ex vtraque Lysimachia mixta: ramulos in summo spicatos, floribus cæruleis, nitidis Teucrii, Germandræ, aut Læundulæ longioribus: pluribus exiguis marsipiolis contentum semen minutum: exigua & fibrosa radice nititur. Rarior hæc etiam hortis: Londini hoc anno Junio & Julio floruit in horto. H. Morgani nostri: Belgicis etiam syluis dicitur crescere sponte. Parcior, aut rarior harum omnium vsus, præter quàm Luteæ, vtī dictum.

CÓNIZA MINIMA *sive Pulcæria.*

IN quadruplici differentia est Cóniza, quarum Media & Minima vbiuis Galliz, Germaniz, & Angliz locis lacustribus, & humentibus aruis multa. In *Emardgreyn* ara & fossis, altero à Londino lapide fruticat minima, inter Camemillam Romanam, inter & Pulgium Regale: sesquipalmum caulibus superat, multis alis donatis, hirsutis, pulvis vel cineritiis, rotundis, rigidiusculis, quos folia ambiūt ab imo crebra, incana, & Phylli Thelegoni fermè paria, aut Gnaphalii vulgaris, quem habitu & colore tota refert, sed maiora multò & obscuriore obsoletiorēque lanngine. Flores rotundi, bullis Agerati vel Tanacetii, sed minus vegeto colore & cōpressi, quibus elapsi semen subest Anthemidis, acerosum minutū: exigua lignosāq; radice, minime omnium hæc glutinosa, minūsq; quàm Media fœtida, quam dumtaxat vestigio olido testatur.

MEDIA.

EODEM loci fecus Regiam viā atq; humentes scrobes, Media illi prorsum similis, sed duplò maioribus foliis, crassis, densis, virentibus, asperis, rigidis, squallidis, caulē bicubitalē & alas multas ambientibus, ima falcata, basi Clasti Dentillarię modo. Radiatis floribus, luteis, Chrysanthemii, aut Buphthalmi, semen haud dissimile, radix pusilla, halitum virosum, & quiddam Cimicium, aut fœtidę Cotulæ efflat. Parum aut minus multò quàm maior, & minor glutinosa.

CÓNIZA MAIOR *Fræ.*

SED maior tepidiore Austrinòq; cælo & aëre maritimo oblectatur, cuiusmodi est Hetruriz inter Florētā, Aquaspedulas, & Romā atq; Nitiobrigi in maritimis Venetis & aruorum mar-

N.i.

marginibus Lunellæ, Mafilar
ges, Möspellii. Binū trinū-
ue cubitorum frutex, multis
propagatur virgulis, rectis,
rigidis, rotundis, foliis mul-
tis cohærentibus, densis, ex
viridi pallentibus, crassis, pin-
guibus, Oleæ similibus, aut
Asteri attici Italici. Extremi
caules multis ornantur secun-
dū lōgitudinē floribus, luteis,
rotundis, Hieracij, aut Sene-
cionis, in pappos euolanti-
bus: nec non semen exigū,
vt Hieracii: radix lignosa, fi-
brofa. Præstātor æteris mul-
tō hæc, cum odore vehemen-
ter suauis, tū viribus, nec mi-
nus Ledi Chisti glutinosa
tangenti, cuius odorem, sed
cum ea quam mediam iam
descripsimus, nōnihil confu-
sum imitatur, adeo vt omnes
norit, qui ambas, mediā nem-
pe & istā nouerit. Adeo sunt
inter se consimiles, & Dios-
coridis lineamentis affabie
bellè congruentes,



CONIZA MINOR Vra.

HVC tamen præ cæteris assimilatur natalibus, viribus, odore & facie, quam minorē
Dioscoridis aluimus. Quæ prorsus eadē foret, nisi proceritate & caulium luxu-
ria vinceretur. Vnico sed. enim est vt plurimum caule, gracili, cubitali & sesquicubitali,
paucioribus, minoribusque foliis Lynariz, vel
Chisti Ledi angustifolii: color, odor, modus, se-
men, tum illis, tum floribus, haud diuersa: ra-
dix exigua. Gramuntiz syluæ finitimis agris,
hanc non modò, sed etiam publica via maiorē,
in depressis Syluæ lacunis minimam, non semel,
Pulegii Ceruini conuicticæ, legimus: Mediam
verò passim vbique locis vdis, sic inibi omnes
studiosis paulò exercitioribus iamdiu notæ:
quibus risui fuit Senensis audax commentum,
qui longè diuersam, vt in Baccharide dictum,
plantam, Nullis reclamantibus, vt ille semper asser-
mat (vti nos hic omnibus aduersantibus) notæ,
intrusit huc. Parum certè illi notam, & quod
minus ferendum, nō descriptā. Spirat huius nā-
que radix odorem, non tetrum, sed aromaticū
Garryophylleum. Caule, & foliis Verbasci, aut
Blattariz non Oleæ, glutinis nihil penitus ha-
bentibus. Flores ex luteo purpurascens: cæ-
tera etiam planè dissimilia, multo magis viribus: quare nunquam Senensis dignitas
nostratibus mulierculis Galloprovinciæ persuadebit, vt scopas euiscandis, & enecandis
pulicibus, ex Baccharide potius quam vulgata illic Pullicaria colligant.



ASTER

Coniza maior
M. ubiolo falso
tradita.

Möspell. Bac-
charis.

ATTELLAE stellæ nomen, si non à flore, sed à folioli flore in stellæ morem cingentibus, factum fuit, vt Dioscorides videtur expressisse: nou aliam hodie plantam commodius potest designare, quàm Monspelliensium Asterem vocatam in ubi Norbonensi agro, prope pratorum margines, & fluua perfamiliare. Florem etenim edit æstate aureum, circinatæ, sed compressæ, nec admodum extuberantis rotunditatis, Buphthalmi aut Chrysanthemi, quem ambiunt quina senæue foliola angusta, mucronata, rigida, longiuscula, Stellam marinam piscem, non parum referentia: caules pedales terni aut quaterni, duri, hirsuti, quibus totis insunt folia oblôga Lychnidis aut Verbasci Saluisfoliæ tenuioris, pilosa rigidiuscula, viridia, in fuscum obscura. Radice capillosa, sparsa. Sapore astringente, amaricante, non acri, nec ita ingrato. Semine anthemidis Augusto maturis vel Septembri in Franciæ, Belgij, Germaniæ, & Angliæ hortis. Nam ruri illis non prouenit. Purpurascunt quibusdam in locis florum foliola subtus, non secus ac in Tripolio.

ASTER ITALORVM *luteum fruticosum oleosolio Conisæ facie.*

EST & istud non modò Italiæ saxosis & aridis valdè frequens, sed etiam Galloprovinciæ Norbone, præsertim via Auenione Nemansum petenti ad læuam, inter Augustæ antiquitatis Romanarq; munificentia rudera, ruinosaq; triplicis forniciis pontis Gari vocati eximia monumenta, nec non prope *Bettonetum*, & secus Lanum Monspelliensium amnem ad pontem. Virgultis quamplurimis, durioribus, nigricantibus, pedalis, & sesquipedalibus: folia Oleæ Conisæ, vel Myrthi maioris, aut potius Conisæ facie & flore. Luteo, papposo circinato squamulis acerosi foris septo, in lacæz morem. Fibrosa radice, gustu vniuersæ substringentis & siccantis, parum quid amarooris aromatici & odori commodi hæcenus incerti. Incertumq; sitne *Amelus Virgilij*. Videtur equidem neq; Ameli veti, neq; Dioscoridis Asteris opinionem tueri posse, vt præsius expendentis stirpes ipsas, & vtriusq; authoris lectioni dicat liquet.

ASTER MINOR *Norbonensium tripolij flore, Lynaria folio medio purpureum.*

NI SI hic (non in pratis) locis aridis & collibus saxosis proueniret, vt sunt Oliueta circum Monspellium & ad Castrum nouum, cæteris plenius expleret Dioscoridis Asteris & *Ameli Virgiliani* notionē. Flores quippe radiatim multis foliolis stellulas effigiant, aureo purpureoq; mixto sulgore micantes Tripolij. Nam Dioscoridi pingitur aliquid purpurei luteo immixtum, vt videte est quando dicit, florū partem purpuream bubonis præsidio esse. Sic enim vertendum est, & vertit doctissimus Marcellus. In gracilibus virgis, numerosis, rectis, pedalis & sesquipedalis ab vno radice fibrosæ cespite: foliola oblôga, angustiora quàm superiorum, Lynariam referentia. Similis tota, sed minor & gracilior Tripolio, quod *Amelus Virgilianum* signantius exprimit, non modò quia secus fluua & pratorum riguum conualles amoeniores, vt Padi, siue sumigeratissimi Eridani prope Ferrariâ, Patauū, & passim in Lombardia: sed etiâ quia tū florū & foliorū, tū caulū superficies, interdū ex virore purpurascunt, speciosamq; radiantium Stellarum in luteo purpurascētium syluam ostentant cymæ.

ASTER MONTANIS *duplex prægrandi Helenij flore.*



MERENTVR etiam Asteris no-
men plātē illā duz,
quæ non nisi rarò in
mōtibus Allobrogū
& Galloprouinciæ
celsis, florē vnicū lu-
culentæ magnitudi-
nis ostentāt. Magni-
tudine ferē, colore,
& effigie Helenij, in
caule singulari, cu-
bitali, recto, gracili,
folia ferenti fusca,
magnitudine Asteris
Italici, & adeò simi-
la, vt planē eadē putes.
Radice fibrosa,
Succisæ, aut Britan-
nicæ, Lugdunenſis.



Aster folijs & caule hirsutus.

Alter proceritate, & flore non abſimilis, ſed caule, & folijs hirsutis, longioribus, Cynogloſi noſtri parui paribus, & ſimilibus: radice verò minus fibroſa.

GLASTVM Satium.

Effig. Ma. 634.

HVIVS ſatiui & longè omnium optimi immenſi tractus conſiti Tholoſanani ditant regionem, vbi virens herba *Guede*: tabeſcēta autem & putreſcēta, inq; mola trituſatili expreſſa herbacea ſanies, in prægrandes glebas aceruat, & *Paſtel* vernaculè vocatur, indeq; Galliz, Angliz, & Belgio ſuppetit ad pannorum inſecturas. Serunt etiam circa Infulas Belgij vrbes, & in Germania vbi ſolū pingue, & lætum, perbonum dat *Iſtidentem* nec multū Tholoſana inferiorem. In Italia minus frequens, eoq; minus mirum ſi doctus Anguillara ſe noſſe negarit, & aliam Norbonenſem ſylueſtris Glaſti ſpeciem, pro ſatuiuo Glaſto deſcripſerit: quam neſcio cur Dodoneus Vaccariam vocarit, cū apud nos neq; vaccæ eam paſcantur, nec vllam eum ea habet ſimilitudinem, vllive vſui ſit: Et illius conſpicua differeſtia ab vtroq; Glaſto, quibus tamen congener videtur.

Glaſtum enim Satium inſecturæ commendatione vbiq; notum eſt. Aruis pinguibus ſeritur quotannis, exirq; folijs ab imo totos caules cubitales & bicubitales rectos ſlipantibus, craſſis, pinguibus, anguſtis, atroczruleis aut virētib; Cynogloſſi, aut Thlaſpi latiſolix effigie hærentib; in ſummis ramulis numerofis, Maio menſe, & Iunio flores lutei, pallidi, numerofi exeunt, ſecundum quos theculæ compreſſæ, acutæ in linguæ figuram erumpunt, & ſemen maturant nigricans. Radix albicat, non altè depaſta.

GLASTVM ſive IſATIS Sylueſtris.

Math. 635.

SYLVESTRIS ſegetibus obeſt, & multò procerius priore luxuriat, folijs Endiuia imitantibus, tamen multò minoribus, vnde Plinio occaſio, vt in Laſtucez reiſceret: radice exigua, caule lignoſo, recto, ab imò folijs compluribus ſlipatoz, quorum alii alternis interuallis propagantur flores, ſed in ſummo multiplici conſerti, melino diluto colore. Galloprovinciæ plebeculæ coronaria eſt.

IſATIS ſylueſtris Ocimaſtri calenſis, flore exiguo pallido, Vaccaria dicta Norbo.

SYLVESTRIS autem ſive Vaccaria, & Ocimoides dicta, importuno proventu Triticæ ſegeti immiſcetur: anguſtiora folia promēs, quàm ſylueſtris Iſatis, Ocimaſtri, ſive Papaueris ſpumei ſimilia, rariora, in caule cubitali aliis ſparſo, & ornato floribus puſillibus Ocimaſtri, aut Pſeudomelanthij, alabaſtriculis albidis, & pallentibus, nec ſemine diſpari: non vllius adhuc commodi comperti.

MAGNO vsui & emolumento est Luteola, recentioribus tantum cognita, ad colorem fuluum aureumue pannis conciliandū valde expetita, præsertim in Belgio, ubi magna copia: tamen si aliis etiam plerisque locis Galliz, & Angliz ruderibus, & semitibus occurrat. Hæc tertia Gladii species constitui rectè potest: radix oblonga, folia habitiora, Isatidis figura, sed angustiora, fusco virore, caule recto, sesquicubitali, Thyrsum muscosum gerit, ex multis flosculis, luteolis, pallescentibus, Oleæ similitudine, & magnitudine, decussatum explicatis: Semen nigrum, Vrticæ Romanæ, sed minus.

TITINMAL

- Parallus, sine Marinus.*
Myrsinus, sine Myrsifolius.
Heliocopus Solsequius, Portulaca folio.
Cyparissus Cupressinus, vel Humipinus.
Pityusa, sine Pinea: Esua minor Officinarium.
Esula maior Germanica, an sit Dioscoridis prægrandis frutescens Pityusa,
Dendroides, sine Arborecens, Myrsifolius.
Platiphyllus, est Characias nuperorum.
Characias Anglicus, & Francus.
Mompellensium, serratifolius, an Characias?
Lathyrus, sine Catapulta minor.
Peplus, sine rotunda Esula.
Peplus.
Chamaesyce.
Nerium, { Pæpureum,
{ Album,
Alpigena Chamaedendroides { Odra.
{ Altera.
Montana Allobrogum Lentisifolia, Chamæscifolia, vel, Olintrifolia
minus odora.
Chamaedaphne, sine pusilla Laurus, an Germanicum Mezereon, an nam
potius nostrum Chamaedendroides.
Granum, Gnidium.
Daphneides, sine Laureola.
Thymelea, Granimedy.
Chamelea triccoccos, Mezereon Arabum.
Chamelea montana hirsuta.
Athyum, Terribilis, Herba Norbonensium.
{ Scrapionis, & Arabum.
{ Mesue.
Turbith { Athuari.
{ Officinarium, triplex.
Tartou Traire Massiliensium, Galloprovincia.
Esula rara, sine Athyum in Lio Venetorum insula.
Maius crenatum Myrsifolium meum teretifolium.
Minus.
Minimum, sine Illecebra.
Anthyllus, sine Vermicularia frutescens, sine arborecens
Sedum, { Arborecens Gracum, Syriacum, & Anglicum. } Maius.
{ Aloe. } Minus.
Coryledon.
{ Coryledon, minus, Montanum Sedifolio.
{ Coryledon, aquatica, acris Septentrio nalius.
Androsachos.

Semperuius, sine
sedum.

Portulaca { *Sativa.*
Agrestis.
Portulaca marina
Halimus.
Telephium, an. Crassula?
Scorpioides.

TITHYMALI.

τιθυμάλι, Laetariæ.

Germ. Wolfsmilch.

Gall. Tithymales, ou Herbe au lait.

Belg. wolfsmelck.

Ang. Wilde spurge.

A S V C C O lacteo quo turgent differentia cuncte, nomen factum commune Tithymalis, vel per diphtongū potius, Tithoimalis, quod mammā, siue papillā vberis exitiosam virosamue non insecit interpretatur. Plures hodie quam apud Dioscoridem extent, habemus; quarum partim confusas à Commentatore, nec verbis designatas, partim affixas orationi non intellectæ Dioscoridis, quamlibet suis iudiciis illustrabimus, & paucis emendabimus: Dioscoridis oratione quasi filo Ariadnæ ducti, sed nostrum ordinem sequuti, accuratiorēque ex inspectione descriptionem: quò quilibet planta cui propius quadret, Magis perspicuum fiat. Paralium primum pōnemus.

παράλλιον. PARALLIUS.

PARALLIUS siue hæc maritima appellata nuspiam hic nisi sabuloso steriliq̃ue litorum solo Mediterranei, Occidui, & Germanici maris, ubi quāplurima exit, virgis à radice, rectis rubellis, tactui glutinosi, foliis densè stipatibus, subnigris, Lino latioribus, Alypi terribilis paribus, & similibus. Flosculi ex herbaceo luteolis: in summis pediculis circinata foliola media traicientibus, sicq̃ue umbellam efformantibus & semine edentibus tricoccum, Chamælez, aut Latiridis non dissimile, minus & coactius: intus medullosa tria grana sunt verrucariz Tornelolis: radice simplici, proluxa, lignosa.

μυρσινίτης. MYRSINITES Myrsifolia. Farnina
repens Dioscorid.

TITH

PROXIMA illi facie hæc, sed brevioribus pedalibus, pinguioribus, reptat humi furculis, quos folia prorsum Chamælez latiora, Myrthi, vel Rusci, mucronata crebra stipant, vt Paralium; pallidè virentia, & in summo magis sparsa Sedi maioris, aut Laureolæ ambitu, è quo trans folia concava & umbilicata, disparantur quaterni, aut quini pediculi Iunio & Iulio, flores lateos, herbaceos, pusillos, nufculos gestat, & semina triquetra Paralii Augusto maturant, maiora, quæ itidem tribus compacta lateribus, in tricarinas valuulas dehiscunt, singulas singulorum granum, teres, oblungum, fuscum: medulla alba acri non ingrata. Angliz, Belgiz, & Franciz horti hunc sæpius alunt: nec alibi natum vidimus.

ηλιοσκοπιον. Helioscopium. TITHYMALIS, Solis-

quius Portulacifolius.

Germ. Sonnenwende wolfsmelck.

Gall. Reuille marin suiuant le Soleil.

Belg. Croonkens cruyt.

Ang. Wertgrass, & Wertwarte.

CYNCTIS gentibus familiaris hic & notior, foliis Portulacæ minus crassis, Halimi brevioribus, ambitu nonnihil crenato vt noster Charatias, caules paruos pedales in humum

HYMALVS *Alyssum*. 150





humum flexos, quatenos & quinos, rubellos, cingentibus floribus ex luteo in pallidū languentibus, inque umbellam collectis, semine non diuerso: sed Norbonæ, vbi maturuerit plenè, adeo spiritu vapido turget, vti soli relictu, quasi se motaret, exiliat, mediūque crepet; pueris raro spectaculo est, quemadmodum Thamarici semen.

Κυπαρισσός *TITHYMALVS* *Cyparissus*, siue *Cupressus*,
vel *Humipinus*.

APPRIMI referunt huius densi ramuli rabētes, sesquipalmes, positu ortu, effigie, æquabili circinatōq; habitu pusillā Cupressum: folia autē angustiora, longiora, & multo quam Chamzlea, aut Thymzlea, Pino propiora, molliora: semine alioqui in summis, pixidata foliola transmittentibus, nec à superioris, nisi quia minora sunt, diuersis: vicinioribus tamen Parallio Tithymalo, & Pituisq; Crepidines fabulose fluminū, & vicini colles fræquentius hunc alunt, vti sunt Ligeris ad Aureliam, Baturiges Galliz, & Norbonæ Lan, non procul Monspellio, alibique passim Maio, & Iunio, quum interdum propter anni & loci rigores, vel seriores alben folia, & minor tota reperitur, etiam in maritimis: quemadmodum cæruleū etiam totum habemus Parallium, & Amygdaloides sanguineum.

ΠΙΤΥΣΑ *PITYPSA*, siue *Pinea*, *Offici*. *Esula minor*.

ILLI ADRO affinis hæc Pinea Tithymalus, nomine & facie, viribus, natalibus, & foliis præsertim, vt ne quemquam falleret assimilatio, Dioscorides diuersas esse species monendum duxerit. Ac quāquam videri posset vna quæpiam Cyparissie Tithymali varietas, quales aliquot notauimus, tamen hic non vniuersum habitum, & lineamenta Plantæ, sed dumtaxat folia Piceæ esse tradit. Quare coniectura fert verisimilior, Pituisam esse eandem cum Officinarum Esula minore, quæ etiam Esulæ vox, quasi abscissa à Pityusula, nempe Pityusa minore videtur. Passimque cognoscitur, cum Linariæ collatione, de verisificationis carminulorithmico. *Esula Lallefcu, siue Lalle Linaria crescit.*

Exit namq; cauliculis gracilibus, pede & cubito maioribus, per intervalla disparia Polygoni more, ramulos, & folia pauciora promētibus, Osyridis, siue Linatiz, longis, acutis, angustis, & nulli Tithymalorum quam Cyparisso propinquioribus: cui etiam flosculi profusis, & seminum triquetra theca eadem: radix digitorum minimū æquat, albicās, cuius cortex aceto maceratus, & torulo ligneo exāteratus vsui Officinis, nec fructui est lentis figura, cuiusmodi codex Dioscoridis habet, cui potius mendum subesse suspicamur, quā standum putamus, rerum suffragante & monente perensione: & sane aut nullum prorsum nostratum Tithymalorum (quorum omnium inter ipsos eadem, & triquetra pericarpia, siue inuolucra sunt,) fuit illis notū, vel descriptum, aut amanuensium incuria (nolim Dioscoridis) temerata fuit, luxatāque aliquot locis germana lectio: vt mox fusius monemus: hinc simul ridendæ, simul pudendæ Commentatoris commenticiz, Tithymali, Paralii, & Mersynitidis effugiaturæ, quas non è plantis ipsis expinxit, sed vti in Antirrhini floribus, Tragacanthi fructu, & capitulo Gnaphali marini, Poterio; atq; quāplurimis alijs locis, plausibilis iconis mendacio, posteritatis theatro illudit; ex quo exercitissimō cuique, & cordatissimo viro suspicionem fecit, & fouis meritō, non vno loco fidei elascici authoris illum fregisse tesseram, nec illi deinceps, nisi benè re perpensa, in medicatoria pollicitatione credendum. Pratorum margines, & sepium, istam sæpius alunt Esulam. In Francia, Belgio, & Anglia, non nisi horti Pharmacopœorum,

ESULA maior Germanica, an sit Dioscoridis pygæidis frutescens Pityusa?

VT vsu crebro apud Germanos, & Belgas Pharmacopœos hæc recepta est, Esula maior, sic sanè nulli Tithymali speciei quam Pityusæ propior videtur, & alioqui nisi hac ac-

commodetur, Dioscoridi, aut minus nota, aut prætermiſſa fuit. Ex ampla multiſque adnatis implexa radice, craſſo, denſoq; pullo cortice amiſta, innumera ſurguntur virgulta, minimū digitū craſſa, & binū cubitorum proceritate viridātia, folia ſerentia Latyridis crebra, aut arboſcentis Tithymali, nec ſemine diſſimili: ſed partim ſecundū caulis & foliorū interualla, partim in vmbella, ſed minus lata, & minus in orbem collecta, cætera non diſſident à reliquis Tithymalis. Verū rarior hæc in Italia & Gallia, & Anglia, niſi in hortis colatur. Germaniæ verò ſuperioris, & inferioris ad Rhenum.



DENDROIDES, ſive arboreus *Myrtilifolius*, *Myrthi* ſpecie non à foliis, ſed fructu.

CALIDIORIS ſoli collibus apricis, & ſaxeis, ſive aſperis, ſecus fluuenta Norbonæ, & Hetruriæ Romanicæque prouenit Arboris æmulatione, ab vno ſtipite pollicis craſſitie, plures eniſſit ramos, amplos, bicubitales, digitū craſſos, Eſulæ maioris folia paria & admodum ſimilia, veluti cuncta planta: quam radix exilior, ſtipis craſſior, & vmbella maior, ab Eſula maiore diſtinguit: vti etiam arboreus vultus, quem hæc præfert, vnde illi nomen.

PLATIPHYLLON Characii Mathioli, Vallari.

POSTEA quàm habemus plures, quàm quot Dioscoridi annuerat ſint Tithymalorum ſpecies, & huic præ cæteris folia ineſſe latiora, vt Plinio etiam viſum, ad Violæ albæ, & minimi Sylueſtris verbaſci accedentia, ſimilitudine, ortu, & paritate, videmur tutò affirmaturi, latifolium hunc Tithymalum dici oportere: & præſertim cū duos inſuper ſimus naſti, quos ſi nouiſſet Cominentator, Characiā feciſſet, noſque hoc labore leuaſſet. Quem igitur Characiam noſtra ætate ſcriptores putant, nos Platiphyllum opinamur, quæſnamodum Platiphyllon Itæam, ſive Salicem appellant illi. Eſt namque latioribus, longioribus cæterarum foliis, ramis ſeq̄uicubitu & duos altis, aliòquin Dendroidi, aut Pityuſæ maiori aſſimilatur. In Norbonæ Galloprovinciæ, Lugdunenſiq; præfectura, ac aliis quàm plurimis Galliz, & Germaniæ ſyluoſis, & fluentum ripis, nihil frequentius. Floret, Maio & Iunio, vnicaulis, vt plurimum hinc: eoque Dendroidi cognator.

CHARACIAS Anglicus & Francus.

HIC admodum ſimilis Platiphyllō, ſed minor caule, & foliis. Frequentior etiā in Germaniis, & Franciæ Aureliæ vicinis ſyluoſis, quàm calidiori ſolo: Nullibi quàm in Anglia copioſior. Primo Vere floret, caulēſque complures à radice lignoſa, fulca, rubentes emittit. In quibus folia multò minora, purpurantia Amygdalinæ frondis eſſigie, Paralij maiora. Luſcente ſoſcolorum ſæctura, & paritura, per Iunii meſſes trilateram, & trigranā: non diuerſam à cæteris ſiliquam, paulò ſuperius quàm ſint Peltata concaua folia, pertranſcant vmbellæ ramuli.

NON temerè alibi (nein Italia quidè) quàm Norbouensi agro istum reperiàs, qui inibi vulgatissimus, & à foliorum crenistenellis, serratus vocatus: exeūt à radice alba, Eriogj simili, pingui cortice, caruosa pulpa, pollicè crassa, prolixa binū & ternū pedū, gūmeo & pereocto succo pregnante, eoq; Turbit suspicionem faciente: exeunt furculi plures cubitales, & pedales viridantes: Folijs Mirfinitidis, angustioribus, aut myrthi maioris, crassioribus, pinguioribus, & elegāter per ambitū, sed leniter, crenatis: in summo ramulis spargitur, & donatur umbellis umbellatæ rotunditatis, foliola traiſcientibus, florem, & thecam haud diuersam ab alijs, estate. Si vilius horum omnium radix affabrè ementitur Turpeti Alexandrini radicem, sanè hæc foret.



LATHYRIS sine CATAPVTIA minor: maior est Relictus.

POSTREMVM omnium Tithymalorum notissima, & vsitatissima Lathyris, cui appellatio indita videtur, quæ congenerem quidem, sed efficaciorē, & virosam magis signaret Tithymalum, idcircoq; Catapotiam, quia dixerat Dioscorides ἐν κατὰ πότιον λαμβάνεσθαι, id est, in pilulis grana sumpta purgare. Nusquam non in hortis, etiamq; in agrorum Anglorum, & Galliz marginibus occurrit, caule singulari, bipedali, sed ramoso assurgit: quem per intervalla ab imo bina cingunt folia, Rhododendri, aut Platiphylli Tithymali, crassa, pingua, succo lacteo virofiore gliscentia. Flores æstate pusillos, & semen edit Augusto, & Septembri, maius Tithymalis ceteris, non tamen diuersum, tricoccum, trilaterum, expressiore ternum granorum commissura, qualis Chamelez, quæ maior, & figuratior, & angulosior magis, ideo conspicua. Idcircoq; plenius, & signatius à Dioscoride descripta, aliorū Tithymali pericarpia, & semina nō perinde. Quare nobis subscribente natia rerum imagine fuerunt interdum immutandæ, interdumq; exprehius ponendæ designationes, non vt faciunt ista mancipia mendaciorum, qui ne videantur ignorasse, malunt ignota blaterare, sibiq; ipsis & naturæ monstra commentari.

PEPLVS, sine ROTVNDÆSVLA.

QVOD ramulorum ambitu, & quasi rotundo amictu, velum efformaret, aut tellurem openeret, Peplus dicta, nisi potius ob purpuream foliorum superficiem, siue xerampelinam, quæ huic in vinetis nascenti, & Peplidi in maritimis sabuletis degenti, vt plurimum inest. Peplum namq; fuisse purpurei, vel pheniceï coloris, cum multæ historiz, tum flammæolum testatur, sic à flammeo dictū colore. Germanijs & Gallijs passim Peplus sponte prouenit, secus sepes, fossimenta, margines hortorum, & in vinetis. Radice prolixiore, pusilla, fibrosa, ramulos promit fruticosos, sesquipalm ares, complures, graciles, tenellos: foliola Rotæ, Alfinæ, vel Helioscopij Tithymali minora, bina, & post flosculos luteolos iuxta exortum singulum, marſupiolum exile tricoccum, nec diuersum à ceteris Tithymalisi tametsi exile admodum, semine intus meduloso candicante Papauerino. Succum lacteum tota fundit planta, planèq; Tithymali speciem fatetur.

PEPLIS.

VT nomine sic effigie hæc Peplum presert, & propius adhuc etymum Pepli, vel flammæoli exprimit: idcirco θημων ἀμφιλαφής Dioscoridi designatur, quia fruticat
vberiore

Ejss. Mas. 1260

vbriore vndequaq; ramulorum comosa concinnaq; sobole in Pepli speciem collecta, phaniceo colore purpureosie, nitentibus viticulis sesquipalmaribus & folijs minoribus, numerosioribus quam Peplij, Chamæfycæ inter & Portulacæ agrestis (cui quàm similima tota) flosculi item pallentes ex luteo, & semen tamen maiusculum, triccoccum, Peplij aut Chamæfycæ, Augusto edit, lacte turgidû acri: Littora Norbonensia Thyreni & Adriatici maris hanc repticem abundè fundunt, ignotam alioquin Septentrionalibus, nisi hortis.

CHAMÆSTYCE.

ET hæc faciliè de illis duabus cognatis nosci potest, rarior tamen multò, nec vspiam Italiæ aut Germaniæ, sed duntaxat in Norbonensis Galliz oliuetis viticisq; vbi plurima, præsertim aridis sabulosis, non procul Monspelio ad patibulum via, & tractibus maritimis. Pulchella tota & tenera, ramulis & foliolis numerosis, humi reptantibus, ex pallido viridibus, non dissimilibus aut disparibus Herniariæ, sed lactescens, vti duæ superiores: & simile semen, thecam & flores, sed cuncta minora.



νίσιον, ῥοδάκοντα, ἢ ῥοδόλευκον. NERION, Oleander, Laurum
Rosa, & Rhododendrum purpureum & album.

{ Gal. Rosage.
Ger. & } Oleander boome.
Belg.
Ang. Oleander.

Mas. Ejss. 1103

ΝΥΜΦΑ Nereides fortassis huic nomen dederunt: apertius alij Rhododendrum, quasi arboream rosam, vel Rhododaphnem, id est, Lauream Rosam, vocitarunt. Non admodum frequens, nisi tepidioribus ad meridiem mareq; vergentibus fluentorum crepidinibus & littoreis, cuiusmodi ad Olbiam Galloprovinciæ, Genuam Ligurum, & Lybornam arcem maritimam Thufci Tyrrheniæ maris, vbi fruticat sparsis latè ramis surrectis, in alios minores diductis, & denso stipatu foliorum amictis, quæ Laureolæ vel Oleæ angustiora, longiora sunt, Laurinis angustioribus, acutioribus. Siliquas bifores & lanugine papposâ quadantenus vicetoxicis farctas: semine fusco, longo, leuiore. Flores rosea, diluta, purpurilla nitet Augusto Amygdalinis aut Mali maiores, quos interdum rubellos, interdum albos memini tum in hortis Italicis, tum in maritimis. Tota aspectu læta, eoq; in septentrionalium hortis coli solita: alioqui vsus aspersioni, aut metuenti, nisi aduersum venena, ad quæ prodesse, authores sunt, post antiquos, recentiorum quidam Practici, nõ secus atq; Vicetoxicum, foris etiam potest prodesse docente Galeno.

ALPIGENA CHAMÆRHODODENDROS, odora.

QVA Oenoponte Tridenti, Veronamq; quis proficiscitur, videre est interdum vniuersa motis de uexa latera, isto frutice, quasi tapeto purpureo operta, præsertim Iunio, Iulio: quò flores eminus coccineo emicant fulgore, còpacti racematim, pusilli, foliaq; perennia purpurascunt rubetq; Xerapellino còpluria, rigida, crassa, defa, buxæ, & Rhododendri multò


multò minoribus, breuioribus. In sarmentosis, præduri furculis depressis, sesquipedem, & duos altis: sed alicubi penè accubantibus laxo, vel glariæ substratæ. Pinguis est tota, suauis odoratu, suauissimòque aspectu. Alpini illiç Italo-Germani *Alprosen* vocitant. Bacculas Alparagi, vel Taxi pares & concolores, Septembri edit.

ALPINA ALTERA.

CESTIS & rigidissimis cautibus huius quadatèus effigie, floribus purpureis, perquã exiguis: Ericæ foliolis perennantibus, nec deciduis prouenit: humifis tota, à nobis tantum siccata aridàque visâ; eoque minus accuratè descripta.

MONTANA ALLOBROGV *Lentiscifolia, Chamæscifolia, vel Oleastrifolia minus odora, CHAMÆRHODODENDRVM.*

PEDË etiam, siue cubitum fruticat, signo flore, crassiorèque multò stipite, & furculo recuruo, brachiato, rugoso cortice, & intus ligneo, Lentiscino, vel *Sagel* Germanici: folia planè Oleastri, aut Lentisci leuore, colore, magnitudine, rigiditate, crassitie: supernè virentia, subtus ex pallore ferruginea, ex vno principio ferè per cacumina exorta, proximè fructuum corymbaceas umbellas, eleganter quinque partitis apiculis, coronata, Rutæ modo ostentant: flores perpulchri sunt copiosi, Chamærhododendros odoræ similes. Cunctus frutex est gustu, nonnihil aromatico, plusculum astrichionis, & aliquid moderatè calefactionis retinet: remperamento Lentisci, & ferè gustu, non-nihil odoros, attritu non pinguis.



CHAMÆDAPHNE, siue pusilla LAURUS, aut Germanicum Mezerium, an-nuum potius nostrum Chamærhododendrum.

ETHUIC pariter Lauri effigiatuam vindicat nomenclatura Chamædaphne, id est, humilis pumilique Laurus, cui duos nouimus affines vultu frutices, alterum Germanicum vocatum Mezerium, alterum nostrum dudum descriptum Chamærhododendrum. Sed vtra alteri præferenda sit, ambigimus, propter nonnulla quæ ipsi nobis obiecimur inter legendum, quæ de viribus Chamædaphnæ à Dioscoride, Galeno, & Paulo produntur: alioqui aptior Germanica foret: fruticat siquidem binum ternumque pedum, ramulis firmis, sequacibus, cortice & foliis obscurè viridatibus, & Laureolæ, vel Ligustri, & Oleæ; secundum quos Persicæ flores subpurpureos, minores, & grana Piperis rugosi, nigri, iam vietæ maturitatis, per initia tamen viridia; deinde ruber euadit cortex, qui exemptus detegit medullosum granum Canabino, aut Lythospermo maiori simile: gustu ferui- *Granum guidi-* *um.* disimo, & fauces, æsophagumque adurente, diu multumque vexante impressione, postquam deglutienti dederint agyrtæ nummipetæ forenses, vt assolent, rusticis spectatum consuetibus, aut potius illustri alicui potiori, quem vinum nequeat remulentum facere: nam qui vel vnum granulum vorarit, nequit quin & vsque vinum inuergat, quasi in ventriculi vtre, gutturque colluat, donec Baccho remulentiæque desipiar. Proindeque vocitant Piper Rubescum, & Gnidium Granum Pharmacia inficta, quam fouit iamdiu Senensis, decipitque deceptus, qui hæc plantas supina ignauia discendi & inuestigandi

stigabdi, sibi incognitas, horum prorsum confudit. Plurima hæc cum in Germania, & Heluetia, tum in Allobrogum, & Lygurum, Taurinorum, Delphinatûque montibus & collibus Syluosis, opacis. Martio floret, semenque maturat rubrum Augusto. Non minus hæc per alium deicit crassum viscidumque Phlegma, & intestinorum rameta abradit, quam Laureola, cui non dispar, sed vehementior facultas inest, eademque in aceto maceratio ad corrigendum debetur. Sic enim vtuntur etiam Medicorum quoridam præcepta Pharmacopœa, quare facit hæc virium expensio, vt minus quis putet Chamædaphnô legitimam. Quippe quam Dioscorides $\kappa\iota\ \rho\alpha\lambda\lambda\gamma\alpha\iota\varsigma$, id est, capitis doloribus & stomachi ardoribus mulcendis commendat, vt interpretes vertit. At si illa ratio miri queat, qua tam feruida planta pro Dioscoridis Chamædaphne agnosci queat, ea interpretatione commodiore & veriore videtur sita, namque $\kappa\iota\ \rho\alpha\lambda\lambda\epsilon\gamma\iota\omega\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \sigma\omicron\mu\acute{\alpha}\chi\eta\ \epsilon\iota\kappa\alpha\iota\sigma\iota\varsigma\ \acute{\alpha}\epsilon\gamma\gamma\iota$, id est, capitis doloribus & stomachi vitionibus accommodat, veritas, non incommodo sensu intelliges, folia tusa admotaque capitis dolori, puta à frigore, vel flatu, mederi: Stomachique vitionibus faciendis admoventi, ad diuturnas fluxiones sistendas, aque stomacho auertendas: vt Paulus ex antiquis docet faciendû, libro sexto de stomachi vitione, ferro vel caustico non vrente actu, cuiusmodi sunt fungi, aut nigri agarici, frustilla, aliæque inibi scripta, quibus non secus atque foliis huius vti sunt antiqui. Sic Dioscorides magnum præsidium putat Arabicam vocatam vtionem à Græcis, quæ fieri solita fuit spirillis capris Oleo feruenti immerfis, & pollicis cano inustis.

DAPHNOIDES, sive Laureola.

VT nomenclatio, sic natura huius, prorsum pusillam Laurum imitatur, frondibus paulo superius quam à medio caule sursum versus obscure virentibus, nitentibus, crassius, densis, Laureis prorsum, semper virentibus, & Bruma, quemadmodum viscus, flores promëtibus densos, multos, quasi oblongis, gracilibus, stellatis, calathis ex herbaceo albo vel luteolo: bacculis media estate virêtes, deinde maturitate assequutas, nigras, Laurum easdem, sed minores: ramis flexilibus, psuribus, binum aut ternum cubitorû, cortice obductis perquam tenaci & lacratu difficili: radix longior, & durior, durat etiam in hortis facile perpetuo frondium virore vegetiore quam Laurus, quam adeo tota præ se fert, vt etiam plebecula vix conspectam, pusillam dicat Laurum. Vbius ferè Germaniz, Galliz, & Angliz, præsertim Mulomedicis & mulierculis clinicis nimisquam nota, vt mirum sit, Commentatorem Senensem tam ieiunè & manca descriptione hanc designasse: certo inditio non tam negligentiz, aut contemptus, quam ignorantis: quippe figurâ, quam nullis floribus dat, quemlibet alicuius arboris (fortè Mizerei Germanici) turculum præcisum refert, quam Laureolam, cuius mutilam descriptionem, vt quam subdit proximam, & plurimas alias, exscripsisse videtur ex istis authoribus meritisimis, quos hic lacerat, & inscitiz traducit.

*Laureola Pin-
genda.*

THYMÆLEA, grani Gnidi.


COGNATA figuræ & naturæ sunt Chamælea, & Thymelia cum inter se, tû illis dudû descriptis: sed frequentior, notiorque Thymælea, quæ non modò in Galloprovincia & toto Norborensi litoreo tractu, sed etiam Italicis montibus longiusculè à mari Thyrræno disitis, vt sunt Mons Diui Iuliani, & Pisani, Lucensesque colles, vbi nusquam Chamæleam vidimus. Quin etiam in Occiduo Oceano, Galliz Xantonice, ad Rupellæ Insulam, *des Ratz*, vocatam, id est, murium, (quorum Ostreis & radicibus victitatum est alumna illa angusta Insula) fruticula Thymælea multat, cuius nomenclatio effigiem naturamque quadantenus adumbrat. Videtur quippe Thithymelia, quasi Thithymali & Olea mixta facie: Est namq; virgis, rectis, multis, sesquicubitalibus, partim ab stipite, partim ab lignosa radice, habitu, situque Oleaceis angustis foliis, admodum viscidis, pinguibus, inter Thithymalû, Cyparissiam & Paralion, corticofo amictu tenaci cinereo, à summo ad imum degubenti sequaci, instar Laureolæ corticis: summis in virgis flores albidî, pusilli, frequentes, Iunio stellati: Augusto demùm grana, antiquis $\Gamma\epsilon\gamma\gamma\iota\ \nu\epsilon\alpha\iota$ vocata, no-

uena.

vena aut dena, primulū viridia, deinde ex flauo rubētia, tenella cuticula, succo aequo turgida, vnū medulloſū gygartū amicitēte, foris nigrū, intus alba medulla, in qua ser uor ille quæſitus in Gnidio grano, vt expendenti verba Dioſc. liquet, ad cuius imitationem perperā edoctus cū Pharmacopœorū plebe Commētator, qui hāc nō nouerat, Mezerei Germanici granū feruidius inultō, & planē cruſtas inurēs, tum foris, tum intus, nobis, qua ſolet fiducia, ſugillata tum Dioſc. tum recentiorū omniū doctorū ſententia temerē obtruſit. Nam nō coecū ipſum rubrū dat, aut purgare aſſerit Dioſc. ſed Pericarpio cōcluſæ medullæ interiori, cui vni (albam nuncupat) vim deiſciendi Phlegma & cholera attribuit, & abundē explicat, quādo viginti granorū internā partē, quæ ſanē medulla eſt, Pericarpio gygarti nigro ſepta, præcipit dare. Vnde nec ipſas plantas, niſi ſuperba animi inductione à Senenſi incertas, & codicis Dioſcoridei nulla niſi truali lectione, cuius tamen admodum accuratum vindicē ſe fore voluit videri in titō, aſſertas, magno multorū detrimēto, qui illi freti conuenient ad Hydropem ſunt vſi, rati eſſe Dioſc. veras Thymeleas, Chumzeas, Daphnoides & Chamdaphnes, quarū nullā nec legēdo quidē, nedum facie, vel viribus cognitā habuiffe tantum huiorē Senēſem, cui libet vel Pharmacopœo iam liquet.

MEZEREON *Arabum, Chamelea triccocas.*

FERVIDI etiā ſquallidiq; ſoli, ſaxoſi, maritimi, Chamelea, id eſt, humilis Olea vel Oliuella nuncupata, ab ea quā admodū expreſſā eſt fortita cum Olea faciē, ſolijs læuore, habitu, ramis, ſub quibus in Oliuetis cultis prope Frontignanā Norbone vbere fruticat, nec niſi collibus vicinis, arētibus, ſaxoſis, ſponte enatā, perinde facile eſt reperire: nec quidē in Galloprovincia, vbi tamē naſcitur, multo prodit prouētū. Ramorū bicubitaliū ſobole magis ſarmentōſa & ruſtoſa, lignoſa, intorta, quā Thy melez. Folia latiora, viridiora, nigriora, lenticulis lōgiora, auguſtiora, propius reſerūt Oleaſtrum & tenuiſſoliam Phylereā. Flores luteoli, pallidi, Laureolæ minores, eſtate æſtuq; ſummo: Auguſto verō promit virētes, demumq; rubētes bacculas tricocas, Tornefolis ſiue Heliotropij verrucarij, aut Tithymali ſimiles, niſi quia oſiculis eſt præduris, lignoſis, guſtātī medullam ſeruadā & præſecā exhibētib; radix lignoſa, inutilis. Magni tamē ſucci vſus totius plātæ etiā hodie, præſertim Mōſpellij, vbi Pharmacopœi præſſū ſiccātūq; habēt, monēte primū Rödel. cuius imitatione & nos ſæpius deſati ſucci recētis 3. j. & 3. ij. dedimus per ſe, & aliās alijs cathartici Hydtagogis mixtas, perſono ſanē euentu: ſed nō admodū multū excernit, nec vllo effreni motu, vt ſolēt Laureola Mezereon Germanica, Gratiola, & alia. Quin perparū, aut nihil interdū, mouet Chameleæ ſuccus cōcretus, niſi remixtis quibuſdā leni entibus, aut ſimilibus catharticis. cui dā arthritico habitiori, toroſo, procero homini, tres dragmæ nullū excrementū mouerūt. Pueris etiā darus, nec tormina, nec vomitiones facit ſed aquas educit & ſerū. Admotus pubi & abdomini Hydropico, nō vlū præſtātius ad vrinas proliciēdas, quo modo lubētius vtebatur Rödel. Sic etiā Thymelez ſucco, qui tamen difficilius præmitur & elicitur, propter glutinoſū virus: nec niſi tepēte affuſo vino, aut cō ſimili quopiā liquore, vt faciūt dum ſuccū Braſicæ marinæ educūt, quilibet vti poterit. Tundūtur tenella folia, flores, diu & vehemēter, ſæpiuſq; tātillū tepētis vini affūduntur inter tundendum, tūc prælo ligneo vehemētius vrgetur, dum trās colum expiret: tunc igne lento aliquā diu bullit, dum Loch craſſitiem aſſequitur. Demūq; Soli ſeruido obiectum da reſcit, addito ſaccharo, ne muceſcat: ſicq; cōchis recūdebamus nos illic dum agetemus.



PERQVAM similis gustu, facie, viribus, folijs, & virgultis ligneis, gracilibus, concoloribus, rugoso cortice amictis Mōspelliaceæ Chamelæz: faciliè tamē ab hac discerni potest, fructu nimirū Mezerei Germanici, Oleastri, aut Phylereæ nec tricocco, & folijs summis, non atro virentibus, sed tenui, molliq; incana lanugine obductis: quemadmodum & flores pallentes ē lagenulis argēteis, Stramonij similibus, sed minoribus, conspiciuntur. Commanducata fauces inuadunt, non secus ac Mezerei Germanici grana. Ideoq; etiam plebs, Rusticum Piper vocat: Masticata folia lentorem remittunt, vti Soldonella, Thymelæa & Chamelæa Norbonensiū. E Lemanni & Allobrogum vicinis Alpibus solum habuimus.



ALYPVM Mentis Ceti Norbonensium.
Herba Terribilis vulgo.

NOMINIS ducta videtur intellectio, contrario quā se habeat planta sensu: Alypum quippe quasi indolens inoffensumq; & expers molestiæ remedium, Sic fella Græcis glycea, siue dulcia, & Holostium, quæ herbula est teneriuscula, per antinomasiam dicta fuerunt. Sed nialim coniectari ἄλυνον, id est, salsum, vel maritimam, plantam nuncupatam, quia secus mare, vt Dioscorides memorat, oriatur. Tametsi oportunum sit calumniæ, statuere vllam certam plantam hodie pro vero Alypo, propter Arabum & Græcomaurorum scriptorum diuersas, aut planè contrarias opiniones (quarum quæ Actuarij, album Turbith cum Alypō vel Alypia Dioscoridis idem autumat: Mesuæ verò Thapsiam vel ferulæ genus lacteū quoddam, deniq; Serapio Tripolium) tamen cum nullū hodie nostra norit ætas, cui Dioscoridis Alypū assimilari queat, neq; plantā vllam habeamus quæ eque benè, imò villo modo (præter ferulas) Alypo cōgruat, siue lineamentis, siue efficacia purgandi, atq; hic frutex maritimus: sanè hanc quod minus asseramus genuinum Alypum, vna notula non tam obstrepit, quā deest, foliorum nimirū: quæ non fuerūt expressa à Dioscoride, aut fortassis fuerūt labecula codicis peruersa: mutata nēpē voce μαχατεος in ὑπερότερος, vt sit nō subruber, sed fœniculaceus frutex. Hincq; Mesuæ suū Turbith ferulaceum fecerit, vel Thapsiam cum nonnullis, qui eius radicibus quotidiano vsu in Gallijs & Hispanijs purgationes pituitæ, crassæq; & Melancholicæ bliennæ moliantnr. Verū, si vti nonnullis eruditis persuasum fuit, Arabes vocitarūt Turbith, quodlibet phlegmagogum, paulò vehementius pituitam educere: merito & istū fruticem, quem pictum damus, posset quis Turbith vocare:



vocare, nec enim minus malè ominato nomine quàm Turbatorium Turbith vocat ista^{ur} herbam Terribilem vulgus Norbonensium, vbi impostores valetudinis, cauponatores in pij, atq; tribades mulierculæ terribiles, vt vocant, illic moluntur purgationes, istius terribilis fruticuli foliis, floribus, & semine. Siquidem virgultis crebribus lignosis, sesquicubitum & duos alcis, cortice tenui, ex fusco purpurascente, densè cingentibus concoloribus, numerosis ab imo summo tenus foliis exilibus pusillæ myrthi similibus, minoribus Thymelæ aut Chameleæ. Singulis in virgis summis singuli insunt tenuissimorum florum purpurascens glomeruli, nonnihil similibus sed exilioribus & brevioribus delicatioribusq; Scabiosæ staminibus. Radix digitum crassa, fusca, lignosa. Cuncta planta perquam amara, & inamœno Thymelæ aut Chameleæ gustu, aut vehementiore, etiam nū dum hæc commentamur, sexto abhinc anno, auulsa in monte Cæto Frontignan & Mafsilæ, saxosis præruptisq; vtrobique ad mare & Austrum deuexis natalibus: quam si Senensis prorsum siluisset, nec pingendo deprauasset, & melius suo honori lectoriq; consulisset: hanc enim capite de Tripolio, sibi etiam ignoto, vbi multum ineptit, & Alypum plantam tenuibus ferulæ foliis esse dicit, non istam, Dioscoridi imponit, Brassaulæ & alijs locissimis conuiciatur & obreſcat, argumentis ab illorum monumentis mutuò sumptis, etiamq; vestigatore ingenuo, qualem immeritò hætenus sese nobis gloriatus fuit, indigne prorsum & vecordæ plena verba illa inseruit: Nō referte cuius plantæ sit radix Turbith Alexandrinum, cū eius facultates à Medicis optimè sint perspectæ. Sic caprimulgum, scamnidicum, vel aratorem, non commentatorem, loqui decet.

ALEXANDRINVM Officinarium Turbith.

PA^r fermè controuersia de Turbith atq; de Hermodactylis, quarum plantarum vsu aut certè possessione non videmur carere, veriora tamen quænam sint, ambigimus, quia ambigæ fuerunt sententiæ antiquæ. Ac de illis suo loco, hic verò pauca de Turbith. Arabica Semimauræ Orientalium nomenclatio vaga est, vt non paucæ illius gentis voces, signare quamlibet lætæam radicem vehementius pituitam deturbatæ, voluisse videri si sunt, propterea vt quilibet vna magis attisit, sic eam arripuit.

Est enim Turbith vel Turpetum vel Turbith.	}	Serapionis, Tripoli radix Diosc. vt liquet i descriptione.
		Mesua, Herba ferulacea lacte turgentis.
		Aluacarij duplex } Album, quod interpretatur auctor Alypum Diosc.
		} Alterum, Pityusa radix.
Officinarium triplex.	}	Venerorum & Alexandreum videtur, Scammonij antiocheni species.
		Cineritium, à colore, Radix Thapsia vulgaris Nigrum, deterioris quidem notæ, sed aliquando eiusdem cū Antiocheni species.

VLGARE Officinarium Alexandrinum cognominatum diu nos torſit, cū enim audissemus de Gullaudiao Patavium Alexandria reuerſo, nihil aliud esse Turbith Alexandrinum, quàm Myrsinitem Tithymalū, omnes Tithymali species erutas, siccataq; habuimus, inspectione & exploratione expendimus, sed non ita habere depræhēdimus. Etenim, Tithymali ferrati quæ similior est Turbith Alexandreo, cortice est rugosiore, tristi ore aspectu, fungosa, læuioreq; concretionem, gustanti virosior & feruidior, minus firma, & quæ facile non assulatim aut secundum filamenta in longitudinem dehiscit, duraq; non est, nec perinde purgat vt Turbith, cuius exemplum sumi potest in Benedicta laxatæ, cui miscetur Esulæ radix, & tamen blanda benedictaq; habetur.

Porro sub finem capitis de Scammonio, de Turbith quid & quor coniectemur radicem Antiocheni Scammonij, dicemus.

Quodq; superius monuimus succis Chamelæ, Thymelæ, Brassicæ marinæ, & alijs vsu

venire, vt minus, aut feruē, nihil per se purgēt, nisi remisceantur imbecillioribus, sed lenientibus, aut alio modo purgantibus: id idem admodum perspicuum fit in hac radice Turbith. Siquidem non raro nemini datis infuso ternis, quaternisue 3. cuidam non admodum aluo artēz, nihil penitus eduxisse, in aliis excitasse quosdā torminosos murmurillos, aliis aluum semel, bisue citasse. Quin nec in substantia quidem admodum purgat: vti in electuariis Diatribich, Diaphœnicum, de Citro Solutino.

TARTON-RAIRE Gallopro. Mafsilensium.

NOV A nostræ ætati, iuxta ac elegans aspectu hæc etiam maritima Cathartica, eoque vernaculo vocabulo Mafsilensium, *Tarton-raire* vocata, ab exuperanti effreniq; purgandi vi, quæ non raro dysenterias fluxusq; immoderatos alui accersit. Præsertim si quis minus peritus, huius folia in pulvisculū ducta, vel quopiam liquore diluta, propinaret: vt factitabat ille necator Thmiso, qui nobis primum eam, eiusque vires, vt dicebat, arcanas detexit. Circum Mafsiliam locis ad mare deuexis, præsertimque collem vulgò *Mond-rond* vocatū, squalidū, aridū, glareosum, plurima fructat. tota pulchella, tenui incanæque lanugine obsita, candidis, nitentibus, argenteis foliolis crebribus, ab imo ad summū Chamælez, & Thymælez: prorsum sita & magnitudine Alypo proximè descripto paribus: edit virgas rectas, crassiores, vixenas, tricenæ, aut plures, admodum lentas, & fractu contumaces, nec adeo lignosas, cubito longiores, flosculos in summo pusillos, & (ni labat memoria) pallidulos ex albo, semine pullo, rotundo Arthemisæ, aut Ambrosiæ: radix prolixa pedē, simplex cortice albicantē foris, intus candidā, lineo aspectu, & fibris dura, lignosa, gustu non admodum calida, nec amara, nec ingrata, nonnihil tamen caloris impressi postremò relinquentē, & quadantenus Turbith Alexandrinum, siue vulgare, referente, inodora, tota lacis experta.



ESVLA RARA in Læ Venetorum Insula.

COGNATIONIS cōsequutione sibi hunc vendicat locū hæc superius proximè descripta, & Esulā, quam vocant maiore, siue Pityusam: cuius est hæc Venetis Medicis, & Pharmacopœis species: eoque hæc, vulgatæ communis Esulæ vicem supplent in Benedicte confectione, & pilulis Catharticis: purgat enim non segnius Esula communi, eoque putabatur à quibusdam Alypum Dioscoridis, & alii, quàm bene, viderint ipsi, nigellū Turbith, quē Pityusam Actuarius autumat, opinantur. At Pityusa non hæc est, sed perquam similis, ideo vtraq; Esula à nobis vocatur. Sescquicubitum duosque longos caules, fungosos, rugosos, fuscis, crassos minimū digitum, ramulis multis diuisos emittit, pedibus & foliis situ binis, per interualla maioribus quàm Terribilis Alypi, ad Glycyrrhizā proximis, lentis, pinguibus Thymælez: flores pendulos, promētibus pur-



purascentes

purascētes, & fusco obsoleto aristolochiz, vicetoxici effigie. Radix foris pulla, intus villosa lincisq; pelliculis, cuiusmodi in Tartonrare, cinereis, sesquicubito longa, digitum minimū crassa, succo distenta: vniuersa planta lactescit, & prorsum Tythimali parali, cui conuictrix semper visituræ quiparatur. Sed non alibi quā litoribus, & Insulis sanus Adriatici facile reperitur, & in Lio Insula exigua, quæ obex est maris allisionibus.

αἰθῶν. *SEMPERVIVM* siue *Sedum maius crenatum Myrtilifolium*.

Ang. *Honflike & Sengrene.*
Ger. *Groß Hausswurtz, & groß Donderbart.*
Gal. *Ioubarbe grande.*
Bel. *Donderbaert.*
Ital. *Sempervino maggiore.*

N I I L vsipiam gentiū vulgatiū, visitatiū, viuatiū sue, Sedo siue semperviūo, sic nuncupato, de perenni vegetoq; foliorū virote, quæ hyeme & æstate in parietibus vel imbricamētis, etiam nullis, vti videtur, radicibus nixum, aduersus quaslibet cœli impressiones tuetur: Cessili circinataq; basi & ortu pertinacius hæret subgrundijs numerosa folia squammatim digesta, leuore succoq; pellucida, admodum carnosā, mucronata, & linguas pisciū imitata: caulis promittit rectis vtriusq; stipatū, qui flores Iulio & Augusto radiatos, numerosos ex fusco purpurascētes, & rubellos gestat. Huius aquam stillatitiam febribus curandis, præsertim tertianis, & Causonibus propinant mulierculz, edocet ali- cuius monitu & imitatione nam non paucos curant.

Essi. Fusch.
Epah. 17.

Αλδ. *ALOE.*

Ger. *Bitter Aloes.*
Bel. *Bitter Aloes.*
Ang. *Bitter Aloes.*
Gal. *Perroquet.*
Ital. *Aloe.*

Q V I A in maritimis Aloes sponte nasci proditur, non abs re quis suspicetur nomen illi factū à sale vel salo siue mari, cuius afflatu imprimis gaudet, sorte itidem & noani hil foris falsedinis continet, vt cæteræ maritimæ. Peruagatæ cognitionis & vñs, vti antiquis, etiamnum succus, ipsaq; planta: quæ plerisq; Europæ locis in hortis pensilibus feliciter, non secus ac suis natalibus, in sabuleto depacta adolefcit, floretq;: sed quæ in Pisano Hetruriz viroto, & Masilez superioribus annis, proximè Nouum portum in Præfecti horto viscebatur, meritò nonnullis differre à communi altera visa est. Nam præterquam folijs multò maioribus, bicubitalibus, vnciam & sesquiunciam crassius constabat, tum mucronem extremo singulo folio ostentabat, magnitudine, rigiditate & colore vnguis Aquilini politi, non adeo adunci. Cætero item ambitu rostellæ multò minora, pari prope intervallo digesta. Caulis bicubitalis, & tricubitalis, digitum crassus, Hastulæ Regiz, in quo flores cæruleo purpurei è calycibus oblongis. Folia gustati minimè aut perparū amara: cætera alteri similis, & eadē sortē, vt putamus: Neutri enim insignis amaror, nequidem recenti ex Hispanijs in Flandriam, Angliamq; allatæ, vbi tamen Aloes sacchari dicitur. Quia semper virens est Aloe, Aizoon vulgo hodie Græcorum nūcupatur: succus nondum solibus percoctus, vt Brumali tempore, minimum amarus est: quòd cæteris succo multo aqueo obrutus euenire videmus, vt ignauius multò per initia sapiant, deinde maturitatem adepta, expressiorem saporis formam adipiscantur: sic Lactuca mensua dulcis est, trimestris florē & semē promens, amara: Portulaca satua initio, adulta acida. Succorum prima laus Succotrino, quæ Venetijs, si limpidus & lucidus sit, ex rubro fuluescens, emunt ducato, singulis libris: vbiuis Hepaticus infimi precij est.

Essi. Maub.
683. 684.

Tam haud opus est trixari, aperiāt ne ora venarum an claudat: quando innumeris serè periculis factis certum sit, foris admotum claudere, & sanguinem sistere, intrò verò sumptum succum, illis præsertim qui hemorroidibus vexantur, sanguinem attenuare, calfacere, deducere ad venarum oscula, ipsaq; adeò vasorum extrema referare, non secus atq; alij succi non pauci faciunt, vt Porri, Myrthæ, & Vrticæ, quæ nihilò secius calida & sicca sunt,

SEDVM MEDIVM teretifolium, siue minus Semperuium Officinarium.

- { Ger. Klein haußwurt meule, & Flein donderbart.
 Ang. Frickmadam.
 Gal. Petite Ioubarde, & Triquemadame.
 Bel. Cleyn donderbaert.
 Ital. Semperuius minore, seu Pignola, à folio tereti Pinci.

Eff. Fuscb.
 Epib. 18.

ETIAM iisdem natalibus admodum frequens & notum provenit istud: ramulis à radice perquam exili multis, gracilibus, edentibus foliola angustiora, rotundiora, minor, teretia, carnosâ, mucronata, acuta, Salicorniz vel Kali colore & modo: flosculis aureis, stellatis: tota eiusdem figuræ & facultatis atq; maius sedum.

VERMVCVLARIS. CRASSVLA MINOR Officinarium,
 siue ILLECEBRA maior.

- { Ger. Klein haußwurt weibele.
 Ang. Wyde prickmadam.
 Belg. Bladeloosen, & Dapercullkens.

Fusc. Epib. 19.

SEPISSIME etiam hæc colligentes fallit propter natales eosdem, faciemq; adeo minoris sedi similem, vt mirum magis sit prorsum contraria pollere, nempe calfaciendi & vicerandi facultate: tamen discernitur foliis rotundis, teretibus, obliquis, carnosissimis & superne retusis, mucronatis instar vermium, è totis ramis pendulis: flosculisq; pallidulis, vel albidis: demumq; quia non semper virescit, eò ad Illecebram referenda videtur, cuius est facultate. Supina admodum negligetia Commentator noster nobis hanc fortè pro secundo Sedo dedit: nescius, vt vulgus ignarum, facultatum, & immemor verborum Dioscoridis, qui, sicuti monuimus capite de Telephio & Portulaca, quia nec sepe viret nec refrigeraret, non asserit hanc genus Semperuii, sed tantum cognationis & similitudinis causa proximè subdidit, videriq; speciem duxit.

MINIMUM. ILLECEBRA, Sedi tertium genus non Semper virens.

- { Ger. Katzentreibele.
 Ang. Stone crop, & Stone bore.
 Gal. Pain d'oyseau.

Fusc. Effig.
 Epib. 20.

ISTAM pusillam reptatricem pulchellâ floribus aureis stellatis, vulgò notissimam vbiuis & Illecebram nūcupatam Pharmacopœis, Germanis aut Piper murinum, propter acrem exulcerantemq; gustû, quasi Aronis aut flammulæ, nullis vbiuis Italiz, Galliz, Angliz, & Germaniz nō nouit: pusillis namq; ramulis parietes saxosâsq; moles & colles aridos amplexantibus, gracilibus, reptat sed potissimum gustu cognitu perquam facilis, & quæ inauditam focordiam Commentatoris arguit, inq; re herbaria parū exercitatum, vel mentis, vel oculorum acie, qui hanc tam valde vulgarem (tameñ idē cōstat ille frequēs) vbiq; Italiz, Pisis accersat, Guini præconijs & literis assertionis, & quasi in lucem erutâ, acceptâ serat. Quin in Dioscoridis lectione hæc salebra nulla est: hæc enim quamplurimis locis, non pilosum, siue hirsutum, sed densum rigidum vel compactum signare, capite de Britannica, Hypericone, alibiq; non raro, reperias.

ARBORESCENS Græcum, Illyricum, & Anglicum,
 siue maritimum.

MVLTI s abhinc annis huius multas plâtas Veronæ, Patavii, Venetijs, & in Hetruriæ hortis vidimus, cum admodum exoticâsq; putabamus: Postea singularis fidissimûq; amicus Vallerandus Donrez, passim in maritimis Sclauoniæ siue Illyriæ circa Dirachium virentem collegit. Nosq; demum in Sinu Brissloienfis Anglici Oceani Insulis vocatis HOM s, auulsumus copiosum, sed in saxosis, lentis: folijs, paribus, & similibus, vulgare stirpitem ramisq; fruticat lignosis, duris, multis, lentis: folijs, paribus, & similibus, vulgare maius Sedum situ & ortu zmulantibus, minus crassiss: inter vulgare Sedum maius, Laureolam & Tithymalum ambigentibus.

Græcum

Varie
tae ar
bores
cetes.



GRÆCVM verò, quod & Illyri-
um, maius multò & speciosius,
ramis & cortice foliorumq; circi-
nato, per summa positu magis Lau-
reolam imitantibus, crassioribus,
tenerioribus, breuioribus, succu-
etis, cubitu m longis, in scapo pe-
dali & cubitali, lignoso Laureolæ
crassiore.

In Australis Angliz Insula Port-
landia, pusillam, nò multù diuersâ
ab istis forma, ortu, habuimus: sed
quia inter Tichymalos orta & dun-
taxat vna aut altera planta reperta

nobis erat, rati esse ex Tithymalis, aut ex istis prole degenerem, incertâq; stirpem,
nihil certi de ea prodere ausi fuimus.

SEDVM PETREVM Montanum.

AVERNÆ Mindenis & D. Ioannis Mauri Allo-
brogum, montium rupibus & conuallibus hanc
pulchellam sæpius collegimus, nomineq; Sedi Petrei
donauimus, quòd saxis sæpius innascatur: folijs pu-
sillis vno exortu circinatim Sedi ritu, vel potius Co-
tyledonis minoris montani, sed multò angustioribus,
rigidis, quæsi ligulis mucronatis, è quorum medio cau-
liculi pusilli, binos digitos & palmum alti, exeunt, exi-
guis flosculis luteis Sedi minoris onusti, quibus succe-
dunt clypeoli Thlaspi quadantenus. Cur hanc nò nul-
li Phyllon Dioscoridis statuerint nescimus: quum pro-
prior multò sit facie & ortu Sedi generibus, gustu astrin-
gente, exsiccante.



AN CHAMÆPYTHIS maior Diosc. seu altera vermiculata Sedi effigie.

CHAMÆPYTTIDES, quas natura si-
miles Aizois fecisset, & Dioscorides
iisdem assimilasset, hinc annectendas duxi-
mus. Fruticat maritimis litoribus at-
q; insulis Angliz & Zelandiæ, nec non in
squalidis campis Aralate inter & D. Aegi-
dij oppidù, non procul à Rhodani fluëtis,
vberima perénans, Vermiculatâ dicta, nò-
nullis Anthyllis altera putata, propter ne-
cessitudinē, quam cum Aizoo habet. Sem-
per viuet namq; inibi, virgultaq; promit
cubitù & sesquicubitum æquantia, crebra,
incurua, lignea, colore cinereo, folijs mul-
tis, densis, obscurè viridatibus, & inter So-
dum minorem atq; chamæpithim marem
medijs. Radix multum dura, fibrosa, Flo-
res obliiti sumus, puto herbaceos, & meli-
nos, albicâtes, mucosos, Olez. Salso gustu
& sapore succoq; Kali etiam procul à ma-
ri, natæ, vti Aralate. Quam vt nouam, nec
notam, exercitatis ingenijs expendendam
magis proponimus, quàm verâ astruimus.



O. liij.

CHA-

QVæ receptæ utilitatis, & tritz cognitionis vbiq; locorū prouenit Aiuga vel Abiga, ab Abiete, propter odorē, folia, & flosculos Piceæ, Chamæpythis vocata est, mas seu terra Dioscoridi, nō prima, vt Cōmentator statuit. Sabuleta, arida, lapidosaq; vineta & oliue ta amat Norbonæ, vbi perquā odora, furculis gracilibus, hirsutis, inflexis, numerosis, Pini folijs vel Psyllij, minoribus, incanis, confertis, resinosis: exiguis interlertis secus flosculos melinos, Veronicæ fœminæ: Sed femine oblōgo, tereti, fusco. Germaniz, Galliz, & Angliz ruri spōte peruia, sed paucis in locis: eoq; in hortis colitur, ad Medicos tamen vsus odore & virb' ignauior. Radix fibris duriusculis, lignosis, amaro sapore, medicato, subacti, ne tiquā dulci, sed resinaceo, diuq; faucibus hærete. Idcircoq; nōnullis Germanis *pergis myn* nict: id est, ne mei obliuiscare, fortē dicta fuit: quod etymum dū Mathiolus à Germano Pharmacopœo, & Brassauola adductum erroris incusat, immeritò facit: & imperitius mul tō labitur, cū aliam vocatā *ye lenger ye lieber*, id sonat, quō diutius eō amātus, aut gra tius, (quod Amarzduci siue Circæ meritò quadrat) inscitē in hanc transfert.

CHAMÆPYTHIS prima Diof. odoratio.

MINVS nota hæc, & paucis obuia locis, magis tamen odora, collibus aridis & aruis æditioribus, Nicæ Sabaudæ, & Genuæ Ligusticæ, circum urbem Penem in Italia, fruticat, vt quidā affirmant. Qñ etiam eandē vireta nonnulla Belgij sedulò colunt. Radice fibrosa, Sonchi, aut dētis Leonis minore: ramulos palmum altos, humi stratos, & foliolis septos, Semperuiuinoris, aut potius vermicularis, minus carnosus, sed incanis & hirsutis: in quibus flosculi ex melino albid: Suauiore spirat odorem, interdum vliginosum, vt vinea muscūse Quernus, aut Cedrinus.

IVA Moschata Monspeli est, ANTHYLLIS Chamæpytoides.

QVæ in Oliuetis & aridis aruorū marginibus Norbonæ ac Galloprovinciæ fruticat, Quercalibi temerē nota, Moschata etiā vulgò vocata fuit, cōtrariz fragrantiz, significatu (ironicē nēpē) est enim odora, sed olfactu minimè grata, nec Pinū redolēte, verē & odoratz Chamæpytidi cog nata, furculis tamē rigidioribus, farnētosis, lignosis, sed breviorib': copiosa folia, latiora, lōgiora, leuiter incisa, Coronopi aut Psyllij modo emittit, pluri lanugine inca na, inters flores maiores purpureos, & semē hirsutis stipatū Chamæpytidis. Ligneæ radix, gustu amaro, ingrata tota, & nonnihil stiptico, Absynthiū referente: ea propter Kali species illa, aut potius Sedi marini fruticantis, de qua inibi dictū fuit, neutiquam ad renūciat, si con feratur cum hac, Hirsuties, flores, color, odor, sapor, qui hic falsus non petitur, desunt. Adde odoris grauioris, & amaroris aromatici, non falsuginis notam: quam in medicamentis primæ commendationis ad comitiales plerisq; animaduertas, vt sūt Vngulæ Asininæ, Alceæ, & operculū onix dictum, multoq; grauiore odore, Castoreum, & huiusmodi nidore, potu & suffitu excepta, & quarum dotes sibi vindicat multò adhuc certiores.



Κυρυνδαῖον, VMBILICI Coryledon.

Ital. Cope, triuile, umbilico di Penere.

Hisp. Scudetes.

Gal. Escuelles.

Ess. Mat. 1122 VVLGARIS iam notitiæ Coryledon, sic dictum à concauo folio, acetabulum aut umbilicum imitato, circinato, & nonnihil crenato obtusè, leuore plurimum glauco virente

virent, interim purpurascēte, crassq; carnosō, succulento Telephii, aut Cochleariz: radix bulbosā Cyperi rotundior, aut fumariz Plinii, nonnullos pediculos foliorum & cauliculos teneros florum herbaceorum ex caliculis parit, in quibus semē Portulacæ, minus subrufum: gustu tota glutinoso Portulacæ, sed vix æterbo, insipida, frigida: non solum in Italia, Prouincia, Languegothia, sed etiam in Anglia occidenta ad Bristoiā, plurima. In Francia tamen & Belgio, rara, nisi fata fuerit: exit autem semine, tota hyeme viret, marcescunt æstate folia.

COTYLEDON Minus Sedifolio, Montanum.

MERITO hanc Sedifoliā appellamus, cātopere namque cum Sedo quadrat, vt propriōne illi sit quā vmbilico, ambigat vulgus: eoque apud nonnullas gentes Sedum montanum appellitur. Rarior multo superiore, nec nisi quibusdā Alpinis Allobrogū & Pedemontii, Sabaudiaque Ostensi valle vocata, & Minde- nis montibus Auerniz & Germaniz nobis visa. Maio & Iunio flores albicantes, minoris Semperuiui, in caule sesquipalmari plurimū vnico, ex radice fibrosa, nigra, tenui, per foliorum, quasi centrum, eunte: foliorum lingulas oblongas, crassiusculas, imitantium, & tantillum anibitu crenatas, albo vel glauco leuore, colore, caruēque Semperuiui, minoris gustu.



AQUATICA Cotyledon acris Septentrionalium.

NVSPIAM Italiæ vel Norbonæ meminimus hunc, in Anglia vetō & Belgio & Nortmania admodum frequentem, riguis depressisq; pratōrum conuallibus, & scrobibus, vbi torpuerunt per hyemem felides aquæ. Fibrias exigūas, multas, cauliculōsque teneros reptantes, humique fufos habet, folia peltata, ambituque circinato, & leuiore incisura & obtusis dentibus: cristato medio centro, nonnihil depresso, vmbilicum imitante, sed teneriora: stoscūli albidi, penduli subter folia: Iunio & Iulio videntur, gustu calido, acri, linguamque vellicante, inodoro: quem inscitia etiamq; penuria Cotyledonis induunt indocti Pharmacarii Populeo vnguento.

ANDROSACES Cotyledon Marinum herba foliosum.

QUÆ ADMODVM uominis etymo Androsaces, vel, vt nos putaremus, Hydrosaces, feri lotiq; in abdomine, quasi vtre, aliisque è corporis ductibus, e- ductionem pollicetur: sic videtur hic proximē Nym- pheas descripta à Dioscoride, propterea quia non nisi in aquis, & prorsus magna cum Nymphetz similitudi- ne, tamen multum dispari magnitudine crescat. Nec vlli alii, vt genuinæ, Androsace acquiescit animus, præterquam isti, ex Guino summæ eruditionis profes- sore Pilino: in Mathioli commētariis quadruplō maior (vti solent, qui imagines, non plantas viuas, viderunt) ipsa planta depicta, nec tamen ab eo descripta. Perele- gans est, sed perpassilla planta hæc vmbilicata, & vide- tur è genere earum quas parasiticas festiuē quis dixe- rit, propterea quia non nisi aliena quadra velsitur, ci- bo, & disco. Innascitur ferme semper dorsis striatis Chamz conchæ, quæ humi obuolu-
ta sit



ta sit vacua hospite suo Vesco apud Italos *Cape tendo* vocato: Pedicellis cirriforme, glabris, nitidis, exilibus, vncias binas altis, crebris, surrectis, singulis singulis clypeolum medio centro fulcipientibus, circinatum vmbilici, cum ouracis appensis in memoriam reuocantibus, vnde Monspellenses præceptores Vmbilicum marinum vocitarunt: notissima quippe illic Piscatoribus stagni Magalonensis & Lateræ accolis. Frontignæ etiam refluz stagnantisq; aquæ falsæ innumeras plantas obruunt. E fundo quippe inq; aqua, non in aere, crescent & viuunt vt Mathioli pinxit. Virent enim primum ex fualido cinereoq; colore: Postea egesti vndis, exceptiq; litore, albescunt, vt conchilia & corallina vocatæ, quas gustu subfalso & amaro æmulatur: nec dubium quin vrinæ ciat, & materiam articulis impactum digerat. Semen nusquam vllum vmbilicis claudi non putamus, certè nunquam in multis milibus obseruauimus. Ventrem sistere scimus, vt hunc scrupulū eximamus docto & cándido Anguillaræ, qui nescio qua de re Senam & Calsitham hariolatur verisimiles quia emphylla aut aphylla planè contrariæ notæ legatur, potissimum quia aluum soluant, quod hic neq; expetitur, neq; verisimile sit: tota plantula sicciore actu & tactu quàm calidior est, & multum diuretica, quare Galeno aut eius codice error, qui astruit humidā, ex Ægineta & Plinio req; ipsa expungendus.

Fuit quando Tragum ipsædem fere maritimis oriundum, hanc Androsacem opinati fuimus, sed nos retinuit Pliniana versio, quæ accuratior hic, quàm quæuis alia videtur: delineat quippe sine foliis in cirris folliculos, habentem, & in his semen, albam amaram, in maritimis Istriæ. Videtur legisse *δυάκιον*, non *ἐπὶ τῆς κεφαλῆς*, sed *ἀπὸ τῆς κεφαλῆς*, quasi dicat folliculum, pro capitulo, seu verterit ex Dioscoride: seu, vt verisimilius, vterq; ex eodem auctore. Cæterum Cortusi manus valdè leuidens fuerit, si Morfum galinæ vel Alsinæ, foliolis neutiquam nudam, non ex Syria, sed è veteri quapiam maceria decerptam, quis patefaceret Commentatori, qui proinde non ausus fuit oratione repræsentare.

Androsacem PORTULACA Domestica.

Ger. Burgel.
Bel. Pourcelaine.
Ang. Percehenn.
Gal. Pourpier.

QVAMVIS *Androsacem* scribatur, tamen *Androsacem* dicta potius videatur, ortu quod ténacitate quadā læta & carnosa luxurient, ramuli foliaq; albicent, quadā spumosa fuligine siue tenui quapiam aspergine ctenerea, quæ in marina euidentius multò cōspicitur, vbi nec colitur, & aura spumosa asilatur quàm *Androsacem* dicunt. Tribus autem differentiis, quot nouimus penè eadem facies est, præsertim domestica & sylvestris: quarum tamè contrariæ facultates & effectiones videtur principiis genericis differre, & stabilire nostrū docendi modum, qui figurarum priusquàm facultatū annectit seriem. Etenim quamuis Dioscoridi Satina Portulaca refrigerat, Sylvestris tamen calefaciat, & eadem exulcerat. Nec tamen insiciendum, multas esse plantas, quæ quamuis polleant contrariis affectionibus, tamen eodem generis ambitu censi debent, vt hæc marina plāta Portulacæ foliis, & facie, quàm Crithmum Dioscoridis putarunt: nam nihil videtur illi obesse, aut deesse quò minus Portulaca sit. Cæterum, non astringit sed refrigerat, legendum esse norit qui attentius capit de Portulaca apud Dioscoridem à carcere ad calcem lustrarit, ea enim iilius prima & summa facultas, ideo *ἀντὶ τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς συλῆς* facilis namq; lapsus rerum ignaris amanuensis. Et quilibet etiam ex illa vi, quæ hæmediam dentium vestuporem auferit, minimè aut minimum certè astringere deprehendere quit in quotidianis acetarijs, quò vulgo elitantur tenellæ Cymæ, & folia crassa, carnosa, Thelephij & Scorpioidis vulgaris: succulenta tota, rotundis teneris viticulis humi reptantibus, flore pusillo Sedi: semine in theculis feminis Papaueris nigri plenis cauli hærentibus,

QV i Domesticam norit, Syluestrem non potest non nosse, quæ minor duntaxat tota locisq; squallidioribus, vinetis glareolis, viarumq; interdum stratis reptat: ramulis rubentibus, folio Oleastri, figura cætera duplo minor tota: sed gustu acidior, & non refrigerante, sed potius acri calfaciente, vt in Norbonensi agri vinetis & satis, vbi acrior multò, quàm in Anglia, aut humetibus frigidis ad Septentrionem: quin etiam exulcerat, si Dioscoridi fides habenda, apud quem interpretandū φιλλαξία λέειν sūt foliola firma quadam cum hirsutie esse: vt sanè sunt, φλατύα, id est, latiora, quàm Domestica esse: neutiquam sunt, nisi sibi ipsis comparata, quia sunt breuiora & latiuscula, quasi rotundiora: aut sit fortè immutatio illa apud hunc qualem frequetem & Theophrastum latioris & angustioris folij, in Helenio, Phlomo, & alijs non paucis monuimus.

Τηλεφίον *FABA INVERSA, sine CRASSULA, ac TELEPHIV M?*

Ger. Wundkraut, Knabenkraut, soz zwang, und soz weyn.
Belg. wonden Cruyt, & Smeertwoyle.
Ital. Faba grassa,
Gul. Reprise, Ioubarde des vignes, Feue espeffe.
Ang. Orpyne.

VA G V M & pluriuocū fuisse Telephij nomē, ex Crateuz & Dioscoridis geminatis descriptionibus & varijs plantis accommodatis videre est. Crateuz quippe notz, vti recentiores doctiores scitè monuerunt, Scorpioidē, quæ Dioscoridis libri 4. calce penultima appingitur, exprimere videntur: nec sanè abs re, nam facultates illi inesse eximias ad *dissepulicæ* & inuisa vlcera, non modò lectio, sed & animaduersio facti periculi crebra, testatur. Insuper duobus locis duas plantas Telephio nomine insignit, non parùm tamen similes: alteram hoc capite, alteram libro 3. quam Romanis Illecebram nuncupat dicit, vtrāq; facie & viribus vulgò notā: PRIOR CRASSULA dicitur, quia folijs crassis, carnosius, Portulacæ hortenensis non absimilibus, floribus albis, luteis vel purpureis in umbellis Drabæ: cætera prorsum Portulacæ similia, radix alba, carnosā, tuberosa compacta, Dentis Leonis bulbosius, aut Leucacæthæ Dioscoridæ, vinetis, cultis, syluosis, marginibus, saxosis, Angliæ, Sabandæ, Galliæ, & passim alibi abundat. Hanc rigidi censores pro Telephio fastidiunt, & iniqui calore & abstersione carere: respondent periclitatores, illam multis dotibus pollere, & plura prestare quàm quæ Dioscorides scribit: addimus nos, calorem illi non deesse, neq; siccitatem, quantā Galenus & Egineta prodiderunt, nempe primi ordinis, id est, gustui vixdum perceptibilem: siccitatem v. rō cuiusmodi in Semperuiuo: Abstersionem qualē farinæ fabarum & Portulacæ, quæ tamen videntur potius lenire mucoso glutine, cū primo ad pulsū linguam tangunt. Sed frustra sēpe monemus, istos defici modestia & peritia. Etenim si calefactione, siccitate, & abstersione, Telephia curarent vulnera, numā id præstarent presentius, quæ multò tum calidiora, tum magis abstergentia sunt? Sed curata putamus tum potiunculis, tum pulticulis, & fomentis ex ista paratis, ad acrimoniam saniei erodentis, & opus naturæ præpedientis retūdendam, ac cachymiam corrigendam intus & foris.

Effig. apud Dioscor. Epi. 41.

Scorpioides Dioscor. Telephium Cræna.

Alternabatur Dioscorides, vti videtur, vtri esset ascripturus Illecebram Romanis dictam herbulam, Telephij ne generi, propter vsum & nomenclaturā: an semperuiui, propter faciem & figuram: & quia videtur optionem fecisse Lectori, vtrum mallet eligendi, nos Telephio ascribemus. Siquidem non semper uiuit & vrit, atq; eadem præstare potest quæ Telephium, aut quæ in Telephijs & Cacoeticis vlceribus sanandis desiderantur: tametsi alio modo, vt exercitati operum exploratione norunt, idem affectus diuersis, & interdum contrarijs, expugnetur. Sic in vulneribus, capitibusq; fracturis, vtimur calidis exsiccantibus, vt Iside, & de Minio, vel frigidiusculis, interdum humentibus, vt sanguine columbino & Rosaceo, ad mitigandum, digerendum, & expellendum excrementa à parte.

*Math. depicta,
non descripta,
pag. 1305.*

RECENTIORVM verò & MonsPELLIENSIVM Portulacæ folium Scorpioidem, vulgò sic dictam à siliquis corniculis Scorpionis caudæ instar reflexis, Galegæ semine plenis, doctores, qui Telephij speciem coniectabant, non infirma ratione nitebantur. Est quippe foliis Portulacæ flore luteo, non tamen albo, Medicæ aut Trifolij parui, pratenfis lutei: gustu item & facultatibus non multum diuersus. MonsPELLIENSIBUS cum satis, tum VINETIS, LATRENSIS portæ admodum familiaris.

Crithmum Dioscoridis, an Portulaca marina?
Empetrum, vulgò Fœniculum marinum. *Arg. Sempere, Perchepier.*
Cæpea.
Halimus.
Chrysanthemum marinum, Math. Crith. tertium, vel secundum.
Kali.
Salicornia.
Blanchette.

CRITHMVM, seu CRITHAMON, an Portulaca Marina?
Batis Plinij.

PLERÆQUE sunt maritimæ stirpes quæ Crithmi descriptionem quadamtenus designare valent, nulla autem penitus explere. Quod quidem non ut nodum in scirpo queramus, scribemus, sed potius ut hæcæ tricas expediamus, quæ animum quò minus verum statuatur, irretitum tenent. Et paucis vniuersum negotium componi potest. Si stare lubet antiquis herbarum designationibus, vides hic fruticosam dici plantam à Dioscoride folijs pinguib. longioribus, & latioribus, quàm Portulacæ, albicantibus, falsis, & cætera. Huic descriptioni habemus plantam quandam, quæ melius congruit, quàm Fœniculum Marinum, cunctis fermè herbarijs hodie Crithmum putatum, quod nequitiam Portulacæ, ut Dioscoridi placet, sed potius facie tota & umbellis Fœniculo, ut inspectio ipsa vulgus ignarum vocare docuit. Et folia non albescent, sed virent Porraceo colore: nec quia muria conditur & passim estatur, ideo sit Crithmum habendum: etenim non paucæ aliæ sunt maritimæ, quæ in acetarijs expetuntur, & muria seruantur, eisdem fœniculo illo facultatibus pollere creduntur. At illa, quæ à similitudine PORTULACÆ dicta fuit, folijs latioribus & longioribus quàm Portulacæ, atque albicantibus, pinguib. In fabuletis, adeoque faxeis, maritimis, copiosa, cuius flores albi, herbidi, triplicis: multò propior est vero Crithmo. Cæterum, ineptiuscula audacia eius est qui accumulandi tot species vni incertæ, cum quælibet earum longissimè à descriptione absit: alioqui cur non & tam multas Kali species, neque descriptas, nescio an notas Dioscorid. non possit quis vnâ accumulare, & pro Crithmo vindicare: nam fermè omnes naudeis in cibum cedunt, nobis etiam in mare Ligustico acetarijs mansæ, penuria melioris cibi, non pessimi saporis visæ fuerunt.

Et sciunt exercitati, secundum Crithmum Commentatoris planè Pastinacæ aut Eringij gustum, odoremque præ se ferre, vnde Arabum Secacul opinione fecit, vulgus Pastinacam marinam vocat. Vtrumque litus superi inferique maris Italici hac planta scatet, ne non putet Senensis se munus leuidentis à Cortusiana magnificentia accepisse, quod pueriliter solitus est iactare, & inculcare putidiuscula infantia. Tum tertix & quartæ speciei ab illo depictis, quid negotij aut similitudinis cum Crithmo: tertij, etiam flores lutei sunt, radiati, ut Chrysanthemi, quò retulimus: cætera eius delineatio, nihil ad Crithmum. Quantum demum montanum est, non maritimum, gustu & odore Eringij, radice similes sunt, Crithmo valdè dissimiles. Hinc videre sit ea quæ meris assertionibus, non rationibus, aut veris inspectionibus, asserta ab illo sunt, eadem facilitate dirui, atque stabilita fuisse.

FœNICVLVM marinum,
sive EMPETRVM vulgò
Sempere & D.
Petri Herba.
Math. Crith.
promiss. effig. 489.
PORTULACA Marina.
Math. & Halimus vulgaris.
Effig. 160.

Montanum Eringium recentissimum.

fuēte. Hæc si oculis & manibus versaffes, vti nos fecimus, non tam futiliter asseueraffes sententias neq; veras, neq; perspicuas, quæ magno detrimento sunt non modò Tyronibus, sed doctis quàm pluribus.

Κρωδία CEPOEA.

CVm hæc eadem Domesticæ Portulacæ figura, vna aut altera vagula notula radicis & coloris additis, quasi satis foret nota, & reddite illi facultates, quæ satius consimiles sunt, mentione etiam incerta, de Asparago Myacanthino, quem proximè Portulacæ caput, apposuit Dioscorides: Videtur & hæc nihil aliud quàm hortensis, vt vox Κρωδία testatur. Portulacæ species, quæ illinc huc irrepperit, argumento & methodo hic non vestigandis. Eoq; Galenus fortè ratus è Portulacis vnam, eam tacitam præterijt. Marinam Portulacam, spurium Halimum, Becabungam, Crithimum secūdum Mathioli flore luteo, deniq; medijs speciem huc licuit adducere, sed nihil libuit asserere. Neq; ingenuos deceat tyrones, cuiusmodi sumus, tantū sibi indulgere in Naturæ doctorumq; theatro, quantum sibi arrogat αὔρος ἰπὼς Pythagoras alter Herbariorum Senensis noster, qui vt solitus, hanc pro filio suo Odoorico Melchiorio, pro ætate sua non imperito sibi missam, nunc tandem, cognitam asseueret: nec tamen vllam notam addat vel figuræ, vel naturæ, nedum locorum quæ nos certiores faciat, illū Capeam hanc adamusum suam congruentem certam exploratamq; habuisse. Hanc nos superius dedimus inter Portulacas,

ἀλμυρὸς HALIMVS.

ANNO 1563. Octobri mense, quidam Botanicus Italus, qui ex Sclauonia onustus rarissimis plantis redibat, quandam locis maritimis lætam fruticem nobis spectandum dedit, Cisti magnitudine & modo, folijs Oleæ albicantibus, Portulacæ maris, siue Halimi vulgaris: sed semine & flore tunc orbus erat ramus, quem adhuc habemus Antwerpiz. Hanc cuncti Herbariorum Senatus Venetorum Halimum affirmabant: Et Leo ille famosus aegyptia dicebat, se sæpius quosdam, qui in acetarijs teneriorem elitarint vidisse: cui ne nunc quidem magnoperè refragamur, nam salsa erat, & maritima. Sanè planta videtur esse salsa, vel nominis vel natalium argumento, Halimum.

Quid si negationem eximas, & dicas, Dioscoridem dixisse spinas habere, nam vt quid inter spinosas & vallatorias & finitimas, maritima cū sit, recenseret: nam quæ vesica sūt & holera cæca secundo libro disseruntur.

KALI magnum Sedi medijs folio semine coebleato. Sorde, Gallis.

QVAMVIS tres plantæ sint inter se congeneres & maritimæ, quæ Crithimum, vt dudum dicebamus, adumbrare possent: tamen nulla videtur antiquis nota fuisse, aut certè descripta, tantū abest, vt ex hisce S A L istud, vocatum apud Arabes K A L I, ex istarum vna vsta, & quod mirum, fusa fieri nouerint, vix taciturni si sciuissent. Quare vt nomen, sic & plāta, & modus silis istius parandi, videmur Græcis recentioribus, aut Arabibus Philosophis Chymistis & yalurgis deberi, qui ex ista, quam argutè effigiātā damus, copia, per initia Autumni aceruatim super scrobie, cui ligna insunt decussatim instructa, vt accensa meta herbæ Kali dum vritur & liquatur, inq; fundum scobris defluat, cogaturq; in glebam aut saxum pulli nigricantis, vel cinerei coloris, illi vocant Kali, vel S O D A ad vitrum confandum in Italiam inq; Septentrionem ex Gallia Norbonensī & Aquitania deferunt. Vrit non secus æ-



P.i.

causticum

caustici. Hæc species & notior in maritinis Galliz Norbonensis, vbi tum sponte, tū facta, cāpos maritimos frequentia, cauliū rubentium operit purpura. Fruticat etenim canle cubitali & sesquicubitali, carnosio, Portulacæ concolori. Folijs item densis, angustis, fimbriosis, Sedi medijs siue Semperviui minoris teretifolij duplō longioribus, acutioribus, inter quæ semina Limacem pusillum spiramūc imitantia, colore fusca, folliculis Maluæ seminis rita occlusa. Minus obuia hæc Septentrionalibus, imò nuppiam ferre.

BLANCHETTE Norbonensium siue

Kali minus.

EODem ad vltus sedulo colligunt maritimi coloni Norbonenses, iisdem natalibus, folijs, & caulibus minoribus multo, minusq; carnosis, angustioribus, nec ita rubentibus, sed ex pallido virentibus, vnde vulgo *Blanchette*, quasi *Kali album* vocatum. Semen exiguum, nigrum, lucidum, Vrticæ aut Acetosæ. Non solum calidioribus regionibus hæc, sed etiam ad Septentrionem Angliz, Normaniz & Belgij familiaris.



SALICORNIA, siue Kali geniculatum vermiculatum.

Ang. See grape.

MVLTO frequentissima ad qualibet maritimas oras tum Oceani, tum Meditranei maris: sed effigie multo rarior, & cui folia videntur teneri turiones ramulorum: semen nullum. Sunt enim è radice fibrosoiore quamplures cauliculi bicubitales, recti, geniculis multis donati, extremis quasi folijs crassis, pinguibus, carnosis, teretibus, rubentibus, per crebros geniculos insertis, & pyxidatim, quasi alabastriculi, quadā cum Equiseti similitudine, & cornua recta obtusius mucronata imitantibus: gustu non insulso, nec temperamēto aut vltu dispari à cæteris, verum vbiq; neglecta.

KALI spinosum Capite de Tragano.



Lit. erant CHRYSANTHEMV M flore Buphthalmi aut Cenisæ, folijs

Kali, aut lutea muscata.

ILLIS accenseri debet hæc, quam putarunt nonnulli Crithmum, quia non nisi maritimis gaudeat, flore pereleganti, radiato aureo Asteris aut Buphthalmi : folijs pluribus per interualla caulem rectum cubitalem & sesquicubitalem ambientibus, stellatum cingentibus, rectis, pinguibus, ex viridis cinereis, vel pallidis : gustu salso, nec alio quam vna quæpiam superiotum.

Effig. Mat. 491.

sub nomine

Chrythmi.

Perfoliata duplex.

Perfoliata Napifolia Anglorum siliquosa.

Cormitæ Plinij.

Androschemum.

Androschemum Belgarum an Climacum? commodiori loco, proximi Periclimenum,

Ascyrum.

Hypericum.

Centaurium minus.

Centaurium luteum.

Coris Monspeliaca.

Coris Maubioli.

Camphorata Monspeliensium, an Chamæpence Plinij Laricis folijs?

debuisset recenseri inter Chamaepycides.

Antiarthinum	{	Purpureum.
		Album.
		Luteolum latifolium.
		Minimum, siue Oranctum vel Arumium.

Plinianum, siue Diofe, Oxyris.

Linaria purpurea.

Belueder, Scaparia Italorum.

Oxyris vera repens floribus cæruleo purpureis.

Linum sativum vulgare purpureum.

Linum maritimum luteum.

Campanula lutea Linifolia Montis Lupi flore volubilis.

PERFOLIATVM vulgaris flore luteo, folijs
umbilicato.

{ Ang. Therox waxe.
{ Bel. Durrwas.
{ Gal. Perfoliata.

IN Burgundia, Sabaudia segetibus, & latis, alibiq; Gallia Germaniaq; hæc occurrit, Effig. Dod. Epist. 172.
est radice vnica, simplici, fibrosa, multos graciles ramulos promens, quæ folia transmittunt eoque; apud Germanos Durrwachts, quasi folifera vel folifida dicuntur Græcè Λιαφια & Λιαφίλλα. Sunt enim rotunda, cana, Tithymali ampliora, tenera, exsecta, nec pingua, colore ex glauco virentia, & leuore Plinianæ Cerinthæ, cui multum similis. Per Augustum flores sunt in summo pusilli, ambitu radiato ex aureo pallentes: semina fusca Saxifragæ hircinæ pratensis: gustu non amara, sed mansu resinosa, hyperici aut Clymeni. Colitur etiam a Chyturgis ad fracturas, vlcera, & hernias vtenda. Variantem hanc iam pridem & hoc anno vidimus in Morgani horto, floribus speciosiore situ & fertis umbellatis elegantiores.

SILIQVOSA.

QVANDAM item donarūt recentiores *Perfoliatæ* nomine, quæ tamen ambigæ naturæ videtur inter *Barbaream* *Buniadem* & *Perfoliatam*, non minus frequens, sed sæpius in montibus calidiorum regionum, occurrit folijs maioribus, longioribus, asperioribus, habitioribus, rigidioribus, aliquantum sinuatis *Dentillariz* modo, filiquas angulosas *Leucoij* przlongas, exiles, feminis *Brassicæ* plenas aut *Leucoij*. Gustu neutiquam acri.

CERINTHE Pß.

FACULTATE, gustu, & effigie, illis & *Hypericoni*, nõ ita absimili, sed hilariore multò aspectu ea est, quæ *Cerinthem* apud *Plinium* cõiectarunt recentiorum doctissimi nõ pauci, minus tamen incertis admodum indicij: colore ex vegeto viridi, glauco & cæruleo, oculos oblectante: folia sunt oblonga, non disparia superioribus, nec gustu ingrato, sed tamen medicato, & quasi *Climeni* siue *Androseni* *Belgarum* vocati, veluti si quis gustaret ceram nouam molliusculam. Etiamnũ hoc mense Augusti in horto peritissimi *Pharmacopœi* *H. Morgani*, floribus luteis *Androseni* vel *Hyperici* przgnans visitur, semineq; didimo, foris atro, intus medullosò *Canabini* aut *Raphani*. Eius floribus apes capi & oblectari putarint, sũt enim vt venusti, sic nõ insuaues, & gustu subdulci: folia autem cũ manduntur, quiddã ceræ nouæ, aut *Erithacæ* vocatæ, sapiunt, vnde dictam fuisse verisimile est.



Lręgndy. HYPERICVM.

- | | |
|-------|------------------|
| Ger. | S. Johans Kraut. |
| Belg. | S. Jans cruyt. |
| Ang. | S. Johns Wort. |
| Gal. | Millepertuis. |
| Ita. | Hyperico. |
| Hisp. | Coraioncillo. |

Ess. Dod. Epit.
74.

NVSPIAM de elegantiorib. iconibus *Hypericum*, *Afcyrum*, & *Androsenum*, congeneres species, noscitare licet, quàm quæ in *Mathioli* commetarijs affabrè expressæ: hystoria verò iam trãslatitia & vulgarior, tum quia accuratior *Dioscoridis* descriptio, tum quia plantarum inter se tanta cognatio, vt vna duntaxat nota, ceteræ latere queant, si copia adfit, neminem. Vbiq; vulgarissima & vsu tritissima medico & chyrurgo *Hypericum* dicta, margines satorum, areas desitas, & ruinosas sectans, etiamq; lætiora loca. Totã planta multum ortu, virgultis, solo, & tẽpore, sed rotundis, rubentibus floribus & folijs, æmuletur *Centaurẽ* minus: sed huic nomen *Perforatæ* vel *Milleforæ*, quòd folia obuerfa Soli, innumeris ferè poris, acui quasi traiectis, aciem tum nostram, tum Solis transmittant radios. Flores odori, pingues, glutinoso contactu hærent, atq; chartas sanguineo Anchusæve cruore inficiunt. Semen in pericarpjijs copiosum, odorum, resinaceum, amarum, & ingrati gustanti, ad vulneraria balsama nulli secundum, multo Chyrurgorum peritissimorum *Monspeliensium* experimẽto, vbi etiam oleum vernaculè de *Trescalen* vocatum, quotianus paratur longè optimum ad hunc modum.

OLEVM HYPERICONIS.

Accipit

Accipit summatatū Hyperici } añ. ℥. ij.
& olei communis.

Myrrhæ } añ. vnc. ij.
Gummi Elemni }
Terobinthinæ. vnc. iij.
Aloes. vnc. j.
Thuris } añ. vnc. f.
Mastiches.

Infundantur, bulliantq; in diplomate ex arte. Ad Icterus etiam & Calculum utilitas conspicua.

ASCLEPIUM.

SECUNDVM Hypericum est Ascyrum notissimum, annuum & rigorum riuulorumq; Eff. Mab. 937
pratensium amans valde, quadratos rectos viticulos è radice multum fibris sparsa exiles
erigens: alterius folijs paulò maioribus, venosis; punctim poros peruios habetibus, & flo-
ribus itidem luteis, coccineum cruorem affricanti illinentibus. Semen odore resinaceo
sui indice, nares feriente. Haud disparis, sed infrequentioris usus.

ANDROSEMVM excellentius dictum, seu magnum.

VTexcellentius, sic rarius, nec nisi opacis & syluosis gaudens, verius Androsemum vo- Eff. Mab. 939
catum, quòd non modò floribus, sed etiam folijs tritu & pressu muricem remittat
succum, quo vno præ cæteris Androsemum agnoscas, & discernas, par est: Procerior ma-
iorq; tota, & altero tâto maiora folia, pauciora, quàm Hyperici, cui etiam similis flore &
semine: Procerioribus, bicubitalibus, gracilibus, rotundis, rubentibus ramis. In collibus
& nemorosis pone Rioli Pedemontanæ arcem: Norbonensibus etiam Seuenis pas-
cuis & Syluosis, etiamq; in Anglia ætate superiore prope Bristoliam: In Vincentij prærup-
tis & syluosis trans flumen.

ALTERVM tomentosum.

IN agri MonsPELLIaci locis natura vdis & substillis, sed teruidioribus Solibus excoctis, sæ-
pius Hypericū occurrit palmo non mains, & humo pronins, folijs item minoribus ex
intervallo rarioribus flore & semine luteolis pallidioribus, tota cana & hirsuta, minus o-
dora: non alio sapore, sed imbecilliore.

CENTAVREVM paruum.

NVLLE non notissimum Centautium, Hypericoni omni sui parte simillimum, nisi Eff. Mab. 637
flore rubro & insigni amarore (vnde Felis terræ nomē) discerneretur facilè. Accura-
tiores nimio figuratum aut descriptionū exactores, qui Centaurij minoris notas expres-
siores desiderant, nodum in scurpo quæzunt: vtinam non multò plures deterius insigni-
tas haberemus.

CENTAVREVM luteum.

QVID verò de isto altero luteo sentient, magno-
perè scire aueamus. Quamplurimis tum Galliz, tum An-
gliz locis, istud luteum nuncupatum: prope Rondel-
letij & Assatij prædia, multa MonsPELLij: collibus vrbi
Bristolæ eminentibus, inter segetes itidem. Radice
exigua, folia ima proximè humum pusilla & strata, vt
in altero. Caulis sesquipalmum altus, ex interuallis
bina folia, aut potius vnicum binis apicibus vtrinq;
donatum traiecit, non secus atq; Periclimenis videtur
huic & superiori contigisse: nam Periclimenon alte-
rum, traiecit solium, præsertim superius, prope flores:
Alterū, bina distincta folia, Floribus alterius, sed aureis

P. iij.

intense



intense luteis, amara est: quid vñ præstet nobis nondum cõpertum est.

CORIS *Monspelliaca.*

Kοῖς, aut potius κός, virgo, puellãve dici potuit, quia tota pulchella & perquam hilaris vultu hæc nostra: verum Hippocrates & antiqui, κοῖσις, id est, pupillã, vocarunt, propter semen oculi pupillæ, seu anteriori humori crystallino ambitu sphærico, haud abfimile, cuiusmodi in hac cernitur: quam quia nusquam nisi Monspellij & Frontignanæ ad radices Ceti, & prope Magalonem, reperimus, nec alibi notam audiuius, ideo cognominem fecimus vrbi, lectissimis nobilitatẽ stirpibus. Hanc autem perraram nisi huc appositissimẽ quadrasset, Ericã minimam putassentus, aut mediz cuiusdã inter Hypericũ propter purpurissã, & Aiuze propter folium naturæ: Iam non aliõ, quàm ad Corin referri posse arbitramur. Fruticat quippe ramulis multis, dẽsis, duriusculis, surrectis, rotundis, palmũ altis & sesquipalmũ, lignosis, cuius etiam foliola densẽ stipata Ericæ maioris, & condita, florum purpureorũ tyrsulis consimilibus, purpurea, cœrulea, nitidiorẽ & amœniore decoris spectantur. Semen vtriculis mollioribũve alabastriculis conclusũ, rotundũ thamarisci par, glaucum vel pullum, tenuissimis tuniceis glumis inuolutũ, quasi ocelli pupilla tutior inde futura foret. Radix multò sanẽ maior, longior, & crassior, quàm pro plantæ modo, Anchusæ minoris par & cõcolor. Tota namque planta rubella visitur, & succo purpureo radices pannos imbuendo cõmendatur: amaricat gustu subacri, non in odora. Eapropter Corin nõ dubitarunt profiteri Rõdelletius & Aslatus, doctissimi Præceptores, & in Academia simpliciiũ indagatores, quibus frequens assentiebatur auditorũ corona. Cuius tamen elegantia si minus capiantur isti morosuli plumbei censores, quibus nihil penẽ à nostra mediocritate profectũ placere quit, arrigat aures attenti, magni Senẽs de Cori historiam percepturi, qui sic inquit, vbi nuda Dioscoridis verba recitauit, & in Italia (vt nullies repetit) nasci dixit: Sed quòd de Cori mentionem fecerit Galenus in simplicium censu, mihi incompertum est. Quæ denique κοῖς, Græcẽ, Coris etiam Latine, & Cori Italicẽ vocatur. Hactenus est cõmentatus ille maximus Mathiolus, cuius sanẽ mirandum cùm in cæteris plerisque, tum maximẽ in hac planta cõmentanda acumen, quo Italici rerum nunquam forte auditarum, nedũ cognitarum nomina eruit noua, & literis mandat. Et porro pictori negotium relinquit figuræ exprimendæ, si viuam, nõ pictã vidisset, melius forẽ nostræ cognitioni & suo honori cõsulisset. Cõsulamus igitur nos huius figura & natura representanda, illi operosæ molis volumini plerumque muto.



Mathioli Coris.

CAMPHORATA *Monspel. an (HAM AEPEUCE*

sive humilis Picea Plinii?

SATIS adumbrare videtur CHAMÆPEUCEM Monspelliensibus Cãphorata herba vocata, emittit quippe è radice lignosiore cauliculos plures, graciles, rectos, pedales, foliolis Laricinis dẽse stipatos. Gustu desiccãte, insipido, Nemaufensis Amphitheatri augustæ antiquitatis in hiulcis parietibus, per vetustatem rimas agentibus, hæc prouenit, nec non alibi prope Nemauium & Monspelliũ, inter pontem Iuuenalem dictũ, & Portam Latrensem: in Gallia verò, & reliqua Italia, raro occurrit.



ANTIR-

{ Germ. Drant.
 { Angl. Calfes snout, or snap dragon.
 { Gal. Moron violet.

NON potuit commodiore, veritate, insignioreve nota prodi hæc planta, quam Antirrhini, siue naris Vituli nuncupatione: nulla nãque stirpiû seminis inuolucro, caput, vultum, nares, oculos, adeoque hiatum oris vitulini exprimit, atque hæc, quæ in Italiis & Galliis, præsertim Prouincialis & Norbonensis, admodum obuia inter oliueta: floribus conspicua purpureis, ex rubro violaceis, oblongis, vel roseis, vel albidis, calathum effigiantibus, sed supernè buccas flaccidas, rictuque Leonini oris æmulantibus, & conuiuentibus, non patulis, quò sedulæ apes inde mellificaturæ, si sortè irrepererint, rursum quasi valuulis occluduntur. Et folia & cauliculi sparsi, fragiles, Leucoii, lutei, siue Keyri, nec radice absimili. Semine nigro, nigri papaueris minore, hortis Belgicis, Anglicis, & Germanicis, florum decoris causa colitur, nec ruri oritur.

Effig. Dod. epit.
 219.

Non diuersæ naturæ aut figuræ est luteum floribus Antirrhinum, sed dumtaxat foliis latioribus, breuioribus, nec in agris perinde frequens, hortis dumtaxat vt peregrinum alitur.

MINIMUM forsan Archigenis ORONTIVM, vel Aurantiolum
 quo aurigenum morbum siue lberum lenat.

ETHÛC Antirrhinâ esse docet capitula membranacea vitulinæ, aut Simiz caluariz, profrû figuræ: folia, flores purpurei, profrû similia, sed minora, & secundû foliorû exortus per intervalla prodeuntia, minora, vt est ipsa tota planta exilior minûsque fruticosa, vbiuis tum hortorum, tum in cultorum marginibus sponte plurima, apud Germanos Orant vocata, nomine, vt videtur, persuaso & deflecto ab Archigenis Orontio, iam minor, iam maior & lætior prodiens, folia angustiora multò lini aut osyridis. Quapropter nonnullis hanc Pliniano Antirrhino eandem esse, visum fuit.

Dod. effig. 220.

Ὠσýρις. O SYRIS aut Lunaria, quæ vrinariæ, aut Plinii antirrhinum, vel Belvedere Italorum, Scoparia?

{ Ger. Lynfraut, vnser frauwen flaschy.
 { Angl. Rode flax.
 { Belg. wild blascy.
 { Gal. Lin sauuage.
 { Ital. & Hispa. Linaria.

INTERPRETATIO nomen claturæ videtur herbâ signare diureticâ, siue vrinariam, si sero siue vrina, quæ græcis ὠσýρις ἢ ὠσýρις, & οὐσýρις, quod est traho: quare cum Linaria vulgaris sit vrinaria vocata, propter insignè vim trahendi vrinæ, & figuræ etiam quàm quævis alia concors, nihil est quær exploratissimam fastidiamus, illam incertæ vis & facultatis peregrinam præferamus, quia verrendo sit aptior, quasi non quàm plurimæ sint frutices, quorum è virgultis possunt scopæ concinnari, neque tamen ideo Osyrides fuerint: nec Galeni quicquam suffragatur sententia, quippe videtur ille & Paulus, sequutus nominis significatum, quasi à verrendo aut purgando fuisset constata appellatio, Osyridem siue Scopariam significasse. Et vbi quis seuerius expendat Scopariam, seu Belvedere Italorum, videbit folia longiora esse, quàm Linariz, & numerosiora, non amara, qualem tamè Galenus & Paulus volunt, nec vilius certi commodi ad ea quæ efficacissimè & venisimè Ictericis fermè in hydropem deductis præstat Linaria vulgaris, vbiq; frequentissima, & Lini similitudine notissima, Esulam minorem adeo imitata, vt prudentiores barbari isto versiculo vtramque necessario distinxerint: *Esula lactesens, sine lacte Lunaria crescit*. Flos tamè est Linariz elegantior, & maior secundum suminos caules in P. iij. fundibulis

Effig. Dod. epit.
 96.


fundibulis, quasi caudicellis Delphinij, aut Regalis consolidæ, fronte verò Antirrhini ritu & aspectu.

LINARIA PURPUREA.

UT fruticosior, sic elegatior multò & rarior, & propior descriptioni, ea Linariæ species, quam primum ad Véganij Norbonensis montium radices, in castanetis Syluis inventam, in Flandriam amicis ferendam multis ab hinc annis miseramus: verum, quia vires exploratas non habemus, paucis notis duntaxat oratione pictam damus: non enim nisi foliis paucioribus, floribus purpureis, ramulis gracilioribus, magisque flexilibus, pedalis, & sesquipedalis, vimineis, etiam verrendo aptis, differt: alioqui primo intuitu Linariam putes.

SCOPARIA, BELVEDER Italerum.

NON perinde bellula hæc aut speciosa videtur re, atque est Italico isto nomine, flores etenim perexiguos, racemosos, obsoleti vironis alis, iuxta quas nascuntur, còcolores fundunt: virgæ numerosæ, sparæ, crebribus foliis, Lino duplò longioribus Psyllij, totâ æstatem virentibus: & propter raritatem exoticam apud Italos in hortis & in pensilibus figulinis vasis ali solita, hodie perquam vulgata.



OSTRIS PURPUREO COERVLEA repens.

PRORSVM similis hæc flore & folio Linariæ superiori purpureæ, cui annectenda venit, cauliculis tamen gracilioribus sesquipalmaribus, non erectis, sed humi prostratis, Polij, Coris Monspelliacæ, aut Sesamoidis primæ ritu: flores cæruleo-purpurea hilariore nitet, Cori concolores. Tota herbula gustu est amaricante, nonnihil acri. Hanc nusquam vidimus, præterquam in viroto nostri H. Morgani.

LINUM SATIVUM, vulgare ceruleum;

ὀνυξ.
 Germ. Glacys & lein.
 Gal. Lin.
 Ital. Lino.
 Belg. Wlascy.
 Angl. Flax.

Mat. offi. 414 PARITER Græcis Latini Linum vocarunt, propter corticis libivæ recta stamina, in filamenta recta diuelli solita, quæ etiam *λιν* dicebatur: unde Linea & Libella, qua directiones

rectiones angulorum & parietū structuræ librabantur. Sic etiamnum hodie filum fabri lignarij directorium Lineam vocant: sic & piscatores, filum, cui annexus est hamulus, lineam. Tam frequētis olim & hodie notitiæ planta, vt præterquā quod de liniaris iam descriptis facillimè percipiatur, etiam superuacaneum sit lineamenta depingere: quæ hanc suis strāgulat amplexibus inter Cassithas relata fuit. Theophrasto visum fuit, Linum degener factum, in Lolium abire. Nostrates coloni sibi visum pernegant, aut auditum.

LINUM MARINUM *Latent.*

I VXTA prata & litora herbida Norbonensis maris, ac inter stagnum & mare stritac, pedalis & sesquipedalibus ramulis rectis, numerosis, gracilioribus, paucioribusque quā lini folijs, lentis, corticeque adnendum commodo, flore non dissimili, sed luteo, minore, Iunio, Iulio. Semineque & pericarpis minutioribus multo: non notum reliquæ Galliz, Germaniz, & Angliz. *Matb. effig. 416.*

CAMPANULA *lutea Linifolia Montis Lupi, flore Volubilis.*

PER quam elegans in deuexis Montis Lupi quæ ad Septentrionē vergit, Linifolia aut Poligala, palmaris hercula, flore luteo peramceno, maiore quā pro plantæ magnitudine, latione aut Volubilis donata, quæ hinc piam damus, vt studiosos illic innotescat, quia rara est, nec alibi nobis visa, sic vsu minus cognita.



Reponenda hæc proxime Telephium, vbi omissa fuit.

ROSEA.

RODIA RADIX.

ROSEAM vocarunt prisci hanc radicem, timoso cortice & frequenti, sed pusillo tubere insignem, roseoque halitu fragrantem, odoris Rosei prærogatiua, quem manū aut attritu nullā radicem, ac ne stirpem quidē, spirare (præter peregrinū illum Aspalathū, cuius meminimus inter frutices) nouimus. Ex Allobrogum & Delphinatū saxolis, mōtosis, nec non Taurinis Alpibus Pedemōtium, iam diu in viretis multis Belgicis, Gallicis, Anglicis, & Italicis, Iulio & Iunio vmbellas edit, luteis flosculis pallentibus & herbidis, Drabæ, aut potius Crassulæ, quā tantoperè præ se fert, caulibus pluribus rectis, & foliorū multiplici serie, ortu, positu, situ, diuisura, crassitie, imò & quadantenus radice loco natalitio, saxeo, macilento, corpulento, rugoso, & disparili coalitu, vt cōgeneres sint putandæ: minora tamen huius folia dentata minutim, Tithymali ferrati proxima, & radix maior, torulis & vberiosis papillis rugosisque insignata, foris fusca, intus albicat virens. Sed vetustior & siccior, cōcolor est adeo schænzæ peregrinæ, vt insitiores interdum fallāt frustra aduultioris, quā gustu excessiue vllius qualitatē vix superare videtur, eoque nobis ferè persuadetur, non procul abesse à Rosæ aut Crassulæ temperamento, quamuis non nesciamus Galeum, eumque sequutos, scēdi calorē gradu donasse hanc: verū non nusquam labi, humanæ esse Mineræ, indicio manifestō est planta Onosma, quā radicem absolutē Hippocrates cum vocasset & descripsisset, magnus ille interpret Pergamēnus nec Onosma esse suspicatus est, sed seorsim duobus in locis, quasi duo fuissent, vnā eādem bis, & iisdem planē

Radix Hippocreat. Onosma Dioseo.

Planè verbis, de Hippocrate mutuatis, describit plantam sine caule Anchusæ similem. Fit hodie nulli in vsum vt propter Medicorum ignauiam, & succedaneorum ad Chephalalgias copiam veniat, vt Rosæ, Roseaceum, Nymphææ, consimilisq; facultatis simplicia, quæ huic proximè subdidit Dioscorides, vnde de facultatibus coniectura elicienda lectori.

Glaux.
Polygala.
Polygonum.
Polygonum maritimum.
Polygonum montanum sericeum minimum.
Polygonum montanum alterum pusillo ceteris fido.
Multigrana Herniaria Serpilla facie.
Serpillon.
Thymum.
Satureia.
Satureia altera.
Satureia hortenſis sativa.
Refmarinum coronarium.
Stachas Arabica.
Lauendula utraque.
Casia Montpellierensium, an Theophrasti.
Hyssopum Arabum.
Hyssopum Grecorum cum Origanis.
Graciola recentiorum, an Paupaner spumum Dioſc.
Helianthus, an Panax Chirimonis aut Helenium, secundum Dioſc.
Pysillum, & eius varietates.
Coronopus utraque.
Serpentina.
Sedi Montani Petrei & Pinalis folia planta.
Myosuros.

GLAVX.

EVSCIS & leguminosis fuit etiam Glaux, à colore foliorum, quæ anerſa glanca spectatur, vti saligna, quas salices Poeta canit. Galax etiam, glax, & eugalacto, quasi Lactea, vel Lactifica dicta, vt quæ lactis vbertatem esu suggereret. Iam verò cum huius frequentior defitus sit vsus, minus licet statuere, etiam si veram nosſes, quænam sit hodie habenda, & è multis, quæ Glaucis emittuntur, aut referunt naturâ, vtrâ vtri sit præponenda, incertum.

GLAVX EXIGVA.

Dod. esig. 39.

EXIGVA tamen illa herbula maritima, quæ nonnullis Glaux vocatur, non perperam quadrare videtur: flosculos enim promit Tunicis, Garyophyllez aut Leucoij, exiguos, florum calices dilutè purpurascences, inter foliola Tribuli, aut Lentis, vel Herniariz similia, crassiora: cauliculos complures partim reptantes, partim & surrectos, teneros, holerraceos, Portulacæ aut Sedi, palmum & selquipalmum altos: cespitem summo, radix gracilis fibrosa: Zelandiæ & Angliæ plerisque mari coterminis, salis lacutribus couallibus reperitur: Morgani hortus aluit. Alteram Glauco affinem putamus è Leguminum familia, eodemque reieciimus.

POLYGALA.

M. abiol. Polygala.

QUAMVIS ob lactis vberi prouentum, quem spondebat nomenclatio, debuit esse notissima Polygala, tamen nullam dum habet nostra ætas quam asserat. Quam autè plantulam quo argumento Senensis Polygolam legitimam vindicet, piget referre, sunt

sunt enim norma Leuiz & plumbeæ illius tãti herols ratiocinationis, quas cuilibet aptes asseri licet adamusim congruent. Sic hîc huius Astragali putati, & alterius huic confimilis, tacitas descriptiones si præterit ille, quiduis libuerit cõminiscatur, & illi sanè per nos fides habeatur: addemus verò nos descriptionem eius, quæ feritur, & pecoris sagina dicitur, nõ item asseueremus audacter incertissimam rem, quod est supinæ ambitionis.

NOSTRA.

LENTICULA foliis & facie crassioribus pusilla & tenera planta in Galloprovinciæ pascuis montosis prouentu multo feritur, flosculi sunt lutei, minores Cityli aut Araci, filiqua & semine minutis, quæ lactis augment prouentum gregi & armentis.

RECENTIORVM Poligala.

QVAM tamen doctis Poligala, aliis Onobrichis visa fuit, non minus placet, si quæ pabulo cedit: duriusculus tamen est ramulis, non leguminosis, aut holeraceis, sed Genistellæ oblongis aut Hyssopi angustis folij: purpurei, pallidi flores, albi interdum Fumariæ, & statim initio Crucis die emicant, eoque Germani Crayssblomen vocant: squalidis Hist. Dod. 11.

Πολύγωνο

POLYGONVM MAS vulgare.

Sanguinaria, Centumnodia.

Angl. knot graspe.

Ger. weggasse.

Belg. wechgras & duycent knoop.

Gal. Corrigiole.

Dod. figg. 74.

SANGVINARIA centinodiæve, innumeris geniculorum nodulis, & foliis rutaceis, vel Hyperici, nihil cõtemptius aut vulgatius habet computa & rura, secus vias, areas, sepulchreta, inuitis diurna diuturnaq; proculcatione & neglectione restibili segete lasciuuit, totamq; æstatem humum insternit virore, reptatu scriptuq; ramulorum exilium viticulorum, qui innumeris flexibus se implicant, semenq; subter foliola in geniculis condant numerosum, triquetrum, pusillum, Rumicis iam defluxis poniceis, aut purpureis Troserpinata, flosculis vel albidis. Rubella est radix, proluxusq; fibrata, vti planta serpit, vnde Proserpinaca dici potuit.

MARINVM MAXIMVM altum.

NON NISQVAM in Adriatico, Veneto & Anconensi litoreis sabuletis, serpissimè autem in mediterranea Norbonensi ora, ab vsq; Marianis aquis, ad Cetum montem aut promontorium dictum, polygonum istud occurrit longè maius, & multò speciosissimum: quippe subter foliola rutacea, candida, glabra, lucida, secundum nodulos & flores candidos condita, partim etiam maiora, longiora viridia, Galegæ aut Portulacæ marinæ habet: radice & viticulis alterius, prolixius reptantibus, humiliorq; instratis arenosis siticulosisq; sabuletis: tota planta albicantibus. Semen ad geniculos in foliaceis thecis candidis nitentib, Salso & astringente gustu. Alibi Galliz, nec Angliz, & Belgiz, nuspiam visa nobis.



MONTANVM minimam niucum & Sericum,

SEd vspiam toto illo collium amœnissimo procurfu comparet quicquam rarius, asperum aut attractu & obseruatu dignius, ista minima, sed pulcherrima argutâq; natura soler.

*Math. depicta,
non descripta,
pag. 1305.*

RECENTIORVM verò & Monspellensium *Portulacæ* folium *Scorpioidem*, vulgò sic dictam à siliquosis corniculis *Scorpionis* caudæ instar reflexis, Galegæ semine plenis, doctiores, qui *Telephij* speciem coniectabant, non infirma ratione nitebantur. Est quippe folio *Portulacæ* flore luteo, non tamen albo, Medicæ aut *Trifolij* parui, pratensis lutei: gustu item & facultatibus non multum diuersis. *Monspellensibus* cum satis, tum vinctis, *Latrensis* portæ admodum familiaris.

{ *Crithmum* *Dioscoridis*, an *Portulaca marina*?
 { *Empetrum*, vulgò *Fœniculum marinum*. *Arg. Sempere*, *Perchepier*.
 { *Cæpea*.
 { *Halimus*.
 { *Chrysanthemum marinum*, *Math. Crith. tertium*, vel *secundum*.
 { *Kali*.
 { *Salicornia*.
 { *Blanchette*.

CRITHMVM, seu *CRITHAMON*, an *Portulaca Marina*?
BATIS *Plinij*.

PLANKYÆ sunt maritimæ stirpes quæ *Crithmi* descriptionem quadamtenus designare valent, nulla autem penitus exploræ. Quod quidem non vt nodum in scirpo queramus, scribemus, sed potius vt hæc tricas expediamus, quæ animum quò minus verum statuatur, irretitum tenent. Et paucis vniuersum negotium componi potest. Si stare lubet antiquis herbarum designationibus, vides hic fruticosam dici plantam à *Dioscoride* folijs pinguib. longioribus, & latioribus, quàm *Portulacæ*, albicantibus, falsis, & cætera. Huic descriptioni habemus plantam quandam, quæ melius congruit, quàm *Fœniculum*. **NICVLVM** *Marinum*, cunctis fermè herbarijs hodie *Crithmum* putatum, quod nevtiquam *Portulacæ*, vt *Dioscoridi* placet, sed potius facie tota & vmbellis *Fœniculo*, vt inspectio ipsa vulgus ignatum vocare docuit. Et folia non albescent, sed virent Porraceo colore: nec quia muria conditur & passim elisatur, ideo sit *Crithmum* habendum: etenim non paucæ aliæ sunt maritimæ, quæ in acetarijs expectantur, & muria seruantur, eisdem fœniculo isto facultatibus pollere credantur. At illa, quæ à similitudine *PORTULACÆ MARINÆ* dicta fuit, folijs latioribus & longioribus quàm *Portulacæ*, atq; albicantibus, pinguib. In fabuletis, adeoq; faxeis, maritimis, copiosa, cuius flores albi, herbidi, *Atriplicis*: multò propior est vero *Crithmo*. Cæterùm, ineptiuscula audacia eius est qui accumulandi tot species vni incertæ, cum quælibet earum longissimè à descriptione absit: alioqui cur non & tam multas *Kali* species, neq; descriptas, nescio an notas *Dioscoridis* non possit quis vnam accumulare, & pro *Crithmo* vindicare: nam fermè omnes nauticis in cibum cedunt, nobis etiam in mare *Ligustico* acetarijs manzæ, penuria melioris cibi, non pessimi saporis visæ fuerunt.

Et sciunt exercitati, secundum *Crithmum* *Commentatoris* planè *Pastinacæ* aut *Eringij* gustum, odoremq; præ se ferre, vnde *Arabum* *Sæculi* opinionem fecit, vulgus *Pastinacam* marinam vocat. Vtrumq; litus superi inferiq; maris *Italici* hac planta scætet, ne non putet *Senensis* se munus leuidentis à *Cortusiana* magnificentia accepisse, quod pueriliter solitus est iactare, & inculcare putidiuscula infantia. Tum tertiz & quartæ speciei ab illo depictis, quæ negotij aut similitudinis cum *Crithmo*: tertij, etiam flores lutei sunt, radiati, vt *Chrysanthemi*, quò retulimus: cætera eius delineatio, nihil ad *Crithmum*. Quartum demùm montanum est, non maritimum, gustu & odore *Eringij*, radice similes sunt, *Crithmo* valdè dissimiles. Hinc videre sit ea quæ meris assertionibus, non rationibus, aut veris inspectionibus, asserta ab illo sunt, eadem facilitate dirui, atq; stabilita fuere.

FœNICVLVM *marinū*,
 sine **EMPE-**
TRVM vulgò
Sempere & *D.*
Petri Herba.
Math. Crith.
primū, effig. 489.
PORTVLACA *Marina*.
Math. lo Flati-
moni vulgaris.
Effig. 180.

MONTANVM *E-*
ringij non recen-

fuēte. Hæc si oculis & manibus versasses, vti nos fecimus, non tam futiliter asseuerasses sententias neq; veras, neq; perspicuas, quæ magno detrimento sunt non modò Tyronibus, sed doctis quàm pluribus.

Κωδέα CEROEA.

CVm hæc eadem Domestica Portulacæ figura, vna aut altera vagula notula radicis & coloris additis, quasi satis foret nota, & redditis illi facultates, quæ satius confimiles sunt, mentione etiam incerta, de Asparago Myacanthino, quem proxime Portulacæ caput, apposuit Dioscorides: Videtur & hæc nihil aliud quàm hortensis, vt vox Κωδέα testatur, Portulacæ species, quæ illinc huc irrepsit, argumento & methodo hic non vestigandis. Eoq; Galenus fortè ratus è Portulacis vnam, eam tacitam præterijt. Marinam Portulacam, spurium Halimum, Becabungam, Crithmum secundum Mathioli flore luteo, deniq; medijs speciem huc licuit adducere, sed nihil libuit asserere. Neq; ingenuos deceat tyrones, cuiusmodi sumus, tantū sibi indulgere in Naturæ doctorumq; theatro, quantum sibi arrogat Άντοχ; ip̃a Pythagoras alter Herbariorum Senensis noster, qui vt solitus, hanc pro filio suo Odorico Melchiorio, pro ãtate sua non imperito sibi missam, nunc tandem, cognitam asseueret: nec tamen vllam notam addat vel figuræ, vel naturę, nedum locorum quę nos certiores faciat, illi Cæream hanc adamnsim suam congruentem certam exploratamq; habuisse. Hanc nos superius dedimus inter Portulacas.

άλιμος

HALIMVS.

ANNO 1563. Octobri mense, quidam Botanicus Italus, qui ex Sclauonia onustus raris plantis redibat, quandam locis maritimis lectam fruticem nobis spectandum dedit, Cissi inagnitudine & modo, folijs Oleæ albicantibus, Portulacæ maris, siue Halimi vulgaris: sed femine & flore tunc orbus erat ramus, quem adhuc habemus Antuerpiæ. Hanc cuncti Herbariorum Senatus Venetorum Halimum affirmabant: Et Leo ille famosus agryta dicebat, se sepius quosdam, qui in acetarijs teneriorem elitarint vidisse: cui ne nunc quidem magnopere refragatur, nam falsa erat, & maritima. Sanè planta videtur esse falsa, vel nominis vel natalium argumento, Halimum.

Quid si negationem eximas, & dicas, Dioscoridem dixisse spinas habere, nam vt quid inter spinosas & vallatorias & finitimas, maritima cum sit, recenseret: nam quę vesca sūt & holeracea secundo libro differuntur.

KALI magnum Sedi medijs folijs femine coccineato. Seede, Gallis.

QVAMVIS tres plantæ sint inter se congeneres & maritimæ, quę Crithmum, vt dudum dicebamus, adumbrare possent: tamen nulla videtur antiquis nota fuisse, aut certè descripta, tantum abest, vt ex hisce S A L istud, vocatum apud Arabes K A L I, ex istarum vna vsta, & quod mirum, fusa fieri nouerint, vix tacituri si sciuissent. Quare vt nomen, sic & plāta, & modus salis illius parandi, videmur Græcis recentioribus, aut Arabibus Philosophis Chymistis & yalurgis deberi, qui ex ista, quam argutè effigiatā damus, copia, per initia Autumnii aceruatam super scrobe, cui ligna insunt decussatim instructa, vt accensa meta herbæ Kali dum vitur & liquatur, inq; fundum scobris defluat, cogaturq; in glebam aut saxum pulli nigricantis, vel cinerei coloris, illi vocant Kali, vel S O D E ad vitrum confandum in Italiam inq; Septentrionem ex Gallia Norbonesi & Aquitania deferunt. Vti non secus æ



P.i.

causticum

causticū. Hæc species & notior in maritimis Gallie Norbonensis, vbi tum sponte, tū sata, cāpos maritimos frequentia, caulium rubentium operit purpura. Fruticat etenim caule cubitali & sesquicubitali, carnosio, Portulacæ concolori. Folijs item densis, angustis, fimbriosis, Sedi medij siue Semperuiui minoris teretifolij duplō longioribus, acutioribus, inter quæ semina Limacem pusillum spiramæ imitantia, colore fusca, folliculis Maluæ seminis rita occlusa. Minus obuia hæc Septentrionalibus, imò nuppiam semē.

BLANCHETTE Norbonensium siue

Kali minus.

EO SDEM ad vñs sedulo colligunt maritimi coloni Norbonenses, iisdem natalibus, folijs, & caulibus minoribus multo, minusq; carnosis, angustioribus, nec ita rubentibus, sed ex pallido virentibus, vnde vulgo *Blanchette*, quasi *Kali album* vocatum. Semen exiguum, nigrum, lucidum, Vrticæ aut Acetosæ. Non solum calidioribus regionibus hæc, sed etiam ad Septentrionem Angliæ, Normanie & Belgij familiaris.



SALICORNIA, siue Kali geniculatum vermiculatum.

Ang. See grape.

MULTO frequentissima ad quaslibet maritimas oras tum Oceani, tum Mediretanei maris: sed effigie multo rarior, & cui folia videntur teneri turiones ramulorum: semen nullum. Sunt enim radice fibrosiore quamplures cauliculi bicubitales, recti, geniculis multis donati, extremis quasi folijs crassis, pinguibus, carnosiss, teretibus, rubentibus, per crebros geniculos insertis, & pyxidatim, quasi alabastriculi, quadā cum Equiseti similitudine, & cornua recta obtusius mucronata imitantibus: gustu non insulso, nec temperamēto aut vsu dispari à cæteris, verum vbiq; neglecta.

KALI spinosum Capite de Tragano.



Litorem CHRYSANTHEMV M flore Bapththalmi aut Conife, folijs

Kali, aut lue mustata.

ILLIS accenseri debet hæc, quam putarunt nonnulli Crithmum, quia non nisi maritimis gaudet, flore pereleganti, radiato aureo Asteris aut Bupththalmi: folijs pluribus per interualla caulem rectum cubitalem & sesquicubitalem ambientibus, stellatum cingentibus, rectis, pinguibus, ex viridi cinereis, vel pallidis: gustu falso, nec alio quam una quæpiam superiorum.

Effig. Mat. 491.
sub nomine
Cbrithmi.

Perfoliata duplex.

Perfoliata Napifolia Anglorum siliquosa.

Corinthe Plinij.

Androsenum.

Androsenum Belgarum an Climacum? commodiori loco, proximi Periclimenon.

Ascyrum.

Hypericum.

Centaurium minus.

Centaurium luteum.

Coris Monspeliaca.

Coris Matiboli.

Camphorata & Monspeliensium, an Chamæpence Plinij Laricis folijs?
debet recenseri inter Chymapyides.

Purpureum.

Album.

Antirrhinum

Luteolum latifolium.

Minimum, siue Orontium vel Aruntium.

Plinianum, siue Diosc. Oxyria.

Linaria purpurea.

Belueder, Scoparia Italarum.

Oxyria rara repens floribus cerulo purpureis.

Linum satium vulgare purpureum.

Linum maritimum luteum.

Campanula lutea Linifolia Montis Lupi, flore Volubilis.

PERFOLIATVM vulgaris, flore luteo, folijs
Vmbilicato.

{ Ang. Theroth waxe,
{ Bel. Ductwas.
{ Gal. Perfoliata,

IN Burgundia, Sabaudia segetibus, & lztis, alibiq; Gallia Germaniazq; hæc occurrit, Effig. Dod. Epæ. 172,
è radice vnica, simplici, fibrosa, multos graciles ramulos promens, quæ folia transmittunt eoq; apud Germanos Dürchwarths, quasi folifera vel folifida dicuntur Græcè Διὰ φύλα. Sunt enim rotunda, cana, Tithymali ampliora, tenera, exucta, nec pingui, colore ex glauco virentia, & lzuore Plinianæ Cerinthæ, cui multum similis. Per Augustum flores sunt in summo pusilli, ambitu radiato ex aureo pallentes: semina fusca Saxifragæ hircinæ pratenfis: gustu non amara, sed mansu resinosa, hyperici aut Clymeni. Colitur etiam à Chyrurgis ad fraaduras, vlcera, & hernias vtenda. Variantem hanc iam pridem & hoc anno vidimus in Morgani horto, floribus speciosiore situ & fertis vmbellatis elegatiores.

Accipit summitatū Hyperici } añ. ℥. ij.
& olei communis.

Myrrhæ } añ. vnc. ij.
Gummi Elemni }
Terobinthinæ. vnc. iiij.
Aloes. vnc. j.
Thuris } añ. vnc. f.
Mastiches.

Infundantur, bulliantq; in diplomate ex arte. Ad Icterus etiam & Calculum vtilitas conspicua.

ASCIRVM.

SECUNDVM Hypericum est Ascyrum notissimum, amnium & rigoruū riuulorumq; Eff. Math. 937
pratensium amans valdè, quadratos rectos viticulos è radice multum fibris sparsa exiles
erigens: alterius folijs paulò maioribus, venosis; punctum poros peruios habètibz, & flo-
ribz itidem luteis. coccineum cruorem affricanti illinentibus. Semen odore resinaceo
sui indice, nars feriente. Haud disparis, sed infrequentioris vltus.

ANDROSEMVM excellentius dictum seu magnum.

VT excellentius, sic rarius, nec nisi opacis & syluosis gaudens, verius Androsemum vo- Eff. Math. 939
catum, quòd non modò floribus, sed etiam folijs tritu & pressu muriceum remittat
succum, quo vno præ cæteris Androsemum agnoscas, & discernas, par est: Procerior ma-
iorq; tota, & altero tâto maiora folia, pauciora, quàm Hyperici, cui etiam similis flore &
femine: Procerioribus, bicubitalibus, gracilibz, rotundis, rubentibus ramis. In collibus
& nemorosis pone Rioli Pedemontanæ arcem: Norbonensibus etiam Seuensis pas-
cuis & Syluosis, etiamq; in Anglia æstate superiore prope Bristoliam: In Vincentij prærup-
tis & syluosis trans flumen.

ALTERVM tomentosum.

IN agri MonsPELLIACI locis natura vdis & substillis, sed feruidioribus Solibus exuctis, se-
pius Hypericū occurrit palmo non maius, & humo pronius, folijs item minoribus ex
intervallo rarioribus flore & femine luteolis pallidioribus, tota cana & hirsuta, minus o-
dora: non alio sapore, sed imbecilliore.

CENTAVREVM paruum.

NVLLE non notissimum Centaurium, Hypericoni omni sui parte simillimum, nisi Eff. Math. 631
flore rubro & insigni amarore (vnde Fellis terræ nomē) discerneretur faciliè. Accura-
tiores nimio figurarum aut descriptionū exactores, qui Centaurij minoris notas expre-
siores desiderant, nodum in scirpo quærunt: vtinam non multò plures deterius insigni-
tas haberemus.

CENTAVREVM luteum.

QVID verò de isto altero luteo sentient, magno-
perè scire auemus. Quamplurimis tum Galliz, tum An-
gliz locis, istud luteum nuncupatum: prope Rondel-
letij & Assatij prædia, multa MonsPELLIJ: collibus vrbis
Bristolæ eminentibus, inter segetes itidem. Radice
exigua, folia ima proximè humum pusilla & strata, vt
in altero. Caulis sesquipalmum altus, ex interuallis
bina folia, aut potius vnicum binis apicibus vtrinq;
donatum trajcit, non secus atq; Periclimenis videtur
huic & superiori contigisse: nam Periclimenon alte-
rum, trajcit folium, præsertim superius, prope flores:
Alterū, bina distincta folia, floribus alterius, sed aureis

P. iij. intenſe



intense luteis, amara est: quid vſu præſtet nobis nondum cõpertum eſt.

CORIS *Monſpelluca.*

Kοῖς, aut potius κοῖς, virgo, puellæ dici potuit, quia tota pulchella & perquàm hilariſ vultu hæc noſtra: verùm Hippocrates & antiqui, κοῖς, id eſt, pupillâ, vocarunt, propter ſemen oculi pupillæ, ſeu anteriori humori cryſtallino ambitu ſphærico, haud abſimile, cuiuſmodi in hac cernitur: quam quia nuſquam niſi Monſpellij & Frontignanæ ad radices Ceti, & prope Magalonem, reperimus, nec alibi notam audiuiſmus, ideo cognominem ſeciſſus vrbis, lætiſſimis nobilitatæ ſtirpibus. Hanc autem perararam niſi huc appoſitiſſimè quadræſſet, Ericâ minimam putâſſemus, aut mediæ cuiuſdâ inter Hypericû propter purpuriſſâ, & Aiugæ propter ſolium naturæ: ſam non aliò, quàm ad Corim referri poſſe arbitramur. Fruticat quippe ramulis multis, deſis, duriuſculis, ſurrectis, rotundis, palmû altis & ſequipalmû, lignoſis, cuius etiam ſoliola denſe ſtipata Ericæ maioris, & condita, ſorum purpureorû tyrfûlis conſimilibus, purpurea, cœrulea, nitidiore & amariote decoris ſpectantur. Semen vtriculoſiſſimè alabaſtriculis concludû, rotundû thamiſci pat, glaucum vel pullum, tenuiſſimis tuniceis glumis inuolutû, quali ocelli pupilla tutior inde futura foret. Radix multò ſanè maior, longior, & craſſior, quàm pro plantæ modo, Anchuzæ minoris par & cõcolor. Tota namque planta tubella viſitur, & ſucco purpureo radices pannos imbuendo cõmendatur: amaricat guſtu ſubacri, non in odora. Eapropter Corin nõ dubitarunt proſiteri Rôdelleſius & Aſſatius, doctiſſimi Præceptores, & in Academia ſimpliciû indagatores, quibus frequens aſſentiebatur auditorû corona. Cuius tamen elegantia ſi minus capiantur iſti moroſuli plumbei cenfores, quibus nihil penè à noſtra mediocritate proſectû placere quit, arrigât aures attenti, magni Senéſ de Cori hiſtoriam percepturi, qui ſic inſit, vbi nuda Dioſcoridis verba recitauit, & in Italia (vt milies repetit) naſci dixit: Sed quòd de Cori mentionem ſecerit Galenus in ſimplicium cenſu, mihi incompertum eſt. Quæ denique κοῖς, Græcè, Coris etiam Latine, & Cori Italicè vocatur. Haſtenus eſt cõmentatus ille maximus Maſhiolus, cuius ſanè mirandum cùm in cæteris pleriſque, tum maximè in hac planta cõmentanda acumen, quo Italæ rerum nunquam fortè auditarum, nedû cognitarum nomina eruit noua, & literis mandat. Et porro pictori negotium relinquit figuræ exprimendæ, ſi viuam, nõ pictâ vidiffet, melius fortè noſtræ cognitioni & ſuo honori cõſuluiſſet. Cõſulamus igitur nos huius figura & natura repræſentanda, illi operoſæ molis volumini plerumque muto.



Maſhioli Coris.

CAMPHORATA *Monſpel. an CHAMÆPEUCE*
ſive humilis Picea Plinii?

Satis adumbrare videtur CHAMÆPEUCEM Monſpellienſibus Caphorata herba vocata, emittit quippe è radice lignoſiore cauliculos plures, graciles, rectos, pedales, ſolioliſ Laricinis deſe ſtipatos. Guſtu deſiccâre, inſipido. Nenau ſeſis Amphitheatri auguſtæ antiquitatis in hiulcis parietibus, per vetuſtatem rimas agentibus, hæc prouenit, nec non alibi prope Namauium & Monſpellîû, inter pontem Iuuenalem dictû, & Portam Latrenſem: in Gallia verò, & reliqua Italia, rarò occurrit.



ANTIR-

Germ. Drant.
 Angl. Calfes swete, or snap dragon,
 Gal. Moron violet.

NON potuit commodiore, veriore, insignioreve nota prodi hæc planta, quam Antirrhini, siue naris Vituli nuncupatione: nulla nãque stirpiû feminis inuolucro, caput, vultum, nares, oculos, adeoque hiatum oris vitulini exprimit, atque hæc, quæ in Italiis & Gallis, præsertim Prouincialis & Norbonensis, admodum obuia inter oliueta: floribus conspicua purpureis, ex rubro violaceis, oblongis, vel roseis, vel albidis, calathum effigiantibus, sed supernè buccas flaccidas, rictûque Leonini oris æmulantibus, & conuiuentibus, non patulis, quò sedulæ apes inde mellificaturæ, si fortè irrepserint, rursus quasi valulis occluduntur. Et folia & cauliculi sparsi, fragiles, Leucoidi, lutei, siue Keyri, nec radice ab simili. Semine nigro, nigri papaueris minore, hortis Belgicis, Anglicis, & Germanicis, florum decoris causa colitur, nec ruri oritur.

Non diuersæ naturæ aut figuræ est luteum floribus Antirrhinum, sed dumtaxat foliis latioribus, breuioribus, nec in agris perinde frequens, hortis dumtaxat vt peregrinum alitur.

MINIMVM forson Archigenis ORONTIVM, vel Aurantiu

quo aurigenum morbum siue lictum lenat.

ETHÛE Antirrhinâ esse docet capitula membranacea vitulinæ, aut Simiæ caluariz, profrû figuræ: folia, flores purpurei, profrû similia, sed minora, & secundû foliorû exortus per intervalla prodeuntia, minora, vt est ipsa tota planta exilior minûque fruticosa, vbiuis tum hortorum, tum in cultorum marginibus sponte plurima, apud Germanos Orant vocata, nomine, vti videtur, persuaso & deflecto ab Archigenis Orontio, iam minor, iam maior & latior prodiens, folia angustiora multò lini aut osyridis. Quapropter nonnullis hanc Pliniano Antirrhino eandem esse, visum fuit.

ὀσῦρις. OSYRIS aut Lunaria, quæ vrinari, aut Plinij antirrhinum, vel Belvedere Italorum, Scoparia?

Ger. Lyntraut, vnser frauen fläsch.
 Angl. Eode flar.
 Belg. vdd vlsch.
 Gal. Lin sauage.
 Ital. & Hisp. Linaria.

INTERPRËTATIO nomen claturæ videtur herbâ signare diureticâ, siue vrinariam, à sero siue vrina, quæ grecis ὀῦς ἢ ὀῦρον, & ὠκός, & ὠκός, quod est traho: quare cum Linaria vulgaris sit vrinaria vocata, propter insignè vim trahendi vrinas, & figuræ etiam quàm quævis alia concors, nihil est quær exploratissimam fastidiamus, illam incertæ vis & facultatis peregrinam præferamus, quia verrendo sit aptior, quasi non quàm plurimæ sint frutices, quorum à virgultis possunt scopæ concinnari, neque tamen ideo Osyrides fuerint: nec Galeni quicquam suffragatur sententia, quippe videtur ille & Paulus, sequutus nominis significatoni, quasi à verrendo aut purgando fuisset constata appellatio, Osyridem siue Scopariam significasse. Et vbi quis seuerius expendat Scopariam, seu Belvedere Italorum, videbit solia longiora esse, quàm Linariz, & numerosiora, non amara, qualem tamè Galenus & Paulus volunt, nec vilius certi commodi ad ea quæ efficacissimè & vetissimè licticis sermè in hydropem deductis præstat Linaria vulgaris, vbiq; frequentissima, & Lini similitudine notissima, Esulam minorem adeo imitata, vt prudentiores barbari isto versiculo vtramque necessario distinxerint: *Esula lætescit, siue læte Lunaria crescit*. Flostamè est Linariz elegantior, & maior secundum summos caules in P. liij. fundibulis


fundibulis, quasi caudicellis Delphinij, aut Regalis consolidæ, fronte vero Antirrhini rectu & aspectu.

LINARIA PURPUREA.

VT fruticosior, sic elegatior multò & rarior, & propior descriptioni, ea Linariæ species, quam primum ad Veganij Norbonensis montium radices, in castanetis Sylvis inuentam, in Flandriam amicis serendam multis ab hinc annis miseramus: verùm, quia vires exploratas non habemus, paucis notis duntaxat oratione pictam damus: non enim nisi foliis paucioribus, floribus purpureis, ramulis gracilioribus, magisque flexilibus, pedalis, & sesquipedibus, vimineis, etiam vertendo aptis, differt: alioqui primo intuitu Linariam putes.

SCOPARIA, BELVEDER *Italerum.*

NON perinde bellula hæc aut speciosa videtur re, atque est Italico isto nomine, flores etenim perexiguos, racemosos, obsoleti viroris alis, iuxta quas nascuntur, còcolores fundunt: virgæ numerosæ, sparæ, crebribus foliis, Lino duplò longioribus Psyllij, totâ zstatem virentibus: & propter raritatem exoticam apud Italos in hortis & in pensilibus figulinis vasis ali solita, hodie perquam vulgata.

OSTRIS PURPUREO COERULEA *repens.*

PRORSVM similis hæc flore & folio Linariæ superiori purpureæ, cui annectenda venit, cauliculis tamen gracilioribus sesquipalmaribus, non erectis, sed humi prostratis, Polij, Cori MonPELLIACÆ, aut Sesamoidis primæ ritu: flores cæruleo purpura hilariore nitet, Cori concolores. Tota herbula gustu est amaricante, nonnihil acri. Hanc nusquam vidimus, præterquam in viroto nostri H. Morgani.

LINUM SATIVUM, vulgare ceruleum;

Græc.
Germ. Flachs & lein.
Gal. Lin.
Ital. Lino.
Belg. Wlascb.
Angl. Flax.

Math. effi. 414 PARITER Græcis Latini Linum vocarunt, propter corticis libivæ recta stamina, in filamenta recta diuelli solita, quæ etiam *lînx* dicebâtur: vnde Linea & Libella, quæ directiones

rectiones angulorum & parietū structurę librabantur. Sic etiamnum hodie filum fabri lignarij directorium Lineam vocant: sic & piscatores, filum, cui annexus est hamulus, lineam. Tam frequētis olim & hodie notitię planta, vt pręterquā quod de linariis iam descriptis facillimē percipiatur, etiam superuacaneum sit lineamenta depingere: quę hanc suis stragulat amplexibus inter Cassithas relata fuit. Theophrasto visum fuit, Linum degener factum, in Lolium abire. Nostrates coloni sibi visum pernegant, aut auditum.

LINVM MARINVM *Latenum.*

IVXTA prata & litora herbida Norbonensis maris, ac inter stagnum & mare fruticat, pedalibus & sesquipedalibus ramulis rectis, numerosis, gracilioribus, paucioribusque quā lini folijs, lentis, corticeque ad nendum commodo, flore non dissimili, sed luteo, minore, Iunio, Iulio. Semineque & pericarpis minutoribus multo: non notum reliquę Gallię, Germanię, & Anglię. *Math. effig. 416.*

CAMPANYLA *lutea Linifolia Montis Lupi, flore Volubilis.*

PERQVAM elegans in deuexis Montis Lupi quā ad Septentrionē vergit, Linifolio aut Poligalę, palmaris herbula, flore luteo peramœno, maiore quā pro plantę magnitudine, Iasione aut Volubilis donata, quā hic pictam damus, vt studiosis illic innotescat, quia rara est, nec alibi nobis visa, sic vsu minus cognita.



Reponenda hæc proxime Telephium, vbi omissa fuit.

ROSEA.

RODIA RADIX.

ROSEAM vocarunt præci hęc radicem, rimoso cortice & frequenti, sed pusillo tubere insignem, roseoque halitu fragrantem, odoris Rosei prærogatiua, quem mansu aut attritu nullā radicem, ac ne stirpem quidē, spirare (pręter peregrinū illum Aspalathū, cuius meminimus inter frutices) nouimus. Ex Allobrogum & Delphinatiū saxosis, mōtosis, nec non Taurinis Alpibus Pedemōtium, iam diu in viretis multis Belgicijs, Gallicis, Anglicis, & Italicis, Iulio & Iunio vmbellas edit, luteis flosculis pallentibus & herbidis, Drabę, aut potius Crassulę, quam tantoperē prę se fert, caulibus pluribus rectis, & foliorū multiplici serie, ortu, positu, situ, diuisura, crassitie, imō & quadantenus radice loco natalitio, saxeo, macilento, corpulento, rugoso, & disparili coalitu, vt cōgeneres sint putandę: minora tamen huius folia dentata minutim, Tithymali serrati proxima, & radix maior, torulis & vberosis papillis rugosisque insignata, foris fusca, intus albicat virens. Sed vetustior & sicciior, cōcolor est adq̃ schenę peregrinę, vt institores interdum fallāt frustra aduultoris, quam gustu excessiue vilius qualitatis vix superare videtur, eoque nobis serē persuadetur, non procul abesse à Rosę aut Crassulę temperamento, quamuis non nesciamus Galeum, eumque sequutos, secūdi caloris gradu donasse hanc: verū non nusquam labi, humanę esse Minerę, indicio manifestum est planta Onosma, quam radicem absolutē Hippocrates cū vocasset & descripsisset, magnus ille interpres Pergamēnus nec Onosma esse suspicatus est, sed seorsim duobus in locis, quāsi duo fuissent, ynā eādē bis, & iisdem planē

*Radix Hippo-
cras. Onosma
Diosco.*

sunt enim normæ Læviz & plumbeæ illius tãti herolis ratiocinationis, quas cuilibet aptes asseri licet adamusim congruent. Sic hîc huius Astragali putati, & alterius huic consimilis, tacitas descriptiones si præterit ille, quiduis libuerit cõminiscatur, & illi sanè per nos fides habeatur: addemus verò nos descriptionem eius, quæ feritur, & pecoris sagina dicitur, nõ item asseueremus audacter incertissimam rem, quod est supinæ ambitionis.

NOSTRA.

LÆTICVLÆ foliis & facie crassioribus pusilla & tenera planta in Galloprovinciæ pascuis montosis prouentu multo feritur, flosculi sunt lutei, minores Cityli aut Araci, siliqua & semine minutis, quæ lactis augment prouentum gregi & armentis.

RECENTIORVM Poligala.

QVÆ tamen doctis Poligala, aliis Onobrichis visa fuit, non minus placet, si æquè paulo cedit: duriusculus tamen est ramulis, non leguminosis, aut holeraceis, sed Genistellæ oblongis aut Hyssopi angustifolij: purpurei, pallidi flores, albidus interdum Fumariæ, & statim initio Crucis die emicant, eoque Germani *Cruysbloemen* vocant: squalidus Hist. Dod. 31. & sciticosis prouenit.

Πολύγονον

POLYGONVM MAS vulgare.

Sanguinaria, Centumnodia.

Angl. knot gras.
Ger. weggresse.
Belg. wechgras & dupsent knoop.
Gal. Corrigiole.

Dod. fig. 74.

SANGVINARIA centinodiæve, innumeris geniculorum nodulis, & foliis rutaceis, vel Hyperici, nihil cõtemptius aut vulgatius habet compita & rura, secus vias, areas, sepulchreta, inuitis diurna diuturnaq; proculcatione & neglectione resistibili segete lasciuir, totamque æstatem humum infertit virore, reptatu serptuque ramulorum exilium viticulorum, qui innumeris flexibus se implicant, semenque subter foliola in geniculis condunt numerosum, triquetrum, pusillum, Rumicis iam defluxis puniceis, aut purpureis *Proserpinata*, flosculis vel albidis. Rubella est radix, prolixiusque fibrata, vti planta serpi, vnde Proserpinaca dici potuit.

MARINVM MAXIMVM altum.

NON NVSQUAM in Adriatico, Veneto & Anconensi litoreis sabuletis, sæpissimè autem in mediterranea Norbonensi ora, ab vsque Marianis aquis, ad Cetum montem aut promontorium dictum, polygonum istud occurrit longè maius, & multò speciosissimum: quippe subter foliola rutacea, candida, glabra, lucida, secundum nodulos & flores candidos condita, partim etiam maiora, longiora viridia, Galegæ aut Portulacæ marinæ habet: radice & viticulis alterius, prolixius reptantibus, humilioribusque instratis arenosis siticulosisque sabuletis: tota planta albicantibus. Semen ad geniculos in foliaceis thecis candidis nitentibus. Salso & astringente gustu. Alibi Galliz, nec Angliz, & Belgiz, nuspiam visa nobis.



MONTANVM minimum nuncum & Ericinum.

SEDE vspiam toto illo collium amenissimo procurfu comparet quicquam rarius, aspectu aut attrectatu & obseruatu dignius, ista minima, sed pulcherrima argutæque naturæ soler.

solertia elaborata plantula: vix vnciam & semunciam æquant denſi cõfertique ramuli ſarmentoli, duriuſculi, denſiſſimis geniculis, & foliorũ quali denticellis, Herniariz aut Thymi tenuifolij foliolis minoribus, per interſitiola viſu vix diſcernenda. Eximio vellere ſericeo & niueo candore lucëtibus glomerulis foliaceis, delicatiſſimis, tenuiſſimisque membranulis contexti flores vniuerſam ſuperne plantam ornant & oculant: exilis radix lignea quàm & cauliculi longior. In aruo cui ſubelliſpecus Frontignanenſis cõcameratio & fornices hæc non ita à Chameiride diſſita. Mirabundus Præceptor Aſiaticus & Iaco. Vtenhouius Gaudaueniſis, commilitones multò doctiſſimi, iam tum Polygonum rebantur: ſeminula aceroſa Erythrodani marini, vix viſu capi queunt prz exilitate.



HERBATURCA. *Herniaria multigrana Serpilli facie.*

SEMINIS feraciſſimam hanc nõ inſcitè vocet quis multigranam humi repticem herbulã: innumeris quippe ſeminulis in ſurculoſis cauliculis, fuſè ſparſis, denſiſſimis, luxuriantibus, arua oliuetaque Norbonenſia ſeātent ad rus Bontomet, altero à Möſpellio lapide, & Riouly Pedemontium, ſecus caſtruni. foliolis eſt Serpilli, ſed Alũz miniuz minoribus, crebribus, creberrimis & ſeminulis, vt Polygonũ (ideo mille grana dicta) media inter & ſubter foliola acernata, Atriplicis Centinodizve minor: floſculi luteoli plurimi. Tribuli terreſtris multò



Herba Turca. minores nec diſſimiles: vniuerſa ex herbaceo ſauet. Herba Turca vocitatur, commendatũque ad viperea maleſicia, venenatũque caſtera, tum foris tum intus vtenda: ad hernias emplaſtris fidem ſuperat, ſiſtatiſia oſtiduo hepatis obſtructiones & Iſteriũ perſanare proditur. Eapro pter nonnulli Helleborinem fecerunt, vt fuſius illic monuimus.

POLYGONVM alterum puſillo virmiculate, ſerpilli foliola.

QUA non ita diſimilis hæc nomine eſt, etiam eodẽ tradenda videtur, quia rara & indiſta hæſtenus fuit: nobis autem induſtrij iuuenis Iacobi Reinaudeti Maſſilienſis Pharmacopœi primũ innotuit. Ramuli & cauliculi ſurculoſis, prolixis, gracilibus Serpilli, humi ſparſis: collibus maritimis Galloprovinciæ, non ſecus ac Herniaria multa luxuriat, è geniculis foliola puſilla, teretia, ſucculenta Aizoï vel Illecebræ, Thymo paruo noſtrati æqualia & ſimilia. Radix prælonga, lignoſa, ſapore amariſcante, calidiuſculo.



Ἐγρῦλος.

SERPILLVM.

Ital. Serpillo.

German. Quendel, ghuener ſeel.

Hiſp. Serpolio.

Gal. Serpolet.

Angl. Wild time

Belg. wild Thyme & onſer brantwe bedſtroo.

ASER

ASERPENDO DICTVM SERPILLVM, hodie quoddam satium, quod habitus & grandius, quoddam sylvestre, incultis marginibus, sterilibus & collibus gaudens: Facies vtriusq; Thymi nostratis vulgaris: flores & folia similia, sed maiora, in gracilibus cauliculis duris, lignosis, reptantibus, in capitulis Thymi vulgaris: flosculi purpura rubentes, nonnunquam & albescentes. Vtriusq; notior facies quam vsus: vsus nempe medicus, non efulentus: si namq; adeo exalfacit & acrimonia siccitateq; tor siones ventris dissipat, qui potest non magno discrimine dari hepati inflammato, aut etiam cerebro adiuueneri phrenetico? Id innuisse videtur Dioscorides, nō inflammato, sed phlegmone ex sanguinea pituita conflato hepati profuturum: Initio quidem ipso, aut potius declinante affectu, neutiquam statu summo: vti nec phreneticis, dum furia cerebrum obsidet. Hæc methodico Medico responsioni sat erunt, verum non exploratori auidiusculo animum explebunt. Dicit enim ille, se Sinapisinos adiuuuisse spleni hepaticis, inflammatis, sicq; morbum curasse, auersa nempe inflammationis materia à centro, & per venarum ductus ad ambitum transvecta, sicq; digesta: Cuius quidem therapeutices nonnulla exempla etiam apud classicios autores reperias. Hæc rationis vmbra sese abdundat qui oleo Vitrioli inflammationes & ulcerationes renum sanare profitentur. Sic carpis & ceruici caustica adiuuentur febribus periodicis euellendis. Sed hæc delitit com mentatori Senensi: nos Botanici sumus. Serpillum refrigerare putatur corpora estu Solis feruida, non secus atq; Allia, Cæpe, cæteraq; acria vesica. Rationis quædam vestigia videre est in diuini Maronis Bucolicis.

In flore varietas
Mat. Eff. 724.
& 725.

duos THYMVM & EPITHYMVM Duplex Mauria Albaste

{ Ang. Tyme.
{ Gall. Thym.
{ Ital. Thymo.
Ger. Weich, und Römischer Queckel.

SI Mathiolo magno licuisset vidisse & meminisse illius maioris Thymi, folijs Tymbræ aut Hyssopi, cuius furculi capitulis spicatis, Stæchadis ritu, floribus operti ex pallido purpurascens, atq; numerosa cirrorum fibrarumve cæsarie implicantur, viriumq; præstantiorum commendatione, ex Syria Venetiâ asportantur: deinde Norbonæ maritimis collibus pusillum Thymum vulgatum, folio & flore Serpylli rigidioris, passim itidem Epithymi cincinnis & capilamentis delicatissimis obuolutum: persuasam sanè fuisset vtriusq; Thymo innasci Epithymum. Neq; enim (ut Mathiolus scribit) id Dioscorides negat, sed tantum maioris, è quo prodit isthæc fœtura, meminit. Monspellienses Medici isto minori Thymo innascente, frequentius, eoq; lubentius vtuntur, quia ibi recentius & copiosius, quam illud Syriacum, iam diuturna & disitisima transvectione semiexoletum. Minus quidem mirum, cum vellepebeculæ nostratis experimento Thymum vulgatum Melancholiam educat. Et maiore conatu quam emolumento instaurat demortuas concertationes Mathiolus, nostrumne seu Arabum cum Dioscorideo sit vnum: Idem certè est, non quidem quo ille ancipiti argumento asseuerat, alioquin non solum plantæ & flaminum flores Epithymum forent: sed etiam omnes plantæ partes, vi purgandi Melancholiam donatæ. Notio ex rerum distinctione perspicua, atq; Dioscoridis lectione. Est enim nihil aliud Dioscoridi, quam capitati flosculi geminative, quibus aptantur caudicellæ, capillamenti instar, coloris fuscii, vel rubelli nitentis: flosculi interdum candidi, nonnunquam herbacei: Thymo verò vtroq; purpurascunt, quibus etiamnum Veneti recentiores, Pharmacopœi, vel nominis, vel etiam vsus argumeto, Epithymi loco vtuntur, & suis Theriacis miscet. Nomen quidem id præfert, & vsus facillè fert: tota namq; planta, nedum flores, purgat. Cur istud Europæum, seu minimum Thymum, non curant sculpendum Mathiolus, viderint critici, aut potius Crætenses, quorum Thymum Cræticum dictum apposuit.

Mat. eff. 721

WuGex. SATVREIA sine THYMBRA
vera S. Iuliani.

Qj.

1a

IN Thyreni maris asperis & salebrosis S. Iuliani Her-
trufci, magno prouentu oritur afpectu perquam ele-
gans Herbula, quam nullus non fatetur Satureiam ve-
ram. Pifanis etiam vernaculo idiomate *Tymbra di San-
to Iuliano* dicta. Virgultis exilibus, palmum altis, fermen-
tosis, lignosis; folijs ab imo crebribus Thymi Cratici,
fed angustioribus, longiusculis, spicâ teretē sūmogerē-
tibus, flosculo copioso intertextâ: Gustu acri & odoro,
vniuersa ex obsoleta purpura albicat, Thymo maiore
minor, minori fermē par, Hęc Dioscoridis germana vi-
detur: Ceteræ verò duę etfi non spicatę, vſu tamen Sa-
tureiæ nomen indeptę fuerunt vulgo: cui in condimen-
tis & lucanicis loco Piperis est: Ea præsertini, quę in
montosis & saxosis Narbonensibus & Pedemontanis
vberrim griscit.



SATVREIA sive *TYMBRA* altera.

Dod. Effig. epir.

232.

HV1c folia rigidiuscula Thymi maioris, vulgaris Hyssopi æqualia, asperiuscula, nigri-
cant superne, bina quaternave oriuntur ex interuallis, & indidem flores promuntur
purpurei diluti: lignosa radice: gustu est Piperis tota, eodq; vulgo Piperella dicta.

SATVREIA Hortensiu.

{ *Ang. Saurie.*
Germ. Kundel, swybel, Zysop.
Ital. Sauriegia.
Gall. Sarriette, Saurie.

Mat. Effig. 723

ALTERA raro ruri, vt plurimum in hortis visitur, folijs quàm hæc mollioribus, angu-
stioribus, paucioribus, tum folijs, tum floribus. Belgis & Anglis quotannis feritur, &
moritur. Fabis cum Selino incisa & infrixa edulium gratum illis frequens habetur.

Quam Mathioli pſicam & germanam reliquit, videtur potius Polium sœmina Re-
centiorum: nec vlla spica donatur, aut in cibis commendatur: deniq; nullam nisi vagam
& incertam est sortita notam.

EPITHYMBRA, EPITHYMUM, &

CASSITHA Plinij.

CÆTERVM, Epithymbra non modò hisce omnibus, sed etiam in Hyssopo Serpillo a-
lijsq; non paucis congeneribus clauicalis innectitur, eodq; meritò ambigitur, suapte-
ne adoleuerit radice, atq; finitimis plantis surrecta sese implicauerit, vnde alimentum vberius
nacta, illi radiculę exaruerint. Sed ex simili ratio facillè liquet. Cuscutę enim oriundi
& arrendi conditio par. Ortu namq; primum & amplexata vites Norbonenses, tam
multis osculis, per quandam quasi synallhomosin, eorum succum populator, & genium
defraudat, vt radices sui muneris minus iam necessarij oblitę, feruore areſcant, & abrum-
pantur, (non secus atq; auraci exareſcunt, foetu excludo, & mutatoimenti ductu) pen-
dulis illis capitulis & staminibus Cassithę in Vitium aliarumve stirpium amplexibus reli-
ctę, vbi ideo putatę enatę. Sic nobis deprehensum in vinetis, & semine collecto & sato
non pauci prodijſſe sciunt veram Cuscutam.

SAXIFRAGIA, sive Saxifraga antiquorum.

I AM SÆPIVS ET NECESSARIO monuimus, Saxifragę vocem ap-
ud Authores esse multivocam, nec vnus cuiuspiam stirpis indicem esse, sed vi-
rium insigniorum efficacęque qua sunt præditę, ferè omnes vulgo Saxifragę vocatę, quę

Græ.

Græcorum Lithontriba possent dici, vt non paucæ cõpositiones, Eoq̃ue Bertonica Galeno, Paulo, & aliis classicis, Saxifragam vocatam, & Kelstrum, cū Meo legimus, quia vtrūque Lithontribū esset, seu tu dicas lapidum terebram, aut, vt Plinius, viriculum. Sed quando opera nostra naturæ ditandæ, & illustrandæ Historiæ studet, nihil attinet anxius sciscitari, irreperit ne huc caput illud, quasi intrusum cuiuspiā Latini amanuensis imperita audacia, vel intempestua commentatiuncula, fortè ad Codicis marginem, prope Tribulū marinum ascripta, deinde inter Tribulū & Limonium inserta. Sanè non videtur caput istud a Dulterinum censendum, aut insititum, quia Latina, vti quiritantur, nomenclatura Græculæ præierit; quippe illa inuersioncula facilè fit, nec sine exemplo, præsertim in stirpibus. Quin Paulus & Trallianus, vt videtur ex Dioscoride & Galeno, non Saxifragam Latine, sed σαξίφαρον, carnem eue exedens, scribunt Græcè, apud quos etiā legas Sapon, id est, Sapo, Stupā, & alia nomina è Latinis mutuata.

NVLAM verò è tam varia Saxifragarum tribu videmur posse Dioscoridis genuinā profiteri, præterquam vnā hodie, cuius laus & prærogatiua penes Italos, & Venetos, præsertim Patauios, etiamnum est. Quāplurimi tractus aridi, cretacei, montosi, saxosi, steriles & sabulosi, vbi Polium montanū & Thymū, provenit: Huius magnā copiā in Italia, Galliæ Delphinatu, & Angliā, fundūt: Sparsis pedem altis, multis crebris, exilibus Serpilli ramulis, conto rtisque vnā & implexis in imo, vbi multis gramineis exasperantur geniculis, vt Polygonatū, radice parua, & paucis fibris impacta, colore albicāte, multū graminē Holousium referente: foliola bina, longiora, angustiora, Tunicis, aut potius Tymbræ Pisanæ magnitudine, & similitudine ex geniculis, in viticulis sarmetosis, exiguis, capillaribus, rectis & sparsis, singulis singulum soscolum oblongum quadamtenus Tundum, exiguum. Hæc vt posterius vsu & nomine Saxifragæ recepta, sic potior & verior, Italæ præsertim hodie credita, tum propter famigeratissimā facultatē, tum etiam propter arctam, quam cum Epithymo videtur habere similitudinem: verū non vsquaque certa isthæc similitudinis coniectura, quam Commentator ex recentioribus exercitatisimis arripuit: namque valde varii codices interdum Thymum, interdum Epithymum, & alicubi neutrum habent: Sicuti videre est è castigatiore Græcolatino Lutetie excuso anno 1549. pagina. 370. Eapropter minimè oportuit illas, quas idem statuebat binas, alteram Thymo, alteram Epithymo (quæ illius est constantia) improbare, & è saxiæ Hetruscis reuellere, vt iisdem rimis tertiam impingeret noua adducta icone.



ANGLICA SAXIFRAGA.

Varietas { Hæc eadē operit Iulio & Augusto acclinem cretaceum, & aridum montem, arte militari ægellum inter Chipnam & Malburū Angliæ, Bristolienſi à Londino via, sed variat floribus, qui longè minores albidī, muscoli, non secus ac tota planta.



Ῥοσμάρῖος ἢ Σαξίφαρις ROSMARINUM CORONARIUM.

Ital. Rosmarino Coronario.
Hisp. Romero.

{ Ang. Rosemary.
Ger. Rosmarin.

{ Bel. & Gal. } Rosmarin.
Q. ii.

Vni.

VNIuersi tractus collesq; aridi, saxei, & steriles, cum Norbonensis, tum etiam Galloprovinciæ, coronario Rosmarino ornantur, ubi vbertim gliscit, & totam hyemem vernat, florēsq; ex pallido cæruleos alit. Tanta suppetit copia colonis, vt etiam clibanis calcificandis, focisq; domi alendo succendatur. Verum inibi minor multo quàm plerisq; locis Germaniæ & Angliæ, ubi culta luxuriat, adultior & procerior multo perennat. Nō tamen vsquam mensas, cytharæve ex illius fruticis rescicibus, radicibus, surculisue samentosis vsquam illis in regionibus coucinnatas nobis videre licuit: qui penē Commētatoris fide freti, fabros illic illud sciscitanti ludibrio fuimus. Oleū parant distillatione perquàm odorū & vtile ex summis virgultis & floribus Paraclyticis & induratis articulis Schyro detentis. Aqua stomacho amica & cordi.

STÆCHAS.

Gallia & Officinis Stachados.
 { Ang. French Lauender.

Effig. Mat. 698

MAGNA voluptate non semel pedibus & oculis lustrauimus florente Stachade purpurascentes colles Norbonæ, asperosq; tractus in Galloprovincia, iisdē atq; spica Lauendula, Rosmarinus, Thymū tenuifolium, & Saturea, durior natalibus: quibus omnibus tanto prouentu scatet, vt etiam clibanis calcificandis satis suppetat. Nobiles verō illæ & rarissimarum stirpium alumnæ Stachades insulæ, huic cognomines, non ex aduerso Mafsilæ, vt perperam ex Dioscoride persuasum est (bidui namque itinere & litore indidem absunt) sed è regione Olbiæ, vulgò Hyeres, vrbecula olim tam lauta, quàm nobili, à qua etiamnum hodie Insulæ Stachades nomē retinent, non Mafsilæ, dicuntur namque Hyeres Insulæ. E radice lignosiore cauliculos emittit cubitales & sesquicubitales, lignosos, in quibus copiosa foliola oblonga, Satureiæ hortensis longiora, albicantia, incana, angustiora, & minorā, quàm Lauendulæ, aut Rosmarini coronarij. Capitulis spicatis in summis virgīs Thynni Cretensis, sed maioribus, è quibus flores foliacei cæruleo purpurei exeruntur. Semine subfusco Vrticæ aut Lauendulæ succrescente. Aduersus omnes capitis morbos à frigida causā efficaces, vsus frequens comprobauit.

SPICA LAVENDVLÆ, ITALIS

Spigo & Nardus Italica,

{ Ital. Lauanda.
 { Gal. Lavande.
 { Bel. Lauender.

{ Ang. Lauender.
 { Ger. Lofaender.

Effig. Math. 31

HABES re nomen Spicæ Latinum & tritum ad Stachadem allusit, idem enim signat Stachas Græcè, quod Spica Latine, nempe propter similitudinem totius, primū facie, deinde saporis, odoris & loci. Vtrauis utriq; simillima, neque specie diuersa. Folio & flore spicato Lyfimachiz, aut potius Vitis purpureo, alias albo: hoc tantū discriminis interest, Spicæ fragrantia maior, grauior, folia maiora & latiora Stachadis: Lauendulæ, aromatici, & gratiæ plusculum: coque affectibus matricis semen & folia commendatiora, tum somentis & lotionibus, tum pulueribus dilutis intrō sumptis, ad suffocationem & ascensum ex vaporibus putridis, & ad partus accelerandos.

CASIA Poetica Monspelliensium an Theophrasti?

POTERICAM Casiam, qui cum Casia siue Canella & Cinamomo, nominis sono ducti congerunt, nulla vt id facerent fuerunt ratione illece: tantò minus stirpium vestigatori sagacissimo Anguillaræ assentiendum, cum Lauendulam & Rosmarinum coronarium Theophrasti Casiam censet. Nec non Guilandinus, inde fessi laboris vir, hallucinatur, dum Chamæleam Casiam esse putat. Neuter id dixisset si vidisset, plantam Romano

Nor-

Norbonensiq; agro vberè prouentu oriundam, Sparthi caule, striato, colore Polemoniz: folijs Thymelez, aut Stechadis, vel Lauendulz: Cocco copioso Cneori, vel Asperagi marini æmulo, glutinoso admodum: caule sesquicubito & cubito alto: Flosculo multiplici Olez, ex viridi flauescente. Hanc Præceptor Rondelletius, Pelliserius Magalonensis & MonsPELLIENSIS Episcopus, perquam eruditus, commilitonemq; nostri, Casia fecerunt, quia in Diosco. deerat & in Theop. supererat. Floret Iunio, semè rubet Augusto, ad ripas Lani prope pontem Castru noui, & alibi passim in Galloprovincia iuxta sepes & oliuetarum margines.



HYSSOPVS ARABVM *Misus & Officinarius.*

{ Græ. ὕσσωπος.

{ Ital. } Hyssopo.

{ Ang. & } Hisop.

VT in Hyssopo Græca diximus, tametsi hæc vera non sit Diosc. tamen iamdiu cōmuni consensu recepta ista Hyssopus fuit, quia valdequàm viribus efficax est, eoque in Officinas deducta Mesuz autoritate, qui Hyssopum ramis Thymi atq; folijs, sed maioribus, facit. Eiq; occasio fortè ex Symphito Petreo hallucinandi fuit, cui Origanū (simile nēp Hyssopo) & Thymū cōparantur. Nec mirū iam tū ita persuasum fuisse hac lectione Arabibus, cum Senensis, extra erroris aleam Cōmentator, eōdem impeerit: vbi nō solum de nouo à se reperto, sine probatione, Symphito, sibi plaudit: sed etiam folia Thymi contextui, & Symphito reperto affingit: quæ neq; Græco codice, neq; Latinis versionibus vsquā cōparent. Collibus asperis Romaniz & Veronēsi tractui, præsertim secus Athesim, ad angustias saxorum & arcem munitiſsimā, quæ Imperatoriam à Venetorum ditione discerminat, è regione montis Baldi, sponte fruticat hæc, nuspiam alioquin nisi in hortis.

Arab. eff. 693

HYSSOPVS candidus *Anglorum.*

Varietas. Eadem hortensis in Anglia nullo māgonio dimidio sui folijs & ramulis aded candescit, sine lanugine, vt quamlibet niuem aut calcē faciliè prouocet, semisse altera viridi remanēte. Horum utrūq; montibus, collibus, & hortis oritur.

GRATIO LA recentiorum, an SPUMEVM PAPAVERI

Math. eff. 697;

HACTENVS non parū vexauit multorū ingenia huius plantæ assertio: Saponariam quippe alii, Behen album & vulgare quidam, siue Ocimastrū aruorum, demum Gratiam Spumeum Papauer fecerunt. Huic enim (præterquam quod Olez vel Struthij folijs, & floribus albis donata est) etiā vis strennuè purgandi supernè & infernè inest: radix multiplici flexu, crassiore propagine, summo sparsa cespice. Pratis montosis oriunda; rarò tamē spumea, sed quadamtenus albida folijs est herba, amari & ingratisimi gustus.

HELIANTHOS, siue flos Solis, an PANAX CHIRONIVM,

& HELENIVM secundum Diosc?

Eff. Mat. 740

HELIANTEM pleriq; putarunt illā plantā quæ locis aridis vberè prouenit, humi serpens, & interdū surrecta, sarmetosis cauliculis, palmū altis: Folijs rigidiusculis colore, crassitie, & effigie Cysti parui, sed minoribus multo, quæ Helianthē, siue Solis florē, vocant, floris aurei Potentillæ vel Pentaphylli similis cōmendatione. Qui quia similis recensetur de Chironio, ideo Chironiū putarūt. Nos in Helenio mentionē huius fecimus. Mōspellij Cisti parui speciem faciebāt: sed crescit hic in Anglia & alijs locis passim, vbi nulla Cystus. Altrigendi sicciandiq; vi pollet: acrimoniam nullā prodit; eoque minus Chironij opinionē facit: sed faciet fortassis magis Centaurū luteum vocatum, effigie cum sit & viribus haud procul recedentibus, & quod acrimoniam non caret, non nihilq; odorum est.

Q. iij.

PSYL.

Nov. PSELLIVM, Pulcra herba.

Gall. Herbe à puces.
Ital. Psillio.
Belg. Wiloy crupt.
Ger. Psyllen Kraut, flos Kraut.
Hisp. Zorgetona.
Ang. Fleewerte.

Effi. Mat. 1067
 1068.

CONCINNA nomenclatio Psyllio facta, à pullicem emittente, semine nigro, nitido, intus mucoso admodum & refrigerate, lubricante, quod vniuersum nec diuersum est in samentacea stramineaq; planta trifariam variate copiosum habetur. Ea autem sponte Norbouesia & Galloprovincie veruasta proscindaq; arua operit & infernit. Quae autem frequentissima exilioribus ab ima radice exigua, fibrosa, ramulis totum caule pedale ambitibus crebribus fruticat folijs angustis longioribus Scopariae, Beluidere aut Coronopi, incanis, hirsutis: Imbricatum compactis globulis, squammosis, oblongis, Pimpinellae vel Stachadis Arabicæ primulum florentis, quos apiculi flaminei candicantes ambiunt frequentes Coronopi vel Plantaginis. Hæc etiam inter oliueta fabulosasq; scrobes Monspelij agri prouenit.

Marinum.

Varietas.

QUOD littora fabulosa maritima lubenter sectatur, habitiore, sed non dissimili aspectu, longioribus aliquantò ramis fruticat, & folijs multò prolixioribus magisq; densis & hirsutis, minus incisus: cuius etiam non aliud semen, vel flores, vel vsus.

PLINIANVM forte maius radice perenni.

IDEM in tractibus, sed marginibus & squallidis oliuetorum incultis collibus, sarmetosius lignosiusq; prolixa foliorum & furculorum caudata, comosaq; fœtura densissima implexa fruticat, & reptando cespitem ornat latiore aspectu, sed hirsutie ex viridi albicâte. Semine haud dissimili, sed maiore fuscoq; siue castaneæ corticis colore: radice lignosa, dura, fibrarum procurfu prolixa. Eidem vsui in medicamentis arteriacis, & bilem siue preparantibus, siue educentibus: nec aliud ab istis innit Plinius Psyllium, ut nonnulli minus accurate eius de lacte gummivæ sententiam expedientes opinantur, Tithymaliq; quoddam genus Pityusa dictum, interpretatur: neutiquam id scripturi, si illis venisset in mentem seminis & herbæ mucuginosum & lactei cremoris similem succum, ad purgandam choleram (etiamnum à nostris Medicis hodiernis commendatum) Plinio vocatum fuisse Lac vel Gummi, laxiore interpretatione, ut non raro hic autor solitus est.

Κορώνιος CORONOPUS, Cornu Ceruinum.

Gall. Corne de Cerf, Pied de corneille.
Angl. Buckhorne.
Belg. Crapen boet, & Derts hozen crupt.
Ger. Kraenzuz.

Effi. Dod. 71.

ACoruino pede, quæ effigiat folia, dicta fuit Græcis Coronopus: & hodie eodè nomine utraq; nota, iadiu & recepta Crapenboet vocatur. Sed quæ Ruellij dicitur, multò melius Coronopi species habetur, quam illa Serpentaria Math. quæ incerta est, & folijs longè dissimilior: tū huius vires exploratiores habetur, quas Medici multi admirantur, dum vident intrò sumptam, aut præcordijs admotam, accessiones febrium, quæ originem ab obstructione duxerunt, quasi fascinio amoliri, præsertim ab imperitis Curforibus: haud tamen difficilis causa vestigatio, quæ ab eodem principio pendet, quo cæteræ plantæ congeneres, similes effectus febrientibus admotæ, edunt. Serpentaria verò potius Holoustii species est, quæ eò adduximus. Fol. 17. Quinetiam vulgatio & magis obuia è maritimis in hortos Belgarum, Anglorum, & Germanorum, translata ad acetaria, & calculum, folijs Psyllij aut Plantaginis marinz, crassis, pinguibus, hirsutis, vtrinq; fissis & laciniatis, cornicum ungues aut ceruinum cornu præferentibus. Vere in thyrsulis gracilib. hirsutis ædocrantalibus flores, & spicz Platanis aut Holostij Monspelliaci similes, concolores, sed minores,

minores. Radix tenuis, modicum astringens, cum nonnulla calfactione, calculosis hodie expetitur, non secus ac totius herbæ stillatitia aqua.

Cernu Cerni alterum vulgi.

Varietas

CORONOPUS REPENS Ruellij, echinato seminum inuolutis, an Theophrasti?

LVENS hæc inter Polygonum proculcatis itineribus, sed humentibus oritur, facie, folio cum superiore eodem prorsum, flore albo in cauliculis sessilibus, reptantibus: Semina in folliculis orbiculatis, ambitu nonnihil spinosis, cætera similia, cognitu peruia.

Effig. Dod. 71.

CORONOPUS & SEDI montani media planta Masfulesium.

HÆC nouam antiquis & neotericis indiciis, visum fuit subdere, cum propter nonnullam inter se similitudinem, tum propter eosdem natales maritimos. Collibus & cautibus Masfulez vicinis ad maris allusiones, inter Tragacanthum passim luxuriat densissimo sparsoque foliorum stipatu, Sedi minimi saxei montani, vel Pinastru ritu, positu, & rigiditate, innumeractiam sobole cauliculorum dotrantalium, semen pusillum Plantaginis, aut Serpentinæ vulgaris, spicis includentiū. Radix longiuscula, lignosa, crassior, gustu nonnihil calida, aromatica.



SERPENTINA.

SUPERIUS dictū fuit Serpentinæ plantam & nomenclaturam recetiorum esse, neque Coronopum esse, sed potius Holoustium: est uim folli Gramineis aut Vetonicæ syluestris humi procumbentibus, radice lignosa Vetonicæ Garyophyllez, semine & spica Holostij MonsPELLIACI aut Coronopi vulgaris. Prouenit in montibus Galloprovinciæ, Auerniz, & passim in Italia.

Martini. effig. 489.

Varietas. Supertiori similis tota, nisi habitioribus foliis, flosculis, cauliculis incanis & hirsutis foret: Apenninis montibus & in Delphinatu receptu facilis.

Μουσαρις; CAUDA MYRIS.

Gal. Queue de Suoris.
Term. Taupentorn.
Belg. Wyssen Sterthen.
Angl. Blad strange.

HVC referrenda etiam videtur pusilla illa scite *μουσαρις*, à recentioribus vocata, propter seminis spicatum mucronem teretem oblongum muris candicellæ non absimilem, flosculis per Maium & Iunium albidis, crebribus, palmaribus breui marescentibus vestitum, Plantaginis quadamtenus modo, semine exiguo incluso nigricante: foliola sunt gramminea angusta, pollicē & sesquipollicē alta, rigida, gustu plantagineo.

Effig. Dod. Epit. 189.

Nostrates Caryophylli, an Cantabrica Plinu?
Caryophylli varietates.
Cantabrica Plinij.
Vetonica.
Caryophylli syluestres minores: minusq.
odori, siue Armerij, latioribus
foliis.
Armerij varietates.
Superba recentiorum.
Caryophyllus Marinus omnium mini-
mus.
Muscipula siue viscaria duplex.
Draco.
Pearmica duplex.

CARYOPHYLLI nostrates an Cantabrica Plin.

Germ. Negelin und Griefblumen.
Angl. Carnations, and double gilliflowers.
Belg. Sinosten.
Gallus, Gyrosflees, Oilletz.

Effig. Dod. epis.
189.

Varietas.

CANTABRICA.

VETONICA.

ANTIQV I etiam indisti videntur florum elegantia nominatissimi Caryophylli, ob eam quam cum Caryophyllis exoticis habent odoris cognationem, ac nonnullam cauliculorum cum Anthophyllis similitudinem, quorum fuit differentia duarum, nempe syluestris & sativa: varietates autem permultae. Qui namque in hortis colitur, ex intortis geniculatis cauliculis calices cretos glabros gerit senis foliolis, sed multis conflatos, per extremas oras scite fimbriatos, odorem Caryophyllorum, aromaticum simulante, in pensilibus vasis aut torulis hortorum spectantur: nempe aut purpureascent dilutius, aut intensiore crure nitent, non pauci ex albedo, nonnulli punctis quasi aspergine purpurea versicolore sunt, cunctis diutissime florentibus, folia per interualla bina, glauca & geniculis caulium teretium & gracilium iunceorum: Semen item minutum, praesertim syluestri, quae quidem si nihil a sativa nisi cultu & mangonio differt (quod tamen nonnulli inficiantur) Plinij CANTABRICA planè videatur, quamvis ab illo paucis designetur, ubique nascens cauliculus iuncea pedali, in quo flosculi oblongi, velut calathii, in his semen perquam exiguum: quae quidem descriptio nonnihil videtur quadrare cum VETONICA, inter notha à Dioscoride relata delineatione hac: Montosis pratis & cultis nascitur, radice rubente tota & odorata, foliis porraceis, sed eorum medio puniceo, in recto calamo triangulari, & in ipsis floribus purpureis. TONICAM herbarij putant, qui aduersus pestiferos affectus miscunt in antidotis: tamen doctissimus Bernardus Montpellicensis Polcmonium Belgarum siue Ocymastrum imperat, ut tuius radices plurimum commendantur de eadem dote.

ARMERIA, minorum Caryophyllus syluestris,
minus odoris, foliis latioribus.

QUAMVIS solo & cultu dumtaxat distare videantur isti sponte nascentes Caryophylli à superioribus, tamen etiam dum coluntur in areis hortorum, distinguuntur ab illis foliis latioribus, cauliculis humi stratis, in quibus singulis flores confertim numerosi congesti, Saponariz in modum sunt calyculi, & flores minores, simplices, ut plurimum crure coccineo rubentes, nec odore perinde fragrant, atque superiores, nec adeo serò prodeunt, siue in hortis, siue in agro: est enim plurimus hic Caryophyllus ubique in petreis montosis & syluosis marginibus calidarum & frigidarum regionum Aprilis & Maio.

Angl. Pinket.
Belg. Bluymerkent.

HORVM eadem, quam in superioribus diximus, colorum varietas cernitur, quippe notulis candidis purpureis cruor intermicat interdum, interdum autè niuei asperio diluta purpura nitent flores, qui etiam argutioribus fimbriantur crenulis altioribus, aut laciniosis: angustiora etiam sunt folia, caules pedales & cubitales, odoris suauis elegantiz *Varietas*, celsa in hortis habetur.

ARMORARIA Syl. pratensis.

Ger. Gauchblum. id est, flos Cuculi.
Belg. Crapenblomkens.

SED in vliginosis pratis Angliæ, Belgiz, & Normaniz prouenit Syluestris Armeria vocata, inodoro flore, simpliciore, altius crenato, foliis breuioribus, latioribus, Centaurium minus, aut Viscariam similitudinibus. Venenis commendant, qui putant Tunicem esse: nec prorsum falluntur, quia non frustra opem experiuntur: & nonnullis Practicis Arabibus etiam Tunix vocatur, non secus atque Polemonium Belgarum siue Ocymastrum, quod est Gordonij Tunica.

Ded. Effig. epit.
192.
TUNIX.
Tunicis vox videtur truncata à Betonica.

SVPERBA Recentiorum. *Ger. Zochmut.*

Varietas altera. **Q**UOD iuxta viarum squallidos & editiores margines Germaniz, & Italiæ, florem ostentaret speciosiorè multò, & Phænicea purpura insigni Centaurio minori concolorem, Superbā quidam vocarunt, quæ syluestris superioris species est: gracilioribus viticulis, erectis, rigidioribus, pedè & cubitum altis, paucioribus, exilioribus, angustioribus foliis.

IN Agri Norbonensis montosis plantula est non inelegans, quæ huc referenda videtur, nam sesquipalmare & pedalem erigit cauliculum geniculatum, superioribus consimilem, nec flores dispares gerit, aut calyce ita diuersum: sed semen Scabiosæ, aut Carthami, nigrum, pellucidum, quo faciliè quilibet plantam rariorem hanc à Caryophyllis discernere potest.

CARYOPHYLLVS MARINVS *omnium minimus.*

HARVM omnium minima, similis & quadantenus cognata videtur illa, quam Belgæ Herbarij Moly marinum indigitarunt, alij Holoostium, vtrique potissimum propter folia graminea. Sunt enim rigidiuscula, quamplurima, sparsa humi, colore glauco, similia Caryophyllis. Cauliculi graciles, iuncea, dodrantes, & palmares, in quorum summo umbellæ compressæ Thlaspi Caudiz, aut Schenopraisi concolores. Radix illi subest prolixa, tenuis, rufescens Serpentinæ aut Caryophyllæ. Hac arearum margines ornant Belgæ & Angli, apud quos in maritimis frequens oritur: Calidis & Mediterranei maris littoribus, non perinde occurrit.


Effig. ded. epit.
377.
Moly marinum.

SED conuallibus Calcaris Seuenz montis, passimque alibi in Gallia Lugdunensi locisque à mare disitis, prorsum eadem reperitur, nisi plures funderet cauliculos pedales, folia item quadruplò maiora, & reliqua grandiora: quænam sit planta apud antiquos iam non occurrit.

MVSCIPVLA, siue VISCARIA.

PRETER has, hic geminas damus pictas, quas plebecula Muscarias, Viscarias, siue Muscipulas vocitat, quia glutine quopiam mucosæ a deo viscidæ sint perlitæ, ut non solum manum

manum, sed etiam muscas & papiliones præteruolantes minimo contactu implicet. Oritur apud Norbonenses in locis squalidis & segetum marginibus, folijs Armeriz sylvestris, præteritis aliquantò longioribus: flore & caliculo Centaurij minoris, aut Vetonicæ superbæ dictæ: cauliculis plurimis cubitalibus, semine pusillo Lychnidis.

Muscipula.*ALTERA flore muscoso.*

REGIA via qua Monspellio Frontignam itur, caliculis, semine, folio, & cauliculis, oritur non multum diuersa planta, sed perquam exiguo flore racemoso, ex luteo herbaceo. Vtraq; hodie vsu incomperta.

APHYLLANTHOS Monspellensium.

EMINVS hodie notis ea est cui nomē Aphyllanthos fecerunt studiosi Herbarij Monspellientes, non quia nulla folia emittat, sed quod adeò sint exilia & iuncea, vt vixdum emerſæ areſcant, & festucas præferant, paleasve, pallidiusculo colore in imo cespite è fibrosa Iunci radice: cauliculis sesquipalmaribus plurimis, iuncels, gracilibus, enodibus, glabris, per æstatem flores dentatos czruleos, Lini aut sylvestris Caryophillez minores, in glumoso acere gestantibus: gustus tota planta amaricantis, non nihil calidi: Plurima glariolis strigosisq; Ilcitis Norbonæ.

Aphyllanthos.

DRACO, aut potius TARCHON Symeonis Seti
& Auicenna.

Mab. effi. 593 NON est de nihilo, quòd pleriq; omnes paulò elegatiores holitores, hæc ex Lini semine cupiã Cepacæ aut tuberosæ radici inserto, emergere affirmant: nam tametsi nõ temerè cuiuslibet experienti cedat, rei q; ostentum, & euentus rarior fidem penè abroget, tamè si quis in afflatu maritimo & natalibus Squillæ non auulsæ inserat, optato voto nõ frustra bitur, vt nobis asseriebant quidam Lygures & Hetrusci herbarij non pauci. Idem euenire tradunt, si in Raphano aut Cepe foraminulo factò adigatur Lini semen: & argumento vtutur saporis, què salis & aceti vnâ mixti quodãmodo præfert: in acetarijs frequentissimè estatur, Nacturtij gustu, & ritu: Nec vspiam nisi in hortis visitur: èq; radice in varias partes diuulsæ propagatur & plantatur: quia semen, quasi spurium, & non genitabile, exiguum & euandidum est. Folia angusta, cuspidata, crassiuscula, Kali aut Asteris marini, sed longiora

giora Ptarmicz, non tamen crenata Betonicz modo, vt quidam decepti similitudine Ptarmicz tradūt: flosculi lutei, in ramulis sparſi: caules cubicales: radix Scordei aut Gratiolæ, longius vagatur per ſuum cespitem, exigua.

PTARMICA folio Taraconis, ſed crenato, floccello,
umbellato, candido.

QUAMVIS per plures plantæ, quæ ciete ſternutamenta olfactæ valent, Ptarmicz hodie dici poſint: tamen hæc id nominis præ cunctis hodie eſt apud herbarum peritos aſſequuta, quam Pyrethrum nuncuparunt, quia eſſet gultu feruido, diuq; linguam vexante Pyrethri modo: nonnulli Ptarmicen coniectabant, quòd odore ingratiuſculo & acriore nares feriret, ſternutamentaq; cieret, quibus non ægrè accedimus, quando aptiorem Ptarmicen nondum nouimus: Nam quas alias mox ſubdemus, longius multò à Ptarmicis abeſſe putamus. Huic ſiquidem flores in umbellis Anthemidis, Cotulæ minores, aut Stratiotidis millefoliæ, folia longiora Taraconis, ſed ambitu tantillum crenata, in multis gracilibus cauliculis pedaliſibus & cubitalibus. Radix fibroſa, repens.

PTARMICA altera Gallorum.

COGNATIOREM multò Thlaſpis putabit, qui gultaſit aut olfecerit hanc, quam Pyrethro aut Ptarmicz: Eſt enim gultu ignauiore, quàm vt Pyrethrum æquet: & odore penè nullo, nec ſternutamentum ciente: Quare non magis hæc Ptarmica ſit, vt quidam cõiectabant, quàm Terribilis vocata, inq; caput de Alypo relata. Etenim Monſpellij enatam habuimus in horto eruditiffimi profeſſoris Regij Laurentij Iouberti, folijs, facie, virgultis, & floribus concoloribus Candiæ Thlaſpi.

Bupleurum.

Bupleurum alterum latifolium.

Scorpioides Bupleuri folio.

Lithoſpermum } maior,
 } minus.

Lithoſpermum Plinianum inter miliacea.

Alſine.

Peronechia, Alſineſolia rectorum.

Peronechia altera.

Anagallis.

Anagallis lutea.

Anagallis aquatica.

Antyllis prior maritima Anglica.

Antyllis prior maritima Nerbonenſis duplex
Elatine.

Veronica. } mas
 } femina.

Nymulæria.

Bugula.

Symphitum petreum.

Bellides.

Bellis carulea, ſive Globularia Monſpel.

Moſotis.

BEUPLEVRVM.

FLIS aliquantum ſimilis eſt ea herba quæ recentioribus *βένδανος* Hippocratis ex Plinij hiftoria putatur, nec peſſimè quadrare nomenclaturæ & effigiatuæ videtur: folijs namq; longis, anguſtis, quadamtenus Graminis, Lachrymæ, Iobæ, aut Gladioli, multis ſtrijs, lirisve rigidis, quaſi coſtas in folijs ſingulis effigiantibus, & laterum modo incluſis,

Ded. Epit. 373.

sis, vt de Heptapleuro loquitur Plinius, per lōgitudinē squabris, in caule sesquicubitali & cubitali admodū geniculato, squabro, rotundo, rigido, inq; ramulos abeunte, quorū summa vmbellis pusillis, sparsis, luteolis Anethi donātur, & semine Anisi aut Anethi oblongo, longiore, graciliore: lapidosi & strigosi Illicis cocciferis Nordbonz passim floret Iulio & Augusto: Radix digitum minimum æquat, nigricans Peucedani figura, gustu, & odore, cuiusmodi & semen: quo etiam magis retinemur In veri Bupleuri persualione, Nicandri & Plinij autoritate, si foret planta hæc cibo idonea. qualem Hippocrates commendat: nam in medicamentis, vt placuit Glauconi & Nicandro, non incommodam dicet, qui saporem & odorem quadamtenus Hyperici deprehendit, temperato calore, aliquātan sicciorē.

ALTERA BUPLEURUM congener latifolia, AVRICULA
Leporis dicta, non est ELAPHOBOSCVM.

Varietas.

Ded. epit. 374.

ISDEM in locis non procul Gramontia sylua, longē frequentior hæc reperitur, quæ planē eadem cum superiore est, natalibus, figura, viribus, vmbellis, & floribus: folio alio, qui latiore, rigidiore, latiusculo in medio, & supernē in angustum deficiente, nonnihilq; concauo aut inflexo. Vnde illic studiosi *Auriculam Leporinam* vocitant, alij *Elaphoboscum* fecerūt, quia sit folio aliquantum, vti putant illi, Therebinthi: atqui Dioscoridis collatio exprimit primum folij latitudinem digiti, deinde modum & positum Therebinthi, similitudine plātæ Ferulaceæ, qualem dedimus alibi inter Pastinacas: nam de Plinij liquet illuc conferendum, qui Olusatri folium Elaphobosco dat.

SCORPIOIDES repens Bupleurifolia.

Ded. effig. 48.

IN oliuetis & aridis montosis Monspellio vicinis frequens occurrit hæc, alibi rara planta, nec nisi in hortis vñitur, vocaturq; Scorpionides propter seminis inuolucrum, quæ terna hærent hirsutie obducta in se conuoluta, & aliquantum Scorpionis caudam æmulantur. In caule caduco, reptante, sesquipalmari, & interdum pedali, folia è geniculis promente Boupleuri latifoliz similia, reflexa, minus rigida.

Λιθόσπερμος. LITHOSPERMV M utrunque

{ Officinis Milium Solis.

{ Belg. Berlecrup ende Steen saet.

{ Gall. Gemil. & herbeaux perles.

{ Ital. Milium Solis.

{ Ger. Meerbirsen.

{ Ang. Gromell.

Effig. Ded. epit.

317.

Mat. epit. 416.

LAPIDEA duritie & Herculeæ seminis vi nuncuparūt hæc Heracleiam plantā: notitiæ peruulgatæ omnes differentiz, quæ à magnitudine, habitu, & folijs quærantur. Passim in Galliis & Anglia locis incultis Lithospermum minus, magisq; obuium sit: ramis & alis duris, rectis, asperis, rotundis, albidis, folia angusta, acuta Phylireæ aut Ligustri, vel Polygonati nigricantia, ruda tactu, squalida, flosculi albert in alis & summo secus folia. Vniones lucidi, læues, rotundi, albidi, aut pulli præ lucidi Milio æquales, ideo Milion Soler, id est, montiū, dictū potius quā Solis. Effractum multū siccitatis, absterisionis, nonnihil acrimoniæ habet. Locis strigosis aut quibus coli desitum, semen minus, nitidum, sed rugosum & asperum, vt etiam folia. Maximus huius vbiq; in officinis vsus, æstate colligunt & venum ferunt mulierculæ: in Anglia plurimum sponte.

Soler melius quā

Solis, vide in Si-

lere Montano.

Varietas. { Est vbi minimum videas palmum altum, foliolis Lini angustis, secus quæ granula pusilla, rotunda, polita, & prorsum minora.

LITHOSPERMV M maius.

Ded. epit. 339.

SARMENTOSI in stratū humi ramis, gracilibus, hirsutis, porrectioribus, quos alterno sermē situ, ab imo crebra cingūt folia longiora, acutiora, latioraq; minoris Lithospermi nigrican-

nigricantibus, asperis, quibus occulantur hirsuti qasilli, & semen idem, sed durius & maius, defluxis purpurascensibus flosculis, oblongius, atq; calculo exterendo, lotiòq; mouendo efficacius multò, minus tamè vsurpatum quàm minus frequens, minòrque suppetit copia, nec perinde feminis est ferax. Belgio & Germaniæ hortense vtrumq; Mòspellij propter Sellæ nouæ pontem & decliuius, saxosis, vmbrosis, syluosis, spòtè multù.

ALSINE, Hippia.

{ Ang. Great Chickweede.
Ital. Centons, Panarina, seu Pizze Gallina.
Morsus Gallinæ.
Ger. Vogelkraut.
Bel. Muer ende vogelkruyt.

Effig. Dod. epist.

56.

Auricula muris
Morsus Gallina

ALSIOSIS non modò sed etiam parietinis, & imbricamentis oblectatur Alfine, quæ Auricula muris vocitata fuit antiquis ob foliorum admodum arctam similitudinem, cum genuina Myosotide, teneriuscula siquidem herbula est, Gallinis & auiculis pabulo grata, eoq; vocata plebi morsus Gallinæ. Plurimos ramulos geniculatos, rotundos, foliosos, Anagallidis vel parietariæ minores minusq; hirsutos flosculos etiam ex capitulis Anagallidis, vel Hollauslij explicat, albidos, stellatos. Semine exiguo in pericarpio oblongo, gustu insulso aqueo refrigerante.

ALSINE Minor recentiorum, sive Hippia minor.

{ Ang. Middle Chickweede.
Gall. Morgeline Mouron.

PERSIMILIS superiori, sed minoribus tû foliolis, tû ramulis, humi procumbenti. Dod. effig. 57.
bus, propiusq; ad Anagallidem, quàm Parietariam efformatis, cætera non dissimilis, neq; oriunda diuersis in locis.

ALSINE Minima.

Ang. Little Chickweede.

ET hæc proximè descript: in Anagallidem admodum præfert, verùm tota tenellis capillaceisq; ramulis, exilibusq; Serpilli lenticulæ vel tenuifolij Thymi, numerosioribus: Dod. effig. 58.
non dispari loco, situ, aut effectu, notissima.

ALSINE Myosotis.

{ Ang. Small mouse eare.
Ger. Muesorlin.
Gall. Petite oreille de souris.

HANC etiam propter similitudinem foliorum aurem murinam vocitarunt, & Alfinè, Dod. Effig. 59.
quam valdè exprimit, vt Dioscorides innuit: à radice cassiuscula, rotunda, rectis item multis viticulis crescit, semipedem & pedem altis, foliolis auriculas murinas vel centaurè minus imitatis, binis, ab imò multis per intervalla. secundum quæ in capillaceis pedicellis flosculi exigui Gallij vel Aparinæ cærulei flosculi. Rarior hæc, nisi Italiæ Galloq; pro uinciz herbidis marginibus & campestribus, nullo excellenti gustu.

MYOSOTIS Hirsuta reptans.

ADMODVM familiaris hæc hortis, vinetis, segetibus, & pratensibus, vulgo Pharmacopœorum Auriculæ muris minoris nomine notissima, & aptissimè sic vocata, propter
R. j. hirs.

hirsutiem effigiemq; auri murinæ haud abſimilem, repit humi tota ramulis palmaribus, hirsutis, mollioribus, Scorpioidem minimam vel Anagallidem referentibus: floſculis albidis, & ſemine non diſpari, radice multis fibrillis ſparſa.

ANAGALLIS *Phænicea mas, & Cærulea ſemina.*

Ang. Pimpernell.
Gall. Mouron à fleurs rouges, & Bleues.
Ghr. Gauch heyl.
Belg. Bupchel heyl.

Effig. Dod.
60.61.

Quis dicebatur Græcè Hyacinthus, vnde à colore hyacintheo Anagallis nuncupari potuit. Fortè dixit antiquitas Anagallidem, quia ſuperbula floribus venuſtis vias paſſim ornet, colore oculis grato & amico. Antiquorum duas nouit noſtra ætas, Phœniceam & Cæruleam, quæ neutiquam effigie diuerſæ ſunt, ſed duntaxat colore atq; effectu. Etenim Phœniceam ſiue marem illitu ſedem euocat, quam prolapſam reprimit Cærulea, vt Dioſcorides ex aliorum hiſtorijs recenſet. Vtraq; autem paſſim fruticat teneris cauliculis & folijs Alſine, copioſis floribus & ſemine puſillo in pericarpijs Lini.

Cærulea autem, præterquàm quòd non perinde frequens, variat colore & acrimonia, caloreve remiſſiore eſt, ſi antiquorum hiſtoriz ſtandum.

ANAGALLIS LVTEA.

LVTEA quàm viſu pulchra & rara tranſmarinis regionibus vt Lugduni, tam crebra in Angliæ nemoribus, lociſq; opacis, Menſe Iunio & Iulio. Flores promit luteos, vmbroſis gaudet, cætera mari & ſemine ſimilis, idcirco harum vnam quamlibet qui norit, primo quoq; intuitu cæteras duas noſcitabit. Superiore èſtate maximam huius copiam naſti fuimus in quadam denſa & amœna Sylua Couentriæ proxima: itemq; dum hæc commentaremur, altero à Briſtoia lapide, in Northonij Equitis nemoroſis paſcuis propè deuexum fluminis Danem. Hallucinos planè ſuo more queritatur Senenſis, qui herbam vocitam *Panarinam* Barbaris Inſubribus, Hetruſcè verò *Centone*, Anagallidem tradunt: atqui ſi ſciret vtramq; harum *Pimpernell* plebi Pharmacopœorū & muliercularum hic in Angliā diſſutari, an ille multò grauius ſibi ferendum putaret? Quasi verò non vulgi ſit peruertere nomenclaturas, veteres delere, nouas ſuo, non noſtro arbitrio, eudere & commutare: ſi ſeipſum intueatur, iamiani & vulgi decipula captum dicet. Nam morſum Gallinæ, qui eſt Alſine, Anagallidem hanc vulgi more hallucinatus fecit. Et vtinam non nemo bonus genius illi in mentem non Diaboli Morſum, huic loco prorfus alienum, ſed potius errores ſuos, & ſupercilium faſtu Cerbereo elatum ſibi ſpectanda immiſiſſet. Quin hanc Succifam, tametsi iamdiu Trago & Fuſchio monentibus, hic non pauci imperiti Pharmacopœi & plebecula Scabioſam dicant & vtendam præcipiant: Illuc ſi diſuliſſet, multò conſultius feciſſet: nam fortè Scabioſæ ſpecies eſt, & ſaltem ad ſabiem multum pollet.

MORSVS GALLINÆ Folio Hederulae flore ſigura & pericarpijs Anagallidis.

Belg. Doenderbeet.
Germ. Lünnerbiß.

Effig. Dod. Epit.
62. non eſt E-
latine.

VBIQVE paſſim iuxta ſepes reptat cauliculis hirsutis Alſines Myoſotidis, folia puſilla, anguloſa, Hederæ aut Hepatici trifolij, flores Cærulei Anagallidis aut Teucrij prætenſis. Semen paruum incluſum pericarpijs.

AN.

ANAGALLIS AQUATICA.

sive Beabunga Germanorum, non est Caprea

{Gallis. Beile.

{Belgis. waterpungjen.

GALLORVM plebecula hanc Berulam dicit, sed consultius recentiores Herbarii Anagallidum vnam, vt cuius folia & vires non parum imitatur, nec non natales sectatur vborū, secus pratenses riuulos in pigris aquis, aut substillis; folia edit leniter ambitu crenata, fruticosis ramulis, teneris, carnosis Portulacæ & Nūmulariæ in hamū, deflexis ac ramulis crebribus, fœtura diti florum cœruleorum Anagallidis similitum, supatis: Radix multis sparſa fibris albis, & Nummulariæ modo subtus serpit, tota gustu acriore Nasturtii, odore non ingrato, nec minore ope apud Frisios & Germanos viurpatur, aduersum indigenam morbū illi Scorbutum nuncupati, quem iuuat, non secus atque Cochlearia, Cardamine aquatica siue Berula, & aliz quas alibi diximus. Porro Cræpant non videri, inter Portulacas differuimus.

ANTHYLLIS PRIOR Lenticolia

Peplini effigie, maritima.

QVASI floridulæ, lanugine cana quæ pabent Anthyllides dictæ videntur, aut potius à floscellorum exilitate, quales cernuntur gemmei perelegantes, pusilli, in Anthyllide hac Maritima lenticolia dicta à nobis depicta. Ac tametsi per notas minus accuratas ne nacti quidem veram primam Anthyllidem, integrum fuerit certò asseuerare quænam Dioscoridis prima sit, tamen quoad eius fieri quit, vt consulamus rerum Historiæ, non poenitendi iudicii coniecturæ aptandæ sunt tum descriptioni, tum plantæ isti, quæ non perperam inter se quadrant. In Angliæ insulis Australibus, & præsertim quæ Portlandia vocatur, litore Norhtnānniæ obuerso, plurima quam hic damus, pusilla prouenit in sabuletis & arenosis vadis depressis, & æpricis: geniculis, & ramulis palmum trêsvē viciis longis, angulosis, pallentibus & foliis, Lenticulam, Alsinem minorem, vel Peplin referentibus. Flosculi summis insunt ex buxæ herbacei, dentatim stellati, Sedi minoris Iunio & Iulio: Semen Tythymali in perexiguis Chamæcylis triquetris thecis alit: proluxiore, exili, geniculata radice, sabulo altè infossâ Soldonellæ modo: tota salſa, gustanti amaricat & parum quiddam calfacientis indicat. Nec hesitationi locus iam foret, si quam certum habemus facultates hanc sortitam esse, quales primæ Dioscorides assent, tam confidenter decernere auderemus effigiem planè eandem esse: nos monet tamen non parum Alsinæ quæ quia huic, vt sanè est, cum similibus admodum foret, eodem nomine Anthyllidis vocata donataque fuit, vt apud Dioscoridem videre est. Et multò aptius congruit huius nouæ mantimæ foliola legumini Lenticulæ, quàm palustris Lenticulæ. Quare comparatio videtur accipienda de Lenticulæ legumine, non de Musco paludoso quæm *βουβώνιον φάκω*, id est, muscum lenticulæ similem, vocat Dioscorides, non absolutè Lentem;



MARINA INCANA ALSINÆ

folia, Norbonensium, æt. prima ANTHYL-

LIS Dioscoridis

ET I A M maritimis agri Nitiolbrigi ad *Peraus* & *Lacteras* reptat hæc pafum, vt fuperior, ramulis compluribus, fefquipalmaribus, foliis *Alfinæ*, aut potius *Lenticulæ*, fed per interualla quædam, quafi circumgeniculos exortis, numerosis, copiofiffimis item floccillis in fummo aggeftis, mufcofis, albidis, floridum quafi nomen *Anthyllidis* oftentantibus & testantibus, feminis etiam pufilli feraciffimis: guftu amaricante, fubfalfo, nitrofo, calidiufculo.



ANTHYLLIS Marina Norbontenfium altera, admodum falfo-acida, Chamefyce facie.

NEC aliò debet aut potest referri hæc maritima iisdè locis reptans, quàm inter *Anthyllides*, vt quæ aliis multò falfior fit. Foliis & facie eft *Hernia* riæ aut *Chamefyce*: flocculis pufillis fubter foliola ex albo purpurafcèntibus; femina in florù calyculis quàm *Clinopodij* minoribus multò occcluduntur. Tota guftu falfo, acidulo, lactei fucci expers, & exufta: nec proinde *Chamefyce* ftatuenda, vt quidam, qui ficcam tantùm in fuis mufcolis viderant, prodiderunt.



PARONYCHIA Alsinifolia.

QU I A ei vnguium affectui medetur quem Græci *Paronychiam*, Cicero autem reduuiam dicit, *Paronychia* dicta fuit: hodie minus fanè nota, propter multas plantas, quæ confimiles funt, eandemque adumbrant apud *Diofcoridem*, magis quàm preffè delineant: inter quas tamè in tectis & parietinis reperitur vna, vt fi quæ alia, *Paronychiam* imitata designationem, *Pufilla* eft plantula tota *Alfinæ* figura, non multis foliis *Alfinæ* vel *Lenticulæ*, nec difsimilibus donata, fed exorta ad imum cauliculum aut pedicellum dodrantalè, albidum, admodù exilè, quafi *Callitrici* *Apulei* putati: in quo fummo flocculi candidi, & theculæ minimi *Thlafpi* pares, fed compreffæ & foliaceæ: guftu aliquantum acri, eoquæ opinionem fouente eorum qui *Paronychiam* autumant. Nam illa capillacea, quam *Commentator* iactat, non perinde potest *Paronychiis* prodeffe: effeque guftu & facultate *Capillarium* cæterarum, monuim us alibi.

PARONYCHIA ALTERA, FOLIO Rutaceo, flore albido.

CONVICTRIX in parietinis locisq; mucidis, petrofis, vmbrofis, vbiq; cum fuperiore obuia etià eft hæc: cauliculis dodrantalibus & palmaribus, craffiusculis: foliola *Rutæ* bifida, interdumq; trifida incifura, magnitudine & parilitate quadamtenus cernuntur, colo-

colore pallidula & subrubra, succulenta: floribus albidis, semina etiam in thecis Scorpoidis Myosotidi non disparibus: vtraque exeunte hyeme Vere primo flosculos edunt: deinde nimio aestu marcescunt, vt nupiam toto anno compareant.

ELATINE DIOSCORI. Veronica

femina Fusch.

QUI hic carpat aut balbutiat Commentator nescit, neque scire voluit nos, sibi ignotam fuisse veram Elatinem, cōcinnat tamen effigiem sortē Alsing, facultates verō reticet, nec quid sibi voluerit, hifcere audet: Genuina autem Elatine omnium nuperorum suffragiis, viribus & facie congruis, est ea quam Germani Scriptores, Doctissimus presertim Fuschius, Veronicam feminam dixerat, quam alius generis amari Veronica. Plurima in segetibus Norbonæ, Galloprovinciæ, Delphinatū, Germaniæ & Italiæ quibusdam locis: rarius in Belgio, & Angliā comparet. Pedalibus serpit viticulus, tenellis, flexilibus, pluribus, ab exili radicē: folia Helxine minora, rotundiora, sed pilosa & incana, ad Nummulariam vulgo dictā accedentia, promunt: flosculi Hederæ terrestris, aut Anthirini, sed perpussilli, albidī, & semen exiguum, nigrum, subrotundum, Anagallidis par ac simile. Alstrictoriz non modō hęc facultatis, meritō dissentericis, tumoribusve seruidis prodest: verum etiam tanti fit hodie ad caneros, carcinomata, malique humoris vlcera, vt euentus superet, aut temeret fidem: Nasum qui decreuerant abscindere perdocti Medici complures, præceperantque eiusdem sententiz Chyrurgis valde exercitatis id faciendum, quidam misellus Barbitonsor, qui de quopiam suo hero eximio Medico hanc dotem didicisset, dissuasit: huius litu & potu effecit, vt nec nasus abscindendus foret, & vt reliquo corpori in lepram prono optimē esset: amaricant folia alstringuntque siccitate non exasperante.



VERONICA VERA & maior.

German. Treubreyß & Grunbeyl.

Belgis. Eeren pyts, Laudata nobilium.

EST hęc etiam nominatissima, nec vulgatę commendationis ad vlcera, vulnera, ac pleuraque virulentorum affectuum. In syluis Septentrionalium passim, sed editis & montosis Meridionalium collegimus pusillum, ramulis crebribus, villosis, purpurascētibz, gracilibz, pedalisbz, stratis: folia nonnihil ad Teucrii vel Chamædrios crenis accedūt, sed lenioribus, & Berberidis quasi effigiātibus solum, sed hirsuta Pilosellę: flores dilutē purpureos summi turiones edunt, Germanicę Germandrę, seu Teucrii pratensis effigie, sed iuniores: in marsupio compresso grana minuta, Fibrosa, nec proluxa radix,

Belonica Paul
Dodo. 27.

MINOR Serpillifolia VERONICA.

NE hęc nisi tractibus Septentrionalibus etiam in hortis sponte multa serpit, Alsing vel potius Serpilli ritu & habitu, eoque nonnullis putabatur Serpilli species. Verum crassiore multō est folio, nec crenato, aut hirsuto albedo, vt Veronica mas, cui nihilō min⁹ foliorum ordine & ortu, viticulis, floribus, & seminibz viticulis permultum similitur, sed magnitudine inferior. Radix tenella, fibrosa, subtus repit: calida nonnihil & desiccans, ad Serpilli gustum insipidiorem accedens.

R. iij.

NVM.

German. Phenninck Kraut. Egelfraut, & klein Waterkraut.
Belgic. Benninck cruyt & Egelcruyt.
Angl. Hearke two pence.

Centimorbia.

OPAEIS & riguis gaudet, sed regionum Septentrionarum, & frigidiorum potius quam calidiorum (vbi pauca) indigena est Nummularia, à foliorum circinnata rotunditate numum imitante dicta: bina exeunt hæc, ex aduerso æquis, sed crebribus spaciis viticulorum humi repentiù, Elatinez longitudine, & ritu: colore & habitu quadatenus Vinæ peruinæ, aut potius Anagallidis, luteo flore, cui etiã floribus luteis, stellatis iuxta foliorum exortus, etiam gemino ordine adeò similis est, vt per initia non facile sit discernere: sed Anagallidis luteæ progressu temporis longiuscula fiunt, & in imo nonnihil sinuantur: nec seuen dissimile. Non modò insigni quapiam altringendi & exsiccandi dote in gargarismata recipitur, sed etiam tot ad affectus utilis tantoperè habetur, vt Centimorbia sit dicta, & appellitetur hodie: Angliz, Germaniz, Belgio, & Normanz Galliz vmbrosis vdis, ad sepes familiaris.

SYMPHYTVM Petrarum.

*Symph. Petreū
 Mat. creditum,*

SYMPHYTI Petrazi quæ adubrarent delineatione non defuerunt plantę plerque: at non similitudinis, aut figurę causa, sed vitium & nature, quã glutinadi vtriq; inesse scirent, vtranq; tametsi dissimile Symphytū vocarūt. Συμφύω enim est cōiungo, cōglutino, seu cōmitto. Sed nos potius ad quāpiam Cunillæ, id est, Origani, Thymi, Serpilli, Satureiz, vel Coris Monspel. cōgenrē deducebat Dios. lectio: in Petrofis enim lignosum, furculosum totū & odoratū oritur, ramulis Origani, foliis paruis, capitulis Thymi, vti Plinii, vel vt nonnulli, qui cōiungunt *ἀνίστα καὶ φάλα*, capitula tenuia Thymi, nulla foliorum descriptione. Salinum cit, tum subdulcis est, purpurea radix, longa, digitum æquans: quorum simul subducta notio facit, vt nondum vllam queamus statuere stirpem Symphyto vero eandem. Coris verò Numspelliensiu, atq; Sideritis odora pusilla, spicato flore nos poterant adducere ad Symphyti persuasionem: verum morosis non omnia penitus quadrare videbuntur. Et Senensis plausus præproperus, capite de Hyssopo, repertam esse iam persuaserat: verum eius postea supina negligentia, vel ambitio meticulosa, nos de eadem opinione deturbauit: quippe docturus sibi repertum Symphitum Petreū, natales plusquam prolixè enarrat, puchritudinem celebrat, interea nihil addit quæ ad certiore probatorem faciat, nō faciei, non viriū, aut vsus quidquam. Quare quid vult sibi, vt assentiamur, si nihil explicat, extricat, aut docet? Vidimus iamdiu plantam, quam putamus ab illo representatā, prope Bernardi celsos Sabaudicos montes, & de Anguillara audiuius, cur nō ausus fuerit, vt in quāplurimis, describere: audere id igitur possunt, qui viderunt. Est ea floribus purpurea confertis, speciosis, Ericæ maioris, spicatis, foliis pusillis Chamæpiteos, breuioribus aliquantū hirsutis Pilosellæ modo, in furculis pedalis, lignosis: sed inodora, radix lignea, non purpurea, nec dulcis gustu planta, nec saluaris. Quam ille cum se reperisse, Deo secundo, exultabat, foliis Origani & Hyssopi, non animaduvertebat Hyssopo Dioscoridis folia esse Origani: & Dioscoridem nō folia, sed caules Symphyti, Origano assimilasse, vti & Plinius: folia verò parua distinctè, & seimctè dixisse.

BVGVL A, quidam Prunellæ.

GALLIS, vt Ruellio & aliis, vires illæ decantatz à vulnerariis Medicis & Empiricis, ad foris intusque multos morbos curandos, qui Symphito inesse folia Origani legerant, aniam dederūt opinandi Buglam vulgò vocatā, aut Bugulam, esse Symphytū Petreū: est sanè miræ vis cum Sanicula potionibus vulnerariis: quare vel isto nomine & certi-

certitudine malim, vt Symphito vti, quàm Mathio. incertæ cōiecturæ acquiescere. Consolidam mediā, id est, Symphitum, Chyrurgi vocant, seu Solidaginem & Bugulam. Sed huius similem Prunellam vocatam, aut Consolidam minorem, eodem nomine designant, propter vultum & vires haud ita dispares, alioqui natales Bugulæ vel medice consolidæ sunt vda præta, & syluz, & horti: sarmentosis ramis, exilibus, flexilibus, humi repantibus, & foliis Becabungæ vel Anagallidis aquaticæ, & alicubi depactis, vnde alii eriguntur surculi, angulosi, sesquipalmum alti: quibus folia crassa, rotunda, oblonga, leuiter serrata, & aversa parte Hederæ Pruniæ modo, aut granati colore puniceo, (vnde fortassis vtrius Gallis Prunella promiscuè dicta) flores iuxta folia à medio summo tenus verticillatis spaciis cœrulei elegantisque prodeunt, interdum niueo candore. Radix fibrōsa, tenera, maior quàm Prunellæ.

PRUNELLA SYMPHITVM Petrum.

PRUNELLÆ enim pusilla, sed prolixior subest radix, virgultis item reptantibus, quadratis, hirsutis, palmū & sesquipalmū longis, inflexis: foliis longioribus, superne acutioribus, Pulegii regii, vel Origani, vel Trifoli, spicatis & purpureis comis longioribus. Oritur hæc pratis & hortis sponte, etiamque locis ardiioribus & saxosis Garmuntis Syluz, & alibi finitimis Monspelliaci agri, inter Lados & Illices Baphicas, vbi flores dilutiores multò, folia ina profundius incisa vtrinque, Valerianæ agrestis modo: vocant vulgò illic Symphitum Petrzum, nec parum laudant Astatius & D. Medici.

CONSOLIDA minor Officinæ, aut BELLIDES

Plinaria?

Gall. Marguerites, Pasquettes:
 Ital. Primo fiore.
 Belgi. Gabelteucn, Bertowen, Margrieten.
 Ang. Dayse.

ET si tacitus Bellides præstitit Dioscorides, tamen quæ apud Plinium extant perpauca & vaga, persuaserunt posteritati hosce flores, qui in pratis abundè primo Vere erumpunt, Bellides esse: Nam inquit ille; Bellis in pratis nascitur, flore albo, aliquatenus rubente: cui coniecturæ fauet nomenclaturæ expensio: Potuerunt namque funestæ illæ Beli Danaï Regis quinquagintæ natæ (quæ totidè nuptæ maritis, eos quælibet suū iugularunt) nomen dedisse, vnde forisè postea istos flores vocarint, quia multi visuntur gregatim vnâ & belluli, vnde vocantur vulgò Marguerites: sunt quippe glomeruli multi florū quasi vniōes, sine Margaritæ, è pediculis crebribus, palmaribus, teneris, pilosis, etumpentibus è medio soliorum, quæ Pratenis minori frequentiori insunt multa, viridia, crebra, crassiora, Oleæ aut Pilosellæ. Radix pusilla Plantaginis.

HVIS autem differentiz variētis in florum colore & magnitudine: Est enim flores frequentius albus, medio luteus Anthemidis. Interdum & purpureus. Nec quæ in hortis coluntur ad coronamenta, differunt, nisi cultu: annua enim & frequentē transplantatione maiores, habitiores, confertiores, duplicati, & triplicati, & elegantiores euadunt flores. Hæc potissimum vtuntur vulnerari, vnde Consolidæ minores dictæ fuerunt.

BELLIS MÆDIA.

PERPARVM videtur differre quam Mediā recentiores statuūt. Est quippe foliis alterius Pratenis duplò maioribus, & flore in sesquipalmari & pedali, pediculo gracili, nec diuerso à superiori. Hanc à se lectam in Syluosis montibus Germaniæ nobis communicauit D. Pennius Anglus.

BELLIS Carulea, GLOBULARIA
Monspellensium.

R. ilij.

A Flō.

A FLORVM glomerulis globisque Globularia recetioribus vocata, MonsPELLIENSIBUS præsertim, apud quos Gramuntæ sylvarum vicinis deuexis pratis oritur, foliis Bellidis vulgaris, nigrioribus, sed iuxta pedicellos rigidiusculos palmares & sesquipalmares angustioribus. Flores carulei, pulchelli, in orbem glomerati, Scabiosæ motanz modo & colore. Radix lignea, fibrosa. Rarior hæc Italiz, Germaniz, & Franciz.



BELLIS MAIOR.
CONSOLIDA Media Venerariorum.

{ *Germa. Senßblum.*
 Ang. Great daylie.

QUÆ recentioribus maior Bellis vocatur, caules emittit graciles, lignosos, plures, teretes, cubitales & pedales, Iacobææ similes, è fibrosoiore & sparsa radice, in quibus flores medio luteos, & ambitu candidos Buphthalmi, aut Pyrethri vulgaris; folia Senecionis, serrata: fœcus margines agrorum & pratorum familiaris.

PILOSELLA, Auricula muris,

NEC etiam istius vulgarissimæ herbæ vsipiam, quod sciamus, meminere antiqui, sed dumtaxat recentiores, qui Pilosellam vocarunt, ab hirsuta Pilosæque foliorum superficie quadatenus albicante, oblonga Bellidis, sed aliquantum superne concava, auriculam murinam effigiente, vnde Myosotidem quidam dixerunt; tametsi alia sit Dioscoridis Myosotis: Pedicelli item hirsuti, graciles, palmares, & sesquipalmares sunt: Floresq; edunt ætate Bellidis, aut Hieracii pallidiusculi concolores: vniuersa alstrictoriz facultatis quadam tenuitate calida mixta, cuius ea est vis, vt succo decoctæ acies chalybæ cædentes sæpius mersæ, quamlibet duritiem lapideam, ferreâ huc præcidant & demoliantur, nec tamen retundantur, aut hebetescant. Vi etiam est præsentissima ad calculum.

{ *Vulgare.*
Gnaphalium Marinum.
 Alterum montanum.
 Tertium Anglicum.
Leontopodium.
Stachas citrina an Chrysocome?
Stachas citrina altera minus odora.
Inodora altera flore maiora.
Apios.

GNAPHALIVM *marinum: Cotinaria vulgi.*

Bombax ha- **GNA** + **EIN** dicunt Græci vellere carperere lanas aut pannum, non secus ac *spongia*,
milis. tergere, concinnare, & interpolare, vnde Strutio & Gnaphalion, quod Romani eodem
Petit Coton. significatu Centumculum nuncuparunt, & Tomentariani, ac Plinius Chamæzylon (sic enim emendamus, quod omnes etiam recentiores legunt Chamæzylon) appositè dixit: nulla namque planta raritate, elegantia, & vtilitate propius imitatur Gossipium, imò nihil aliud, quanta est, nisi tomentum videtur, si radicè exceperis, & intimam florum superficiem,

ficiem, corymbos enim Abrotani semina aureos, numerosos, multifidos caulium surculis, quos stipat lanugo candida, aut cinerica perquam densa, cinguntque folia quoquoersum multa, fungosa, eadem pube obducta, tamque vniuersa planta valde quam blanditur, holoserici attrectatu, sesquipalmum pedemve alta fruticat, duriusculis virgultis, sarmentosis, tomento crasso incanis: radice lignea, recta palmum longa, inflexa, Aizoi medii vel Paralij Tithymalli similia ortu, situ, & figura, sed minora. Vniuerso litore & sabuletis à Marianis aquis ad Ceti motis radices & lacum plurima, alibi haud temere occurrit Norbong. In Adriaticis littoribus non vidimus, & nonnullas plantas primum ostendimus Venetis, & Veronensibus Bellicoco & Casselario: Cortusio vero Patavij chartaceum Herbarium spectandum cum dedissemus, huius cum Polyrhizi Aristolochia, Thymalli serrato, floribus Opontiz, plantulam nobis perisse animaduertimus, nec multo post eandem depictas Mathiolo suo muneri missas fuisse, quolubentius persuasi fuimus, propterea quia neque descripsit in postremis commentariis, neque quanam & unde oriunda foret, monuit, nec flores apposuit pictor, quia illi nostrae flos semenque tunc desuit: triquetrum enim, pusillum, acerofum, oblongum, albidum. Astringit magnopere & desiccatur tota planta, nonnihil salsa, nec tamen ingrata, aut amara, aliquantum aronatica odore, quadamtenus citrine Stachadis, vel guhmii Elemnis: Iulio floret. Saepius vsus fumus surculis pro elchinni, qui viuide alunt flammam, Olei quippe ceterique pinguis liquoris potrix est.



GNAPHALIUM vulgare, Filago Centaurea.

VSQUEQUE quidem Gnaphalium istud vbique aridis & sterilibus multum & notum, videtur solus & cauliculis imitari maritimis, differt tamen cum foliis, floribus, lanugine, odore, cadore, tum speciositate & hilaris aspectu, Gnaphaliū superius, à Filagine, quae potius ad Stachadem citrinā referenda sit, aut certe cognitionis utilitatibus: causa, sit cum ista quae statim subdetur Montana à nobis vocata, medi generis: est enim dysentericis & profluentis immoderatis non parum accommodata. Herbula filago est plerisque cauliculis, pullis vel cinericiis, lanugine testis, gracilibus sesquipalmum altis, foliis crebribus, aduolutis, brevioribus quam Stachadis citrine. Floribus glomeratim oriētibus: partim mediis è furculorum diuarcationibus, partim etiam extremis surculis, subluteis & pallentibus: molicella tota & pusilla, frequentior haec hac delineatione occurrit.

Gnaphalium.

Varietas GERMANICI maioris & secundum folia floridi.

INTERDUM & alia vidimus in Germania maiorem flagellatam etiam foliis & caule Stachadis citrina: & inodora, alibi etiam sterculis non in summo, sed inter foliorum interualla passim secundum longitudinem ortis: quemadmodum oriuntur in ista, quam ut nondum plane notam, hic appinximus.



AN-

ANGLICVM folio longiore perperam
Leontopodium alterum *Mnt.*

Gnaphalium str-
oum Anglicum.

GRACILIBVS & rectis virgis, nullis fiffu altis, proceritateq; aequat Absinthiu, colore etiã & figura refert: folia ab imo cespitè, radique capillacea, duplò longiora & latiora quàm Stzechadis citrinæ, fermè Salignea effigiant, toto reliquo caule Psyllo longiora, angustiora, sed pauciora, prope quæ media in pedicellis exiguè vellicatim terni quaternive flosculi, pappoli, à Buxeo pallidi Senecionis, vel Stzechadis citrinæ heret astringit: nò nihil amaricat, multũ exsiccat. Tertiò à Lódino miliari opacz syluz clitus multam alit, cis Tarnesum.



GNAPHALIUM MONTANVM

Purpureum & Album Pilosella minor Fusch.

MYOSITIDIS vel Pilosellæ minoris effigie oritur hæc in arduis frigidis, iugis, & quo loci Vaccinia nigra, aut Idea Theophrasti vitis putata, foeliciter proueniunt: vix sesquipalmm aequat, peretigua radix, repetas fibrillis. Folia incana, mollia, ad imũ penè tota, vti in Bellide, reliquo caule pusillis, perpancis & exilibus, flos summo singulus globulus est, Scabiofæ ferè, sed compactis flosculis permixtis, partim purpureis, partim candidis, hic rarior, frequètius quippe occurrit flore albo: valde quàm altringit, & exsiccat, gultu infuso. Rautsburgi Germaniz & ad Calcaris montem Norbonæ prope pagum sæpe collegimus,

Purpureum



LEONTOPODIUM SIVE

Pes Leoninus.

Mabius. 1193.

PEDVM Leoninum propter villosam foliorum & florum effigiem crus pedi annexum aliquantum referentem, dixerunt, quemadmodum pedem Leonis, Leporis, Vrsi, Columbæ, Corui, & Gallinæ, tum antiqua, tum nostra ætas. Iam inde à Brunfelsii Germanorumque aliorum de re Herbaria meritisimorum scriptorum temporibus inuenta & descripta herbula montana, quæ non parum foliis Rosam, seu Rorellam imitatur. Est quippe foliis angustis, oblongis, hirsutis, sed incanis, præsertim in imo, duos pollices lógis, Gnaphalii, Stzechadisue Citrinæ latioribus: In caule summo itidem hispido, ternos, quaternosve digitos alto, gestante flores, nigraçantes ex fusco violaceo, & capitula latiusculo, sed denso ambitu sparfa, ac nonnihil quibusdam foraminulis impressa, quasi Leonis vestigium, vel soleam imitatis. In Germaniz arduis, adeoque Italiz Alpinis & Baldo Veronensi inuenitur, sed rarius, idcircoque quid possit aut præstet nondum scitur.

CHRYSOCOME *aureae coma. STACHAS CITRINA**nostra, sine Luteus Amaranthus.*

Ang. Gold flower.
Ger. Mottenblumen, Aheinblumen.
Belg. Mepenbloemen, motten cruyt.

CONSPICUA florum corymbaceorum aurea coma nomen dedit Chrysocomæ, quæ hæcenus nosse non potuit ætas nostra, verè Hyilopi Dioscoridis ignoratione, cuius corymbaceis comis assimilantur huius flores aurei. Iam cum Hyssopum veram inferius ostensam & assertam à nobis, corymbis comparamus Stachadis Citriuz dictæ, reliquasq; descriptionis & virium expendimus notas, persuasum planè habemus, Stachadem istam veram Chrysocomen, quam etiam *Luteum Amaranthum* vocarant Græci, à colore & fulgore penè immarcescibili, cuiusmodi in istius plantæ floribus esse quilibet Pharmacopœus agnosceret: Perstât namq; diutissimè corymbaceæ vniuersæ, rotundæ, multifidæ, quasi florum bullatis glomerulis, sparsim tumultuarieq; cõditæ, Origani non ab similes, aut Hyssopi Dioscoridis à nobis datæ, lucente nitenteq; per maturitatem coma aureo pallore, & mollicello vellere, pusillo intus femine Maioranæ, sed exiliori, ruffo, acri, odorato: In cauliculis, rectis, albidis, non nihil incauis palmum & sesquipalmum altis: folijs oblongis, angustis, leui hirsutia incanis, Stachadis, vel Linariæ Oxyridis, quam doctiores minus rectè Chrysocomen antumauerunt. Radix fibrosa, gracilis, nigra foris, gummi Elemnium vel Cyperum rotundum Syriacum, redolens vti flores & tota planta: gustu etiam aromatico, medicato, acuto & feriente, non nimio seruore subaltringente: cuius amicorum quorundam doctiorum imitatione experti sumus, admodum insignem vim, ad iecoris ex glutinosi fucis ac vaporibus crasis intra tunicas discursantibus, diuturnos affectus, Pulmonibus verò inflammatis non impunè dari meminisse par est, sed affluxu pituitæ acidæ, serosæ vel falsæ calefactis aut erosis: Eoq; tutius vertisset interpres, pulmonarijs vel peripneumoniacis, quàm inflammationibus pulmonum. Præstantior hæc & speciosior Norborneis Galloprouinciæ, & Hispaniæ aridis & petrosis, vbi odoratissima & plurima, estate, radice perenni. In Germania ad Rhenum, reliquaq; Gallia paucior & infestior. Eapropter nihil quò minus veram Chrysocomen statuamus oblatre videtur, nisi verbulum vnum aut alterum, quibus subesse quippiam labeculæ MonsPELLIENSIS nostri præceptores Rondelletius & alij, qui hanc Chrysocomen vocabant, sãmedi subolsecerant ex Pliniana & codicis calamo exarati coniectura. Sic enim legebat *σασίαν λεωσίαν*, radicem rigidam siue firmam & tenuem, nigram vt hellebori, *οσ λεωβερ μελαναν* nigra sanè est foris: & paulò mox *υπολευ αρωμασσαν* vel *ουμοσσαν* εν τω γλυκί, nempe Cypero respondentem gustu ex suauis aultero, quæ odori & saporis huius quàm quòd maxime congruere illis visa fuere.

Αμυγδαλίβη
Luteus,

STACHAS *Citrina Altera.*

NEMANSII ET MONSPELLII meminimus alteram huic similem, sed graciliorem totâ, nigriorem, squallidiorem, cineritiam, pluribus cauliculis viti-
 ceis pedalis: Radice exiliore minusq; fibrata, quia raro nisi in rimosis ruderibus & mœnijs vrbium viciat, fusca foris, minimum odora. Florum corymbi singuli in singulo caule, nec aggregi, vti superiores. Semen tamen simile exile fuscum quod Londini satù nobis floruit & annuè viguit.



STACHAS

RARIVS hæc multò occurrit Illicetis Coeciferis *Sommieres* inter & MonsPELLIUM, tota pulchella, facie Stachadem Citrinam præferens. Folia tamen sūt latiora incana, uti tota planta: Cauliculis palmatibus, in quibus flores itidem Stachadis Citrinæ alterius grãdiore s, lōgiore s, Lactucæ agrestis quadamtenus. Radix non magna, lignosa, inodora tota: minus nota, peruiã, aut inuētũ facilis, ideo nondum vires agnoscuntur.



APIO'S vera, siue Pyriformis radix Dioscoridis.

RADICIS indicio cognitu facilis apios, quæ rotunda, turbinatæ coni Pyrum imitantis est, cæteroquin nobis hæc inquilina, primumq; annis abhinc plus minus decem visa Venetijs, apud eruditum Senem & Doctorem Comalecum, qui istam primum è Cræta Insula erutam, illiq; Pyriam vernaculè vocatam, studiosis quàmplurimis detexit, Deinde nobis atq; peritissimo Pharmacopœo Valerando Dontze visendi attractidq; copiam fecit plantulam Capaceæ radice, Poroniz breuiorem crassiorẽq; vnum è bulbis simulan te, concolorẽ, pullamve foris, sed intus albicantem, iam aridam, rugosam, aliquot emergentibus gracilibus cauliculis prominentibus: foliola Lini aut Hyperici minorã, breuiora angustiorã, flosculis, pallidis, tichymali minoribus. Hæc quin esset vera Apios non ambigebat ille, ut cuius vis purgatricis periculum non semel se fecisse aiebat, grauis & minime triualis peitiz vir: cui eò lubentius assentiebamur, quòd nullã aliam videremus figuræ perinde Apio quadrare: & istã iamdiu iactatã leguminis speciẽ, quàm Fuschiã Apij fecit, tã lōgẽ abesse à legitima Apio, quàm dissidet Cyclamẽ à Cicerula, cuius est fermẽ effigies illa Fuschiã: radicibus quidẽ bulbosis, sed neutiquã purgãtibus, imò ab Opilioni bus peregrè proficiscentibus esitari solitis, vocariq; *Santz cardz* Anglis, & Germanis, vt in Alstragallo monuim⁹. Multò autem magis mirati fuimus, nõ incelebrẽ Tholosatẽ Medicũ Augerium Ferrerium, qui libello de Luc venerca, hanc eandem sibi alijsq; ad eò veram esse persuaserit, vt profiteri ausus sit posteritatis theatro se præparatas ministratãsq; istas tapulas Venereis ægrotis vidisse, adq; lotiones & fomenta dolorũ decoctionẽ vsurpasse, porrò Imperat decoctionẽ harũ faciendã vti Guaiaci, Salsæ atq; Chinæ sue officinarũ Apij, quã docendo aliud longẽ esse ab ista planta, multum diuq; æstuat. Optimum virum monuisse potuerunt illius primæ qualitates alimentosæ & ignauæ potius quàm medicatæ. Apij autẽ vox, quia polysima variezq; significationis apud Græcos est præsertim literula vna aut accentu mutato: eòq; nostri Barbari non tamen indocti, sed magis de re quàm de verbis anxij, cum hanc radicem & Pyrum propter figuræ similitudinem, atq; ἀπῖον aut Chinam, propter nullam fermẽ gustui perceptibilem qualitatem vocassent, (sic enim sonat ἀπῖον Græcis, qualem vocat cucurbitam Galenus, nonnulli æterem) dederunt imperitis ansam putandĩ Apios Dioscoridis ad Gallicam luem m̃sum quantum prodesse. Hincq; errorem geminarunt cum quòd istos bulbillo: nulla purgandĩ vi præditos Apium verum Dioscoridis fecerunt: tum quia autamarunt verum Dioscoridis Apium morbo Gallico magnum præsidium: cuius facultates non præstãtiores quàm Ebuli aut similium infernẽ supernẽq; humorem pituitamq; excernentim, Dioscorides tradit. Et quia prudentia huius vitz imperarent quadragenam potationem cathartica futuram? aut si rectẽ agerent, cum drachmam. f. purgationis ergo Echinz decocto addendam præcipiunt? Verum nos honoris causa istis istorum nomini parcimus, hancq; duntaxat responsu-

unculam parentamus Præceptorum nostrorum manibus meritisimis, quos illi inscitiz ignauizque traducebant sua inuentioncula.

ACORVS

Tholosus.

ETIAMNUM in cognatione faciei & coloris geminus obrepserat error superioribus annis, propter duas radices nondum à quoquam descriptas, quarum alterâ Acori speciem & faciem præferentem auara institorum sex Cynæ suffecerat; alteram articulatam Pyrisforma tuberculis prægrandibus, Apium ab effigie turbinata mentiebantur, à colore verò & cõcretionem Cynam, nominis & rerum ignoratione persuadentes Cynam & Apii radicem idem esse, quia vtraque eodem vocata esset fortè nomine Apij, vt inonimus in *Pyrisforma*. Acoro.

- Polium montanum* { *Marinum, flore albo.*
Mediterraneum, flore luteo.
Venerum.
Creticum.
Mediterraneum minus.
- Polium, Lauendula folium, semina dictum.*
- Ageratum flore* { *Albo*
& Luteo.
- Ageratum Anglicum.*
Eupatorium Mesia.
Tencrium.
Tencrium pratense.
Chamaedris.
Chamaedris maior.
Chamaedris montana, frutescens, durior.
Chamaedris altera minima.
Euphrasia.
Scordium, siue Palustris Trisago.
Scordium alterum Plinii, Mentastro simile.
Heracleoticum.
- Origanum* { *Onitis.*
Sylvestre origanum, Dioscori. an Syriacum?
Cretense Venerorum.
- Tragoriganum* { *Alterum.*
- Hyssopus Græcorum folio Origani genuinus.*
Amaracus vulgarior, siue Maiorana nostras, non Dioscoridis Samplicus.
Amaracus, siue Maiorana repens Equid. Dioscoridis.
De Amaraco Galeni & Pauli in Parthenio.
Marum vulgare, siue Malticæ Gallorum.
Marum Syriacum.
- Palegium* { *Mai Plinii floribus albis.*
Femina.
Cerinum Montpelliensum angustifolium.
- Dichamnium Cretense.*
Pseudodichamnium, floribus verticillatis.
Pseudodichamnium album Officinatum, Fraxinella & Tragium recentiorum, cum Ghyrrhiza.
Clinopodium.
Clinopodium alterum.

- Ocimum* { *Maius Curatum.*
Medium Duplex.
Caryophyllatum pusillum.
- Acinus.*
Erinos. { *Vulgata rotundifolia duplex.*
Mentha quadruplex. { *Romana* { *Angustifolia.*
Sylvestrium sylvestre. { *Cardiaca.*
sive Mentha aquatica.
- Mentastum.*
Mentastum niueum Anglorum.
Mentha Græca, inter Lepidia.
Calamintha montana præstior.
Calamintha montana Palegia similis Nepeta vocata.
*Calamintha tertia Mentastro cognata, est Sylvestrii sive Mentastri aqua-
 tici species folijs oblongis.*
- Cattaria.*
Polycnemum, sive multitibia an Calamintha aquatica Belgarum?
Altera facie Clinopodii an Polycnemum?
Apiastrum sive Melissaophyllum.
Melissophyllum Turcicum, sive Moluca duplex.
Melissa Turcica, Sideritidis facie flore cœruleo.
Cardiaca.
Cardiaca eîsq; varietas Aspera vocata Melisa, sive Moluca.
Marrubium.
Marrubium Craticum.
Ballote, sive Marrubium fatidum.
Galiopsis.
Lamium.
- Vitica* { *Communis maior & fœmina flore muscoso.*
Sylvestris Dioscorid. Romana Officinarum, semina
Lini.
Minor. Cania Plinii.
Acrior non mordax, sive mortua duplex.
- Sideritides, sive* { *Hieraclea, sive Hierulea, Tetrabis, herba IYDAICA.*
ferruginarices { *SCORDIOIDES MonsPELLACA.*
Montana.
Mentha folia Anglica.
Secunda Mathioli, est Canabii fœmina.
*Prima Mathioli, vulgi est Marrubium aqua-
 ticum.*
- Reliquæ Sideritides quia facie diuersa, alibi.*

πολύ σπένος POLIVM maritimum Montanum.
 . Angl. Poltepe.



INTER LVSTRANDVM CYNCTAS HERBA-
 rum gentilitates, & similitudines, nullam tribum videmur
 congruentius posse annexere superiotibus quàm hanc: cuius
 figura, habitus, & quasi modus, magnitudoue non longè ab
 illis absunt, & folia dūtāt ambitu dentato, aut crenato, ser-
 ratouedistant. Est autē Polio nomen inuentum à canitie, canis-
 ve capillamentis & tomentacea hirsutie, quæ non modò ca-
 pitula corymbacea (vt ait Dioscorides) sed etiam vniuer-
 sam

fam plantam incanam reddunt, perinde ac Gnaphalium, præsertim locis maritimis, & deuexis collibus, & arenosis litoribus, cuiusmodi ad Ceti montis insulam & Magalonam Nonnensis Gallie, ubi speciosius & crebrius, quod idem Maritimum & Montanum dici potest: ab radice lignosa, recta, fibrosa, statim numerosis fruticat cauleculis, rotundis, sesquipalmis, & que spaciis crebribus folia oblonga, Gnaphalii leuiusculis impressa crenulis, rigidiuscula, quæ ex aduerso vna caules cingunt: inque summo radiatim circinatisve florum globulos corymbeos effigie Serpilli candidos, effigiant: vti & vniuersa planta tomentosa lanugine pubet incana. Istud præ cæteris odoratus: sed quiddam acutum & grauiusculum naribus vna cum suauitate afflat. Semen paruum & teres, oblongum.

VENETVM.

Quo minus multò crescere meminimus in Insula Lyo Venetæ ditionis & clientelæ, necita incanum.

CRETICVM.

Nec aliud videtur quod Creticum dono habuimus: nempe huic magnitudine par, lanugine & habitu maritimo MonsPELLIACO simile.

MINVS & mediterraneum.

PASSIM istud etiâ locis perquam à mare disitis Allobrogum, Lugduni, & Valentie, glareosis, & asperis, salebrosis, montosis, & planis fruticat, viticulasque palmares erigit crebras, tenues, foliis crebribus ex interuallis emissis, angustioribus multò & inæmolate, sed minimè incisis, leuiusculis tantum denticellis in ambitu extantibus: alterius flores pallidi albidius: non diuersum semen est, nec odor, sed ignauiora.

LVTEVM.

PROPE Aquilextias quibusdam superciliis collium & cliuorum luteis occurrit floribus, spectatu iucundis.

POLIUM Lanenda folio, flosculis pallidis,
Famula Recentiorum.

Quo nondum in maritimis verum Polium nouerant, istum plantam Polium fecerunt: Siquidem persimilis etiamque congener Foliis est: tametsi odore penè nullo, gustuque emplastico & ignauiore: quam Polium Fœminum ideo quidam didicant: nec loca maritima amat, vti Polium germanum, sed montosi, glareosa, Sabaudie, Delphinatus, & Galloprovincie: Reptatq; Serpilli modo, lignosis furculis, dodrantibus, inflexis, crebro geniculatis: & numerosis foliis incanis, Stachadis, aut spicæ Lauendulæ: flosculis etiam confertim è calyculis Rosmarini: crassiuscula & duriore radice.

ΑΓΕΡΑΤΟΥ, AGERATVM, vel non senescens, MESSIA,
Eupatorium. Officinis.

Ital. Herba Giulis.

FLORIS aurea gratis, senecti non sentientis, umbellæq; corymbacæ, Elichrysi æmula, satis superq; fuerant docendo nostrate Ageratum esse Dioscori. genuinum, quibus de notis etiam notissimū vel Pharmacopœorū calculis vbiuis gentium iandiu fuit: nec proinde opus fuit istis Herbariorū rabulis, & triuialibus declamatoribus tam multa acerrare, vt nullius momenti obiectiones diluerent: potius inter parahædum Mesuæ Sirupum de Epithymo gustassent decoctum, aut folia Agerati Nonnensis & planè siluissent: est
S. ij. enim

enim non modò valde acre & amarum, sed etiam ad ciendum vrinæ intrò sumptum, forisquæ suffitum, admodum efficax: odor etiam suauis quādamtenus Rōmāz Chamæ: nullz fragrantia, index certior est facultatū emolliendi vuluz duritiæ, vrināq; nidoze eliciendi, quas Diosco. memorat. Præterea collatio cum Origano hic valde oportuna est, siue totam fruticem, & umbellæ, vt Dioscorides, siue etiam reliquam plantæ faciem perpendas. Sunt enim hæ bullatæ umbellæ, vt Elichrysi, Origani, Hyssopi & Chrysocomæ, quas inter se confert Dioscorides, qui tamen hic foliorum non meminit: vt neque Chrysocomæ, quam Hyssopo assimilat: Hyssopum autem Origano. Quid si etiam Origano folia assimilasset propterea istud nostratæ Ageratum perisset? neque enim adeò procul absunt folia ab Origano: quinimò quibusdam Norbonæ locis & Tuscaniz squalidis, sed depressis, videas Ageratū fruticuli folia multò minora, & tantillum crenata, rigida, dura, pluraque virgulta, Origanis variis inibi fruticantibus, toto habitu non dissimilia.

Ageratū visitur interdum etiam illic specioso candore, nitentibus florum bullis, haud tamen de cætero, ab illo diuersum.

AGERATVM Septentrionalibus & Anglicis.
Angl. Mandelem & Mandelein.

*Balsamila mi-
nor Dodo. Ept.
885.*

CVLTV tamen adhibendo humidiorē, vel cœlo Septentrionali algidiorē, valde variat quod colunt vireta Gallica, Germanica, Belgica: latius proceriusque fruticans, maioribus ramis, latioribus, longioribus foliis, & altius multò crenatis, flaccidis, ad Galli cristum herbā accedentibus. Sed Angliæ hortis viuacius nihil, isto etiā Norbonico semine fato, ramis caducis, magisque serratum foliis, diu persistans, admodum diuersum. Idē contigit etiam Altheæ arboreæ Prouincialis, quæ in Maluam abiit trienniò post quā in Angliæ hortis seueramus, hirsutæ canitiæ; exutis: quasi foret species diuersa. Istud sponte enatum clarissima MonsPELLIENSIS schola & collegium Venetorū Medicorū Syrupū Epithymi & Mesastiarum compositionibus, vt legitimum Eupatorium addunt: Græcorum autem medicamentis, nostram Agrimoniam. Quod institutū si cui minus aridet, ista vtatur moderatione, vt vtriusque; nempe Græci & Arabici Eupatorii equas portiones misceat, vt in Antiballomenis monuimus: præsertim vbi vtrius sit gentis compositio, incertum fuerit. Neque arbitrandum Eupatorium Mesuz esse idem cum nostrā Agrimonia, Dioscoridis Eupatorio recepto, vt non nemo autor minimè inualus, nec indodus Belgæ nuper persuadere voluit: cui libenter assipulabimur, cū hæc notas à Mesuz Eupatorio tributas suo, nostrati conciliari: quæ sic habent: *Herba longitudinis cubiti, amarum tinis multa, cuius folia sunt sicut Centauri minoris, viridia, sed sunt aspera & incisa, & Stipes eius est subtilis, & quando exsiccat ut cirtinensis, & eleuatur super eam, flores, qui sunt sicut subcitrini, longitudinis pauci.* Quæ Arabica simplicitate, exprimunt tum delineationē Centaurio proximā, tum perquā in amaram & Absinthio similem, Cholerae purgatricem facultatē (neutiquam Gratiolæ, impendiō effrænis & visceribus hostis) paulò superius recensitam inuunt, aliæque non pauca indicia, cuius plantæ potius, quam Agrimoniz ascribenda: eapropter satius fuit Agrati speciem retinuisse, ob eas rationes quas adduximus.

*MESUZ
Eupatorium.
Agrimoniam.*

Teucrium TEUCRIVM.

*{ Germ. Stoffs Balthengel,
{ Gallie. Grosse Germandree.*

PVTANT Plinioni idem alii: nos potius Spleniū Teucrī inuentoris cognomine donatum à Plinio, & hanc Dioscoridis præteritam, quæ tamen Spleni optimè sacere nata est, & nihilo secius ad Teucrum inuentorem referri potest, per Plinianā Historiam: cū constet neutri harum proiecta exta adhæsisse, nedum sanguine exinanita fuisse. Ac tametū Teucrī notio minus certa videtur propterea quòd descriptio aut malè aut mutilè

tiſe prodita eſt. Verum huius vt & conſimilium Chamædriſ & Germandriæ diſtæ deuoluta eſt ad poſteritatem cognitio, adeo vt etiam qui deſcriptiones nullas norunt vernaculè omnes vno nomine Germandreas vocent. Nec ambigendum quin legitimæ ſint. Ac primum Teucrium ſaxoſis multis aridiſq; montibus fruticat, virgultis multis, rectis, lignoſis, ac proceritate dupla Chamædrin vincunt. Folia verò ſimilia ſed craſſiora, aliquantò minus incana, rugoſa, & aſpera: flores conſimiles minori Germandreæ, ſed puri purei ſaturioris ex interuallis & ex auerſo Chamædriſ ritu vt i & flores oriuntur.

TEUCRIVM præſenſe. Offici. Germania & Baſſauia
perperam Chamædryſ;

Ger. Etiam Samander.
{ Ang. Wilde Germander.

IN nemoribus & pratis ſubfruticula, cauliculis exilibus, nec duris, ſeſquipalmum altis, radice lignoſa, fibroſa, folia ex aduerſo & interuallis bina, quaternaria, ſena, caulem veſtiunt in ambitu ſerrata, modo & magnitudine Chamædriſ maioris: ſpicatis Thyſis: ramuli catulium ſummi donantur cæruleis ex purpura floribus Anagallidis concoloribus, Hyacinthi modo. Nondum Chamædriſ vtrius nota utebantur Germani Seplafiarij iſto, ſimilitudine quidem decepti, ſed viribus ducti quibus, ad viſcerum obſtructiones, Cacoſymiam, virginumq; foedos colores, miris pollet & certisſimis hæc plantula. Et hanc vnâ duntaxat Germandream tum vocitabant illi: quam nomenclaturam vulgus poſtea impertiuit Chamædriſ, etiam apud Anglos & Gallos.

CHAMÆDRIS Quercula minor. Triſage ſive Trixago.

{ Ital. Quercinola, & Calamandrina.
{ Gall. Germandree, ou Cheſnette.
{ Ger. Samander leyſen Baſſengel.
Ang. Germander.

ABVNDI exprimit huius ſolium & faciem nomenclaturâ Chamædryſ, ſive Querculæ, vbiuis locorum præſertim apricorum adoleſcentis. In Burgundiæcis verò collibus vniuerſos quaſi tapetis videas ſtratos purpureos & viridantes opacè montuſos campos, quantum eſt inter Chalonas (vulgo Chalon) & Machaonem. Radice exigua, ſurculoſis virgultis, numeroſis, pedem altis: folijs in ambitu ſerratis, binis, numeroſis, vt quercus, ſed profundè minus. Floribus purpureis ex iſdem interuallis vt Teucrio.

CHAMÆDRIS MAIOR.

SEDOQUÆ Antuerpiæ hortis viſitur folijs eſt maioribus & ædidiſioribus, & flore cæſio pallescente: vbi etiam nives imbrèſq; brumales aſpernit, illa contrâ breui marceſcit.

CHAMÆDRIS montana fruteſcens, aurior.

HEC nobis primùm innotuit Lugduni opera noſtri Valeradi Donrez, qui è Sabaudiſ & Delphinatus motibus erutam habebat. Eâ Chamædryos Montanæ nomine, quia illi facie tota proxima, donauimus. Eſt quippe folijs Chamædryos vel Scordij ſimilibus & paribus: ſed auerſa parte Potentillæ ſive Argentinz diſtæ modo, incanis, & inæquali exortu, nõ verticillatim binis, prodeſutibus, Cauliculi verò duriores, lignoſiores multò, maiori Germandreæ ſive Chamædryos, pedales, humi ſparſi, colore ex fuſco rubentes, Alypo Norbonenſi concolores, Radix lignea, Tota nonnihil amaricat, Salicis guſtu.



CHAMÆDRIS minima.

Farmina Dodonæi.

S.iii.

Hef.

HERVLA istam olim Germani herbarij nomenclatores dixerant alteram Chamzpytim, quam floribus & odore quadantenus refert: sesquipalmū alta multiplici cauliculo quadrāgulō, lanuginoso, implexo humiq; incuruo: Fumariz Plinianz non Chamzpyteos: folia numerosa, parua, dēta, multū incisa, absynthij aut Quercus ritu, sed longē mi nora edēte. E quorum interuallis, flosculi purpurascētes circum emicant. Semen pusilla inclusum capsula, nigrū, Calaminthz montanz modo. Radice crassa multis capillamētis.

EPPHRASIA, siue *ὑπερόσυν*, alia ab Euphrosyne Bugloso.

{	Ocularis.	{	Ger. Augentrost.
	Bely. Dogentrost.		Ital. Eufrafia.
	Gall. Eufrafe.		Ang. Eyebrecht.

APUD antiquos Botanicos nulla extat mentio vllius Euphrosynes; praterquā Bugglosi, quam *ὑπερόσυν* πρᾶξα τὸ ὑπερόσυν vocarunt, quod in vinum deicta, vt loquitur Plinius, animi augeat voluptates. Ac tamen non paucē possunt eadem nomenclatione insigniri, vt Verbena (cuius decocto asperfa cēnacula lztiores conuiuias reddit,) atq; Melissa, Pimpinella & aluz, quibus imbuta pocula animos voluptate demulcent: tamen hęc herbula Græcam originem testata, ducentos & eō plus anno s, iam posteritati Euphrasiz siue Euphrosynz nomine innotuit, ad oculorum caligines & morbos pituitosos peruagatz commendationis: vnde Germani Augentrost, oculorum solamen: Anglis Eyebright, oculorum lumen, dicta fuit. Nec abs re sanē, vt cuius puluere sepius ingesto, per se, vel cum Aloe, ex aqua fœniculi aut Verbenz, mirū quantum opis prestetur oculis, fluxione, aut caligine vexatis. Vino autem cui multa Euphrasiz iniecta fuerit, quantumuis magnopere commendetur à multis, non perinde fidendum: vt cuius potu tantum trimetri in Heluetia vsū sociū & cōmilitonem nostrum, meminimus penē ambobus orbatū oculis, & fluxionibus modō non oppressum: quom dūtaxat antea leui cataphora & lachrymanculis laboraret. Quare puluere, aut decocto, citra vinum, tutius vietur quis, & ea prætetim, quaz itrigoto solo pusilla est, palmaris, hilari aspectu, facie, cauliculis & folijs crispantibus Teucrij parui, aut Veronicz sceminiuz, ex alioribus: flosculis item pusillis, ex luteo albicante, & purpurascētibz. Pratis strigosis gaudet, sapore amaricante, desiccante, calfaciente.

Σκόρδιον. SCORDIVM, Trizago Palustris.

{	Ger. Wasserbottenig, Lachen Knoblauch.
	Gall. Scordion & Chamaraz.
	Ang. Water Germander.
	Ital. Chalamindrina Palustre.

AB omni memoria celebrem fecēre Scordiū Allij teter odor, & alexiteriacū nomē: sed tamē penē perierat superiori sēculo cūcto ignota plāta: vix enim vigesimus hic est annus cūm primū A cademiæ Pharmacopœisq; MonsPELLACIS innotuit verum Scordium opera Episcopi MonsPELLIENSIS Gulielmi PELISSERIJ, Rondelletio Præceptorī in Piscium stirpiūq; vestigatione Theſeo & riali. In herbis namq; & amœnis manūmis agri MonsPELLIACI animi causa dum vnā spatia rētur, inibi q; Allium subodorarentur, illico herbula vixdum arreptam, & eminus conspicatū Scordiū esse deprehenderunt. Indidēq; varijs plātis in Galliā & Italiam misis, amico s verū esse Scordium monuerunt. Illi facies vniuersa prorsū Triflaginis, radices numerosiores, fibris crebribz sumo cespite sparsis: folia crassiora, densiora, succulentiora, non nihil tomentosa, rugosa, aspera, viridantia, vt Mentastri.

SCORDION alterum Plinij, latioribus folijs, Mentastri simile.

{	Officinis saluia agrestis & saluia Bofci.
	Ger. Wild Galben.
	Ang. Wood sage.
	Bel. Wilde saut.

Alterum

ALTERVM & quidem Plinianum fecerunt illam in sylvis Germaniæ & Angliæ frequentem Agrestem vocatam Saluiam, fortè nonnulla de foliorũ similitudine. Quippe folia magnitudine & habitudine Saluiam, colore verò atro, virète, superficièq; rugosa Scordium Melissamve referunt: etiamq; odor quiddã Scordij, non tamen prorsum Allini, sapit. Herbacei ex luteo sunt flores Saluiæ, aut sylvestris Hormini nõ absimiles, minores vnaq; serie ad easdemq; partes penduli, vt Digitali, lutei: rotundum & fuscum semè est: fasciculatus Rubiæ, ad sanguinis grumos dissipandum.

ORIGANVM Heracleoticum, Cunila.

Ital. Origano.
Ger. Wolgemut, Kottbosten, siue Costens.
Hisp. Oreganos.
Ang. Organe, or wilde Margerome.
Gall. Mariolaine bastarde, Origan.

QVASI diuinos, editos, montososq; natales amaret *ὀρειανόν* appellata fuit hæc, quam iam haud nobis difficile nosse ex Hysopo alibi indicato & probato, à quo non varient Origani species tres, nisi magnitudine & vmbellarum disparilitate. Heracleoticum autem est illud Hispanicum in Flandriam saccis plenis quotannis deferri solitũ, & ab institutoribus distrahi: vtuntur enim vulgò Piperis & Saturiæ vice in obsonijs. Belgæ hanc plantam colunt, pedem altam, folijs & virgultis Maioranz maioribus, quibus summis nõ in vmbellam circinatam collecti sunt flores, sed in paruis thyrsis, spicatis, ternis, hinc inde dissipatis vt Thymi, odore Maioranam prouocantibus, præsertim in Lusitania & Lucania enata.

ORIGANVM ONITIS Galloprovincia, *maius*, & *minus*.

MONSPELLI circum inq; Galloprovincia, notissima sunt duo Origana, maioris & minoris discrimine duntaxat discrepantia: nisi quia huic Amaraci facies & folia, sed minora & rotundiora Heracleotici semè: Caules recti, pedales, fruticosi, ramulis & fastigijs breuib; coactis, spicatis, confertim in vmbellam collectis, floridum corymbum imitantibus, & per æstatem purpurascenibus, admodum glutinosis.

MAIUS.

Est hoc quidem maius, & fruticosius, hirsutius, sed viribus, sapore, & odore contemptius alioqui: perquam simile, & passim occurrens.

STYLVESTRE *Origanum Syriacum*.

VENETI Pharmacopei & Medici è Syria aut Creta Origanu vtuntur longè optimo. Cui cauliculi exiles, folijs paruis, capitulis numerosis, collectis, ambitu vmbellam imitatis, Onitidi proximis, sed non perinde accumulatis, albis flosculis. Gustanti grata tota & aromatica, Dictamni & Piperis acrimonia. huius fasciculos multos habebat seduli & pro bi Pharmacopei Martinelli Officina ad Angeli Symbolũ. Sed Seplassiarij nõ pauci illic & alibi in Italia, veras Theriacas ementiuntur & nundinantur istius nucella, & verè precio distrahit, non tanto errore, quanto flagitio: est quippe efficax & gratum antidotum dissolutis veneno viribus, aut stomachum dolentibus.

CRETENSE apud Venetos *Tragoriganum*, siue *Hircinum*.

HIRCINVM videtur nuncupatum quasi pabulo gratum foret capris, vt Onitis Asinis, potius quàm hircum feteret: grata enim & mitis Tragorigani potio, Dioscoride teste, cuiusmodi huius, qui furculis dodrantalibus & folijs paulò quàm Thymi Cretensis maioribus, densis & rigidis, floribus per interualla & verticillos, purpureis, Clinopodij modo fruticat: sapor feruens Piperis, aut Thymi illi, qua & foliorum addita coniectura, Creticum Thymum id vocarunt Origanum recentiores, quod nos Tragoriganum putamus. Cum inter Thymi Cretensis fasciculos & quisquilias istud semè repertũ hortis creditum fuisset, scilicet adoleuit Italiæ, & Flandriæ hortis.

ALTERVM TRAGORIGANVM.

HERBVL illa fruticosa, quam iãdiu decerpimus in horto Antonij Cortusij Patavini magni Mathioli præconis & seruitoris, nulla melius videtur genuini Tragorigani R. iij. effigiem

effigiem & facultates explere potius quàm Mari, quo uomine isti nomenclatores præproperi illam donauit, nam Fruticulus est sesquipalium altus, albidus, multis cauliculis tenuibus Serpilli folijs, vel istius Tragorigani proximè descripti: flosculus subter folijs purpureascentibus, saporis acerrimi, odore fragrantissimo & vrente: tritum namq; digitis eminiùs non fecus ac Flammula percellit nares & cerebrum ferit. Multas licuisset Tragorigano aptare, sed nullas reperimus istis duabus verius aut commodius quadrare. Non esse Marum, semidescriptum à Mathiolo folijs serpillis, odore Pulegij, suo loco dicemus. Videtur species altera Calaminthæ.

Genuina HYSSOPVS Græcorum folio Origani, umbellato flore.

CLARA & notissima olim Hyssopus, sapientissimi Salomonis nota altera Sermonum Naturalium, qui cuncta disseruisset à Libani Cedro ad vsq; Hyssopum de pariete enascentem: nisi non sit eadem Palæstina, quæ Græca: vbi tamen perinde cognita, & quasi ὁ μιν ἔτι τοῦ ἀπα impluens oculos vel visum, tametsi possit & ἐν τῇ ἐννιῇ quia vocem rauca ἦν ἐκ pulmonέσq; iuuat. Ne aperiamus fores declamatoribus, pauci, & aptis Hyssopi historiam perstringimus: nam non minus vulgaris notitiæ Hyssopus fuit olim quam sunt hodie varia Origani genera in Galloprovincia: & in Romanæ alperis Hyssopus vulgaris hortensis spontè fruticat: sed quia duplicem facit Dioscorides, & notiorè ait quàm vt describatur: nobis hinc inde emendicandæ notæ, quæ Criticis istis declamatoribus claudat concionandi valuas. Alioquin quod chartis illinent semper habituris. *Proximo Stachadis capite isdem viribus Hyssopum dictū, & altero mox Heracleoticum folijs Hyssopi similibus, sed umbellam non Trochoides ad eist, circinatam, vel turbinatam qualis Hyssopo: quin potius umbellæ vel turbinatæ, vel disperatæ: & in extremis virgii semen non densum.* Venuò paulò mox Onitidem candidore folio, & similiore Hyssopo, quàm Heracleotico. Semen non quidem esse corymbos sed ita coniunctum vt speciem corymborum præbeat. Primum quando ex Philosphiæ præceptis Phroniz tacito ductu à notioribus vniuersam nostram cognitionè hauriam fuisse docemur, nobis quippiam certi statuendum & cognoscendum cuius ope & perspicua notione in cæterorum cognitionem prouehamur. Ea de re cum sit Serpillum non minus frequens quàm certum & notum, eiq; à Dioscoride folijs & ramulis Origanū collatū, cui quidem author idem Hyssopum assimilauit folijs & umbella. Nobis minutias istas accuratius perpendentibus, neglectis nequitiam facultatibus, nò magis, videtur iam ambigendum de vera Hyssopo quàm de Serpillo aut Origano. Quinetiam Maioranam hortensem certissimè cognitionis Botanicus Cræteus, Isaac Serapio, & Mesues similè faciunt Hyssopo. Intuere iam communioris & vbiq; Galliz, Belgiz, (vbi Anglicū vocatur, quia in Anglia plurimum lætius, & cibis aptū prouenit, præsertim in hortis) umbellam habet circinatam, turbinatamve, densam & congestam ex multis flosculis, purpuream. Eius dum flosculi maturescunt, semina frequenti pericarpiorum serie ac glomeratione coniunguntur in Corymbis æmulationè, non fecus atq; in Maiorana cernere est, nec non in Origano Onitide, & vulgari. Quòd si ad folia, vires, umbellam, totam deniq; effigiem respicias, Hyssopum sanè, nisi foret Origanum, futurū dicas. Est igitur ista planta prorsum congrua tot notis quot possunt & opus est adferri ad geminæ Diosc. Hyssopi cognitionè: odor suauis, Origani Hispanici, Heracleotici putati, acrimonia mitiore. Nec quicquam videtur differre ab illa plàta quàm Doctor Treuisanus Patavinus in horto suo colebat: putabantq; Docti Hyssopum folio Origani vel Origano similè: omnia quippe similis huic, acrior tamen: de floribus & semine nihil prodimus, quia nondum planta, vt potè recens allata, floribus seminèue donata erat. Corymbi autè vox Plinio & posteritati fraudi fuit: nam legenti tria semina Hyssopi mederi Epileptici, ratus nasei è Corymbis istis bacca hæc seminibus hallucinatus: Siquidem umbellæ attribuunt semina, Corymbis Baccæ.

AMARACVS vulgarior sine MAIORANA nostras,
non *Uscoridis SAMPVCVS,*

Ger. Maioram, Meyeron.
Bel. Mariolèpnen.
Gal. Mariolaine.
Ital. & Maiorana.
Hyss.
Ang. Maricrem.

Quia

QVIA ex Cypro Amaracus laudatissima & odoratissima ad vnguenta expetita fuit, adulati Poëtæ Cypri Regi Cynaræ, fabulati sunt eius puerum Amaracū vocatum, dum alabastrū vnguinis suauissimū plenum ferret, lapsū, id fregisse, præque luctu intabuisse, & in Amaracū versū fuisse: vnde Herba vocata fuerit Amaracus, quam & Sāpsucum Aegyptus & Syria dixerē. Hodie notissimam quidem habemus Maioranam, quæ tametsi non sit ea quam Dioscorides, per terrā repente, ramosam multis cauliculis Calaminthæ foliis describit: tamē tātopere affinis est ea quam mox ponemus, vt quā sit species vna, minime harendū: quod idē sapor Thymi, color incanus, odor Mari, suauiorque quam Origani, testantur: perinde vt figura, palmi & sesquipalmi surculosa, alis numerosis, quæ cingunt foliola rotunda Origani: vt & summitates spicate, in quibus flosculi purpurantes: radices sub sunt exiles. Nuspiam nobis visa nisi in hortis.

Hanc maiorem dictam, tum aliam tenuiorem, delatiorē, odoratiorem, Origani facie, alioqui non dissimilem, colunt Gentilemque & minutam vocitat plebecula: *Varietas.* fragrantio rem est & in holere aptior, eius oleum stillaticium coagulo leporino remittum & Moschi tantillo, arcānum conceptui felicitando nulli referandum, augmant.

SAMPVCVS *Dioscoridis, siue AMARACVS serpens.*

VT non inficiamur vulgatum Maioranam Sampfuci speciem esse, ita istam rariorem multo & humi serpentem verius Amaracum dici debere asseueramus. Non enim rectis erigitur, aut fruticat ramulis, vt superior, sed in cespitem caducis Serpilli modo, cui alioqui persimilis folio, effigie & magnitudine est: cuiusmodi quæ in Belgio Nerui creuerat sedulo Pharmacopœo Ioanni Mouton, & nonnullis in Gallia hortis, etiamq; Antuerpiæ nostro Coldenbergio, stirpium peritissimo.

MARVM, est Mastice Gallorum & Anglorum.

REGI Thraciæ cui nomē Maroni esset, sunt qui Mari herbæ appellationē acceptā tulerint: verum tamen potuit etiam ab Amaraco per apocopen dici: vtpote cum Amaraci species videatur Marum, adeoque tātopere affine sit, vt multi hodie Maioranā legitimum esse Marum in literis miferint: idemq; ausi sint Marum receptū siue Mastice Gallorū decernere Clinopodii: quæ tamen herba parum Clinopodio congruit, præter quadrant quas nos illic damus: & odor, sapor, color Amaracum & Origanum, aut potius Marum satentur: eoque Galli vocant Mastice, quia odoratiore & gratiores quam Origanum, aut Sampfucum, vt Galenus vult Marum, Lib. de Antidotis. Quare cum tot talisq; quot & quales hactenus desiderabantur, eoque plures, habeamus plantas; ne utiquam pareat Maioranam nostram Marum asserere: nosque Sampfuco priuare; quem nullus nescit speciem Maioranæ esse.

MARVM STRIACVM, gracilioribus sarmentis, minoribus capitulis & foliis.

SI cui interim superior, siue Mastiche Gallica, minus videatur Maro congruere, saltem hanc nō respuat Syriacam, quæ gratissimo & vegeto est odore: imò & facie tota Maioranam præfert, aut Origanum: sed gracilioribus, non breuioribus, pedalis, & sesquipedalibus: viticulis i corymbaceisque aspectu elegantioribus, delicatioribus capitulis, etiā decimum ferme annum, ex quo Venetiis Alepo Syriæ habuimus, odoris fragrantiam retinentibus. Cæterum nisi harum vtriusq; in Mari veri persuasione nos retinuerit, licuisset huc adferre Marum Cortusianum, quod alibi Tragoriganum fecimus, quia vrentior & vehementior est, quam vt Marum deceat, sicuti imbi monuimus.

ῥιζοῦ PVLEGIVM *Regium vulgatum.*

Gemma.

Germa. Poler.
Gallis. Pouliot.
Belgis. Pölepe.

Peny riall, Peny Reyall.
Angl. Pulwell & yal.
Pedalag. grosse.
Organy.

SIMILI Dictamno facie Pulegiū, sic Latinis dictum à pulicibus, quos nidore fugat & necat, acriq; & peramaro gustu, pectori si eo pascatur balatū extorquet, idcircoq; *βλῆξ* nomen factum illi, nisi etiam sit quia è pulmonibus pituitam crassam facietamque exundat. Hodie regium & vulgatum Pulegium immeritò, sed solito more respuunt publici censores, & rationis ne micam quidem addunt. Pliniae non nisi vnum genus designat Maris & Fœminæ mentione, quod idem est & Dioscoridis. Est omnibus facultatibus efficacissimum receptum Pulegium, in hortis quidē floribus purpureum, vtplurimū mat Pedemontis planitie itinere medio ad Izuam, quā Ryuolio Taurinum itur circa margines Pulegio florente obductos, non paucas plantas floribus candidis, vuidis legimus: ac deinde idem aliis locis repertum, Cortusio & Venetis quibusdam studiosis ostendimus: foliis vtrūq; Syfimbriæ, aut Origanī, toto caule ex intervallis cum floribus verticillos alterius planē modo constantibus vires, odor, prorsus eadem.

Max Piniy floribus albis.

Argusifolium, sine CERVINVM, Montpellierensium, odoratus.

MINIM mirum Ceruinum Linguæ gothicum nulli dum fuisse descriptum, aut pictum. Nam tamen Norbonæ Montpellii est ubiq; obuium, & nulli non cognitum: tamen quia laud tenerrè facillè occurrit in Italia, Germania, aut aliis Galliz Regionibus, illis ideo videtur fuisse ignotum. In luco Gramontio pone cœnobium, & in primo aditu ad lutosas scrobes multa fruticat crebribus furculis, multò quā alterius erectioribus & rigidioribus, dodrantē altioribus: foliis minoribus, crebribus, Satureiæ æmulis, & æqualibus: ex intervallis per verticillos distinctis, è quibus florū veluti purpurascētes globuli oriuntur. Radix verò dissimilior alteri Pulegio, summo cespite sparsa & multiplici flexu multorū quasi asparagorū bene adultorū, Gratiolæ vocatæ modo. Huius sapor, odor & vires multò quā alterius gratiora, vehementiora, & probatiora: vtriusq; enim cum maxima copia suppetere nostris præceptoribus Regiis & Montpellierensibus professoribus, tamen istud præ altero, Pharmacopœis accipiendum imperabant.



DICTAMNVM.

VNI, Cretenſis Idæ montis quasi oculo Dictæo vocato, debentur nomenclatio educatioque decantatissimi Dictamni, Pulegio adeo affinis, vt nonnullis aegre sit dictum pulegium. Huius nō ita magno precio multam copiam emunt non modò Italica, sed etiam Belgicæ & Anglicæ Officinæ hodierno die, tametsi non paucis ab hinc annis floribus donatum perrarum & chærum erat: quippe per paucum olim, idque floribus orbatum adferri solitum fuit: Idcircoque flore cassum esse Diosco. verius quā antiquis, de eo prodiditum fuisse, credebatur. Iam planta cognita, lis iithæc reliquēda maleferiatis: floribus enim speciosis, purpureis, multis, trans lucidas concolores squamas spicatas, emergentibus, Stechadis modo, copiosum ad nos affertur. Quinimò, vt fertur, Pisanz orge & Ligusticæ asperis de uexis satum, creuit, & floruit, exili semine, in plantam paris pulchritudinis, qualem ipsi vidimus: tertio tamen vel quinto post anno, in spurium abire audimus.

PSEVDODICTAMNVM floribus verticillatis.

ISTUD quidem Pseudonocatum audiebamus de quibusdam Italis in monte Nigro dicto Pisze & Liburnæ contermino & aliis locis maritimis nullo fatu oriri: nec verò illic vnquam fata, aut in affinem speciem degener facta videtur; nam caules multiplices cubitales, recti, terni, aut quaterni: folia ex interuallis bina, paria, & vt caulis incana: omnia deinque similia, nisi quia flores cõsimiles, dissimili modo & situ oriuntur. Sunt enim non ex spicis, sed ex foliorum pediculis.

Ἰκμυοῦ. OCIMUM medium vulgatum, BASILICVM.

{ Germ. Basilgen.	{ Hisp. Albahaca.
{ Gall. Basilicq.	{ Belgis Basilicom.
{ Ital. Basilico.	{ Ang. Basil.

QVAMVIS antiqui excusi, tum calamo exarati codices, vbique Ocimum, non Ocy- *Math. 133.* mum, aut Ozimum habeant; tamen quia herbula hæc eximie odora cerebrum feriret & sternutamenta ciceret, eam primulum Ozimum vocitatum, id est, odoram fuisse, naturæ & doctis nos assentiri par est, odore enim nium quantæ fragrantie esse Ozimum Troglodyticũ & syluestre nasci iamdiu notum est. Nec ocyus cæteris quàm plurimis oriri certum; quare id Ocyumo farragini leguminum tribuendum fuit, vt postea dicemus.

Ocyumi autem vel Ozimi vna species est, varietates tres notissimæ vel mulierculis, quæ *MEDIUM vulgatum.* odoris & oleris gratia in figlinis vasculis colunt, aut in puluillis areolisve viridarium: frequentissimum autem Ocimum vulgare, siue Medium dictum, quod quidem duplex odore habetur: vnum quippe vilius & abiectius, odorem suauem et antilla grauitat iuxtum, Apiastris modo spira: radicem & cauliculos pedales & folia Mercurialis Parietariz, vel Agriorigani, sed nigriora mittit: flosculis è calyculis verticillatum caulē ambictibus: semine pulillo nigricante, quadamtenus Thlaspi.

Medium Citratum.

ALTERVM nullatenus distat, præterquàm odore gratiore & cordi amabiliore, qui corticem Citri mali redolet; idcirco Citratum vocitatur vulgus, non à Citri folio, vt falso scribunt quidam.

MAXIMUM Caryophyllatum ac Citratum.

RARIUS istud, & regionum calidarum amantius, cuius folia, cum & aque planta quadruplò maiora, odora, Caryophylli cum Citro confusi iucunditate, semine, nec villa sua parte alioqui diuersa.

MINIMUM Amaraci figura Caryophyllatum.

NON diuersa huius facies, sed minor tota dumtaxat, quæ Caryophylli halat fragrantiam, eapropter vulgus, qui in tessulis & pensilibus figlinis, alit Caryophyllatum vocat, & gentilem, quemadmodum rosam quampiam Canellatam, à Cinnamomo, & Moscatà, à Mosco dicere cõsuevit. Hic aspectu pulchellus, interdū crispantibus, foliis & cõuolutis in glomerum: vitreæ phialæ, cui insit aqua, angustis oris, intrusum, vixit angeturque radice aque potrici, diu reliqua herbula virente. Complures alie vel differant, vel varietates sponte oriri produntur apud Abyssinos, quas nobis non planè notas hic silemus, fusius alibi dicturi, quæ de Ocimi natura culta, & viribus penè prodigiosis, tum ab aliis prodita, tum à nobis comperta fuere.

Ἄκυνος. ACTYNS, siue Sterilis.

NON tantum persimilis, sed & congener Ocimo videtur Ἄκυνος, ac per y proferenda; quod sterile infecundamque signat plantam: vt etiam Plinius fortè interpretatus fuit, qui hanc herbam coronarum & ciborum causâ in Ægypto seri, nunquam florere, aliòque nomine Epitreton vocari, aut potius Epipetron (vt Theophrastus habet, qui hanc inter ἀκύνους censet) scribit. Quare cum illi florè non negasset Dioscori, eiusque studiosissimus Ruellius Ocimum, siue minus Basilicum, posse esse Acynon, ni obstat Theophrasti Pliniique mutila Historia, dixisset: Senænsis candor consuetus hæc arripit, & quæ
si ita

si sua obtrudit exprobatque doctis, nec interea lectori quidquam commodi molitur: tamēu explosio Ocimo illo minimo, Calamentum illud inodorum viarum vbique frequens & contemptum, à Manardo iamdiu adductum profert, illique nulla probatione præfert. Sedenim qui acris menstruique ciendis aptum Calamentum illud norit, neutiquam assentietur. Et aliz sunt plantæ quæ multo aptius quadrarent, nī aduersarentur vires, nempe sistendi menstrua, & igni sacro medendi; si conuenerent etiam folia, & rami floribus vidua, ex Theophrasti & Plinii Historia, quod nusquam tradit Dioscorides. Quare fieri potuit, vt quod Plinio in Bechio, & Dioscoridi in Distamno contigit, idem vīu venerit Theophrastus. nempe vt nullum agnosceret florem in Acynno; quem postea Plinius sequutus sit: apud quem tamen legunt nonnulli Acynon non penitus flore carere: sed in hortis non florere. Et si coronaria fuit, verisimilius est flores habuisse. Sed quemadmodum Bechio & Petasitidi, quia præproperè florent, & citissimè deflorescunt, deesse florem quidam putarunt: sic fortè isti, quia obscurius & serius flores promittit, ac sæpius interdum emerlos amittit, intempesta Autumni qualibet minima sciuit: sicuti videre est in nonnullis pusillos & serotinos flores edentibus. Aut aliud fortè sit Theophrasti Acynos, à Dioscoridis, vt vidimus in Teucrio, Tragio, & aliis. Nam illa, quam nouimus huic loco admodum congruam, flosculis purpureis, verticillatis, ramulis quadratis, siccis, & exilibus, foliis hirsutis, lanuginosis Ocimi, multa secus sepes viarū fruticat, nonnihil aut perparum odora, & gustanti multo scior quàm Ocimū, tantillo calore subaltringente, vt Bethonica. Quare posse sistere nieuses, si à partium imbecillitate fluunt: posseque igni sacro mederi perspicuum est: cum moderate repellat digerendo, quo pacto Mentham siccam, tametsi calidam, admovent inflammationis partibus nostri tonsores Empirici, & breui discutiendo deprimunt tumores tum calidos, tum frigidos.

*Caprificus vel ERINOS Nicandro & Plinio, Galeno autem Echinus;
seu vipera, apud Dioscoridem. frequentius Erinos, interdum & Echinos.*

NO M I N I S etymon notiove veriloqua Erini, vel Erinei, satis perspicue insinuat ob lacteum succum, quo plurimo turgeret, hanc plantam sic nuncupatam fuisse. Est quippe Erinos ficus præcox fugaxque, lacte turgens primo aut exacto iam Vere, florum vice, quo caret semper ficus seu syluestris, seu domestica, ornatu: quam sequutus gentilitatem Plinius, proximè Caprificum subdidit. Et inquit, *Palmæ altam cauliculis quinis ferè Ocymi similitudine, florem candidum, semen nigrum, paruum: manare lacte multo & dulci.* Quæ designatio partim ex Dioclis libro Radicatio, seu *Πίζοτομνόν*, & Nicandri Theophrasti versibus, partimque de vulgata Dioscoridis litera collecta est. Cui quidem vt nunc aptaremus non inicitè quandam plantam nobis notam, tametsi diu elaborauimus: tamen propter hiulcam codicum lectionem, atque è Galeno notam Erini, in Echino variationem, lubuit nullam certò asserere: sed dumtaxat vnam aut alteram, nec vulgares & præceteris aptiores, in medium adferre exercitationibus stirpium vestigatoribus. Quædam plantula est in montium depressis decliuibus, & conuallibus vdis vel riguis, quam *Dulce Lupinum Lac.* id est, *Süss wolffs milch*, Germanicè dicunt: turget enim succo lacteo, minimè aut minimum acri, eoque Tragus Esulam dulcem vocauit: foliis Ocymi longioribus, radicibus geniculatis implexis, & altius depactis.

Altera ESULA Syl. Tragī, folio similior Ocymi dentato.

Trag. Epit. 101. **S**E O alterius Esulæ syluestris dictæ, Germanicè *Wolffs milch walden*, id est, *Lac Lupinū syluestre*, folium proprius accedit ad Ocimum ambitu circinato & crenis latioris folii. Cæterum, utrius vel vires, vel facies magis quadret legitimo Erino, industrii esto lectoris: cuius etiam hic Cōmentatoris impudentiusculum commentum liceat deprehendere & ridere. Is namque quam sibi visam & lectam ad riuiulos aequatum adeò lacteo succo manantem, vt eo manus inficeret; palam & audacter asseuerasset, non verbis ausus fuit describere: sed pingendam curauit plausiblem in vulgus Pharmacopœorum iconem, quinis

quinis nec pluribus erectis de cespite caulibus: Ocymi folio, bino, nonnihil crenato per intervalla donata, nulla addita prorsum quæ dubiam vel fidem, vel plantæ fulciret historia: cuius picturæ quum eum puidisset, postremò de vltimis commentariorum interpolationibus curauit expungendam, nullam interea in huius miscellæ subrepticam locum suffecit, ac ne verbum quidem subdidit, quæ id de causâ demississet,

POLYCNEMON, quasi multiribis aut multicaulis, an CALAMINTHA aquatica Belgarum.

AEQ nos habuit anxios conquisitio Polycnemonis, quasi tu dicas multiribiâ multuram, aut geniculatam plantam: fruticat enim multis geniculis intercepto Pulegij caule, folia origani edêre, nec umbellas, sed corymbos, odoratos & a cres, Dioscoride auctore. Cui succinctæ delineationi, quâ tum coniectando licet, vnamquam aptare oportet mediæ cuiusdam habitudinis & effigiaturæ inter Origanum, Pulegium, & Clinopodium. Quales aliquot adeò similes habebamus, ut quàm cui antiponeremus, aut veram proderemus, ambigeremus. Ea propter vnâ aut alteram exercitandi causâ Candidatis proponemus, quæ nulla non nota congruunt: vix est fruticosa quædam non ita magna stirps, exigua radice, caule geniculato, folijs Origani vel Pulegij, vnde Pulegium agreste, propter odorem & folia similia, dicitur, flores Corymbi specie cæsi, vel Pulegij, tota in cina. Caulis multiplex, incanus, geniculatus, quadratûsq; Pulegij, & sarmentosus, præsertim locis aridis decerpit plantæ. Flores verticillos amittunt, in summòq; visuntur instar corollæ vel Corymbi aggregi ex pluribus flosculis, Pulegij modo. Vniuersa planta suauem spirat odorem: sed quapiam acrimonia nares ferientem. Huius vsi sunt olim Belgæ Pharmacopœi Calamenthi loco: eoq; id nominis adhuc illic retinet. Inter veruacitæ & sata ripasq; agrorum, pratorum, in Belgio prouenit & in Anglia. Stillicidio & vrinæ difficultati scimus profuisse: Syderiticam esse haud in dubium vertet, qui illam gustarit.

*ALTERA SERPYLLI & CLINOPODII
figura, an Polycnemone?*

QUANDAM etiam Clinopodij & Serpylli facie plantâ videre meminimus superiore anno in Morgani hortis, quam quondam rebamur Polycnemone: furculosis enim ramulis, geniculatisq; Serpylli aut Pulegij crescit, vix est quod optes, serpentibus folijs Origani minoribus, Serpylli odore non ingrato, acri gustu.

Κληπόδιον CLINOPODIUM aut Lestipes.

MVLTI SVRVM siue Polycnemone, consuetudine quadâ appellationis & viriû comitantur Clinopodium, siue lestipes, propter lestipedû, quorû furculis delineat effigiatum: notissimam hodie eodem nomine vel Pharmacopœorum vulgo apud Monspelieneses & Lugduncenses, in qua ad veri Clinopodij expressionem vix est quod optes. Aridos namq; & glareosos occupat tractus, furculis plusculis, sesquipedalium longioribus, radice exigua folijs paruis Serpyllum æquantibus, cui & similia vel Calamenthi montani, vel Ocymi minimi, nonnullis leuiusculis in ambitu crenis apparentibus. Cauliculi compures sarmentosi, præduri, crebrius ab imo summo tenuis geniculatur verticellis & alabastrulis Lamij quaternis, sed multò minoribus, crassula toti de exprimētibus, purpureis flosculis Calamethæ. Calida planta, calorem non ita magnû gustanti præbet, sed siccitatem, odore suauem spirat Serpylli quadâ: genus. Hanc si propius figurâ intuear, quæ melius Clinopodium exprimat, inuenies nullam. Marum quippe, quam Mastiche plebecula Gallorum vocat, Maro quadrat aptius: nec verticellis aut floribus Marrubij tam concinnè conditis vel digestis, nominis argumentum nempe Lestice vel Triclini pedem referat.

Gemina *MENTHA* *Vulgata* *serpens* *uouit* *folia*, *Pulegij*
flore, *verticillata*.

Belg. *Wynheylige*, seu *fusca* *facta*.

MINIME dicta *Mentha* fuit, quia mentem percellat: quam potius spiritus oblectet, gratia odoris, vnde *ῥίσημα* vocatur. Nec de odore, qui non semper suauis est, vt *Galenus* etiam notauit, aut illius contrario sensu: sed potius quia *μῆρα* esset concolor, aut hirsuta, dicta videtur *μῆρα*, vel *μῆρος*, vt legitur apud *Theophrastum*. Est enim *μῆρα* lanugo muscidave pubes humentibus & putrescentibus penè cunctis sub dio apertis obduci solita, qualem cernere est in succis & decoctis herbarum diutulè seruatis & passim in oletis & sterquilinijs: cui hand absimilis tenera illa hirsuties pulla, quæ in *Mentha* agrestis, sed præcipue in *Calamentho* visitur, vnde dicitur *Calamentha*, quasi pulchrior *Mentha*, muscida & pubens, sunt autem species duæ & totidem altrinsecus obuersæ varietates.

Binæ namq; *Menthæ* rotundiores sunt folio & fusco purpurante, minus hirsuto, caule quadrato: Sed vni flos secundum totos ramulos *Sisymbrij* siue *menthæ* aquaticæ modo, per interualla flores insunt purpurei *Pulegij*.

Alteri verò omnia planè eadem, nisi quòd folia ex aduerso bina, rugosa, alterno situ decussatim & deinceps insunt laxentia, quadam crucis imitatione, vnde *Crucismunt*, siue *Crutiata* *Mentha* dicitur: flore etiam diuerso spicato *mentastri*, procumbit humi utraq; & ex agris videtur in hortos translata.

ROMANA *Officinarum* siue *præstantior angustifolia*.

Ger. *Spitz muntz*, spicata.

ROMANÆ itidem geminæ non nisi leue discrimen: utriq; enim folia oblòga, angustiora, albidiora, hirsutiora, odoratiora, efecaciora folia, vnde *Romanæ* nomen & *Balsameæ*: cui flos spicatus *Cruciatæ* *menthæ* proflus.

ROMANA *angustifolia*, siue *coronato* siue *Cardiaca* *Mentha*.

Ger. *Hett isunt*.

ALTERI flos glomeratim in verticillatis ramulis, purpureis sacre *menthæ* similis, odore & vi peramica cordi ac cerebro: Ideoq; Germanicè *Hertraut*, siue *Cordi*: herbā vocarunt. Omnes vulgatæ cognitionis, & opis multiplices: humectia amant, nec semine, sed radice & furculo propagatur.

AQUATICA siue *SISYMBRIA* *Mentha*, rubro folio, & siue
nigra *Mentha*, *Balsamum* *Officinarum*.

CVM esset hæc cognatio *menthæ* quàm *Sisymbrio*, rectius huc à nobis dilata fuit. Est siquidem folijs (sed maioribus) facie & odore *menthæ* fuscæ, quam idcirco qui norit, minus mirabitur si legat in *Sisymbrium* abire, vel hoc in illam redire sponte, cultu, aut neglectu. Iuxta & subter aquas leniter labentes passim: radix *menthæ* nigre ritu reptat, non alto solo depacta: caules quadrangulos, ramulos numerosos amiciunt glomeruli florum purpureorum *Pulegij* Regalis, odorem *menthæ*, sed vehemètiorem, non ingratum vibrantes.

MENASTRYM.

Ang. *Horfe mynte*.

VT appellatione defluxum à *mentha*, sic etiam asperiore & crassiore habitu odorèq; grauiusculo degener videtur *Mentaltrum*, quod vbius secus mœnia, vda, & scrobes vrbium scatet, maioribus, crassioribus folijs, rugosis, incanis super & subter, hispidioribus, leniter crenatis, *Menthæ*, cuius consimiles flores spicatos fortitur, caules ambiens quadratos caducis ramulis, calore & odore ignauo.

Varietas

Varietas Anglici cinerei & NIVEI.

CVLTIOR eshorti in Anglia Mentaltrum quoddam alunt, vulgato longè minus & odoratius, cuius folia partim sunt viridi colore, partimque niveo candore, & luore nitidissimo, cuiusmodi in Hyssopo & Salvia euenire notauimus. Balneis & compositionibus Officinarum, vt Pulueribus Diacalaminthæ & Diacymini, hanc vtpote gratiorem, nec minus efficacem, præstaret indere.

CALAMINTHA Montana præstantior.

QUASI elegantiore aspectu odorèq; delicatiore esset quàm Métha, Calaminthe vocata fuit: certè hilariore nitidiorèq; habitu esse nullus inficiabitur, qui Vincentinam & Veronensem viderit. Et vtinà cætera omnia perinde paucis & scitè expediisset Dioscoricus Calaminthæ differentias signauit: nam ille multos scrupulos nobis exemisset. Et quāuis tam perspicuè ostenderit, tamen non diu est cum primū Officinæ peritiores Calamentum à Cattaria dignouerunt, & vsurparunt, cōiunente adhuc ignara quorundam Pharmacariorū ignauia, qui sciunt quidem istud verius & efficacius quàm Cattaria, sed labori aut nummo parant. Neque enim obuium istud montanum, nisi Norbonensis Sequenæ vmbrosis, saxosis cliuibus, & in Romano atque Patauino agro, vnde meminimus quosdam medicos Taurinenses doctissimos curasse quottannis magna vi accersendum, cuius aqua stillatitia ad menstrua cienda vterentur, sperato successu: est enim gustu & olfactu suauiter acri. Etiam dū est viride plurimi sit apud Italos: arefacto non aliud ad theoricam illam mysticam præstantius, virgis riget quadratis, nitidis, cubitum altis, & quàm Menthæ gracilioribus: folia edentibus Ocimi, aut Melissophylli, sed minora, speciosiora, hirsutiora: flores item Melissæ, sed purpureos, semine Portulacæ minuto, odore Amara-cino, Menthæ suauiore.

*CALAMINTHA altera, foliis maculosis odore
gravi Pulegii: Diosco. Nepeta.*

APRIME sedulus hic Dioscori. hanc Pulegio similè facit: vt certè est, foliis quippè Aregalis Pulegii aliquantò maioribus, albidis, variegatis maculis, minoribus quàm superioris Calaminthæ, ex pullo porraceis, odore Pulegium testante. (vnde Syluestre pule- *Perperam Ma-*
gium antiqui dixerant) sed vehementiore ingratioreq; præsertim seruidioribus tracti- *thio. Icon. 677.*
bus, squallidis, cliuosis Italiæ Norbonæ & Galloprovinciæ, vbi nomine Calaminthæ, siue *Montanæ.*
Nepetæ Officinæ vsurpatur, non secus atque Cattaria alii illic vtuntur: & in reliqua Gal-
lia, Lugdunensi præcipuè, vbi etiam totam ætatem flores purpurantes pallentèsque ver-
ticillatim virgas cubitales amicientes, fundit.

*MENTHA STRIFOLIA aquatica, hirsuta, Calamintha
Dios. est Sisymbrii species quedam recentiorum.*

FACILIS huius dignotio Mentaltrum intuenti: vtraque enim aquosis viret margini-
bus fatorum aut pratorum, huius caulis cubitum & sesquicubitum æquat: foliaque
Menthastri aut Sisymbrii edit, incana: flores Menthæ spicatos purpura obsoleta, odoris
grauis Sisymbrii, nec gustu minus calfaciente.

CATTARIA, siue Mentha Cati.

{ Germ. Katzen mintz.
Gallis. Herbe au Chat.
Ital. Gattaria, seu herba Gatta.
Belg. Catten cruyt.
Ang. Catia Mynte.

T.ij.

E Calz.

Non est Nepeta
antiquorum.

E Calamenthæ Melissæque participe tribu est ista præstans viribus herba, antiquis fortè ignorata, quam Cattariam plebecula vocat, peramoeni spectaculi argumento: vixdum enim conspectam vbi olfactarit Cattus, amplexatus & dissuauitatus fuerit, lasciuiendosq; illi iam accedendo, iam recedendo sese vtriusque pedibus diu & multùm stricauerit, colludédotadè miris gesticationibus vniuersam audè ligurit, sed audius si ea ex agris in hortos fuerit transinota: tenerior namque tunc est, odorq; nõ perinde vehemens, alioqui agrestis similis, quadratis, numerosis, rectis culmis, durioribus, stratis: folia iuxta internodia prominentibus bina, incana, Melissæ, aut Marrubii æqualia: flores intra & circũ superiorum foliorum exortus ramulos ambientes, & extrema spica caudata decorantes, Menthe aut Mentastri: cuius etiam vdis natalibus gaudet. plurimam nihilominus viarum & cultorum margines dant: Strenua, calfaciendi & attenuandi dote, sed eximia prærogatiua ad conceptus facilitandos, prolificumque vterum reddendum.

μελισσόφυλλον, ή μελισφύλλον *APIASTRYM, Carago.*

Germa. Wanzentkraut.
Gallia. Melisse.
Belgia. Confilie de greyn.
Ang. Bawme.

NO N muld præstantior aut dissimilior Priscorum Melissa, qua non secus atque Cattisua mirè capiuntur Apes, quibus aspergebant Coloni diuini præcepto Maronis,

Tuiusssas asperge liquores,

Tritæ Melisphylla, & Ceruithæ ignobile gramen.

Citraginè vocauit posteritas quòd similiter Citrio suauè spiret, & cordi prosit: tametsi nõ nullis è locis lecta, quiddã pædoris aut cimiçũ eius gratiæ odoræ ascitũ sit, & idcirco dubitatum sit, vera ne esset, an aliũ speciei nostras hæc, quæ nulli regioni in hortis deest, sed in quibusdam Italicis & Pedemontanis hortis meram suam sibihalat gratiam, Basilici aut Citrii, eximitque quamlibet de odore argutationem, quippe de cætero nulli non cognita: folia Menthe, Ballotæ, aut Cattariæ, rugosa, aspera, sed viridantia: ramulis quadratis Marrubii, edentibus orbiculatim flores albidos, copiosos, in verticillis Ballotæ aut Cardiacæ: teneros tuos turiones excipiunt mulierculæ onis, sacharo, & rosacea, placentulasq; pinguunt parturientibus, puerperis, & enixis, quibus vires impendiò deiecit fuerint, aut secundinæ non probè educit: stillatitiz ad cardiacas confectiones, multa vso.

MELISSOPHYLLON Turcicum.

TAMETSI ne nares quidem mucosas latere potest huius eximie plantæ odor, qui Melissæ Citreumve malum adeo imitatur, imò & superat, ut illic cui sit ascribenda classi moneat, & penè præ nimia fragrantia fastidium faciat, illo exuberanti halitu permixto, qui à Cimiçũ fortore haud longè abesse subolet nonnullis: tamen merita est imprimis vel accuratissimam delineationè, propter visendam venustatem, & vires non contemnendas. In viretis duntaxat fruticat, radice non magna, caule quadrato, sesquicubitali, aut maiori, foliis Chamædis vel Scordii, serratis, in acutũ desinètib; per interualla ab imo summoq; tenuis, multarum alarum ramulis ambientibus verticillis septenis octenisve ex spinosis caliculis, radiatis, congestis, in quibus flores purpurei, cæsi, Teucrii aut Trislaginis. Semen Augusto aut Septembri nigrum. oblongum, Psylli, apicello donatum albo, quò sursum tendit.



CAR.

CARDIACA.

{ Ger. Herzgesperr, vnd Herzgespan.
 { Bel. Herteghespan.
 { Ang. Motherwort.
 { Gall. Agripaume.

AD hanc classem spectat genus illud Marrubij, cui recentiores Cardiacę nomen dedē-
 ri eximie dotis & cordis affectibus amicę merito. Radix est multifida, in terram flexi-
 bus sparsa, quadratis caulibus fruticās. Marrubij folijs herbaceis, crebrioribus, longiori-
 bus, & altioribus multo fissuris, quā Acutz spinę vulgaris. Flores item purpurei verti-
 cillis caulem ambiunt, odorq; quadratenus Marrubium præferunt. Vires Melissophyl-
 li, suppare.

CARDIACA MELICA sine Moluca Syriaca.

DVA s etiamnum Melissophylli congeneres & inter se persimiles (tametsi peregrinas &
 minus cognitās) virum commendatione & odoris coniectura hæc ætas Cardiacas vo-
 cauit, nomine etiam quadratenus eodem alludente, nam Melicam & Molucam appellāt,
 non ab Oceani trans Tropicum nostrum insulis Molucci: sed nomine cum planta misso ē
 Syria Venetias Martinelli Sequini opera, anno serē decimo exacto. Harum maior (quam
 Antuerpiam primum doctis amicis dono misimus, deinde Narbonę & Londini seimus)
 duos tresq; cubitos alta, multas fundit propagines ē radicelignosa, fibrosa, multifida, al-
 bicante; caules item rotundi, crassiores, culmosi, intusq; caui, nonnullis obscuris striarum
 secundum longitudinem vestigijs, & æquis spacijs semigeniculatis porriguntur, vtrinq;
 ex aduerso bini, exiles, sed prolixiores pedicello, totidemq; folia fulciētes, circinata vt Me-
 lissę, diuisuris minus quā Cardiacę no-
 stratis, profundis Proximē pediculorum
 exortum geniculos amplexę sub-
 spinulę prætenues, quas operiunt patu-
 lę senę octonęve campanulę, multian-
 gulę, tenues, membranose, albidę, & ri-
 gidiusculę, adultę: Summa ora lunatę &
 spinulis horrentes, quarum ē medijs cen-
 tris purpurascens albidusve flos, Lamij, aut
 Cardiacę nostratis non absimilis exit, suc-
 cedente semine anguloso, Pyramidis ef-
 figie, cunei basim apicemq; constituentibus, albidis, alterius Cardiacę. Gratio-
 rem hæc quā Melissa odorem spirare vi-
 detur his quos minimē iuvat, ille impen-
 diō fragrantior, & quasi stum pntoremq;
 cimum redolens, Apiastris odor. Hęc nāq;
 Citrij prodit, sed mitiorem.

MELICA vel MOLUCA
 asperior Syriaca.



Ramulus
 MOLUCÆ
 sine Cardiacæ
 minus aspera
 Syriaca.

MOLUCA ASPERIOR.

HVI s varietatem sæpius aluimus in
 amicorum hortis MonsPELLIJ, quam
 nunc asperam Melicam aut Molucā dicti-
 tant: vtpote asperiusculis caliculis tantum
 diuersā, angustioribus infundibulis, sed acu-
 leis infestioribus, rigidioribus, longioribus septenis vel octonis, caule quadrato & leuiter
 caniculato. Sed par cuneiformę triquetru vtriq; semē, infundibulis sulcis, nō ita albis, a-
 spera

antiqui, sed etiam docti barbari posteriores experti sunt, & literis mandarunt, qui Vrticæ; mortuæ & fortentis nomen indiderunt, quæ nota faciliè dignoscitur à congenerè Lamio & perquam simili.

LAMIVM *sive Archangelica, albo flore.*

Ger. Todt nessel.
Bcl. Wood net.
tell.
Gal. Ortie
morte.
Ang. Dead net.
tel.

Vrticeo etiam generi primo intuitu hanc assignat vulgus: est quippe folijs simillimis Vrticæ, & caulibus quadratis. Galio pſy simillima, multò tamen procerior tota. Floribus oblongioribus, maioribus, fabæ aut matrisiluz: quæ per interualla foliorum verticillatim quasi anſæ inflexæ, & laruatam cuculo adumbrantes Lamiam tribadem, (vnde Lamium fortè dicta) caules amplexatur, minus grauè olentes, albidi vel pallètes: Admodum etiam nota hæc: tametsi lubentius senticetis & sepibus, quàm domuum ruderibus vicina accolit.

LAMIVM *Luteum.*

Nec hæc in syluosis & opacis videtur specie variare, nisi proceriore caule, numerosiore, hirsutius: folio, flore pereleganti, luteo, & alioqui nõ dissimili, nec alijs viribus, sed multò efficacioribus ad vulnera, vicia, & tumores, vnde Sideritis putata, & nostris auis Archangelica vocata.

Ακαλίφη *sive urtica Commionis, siue maior & fac. ina,*
flore muscose, Mithy semine.

Ger. Nessel.
Bcl. Nettel.
Gal. Ortie.
Ang. Nettel.

MORDACI, pruriginosa, vridaq; lanugine Vrticæ inuise & noxiz, notiores vbiuis gentium quàm vt descriptionis egeant, eoq; duntaxat distinguimus à flore, semine magnitudine & vi, species, quas vno duntaxat nomine *ακαλίφη* & *κρίσις*, Græci vocarunt, quasi non tangendas, quia seuum punctoris vitionis dolore inurerent, cuiusmodi ferme vesparum aut apum aculei: tametsi miranda magis iniuria, cum perquam exilis, mollicella, nec penetrare potis isthæc videatur lanugo.

Maximo importunòq; prouentu cuncta scætet Europa communi siue maiori quàm ceteræ, latioribus folijs, nigrioribus, & interdum purpurantibus, minus altè serratis, procerioribus: caule & ramis, semine in racemacis filamentis Milio minore subrusto, cuius in Officinis, Borealiū, Penuria Romana vulgò dictæ, plurimus vsus.

VRTICA *hyulestris, siue Romana Officinarum, semine Lini.*

TAMETSI hæc non nisi calidioribus regionibus, vt Hispaniæ, Norbonæ, Italiæ, & Romanæ frequentior & vulgatiore tamen Romana non est dicta ob natales, sed propter seminis maioris maiorem efficaciam, quod mense Augusto & Iulio maturum pilosis villosissæ pillulis, Echintum referentibus, è pedicellis, in caule flexuoso, folijs donato, altius quàm ceteræ Vrticæ funbriatis colligitur, ad gluten pituitosum incidendū, extergendum, quum opinionem asthmaſis & orthoropnæ verè facit, vtilissimum: non tantum enim præparat vifcidum farcū, sed etiam delectu educit elementius, Chartami seminis ritu & Dosi: Rondelletio in magna commendatione,

VRTICA *minor siue Cania Plinij acrior.*

VULGATISSIMA minima in hortis & satis vbiq; gentium hæc, admodum mordax, si milis planè maiori communi, sed minoribus folijs & caule breuiori, tametsi magis vrida vi: Omnium vtilitas hodie corticis libraq; Vrticarum aqua duu macerati in India Orientali apud Callectios & Goas multa, ad lineos pannos delicates, quos illic adferunt in Occidentem & Septentrionem, quidem commodo insitiores precio, elegantius tenuissimæque textura, sed non magnæ durationis.

SIDERITIS, siue ferruminatrix.

VOCABVLO QVOD FERRO SAVCIATIS PARTIVS O-
pem promitteret, nobilitarunt primi mortales complures plantas, Sideritèsq; vocarunt potius virium consimiles effectiones sequuti, quàm vultuum assuitates generi-

cæſe differentias, ſic et æſp̄is terra, ars, & lapis Magnes, dicta, quia ferro vel aduerſaren-
tur, aut uteretur, vel conſentirent. Sic plebs Gallica Carpentaria ſiue fabrorum vocat, qui
bus ſep̄ vulneratis remedio eſt: nec alia notione Stratiotides ſiue militares, vocatæ fuerat.
Sed cū huic ſeculo diuerſi admodum generis, nec minus excellētes, & multo plures in-
notuerint, quā quæ huic vel poſſint vel debeant cōgeri: noſtrā ceptam viam inſiſtentes,
quālibet hac dote & nomine claram, ſuz addemus claiſi: alioqui Helixine à Dioſc, Sideritis
dicta, & ſexcētæ aliz tum Sideritides tum
Stratiotæ poſſent huc aceruari. Hanc itaq;
Sideritidem Heracliam, ſiue ferruminatri-
cem Herculeam, Docti Barbari illam niul-
to experimento compertam & vocatā Te-
trahil, ſiue Iudaicam, eſſe ſanxerunt: non
modo propter vires efficaciffimas & pla-
nè Herculeas, ſed etiam quia quā proximè
delineationem Dioſcoridis, ſi quæ alia,
repræſentat. Strigofa enim vel ſabuloſa,
arida perpetuò amat, inq; Autumnum
perdurat: Iulio & Iunio floribus purpu-
rantibus, paſſim in Maritimis & monto-
ſis Italiæ inſubraz, & ad Apenninos mōtes,
Venetijs ad Lio, inq; Gallijs Norbonēſi &
Lugdunēſi reptat. Virgultis pedaliſibus iam
ſurrectis, iam depreſſis, quadratis, duriuſ-
culis, ternis aut quaternis, verticillis crebriſus per interualla donatis, firmis, aſperis, pun-
gentibus, planè Marrubij Cretici ſimilitudine, etiāmq; floribus albican-
tibus ex diluta purpura. Iuxta quos & ſubter folia ſunt longiora, anguſtiora Marrubij itidem Cretici, in
cana, & vt totus caulis, ſcabra & criſpa, ambitu laciniato vt Chamædrys, aliquādo lacini-
oſa diuiſura obſcure apparere in quibuſdā folijs, quæ puto cauſa fuit vt Dioſcorides iam
quærnæ frōdi, iam Saluiz & Marrubio cōtulerit. Radix lignoſa Marrubij, minus fibroſa:
iamdū valdè magno emolumento cognita practicis quibuſdā Iudejs & Maranis curſori-
bus, qui hac enterocellas & alba mēſtrua curant. Vehementer exſiccatur nonnihil o-
dora, aſtriſtione inſigni, nec ingrato ſapore, ad vulnera nata, & proſum tanto Herois no-
mine digna. Quò magis dolet peritis & candidis plantarum arbitris, Commentato-
rem noſtrum eò ſecuritatis ignauæ progreſſam, vt cū quænam eſſet vel Italicis Iudejs
Iudaica herba, ſe nescire quereretur, quā ſcitè, vt ſemper omnia, Ruellius, & ex eo Fuſchi-
us expreſſiſſet, tamē in vtrumq; de re herbaria optimè meritum inſcitiz calumniam im-
pegerit: & ſenſu ſtudio planè deprauato plauiſum ē truiuo captarit. Huicq; herbæ de ſua
claiſſe pulſe, ſibi miſſas, vt ſemper iactat, nec tamen niſi mutile deſcriptas, alias ſuffecerit, ſci
licet Marrubium aquaticum vulgi. Cuius natalitia, folia maiora, latiora: cauſes cubitales,
nec aſperi, multaq; alia refragantur: quin potius Verbenæ aut Marrubij ſpeciem inſinuāt.
Sed cum illum huius prioris ſortē poenituiſſet, ei alteram multo adhuc conſuſiore facie,
quā ſubſidiariā dat, herbarijs Canabim ſceminā vocatā: quā inter Vrticas, Lamium &
Galyopiſim referimus: folijs namq; facie & verticillis Lamij, floribuſq; purpureis, nec niſi
ad riuiolorum margines fruticat: neutra ad vulnera exploratæ vtilitatis. Alteras duas ſi-
guras equidem parum notas, cur idem autor pingendas curarit, & proſum tacitas præ-
terierit, non iam querendum: potius ferendum ſui malæ conſectæ oſtentationis ſtadium
ducimus. Nos alias à viris multæ exercitationis non parum approbatas hlc damus, quò
expendantur, & non vt aſſerantur deſcribimus: nec vilius aſſenſum aucupamur.



Marrubium a-
quaticum vulgi.

Syderitis 2.
Matholi.

SYDERITIS *Monspelliaca Scordoides,*
ſiue Scordij folio.

P O R R O præter hanc Iudaicam, Monſpellienſium ſchola aliam ſpeciem Syderitidis no-
uit, palum & ſeſquipalum altā, viticulis anguloſis, rectis, pluribus, aridis, lignoſis,
coma

coma & verticillis Hyslopi, solis & facie & colore Scor-
dei Dioscoridei, sed minoribus, magisque rugosis, rigi-
dis, crispis, pilosisque, quam Tetrahit Iudaicum, nec
minus laciniosis, sed hirsutioribus: flosculi Satureiz vul-
garis dictæ (quæ tymbra est) ad foliorum articulos & ver-
ticillos, amaricante exsiccantèque gustu, nonnihil a-
romatici. suauisque hialant, quod Chamædryn aut Be-
toniam referat. Ad tipas deuexas Patibuli Monspel-
iaci, squalidosque margines & colles prope urbem, &
nouum Castrum & alibi Norbonæ multâ meminimus.



MONTANA.

INDUSTRIOSILE & gnarus materiz Medicæ cun-
ctæ Valerandus Donnez, ex Sabaudie Alpini hanc sibi
lectam, vnâ nobiscum vnâ Syderitidum opinabatur:
& quidem sic satis bellè quadraret Heracleæ Syderitidi,
ni fossâ angustiora multò essent, vique efficaciore care-
rent: est quippe cæteroquin verticillatis circis asperius-
culis, pallidis Marrubii aut Tetrahit, pluribus verticu-
lis, tenuibus, lignosis, nec quadratis, binum palmorum
radice flexuosa, prolixa, lignosa, pulla, amaricante gu-
stu, præsicca, nec ingrata: visu nullo explorata.



Cannabis } Mas.
Famina infecunda.

Cannabis erratica pabulosa, siue fylu.

Aquaticum Canabium Mas, Eupatorium dictum Anicenna.

Canabium Eupatorium aquaticum dictum Faminam Septentrionalium,

Crista Galli herbariorum, vnum & alterutroque Plin? an nunc potius

ALLIARIA Recentiorum, & Pes Asini Paudeletarij?

Stachys spicata circinata que ambiu cinctis floribus purpureis & luteis.

Stachys Spuria folia Echij, aut Calthæ, Belgarum.

Herba Pentii Rondelletij & Monspellensium, pamosis, si accidit sub Hy-
mem folijs, an, Othonna Diofco?

De flore Africano, siue Othonna Italarum inferius.

Betonica.

Betonica aquatica Septentrionalium, an Climenon Diofco?

Climenon Italarum, siue Cilibana cum Periclimeno.

Scrophularia.

Serratula.

Herba sacra yelæ, altior est Verbena nostras: sed Peristerion: siue Co-
lumbaria dodrantalis, in aquaticis est longè alia, qualem Egiptia
memorat: siue Scabiosa murina?

Scabiosa

<i>Scabiosa vulgaris</i>	{ <i>Maiores</i> <i>sternum</i> , <i>sine</i> <i>Lycop. Arij?</i> <i>Media</i> <i>ferrata</i> <i>angustifolia</i> <i>stere</i> <i>Gibbularia</i> .
<i>Scabiosa montana</i>	{ <i>Alpina</i> <i>maxima</i> . <i>Maiores</i> <i>calidarum</i> <i>regionum</i> & <i>eius</i> <i>varietas</i> . <i>Omnium</i> <i>minima</i> .
<i>Lacea nigra</i> , <i>vulgarior</i> <i>Prædicantium</i> .	
<i>Lacea maior</i> <i>folio</i> <i>multum</i> <i>lacinioso</i> , <i>Dentis</i> <i>Leonis</i> .	
<i>Lacea lutea</i> .	{ <i>Maiores</i> .
<i>Lacea nigra</i> <i>serpens</i>	{ <i>Minor</i> <i>acanthi</i> <i>serme</i> .
<i>Cyanus</i>	{ <i>Maiores</i> . <i>Minor</i> .
<i>Sesamoides altera</i> .	
<i>Chrysanthemum</i> .	
<i>Caliba</i> , <i>sine</i> <i>Calendula</i> .	
<i>Tragopogon</i> , & <i>eius</i> <i>varietates</i> .	
<i>Scorfonera</i> & <i>varietates</i> .	

CANNABIS.

RACIS *kana* *sa* fonticuli sunt sparsæ scaturigines, quò loci cum subens Cannabina rectis culmis, quadratis, striatis, horridisq; ferratis, nigricantibus foliis, Vrticæ, aut Sideritidæ quadantenus exprimentibus, sed septenis aut nouenis è singulo pediculo diuisuris Lupini aut Ricini, multò notior quauis designatione: non disparis vsus, sed in immensum vtilior quàm Vrticæ Molucæ. Cunctis enim populis penuriâ Laniæ, Lini, Xylisq; refarcit, ad vestium stragula, velorum, Papyrus, quamlibet denique supellestem. In marem & feminam seminis duntaxat foecundo prouenta distinguunt: Nam ex eodem solo pingui, vdo, aut riguo enatæ, quæ molliore culmo, delicariore cortice, aptioreq; ad nendû & textrinas, feminâ faciunt: cuius florû feminisq; spes in sitû muscosum & puluerolentum, quâsi filicis, perit. Quæ verò robustior, horridior, fruticosior, rudentibus & capistris torquedis nata, Mas habetur mulierculis, adagio iocantibus feminâ potiorem mari. Huius autem semen est non parû ad multa proficuû: ex eodem Oleum pressum tum moribus & scirrhis opitulatur, sugernis alit lychnia & lacem. Lac etiam vel pulter eiusdem macerati, aut iusculis decocti, fluxiones sistit diurnas, dolores repentinosque statuum vortices, & humorum fluctuationem compescit: somnum consiliat. Vfus tamen nimis molesto sopore perfundit. Tritû capiti, vel pedibus imis admotum, haud abs re Icteri humores, vaporesq; renues à cætro auertere & euocare putatur. Radices podagriceis topiis proficiunt. Odorè grauè & nonihil virosum eructat, & vel capitis in eo decubitu temulentos facit. Succus verò foliorû certa pernicies insectis interitaneis, & vulnertum putridorû alumnis: non quæ facultate idè foliorum Persicæ, aut Iuglandium putaminis succamētum efficit: sed vapidò tetròque situ, odore, & exsiccandi vi, quæ alimentum præripit illis & populatur, excrementis dissipatis: multum alimoniz suggerit Gallinis, Cortalibus quiescèd hyeme sæcündiores, postea steriles & quâsi pinguedinis mole obrutas reddit. Auculis eulâ cibus est, ac tantû saginæ adfert, vt aut enècer, aut cantillandi adimat alacritatem & facultatem, vt Carduellis, Linottis. Lacunis aut scrobibus aque plenis merguntur vtriusque sexus fasces & manipoli, vbi macerantur eluunturq; multum & diu: dein de sicantur Sole, vt tundantur, ac demùm cortices flumini tundendo velluntur, vt Lino sit ad filum & telas. Sed lacustris aqua, cui inrabuerit, tantoperè viru nocet, vt epota præsentissimo sit sitientibus exitio; nullis enim antidotis quamuis tepestiue datis occurrî potuit fato Marquisii Arboii fratris Guisiorû, cuiusq; vxori & quâ plurimis generosis, qui superioribus annis prope Olbiam in Prouincia ætates, feruidas cum transmittērent,

STIRP IVM aduersaria noua. 227

rent, imprudenter fontanam lympidam, sed occultis mœandris & subterraneis cuniculis indidem in fontem illapsum hausissent.

CANABIS erratica, paludosa Syl.

ALIA non est hæc à Satlua, vt etiam de Dioscoride discitur, nisi quia illius proceritate vincitur. Hæc tamen crassiores caulem Brismalæ parem indicij assequitur: vmbrosi lacunarum marginibus Cicutæ sociatur, itemq; cænoxis, scetidis, secus villas & mœnia. Flaccidiora folia, sed hirsutiora aliquantum & Sideritidis fimbriatis oris: floribus purpurillis & albicantibus. Radix compertissimi commodi ad tophos, & spretas remedia durities.

AQUATICA Canabina, Eupatorium diuila, Mas.

PASSIM ijsdem natalibus & Canabina facie oriuntur, duæ plantæ similiter discretæ sexu, quas propter amicas hepatis vires, fortè & ob folia, Eupatorium vocarunt, marem & fœminam. Ille rotundo subpurpureo caule, intus medulla alba referto exit, duos tresue cubitos æquante, aliquantum hirsuto: vti & folia crenis fimbriata, nigricantia, aspera, Canabinæ ortu & situ adeo accedentia, vt permulti Pharmacopœi, Belgæ præsertim, Eupatorium Auicennæ folijs Canabinis proditum, vocitent. Glomerosos villososq; in summo feræ flores, ex diluta purpura albicantes, inq; auras papposi abeuntes. Radice sparsa latè fibris. Amaricantis gustus, odoris nõ minus suauis quàm Betonica vel Agrimonia, cui viribus æquiparant Medici & Pharmacopœi illic: ac quoties præscripto vtuntur; eodem præcipiunt Diosco: ideum & istud intellectum ita voluit. Nec spretui habebit is qui nouerit nonnullos ad affectus istius decocta non modò nõ cedere Agrimoniz, sed etiam excellere: impacta hepatis ac splenis referando non multa cassatione: etiamq; sanguinem temperando & cunctis partibus concoctioni dicatis tonum, roburq; conciliando. Obese nimis naris aut Rinocerotides erant, qui scetere discubabant. Quippe suauius spirat manifestò omnium ferè mène regionum ad aquas alumna.

FOEMINA Canabina Septentrionalium, stellato & odore flore

NON item tot regionibus frequens, sed Borealibus magis, & ipsis in vdis aut medijs riuitibus cùstantius fluentibus viuit hæc, viuida radice, multis prolixioribus & gracilibus aquaticarum modo fibris, caules prominentibus cubitales & sesquicubitales, subpurpureos, rotundos, ramulis multis, distributos ex interuallis, & è regione sibi Canabina folia magis tamè serrata latiora non perinde hirsuta. In extremis foliola ungules roseos imitata, stellata, luteos vmbilicos atris pùctis maculatòs alteris ætici anibèctia, odorè Cùmi Elemnii aut Resinz, aut Cedrini ligni quod adoletur, edant. Semen Pyrethri longum, compressũ, & hirsutie vestibus hærens. Minoris hæc notitiæ, eòq; minoris vsus: vulneribus introsumpta præsertim plurimùm confert. Et eadem quæ superior potius est. In Angliã vbique; vdorum, præsertim Londini & Auxonæ.



CRISTA Galli Herbariorum nũm ἀλακτολόφος Pliny:

an nũm potius ALLIARIA Recentiorum?

Galli centum inferius adducitur.

Propter

PROPTER folia quæ cristæ Gallinacæ equiparantur ἀλκιστολῶδες & Cristam Romani etiam Plinius ætate dicebant, vnde nostri fortè istam pratensem luteorum florum paruorum & foliorum denso amictu fastigiatam in Cristæ modum multiplæ & densæ ferocioris Gallinacæ coniectarunt, aut retinuerunt, folijs vtique magis suadentibus, quæ ex aduerso bina ambitu diuisuræ prorsum cristatæ sunt, sensimque à medio latiore in angustius desinunt cristæ ritu. Caulis tenuis, pedalis, sesquipedalis, rectus è radice exili, pratorum præcipuè amantis. Semen in vtriculis foliaceis vel siliquosis, teneriusculis, Pfeu domelanthij, fuscum, compressum, rotundum : nullodum tamen experimento oculis prodesse, aut in eos indi compertum habemus : Vulgus etenim non istud, sed Scarleæ lanius & lubricus solet genas inter & tunicam inferere semè, & huc illucque oculū versando, ducere, nullo molestiæ sensu. Hanc etiam Centrum Galli dicunt, quibus ad duellum sit incitamentum, & si flores non parum ad cristæ nomenclaturam alludant. Nulli non pratorum & agrorum marginibus multa, gustu subastringente.

*ALLIARIA, Pes Asini Pandellarij, an
Alectorolophos Plin?*

PERINDE vulgaris hæc, itidem Dioscoridi præterita putatur, quod neminem odor illius redivus Allij latere queat: delineatio autem nō pessimè quadrat Plinij Alectorolopho: quippe folia per initia circinata Hederæ terrestris lōgiora, altiusque, serrata euadūt, fimbriatis, acutis in ambitum denticulis, tota planta Vrticani referente, præterquam siliquis, Napi semine plenis, nigricante, vt vult Plinius. Flores multi, albi di Ironis : alba radix, multos caules bicubitales fundens. Tota gustu calidiusculo, humente melioreque; odore & gratiore quam Allij: Quod sit vt mulierculæ, præsertim Angliæ, folia succulenta, tusa, balsamentis & intinctibus frequenter misceant, multumque; ad incolumitatem annuam tuendam primo Vere comedent. Quare si quis vires consulat, hanc certiore dicit quam superiorem, cuius vires multum absūt ab Alliaria. Hæc autè Erisimum aut Erucam facultate refert: quare tussientibus magis proderit, vt placet Plinio.

Cæterum Septentrionalium strigosa macilentaque; prata montosa Norbonensium palmarem pusillam quandā habent, floribus Alectorolophi superioris, plurimum rubris, interdum albis: nos inter Filipêdulas dicemus, quorum folia & facies imitatur: Sed facultatibus virosis, pratis infesta, & pediculis hostis, quare quidam Pedicularem vocant.

*STACHYS, spicatis circinatisque, ambitu cinctis floribus
purpureis & luteis.*

DE culmorum florumque; verticillatis spicatis extremis dictam fuisse σέχυρ siue Spicam certū est: vnde coniectura non perinde vera vt solerti perdoctus & modestus Anguilara Spicam Lauendulæ opinatus fuit: Senensi autem hic moderatio defuit, qui spernendo meliora tum iudicia, tum plantas, suam intrudit Stachyn, Marrubium quidem non ita dissimile, sed neutiquam spicatum, nec adeo congruam, vt est ea quam Germani feld Andoren vocant, id est, Sylvestre Marrubium. Eius siquidem est persimilis, procerior e caule quadrato, crassiore, candidiore, & hirsutior: tumque; folijs longioribus, nonnihil ad effigiem & incisuram Betonicæ vel Ballotæ accedentibus, plusculis alarum ramulis quadratis, quos flores purpurei partim verticillato ambitu, Marrubij aut Lamij ritu, distinguunt, partim superiora spicant Hyssopi vulgaris aut Betonicæ modo, quam Dioscorides spicatum summis caulibus Satureiæ similitudine dicit: Hæc passim sponte in Norbonæ asperis, non procul Peranis & Magalona occurrit: interdum purpureis, aliis luteis floribus: odoratior, gravior multo illa quam Senensis priorem & Germanam ratus fuit.

Altera folio Echij, aut Calthæ apud Flandros STACHYS spuria.

Minus

MINVS verò Stachys appellationem tuetur, nedum vt vera sit ea, quam multi Belgarum horti alunt, vocantque Stachyn. Follis siquidem est proximis Myosotidi, pilosis, vel Echii, non Marrub. i, neuti quam candidioribus, sed viridioribus: ac potius flaccidis, quam crassioribus, aut rigidioribus, nusquam serrato ambitu: quam potius quispiam alterum Echium luteum merito putet: minus enim odora est, succoque aqueo pregnat.

idona HERBA VENTI Rondelletij & Mon.

spelliensium, pannonia, flaccida sub hyemem

folijs, an. OTHONNA

QUAS: Linteariam, pannosamve quis dicat, propter folia crosa, multifora, & squalida, *ob id* nomē fuit, capropter herbe cuius aptius congruit, quam succo illius, vel la- *De Ocellis A-*
pidi Thebaio: sed quæ de hac nutantibus sententiis produnt Diosco. ac Plinius, le- *fricano, sine O-*
genti plus quo torqueat, quam vnde animum expleant, suggerunt. Nec enim succum, *thonna litorū,*
aut plantam sibi visam, sed potius quas de incerta vel lectione, vel auditione opinatio- *inferius.*
nes hausissent, scriptas reliquerunt, ex quibus ignotis notis, ne siquidem præ oculis foret ipsa planta, eam valeat certò quisquam assequi. Quare si illi summi velligatores nihil certius voluerunt, aut potuerunt decidere, in re tam controuersa, ne nobis quidem id tentandum. Coniectura tamen indulgendum doctiorum, ne illi nostra causa frustra operam posuisse videantur. Maximæ exercitationis præceptor eruditissimus Rondelletius conferre non semel solebat cum Othonna hac, quandam Monspellensi Academiæ admodum notam, & vulgo illic Pharmacopœorū Venti herbam vocatam. Etenim folibus estiuis, imbribus & statu iam marcescentia folia crebrò pertusa, & multifora, quasi vento peruia, visuntur, Verbasci similia, Saluiz, aut Menthæ maiora, parum quid serrata, caules ramulis diuisis quadratis, cubitales ambientia: quibus indicibus melius hanc, quam virosolum illum Africanum florem, literæ Dioscoridis respondere putabat: Apud quem legebat & restituebat *φύλλα ὀνιδέμου ἢ καὶ ἐν πολύτροπῳ, ἢ παρὰ*
folia Menthæ, non *ωζάμους* seu Eruce similia, multifora, squalentia. Sed quia huius flores purpurei sunt, & Lamii modo, verticillato ambitu ramos stipant, hic illi aqua hærebāt: reliquumque descriptionis potius deprauatum conquerebatur: Nec de flore in-
dico, sententiæ assentiebat, vt nos infra ostendemus.

κίσπος BETHONICA.

German. Brann Betonie.

Belgis. Betonie.

Angl. Betony.

MULTA salubritatis tuendæ & restituendæ olim merita præconia apud Latinos Betonica, *κίσπος* Græcè dicta fuit, à floribus emicante spicata, mucronata acutis Cestrò aut vericulum, vt loquitur Plinius, seu viriculū præferente: indidemque fortè *καὶ ἐν πύρῳ* rūpipetra dicta: *φυκτότροπα* verò seu soli frigidi alūna: quia opacis & vmbrosis proueneret, cunctis gentibus notissima. Caulē quadrangulū, rectū, pedale & cubitalem erigēs: folia ex interuallis Chamædrys, vel Teucrii, crenata, thyrsos florum in summo spicatos brunellæ, vel Bistortæ, purpureos elegantes. Radix albicat multis sparsa implexis fibris, & vno supernè nexu aptis, Ellebori nigri modo: Cuius sanè facultates longè dispares à foliorum & florum viribus comperiuntur: sunt enim hæc multum stomacho orique ingrata & nauseam, rûgitus, vomitumque cient: folia contrà odora, aromatica & grato sapore non nihil roborante, cibo & medicamento naturæ amica. Vt maior disparitas, quam Asaro videatur illi contingere, cuius radices quidem turbas cient, vomitum & secessum: folia tamen sunt gratiora & aromatica, non tamen excitos tumultus pa-

eant, vti Betonica. Itaque verifimile antiquos suum Cestrite quasi Betonicum dicas vinum floribus & foliis, non item radicibus inditis parasse, eoque sic faciendum hodie illis qui caseos longè saluberrimos & sapidissimos hic in Anglia & alibi parant, autiores sumus, non modò enim renibus innoxii sunt tunc futuri, sed etiam profuturi. Quædam enim naturæ maximè eorum esu iuuantur, & mucum pituitosum in lotio mingendo euertunt. Est enim diuretica & Litontriba, vti Galenus libro nono de sanitæ tuenda innuit, qui inibi *καρχήρυγος*, aut Saxifragam nuncupat. Sic Platearius Cestrum Meum dixit, ob consimiles vires diureticas. Betonicas aut Vetonicas, tum *Æginetæ*, tū recetiorū, Tunices, seu Garyophylleos vocatos, quia multò diuersæ sunt classis, suis quamque familiis reddemus. Gens enim Vetonum diuersis plantis, vt res & occasio ferebat, nomen suum accommodarunt, vt de Plinio & proximo capite liquet.

Βήτωνος. BETONICA AQUATICA
Septentrionalium, æt. CLYMENYM.

Angli. Water Betony.

QVAMVIS inelyto Reij Clymeno illam cognominem decreuerint, Cilianam seu totam Sanam Gallis vocatam, de qua suus alibi diximus, tamen & hanc Clymenon putatam, experimentis celeberrimâ Vigoni Chyrurgi, tum opinione percelebrein, decuit huc adduci. Eam enim descriptam is autor impensè collaudat, ac eius natales propè Genuâ, cuius ciuis fuit, ad fontem *Labeuadore*, siue æquorum aquatorium dictum, indicat. Amat quippe non secus atque Betonica vmbrosa, frigida, sed magis humentes elices & crepidines fossarū, qui hac scatent, in Northmannia & Angliæ præsertim. Idcirco *Water Betony*, seu Betonica aquatica vocant Angli. Edit quadratū, fuscum caulem, bicubitalē, geniculatum, canum, & rectum, crassum Betonicæ; folia ex viridi nigricant, ambitu, figura & crenis Betonicæ, aut Scrophulariæ, sed maiora: alæ nonnullæ in summo sunt, floribus nigricantibus purpureis pusillis cassides imitatis; vnde semina pusilla in lagenulis Blattariæ, aut Digitalis purpureæ. Fusca radix, multū fibrosa. Clymenon etiā hodie propter insignes vires putant, miscentq; vulnerariis & vlceribus prauo humore imbutis, deterrimique humoris & dolore faucis. Vulgus Chyrurgorū sua mundificatiua, quæ ruptica vel absterforia dicuntur, ex eadem parat. Cruribusque cutē erosīs admonent folia.

SCROPHULARIA MAIOR Millemorbis,
Fictria, Ferraria siue Castrangula.

Germania. Braunwurtz.
Belgiæ. Sceterruyt.
Gallis. Grande Scrofulaire.

NON potest non nosse Scrophulariam à radice factoque vocatam, quæ proximè dictam Betonicā nouerit, non enim ovo ouum similis: sed radix tuberculis aspera & capitulis papillofis donata Fabariæ, aut Alabastridis coralliarū dictæ: alba, solida, strumosa, incondita, subtus porrecta cespite, obstat quò minus interdum etiam excitatiores inter legèdum vtramuis pro altera euulsam accipiamus. Huic tamen folia longiuscula natales syluæ & nemora vda, vmbrosa, montosa. Calidior etiam hæc vtraus Betonica & vlceribus strumosis, cauernosis, cadauerosis, carcinomatosis, atque depascentibus sideratis oportunior. Tuberculis insuper ab humore frigido glaciatis, aut schurtis carcinomata minantibus, discutiendo & emolliendo opitulatur.

SERRATVLA.

PERINDE lubens, sed frequentior in nemorosis & decliuibus Pedemontis aut Septentrionaliū Northmaniz & Angliz exit hæc, antiquis item prætermissa, ac de folijs minutim venusta fimbriola serratis dicta Serratula. Sed ea sunt partim Bethonicæ virore, lz-uore, & crenis: partim non serrata, sed laciniaza, vt in Scabiosa visitur. Flores autem purpurei, è squammosis capitulis lacez, gustu fermè Bethonicè, aut Virgè aurez, à qua per initia erumpens non facile discernitur, & promiscuè proueniunt in iisdem syluosis, iisdemq; facultatibus ad vulnèra & enterocelas commendantur.

Communis VERBENA siue SACRA procerior recta.

AVGVSTAVOCE ἄγρυ quasi sacrosanctam & lustralè herbã hanc nuncuparunt: ritibus quippe pacis & belli verrèdisq; Iouis aris, Veruenis utebantur, vnde satius nomen, quàm ab herbenis ducere: huic enim suam etiãnum seruat nomenclaturam, prolatione paulũ mutata, plebecula Itala, Galla & Angla, Veruenã dictans, antiquòq; obtinès, delira quadã persuasione. Quippe ad Veneris illicia, ad diras & clades impendentes auerrècandas non parũ pollere hodie quidam amètes amàtes, & fanaticz Lamiz Mulomedicæ profitètur: quas impietates iãdū ipsi audiuimus & risimus. Nec vel hanc supinã aut aliam rectã dictam, arbitramur præstantiores esse primis, secundis, tertijs aut quartis qualitibus, quàm sint, Bethonica, Euphrasia, Rosmarinum, Stachas & consimiles. Pagorũ viarũq; margines & vrbũ areas occupat hæc, folijs virentibus, minoribus per interualla lacinijs, obtusis, Quernis, altioribus, Senecionis vel Scabiosæ. Ramulos & caules graciles, angulosos, glabros, cubito maiores, promentes flosculos purpura pallentes, Calamitè minores. Longiore, & fibrosiore radice,

PERISTERON siue COLUMBARIA dodrantalis, in aquaticis, plesicans & alstringens, qualem Ægimeta memorat,

an sũ SCABIOSA Minima?

FAM attentius sacrz Verbenæ delineationem, & huius Columbariz historiam excutienti, faciliè patet ipsas inter se figura, viribus, & nomenclatura discerni oportere: quantumvis Plinius breuitatis studio, diuersum videatur innuere, & vtramq; vnã inuoluere. Et enim præterquam quòd huic dodrantalis, vnus è singulari radice caulis, ex eoque folia vtroque incisa, natalesq; aquosi sunt: viribus diuersis, si non contrarijs pollere traditur, Pando Dioscoridi suffragante; siccando & alstringendo erepsilata reprimere, vlcera putrida coecere, vulnèra glutinare, inq; cicatricem ducere: demùm dolotis immunem præstare vuluam siue ὤσταν: vnde nobis quidam ὤσταν, quasi Matricariam diuinabat coccinius dictã, quàm à colũbis. Sacra quippe illa nõ modo œdemata antiqua & tumores mitigat, sed & tonsillarum crustas rumpit & exsiccatur inimirum calefaciente vi, quæ prodesse capitis affectibus pituitosis, & doloribus chronicis autor Galenus est: nec in humidis oritur hæc Sacra aut expiatrix, sed illa vocata Columbaria, vt cui lubenter aduolent, aut asfideant Columbz: neutiquam vulgari Sacrz, quæ alia occasione ὤσταν videtur dicta. Quippe nõ semel audiuius multæ lèctionis & obseruationis Præceptorem Rondellitiũ è suggestio Regio monentẽ (bona Græcz opinationis venia) non ὤσταν, sed à Colũbis, quæ nec Verbenis visitat, aut oblectantur: sed potius ὤσταν, quasi Colũbariã, quòd iuxta Colũbaria in sterquilinis lubens proueniat. Mirabatur idè triviales semper & negligentiores meditationes Senèsis, qui nõ olfecisset hæc Supinã siue strata & humilè satius dici, Sacra autè rectius rectã: nec illã distinxisset rectis ramulis, pluribus, cubitalibus, angulosis, Querna subglauca folia edetibus. Et tamenli nõ nesciret ab alijs alias adductas plãtas non paucas, sed zquè p̃mnes incertas, pro Verbena minore, vt est pratès Teucriũ, & quedam apud Italos Colũbina dicta Bugulæ flore, alizq; cõplures: tamen facie virumq; con-

coniectura, Verbenam minorem, Columbariam esse opinabatur, nempe ea quæ minima vocatur, propius reliquis Scabiosis, Verbenâ istam adumbrat. Est quippe folijs Verbenæ, incisuris per summa alioribus, laciniosis, similibus tamen, & altera superficie albidis, ad terram stratis, latoribus, minus serratis. Caule plurimum assurgit recto pedem & cubitum alto, gracili, superne in ramulos rectos sparso: hilari flores, rotundos villososq; ex cæsis cæruleos vel glaucos, Morsus Diaboli: semine compresso, radice pusilla, quantus paruis digitus, parum fibrosa. Propè Monspellij Egidiam portam ad riuulum, & agrorum margines Norbonæ plurima. Etiam in Apeninis Bononiæ meminimus: eandem Angli & Belgii horti habet. Hac plurimum vñrur Monspellenses Pharmacopœi, propter inibi maioris Scabiosæ penuriam, non modo ad sanguineum serum putridum educendum, defecandumq; & Thoracem pulmonesq; congerie pituirosa expediendum: sed etiam ad Morpheas Arabicasq; Elephantiasis, & Græcorum lepras squamulâsve, reprimendas item impetigines ex aceto Fumaria incocta, sacri ignis excretiones, pruritus, cutisq; scabies fœdas: quas dotes ferme omnes Dioscorides Columbariæ verbenæ iudicabat, nosq; enarrauimus, ne si minus placerent lectori illius tanti viri coniecturæ, nostraq; commentationucula, saltem plantæ huius utilitas tanta foret accepta.

SCABIOSA maior, Satorum vulgarior, sive

Ἰάρεξ Ἄετις?

{ Ger. Apostemen Kraut, vnd Stind Kraut.
 { Bel. Scabiose.
 { Ang. Scabius.
 { Gal. Scabieuse.
 { Ital. Scabiosa.

*Vulgarem non
 nouit Mathio-
 lum: & Iacra illi
 nigram maiori
 laciniosam in-
 scius suffecit.*

ET quamuis pluribus plantis possit accommodari Scabiosæ nomenclatio, (non secus atq; Pforæ Ἄετις) vt Iacæz, Morsui Diaboli, similibus facie & viribus: tamen non est de nihilo quod vulgus tam diu istis Scabiosis id nominis vindicari: vnde propensior est animus eo vt augeretur quampiam harum Ἄετις Pforam esse, quamuis nuspiam extare apud antiquos meminerimus. Sed maior Scabiosa notior est apud omnes, quam vt delineationis egeat, consimili superius is vultu, sed latoribus folijs, pullis, lirsutis, inq; terram repandis & recumbentibus, & alioribus incisuris, nec perinde Verbenam Sacram, vt maiorem Valerianam exprimentibus. Radix simplex, longior, caulem plurimum singularem, cubitum & sesquicubitum altum fundens, & florum cæsariem villosam Cyaneo purpurâ imitantem, in segetibus, planis, & decliuibus lætior degit.

Media SCABIOSA serrato, angustifolio,
 flore globulari.

DISSIMILIOR aliquantò hæc maiori Scabiosæ, quam priori, minimæ Verbenæ pnata: in marginibus agrorum Septentrionaliù lætior multo, & maior adolefcit, quam in calidis. Caulis è radice exiliore, simpliciore, cubitalis, alis diuisus, folia Iberidis aut cristæ Galli, aliquantum serrata. Flores Globulariæ aur Scabiosæ.

Scabiosa ALPINA Maxima, pœntis
 Inra & Saleua.

Parum

NON parū speciosiore & iniorē hanc ē iugis oriundā Iurę & Salanę nobis impertuit singularis amicus D. Pennius, ea Morgano hac æstate flores perelegantes cætos velleris instar sericei. staminibus crebris amicitibus globulos echinatos, Dyssaci, rotūdiores, minores, aspectu hilares, & Scabiosę vulgaris duplō maiores: folia itē Scabiosę. altero tanto ampliora, altius incisa, & Centaurio maiori Belgarū similia, penē paria angulosos ab imo & numerosos bicubitales & tricubitales caules, multis alis diuisos amplectētia, per æquas intercapedines, iuxta singulos exortus alarum, cauo protuberante & rorem excipiente, Dyssaci more: gustu nihil diuersum à cæteris percipitur.



MONTANA calidarum regionum maior.

COLLES AMAT hæc plagę temperationis, vt Pedemontis propē Riuoliam, & Norbonę, vbi montanam vocatam Herbarii folio angustiore, albidiorē, parum hirsuto leniusque laciniato ad imum caulem Verbenacę, aut vulgaris Scabiosę: superiora verò in ramulis plusculis, gracilioribus, altius diuisis, & flores per lunium & Iulium prominentibus purpureos Scabiosę, paruz, aut facit capitulis squammatim compactis, vbi semen trifolii Asphaltitidis, pullū, copiosum, inuolucris membranceis arguta cōcinnitate effictis, angustis plicarum fornicum pusillorum cohibentibus.

Iamdiu est quando in hortis Herbariorum Belgarum quandam multò maiora fundere *Varietas.* folia, teneriora, crassiora, succulenta præsina caulibus & floribus, duplo maioribus, nec iam essēt diuersa species ab illā, succurrit.

MONTANA omnium minima.

HARVM omnium minimā hanc animus fuisset verbenā paruatā facere, nisi in montibus cretaceis & incultis obuia foret. Nam sesquipalnum pedalesve paucos edite cauliculos, foliis in imo sæpius donatos angustioribus, inter Sclamoidē & Scabiosam minimam, floribus dilute purpurę, è squamosis capitulis alterutris non diuersis.



V. iij.

1A.

IACEA NIGRA vulgarior Practicantium:

Alba Monspeliensium in Ocymonde dicta fuit.

S V B E N D E N D A Scabiosis Iaceæ, quas à lanthino florum colore vocauit fortè quis recentiorum Græcorum: tametsi Barbaris Practicis duntaxat notæ fuisse videntur, qui nihil præstantius ad hernias inuenisse Iacea nigra narrant. Errat oppidò Senensis, qui huius facultates Violæ flammæ asserit, & à Scabiosis discernere nesciuit, à quibus non minus distat quàm Morfus Diaboli ab illis: & Iaceæ sapor non perinde ingratus, subdulcis astrictio, siccitas efficacior multò, calor prope nullus: sed decepit illum nomenclatura Iaceæ vtrique communis: illam tamen tricolorem Iaceam malum dictam ἀπὸ τῆς αἵς à Viola, vt etiamnum vocatur, quàm quòd plurimum humi iaceat, vt quidam autumant. Ceterum, qui hanc Plinij Hyosciridem diuinant, ferendi sunt: tametsi ploris ducant virium quàm effigiei coniecturam, cum vtrique consentiēte sit opus. Intubo dicit Plinius similem, minorem, tactu asperiozem: vulneribus contusam præclarè mederi. Quæ vt nihil certi de figura afferrent, tamen quandam plantam similem opis istiusmodi, indicant: neque enim Serides sunt tantæ ad vulnera laudis, quantæ ista I o v i a Seris Pliniana, aut Iacea nostra est: quam duplicem, nimirum albam & nigram Practici vsurpant, frequentior multò nigra, notiorque, pratis & incultis multa fruticans, foliis nigricantibus, hirsutis, rigidis, à radice multis, sed in caulibus cubitalibus, & sesquicubitalibus obtusioribus laciniis dissectis. Flores ex purpureo nigricant, in ventriosis poculis squammulis compactis, semini Cyanci, aut Cartami.

*IACEA maior folio multum lacinioso, Dentis Leonis, masculis
vaseculis, floribus purpureis, & luteis.*

S E G E T V M hæc potius quàm pratorum est, in Gallia & Anglia plurima altiores cubito & sesquicubito caules edens, circum quem folia multa multumque laciniosa Hieracii modo sunt; globulos duplò maiores, communiore, turbinatos, squammulis loricatos, gerit, apicibus florum purpureorum obductos Cyani maioris. Radix digitum æquat lignosa. Semen item Cnici, minus: horti Belgici hanc vt præstantiorem ad vsum Medicum colunt: tametsi in Angliæ segetibus Couentriz conterminis abundè proueniat.

IACEA maior lutea.

Varietas.

I N T E R D V M eandē videre est in segetibus Mōspelliaci, floribus luteis, venustis: Carthami syluestris nullatenus diuersam, capitulis, foliis, aut caulibus: Nisi quia tota asperiuscula; quam qui malit Plinij *HYOSCIRIDEM*, nobis secundis, liceat.

*CAPITVLIS SPINOSIS
IACEA.*

Varietas.

A D Cellam nouam & vicinis vinetis Monspelli minor sponte visitur alia, nigra eadem prorsum radice & effigie: duntaxat tristiore aspectu, florem edit purpureum interdum album, in squammoso & spinulis horrido capitulo, Calcitræ hæud absimili.

XUAT.



IACEA *puella, humilis, serpens, acaulis ferè, flore
Cyaneo & albo.*

RARIUS occurrit hæc, & ferè Norbonensium est: marginibus satorum ad Pontem *Monspellio* miliare distitum, via qua *Frontignan*am itur, obuia eodè in aruo, vbi studiosi solebant *Phallarides* colligere, foliis est paruis, laciniis *Hieracii*, retusioribus, minoribus, vna cum cauliculis dodrantalibus humi stratis: flores & capitula *Cyani* prorsum, cerula minus obsoleta purpurantes, vel albid: radix crassior, & semen ceteris non absimile.



Incana altera CYANI aut IACEÆ, capitulis & flore.

PROPIOR hæc *Cyano* quàm *Iacæ*: vtrique tamen haud absimilis, quam quidam *Parmicam*, siue *sternutariam* arbitrati sunt, propter saporem acriorem, amarum, halitumq; tetrum, cerebro *sternutamenta* interdum extorquentè. Non ita multi sunt anni, quum primum in *Linguntia* vinetis, & cis *Cellæ nouæ Monspelliacæ* Pontem plurimam, iamq; in hortis plerisque *Angliæ* vberè propagatam videmus, ab vna radice oriore, plures caules emittente, totam *hirsutie pilosam*, *incanā*, *Gnaphalii* foliis triplo maioribus, crebribus, leniter serratis, ab imo multis ad vsque summa, oblongiora, acutiora, graciliora, squamulis albidis compacta capitula *Cyani*, aut *Iacæ* apicibus villosis, ex purpurante paleo colore in pallidum languentibus.



MORSVS DIABOLI.

{ *Germa. Teuffels bisf.*
 { *Gallie. Mors de Diable.*
 { *Ang. Dewelles bit.*

NON video quid negotii sit hanc non esse è *Scabiosis* vnā probare; quod quidam contendunt: verum adeò *Scabiosis* est similis, vt plerumq; pro iisdem accipiat: euidens tamen discriminè in radice, à qua tota *Teuffels bisf.* id est, *Diaboli morsus* dicitur, quod nomen *Herbarii* retinent, nam antiquis non debetur. Cum itaque sit multis crassis fibris sparfis, depacta, præcisā appareat quā crassiores coeunt fibræ plures, quasi præmorfa foret à quopiam *cademone*: tametsi idè ferè cernatur in *plātagine*, quare malunt alii dictā ab *vidā* vi qua mordicat *bubones* & *carbunculos* pestilentes, quibus magno leuamento admoventur. In pratis & viis quibuslibet occurrit multa, cubitalis & bipedalis: foliis *Scabiosæ* vulgaris, sed rigidioribus, nigrioribus, *hirsutioribus* in imo, in summo autem caule aliquantum serratis (non profundè incisis, vt *scabiosæ*): floribus item prorsum *Scabiosæ*, sed purpura fusca, tristiore aspectu.

V, iij.

Germa.

κλιν. CYANVS VVLGARIS.

Blaptiscula Officinaria.

Germania, Conblumen.
Gallia, Blauetz & Bluetz.
Ital. Fior Campefe.

Belgia, Conblumen.
Angl. Blew Borell.

Viraque propin-
quior Scabiosis
& Iaceis, quam
Ithybis.

CÆLESTIS cærule æmulus color flori inest Cyaneo, sic vocato etiam apud Pliniū: Blaptiscula vulgo, *Bluetz* & *Blauetz*, dicta Gallis eodē à colore: etiāq; Germanis *Conblumen*, siue segetū flos: quia inopportuno luxu segetes ubiq; præter cæteras Secalis passim propemodū enecet, præsertim frigidiusculis terris. Huius diuersitates insigniores Erratici & Hortēsis. Ille in caule anguloso cæxia albicantiæ folia, angusta, in arcum desinētia, acutis laciniis sinuata Scabiozæ, aut Dentis Leonismore gerit, capitulāque oblonga calycis effigie squāmatim foris cōpacta, ex acerosis tescilis nitidis, ē quorum medio cærulei erumpunt flores fenis plurimum foliolis, semen sub messem relinquentibus, angulosum, acutum, oblongum, & hirsutie obductum glauca.

CYANVS Maior hortenſis.

QVEM alterum Cyanum alunt horti quidam in Gallia & Germania. non ita diuersis est foliis, sed maioribus, latioribus, flaccidis, minūsq; laciniosis, ad Lychnidem, aut Flomā paruum hirsutie & mollitie accedentibus. Nec flores diuersi, sed maiores, speciosiores, saturiorēque in purpureum vergenti cæruleo: radix longior, & viuacior, quā superioris.

CYANVS minimus viticulis Sparteis striatis, copiosis, perpusillis
cauliculis, flore purpureo obsoleto.

NORONENSIS item opulentia videtur hūc Cyanus, nec perinde obuius, nisi strigo sis, aridis, propē Monspelliacum patibulum & Castrum nouum. E radice lignosa ramiferos va lde emittit & vimineos graciles sparteos pedales, duriores, lignosos, multis aliis diuisos, piliferos, incanos, vti & folia pusilla Cyani, aut Iberidis, aut Scabiozæ paruz montanz diuisura: flores aspectu tristiore in cornulis pellicula squammatim confertis quadruplō minoribus, numerosioribus. Calycibus Stachadis citrinæ alteræ paribus. Cyaneo gustu, non perinde, vti superior, amara. Semina non dissimilia,

CYANVS peramarus, repens, capitulis squarosis
Sesamoidis parua.

MINVS obseruata hæc: non aliē quā ad Cyaneū aut Iaceā referēda, sed habitu ipso & aspectu superficiē proximē superioris similior occurrit (nec nisi quærenti) subterque Sefeli pratenſe ramulos ad Sellam nouam & alibi agri MonsPELLIACI reptando latitat: foliolis oblongis, angustis, Lauendulæ rigidis illius plantæ, quā incanis, albidis Cyani & Iaceæ mediam, vna interiecta planta, proximē descriptissim, similibus in cauliculis gracilibus, viticosis, palmariibus, pedalibus, & sesquipedalibus: quorū singulis summis staminci flores singuli Iaceæ, obsoleta purpura, ē poculis squammosa insertione conflatis prodeunt. Radix digitum paruum æquat. Tota planta gustu perquā amaro & ingrato.

ΣΕΣΑΜΟΙΔΕΣ τὸ μικρὸν SESAMOIDES parua Dioſcoridis
squamosis lucidis capitulis Cyaneis, flore cæruleo.

Aliud & primi Dioſcoridis rutaceis folijs, sicut. Harmala & Rutis.

EXACTE potest equiparari Cyaneis Sesamoides, à seminis Sesami similitudine, adeoque vsu, vt nos putamus dictum. Iamque multi sunt anni quum verum minus notum fuit

fuit scholæ Monspelliacæ professoribus eximijis Rondelletio & Affatio. Siquidem lineamenta perpendas, folia sunt Cyani parui prorsû, incisura & ortu Coronopi, hirsutiora, maiora (tametsi fortè μακροτέρα legendum, vt alibi crebrius monuimus) flores radiati prorsû Cichorij concolores & similes supernè, subtus capitula squâmulis compacta Chamelei leuis Theoph. Cyani aut Iacæz modo habentes. Semine intus Sesami aut Cardui minoris : radice Tragopogi, exiliore. Commentator noster cum suis *Belle al: stipulantis om-nibus ex imagine, aut potius ignauis, notis*, huic Phalaridis flores & capitula commentus est, & affligit, suo ne, an sui Thefei errore, nescio : fortè quia qui illi pictam miserat à nobis Patauij siccâ habuerat: Tametsi in Italia Longobarda non infrequentior quàm Norbonèsi agro plurima squalidis collibus, & etiam herbidis ad Lanum.



CHRYSANTHEMVM segetum folio multifido.

CONSPICUVM aureum florem isthec satetur Chrysanthemî appellatio, eiusmodi est sanè ille, quo segetes frigidiorum tractuum Galliz, Germaniz, & Angliz scatent, flauam per menses Cererem ornate, ac vnâ cum Cyanet & Papaueris Rheadis floribus infestante, magna spectatoris voluptate, quasi tricolori tapeto. Regionibus æstuosis rari-us. Caules illi teneri, glabri, virentes, plusculi, rotundi, sesquicubitalis. Folia crebra ab imo semunciam lata, toto ambitu Arthemisiz modo & crebrò incisa, pallentia, tenerâ, viridatâ. In summo aureæ orbitæ nonnihil fulgentes, latiores, compressiores, Anthemidis, bollidis maioris, & calendulæ similes. Oleracea est gustu & nonnihil caloris indicante, ei tamen, parit pecus in Anglia, nec item olere manditur : ac illis signis deficitur, quæ in Calendula graphicè Dioscoridis Buphtthalmum exprimunt.

CALTHA Poetarum & CHRYSANTHEMON

oculorum verius Dioscoridis,
Calendula Offici.

QUIPTI nostrâs Calendula quîn sit Poetica Caltha nullus neget, qui in Georgicis Luteolam Caltham, & in Plinio grauiter odoratam legeti Columella autè Buphtthalmum hanc innuere videtur, vbi sauëria lumina Calthæ canit, nempe aureum rutilumq; flauorem, & orbè circinnatum vmboneq; in centro exantè còspicuo, luminis, siue oculi, in spe ciem. Vnde Cachlan, id est, hiantulam & apertam dixerunt: sicq; Caltham putet quis de cismâ à Calathò (vt Melyphyllò à Melissophyllo) qui quasi lili Latinis, Seruio teste, poculum & calyx est, cuiusmodi ostentant singulis ferimè Calendis Calendulæ florum pocula mense. Ang. Marrygold Ger. Kimgelbblumen. Bel. Bon bloemen. Ital. Fior d'ogni mese.

flaua : cuius & nos sumus sententiæ, à quo hisce salebris permultis perplexi, discendi causa Monspelliensem Episcopum Gulielmum Pellisserium, Dioscoridæz Plinianæq; lectio-nis mirum quantum auidum & peritum, Magalonæ audire meminimus (inter complura loca partim hiulca, partimq; luxata, quæ ille interpolabat) distinctius legentem, hunc in modum è codice calamo exarato, capite de Chrysanthemò, χρυσάνθεμον ἢ κάλθα, τριφύλον ποικιλόχρουν πλείους ἀνθῶν (non λεύκων, nempe plures, non leues legendum) ἀνὰ φέρουσα καυ-lὰς καὶ φύλλα : deinde πολυχρῶν ἀνθῶν πολλὰν ἰσχυρὰν τέλβαντα, reliquū autè vt in vulgata editione Lutetiana constabat. Id est: Chrysanthemum seu Caltham, tenera herba fruti-cosa, plures (in vulgatis leues) ferens caules & folia : tum multifidos, id est, crebrò, aut minu-

minutum fillos flores luteos, admodum splendidos vel rutilos, magnos oculos (non bonus) exprimentes: circaq; oppida eandem nasci, & olere mandi. Quam hac cefura literam Calendulæ seu Calthæ vulgaræ componētes, tam plenè & exactè vtramq; vtrius indicari, vt nec herba alterius descriptionis, nec descriptio alterius plantæ egere visa fuerit. Etenim fruticat Caltha Galloprovinciæ & Norbonæ eam multis in aruis & incultis propter segetes & oppidorum rudera, tum Monspellij, paulò vterius Ægidio fonte aruis vrbis conterminis. Caulis & radice parua, fibrosa, complures, sparsi, teneri, læues: foliaq; Leucoij flores eximio fulgore nitentes edūt, vel etiā rutilos (sic enim τὸ λευκὸν Cicero, rutilum Martis fulgorem vertit) oculi amplum orbem effigiantes, argutis minutissimisq; crenulis multis scissos, quod est ἀνὰ πωλὺς ἰσθμῶν: nulli nō horto decora & inquilina, culta autē alte ro & tertio tāto plenioribus & habitioribus floribus paucis coronariorum speciositate secunda. In cibum etiam cedit & iusculis inditur, gustu & odore nō ingrato: acetarijs etiā miscēt multā mulierculæ, tū cordis affectibus tum icteritij & fædis coloribus indūt virgunculæ, respirandiq; difficultate vexatæ. Ius & teneræ cymæ luteo ouorum in placētam exceptæ & mansæ, nimis mentes fluentes sistere, cunctantes autē impellere cōmpertū est.

- Sabia* { *Μαύρ ἑλκισφάκος*
Μινὸρ ΣΦῆλαιος
Baccifera Cretensis
Candida, niuea.
Crispa.
- Horminum.*
Horminum sibiestre
Scarla.
Colus (onus quorundam, & Galopsi) Lutea.
Sylvestre Sabusolum verticillatum, angustifolium, Monspell-
ensium, an Phlomis Lychmitis, sine Lucernaria Diosc.
Sylvestre Sabusolum, latifolium lignosum, fruticosum, verti-
cillatum luteum.
- Verbasium* { *Sabusolum purpureum.*
Mas.
Femina.
Maximum odoratum.
Nigrum odoratum Luteo flore.
Purpureum Ericifolium.
- Athyopis.*
Blattaria Pl. an Chrysogonum.
Primula Veris an antiquorum Phlomisides sine Verbasuli?
Primula Veris pratensis } *eiusq; gemina in flore varietas.*
& odora lutea } *eius triplex varietas.*
Primula Sylvarum, *eius triplex varietas.*
Senicula altera Alpina sine Auricula Viri flore purpureo albo & luteo.
Baccharis.
Digitalis { *Purpurea.*
Lutea.
- Helenium.*
Helenium secundum alibi.
Buglossum Diosc. sine Borrago recentiorum.
Buglossum vulgare angustifolium.
Borrago sempervirens.
Buglossum peregrinum radice multifida Pulmonaria.
Buglossum erraticum, Echivoides asperum.
Anchusa { *Onocloides.*
Lutea.
Tertia.
Quarta, est Lycopsis.

Lycopis siue *Lycapsis* degener *Anchusa* *Egineta*, Commentatoris *Cynoglossum*, siue caule, siue flore.

Echium.

Onosma.

Cynoglossum.

Cynoglossum pusillum.

Cynon. utrumque.

Symphytum.

Pulmonaria.

Nicotiana.

Petum ulceraria *seminaria* & *Herba Sancta.*

Arctium.

Personata.

Xanthion.

Petasites.

Cacalia.

Tussilago.

SALVIA Maior scabrior *Dioscor.* *ἡ ἁλίσσα*.

Germania. *Grosz Salbey.* *Breiz Salbey.* *Belg.* *Broue & groote Sauie.*
Gallis. *Grosse Sauge.* *Hisp.* *Saua siue Saluia.*
Italis. *Salvia Maggiore.* *Ang.* *Great Sage.*

FOLIORVM squalor cinereus, decolor, pallensque facies, arenti & marcescenti similis, qualis in torridis collibus enatæ Saluiz est, occasio fuit *ἡ ἁλίσσα* vocitandi, quasi dicas Sole afflatam, tabefactam, aut sideratam: tamen potuit æquè scire à medendis sphacelo penè demortuis partibus, quibus calorem natium, roburque insitum reuocaret, qua pollet familiari facultate nostræ vitæ primordiis benefica. Vnde Saluia Latinis dicta, quia saluos & incolumes præstet innumeros, eapropter Rithmicus versificator quem in admirationem rapuissent tam diuinæ vires, sciscitatur, *Cum maritur homo, cum Saluia crescat in horto* & *Antiphona*, *Contra vim mortis non est medicamen in hortis.*

Conspicuas duas differentias in *Eleliphacu* & *Sphacelum* è *Theophrasto* etiamnum licet obseruare. Vnam nempe Saluiam maiorem in vinetis Aquitanicis, Linguagothicis & Pedemontanis, ubi fruticat multa, squabriore, rugosiore, maiore, magisque squalente aspectu; quæ eadem in hortos transuecta fuit & vocata maior Saluia. Eius sunt plures varietates, cunctæ Menthæ, foliis; nõ Cotoneæ, vt mēdosæ Græca, extat, Pliniū legenti manifestum fiet, qui tamen germanitate nominum deceptus, Saluiam in Mentham demutauit.

SALVIA *Coccifera*, siue *Baccata*, *Cretensis.*

QUAS inter perquam pulchra ea est *Cretensis* baccata nostrati prorsus similis figura, odore, ac sapore, lignosis furculis. Sed hi instar Gallarum rotundis excrementis Pistachiorum inagitudine & forma, sapore minus calido, magis astringente, non insuauis donantur, multiplici lignosi furculi, quibus nos impertiuè apprimè sedulus & peritus vestigator stirpium *Iacobus Reinandetus Pharmaceus Maisiliensis.*



Varietas.

Valde

Valde variat etiam in Anglia, vbi sarmenta quædam & palmites eiusdè plantæ partim spadiceo colore, partim candore plusquam niueo visuntur, & folia quasi pellucida. Quæ nonnullis etiam rugantur, & fimbriis multis in ambitum crispæ cernuntur, non sine voluptate.

SALVIA MINOR pinnata, Theophr. ΣΚΙΑΛΟ.

Germa. Klein Salbey, edel Salbey.
Ital. Salvia minore.
Belgis. Crups sanie & Dykens sanie.
Ang. Little Sage.

ALTERA verò differentia, quæ auritis, aut pinnatis est ad imum, Circeæ modo, foliis, minus squarosis & coriaceis, minoribus multò: eoque nobilem dictam, & Sphacelum putamus, nec vllam eius varietatem nouimus: nullum enim discrimen in sapore, aut odore est.

ἑρμινν. *HORMINVM.*

TVM Satium tum sylvestre notius hodie, quàm vt pluribus asserendum sit: nedum in hæsitacionem reuocandum: vtrunq; medicatum est: sed vehementius Sylvestre ad Veneceæ illicia, vnde nomen acceptum: ἑρμινν quippe est impetu cæco agi instinctuq; ferri & cicri intestino, vt quos in Venerem vrget libido: ideo τὰς ἐρμινν πρὸς τὴν οὐροσλαγ, in Venerem laceßere dicit hic. Nusquam autem nisi in hortis, cultu Herbariorum visitur Satium, foliis Pseudodictamni vel Marrubii ex intervallo binis & in summo purpurascens, colle ctis vt in Dictamno: iuxta quæ tota circum caules quadratos, pedales & cubitales, flores sunt verticillatis pyxidulis purpureis ad cæruleū vergētib; quæ hiantes per maturitatem deorsum nuunt pendulæ: semine papauereo maiore, nigro, ablongo, mucaginem aquæ meris, vt Psyllium, emittente: æstate floret.

SYLVESTRE *HORMINVM.*

RVDERA & præta macilentæ sectatur sylvestre dictum: foliis maioribus & aliquantulum laciniatis oris Blattariæ similitudine & colore: quadratis & paucioribus virgultis, seculicubito altis: per internalla flores verticillati in spicas longiores abeunt, deorsum inclinatas, cæruleas purpurascens: nigro, nec absimili priori, semine glutinoso. Vtrique radix lignea: Sed, illius odor nullus, huius verò Scarleam redolent flores.

SCARLEA, Centrum Galli, Officinis Gallitricum.

Germa. Scharlach.
Belgis. Scarlepe.
Gallia. Oruale, Toutebonne.
Ital. Schiagra.
Ang. Clarye.

EST autem quam vulgus Gallicum *Oruale*, conspicua ad Horminum allusione, & cõsimili de dote vocata, notissima: Germanicè & Belgicè *Scarlepe* quasi dicas, oculum clarificans, mixtis Latina & Germanica voculis. Semen quippe palpebram inter & oculum insertum, atque diutulè retentum, quantum est sordium illic, illico euertit & rapit, quotidiano etiam vulgi experimento. Seritur, & oritur anno post, Iulio & Iunio: flores edit cæruleos & albicantes Saluæ vel Dictamni: in quadratis caulibus folia prægrandia Verbasci aspera, admodum hirta, rugis & veluti verrucis nonnihil hirsuta, Æthiopidis aut Verbasci pube, & sylvestris Hormini similitudine: sed minor radix, dura & sublutea. Semē in calycibus nigro τὰς ἐρμινν, capitis ve grauitatem facit, odore, quē vniuersa spirat, non tamen ingrato: eoque magni vsus quibusdam septentrionalium ad Zyti Bierque confectiõnem: Lupuli namque vel penuria, vel vegetioris potioni facienti causa, cortinis feruenti-

uentibus addunt; sitque temetum, quo non multis depletis poculis temulenti fiunt, hilaritate propemodum insana: in nonnullis tamen, risu quam miseratione magis digna. Menstrua & secundinas ducit, & Venerem ciet, quare minus, quin sit Hormini species, refragandum.

COLVS IOVIS folio Vrticæ, aut Hormini, Galapfis

Lutea recentiorum.

His meritis accensenda videtur ea, quam nescio qui rei Herbariæ nomēclatores, Galio-psium luteam dixere, & Colum Iouis: summo caulis fastigio colum flauo penso inuolutam, nonnihil effigiantes: iacit quippe Hormino propiore quam Vrticæ, aut Ballotæ, & radice Lamii simili, caules edit non multos, cubitales & sesquicubitales, quadratos, hirsutos, quibus folia Vrticæ, aut Trachelii albidia, ad basim sinuata, latiora, lauiua, Gallitrici minor: flores in verticillis lutei, Saluiz aut Scarleæ. Scaturigines vdosque sylvarum marigines amat, Galliz, Germaniæ, & Italiæ. Gustu nonnihil calido, exsiccante.

VERBASCVM Sylvestre Saluitemisfolium Norbonensium,

aut PHLOMUS LYCHNITIS Diosc.

MULTIPLICIS differentia itē φλέμος, vel φλέγμος, deductus ē flammis, aut Elychniis, quæ huius tomento bombaceo concinnatur & alutur, Tapium potius maius dicunt, aut Taxū practici, quia toxicis aduersetur: tametsi cognati cuncti saluiis facultate & facie adeo sunt, vt sylvestrem saluia plebs vocitet minores species montosas, inter quas frequentissima plerisque omnibus agri Norbonensis collibus glariosis, Mō spello vicinis, fruticat hic quæ Phlomis Lychnitidē videtur innuere Diosc. rarus alibi Galliæ, vel Italiæ. Perameno aspectu florum luteorum Fabæ vel Matrubii, in verticillatis circinationibus secundum foliorum exortus hinc inde porrectis, pallidulis villis laminum, folia scabra, crassa sunt, densa lanugine cana, asperaq; tactu & crispata, Saluiz Angustifoliz angustiora, sed lōgiora, & ad Elychnia valde accommoda: vnde videtur Dioscor. Lychnis dicta.



STLVESTRE Saluifolium fruticosum, lignosum.

PL. t. proprior ceteris hic Marrubium & Saluiam imitatus: eoque vocant quidam hortii Angliæ, Italiæ, Belgiæ & Galliæ, agrestem Saluiam: foliis scabris, albidis, aliquantum hirsutis, quadrangulis, in virgis lignosis, breuibus, bicubitalibus, per interualla foliorū flores prominentibus luteos, Marrubii vel Atchangelicæ modo, verticillatim herentes, visu per iucundos.

VERBASCVM Nigrum Saluifolium, purpureo flore.

PRATI s fabulosis familiaris hic Saluifolius, præsertim non procul Taurino Pedemontium: pariter Germaniæ, Galliæ, Angliæ, saxosis pratis herbis & rudibus. Folia quam maximè Saluiam agrestem, siue Scordeum Plinii, aut Horminiū æmulantur, secundumque caulem & ramos ab imo quadrato s pedales & sesquipedales numerosi bosculi, verticillati, purpurei, vel cærulei, per fœnicetia,

SYLVESTRE *Saluifolium fruticosum, lignosum.*

PVRPERVM Erucæ foliū Angliæ & Galliæ etiam obuia hæc tum pratis, tum rudcribus, quam horti quidam alunt in Belgio, cognitu & distinctu facili, foliorū laciniolosæ oræ Erucæ, aut potius cornuti papaueris diuisura, & colore nigriore, ramosos caules & cauliculos ambiunt: flores per interualla Saluiz aut Hormini modo & colore, tota viridante & hirsuta superficie. In mole templi diruti Bathoniæ Anglæ prope Thermas, videre erat superiore anno.

φλόμος. **VERBASCVM MAS**, *Thlapsus barbatus.*

Germania. Wulfrant.

Gallia. Bouillon blanc Maste,

Belgia. wolterupt.

Anglia. Mulleyn the male.

QUI obseruarunt mustellæ conflixisse cum serpente, peneque eneetas & victas, pastas isto Thlapso, & factas denuo alacres, duellū instaurasse, Taxū vocarūt: alioqui lusculenta foliorū magnitudine, & videndi ubiq; consuetudine, nulli nō cognitū. Folio prægrandi, simili, & pari. Enulæ, pube obductum multa & leni & incana, quali in Gnaphalio & Ethiopide. Caulem admodum procerum, trium cubitorum, à sui medio summo tenus floribus luteis stipatum, thyrsūque, siue funalem experimentem, visendum, vnde vulgo *Torches* & Græcis φλόμος à flamma, quam alunt funales, aut Phlomi folia & caules in lucernis. Radix pollicem crassa.

FŒMINA.

HANC si albidis exeat floribus, & senis foliolis diuisis, fœminam vocant, alioqui folio consimili & pari.

MAXIMVS *oderatus meridionalium, Thlapsus barbatus.*

EXCELIT hic vt magnitudine foliorum, sic etiam odore suauis, omnibus Verbascis tametsi varietas tantum videtur descripti communis Phlomi fœminæ, vel maris: floribus quippe luteis & interdum albis exit, senis foliolis: quæ arantur rubris lineolis, odore suauissimo, folio longiore, latiore: radice crassa, nec aliubi dissimilis tota planta. In Belgicis, & Gallicis Northmannis hortis alitur. Pedimontani verò agri, Norbonæ, Angliæ, & Italiæ, occurrit passim in campestribus.

NIGRVM *Latifolium Luteum.*

ET huius omnia penè similia, foliis namque Enulæ inter & Digitalem vel Symphitum nigricatibus obsidetur, paribus, scabris grauitè olètibz, nec incanis, flosculis ex herbaceo luteolis, stellatis, minoribus: semine item Papaueris minore, Digitalis ritu in cluso: è radice æque cæteris magna, caulis gracilior Blattariæ cubitalis. Pratis Brabanticis, sabulosisque & herbidis, atque in Francia, & Anglia, Iulio & Iunio sponte prouenit.

ÆTHIOPIS φλομώδης, siue Phlomis.

HVC nomenclaturam Magica futilisque mendaciorum magistra superfluitio commēta videtur, quod iniecta flumini folia quantū esset aquæ exhauriri crederetur: tametsi verisimilius, quia optima ex Ethiopia adueheretur: nisi sit dicta, quasi fuliginosa ciuefacta, cinerève aspersa, ἀντοψ, namque Græcè fulligo est, siue fauilla adusta. Inquitina hæc hortis Germaniæ, Angliæ, Galliæ, & Italiæ: ubi primum vidimus ex Græcis & Illyricis montibus maritimis allatā, iamq; satis vulgatā esse, & cognitu facilē, Thlapsi barbati admodū similē, cōstat, Magis tamē incanis, mollioribus: carptaq; delicatiore lōgiore lanugine, cuiusmodi Cretenis Dictamni, & laciniosa undulatq; crispante ora, circum imum caulem accu-

STIRPVM aduersaria noua. 243

accubantibus, & ambientibus quadratum, hirsutum, binum pedum, & sesquicubiti, multas iu alas sparsum, quæ secundum lōgitudinem verticillatim flores amittunt Searleæ aut Hormini: sed albidi, & semen non dissimile. Radix cognatā Verbasci naturam testatur

CHRYSOGENVM, an. potius BLATTARIA Plinii,

quàm recentiorum TORMENTILLA?

A Baurea florum scetura dictum Chrysgonum credere par est: Eapropter si Blattaria Plinii Chrysgonum Dioscoridis non est; nulla iam planta in memoria est, quæ nou longius multo absit à Chrysgono, quàm hæc Blattaria. Quippe densè fruticat, multisq; firmis ramis, & rigidis sesquicubitalibus, & duos cubitos altis, rectis: foliis Quercus, aut Verbenæ: flores ad eò Verbasci, foliorumq; quinario numero, & colore accedunt, vt vtrālibet pro vtrauis accipere facillè sit, etiā monente Plinio. Verum Blattariæ sauo satiore, & magis rutilo, initio præsertim, folia non perinde incana, aut hirsuta, sed obscurè viridantia. Semen pullum, inclusum pericarpis Lini, aut potius Digitalis purpureæ, Radix Napi aut Raphani syluestris, alba, digitum crassa, sed æstate exeunte per Autumnii initia, ex atro foris intusque rufescere quidam amici affirmabant; nempe excocto ab æstu alimento: quemadmodum Carduo Benedicto vsu venire videmus, & quidem minus de hac miramur, vt cuius flores interdum purpurei, punicej & cærulei conspiciantur, non modo in Belgii & Galliæ Herbariis hortis, sed etiam in Taurini & Rioli marginibus campestribus herbis. Amara admodum, calidæque & sicca gustanti; quare quæ alliciat blattas & tineas dote arcana malim scire, quàm non potius (quemadmodū Absynthio, Abrotano, & aliis amaris arcentur) ab-actum iri idem animalculum suspicari; sacæus viscerum melaicararūq; expedire certum: incertum verò quid ad morsus venenatq; possit. Eapropter qui præ hac Tormentillam septifoliam, inter Pentaphylla memoratam, mauult Chrysgonum facere, ob radicem (tameñ perparum rufescant) effigiem flores & folia, ac denique vires ad venenata plurimi faciendas: sanè per nos optionem habeat, dummodò hæc nostras coniectationes sic accipiat, vt eas, quæ sunt, libenter cessare potioribus vestigatoribus, non ignauis obtrahatoribus.

Græci similem
raps non equa-
lem, aut extu-
berantē radicem
ὄνειαυ γογγύλι

TORMENTIL.

Φλαμίδες, PRIMVLÆ variflora, an. Antiquorum PHLOMIDES,
sive Verbasculi?

A Verna germinatione, florumq; quasi rediuiua vernatione, vulgus Primulas veris, quia primulūm tum erumperent & florent, vocitauit. Huius plutes varietates, præsertim in Angliā, lautitiz & florum deliciaz amantissima, quàm alibi conspiciuntur: quæ-
rum quæ vnā duntaxat nouerit, cunctas cognitas habebit: distant quippe floribus duntaxat satiore colore, rugosiorēque folio.

PRATENSES Dna, Pallida, Lutea odora, quæ culta sit maior
& flore multiplo apud Anglos.

{ Germa. Himmel schluffel, & S. Peters Fraut. & Schluffelbluom.
Gallis. Prime vere & brayes de Cocu.
Itali. Brachediculo, & fior di prima vera,
Belgis. S. Peters crupt.
Ang. Coweslyppe.

VBIQVE in pratis vlginosis & riguis, præsertim regionum minus calidarum, vt Sabaudiz, Flandriz, Galliz, Northmanniz, & Angliæ, primo veris tepore florent: è radice albida, fibrosa caulem nudum, rotundum, aliquantum hirsutum, palmarem & sesquipalmarem, quem summum & nutantem umbellæ instar, florum calyculi copiosi or-
nant, non dispares pulmonariz, sed lutei, ceræ nouæ odorem & colorem æmulantes. Folia

X. ij. maiora

maiora Betonicæ, neutiquam ambitu incisa, Digitalis purpureæ quadantenus, rugosa, ad imum strata, aut parum surrecta: gustu non ingrato, in olere, placentulis, & acetariis: admodum utilis capiti, neruis, & humorum ex decubitu putredini, aut inflammationi, eoque vulneraria habetur.

I S D E M ferè locis hæc, nec diuersis floribus, sed pallentibus, & foliis grandioribus paulò, odoris verò nullius.

*Varietas florum,
gemina.*

S E D quæ in hortis Anglicis & Northmannicis colitur, florum maiorum, prouenta & foetu multiplici, triplò aut quadruplò omnium Primularum magnitudine & elegantia prima.

STYLARVM PRIMULA.

H A M c non potest non nosse qui vllam superiorù viderit: differt enim flore duntaxat, qui singulis languido pallore, pusillus, palmo breuior, quasi canli summo inest. Folia, sapor, odor, vsus, non disparia, sed lubentius hæc nemorosa vmbrosasque conualles sestat: ut in Anglia, Delphinatu, & Sabaudia. Flandris & Gallis hortensis.

V A R I A T hæc in Angliæ hortis speciosa florum duplicatione & incremento, Lychnidem coronariam duplicatam æquante: coloris etiam diluti lutei.

Variea

I N T E R D U M & albi peramœni, sed simplici floris, venum ferunt mulierculæ in vicum Mercatorium Londini.

E T I A M fimbriatis floribus, rugosisque plicis, & coloris obscurè virentis, Primula quædam Londini hortis frequens, alioqui asimilis cæteris: quam studiosi Herbarum Antuerpiani, ut nonnullas superiorum indidem habuerunt, & nos monuerunt quæpiam Primulam in Anglia extare floribus purpureis: sed nobis frustra quæsitæ, & Pulmonaria putata, ut doctissimus Turnerus dicebat.

Harum omnium cum sint folia ambitu rotundiore quàm maioris Verbasci, & caulibus nonnullarum foliaque sint hirsuta; cur neget commentator non esse Phlomidis? nullam nisi ostentationis futilis habet rationem: vires quippè & tota facies planè Thlapsi, contra suadent, consensuque experimenti apud omnes regiones, quæ modò vnam quampiam harum habeant, Paralyfis herbam vocant, quo nomine propter insignes facultates fuit etiam Phlomis donatus: igitur & hæc Phlomidis.

P A R A L I T I C A Alpina SANICULA, Vrsi auricula recentiorum figura Primula, sed floribus purpureis.

V I S E N D E venustatis vt si quæ alia Alpinarù, istam herbulam, satius fuit Arthriticam vel Paralyticam nominasse, quàm Saniculam, tum propter peculiarem expressionè affectus Arthritici, quem admolitur, tum maximè quia Primulis annumeranda videtur: tametsi amat hæc summa item montiù præcella, & præruptarù supercilia petrosa, qualia sunt in Claudii cautibus, Clauene, & Oenipontis finitimis, vbi ferè tota æstatè perennat nix, quæ inuita exacto Vere hæc Primulæ pratenses singulæ cauliculo, quasi flores in pediculo molliore & inflexo punicantes, aut ex roseo albicâtes, visum exhilarantes dant, suauiterque spirantes: folia autem albida, virentia, crassiuscula, carnosa, & leuiora, quàm Primula Veris, nonnihil repanda, & limbo crassiore tantillum fimbriata & circumata: radice multum fibrosa & cognata Primulæ: gustu pariter multum exsiccante & astringente, vulnerariis potionibus quæsitæ, & foris vulnera glutinante, vnde Sanicula.



Varietas. { Alibi montium interdum frequentiorē & maiorem vidimus folijs, cauliculo & flore, qui tamen nō purpureus, sed luteus, aut albus, & fuscē uel pulchus est.

DIGITALIS PURPUREA.

{ *Ger.* Fingerhut & fingerkraut.
 { *Belg.* Winger hoet cruyt.
 { *Gall.* Gant nostre dame, doigtier,
Ang. Foxe glove.

REGIONES quæ ad Aquilonem sunt, feracissimæ sunt Digitalis purpureæ, quæ Meridianis calidiusculis ferē deest. Sed in Francia, Belgio, & Anglia, nulli non nota, ubi id nominis vernaculē assequuta fuit, nec enim antiquis memorata, quorū calathi oblōgi, picti, celsatīve apparent, in Digitalis siue digiti ad suendū munimentū speciem, elegantī serie cauli bicubitali hærent vno ex latere, penduli, folij paris, cōcoloris, & similis. Cynoglossi vel Symphiti maioris: fibrosa radice, viscida, nigricante, semen in pericarpis pusillum, Verbasci, odore puridiusculo, & qui Bacharim dicebant, opinionē refellēte gustu ingrato, exsiccante, aliquantum calido, & vulnerario: quare plurimi fir ad omnia vulnera sananda.

DIGITALIS Lutea.

MINOR hæc, minorisq; elegantia, minus fert cælum Angliæ, ubi non vidimus, alioqui passim in Pedemontani Taurinis & Sabaudijs collibus, folio nigriore, angusto, Blattarix aut Plantaginis, læui, nec hirsuto, non perinde hilari aspectu florum, qui palliduli luteo squallent, angultiore nola, nec perinde punctulis impressa.

ΓΑΧΧΑΡΙΣ ΠΑΥΧΑΙΣ ΒΑCCHARIS.

EXTAT apud clāssicos Græcos ΓΑΧΧΑΙΣ, aut potius ΓΑΧΧΑΙΣ, plantæ cuiusdam nomenclatura, sic, vt lubenter credimus, indita, propter eximiam fragrantia gratiam Cinamonæ radicis, ex qua cum multa alia, tum vnguen confiebat, irem ΓΑΧΧΑΙΣ apud Athenæum dictum, sertaq; concinnabantur, quibus tempora cingebantur, ne Vati noceret mala lingua futuro, vt canit diuinus Maro. Eam ob rem licentius abutuntur lectoris patientia, qui istud caput ē Dioscoride quasi spurium expunctū voluit, frustra que probare fatagunt, vtramq; plantam, Baccharim nempe & Asarum, & vtriusuis descriptionē (paucis quæ irrepsere demptis) eadem esse, cum quilibet iam cernat legendo non propius abesse Hederam à Saluia, quàm Asarum à Bacchare. Alstringit hæc, inflammationibus & ignibus sacris proficir, somnifero est odore, fronde inter violam puta albam & verbascum. Illa contrā impendit calfaciens, discutiens, hederaceo folio, Nō parum iraq; diserepant Plinio autore: qui quod coronis non addatur, dictum tradit Asarum. Labes hæc profecta ē fragmentis Crateuæ, ubi Baccharis Dioscoridis Asarum vocatur & describitur. Quod qui dem nos nionet, sedulum appellationum perpensionem nequiquam neglectū habendam esse accuratis viris, veri filis venatoribus. Iam verò de multis, si optio detur, nullā perinde congruū videmus, ac illa, quā olim barbarorū doctissimi genuinā putabant: multò enim propius, quàm illa Mathioli species verbasci odorati, ad Baccharē accedere certū est. Hæc quippe fruticosa, appendicibus donata, folijsq; asperis, nigricantibus, Primulæ veris, vel Saluæ latifolia magnitudine, caule bicubitali, floribus purpura obsoleta glomeratis, in pappos desluentibus, Cardui modo. Radix summo cespite sparsa, diffusis fibris, garyophyllatæ modo, cuius odorem præsentissimum halat, vel cinamomi: cui contulerunt antiqui Baccharis radicem, qui Garyophillos non noscent. Planra valde frequens, valdeq; isto nomine nota Monspellij circum, & alibi non paucis locis. Qui quatuor Coniæ species nouerit, (earum namque inter se non parua similitudo, flore, Luteis omnibus, odor grauis, gluten dum attrahantur) cur Marhiolus istam Baccharem odore & flore

nobilem Conisam maiore fecerit, & Verbascum ei suffecerit, hand facile dicet. Verbasculū quippe est odoratum, cui interdum flores lutei, interdum purpurei, vt Blattariæ maioris; Verbasco interdum contingit mutari. Romæ cum valde auidi, vt semper soliti fuimus, & freti fide Mathioli complures quos sciscitabamur herbariæ rei peritos, nihil aliud quàm Verbascum putabant: idemq; in Flandria alijsq; non paucis locis ortum, non chartæ agglutinatam plantam istam Mathioli, quæ potius figuræ, quàm odoris, colorisve notas retinet. Sed istud consuetum illius dignitati, res verbis aut chartis assertas, non item inspectione exploratas literis mandare.

ἑλένιον *HELENION.*

Ang. Elecampane.
Ger. Alantwurzt.
Bel. Alantwoytele, ende Salantwoytele.
Gal. Enula Campani, herbe d'Élaune.
Ital. Enola, f'Éla.

HELENIA luctu aut fatu clarius & notius posteritati factum est Elenion, quàm vt fusiore delineatione sit opus, tamen & ab insula Helena dici putatur, vbi longè optimum luxuriat numerosa & prægrandi fronde Digitalis aut Verbasci Platiphylli (non angustifolij Verbasci, vt mendose codex Græcus) florem Bupthalmi aut medicæ Conizæ aut reu stellatū Iunio & Iulio fundente scapo summo, recto, tres aut quatuor cubitos procero: radicis amplæ, crassioris, carpum ferè æquâtis, perquàm odore: in pratis villarum & prædiorum Angliæ, Germaniæ & Galliæ, etui primo Vere solitæ. Qua quidem vtendum intrò humenti & rectè ad animi paranda commoda lætitiarumq; inuehendam, & mœstitiarum necadā: de qua dote plurimi fecerūt eam antiqui, & nepenthe illud Ægyptium ex ea vna confectum opinati sunt: sicca verò benè facit foris: sin intrò sumas, humenti atq; recenti vtendum, præsertim in pulmonis affectibus chronicis. Istud tamen Pharmacopœi non est, sed periti Medici.

βούλωσσορ *BUGLOSSVM* sive *BORRAGO.*

BUGLOSSVM vulgare angustifolium.

Euphrosynon.

Ger. Surrisch.
Bel. Bernagie.
Hisp. Borraïenes, Borraïes.
Ang. Borage.
Gal. Borraches.

BORRAGINEM quasi Bouaginem vulgus dixisse putatur, versa & deinde peruersa è Buglossa voce, quòd tam verum videtur, quàm nulli in dubium iam vertitur, nostram Borraginem esse genuinum Dioscoridis Buglossum, ἐνπρωστίν, seu exhilarantem herbam: cuius postea ætas recentior nomen confudit & commune fecit, viribus & non nulla ducta similitudine, angustioribus folijs, & aliquantum diuersæ plâtæ, non Borrâginis, vt nunc, sed Buglossæ tunc dictæ. Iam verò notior vtraq; etiā plebeculæ quouis olusculo: sed minus vera, verum retinuit nomen. Latifolia & germana, non Buglossa, sed Borrâgo tantum dicitur, Vtraq; fecunditate importuna in hortis luxuriat. Genuinum & latifolium folijs in cespite stratis, latis, subrotundis, asperis, hirsutis, rimosa viridi in atrum declinante, superficie Symphiti maioris potius quàm Verbasci. Huius radix extima albicat, minor & brevior nec perennis. Alterius contrâ foris nigra, perennis, prolixior. Vtraq; tamè glutinosa, edêdo medendôq; nata: genuinæ flores stellati quinque foliolis, eximia purpura, cœruleoq; nitentibus, interdum candidis, medio quasi centro coronidem circumatam, fuscā, exilem cohibentibus. Semine nigro Anchusæ aut Lycopsi: Sed alteri flores concolores, Primulæ Veris modo aut Anchusæ: Semè maius, minus nigrum, folia lōgiora, angustiora, Echio aut Lycopsi toto habitu tam propè accedentia, vt nī defuisset rubellus radici color, Lycopsim domesticam facturū fuisset, qui quia nigricat, potius Echium indicat, aut vtriusq; anceps naturæ.

BVGLOSSVM semper virens.

EX duabus dudum recensitis videtur natura Dédala ludibunda vnam concinnasse multò elegantissimam, ac semper virentem, etiam frigidissimis Angliæ, Antuerpiæ, Belgiæ; reliqua aduecta, vbi plurima & peropportunè viget in hortis ad vsus medicos, vtraque Brumæ rigoribus delicta. Folia subrotunda, latifolia; Borraginis, vti etiam caulis: radix situ, habitu & mucagine Còsolidæ maioris: Flores verò specus alas & folia prorsum angustifolia: eiusdem saporis & vtilitatis ad cordis & ex melancholia affectus,

*BVGLOSSVM peregrinum radice multifida Pulmonaria.*

IN nostris stirpium sportulis quedà arida adhuc est Buglossi facie planta, quam ex hortis Bononiensibus habuimus: in pilis densis, horrida & aspera sunt, angustius desinunt folia qua hærent radici, fibrosa, fusca, non Buglossi, sed Pulmonariæ: caules & flores per temporis angustiam expendere non licuit.

Erraticum BVGLOSSVM asperum Echiioides.

EST & hæc perquam similis qualibet sui parte superiori, & penè par, macilentis & sabuletis Antuerpiæ vicinijs passim sponte, etiam in hortis locum faciunt, vtunturque; Buglossi penuria Pharmacopœi, quibus Sylvestre Buglossum creditur. Admodum horrent hispidaque sunt folia, setaceis, pilis rigidis, & bullis prominulis, tantumque & simili differt modo à superiore, quantum Labrum Veneris à Diplaco hortenfi. Radix gracilior, lignosa.

BVGLOSSVM Echiioides Luteum.

VALDE cognatum huic est facie, natalibus, vsuque. Pluris faciunt hæc mulierculæ Angliæ, quam Buglossum, vocantque linguam Bouinam luteâ, propter luteos flores Sonchi similes, in asperis caliculis collectos. Folium item Diplici Sylvestris, nec minus spinosum, angustius aliquantum. Radix alba, viscida, oleracea, vt Buglossi, cuius est species.

*ἄγχυσα ANCHUSA.**Offi.* Alcanaz radices.*Ger.* Root ochsenjung.*Gal.* Orcanette.*Ang.* Alkanet.

FVCO pigmentisve illincere, Græcis ἄγχυσα erat, vnde Anchusa dicta à radicis illustri cruore, coloreve florido, cui plantæ totius cognitionem debemus: vix enim aliqui innotuissent, tum propter cum Echijis, Lycopside, & Buglossis similitudinem, tum etiam ob versionem minus perspicuam: confert quippe hanc lactucæ τῆ ἀγροφύλλου angustifoliæ,

vel acutæ, & vti videtur agrestis, quæ hirsutior & horridior. Quatuor animaduertimus differētijs ex floribus, folijs, & magnitudine. Quæ Calys seu Onocleia vocatur, maxima, frequentissima Galliz & Angliz, aruis lætis, sed glareosis, vel argillaceis. Radix intus ligneo corculo, libro corticēque crassiore amicta, sanguineo succo sādalinōve digitos inficiente: digitum æquat, sesquipalmum longa, gustū Buglossæ. Folia copiosa Echij aut Buglossi angustifolij, lanugine spinosa, incana, cespiti incumbētia: caulis plurimū singularis, rotundus, squaber, cubitalis, tirifolis florum cæruleis ad punicem vergentibus, Echij non dissimilibus: semen exiguum, oblongum, pullum.

Lutea ANCHVSA.

RARIOR & elegantior multò qui luteis floribus, sed ramulis minoribus & magis collectis in summo: folijs item numerosioribus, lanuginosis, albidis magis: caulis pedē aut cubitū æquat, & semen altērius. Radix tamen viuidiore multòque: delicatiore nitet purpurissā, succulentior priore, Norbonæ ad aquæ Marianas, vmbroso & pingui solo. Etiam in asperis, non procul Athesi flumine, & Baldo Veronēnsi, collegimus.



MINOR seu Alcibiadian vel Onochites.



NOTISSIMA hæc & copiosissima in Nitiobrigum agro, vnde Pharmacopœi Monspellenses & Lugdunenses Lugdunū ad nūdinas quotānis acferunt: nos ē vinetis & sabulosis aridisq; collibus Grāmuntiz Syluz, propēdōris Assutij prædiū, eruendā curabamus. Prolixior namque & carnosiore pleniorq; est radice cæteris. Cætera tota minor, angustiora folia, multò numerosiora, viridantia Buglossi. Complures fundit cauliculos teneros, graciles, floribus minoribus, Buglossi minoris angustifolij, puniceis. Semen cinereum, oblongum, paruum. Sapor Buglossi, nō ingratus, acrior tamen & siccior.

ANCHVSA LIGNOSIOR angustifolia.

VLTIMA hæc & minima omniū, tametsi vix Anchusa habenda sit, vt cuius sit parum aut nihil purpurea radix lignea, ruffofusca, fundēsque: cauliculos sesquipalmares lignosos Satureiz: foliolis oblōgis, Alcibiadz Anchusæ minoribus, minūsq; hirsutis: flores item nō multum abimiles, pusilli, cærulei. Radix lignea ex fusco rufescens, parū aut nihil inficiens, Marginibus agri Frontignani & Valeriz Syluz hæc interdum occurrit. Alibi nobis nusquam visa.

Anchusa lignosior.



LYCOPSIS, vel *Lycapsis degener Anchusæ, Aginetæ.*
Mathioli Cynoglossum.

NON habet hæc Anchusæ, præterquam radicis fuscum ex purpureo colorem; à quo Lycopsis deriuata fuit, id est, fuscedo obscuritasve, qualè ante lucanum vulgus inter Canem & Lupum crepusculum vocat: nisi sit ab hispida caulis foliorum & florum inpexaque hirsutie, pedem imitata Lupinum: qualem non procul à littoribus Frontignanæ & Doctoris Griffii rure nobis primùm ostensa fuit à Professore D. Assatio, præceptore exercitatisimo, & de Medica materia benè merito. Satam postea habuimus Londini in Angliæ: folia dum per initia erumpunt, cespitem instrata numerosa, bullis & villis asperata, Echii, palmum longa, pollicem lata iacent, neque toto anno assurgunt, aut caulem florèmvē edunt; sed vno & interdum altero anno post, ætate caulem sesquicubitalē, rotundum, hirsutis alis multis diuisum. Iuxta quas & folia erumpunt ex intervallis: florèsq; Echii fimbriati, diluta purpura, exili stamine. Semen Borriginis, minus nigrum: radix crassior digito, rufescit, lignosa: parum aut nihil attrèctantem inficiens.

Hæc ab ea quæ hic in Angliā via quæ Bathonia & Bristolia Londium ducit per menses Iuxta & multa hilari visitur aspectu, floribus tantum differt: quos non secus foliorum & alarum interstitia, sed in summis caulibus saturiore purpureo, Anchusæ maioris. Vt prius or subrubra linet & nonnihil rubelli affricat digitis.

Ἐχίον *ECHIVM, Buglossum agreste.*

German. Wild ochsen zung.
Gallis. Buglosse Sauvage.
Belgis. wilde Oile tonghe.
Ang. Wyld Bugloss the lesser.

SETIUS à prodit seminis indice, quo à Borragine discerni videtur: ab Anchusæ autem radicis colore, siquidem Echio multumque ad sylvestrem Buglossum accedunt, folia per intervalla circum teneros rotundos quaternosve caules rectos sesquicubitales, alterno situ plurima hirsuta, ternas, quaternasve vncias longa, pollicem lata, subnigra, crassa, è quorum sinu emergunt per intervalla flores copiosi, ex puniceo cærulei, in pusillis vtrinque incurvis aristis digesti, plumatas summitates effigiatibus: hisce asperiusculis & spinosis tegumentis evolutum clauditur semen, viperinum caput argutis, sed exilibus oris, luminumque vestigia efformat.

ONOSMA, sive Ononis.

NVLVS est paulò exercitator, qui illico percepta Onosmatis ex Dioscoride delineatione, non opinetur eam esse è censu Anchusarum, Lycopsidis nimirum cognatam, anchusamve degenerem, quam secrevit Diosc. nomine & familia: ut suo obsequutus instituto frugiperdis abortum faciètibis infereret, cuiusmodi sunt Securidica, Nymphaea, Asplenium, Hemionitis. Eoque bis foliorum similitudinem ad Anchusam inculcat. Res verò ipsa indicat esse, quemadmodum arbores non paucæ, quæ fortè fuerunt primùm: postea exhaustis viribus biennio aut triennio florem frustumque edunt nullum. Sic duo aut tria genera Echii putata meminimus, triennio primùm non nisi folia, postea caulem & semen promere: quibus per frigora amissis, non nisi biennio aut triennio interiecto, rarsum incaulem & flores erumpere: alias anno floruisse primo, aut altero, bienniumque interdum totum quasi effortas & steriles, caule orbatas fuisse, suspicionemque fecisse seminis, florum, caulisque sua natura expertes esse: cum tamen denuò rediuvas reparatis caule flore atque seminibus Lycopsides animaduertissemus: quod potuit itidem inde istis evenerisse, & id vulgo persuasisse, quia in foelix, atque fortis certa perniciēs, non secus atque si filix aliæque haberetur. Huc exempla Bechii & Didamni studiosi arcescant. Cynoglossum autem iam hic nobiscum perpendant.

Κυνόγλωσσον. CYNOGLOSSVM.

Germ. a. Hundszunge.
 Gallis. Langue de chien.
 Belgii. Bondes tonghe.
 Arg. HoWundes tunge.

HAudispar de lingua Canina hæsitatio, sed quæ minoris egere videatur disquisitionis & probationis, æquis arbitris attentius rem ipsam expendentibus. Etenim nisi nullidum cognita est Cynoglossa, aut certè ea est planta nominis interpretatione, vsu, & caninæ linguæ assimilatione, consensui vulgato adeò probata & recepta, ut nullus sit ex istis malè feriatis nouatoribus, qui æquè bonam & congruam, nedum potiorem, indagare quiuerit. Est namque ea foliis mollicibus, lenibus, lanugine pauca, ad tactum minime aspera, mollicie & effigie linguæ caninæ vel Glaſti, non nihil venosa, albicantia, Plantaginæ latifolia arctiora, præsertim aridis & sabulosis Linguagotticis, vbi pusilla vix sesquipalmū



CYNOGLOS-
 som. Pusillum.
 Norbomenſe.

Plin. Cynoglo.

& pedem excedens: caulis rotundus, incanus: in alas diuisus, quibus flores punicei angustifolii Buglosis: paruum semē lappulis, hirsutisve clypeolis contentū, vestibibus, ut Agrimonie vel Caucalidis pertinacius hæret. Pinguibus tamē & humetibus aruis Ferrariensibus & Patuinis maximum glaſtum superat, eò proceritatis progressa, ut vix sui similis sit: viridiora namque folia imæ & latè humū operiētia: dilutiores flores, obsoletioresq; quos fert nullos nullumq; caulem nonnullis annis, præcipuè vmbra saligneæ aut sepibus vicinis opacata. Qui in Herbariæ cognitione cōsenuerat peritior quàm iactantior Barallis, Dioscorides MonsPELLIENSIS vocatus, assererat Rondelletio nobis audientibus sibi non semel in Lemouicibus & Auerniis obseruatas non paucas triennio & quadriennio quotannis bellè reuiuuisse, cæterò nullum caule promississe. Quin si vires spectes, magis arideat tum planta, tum sententia nostra, quæ doctiori libenter cedit, quum potiorem indicarit Cynoglossum. Ambustus siquidem opitulari, vel mihi erculæ sciunt, refrigerandi scilicet manifesta qualitate, exsiccante, doloremq; leniente, & maiore affluxū prohibente; præsertim exungia alliquefacta feruidæ instillata: itē Allopecis de acri & erodente humore capillis defluētibus, cōfert. Nec nō emolliet aluū eius vis malaëtica & muccaginea vino incocta & frigore retuso. Radix Symphiti est magnitudine, muccore & colore, odore penè soporifero, maximi hodie vsus ad acres & tenues fluxiones: magis tamen incrassat quàm refrigerat. Hæc Plinii lappulas ferens videtur: non enim Echii, aut Anchusæ, aut Lycophides ferunt. Quare, si, ut pleraque omnia, è quoniam Herbario vertit Plinius, caule ferre & semen, ut qui obseruauit fortè eadē quæ nos scripsimus: incitè simul atq; perfidè erroris fœdi traducitur, & Ruellio pererudito calumnia impingitur non ferenda ab illo eius perpetuo plagario præsertim: qui nisi hūc tantus fuisset, nunquam ille cōmentatoris opinionem sustinuisset. Porro eum nisi tumultuari gloriolamq; aucupari satis perspicuum, cum nihil interim doctiores nos vsipiam relinquat. Cur nō docebat, quæ de re Trallianus eximius Græcus addiderit radicis cortices pilulis, quas de Cynoglossō inscripsit? quæ apprimè pollicitationi stant, nec yllus Medicorum hodie aliam vel addit, vel nouit. Etenim Mathioli hanc, cui natales Romæ ad molem Adriani facit, nusquam non locorū paulò calidiorum Norbonæ & Hetruriæ multa, nec alio quàm diximus modo in Lycopside & Onosmate, illic caule vidua cernitur. Proinde, qui nec hanc quidem probè notam de facie haberet Senensis, paucas & confusas notas posuit: vires verò, quod minime decuit, suo more reticuit, & tamen legitimum asseruit.

CIRSIVM.

CIRCIÆ varices Hippocrati, Ixiæ Aristoteli sunt: venæ humore flatûque melancholico prominentes & tuberosæ, dolore interdum sæuo partem vexantes, quibus quia hæc planta medetur, id nominis assequuta fuit. Genuinam autem plurimam propè pistrinum oliuarum, & ponè molas farinarias, in locis vadosis Lani amnis MonsPELLIACI, & pratensibus lacustribusque litoribus à Grammutio luco in meridiem deuexis, quæ maris alluionibus & solibus feruidis longè latèque patentes planicies sale niueo opertas pedibus terebamus Iunio 1566. Radix & ima folia Dyssaci modo & ortu, Buglosi angustifolii acutiora, & leuibus hirsutis spinisq; asperiora, lōgiora, virida. Caulis vt plurimum singularis, binos, ternos, aut quaternos cubitos æquat, angulosus, rectus, incanus, tener, Sonchi modo. In quo extremo flores, rotūdis, oblōgis capitulis, Senecionis, aut Cardui, purpureis densis cōflati staminibus, vnà numerosi & cōdati. In pappos defluentibus Iulio, relicto exiguo oblōgo cardui semine fuluo. Notissima hæc illic studiosis, alibi Italiæ aut Galliæ parū nota, aut frequens. Quā eandē cum Guini Cirsio in Mathioli cōmentariis eleganter depictam, intuitu, quoad licet, coniectamur: propterea quia idem Senensis vtique sui similis, nullam descriptionem apposuit: Ruellio alijsq; doctis, qui putarint hanc Buglosium angustifolium esse, neutiq; parsurus: si virentem, florētēq; vt nos, vidisset. Sanè vix illa in Dioscoride plenius descriptioni respondet & facultatibus, quàm hæc, floribus non quidem Buglosi, sed papposis & lanuginosis, euanidis, caducis.

ALTERVM.

Hic Londini in horto Morgani, etiamnum ineunte hyeme, huic aliud Cirsium creditum creuit, cognatum foliis, floribus, & radice, facie tamē Cicerbitæ, foliorumq; positu in cauliculis teneris, canis, minns hirsutis, vt etia folia paulò breuiora: sed flos purpureus, & singulæ cymæ singulus papposus: ea annum ferme vegeta viruit.

SYMPHYTVM Alum. seu Alus.

{ Gallis. Consyre, Oreille d'Asne.

{ Ang. Comfrey.

{ Consolida maior. Hsp. Suelda maior. Ita. Consolida maggiore.

PERAPOSTE istud Symphytum cōtulit Buglosso, id est, nostræ Borragini Dioscorides: quandoquidem tractus amat lætos, riuos, interdum & hortenses istud, non secus ac Borrago: cui foliis similibus, maioribus, longioribus, itemq; caule cauo, hirsuto, anguloso est: radix nigra foris, intus alba, mollis, & fermè omnium quas nouimus *Quod sonat ipsa nomenclatura.* maximè viscida: sapore oleraceo, vel insulso, quæ carniū frusta, si illi incoquantur, ferruminare, glutinariq; merito credūtur. Quāplurimos ad affectus certissima ope cōdūt, ad vnguenta spissantur, tota namq; folio & radice vulneraria est: Buglosi gustu & maccagine, sed multò pluri & efficaciore ad vlcera ferruminanda, eōq; Consolida maior vocatur: & quæ mas vulgò dicitur, floribus purpureis, efficacior habetur: quæ verò albidis floribus, scemina. Luteis etiam floribus obseruauimus quandam, quæ foliis putaretur Borrago, vbi defloruit, nisi radix subesset tuberosa nigricansq;: quare minus vetè quidam opinati sunt, Indicam occidentem sanctam herbam, Symphyt *σύνφυτον* apud Dioscori, esse, vt innox ostendetur.

Indorum. Sona SANCTA, seu NICOTIANA Gallorum,

IMPVDENTIVS CVLIS Herbariz obtrectatoribus, ignauiam hæc, si loquatur, exprobrēt, ingenuis autem vestigatoribus sedulitatem gratuletur, qua factum est vt non multis ab hinc annis ex Hesperie Indiæ nouo orbe Portugaliæ, Galliæ, Belgiæ, & Angliæ facta fuerit inquilina: maiorēne an certiore commodo, incertum. Siquidem non modò

Symphyti

Symphyti de figura & habitu ipso conferenda est, sed etiam effectiōibus ad interna & externa inuicem, eidem & cuilibet Pannaci decantatissimæ præferenda. Non est tamē Symphyti species, tantò minus ~~etiam~~ Dioscori, sit, licet visum fuit quibusdam: at illud est nostrum Symphytum vulgi magnū, tametsi iisdem riguis, nempe pinguibus & apricis gaudeat, proueniatq; foliis prægrandibus, oblongis, hirsutis, Symphyto magno, latioribus, rotundiorib⁹, Bardanę Hyoschyamo luteo concoloribus, multis è radice exili Lætuæ, multum fibrosa: scapus exit trium cubitorum in Fræcia, Belgio, & Anglia: sspissimè quatuor & quinque proceritate, quum maturè satum semen in calidioribus tractibus Aquitanie & Linguagotie florum calatos Augusto fert, herbaceo pallore nonnihil puniceantes, viciales: semenque maturat in calycis exiuius æmōdum, & similibus Hyoschyamo luteo, vnde nonnulli putant Hyoschyamum luteum huius speciem esse: & sanè utriusque plusculum caloris inest. Quare nec Hyoschyamus esse potest; quòd illis persuasum fuit, quia vidissent non paucos huius fumo hausto temulentos fieri. Videas enim naucleros pleròsque omnes qui isthinc rediunt gestare pusilla infundibula ex folio Palmarum aut storea confecta, quorum lateri extremo inserta sunt conuoluta folia & comminuta siccata huius plantæ: istud illi accendunt igne, atque hianti ore quantum plurimum possunt, inspirando fumum sugunt, vnde sibi fæmen sitimque sedari, vires instaurari, spiritus exhilarari asserunt: soporique iucunda ebrietate cerebrum, distant: incredibilem pituitæ copiam plerumque educi: Quod ipsi dum hauriremus, experti sumus: non tamen citò inebriat, nec frigore dementat, vt Hyoschyamus, sed quadam aromaticitate rapida ventriculos cerebri imbuit. Hyoschyami illius lutei nullū factum à nobis certum periculum, Istius verò Sanctæ herbæ vocatæ iam vbique increbuit fama: sanè ad vlcera, vulnera, thoracis affectus, tabemq; pulmonū, ea nihil noui nouit ex nouo Orbe nostra: tas præsentius, aut efficacius, quemadmodum inter remedia dicitur.



Nicotiana
inserta in
fundibulo
ex quo ha-
riont fumū
Indi & na-
cleri.

PULMONARIA, maculosa folio Borrag. floribus Primula
Veris, purpureis.

{ Gallis. Herbe aux Pulmons.
Belgis. Onser brouten weickcrup.
Ang. Sage of Ierusalem.

CONSULTIVS huc hæc fuit dilata, non enim magis dicta Plinii Pulmonaria ob effigiem foliorum, quàm propter vires pulmonibus non secus laudatæ atque Symphitū, cui congener est, nec parum similis, hirsutis calyculis florum Primulæ, prima vernatione eleganter purpurantibus, in cauliculis mollioribus, sesquipalmaribus: foliis item super-
ficie

item superficie & hirsutie Symphiti aut Buglossi, maculis lacteis & nigris aspersis, semina nigra relinquentibus Borraginis, ab imo erupentibus, superne acutis, radice quam Primulæ crassiore, fusca, viscida: gulta non ingrato totius plantæ Holeraceo. Iusculis miscet folia mulierculæ, aut tusa ex ouis in placentas ducunt, adque pulmonis affectus, & cordis vires conferre prædicant, eoque in hortis habent ex umbrosis montosis. Quibusdam regionibus visuntur sine maculis.

PULMONARIA *Gallorum, flore Hieracij.*

QUAMVIS sit hæc Pulmonariæ maculosis folijs & nomine donata, propior tamen videtur Intubaceo generi: flore nempe luteo Hæracij, in parietinis & dirutis, musco oblitis, Lugduni, & MonsPELLIJ Graminæ sylæ, emicat tenello cauliculo, Intubaceo, palmarum & sequepalmarum, gracili, è radice exiliore Betonicæ, nonnihil fibrosa. Incerto adhuc vsu, uti planta parum nota est: quidam tamè cõferre paronochij & pulmonibus prædicant.

MONTANVM *Arction an Personata Plinij?*

TAMETSÌ nullus dum scriptor ARCTION, siue Vrfam, vel Arcturum Dioscoridis nominat (neque enim Ruellij vndequeque doctissimi manes, aut sententiæ de Xanthio, insectari, animus est, aut fas ducimus) tamen id putamus factum ignoratione, non tam plantæ ipsius, quam Cumini Syluestris siue parui, cui confert Dioscorides Arctij semen: alioqui folia ampla Phlomo rotundiora, caulisque teneros & longos promittit hæc, quæ ut nomine & ordine apud Dioscoridem, sic facie magnoperè cognata est Personatæ siue *Αρctίου* vulgari, quam Vrfam interpretamur dictam, utramque à semine, uti videtur, hispido, villosis echinis, qui huius Arctij sunt molliores, propiusque Cuminum paruum siue Syluestre simulant: semine etiam non absimili. Quare nec absimili vero ratione videmur asseruisse hanc Arction veram. Hæc nupsiam nobis visa, nisi celsis & Syluosis montium opacis, ut Veganij Iugis Norbonæ & Saleux montis, aliisque Pedemontis & Sabaudie finitimis. Radix longa, tenera, candida; foris & intus, edendo non ingrata. Folia, subtus præsertim, admodum incana, uti vngulæ caballinæ vel Petasitidis. Plinius hanc *Personatam* nuncupasse videtur: sed descriptione confudisse (ut sæpè facit) cum Personata, non levis suspicio est: tum quia folia utriusque comparat Cucurbitæ, & tamen singulari distinguit Personatam à Personata capite & radice. At Dioscorides Verbasco comparauit, & hæc tres, nempe Arction, Arction, & Petasidem, admodum inter se similes, serie coniunxit, nec tamen aliam alij assimilauit, cum tamen Petasitidi simillima Personata sit.

Ἀρκτίου. PERSONATA, *Lappa maior, Bardana.*

{ Ang. Great Bur.
Ger. Grosse Kletten.
Belg. Groote klissen.
Gall. Glouteron ou Gletteron,
Ital. Lappola maggiore.
Hisp. Bardana.

PROPTER eandem quam cum villosis hirsisque, vrsorum capitibus glomerationes echinosque, lappæ haberent similitudinem, nomenclaturam cõsimilem accepit Arction & Arction. Personatæ autem fortè, quod folia prægrandia vultui, larum, aut personæ obtendi facie solita essent. Et Personata, quia galeri vice Solis æstum à capite arceret: vnde etiam Petasitidi nomen factum.

Nimis quàm frequens & vulgaris lappa magna ubique gentium secus vias & vrbium pomeria, luculentæ magnitudinis, Cucurbitæ emulis folijs, & Echinis, mordaci hæsu vestes canesque arripientibus, puerorum frequenti lusu nulli non notissima. Radix grandis, carnosa Arctij siue Personatæ, sed foris nigra: conditur saccharo, & cum grata tum vtilissima ad calculum & dysenteriam habetur, Veneris etiam incentiua. Idem semen pollet, sed multò efficacius calculosis.

. Y. j. XAN

Ξάνθιον καφαγανιον. *XANTHIVM* siue *Strumararia*.

{ *Offi.* Lappa minor.

{ *Ang.* Lappe biere, or lesser biere.

{ *Ger.* Beilet steiz und Spitz Kletten.

{ *Bel.* Lleyne clissen.

{ *Gal.* Petit Gloutteron.

{ *Ital.* Lappula minore.

COLORIS cognomine sic dicta, quia ruffat capillos, quemadmodum hodie vulgus tinctorum luteam & Kermes, siue *Kermesinum* dicit, cui libet regioni fermè æquè nota ac maior lappa, sed non perinde feraci inuisoq; prouentu abūdā, locis & scrobibus arefactus, quādo imbres aruerint, gaudet, ortu & fructu echinato lapposoq; Platani aut potius Glycyrrhizæ alterius filiquosæ, folia gerentibus caulibus sesquipedalibus & pedaliibus, incisura, figura, & colore Attriplicis vel Tornesolis, Bardanæ etiam aliquantū adūbrante: vnde Bardana minor dicta, radice non profunda, fibrosa, merito, vt semen ipsum, laudata ad tumorem strumarumq; pertinaciam delendum frequenti admotu, vnde χαφαλάς, siue struminecam vocarunt antiquitus.

Βίχλον. *TUSSILAGO*, *Farsara* & *ungula cabalina* *Offi.*

{ *Ger.* Koffhub & Brantlatich.

{ *Bel.* Doßbladeren.

{ *Ang.* Fole foote, Coltes foote.

{ *Gal.* Pas d'asne, patte de cheual.

ACOMMODO compertissimū, quod præstat anhelosis & tussi afflictis, dicta fuit *Bechium* Græcis, *Tussilago* Latinis, vel *ungula cabalina* recentioribus. Folia quippe promit ab imo in pediculis sesquipalimum altis, rotunda, sed lateribus senis, septenisve angulos acutos claudetibus, auerſa tomentosa incana, aduersa virentia carnosā, Petasitidi adeo accedentia, vt per initia nisi odor (qui huic grauis) discerneret, eādem putares. Flos illi anreo pallore, radiatus, dentis Leonis æmulus, qui Februario & Martio nondum egressis folijs repente floret: parumper perſtat, & celerrimè in pappos dehiscens. Radice tenera, candida, carnosā, geniculatā, humi sparſa, cuius cum folijs est vsus notior, quā vt longiori cugeat oratione. Vda ſata, crepidinèq; fluminum amat.

Πετασίτης *Petasites*.

{ *Ger.* Pestilenz wurz.

{ *Bel.* Pestilence wortelen.

{ *Ang.* Butter Barre.

SED & utiq; similes sui negotium ex negotio serunt studiosis, qui *Tussilaginem* asserunt, *Petasitem* negant, plantam illam in pratis palustribusq; primo Vere crescentem, atq; nondum folijs ortis caulem erigentem tenerum, carnosum, concanum, sesquipalimum altum, *Orobanchæ* similem, floribus in summo densis, pusillis, multis, mucosis, racemosis, oleæ, in purpureum conum compactis, spectatu amœnum: nullo semine prægnantem, sed flore marcescente & defluente, spē etiā feminis perdentem. Folia pediculo cubitali, crasso, carnosō, quasi appensa medio sui centro, pendula instar *Petasi* inuersi visuntur, maximā Personatiam superautia: sed rotunda, subter parum incana, singulis pediculis singula, medio fermè totius puncto hærentia, vbi sinus desinit profundus ad vsq; folij centrum actus, quæ si prorsum clausuris, fungi penduli modo fulciri dixeris: simūq; Commentatori silentium indixeris, qui dum nihil habet quod illinat paginis, in minutis istis obstrepit bonis viris, nec quid quouē modo scribat, de facultatibus notisve certioribus, quicquam pensi habet. Grauis enim & prorsum ingrati est odoris hæc, gustanti verò perquam amara, & ingrata: desiccatur item magnopere, quapropter morbis epidemicis vtilissima habetur & comperta Medicis Germanis etiamq; plebi, quæ ea de dote vocat *Pestilentie wortelen*, id est, pestis radicem: quæ valde crassa, foris pulla, intus cādida, & plurimum vermiculis prægnans & exesa, quod mirum foret pabulum adeo amarum amare, nisi illius essent proles & alumni: vt in absynthio, & in vesiculis, quibus condita & reposita aloes asportatur, cernitur, quam interdum etiam mures liguriunt. Radices complures cortice exutas

& exenteratas aceto indunt quoad viribus imbutum fuerit, exque illo cum Rutz succo & Theriaca propinant, praesidiumque nulli secundum affirmant. Leuiusculo argumento deceptus fuit, qui rebatur propter communia natalitia & florum ante foliorum egressum, esse eandem, quasi non idem contingat Trifolio Hederaceo, Croco Syluestri, Ephemerio, & aliis.

CACALIA.

Hec multum Petasitidi asimi-
latur, foliis praesertim: an verò
sit Cacialia ambiguum, nec tamen
vlla alia vllā opinionē verē nobis
fecit, nedū vt animum expleret,
praeterquā ista. Alpini iugis o-
paciq; supercilii prope fagos &
aquarum scaturigines vel fluentia
plurima, alibi rara. Ternos cubi-
tos aequat caulis: ramulis quibus-
dā diuisus, flosculis albicatibus &
aliquantum obsoleta purpura as-
persis, incōdite cōgelis & pānosus
mucosissive, vti in Eupatorio Can-
nabino, aut Virga aurea, radix albi-
da, fibrosa, crassa Garyophyllatae,
vnde pediculi surgunt foliis per-
magnis leuiter laciniosis donati
Petasitidis: quā etia odorē qua-
dantenus imitantur. Galliae Nor-
bonensis celsō monte Calcaris
nūcupato primū vidimus, pro-
pe illius montis verticē qui Dei
Paradisus à plebe vocatur. In
Delphinatū vel Allobrogum fi-
nibus Montes qui Pilati monu-
mento ē regione visuntur. istam
habent, vnde quidam amici Lugdunenses peritissimi habuerunt.

ALYSSON.

FVI t haec Thlapis & Lunariz Graece socianda: sed operarum properatione huc intrusa
est, licet non absimilia sint folia Echii: in hortis cultioribus habetur, & nonnullis Lu-
naria vocatur: sed nulla melius Alyssio Dios. quadrare videtur: est cubitum alta tota, in-
cana, asperiuscula, ac nonnihil tomentosa, radice exili, foliis in imo Conizz, vel albę violę,
plurimū n vnicaulis, rotundus, hirsutus, pusillus alii diuisus, in quibus alternatim flos-
culi lutei oriuntur Irionis, & folliculi oblongi clypeoli compressi, qualis Lunariz Graecę,
quem duplicatum facit membranula dissipans vtrinque seminum seriem duplicem, que
sunt Leucoi similia, sed maiora. In Belgio vidimus, in Italia dono habuimus, Mōspellię
satam & enatam gustauimus, sapore longē Porro aliud est Galeni Alysson putatum à re-
centioribus, Bugula nempe siue media Consolida, iamdiu superius adducta.

Dotterbloemen Germanorum, an Plinij Chamaeleae & Malacocysus?
Chelidonium minus.

Nymphaea { Alba maior. . .
 { Mirima.

Nymphaea { Lutea.
 { Minor.

*Morus Ror.**Tribulus aquaticus.**Faba Egyptia.**Arum Aegyptium.**Dracunculus maior Math.**Dracunculus aquaticus.**Arum.**Arum minus.**Arisarum utrumque.**Arisarum Norbonense.**Asarum.**Asarina.**Brasica marina, sive Soldanella.**Soldanella montana.**Gramen Parnasi.**Thora.**Cyclamen utrumque.**Recunda.**Aristolochia* { *Longa vera.**Polyrhizon Pl. Aristolochia tenuis efficacior Galeni incognita,**Clematidis, falsò longa, Maub.**(Matb.)**Viola Martia, cuiusque varietates.**Viola flammula, coloris calida.**Saxifraga* { *Alba strumosa, Chelidonioides.**Aurea.**Caryophyllata Alpina.**Χελιδονίου μικρόν. CHELIDONIUM minus, sive Hirundinaria minor;**Scrophularia minor.**German. Klein Scholwortz, Klein feigwurtzenkraut & Mispentkraut.**Gallis. Couillons de prestre, Ital. Fanojello.**Petite Esclece.**Angl. Pyle woorte or Fyg woorte.*

NIMIS quàm morosi sunt, qui Chelidonium minus ob ignauam acrimoniam reiciunt, cum notæ ceteræ suffragentur apprimè descriptioni: nam oritur primo Vere cunctæ Europæ Chelidoniis ad nos remeantibus, & grannla triticea multa appenduntur radiculis, vnde triticum, siue τῖτρον vulgò Diosco. xuo dictatum fuit: à nostris autem Scrophularia etiamnū vocatur. Quare facilè futis obiectio de acrimoniam refutatur, aliorum multorum simplicium exemplo. Apud Diosc. Arum, Asphodelus ex Hesidio, vbique cœpæ fidem facient, quorum ætior aut mitior sapor, agri sequitur conditionem. Folio Hederaceo Afari exit, florumque elegantem sobolem in pediculis tollit, foliolis aureis radiatis, stellatis.

CALTHA Palustris recentiorum, non est Chamelence Pl. folio Populi, sive humilis incana. Dotterbloem Belgarum, & Farfrugū recentiorū.

LOCIS item lacustribus & vdis huic perquam similis & frequens quæ Germanicè Belgicè *Dotterbloemen* vocatur, Chamelencè quidam ex Plinio, ex Geoponicis Malococyssum maiorem: Mathiolus ex suo cerebro Tussilaginem alteram facit: nam coniecturas triuales, quas & descriptionem de recentioribus scriptoribus, peritisatmo Dod. & aliis, emendicauit, inculcat, suppressis nominibus & mutatis classibus, quasi scopas dissolutas: hæc enim multò magis Chelidoniū ipso toto vultu præsert, nisi quòd vniuersa maior: Flores neutiquam papposi sunt, quinimò diu admodum & particulatim floret aureis Rauunculi, aut Chelidoniū minoris: neque folia ortu, vt Tussilago, anteuertunt, & Nymphetæ luteæ colore, vel Chelidoniū minoris nitore fulgent, & similes sunt adeò, vt in Angliæ vuidis, vbi vberissima, sæpè pro Nymphæa minore Pharmacopœi & Clinicæ mulierculæ

MALOCOCIS-
sive Cassani Baf-
si.

mulierculæ nobis attulerint & ostentarint. Folia non subter incana, non angulosa, non caulis tomentosus, sed potius atro virore polito, vti Asarum, Nymphaea. Radix fibrata capillamentis, acris gustu est, sed moderate: nondum ramen vsu exploratæ facultates: quod magno pudori est istis audaculis assertoribus, sed maiori detrimento Medicinæ tyronibus, maximo verò nocumento & grotis, quoq; perdit inscitia, & scelerata gloriæ famēs.

ΝΥΜΦΑΙΑ NYMPHEA LVTEA, Papaner palustre.
Nemuphar. Officinarum.

{ Ger. Wasser gilgen, haarwurtz, 3er blumen.
Belg. Isolompen.
Hisp. Escudetes del Rio, & Higos del Rio.
Ang. Water lily.
Gall. Blanc d'eau, & Lis d'estang.

AQUA Lymphæ seu Nymphæ antiquitus vocatæ, natales & nomen suppeditarunt Nymphæ, quæ nuppiam nisi in aquis leniter labentibus emergunt, parum extante folio peramplum, Bechij aut *Dotterbloemen*, circumatæ rotunditatis, læuoris, densitatis, & magnitudinis, in caule glabro, quasi pediculo, quaternum quinumve cubitorum, flore specioso, luteo micante aspectu, & ambitu obrussiore, quàm albæ Nymphæ.

NYMPHEA alba.

ALTERAM speciem, quæ maior vocatur, vix quisquam discernat, nisi floris emaculato cā-dore Liliū prouocante: radix vtriusq; crassitie cruris humani, nodoso & strumoso corio clauum imitatur, gustanti insipida quæ adhuc humens, siccata nonnihil sapit alimētosi. Luteæ autem candidæ nigricat cortex, vtriusq; amaricat semen & flores nonnihil odori albæ: Flagrantissimi lutei, & gustanti nonnihil acrimoniz præferunt, glutinosi; quippiam habent, quem, nisi condiantur, arfacti amittunt, sicciq; efficiuntur, atq; nullo aut passillo calore digerunt: quæ est perpensione faciliè quis componat tumultuarias Arabum & Neotericonum inter se perorationes, Atq; quum attoniti mirantur Arabas quandam speciem Nymphæ calidam tenuantemq; putasse: non est sanè quod conuiciantur, aut ineptè de capite de Sedo accersant subsidium; nam si Nymphæ inde sit dicta, quia Lymphis Nymphisve est conuictrix & accola, potuerunt Serapione antiquiores Caltham nobis dudum Palustrem dictam congenerem fecisse: natales quippe, folia & flores affinitate haud vulgari, etiamnum persuadēt idē quibusdam Pharmacopœis, qui nostris medicamentis non semel subdiderunt hanc, illarum vtriusq; loco: vocabantq; Nymphæam luteam. Quin ni nobis forent notæ Nymphæ, certè hanc legitimam Nymphæam agnosceremus, vti fortè pleriq; alias arbitramur pleriq; omnes humanæ Mineræ cō- iectores, quoties potiores vel rationes, vel plantæ accommodatiores nos deficiant,

ALBA Minor.

SUNT insuper antiquis prætermisæ Nymphæ duæ, potrices quidem, & aquarum alimēnz: verum regionum duntaxat (aut certè plurimum) Septentrionalium, præsertim Angliæ, via quæ Londino Oxoniæ & Bristoliam ducit, secus & trans aquas viarum priores minusq; profundas, numerosū exerit hæc in tenuioribus pediculis & non dissimilibus foliis, ferè magnitudine Chelidonij minoris, aut Palustreis Calthæ, *Dotterbloemen* vocatæ: defluente flore candido Papaueris, Rhæadis, aut Melampyri, capitula & semina superfunt, crassiusculo cortice obducta, nullius dum vsus,

NYMPHEA LVTEA minor Septentrionalium.

MINVS frequens Lutea minor, è limolo item fundo, traiecit lymphas iunceis pediculis, ternū & quaternū cubitorum crassiusculis Portulacæ, singulare folium in summo gestantibus, duplò maius quàm superioris: quare hæ differentię sibi ita ex aduerso altrinsecus opponūtur, vt hæc maiuscula lutea, albę nymphę Dioscoridis respondeat, superior verò minima conueniat cū maiore lutea. Floribus ex vno quasi iunceo exortu Primulæ, minoris chelidonijs stellatis, iuxta amœnissima Thameſis fluenta, in vdis scrobibus & lacustris præſiſibus: gustu plusculum caloris videtur habere, & sicior esse quàm superiores.



MORSVS RANÆ.

FNCOMPERTAM & hanc Græcis, Septentrionales, apud quos (raris in calidis) prouenit, *Wasschen Beer*, aut *Ranz morsum* vocitant, & *diejn plompca*, id est, parua Nymphęam: & certè magis Nymphęis, quàm Potamogetoni accedit, præſertim figura & natalibus, nempe torpentibus aquis foliola plurima innatant, in Lenticulæ palustris quãdam effigiem, aut potius pusillæ Nymphęę albę, circinato pariter ambitu, sed minore Capparis, vnguem maioris digiti æquante: in pedicellis flosculi intermicāt luteoli, alibi lactei aut melini sūt, tribus foliolis cōstantes minimæ albę Nymphęę, crebribus radicum staminibus, longius se porrigentibus in fundum lacustrium, stagnantiūmq; aquarum, vbi ranz lubentius stabulantur, vnde nomen: ad arcem Londini regiam & mœnia, plurima Julio & Iunio, gustu Nymphęę aut Lenticulæ palustris.

Tetfolioꝝ **TRIBVLVS Aquaticus.**

Off. Tribulus marinus.

Ger. Wasser nuss, weihenuss, Stachelnuss, vnd Spitznusz.

Belg. water noten. *Hisp.* Abroyos & Abrollos.

Gal. Escharbotz, Saligotz, Chastaignes d'eau, ou Truffles d'au.

BORREALIVS, vt Belgiz, Germaniz, fosis, & pigris fluentis, prope Nymphęas aquaticus Tribulus, qui etiam aduerso flumine è Francolino Ferrariam versùs nauiganti, non semel occurrit, adque ipsius vrbis Ferrarię mœnia lateritia in altè depressis vallibus & scrobibus. Paucis hæc similis effigie, eòq; nullū latere quit, qui muricataz uces castaneasve triquetras, duras, ternis plurimum aut quaternis mucronibus figētes, noriti nucleo albedo, Castaneę sapore, quo plebecula lubēter viciat, Castaneęsq; aquaticas appellet. Semirotunda, cristato leniter ambitu, folia Soldonellę & Vmbilici similia, sed

cras-

crassiora, e pediculo longiore, superiore sui parte nonnihil protuberante, carnoso, succulento, e caule breui Portulaceo sensim desinente in radices, comis vdis, & albicantibus capillamentis, prolixis, fibratis, continenter in aquis partim natantibus, partim in fundo repantibus & meris. Quare videndum meritò cur Agri ppe vnguento addantur nuclei, quibus etiam emplastica, obstruendiq; vis, aluum constipans.

COLOCASSIA, siue ÆGYPTIA FABA,

an sit ARON *Ægyptium patarum, Italia
nuper inquisitum*

SI QVIS ad fructuum varietatem respiciat, latius hodie multò patet ambitus generis fabacei, quam quum Dioscorides Græcam fabam & Ægyptiam duntaxat memorabat: nam & nostras vulgaris nentra illarum est, & complures ex India tum Orientali, tum noua Occidentali consequuti sumus, quorum fructus aliquantum fabæ equiparantur, frondem autem & reliquam faciem, si ille absit, nullus agnoscat fabæ. Eapropter illa cum primis egregia Ægyptia huc pertinere videtur, vt quæ palustris soli humentis glebæ sit soboles, vnde aptè Dioscorides Cibotij siue Arculæ eruit ethymon, quod immeritò quidam carpunt, vti dicetur postea. Et frondes isti sunt quantæ arborum (malim verti Petasitidis, vt e Græco potest elici, eque Theophrasti & Galeni lectione.) Radix harundinacea, crassa, cruda vel cocta estur. Quare apprimè olim innotuisse Theophrasto & Dioscoridi, certum est. An verò sit ista, quam Commètor sibi, alijsq; persuasit, fides sit penes Bizantium picturam: quam isti critici audaculi substantant, ac mussant Dracontio Aconito, alijsq; nonnullis, ita nescio quid tale euenisse. Certè multis annis ab hinc permultas credebamus plantas nobis visas istius in pletisq; Italiæ locus (nam nullus erat hortus paulò celebrior illic cui deesset) verum postea monnerunt nos flores & bulbi, tametsi complures vnà adnati, Aronis speciem esse. Sunt enim multæ confertæ & quasi appendicibus aliorum bulborum auctæ, tuberosæ, oblongæ radices, effigie quidem Ari, sed triplo aut quadruplo maiores, similes, & còcolores illi radici, quæ Apium falsum esse monimus: sed succulentæ, teneræ, intus forisq; fusce dine rubiginosa: folia nobis creuerunt Nymphæ maximæ magnitudine & ferè similitudine, crassitie, colore, sed lixæ, venulæ, neruulq; & superficies fuerunt Aronis, vt & gustus: flos nullis blanditijs potuimus prolicere, neq; diligentiores cultores, Pisis, Bononiæ, Patavij, vbi Trisianus Medicus habuit: nec Leo ille forensis Philosophus Venetijs parum studij huic impendit in Belgio fatam hyemis sæuitia deleuit.

ARON ÆGYPTIVM qui & Theophrasti, nunc
sit recentiorum Colocassia?

SI igitur, vt non nolentes assentimur, sit Arum Ægyptium ista planta, quam dudum delineauimus, non Colocassia siue Ægyptia faba, cognationis notis quibusdam potuit imposuisse cum reëterioribus, tum antiquis authoribus: nam Palladius, vbi bulbos Colocassiz serendos præcipit, videtur sequutus opinionem & nomenclaturam Cypriorum, qui Colocassiz appellationem huic impertiant, vt est apud Dioscoridem. Et vtinam otium non defuisset Mathiolo, quum illi ostendebatur Tridenti vera Colocassia, nã ille accuratius tam visendâ stirpem, eiusq; natales, conditiones, magnis, vt par est, votibus herbariorum expetitâ, nec citra laborem & sumptum aduectâ, verbis expressisset: Sed non rarò instituti oblitum magnum virum transuersum agit perorandi libido in quolibet, qui nequeunt fauere linguis & silere, cuiusmodi hic doctissimus Guilandinus, modestissimus Anguillara, Matthiolomastix Vercellensis Apollo. Itaq; ob similitudinem canis & foliorum Nymphæarum Ægyptiæ fabæ contulit Dioscorides, & rursum istum Aronem peregrinum Colocassiz compararunt Palladius & recentiores, cuius nostrum Aronem speciem esse, certum habemus. Quin si e Græco non sit ἀρον ἡγοῦ quasi Sacrum, vt in Iride factum, plebecula, quæ Barbam Aronis vocitat, videtur agnoscere, ex Palæstino vernaculo

& ornaméto Aaronis Pontificis. Et alij scedius, sed signatius, eodé feré alludentes, Sacerdotis veretrum, aut mentulam vocant, in conum mucronatum racemum illum purpura punicante miniatum acinulq; stipatum, ad milij Indici fastigiatz spicz effigiem: vbiq; viarum marginibus & pratorum ripis vdis obuiû, viscû hyeme exacta folia pediculo edéte bipenniss effigie, quale sagittariz aut Boni Henrici, virore lurida & pallentia, maculis nonnullis nigricantia, vnde etiam Dracontium vocant: radice hermodyli feré oblôgiore Satyrij Erithronij Geneuensis.

ARISARVM Veronensium: Plinij ARIS.

VOCTIS argumento, non tantû effigie & viribus perspicuum Aro congenerem esse Arisarum, quem vocat Galenus & Plinius Arim: quæ vox Hippocrati, instrumentum Chirurgicum ostendit, vnde fortè accommodatum nomen: aut potius à vigetiore acrimonia quæ huic inest, quàm Aro, & qua discernuntur: alioqui non nisi magnitudine discrepantes & in Ægypto nascentes à Plinio traduntur. Nobis tamen quæ notæ sunt species duæ, non solum minores multò sunt, sed etiam rotundius folium vni est, cuius virentis Veroneus in primis peritus Pharmacopœus. Eâ putamus alicudè ex vicinis vrbi môtibus aduectû fuisse, nâ & alibi non procul Thermis Lucensibus habuimus: & idé bulbi, quos vna in capsula cum Moly & Colocasia asferen dos curassemus, in Belgio sat ipsa Bruma in foliû erupère, paulò antè Ari exortum: in pedicellis loreis Cyclaminis modo, folia singula Hederacea, multò minora, Ari molliora, & delicatiora. Flos fuit etiâ singulis vnus, vno foliolo conuolutus, oblongus aspectu Aristolochiz, è lateris rimula emicante fibra staminea. Radix quanta Fumariz Pliniana, sed foris fusca, albida intus, tantoperè feruens, vt ista Agyrtz: ridiculum quidem, sed non perinde iucundum, excitent plebi spectaculum. Quippe alicui è turba ostendunt nuculam auellanam, persuadentq; saltem in os inserat, si deglutire non lubet: tum impostor, celeritate manus, qua valet, inserit hianti rustico vnum ex istis bulbillis, moxq; illi comprimit fauces, quæ actutum inuultu bulbi imprefione, contractis fibris, & tunica palati, conuelluntur. Manetq; misellus rictu diducto, ore hianti, ridenti similis: Sed *κλαυσηρόν* Homericum edente.



ARISARVM Norbonensè.

HOMINIO quidam Stephanus Barallius vocatus, nobis per familiaris, propter summam stirpium Norbonensium peritiam, in qua consenuerat, & nomen in Academia indeptuserat Dioscoridis MonsPELLiensis, non semel duxit nos ad triuolum quèdam ponè cœnobium Funecinctorum, vbi in salicetis & herbis vdis eruebat radices huius, interdum vnam aut alteram simul, interdum plures adnatas, maiores quàm Chelidoniij minoris: folia emittentes longiora, angustiora Asaro, rigidiuscula, eoq; cuncta plantula adeo arida, vt frustra sapius cupierimus flores & fructum videre, maturius marcescentes præ solibus feruidis. Nam illic quibusdam annis, humidioribus præsertim, nonnullæ se producit plantæ, quæ aliàs aliquàm multis annis continuò æstate recurrente præficca, nuspiam cõparent: vt est legumen illud *Ferro Cavallo* Italicè vocatum, nec non aliæ multæ.

ARISARVM angustifolium, Orthogali lutei facie.

NE QUIDEM illius angustifoliae Arisari, quod in hortis Belgicis, Gallicis, & Anglis colitur, nobis florem vllum aut semen hactenus visum. Quod quidē eō magis optabamus, quia suspicabamur Orithogala lutei congenerem. Est enim in ericetis & filicetis, Liguriz praesertim, angusto folio, porraceo, aut Ornithogala lutei, palmari, in angustum quasi pediculum, prolixū, ad imum deficiente, ē ceruice bulbi Auellanae nuculae parī, aut Serpentariae maioris.



ANGVINA DRACUNTIA.

SERPENTARIAM istam maiorem, quam cuncti horti norunt, & ager MonsPELLIENSIS sponte dat, quin sit Dioscorid. Dracontium maiore, inaculis albidis, folia Hederacea prominentem, nullus inficiās illi, nisi maleficus temporis prodigus rixator quispiam. Rectus quippe caulis, glaber & politus, extima cute anguinum serpentisve exuuium, maculis, fuscis, vipereis, pullis, puniceis, giluisque, transuersis, obliquis, & fortuitis, adeo exprimens, vt eminus repente intuitu horrorem incutiat: tesquicubitali bicubitalique in summo ē vaginula emicat, congestus in cono racemus planē Ari, cui radicem etiam non ab similem, rotundam, maiorem, seque lateratim propagantem. Qui igitur foliorum comparisonem negant veram, quod non sint hederacea, actum agunt, nempe monēt, propter consequentem & arctam similitudinem, folia Dracōis dicta fuisse hederacea, cum potius debuerant hederacea illa Ari dici, quia huius postea conferuntur cum foliis Dracunculi & radice. Vbi Dioscorides, aut si quis alius Crateuanus fuit, ad indolem & vniuersum habitum plantae respexit, foliorumque laeuorem, viorem, colorem nitidum superficiē contulit; quia essent perquam affines plantae, vt vides in collatione etiam radicis: vbi singularis numerus, nulla expressione maioris, aut minoris Dracontii, bis repetit collationem. Nec vniuerso tractu Graeciae, à nostris amicis iamdiu lustrat, vlla alia vspici Serpentaria, quam ista, quae etiā non procul moenis Mōspelliaci inter segetes, Gladiolos & Hyacinthos laeta exit, alibi que in pinguibus aruis, non diuersa nisi ætate, quando decussis seminibus & summitatibus effractus à praeceuntibus, frequenter repullulant nouellae, quae potuerint Plinio persuadere, plures vt constitueret species Dracunculi, miscerētque Ari, Asari cognatas differentias, vt in Bechio, aliisque locis illi contigit. Nec alterius DRACONTIUM plantae videtur geminata descriptio apud Dioscoridem, sed ab alio quopiam, paulum diuerse, vt ferē fit, descripta. Lubenter nos & grati illam à Senesi Rapi effugie adductam, nec tamen descriptam, spectatum iuissemus quod loci ille dicit, vbi sapius frustra sciscitati sumus: negant enim Patavini, Veneti, Veronenses Pharmacopoei, & doctissimi complures, usquam sibi visam; negabant item Cortusius & Anguillara nobis anxie sciscitantibus.

AQUATICA ANGVINA, sine Draconculu.

IV. x t a riuulos & labentes aquas frigidarum ac calidarum regionum, vt in Belgio, Northmannia, Apulia & Hispania Granata, sponte illum emergere afferebant nobis, qui in hortos suos indidem transplantarunt: cauliculis folia hederacea gerit, maiora Ophioglossi, supernē acuta: in caule humili subpurpureo vix palmari flore rubellū, odorum, non ab simile Serpentariae, ē radice fibrosa, geniculata, latius serpente, & multis fibris humi depacta, nullo bulbo appenso aut annexo, vrente gustu & crustas excitante,

Ἀσάρων. ASARUM Baccaris, sine Baccatis diuersus à BACCARE, Nardus Rustica.

Germania.

Germ. *Asfelwurts.*
Gallis. Cabaret, oreille d'homme.
Belgis. Daelwoetel, ende Ejanfoezen.

NO N video quid negotii fuit quanam Asarum esset, quidve à Bacchari distaret dignoscere. Sed ambitiosa huius aui declamandi licentia mauult rixari, quam docere, aut doceri. Qui enim Baccharum videt, etiamnum apud Italos & Hispanos, apud Gallos item *Cabaret* hanc dici, leuiuscula Metathesi, voluerunt Baccharim fuisse Dioscoridis: illud autem caput, aut idem cum isto, aut reiectaneum esse. Atqui discrimen vtriusque satis perspicuum cum nos illic ostendimus, tum hic addimus: nominis confusione neuti quā fraudi esse debere nostræ cognitioni. Baccarim hanc fortē vocatā dicimus, quod Bacculis similes, aut Vacciniis ferat lagenulas similes, illam alterā *παρχαρι*, siue Baccharim, propter odoris cōmendationem. Quare quando Plinius negat Asarū Coronis addi, eoque sic vocari, putamus voluisse dicere, ex hac aptari nullas scopas lustrales verendis Deorum aris, quales colligebantur ex Verbenis, Verbascis, & similibus comosis firmioribus. Nam hic Dioscorides de *παρχαρι* asseuerat; & ipsa planta id confirmat semper virentis folii leuore cum sit, ramulis viticosis, & pediculis flexilibus in corollas aptis, floribus purpureis, odore Nardi; radice exili, fibrosa, admodum viuaci, non solum domi, sed & ruri sponte enata, in montium conuallibus humentibus, syluosis, Allobrogū, Sabaudorum, Galloprovinciæ, & Pyrenæorum.

ASARINA, aut Saxatilis Hederula.

ASARINAM verò rarò nisi locis montosis & saxeis vidimus, in Galloprovinciæ, Delphinatū, & Norbonæ mōtosis; cuius quidē per plures notæ sunt, quæ Hederæ terrestri conueniunt, proindeque nonnullis Hederæ saxatilis dicitur: hanc vtrinas ciere scimus, an alium ducat compertum haud habemus: nec tamen id inficias imus: nam huic fortē vsu venit quod de Asaro asserunt. Si tenuissimè teratur potu, lotium: sin negligentius, aluum & vomitum ducere. Sanè putarim, quia tenuissimarum partium, decoctum celerrimè ventriculi fundum & duodenum transuectum illicò hepatis vi alterius mœstiaicas rapè vix dum collutis ductibus, aut leuiuscula impressione inibi relicta: at subest ratio argutior, hypopotæ non pauci, præsertim splenetici, etiam referto cibus ventriculo, moxquàm frigidam hauerunt, rugitum, grauitatēque in splene præsentiant, nullo ventriculi aut hepatis percepto fastidio. Nempe venę, quę superiores mediastiquę stomachi partes à liene traiciunt, suis ramis hauriunt illicò maximam liquoris copiā, rapiuntq; in splenis maiores venas, vnde flatus, granitas, murmurilli.

SOLDANELLA Montana.

QVÆ arduis montibus oritur & periclitatoribus Germanis montana Soldanella nuncupatur, celsis Alpibus quæ Inspurgū & Rauispurgū ambiūt, nobis collecta fuit, cum quidā ex illis Theophrastinis æruscatoribus folia decerpta, cuticulāq; summa deglubita ascitico abdomini admoueret, & aquas se educturū citra vllam calfactionem aut tractionem assereret: vulneribus etiam illicò mirificè carnem claudebat, & cicatricem obducebat. Folium crassiusculum & subatringens, amaricante sapore Soldanellæ planè simillimū, vnde nomen, illi autem flos Gentianellæ minoris cæruleus. Audio quibusdā montibus, Auinione noui disitis, magna gliscere copia.



Κρημὴν θαλασσίαν. SOLDANELLA. *Brasica marina.*

Ger. Meerwinde.
Ital. Canolo marino.
Gal. Chon de mer.
Ang. Sea cole.

VULGATISSIMA hæc non modò meridionalibus litoribus maritimis, sed etiam ad Septentrionem Angliæ, Belgiz, & Nortmaniz, abundè prouenit folio Asari minore, crassiore, in viticulis pedalis, & cubitalibus, humi sparsis: flore pulchello, purpurante, Volubilis, nolæ instar. Semine nigro, durin sculo, anguloso, Pæoniz minore. Tota mnceagineo succo prægnat, qui densatus Hydropicis, cum in trò sumptus, tum abdomini admodum, multum commodi præstat, notiore quàm tutiore experimento.

GRAMEN PARNASSI *hederaceum recentiorum.*

PERPYLCHRA herbula, floribus candidis, Ranunculi, venulis fuscis, pallentibus depictis, in viticulis dodrantalibus, semipedem & pedem longis, infernè rubellis, & à medio ad radicem, folia Cochleariz adolescentis, vel Chelidoni minoris aut Hederæ, sed multò minoribus, nitidis, virentibus: radice crassa, teuera, multis fibris rectè depacta, in pratis & vdis pascuis Angliæ ad Oxoniam, Pedemontium, Belgij & Northmaniz: semen in viticulis, subruffum, exile, legebamus per caniculares dies dictos: sapor subdulcis; gramineus, tantillum acrimoniæ prodit: magis congrua descriptioni facie, quàm vsu còperto, gramen Parnasium sanxit hanc herbariorum Germanorum Senatus, Bras von Parnassius vocans.

Φόξα PHTORA *Valdensum & Thora.*

NON insecitè quis inseret huc illam istis persimilem herbulam, quæ passim mòtium Alpiùq; accolis vocatur Thora, interdum nulla adiectione, interdum Valdensium. Etenim multum diuq; venatores illius Alpinæ gentis vti sunt, vti etiamnum multi alij, ad ferarum capturam, quibus solo succo expresso, & spiculis illito certam citamq; parant perniciem, qua namq; hæserit telum, aut vulnus fecerit, subire repentè virus, quo illicò ora vulneris (nisi præcisione antevertant) corrumpuntur, putrescunt: unde Phtora nuncupata, vestigio manifesto de Græcis relicto: quippe φθίσς corruptio, nex, venenum, aut mors. At hi quibus multis periculis notæ sunt vires earum omnium herbarum, quæ vulgo nuncupantur Sagittariæ, cuiusmodi cum multis Aconitis, etiam Hellebori sunt. Hispanis vocati *buena de los abalesfreros*, præter ista est, cæteras propè elumbes & incertas ducunt. Huius verò ineunte Vere ius premitur, atq; vesiculis, aut potius vngulis & cornibus bouillis reconditum emittitur: veni ad emporia finitima, vbi ad vsus annuos venationum sibi comparant ferarum insidiatores, quos vicini Delphinates, Allobrogi, & Prouinciales vocant, *Bessiers vel Lobaiers*. Qui quidem mouere potuissent istum Pseudocommentatorem, ne Pseudoaconitum astrueret, vt quæ funesta dote superet quoduis Aconitum & toxicum. Hanc nos ex montibus Geneuz conterminis primum Italici plerisq; ostendimus: Cardanòq; qui tum primum suo de venenis libro, multam illius mentionem fecerat, neq; dum nouerat, dono tulimus, cù huius antagonista seu hostica antithodo, Antithora etiam vulgò sic dicta. Sesquipalium vix superat caulis, glaber & iunceus, cuius è medio & summo sæpe vnum, raro bina, rarissimè toto caule terna aut quaterna folia oræ circinata, & tantillum cristata: superficiei



glab.

glabra & rigidiuscula non hirsuta, leuore & colore viridante, non nihil ad Cyclamen accedunt, floribus luteis Pentaphylli, Tormentilleve. Radicellis aliquam multis quasi torulis oblongis, in imo exilioribus & acutis: supernè autem quasi nodulo collecti, Alphodeli aut Leucacanthè nostræ similitudine & candore cespitem amplexæ, quasi Cancrì forcipulæ, quod Theophrastus vocat *εγκραμνός*, ab cancrorum pertinacis amplexus imitatione. Cuiusmodi ea quam è cellioribus Sabaudæ Alpibus *val d'Engaigne*, vocant, hic damus, Nam in hortis Mechliniæ cauliculo singulari singulum florem Ranunculi dedit, a mico stirpium perquam studioso Georgio Rienû.

Κυκλάμιος CYCLAMEN folio H edera.

Off. Panis Porcinus.
Ger. *Erdt appfel, Scuwbrut.*
Bel. *Erdt appel.*
Gal. Pain de Pourceau.
Ang. Sowbreds.

INSINuat Cyclamini vox tum folij ambitum circinatum & circulare, tum etiam orbiculatum radicis bulbum, vnde facilis dignotio vulgatoris Officinarum: Nam ex montibus Alpibus Rheticis in Italiam proficiscentibus, locis vdis & saxeis itineribus obuia passim aliæ, quæ non folio circinato vt Afari aut vulgati Cyclaminis est, sed potius triplici mucrone distincto, herbæ Trinitatis aut Hedere Helicis modo. Eadem etiâ Norbong riguis montibus & hortis crebra. Eius radices quæ vetustiores magnitudine alterius sunt: quæ nouellæ aded exiguæ, vt Auellanz magnitudinem vix superent. Adultioribus caulibus promittitur exilis, teneriusculus, & in humum pronus, è quo prælongis pediculis folia surrecta fastigium versus, vbi sunt flores purpurei communis Cyclaminis prorsum similes, purpurei: nonnunquam & luteos Verno tempore exortos nondum folijs emerfis meminimus nobis attulisse commilitones: Florent enim Vere & Autumno interdum odorati, aliis non. Huius vires communi pares, & vsus frequens Norbongibus ad Hispanicam lucem. Doctor Senensis vbi ex Mesuz maiorem & minorem facit, tandem dixit se minorem vidisse solum vno tractu: eam tamen neq; verbo aut iconè docuit. Decuit tamen illum sinere nos scire quænam ista esset radix, & an ab hac nostra differret, quando multa minus vtilia varijs locis inserit.

Aristolochia

Longa.
Rotunda.
Polyrizum Pl. & Gal.
Clematidis.

LONGA vera.

COMPLURES iam sunt anni cum Academia & Pharmacopœi Montpellierenses quatuor Aristolochias notissimas, & vsu receptas habuerint: quas hic propter ardeliones, qui temerè res sibi nec visas, nec auditu cognitæ peruertunt, potius quam produnt, operæ præciû fuerit oratione & iconè perspicuis notiores facere. Ac primû animû huc aduertat vestigator, tantum esse trium, Rotundæ, Longæ & Polyrizæ Pliniaz, folijs, caule & flore similitudinè & parilitatem, vt ne perspicaciori quidè, & exercitati interdum liceat nõ decipi: nã foliis cûctis circinatè rotunditatis, magnitudo ferè mæpar, è caule lento flexili: florib; color partim ex luteo nigricat, forma omnib; eadè, vnde discrimè vel attentius intuenti vix patet inter ipsas tres Aristolochias: æ nisi radix certiore faceret, nullû nõ fallere posset. Id tamè interesse deprehendes, si quando loca vbi omnes magna copia nascuntur, vt toto Narbonensi tractu, Iustris, Pistolochia toto habitu aliquantò minor, neq; folii, neq; florum



florum aut pomorum differentia nulla, uti neq; feminis, radice tantum differunt, quæ Lon-
gæ, forma digiti, cum pusilla, qualè videtur describere Dioscorides, cum verò prosecta,
quadruplò maior, foris colore fusco vel atro, intus flauet Centaurei magni colore.

POLYRHIZO gratior odor multò &
aromaticitas; radix multis fibrosa ca-
pillamentis Hellebori modo, prolixiori-
bus tamen, & flauentibus ex atro. Rotun-
da vtrius perquam similis; verum folia a-
liquantum rotundiora, & nigriora Lon-
gæ Aristolochiæ, non Piftolochiæ, ut pluri-
mò, nam situ mutari possunt & solent: flo-
res itidè, ut folia, obscuriores, & per menses
turgent lagenulæ, nucis moschatæ pares,
semine fusco prægnantes, ad basim com-
presso, & apice donato; ea eadem planè
quæ inter marem Myrsiticam & ferminam
nucis intercedit discrepantia. Rotundæ
autem radix iam valde nota, Italiæ &
Galliæ Norbonensis; sed non periude in
vsum deducta, ac potius Chirurgis, quàm
Medicis, magno sanè dedecore artis, & incommodo egrorum: Quibus commendamus
Indicæ merces, plerumque tempore victas, aut cariolas: hæc autè nostratia recentissima
ignorare non pudet. Tam efficaces quippe sunt Lõga, & Polyrhizon præsertim, ut radices
vtriusque pari momento, partim intro dato, partim in pessario admoto, ellicerint fœ-
tum, iam seculum diu frustra erumpere conatum, fœtusque inuolucra lacerata, enixam
puerperam, tridui cruciatibus penè enecatam: eoque multus omnium vsus apud Mon-
spellienses. Polyrhizæ quidem Aristolochiæ, indicæ Diosc. & incognitæ Commentatori,
radices, in vsum Rondeletius reuocarat, propter plantæ ignarationem iamdiu desitum, &
tamen præferendum reliquis duabus, tum suauis aromaticitate, tum medicata efficaciore
facultate, cuius merito Andromach. & Gale. Theriacis aptiorem præ Rotunda & Longa
præceperant: at vtrunque, de odore & sapore exploranti, multò ignauior comperitur Cle-
matitis, quam falsò tenuem apud antiquos Theriacæ scriptores vocatâ putabant Itali: est
enim ista implexa multis viticulis tenuioribus quàm Alparagi, aut Clematidis alterius
cæruleæ; sed non dissimilibus, qualem in Oliuetis, segetibus siccioribus, nos, comilitonè-
que nostri toties videbamus & eruebamus, quoties Mòspellio Botonetù versus & Castrù
nouum prodeambulatum ibamus. Inibi etiam locis pratensibus & vdis Rotunda luxuri-
at. Longa verò prope rudera cœnobiorum, via quæ Frontignanâ ducit plurima. Proce-
miscoè aded vtrius, item Rotunda & Lõga in pratis ad oppidum Villæ nouæ, ut vix dis-
cernere queas,

*Aristolochia Polyrhizon, sive Piftolo-
chia Planu.*



ROTUNDA.

CLEMATITIS.

No x parum notiotem & frequentiorè Clematidem, tum vineæ plurimam, tum
& arua frigidiora dant in reliqua Gallia, cuncta Italia: deinque Germania, & Flandria
sponte habent: multò proceriore fruticat viriceo sarmento, cubitali; flore luteo, caule cu-
bitali, fructu oblongo, magnitudine parui oui: semine intus lato, radix exilis, odorata.
Huic vires ignauiores ceteris, & vsu obsoletior; præterquam apud omniscios Appollin-
nem & Mathiolum, secutos hæc Pharmacopœorum; qui cum Longam & Polyrhizon
nunquam vidissent, & Italiæ nihil vspiam plantarum deesse à Mathiolo persuasi essent, illi
facile & falsò persuaserunt, Clematidem esse genuinam Longam. Hincque tot morosus
Laurenti Appollinis disquisitiones, qui cum hanc in Biblioteca pictam ex authoribus
frustra quæssisset, & Mathiolo scribenti, prope fossas emergere, fidem habuisset,
illuc illum sequutus, dum venatur, vnâ suo more, in fossas lapsus est. Res ipsa
qui

qui inspectione notas habuerit, & tum mente, tum manu concinnè digerere nouerit, facile ex uoculis perperam ascriptis, sese & lectorem extricabit, & perplexas aceruaciones istorum declamatorum aut ridebit, aut declinabit, nec se rebus, sed sibi res subiiciet.

Pistulochia Fuschij, quam Plinij Capnò esse, nullus iam ambigit, plurimò aberat à Polyrhizo: hincq; licet documentù videre humanè imbecillitatis & satagentiæ, quæ etiam optimum quemq; & veri amantissimum, ut fuit Fuschius & Dodonæus, non rarò transuersum agit: modesta horum tamen potius gratiam, quam censuram merita est. Alioquin vides Pistulochiam à crebra radicum propagine proluxa sic nuncupatâ, & descriptâ. Contra Capno utriq; rotunda vel glomerosa radix: maioris, quanta Castaneæ nux magna, infernè concaua: minoris, nuci auellaneæ par. Fumariz folia latiora, caules, flores, sapor & odor, cætera similia, vnde Capnos: & vides quid profuerit error: etiamnum hodie clinicæ & Chirurgi Batavi isto errore imbuti, ad vermes necan dos, & vulnera vtuntur, non infelici tamen successu.

Ῥορ πορφυρεῶν. *VIOLA purpurea.*

{ *Ger. Blauw Vriël oder Mettizen violen.* *Ang. Violet.*

{ *Bel. Violetten.* *Gall. Violettes de Mars.*

VT ferè prima ortu, sic in prima cõmédatione utilitatis & delictijs inter vernos flores Viola purpurea, sic Græcis vocata ab Io vacca fabulosa, cui pabulo hæc fuerit. Nihil frequentius & vilitatis vbini gentiù, tum officinis, tum plebeis cõmodis, toto vertète anno, foliorum virentium, & florum recentium, Vere præsertim. Eximia namque fragrantia blandiuntur quæ saturiore purpura nigra lucent (flores albæ quippe vbiq; etiam vulgatiores, nullo aut sanè languido, placent odore) ad Cordiales condaturas, Syruposq; & cathartica decerpuntur, vsurpantur, aut siccati umbra seruantur. Nullibi Europæ cultu luculentiores, magnitudine, fragrantia, colore, & prouètu visuntur, quàm Antuerpiæ officinis, quibus parant cæruleum violaceum Syrupum ex pluribus insulis, saccharo addito, Solâ 20. aut 30. dies expositis. Angliæ horti delictijs, ædiumq; ornamento & olfactoriolis alût. Sed semine cassam orbâmvē fecit hanc duplicè vocatam Violam, florum luxus, fraudato feminis genio. Etenim si rursus negligatur, nec frequentius transplantetur, ad ingenium redit, siliquosa, fecundaq; seminis albi, rotundi, pusilli, miliacei, mollioris, medullosi, ad purgandum utilis, sed calculosis vtilissimi.

VARIETAS.

QVAMADMODVM loci & frequentis transmotionis occasione, flores maiores, coloratiores, & semina nulla edit: sic in nemorosis, vmbrosis, frigidarum regionum, qualis Anglia, Belgia, vel calidiorù môtibus arduis, sicuti Vegani & alii Norbonenses môtēs, ramosos cauliculos emittit, sesquipalmares, teneros: & ex interuallis folia oblongiora, altius serrata; siliqua; in tres fissuras dehiscētes, longiores: flores concolores, inodoros: nonnihil tota ortu & positu Violam flammeam imitata. Neq; tamen specie, aut natura diuersa à Martia, ne tantoperè sibi plaudet Cõmentator, qui inuenta Labrusca, insultare videtur Baccho.

VIOLA FLAMMEA, coloris, calida.

{ *Germa. Geerstamkraut.*

{ *Belgiæ. Wensken.*

{ *(ces.*

{ *Gallis. Pensées, aut menues pensées.*

{ *An. Hartys ease, Love in ydle pain.*

Varieta. SICCATORIBVS hortis pratisque siticulosis hæc admodum similis violæ fruticosæ, sed angustioribus, longioribus, laciniosisq; foliis, caulibus quadratis, tenellis, succulentis, reptantibus: florum tricolori variegati elegantia & magnitudine violæ Martiæ æmula. Sedula etiam culturæ opera, nitidiore bicolore purpura, cādore immixto, intermicant flammis violaceisq; foliolis quinis & quaternis, gustu subacris tota est.

SAXIFRAGIA ALBA Chelidonioides.

Ferenda huc est hæc, magis figuræ merito quàm temperamento, aut vi calfaciendi & incidendi suæ, vnde radicem ad calculum laudant, & Saxifragum dicunt, illius enim albæ Scrumosæ & grandiosæ nigre filamentis & fibrillis hærent pendula exigua quasi granula, qualia Chelidonii minoris, fusca & obscure purpurea, acria, amara, à vulgo semina falsò putata, propterea quia obseruarit sese propagare ex aliis atque alius bulbillis, noua sobole succrescente: folia nonnullis ima erumpunt è pallore virentia; in pedicello pilloso, rotunda, cristata, mollia, minora, similia Asarinz aut terrestris Hederæ. Caules etiam villosos, pedales, & sesquipedales, quibus foliola florù nonnulla summatis habent albicantia, Nasturcii quadantenus colore, effigie, aut Erucæ. Magna copia & magni nominis hæc in sterilibus, & sodinis lapidei carbonis, via Bathonensi in Anglia, Belgio etiâ & Northmannia, acceruant mulierculæ gradinosam nondum florētis plantæ radicem, vocantque Saxifragæ semen: peroptimum ex vino vel polline ad calculum pel-lendum, farctusque renum, vterum & visicæ extergendos.

SAXIFRAGIA AVREA Lichomi facie & natali.

Hvis videtur species illa herbula palmaris & perquam similis foliis: sunt enim rotunda, & similiter circinata, crassiuscula, nigriora: sed radix tehellæ prolixioribus & comosis fibris, multos hinc inde cauliculos emittens, in quorum summo flosculi emicant aurei, vnde utriculi semina per maturitatem pandunt hiantes, rotunda, parua, rubella, sapore herbaceo, frigido, insipido, & prorsum eiusdē tum figuræ, tum naturæ, quæ Hepaticæ aquaticæ: qua cum Martio & Maio bellula in Angliæ Northmāniæ & Belgii humentibus aut Lichenis saxeis & parietinis substillijs & manatibus floret. Vsum putarim non aliū quàm Hepaticæ aquaticæ, aut Lichenis.

GARYOPHYLLAT A, sive GEVM Alpinum Recentiorum folio Hederaceo.

NOSTRIS herbariis hanc Alpinam Geum quoddam facientibus, non aduersamur, quia nescimus, sitne potius ad Saxifragas superiores referenda. Folia quippe in imo plura, Hederacea, nonnihil cristata, circinnatione Asarinz, aut Saxifragæ albæ, sed maiora sunt. Caulis è radice geniculata, ex fusco rufosve albicæte, rectus, gracilis, cubitalis, summo ramulis diuisus, & flosculis albis, stellatis onustus: tota nonnihil calefacit, exsiccatque gustu Caryophyllatæ, aut Sanniculæ.



Hedera terrestris, an Chamaecyffos Diosco?
Chamaeleuca, sive Populus pumilla, an Populus, Dorrerbloem, sive
Fraxinum?
Nigra corymbosa communis.
Hedera { *Lutea.*
 { *Alba.*
 { *Hedera Helicæ.*
Cymbalaria Italica hedera folio.
Smilax aspera, non est Sarsaparilla.
Sarsaparilla.
Smilax lenis.

- Scammonium* { *Antiochenum.*
Monspeliacum.
Dragredium.
Helxine Cysampelos.
Volubilis minima.
Campanula Lasiota. *Afrens* sine *caruleus* *conuolulus* *Hederaceus.*
Bryonia { *Alba.*
Nigra.
Verna.
 { *Clematis altera.*
Clematidis altera Varietas.
Flammula.
Lupus salicarius. *Vitis Septentrionalium.*
Vitis vinifera.
Labrusca.
Apocynon.
Periploca repens.
Chymenon. sine *Ciciliana* *Italarum.*
Periclimenon.
Seseli Aethiopicum *Diosc.* folio *hederaceo* ad *Periclimenon* accedens.
Lybanotis Theophr. non est *Aethiopicum* *Seseli.*
Capparis.
Vinca peruinca. sine *Clematis* *Daphnoides.*
Asclepias.
Viscum.
Polygenatum.
Ruscus.
Hippoglosson.
Laurus Alexandrina.

HYMILIS HEDERA, *Hederula*, sine *Chamaecissus*.

Ger. Bundeckrab
An. Alehone.
Beijia. Onder-
haue.

EFFIGIES M, vires, atque nomenclaturam plebeiam vulgaris hederæ terrestris ex-
 pendentis, vix vlla se offert planta quæ æquè scitè quadret *Dioscoridæ* *Chamaecisso-*
 sic dictæ (vt verisimile sit) sicut *Chamepeuce*, *Chamaedris*, *Chamaeciparissus*, & *Chamapi-*
 tis, quia hederam præ se ferret, specie tamè differret, vti facit terrestris *Officinarum* *He-*
dera, quæ amarore & viribus *Dioscoridi* memoratis, ad obstructions discussu perdiffi-
 ciles, nec nõ arthriticos affectus valere, *Barbaræ* praxis crebrum experimentũ testatur.
 Verùm qui malunt litigare quàm inuenire, obliuiscunt folia *Macrotera*, vbi nos *Microte-*
ra (quæ transnotiuncula vnus literulæ frequentissima est) legendum suspicamur. Re-
 spuunt etiam flores *Leucoides* minores: atqui respuerent potius in *Anthrithino*, quem
Violæ *Leucoides* assimilant *Dioscori*. sunt & huius purpurei caliculi filicis flosculis non ita
 dissimilibus. Reliquæq; notæ ad eò suffragantur, vt qui hanc hoc loco excludunt, dum
 nullam siue potiore, siue deteriore sufficiunt herbam, parum gratiæ ineant à rei
Medicæ candidatis, & à nostris *Practicis* merito ambitionis præcipitis in suspensionem ve-
 niunt, Passim abundè hæc prouenit, & noscitur ab omnibus, iuxta fossas & culta, vt *Dio-*
scori. monet. Qui etiam flores candidiores quàm *Albæ* violæ desiderant, minus accura-
 tè vulgatos legisse videntur codices, qui non habent album florem. Nec si *Plinius* *Spica-*
rum *triticæ* florem habet, illicò idcirco sequendus, quando *Dioscorides* nullam facit
 mentionem, & *Plinius* solitus est non paucis in locis permiscere notas, vel audacius *Latine*
 vertere, vt proximo facit capite de *Chamaeleuce*: quem tamen nos lubentius excu-
 samus, quàm inculamus, hoc sæculo alienæ sàmæ vorandæ audissimæ.

CHAMAELLEUCE, sine *Populus pumila*,
 an. *Populus*?

HAnc etiam quænam sit, vix nisi de nomine coniectari licet, adeò ignotis notis prodit Diofcorides: verum si quæ sit vspiam nostris in terris Populum proximè imitata foliis planta, ea erit, quam vulgus Germanorum *Dorsterbloem* vocat, Latini autem, *Farrugum*: qua pratis nihil notius aut frequentius est, vicina, æmula, & conuictrix *Chelidonii* minoris, prope quam collocauimus. Ad renum lumborumque dolores epota mulcere posse, si quidem crassus & statulentis mucoribus sint oppleta, facillè credet, qui gustarit, & nouerit partim vrinæ ciere, partim etiam in alimentum adeò multum & laudatum abire, vt vacce primo Vere pastæ, lac petbonum efficiant, & inficiant. butyrū luteo colore.

Κισσός. *CORTUMBOSA HEDERACEA*: *munis*.

Germania. Ephra. Gallia. Lierre:
{ Belgia. Ceyl. Ang. Iui.

MALITIMUSQ. dictum à texture porosa & spiraculis innumeris setè peritua, quæ vinum transmittit, quale Catoni & Varroni Cissymbion poculū est: quàm à pusionis Citti saltātis in Hederā Poëtica deformatione à Baccho versū, vt fabulant Græci. Κισσός item pumexve, siue potosus lapis, indidem videtur deductū, & vtrumq; ἐπὶ τῷ κισσῷ, siue Cutculione, qui cuspidula, aut acu, potius quàm ore triticum hordeumq; terebrat. Latini ab edendo Hederā dixerunt: Etenim arborū importuna amasia, & veluti assestratrix, cortice rimoso impasta, maceries vetustiores demolitur, & radicatis propagationibus arbores amplexa, enecat & exedit; præsertim illa species quæ maior & arborea vocatur: non item quæ Helix. Nec plures duabus nouit nostra etas differentias genericas: tametsi quamlibet multas dixerit species Diofcorid. quæ fortè melius decernerentur varietates, quales agnoscat quaternas quinæve è duplici specie vulgaris arboreæ, quæ cunctæ genti notissima, virere etiam inuita Bruma solita est: Fronde in imo per initia arcuatis, & semilunatis angulis triquetra, vt sunt Trinitatis herbe dictæ: Vetustiora autem in editionibus viticulis circinata, qualia Cyclaminis: floribus cōgerie muscarii glomerosi exstare defluxis, corymbos botrōsve glomerofos ineunte hyeme maturerescētes, Ligulstro similes, cernere vbique viarum est: itē circa vda, & ripas humentium regionum frigidarū ac temperiorum; nam & calidissimarum impatiens est. Huius multæ varietates sunt, quæ antiquis persuadere potuerunt, vt plures differentias, siue species statuerint: tametsi discrimen è Baccis duntaxat Diofcorides accersat, vti in *Malis*, *Nucibus*, & aliis fructibus vulgò fit.

Arborea Hedera rella.

Quinectiam arborefcit quædam, suapteque stat stipite, nulli innixa pedamento, qualem in syluosis quibusdam Angliæ meminimus, Orthocissum antiqui dicunt. Interdum etiā quibusdam locis xerampelino colore folia nitent. Pisis nobis ostendebant herbarii corymbos cæsi & albicantis coloris. Melinos subfuscis corymbos pleræque plantæ satz in hortis Italicis & Germanicis ex Campania & Apulia, hodie maturant,

Varietas

HELIX, siue prouoluta, sterilis Hedera.

HYMETIS planè hæc minor & infrequētiore cōcittinè vocata Helix fuit, quia secundū sarmentosos funes exerat clauiculas capreolōsve viticeos, qui humi pangūtur, & propagatione quadam quasi in spicas & anfractus prouolūtur: interdum etiam serpendo muscidis truncis & caudicibus aduoluitur gracilioribus sarmentis, folia minora altius triquetro segmēto sinuata, edentibus, planè superioris, sed minora minorisq; vsus: nec enim vel folia huius decerpuntur, vel Gummi vllū officinæ ex hac colligunt: Quin nec fructus quidem villus in ea observatur, vnde sterilis putatur. Verius autem hæc nūcuparetur tettesis Hederæ, quàm illa Barbarorum, nobis paulò ante asserta Chamæcissos Diofco.

CTYMBALARIA Italica, Hederaceo folio.

VENETIS, Patauii, & vicinis pagis passim in ædium parietinis Hederæ, aut Alnes modo dependet istæ, folio sinuato, Hederaceo, mollicello, leui, in flexilibus, exilibus & tenerrimis, capillacis, pedilibus & sesquipedalibus Casisz cauliculis. Flosculi

Z. iij.

luteo.

luteouirentes Elatines, siue Veronicæ fœminæ pares & similes. Illic Pharmacopœi, penuria & ignoratione Cotyledonis veri, miscent Populneo vnguento.


SMILACIS ASPERÆ, & SALSÆPARILLÆ

figura & natura discriminata.

SMILAX ASPERA.

DIFFERT hæc à læui vuis foliis, spinis, radice, floribus, viticulis, atque viribus, denique natalibus. Quippe non nisi montosis & collibus feruidiorum tractuum, Romaniz, Hispaniz, Linguagotiæ, vbi plurima, horridis aduncisq; crebribus spinis, Rubi ritu, implicat mordicus proxima quæque; assurgitq; vltra supraq; parietes & sepes vicinos. Folia Hederacea, longiora, Bryoniz nigre ambitu & superficie: non incisa, sed læuia, & in medio, secundum strias neruulorum, spinulas habentia atrouientia, acinosq; rubros, racematim copiosos, Ribes magnitudine & modo: nec flores dissimiles Ribes vtriusvis racemosi, sed albi. Radices tametsi longius excurrât subter humum, ternis aut quaternis vlnis longiores, non tantæ tamen cum Salsæparilla similitudinis sortitas scimus, quantum hæcenus persuasum doctis quibusdam fuit: qui scriptis mandarunt Salsæparillæ eandem planè esse: cuius tamen conspicuæ intuenti patent, à Smilacis radicibus, differentiz. Siquidem Smilacis geniculatz, articulatis segmentis radices, candidæ, foris nitentes, Graminis carinæ, aut Harundinis valatoni,

SALSA-PALLA.



At Parillæ crebris loris præbissimis; ab vno trunco radices magno, præduro, strumoso rugosisq; capitibus, hinc inde subtus, vt in Asparago, vel Rusco, oriuntur numerosi concolores lori, æquabiles & sine geniculis vel nodis; recti, flexiles, cortice duriusculo, pullo, rugis striato in longitudine, quam vicenum pedum interdum metiti sumus. Intus farinacea medulla, non ita ingrata, sed viscida, nonnihil emplastica, amaricante, nec tamen calorem prodente. Eapropter perspicuum est, non magis esse Smilacis, Rubi, aut Clematidis alteræ Viornæ dictæ, quàm sint Cinnamomi, & nonnulli arbores,
tum

tum Indicæ Orientalis, tum Perunianæ nostræ Laurus : Tametsi hæc possit nonnulla eadem : quæ illa præstare. Neq; si Colutea simillima est Senz, idē continuē eadem astruenda. Sed stipites quos habemus Salsæ, ex eodem radicis prægrandi & capitato nodō lignoso, intus flauescēte, Aristolochiæ rotundæ tuberosæ magnitudine, & colore, exeuntes; pollicē, aut maximum Rubū crassitie superant : sed præduri lignosiq; , crebros nodos admodum extantes circa articulos cōmissuras crebriorum vncialium, frequentiumq; interuallorū, atq; aculeos adūcos deorsum versus nōnihil depressos, rigidos habent, & valdequā Rubū imitantur aspectu, potius quā Smilacē: verū gustu neutiquā astringente, sed fermē insipido, nec vt radicis emplastico: eoque, vt certō scimus, minus efficacis: Folia tamen quidam amici, qui viderant, asserēbāt non admodum abesse ab Smilaceis. Optima habetur quæ plenis medullosisq; est flagellis, solida, cādida intus & habitior, quæque facilius in æquas tota sui longitudine partes diuellitur: huius namque libram semissem plus viciū habere experiuntur, quā alterius strigosæ & gracilioris, nigrioris, decē aut duodecim vncias. Debent tamē institui decoctiones non minoris quantitatis, quā mero. aquæ librarum, ad vncias duas, tres, vel quatuor radicis : non, vt quidam Medicī nostrates scripto imperant, aquæ libra 3. ad vnciā vnam radicū. Citius namq; dissilaret aqua (nisi in diplomate id præceperint) quā radicū vires bulliendo eduxerint: Radicis namque mediū torulus vel corculus, qui lori instar est, durior est, quā vt tapitō vires deponat. Vnde quilibet faciliē percipiet, quā parū comperta sibi ex alienis paginis in suas transferat & posteritati offerat Cōmentator, qui eximii ingenii & Italorū superioribus annis doctissimū Medicū Fallopiū mendaciū insimulat: atque istius de Salsæ-Parillæ, atq; eiusdem sententiæ, admodū incertæ, authore in faciat Guinum suū præceptorē, quem virū auditione, dum Pisis essemus, accepimus tantopere flagrasse rei plantariæ cognitione, vt etiam nihil nō lustrasse montium, nemorum, præruptarūve rupium Hetruscarum, & Tyreno vicinarum insularum, quō minimas qualque herbulas indidē aduectas, nec dum sibi notas, in chartas ipse cōderet, & affabrē pingendas curaret. Quare si fuit illa pluribus abhinc annis Tuscorum Principi allata planta vera Salsæ, (ac nō potius, quod periti nonnulli subolsecerunt, Hispanica Smilax aspera) mirū videtur Philosophici & nobilis animi Principis, princeps Medicos Guinum & alios istā non curasse representandam; saltē illas satis cōpertas, & valde variās notas, quas superius ostendimus,

CONVOLVVLVS maior Plin. Smilax laxis vel lenis.

Volubilis maior vulgi.

VALDE quā laxus Smilacis significatus, qui quasdam cognatas, vel similes alias, tamē admodum discrepantes, & viribus penē cōtrariis pollentes, designat, vt Smilacē, Taxum virosam, asperam Smilacem venenifugam, fraxinū ambigū; demū hanc non valdē certam, vt cuius vtilitatem nullam, sed duntaxat incommodum turbulenti insomniū parere Dioscoridē, autumat : eapropter hanc hic nostro more discussimus consulam significationem, ne vt Plinio, imponat nobis. Quod autē ad Læuē Smilacem istam, vulgō receptam attinet, quia nihil omnino reclamāt: præterquā collatio feminis huius angulosi, cum Lupini rotundo, compresso: quæ sanē ineptior est, quā vt Dioscoridis sit putanda: coniectamur nos voculam *θῆγας* quippiam deprauationis perpeffam, quæ genuinam comparisonem vicariat. Vt si amanuensis quispiam *arri θῆγας*, id est, pro Lupino, & Latino Græcum *ἑσθῶ* faciat : Sic extrito primo elemento, & medio mutato, faciliē potuit *ἑσθῶ* legi: quā suspiciōnē augent verba quæ proximē addita sunt, quæ neutiquā scitē cohererent; hæc nempe. *Semen veluti Lupini paruum & ægriū*. At Lupinū non est paruum: nec nigrum. Saltē quæpiam subest labeclula, cuiusmodi myriades plures expūnq; sunt in authoribus Græcis Theoph. Atheneo, & aliis : & in Galeno nonnullæ: in Paulo & Tralliano complures voces Latine. Eapropter hanc eandem maiorem *Convolvulum* retinendam arbitramur. Est quippe non modō sarmentis viticēis, mollioribus, longissimis, & aptissimis ad fornicatas opacationes: Foliis itē leuibus, hederaceis, aut alterius Cōvoluuli Cissampeli maioribus, mollibus: cetera tū flore, semine, sarmento prorsum Cissampeli nostri, sed maiora: radice item longa, sparsa, flexuosa, sed paucioris lactis, nec comperti cōmodi:

Iafione Theop.

ET hîc fâtorum alumnus conuoluulus, non fociz fegetis, aut sepum: est enim caduca, vite multo minus proluxa, nec proximis adminiculis sefe applicante, ternum & quaternum pedum, reliquis cōuoluulis tenuitate, flexilitate, radice, foliis, semine iisdem, sed purpureo flore dilutior: totus multo minor, neglectus, aut potius inuisus rusticis: tam notus quàm passim obuius.

SCAMMONIVM SYRIACVM, Antiochenum,

& Norbarnense.

PAVCÆ sunt plantæ, quas de facie & facultatibus penitus notas habere, magis intersit boni Medici, aut Pharmacopœi, quàm Scammonium, tam enim commoda hæc laxaria scanforiâq; voluula, (vnde fortè nomen Voluulo fuit) catharticiis medicamentis, & necessaria, vt tametsi nonnulla infamia flagaret, tamen nulladum sit inuenta, cuius vlla pars, succus, vel excrementum, tam pusilla mole tantum cōmodi prestet, aut vt vicaria huic suffici queat. Quò magis nostra ignauia incusanda est, quibus licuisset hanc plantam alere, succumq; illius exprimere, si non multum ad vtendum, saltem quantum sat ad cognoscendum, impostorumq; fraudes detegendum: sicq; cautior & felicior foret Medici opera. At vix hodie millesimus quisque Medicorum plantam vidit, nisi fortè pictam, cuius pluries quàm sæpius millies succo vel lachryma se vsum profitetur. Quare quò dehinc cuilibet sit in procinctu veram & nosse, & alere, orationis ambitu pingenda, quam solo penicillo Cōmentatoris pictor expressit. Anno sexagesimo primo aut secundo supra seculum millesimum, indecessus ille herbarū nouarū vestigator Venetus Pharmacopœus Sequinus Martinellus, ex Syriaco Alepo miserat plusquàm centum libras glebæ Scammonii Antiocheni succi concreti, cui exprimendo interfuerat: conchas etiam non paucas Lachryma plenas, seu Diagredio antiquorū, cum seminibus angulosis Volubilis. Hæc semina tum Patavii & Venetiis primo Vere mādāta, in luculentā Volubilem, seu Voluulū abiēre, adeò sinuosis Smilaceis foliis, triquetris, vel potius Cissampeli, foliis, floribus, & facie, vt planè nostræ Cissampelo eandē dixisses: verum radice insigni fuit, & mole grandem Bryoniz radicem æquante atq; teneritudine simulantē: fors tamen pulla, aut cinerica, intus albidā carne: cuius fîsæ torulus siue cor mediū exemptum, planè idem est, aut simile radici communis & probatoris TURBITH officinarum: verum facilius aliquātō frangitur hæc, tametsi perinde gōmofa succoq; lacteo pregnet, atq; Turbith. Hanc eandē postea Antuerpiæ, quò semen miseramus serendo meminimus, speciosam factam, floribus & viticulis quinum & senum cubitorum, prorsum nihil diuersam, cuius Guilielmus Dries, non minus peritus Pharmacopœus, quàm probus ciuis Antuerpianus, adnata radicemq; pullulationes excisas, exsiccatasq; ostentabat, adeò Turbith Alexandrinum ementita, vt discriminis perparum, aut nihil percipi posset.

Quæ lachryma fuit apud Albertum Martinellum Sequini fratrem, ad Symbolum Angeli, Venetias in Syriacis conchis allata, nō fuit aspectu trisfiori, squallidiorē & cineritio, vt vulgatum Scammonii visitur, sed Colophoniz concolor, cōcretionē similis ex fusco cæruleus erat. Quare non secus differunt quàm Meconium, siue succus expressus, ab Opio, quæ fuit manans liquor, seu lachryma. Sed Scammonii lachryma cinereū habet colorē: Opium flauum & limpidiorem: vtpotè capite, vbi defecator, non ē radice fluens. Verum quia pauca lachryma aut mera, aut hodie vsurpata Europæis vānit, nō enim posset tanto vsui tam paucifatis esse: opera ponēda, vt succi probè teneamus exquisitas notas, & varietates, quò minore mortaliū detrimēto, lōgè maiore emolūmēto eo vtamur purissimo, vel saltē quàm optimè correcto. Nō paucos enim sepè fallit multum, pusillū delectus discrimen. Videas namq; non rarò idem corpus, eadem de morbi causā, & planè eodē modo affectum, aliquot granis sumptis sæpius facili ductu, nullōq; cruciatu bilē, pituitosamq; colluuiem excludere, tum ex eadem prorsum glebā effracto frustillo, multo plura grana


Scammonii descriptio.

data

data minus educere, multum tamen cruciatum ciere; nempè dispar molis concretio alicubi plus, alibi minus, alterius cuiusdā lactis Tithymali, aut Cataputiz accipit: vnde disparilis vacuatio tam sæpè consequitur: si namq; foret purus & merus succus vniuscmodi, nequaquam tantæ dosē essent discrepantiæ, quantas cum antiqui tum hodierni Scammonii animaduertimus: quandoquidē etiā hodie quidā nihil aut parū excernūt scrupulo vel 3. s. quāmplurimū verò minore portiuncula, quia vt plurimum remissū est Scammonium, quæ miscella neutiquam improbāda videtur, vt vociferantur humoristæ Galenici, namq; si est pro eo ac debet, æquabilis atq; correctā, valdequā est vtilis, dū minore & mole & mora educit, anteuertiq; inpressioni caloris, quæ fieri solita est à medicamēti cunctatione: maximā enim nouimus vtilitatē in huius cathartici celeri motu cum delectu: nam sufflōnum Agyrtarūq; vitrū, flores, siue faring stibiq;, impetu & nō discretū humores quoslibet obuios præcipites dant. Tameris vinū purgans ex radicibus Scammonii Dios. parat, & si homini Græco istud demensum solitū, sanè plus purgat aliis additum: sic videmus additum Diaphanici Catholici & aliis, vt succo Rosarum, plus monere, vt Brassica marina Thymalli. Ac nullum Scammonium hodiernum assertor non adulteratū, & tamen fortassis commodius, quā Dioscorideū sincerū, cuius quo si fuit dosis recepta, par est putare alicuius vehementioris succi additione, tantillā quantitatē tantum elficere nunc, etiā nonnulla portione farinz, colophonæ Resinz addita: nimirum resina ad pelluciditatem coloremque raurini glutinis ementiendum: farina verò, vt cuius interuentu resina cum Scammonii lacte aqueo societatem coalitūq; inire queat: lento tum igne rudicula versando quantum plurimum possunt optimè agitant, donec induruerint, coalescerint: quæ in commodæ mixtionis glebam. Cuius dignotio hæc, si non admodum serueat ore, nō multum virus redeat, nec nimium tenax sit terēdo: nam leuitatis albescentis atq; taurini glutinis pelluciditatis hodie vagæ, nec certæ notæ sunt: nullū ferè hodiernū videas Taurino glutini aut Bdellio trāsparens & nitidū, nec lactæ albedinis, sed liuentis & ad czeruleum dilutum quadantenus vergētis. Pharmacopœi è Mesue & Græcis cytonii cauo inditū coquere in clybano addereq; mastichem soliti sunt: minnq; prudēter cytonia abiciunt, quibus trāsmissa vis & potior & delicatior scammonii remanet: Quare dehinc sciant miscendam esse carnem cythonii compositioni, vel isto Venetorum modo parandum, ne maior iustū moles medicamenti instituto officiat. Pulueratū scammonii Lib 1, succo cytoniorū depurato operiunt, leniterque & blandē, non secus atqne Mesues suū de succo rosarū Elect. excoquit, dum induruerit, vbi cautio, ne nimio obruat succo, quò vires scammonii nimis repri mātur, obtusæve penē langueāt, plerūq; plus nocituræ quā profuturæ. Nam Mesue meritū multum succi rosarū Scammonii incoquit, vt quo rerundatur quidem impetus & acuties, sed non deleantur vires à succo Rosæ roborantis & purgatricis.

Monspellienſe SCAMMONIVM.

COMMYNIS Pharmacopœorum consensu Scammonium etiam facit illam Marinam volubilem, copiosissimam toto illo litore & sabuleto, ab vique Rhodani ostio ad Aquas Marianas & Sinum Agarhenſem, cuius succo lacteo concreto, (quo multo tota turget) purgationes moliebantur, sed maiore doſi, minore effectu: quippe succo nihil additū erat, sed coſtione coactus, niger vel fuscus erat. A volubilibus omnium floribus differt flos huius, multos namq; puſillos, ſtellaros, candidos, confertos fert Iunio & Iulio: folia rotūdiora, Afari, breniora, craſſiora, firmiora, latiora, ſuperius albidā, acuta, & baſi ſalcata, nec anguloſa Apocyni, aut Ariſtolo-chiæ ſimilitudine & magnitudine, ex pediculis & loris reptantibus & ſtratis humi viticulis vel piſcatorum attegiis & Tamaricis



aduolutis quaternum quinumve cubitorum: semen angulosum in vtriculo minore quam Aristolochiæ: radix digitum æquat minimum, longo reptatu multum fibrosa, alba, succulenta, veluti reliqua planta.

CONVOLVULVS minimus Spice folius, vel Stachadis citrina, aut Linaria.

RA R I V S inuente hic aliis regionibus quam Galloprovinciæ, Allobrogum, & Norbonæ, ad margines aridos fatorum, & oliuetorum: vbi Iunio, & Iulio florem delictiorem superiore, sed consimilem, vni foliū, angulosum, diluto colore purpurascens; semenque haud dissimile, angulosum, compressum, promit exilibus in viticulis, rectis, crebribus, à radice lignosa, sesquipalmum longa, albida, à qua partim folia, partim à cauliculis sesquipalmum altis, exeruntur, angusta, longa ad Linariam, aut Stachadem citrinam Phiteumamyæ Norbonensē, etiamq; colore & canitie accedentias gustu exsiccante, nonnihil calfaciente.



ASPREVS, sive ceruleus Corniculatus Hederaceus, vel simulacens, ænoticum.

HÆc omnium luis classis rarissima & pulcherrima, nec nisi hortis Italiæ, Galliz, & Belgiæ nota, vbi amœna purpura porrectis attectisq; secus parietes & perticas funibus viticis, gracilibus, vmbacula coccinant, atq; fornices, visu periuicūda: visenda quippe floribus, è pediculorū calyce exeuntibus, lasmini, aut Vincæ peruinæ similibus, sed ora quinis stellatim prominentibus angulis, nolę cæuleæ vel asuræ effigie: vnde *Campana Læsa Italica*. Folia ternis angulis singula, in teneriusculis pediculis, Ciclamen, Hederamve annosam imitata, nonnihil hirsuta: longa & gracilis radix, nulla sui parte in Medicorum commercia venit.

HELXINE CISSAMPELOS.

SI V L Cissampeli nomen, simulque collatio & soluendi effectio, testantur abunde Helxinem esse vnum quempiam Voluulorum lactariorū, passim propter sepes, inter segetes & vites oriundum: vox siquidem ἡλύειν, trahere, hærere, vel arripere significat, viticeam, voluulosamque propaginem, præsertim in Cissampelo, & Hederæ mixta significatio, folia satis representat: Verum cum Voluulorum, plebi Volubilium dictarum, quatuor sint differentiz, mox subdendz, quæ vixdum effigie, viribus, verò neutiquam distinetz hæcenus fuerūt, nobis eam sciendā Cyssampelo, quæ cum eo, quod notis & natalibus magis quadrat, tum etiam præ cæteris euidentius purgat, quam vnam duntaxat facultatem illi reddidit Dioscorides, cui potius assentiendum quam posteris illius duntaxat amanuësis, & exscriptoribus, quos modestiz causa nō nominamus. Scimus igitur Volubilem illam, quæ inter vineta Muschatelina, maritimaque sepes, Thamariscos, prope segetes ad Frontignanam Norbonæ & Lio Venetorum, inter mare & hortos, alibi que passim viticularum prolifixissimis flexilibus sese aduoluit, aluum soluere succo & diluto. Est hæc non diuersa à Volubili vulgari maiore: sed folia aliquantum angustiora, crassiora, dilutè virentia, in exilibus pedicellis & prælongis viticulorum loris, quibus etiam intricat sepes, pendentia: prope quæ, ex iisdem intervallis, sed in aliis pediculis, flores infundibuli, nolæve effigie, à latiore labro ad mucronē ductis, cuius striis, latera nōnihil intrò inflexa, finientibus, candidos, tenues: de cuius imo cætro prodit vtriculus angulosi seminis plenus, Aristolochiz rotundz similis, sed dimidio minoris, Scammonæ Antiochengensis. Succo etiam tota, tum radix, tum folia turgent lacteo. Candida radix, proluxa, fragilis, hoc ille reptans, minimum digitum æquat. Hac plerique impostores Phamacarii, præsertim regionibus

glonibus maritimis, vbi hæc adultior, admixta succo Tithymali Paralii & resinæ Colophoniz, quæ nigricat, cmentuntur Scammonium.

CISSAMPELOS, ALTERA, Atriplicis effigie.

HA NC iamdiu à doctis persuasi, huic tamen aliquantum dissimilem, putaramus legitimam Helxinem: frequens namque amplexibus multis vites arripit, nec secus aut arctat, aut enecat, vel iisdem pabulum surripit, atq; Casynthia. Foliis est hederaceis, oblongis, in angustum Atriplicis facie & modo desinentibus: Flores item Atriplicis albicant racematim: semine triquetro, nigro, Sesami Theoph. sed minore; radice exigua; vbiuis magno prouentu vinetis, frugibus, ac sepibus adnata. Sed de succo vel facultate subducendi alium, nobis ignota, nisi quis Atriplicem putet, eoquæ lubricare posse alium statuatur, multo tamen imbecillior illa maritima certum.

VITIS ALBA, BRYONIA.

Germ. Sticheuueiz, Gallis Couleure, Ang. Bryonia, Wilde vyne & Wilde hoppel.

HA NC nullus dum in dubium vertit, quippe quæ cõmodi plebei & cognitionis semper fuit. Radix loculentæ magnitudinis est, quam auulsam, qui quotannis, vel alternis, deorsum versa basi pangunt, altero tanto crassior em efficiunt, teneram, Raphani colore & concretionem: In viticulis prælongis, teneriusculis, clauiculis multis, obuia quæque præhendentibus, folia vitis, aut Balsamini, incana, flores palliduli, stellati: acini sparsi, rubentes, magnitudinè Asparagorum ferme æquant, succulenti, acriter, vti tota planta: cuius turiones & asparagi pullulantes etiamnum hodie quidam in acetariis esitant. Ischiadicis cataplasmatibus radix peroptima, & Psilotris immixta & cõtusa taurino sanguini, ad Scirros & carcinomata mirum quantum prodest.

*VITIS, vel BRYONIA nigra, Sigillum Mariae;
an Ciclamini altera?*

VE L tacitus plebeius consensus istam vitem esse sciuit, vocauitque nigram Bryoniam, vti ex Dioscoride Galenus & Paulus; cuius tamen quiddam leuioris momenti, vt color rubens in acinis, ac buxeus internus vitibus desit: tamen hederacea folia, Smilacis asperæ quàm si nullima sunt, citra, & sentes flexuosos gyri, viticularum multiplici capreolo, & clauicella proxima quæque amplectente: racemi multis aggesti acinulis, virentibus primulùm, deinde rubellis, demùm vltèrius maturitatis quasi vitæ progressi, ex fusco rubore in fuscèdinem atram vergunt: cætera, vti radix (quæ Bryoniæ magnitudine, figura efficacitate & teneritudine imitatur, foris nigra, intus alba) planè tam vera, quàm vulgo notissima sunt: vbiq; siquidè in Gallia & Germania Syluosis & asperis dumetis, arbores, sepèque scandit, & vis, speciosis, oblongis, floribusque muscosis Labruscæ, vel Oleæ pallentibus conuestit. Comptum est, vel mulierculis, vehementius urinam, renumque sabulum, & mensium saburram, impellere potu: verum Veneris tantoperè incentiuam esse, non perinde assentiuntur quidam Commentatori; quin potius experti eidem conuiciabantur; conuerti lumbos enervare, sanguinem, renèque inflammare, plurisque esse sibi vnam aut alteram Cynaram, quàm incertam & periculosam suam Bryoniam: quàm si propter calorem, Venerem accendere vult, haberet sibi vni; aut Flammula vesceretur, ad sui Satyrii Erithronii vires enervæ suppleudas.

VIORNA FVLGI, fortè Vitis sylvest. Dioscor. & Theoph. Atragani.

NV L loco aptior Viorna vocata Gallis, quæ nusquam non frequens & nota (fortè quia viarum sepes ornat) quàm huic Sarmenta quippe cæteris Clematidibus prolixiora, duriora, crassiora, rugosiora, vitiq; Labruscæ vel Viniieræ Vitis coloris similiora: folia etiã sunt Solani hortensis & maiora, atq; singulis clauiculis quina, quibus lubens obrepit arboribus, atque Hedera æmulatione editiora sulcra scandit, sed interdum ambitu supernè

supernè ferrato ternis aut quaternis dentibus, vt in Solano nonnunquam videntur; quæ laciniata pedem Anserinū vocatum, Atriplicis speciem, tam bellè referunt, vix vt discernatur, sintne Solani an Atriplicis flores radiati, pusilli, conferti, numerosi, albidī, muscosi, & stamineis apiculis oruati, odori, Maio & Iunio: capillaceo tomento cinguntur carptæ lanuginis albidæ leuis, quæ etiam in multam hyemei perdurat, foliis amissis: acini autem complures confertim stipantur ab vno pediculo, apti, rotundi, rubentes ex fusco, compressi tamen: quare nonnulli docti, vbi *σφαίρις* *σφαίρα* legitur, id est, sphaerica figura acinorum vel granorum, *σφαίρις* leuiuscula immutatione & commodiore sensu legi volunt, id est, rotundam compressam figuram. Ac tametsi coniectura hæc nobis non satis animum explet, tamen multo minus respondebunt, amara Dulcis vocata, aut Bryonia nigra quas suis locis commodius & necessariò aptauimus, notis. Alteram scilicet neutquam viticeam, sarmentosamve, rugosam, lignosam, rimosam: illam verò communem, ipsam nigram Bryoniam.

*Atraginis Theo-
phra, vitis Syl.
Diosc. Dalese.*

CLEMATIS peregrina Cærulea purpurea.

NON absimilis est hæc cærulea peregrina nostrati Flammulæ clematidi, ortu & flexu, porrectuque viticularum atque foliorum habitu: sunt tamen maiora, flaccidiora, firmioribus sarmentis, prolixioribusque anfractibus, Viornæ non disparibus Flores aliâs cærulei, aliâs purpurei, ab illius & multorum foliorum figura situi; multū diuersi, expansis quaternis altrinsecus & ex auerso sitis foliis, Pusatillæ effigie & colore, minoribus tamē. Semē & radix Flammulæ. Nuppiam nos vidisse meminimus, nisi in horticorum delitiis: Quin superiore tantum anno Angliz inquilina fuit, floruitque in Morgani orto: vt malè sit illis bambalionibus rizotomis, qui doctissimo Dodonæo hanc passim viarum & agrorum in Angliâ luxuriare persuaferunt.

CLEMATIS altera, vrens, vulgi Flammula.

EClematidum viticearumve generi affinis plantis, nulla est, quæ perinde quadret facie, vel viribus, atque Flammula, plebi sic vocata, quia non secus ac flammeus seruator cuti adpressa, vesicas, crustas, vlceraque inurat: Quin eius est tenuitatis calor, præter multa quæ vrunt, vt spiritū vridū dū digitis fricantur folia, eminus in nares præsertim iaculetur. Cerebrumque & sensus repente magnoperè percellat, quod experiendo notius, quam gratius nobis fuit, tametsi idcirco ad facultatem noscendam adinvento fuit. Quippe seruator ille non in centro, intimisque terreis partibus, sed in leuioribus extimis, indicium faciunt suæ Norbonæ, & alibi, qui hac innoxia, tum viridi, tum siccata, vescuntur etiam estate, saginariique creduntur mulierculis. Quin & succus, & stillatitius liquor primus, quasi è vino flammeus est. Folia multum colore & leuore Peruinæ Clematidæ præferūt: flores item stellati, sed minores, albidī, & pusilli in medio staminibus, vt in Hypericone. Radix ab vno principio multas spargit fibras Hellebori modo: nescio an etiam purgent, vt de semine prodidit Dioscorides, Est autem subfuluum, vel fuscum, rotundum, compressum, in angustum desinens, copiosum, serie quadam & corolla connectum: Norbonæ & Galloprovinciæ spôte & in pratis maritimis humi sparsa, tenera, & humilis visitur, aut fœniceis sale cadit, deficitur quippe fulcris, quibus innitatur: etiâque plurima fruticibus & sepibus innixa, aliisque pedamentis, si quæ nata sit. Belgii & Germani cultiores scita textura hulus, Campanicæ lasuræ, & peregrinæ Clematidis cæruleæ, depactas stirpes frondosasque vites porrigunt, ad parietum fornicumque vmbracula, variegato implexu, reticulatoque, tricoloria. Nec enim minns scandit, nec dissimiles vites habet Ialemio: ne tantilla unicuique raticula à Cômētatore tanto adducta, quispiam deinceps audeat inficiari veram alteram Clematidem esse hanc, cui prætulit Senenlis idem Viornam vix acrem, nedum vrentem, aut vlcérantem.

LIPPVLVS SALICTARIVS, Spontanea.

Lupuli salictarius & vitis Septentrionalium.

Germa.

{ Ger. Hopffen.
Gal. Houblen.
Ang. Hoppes.

QVAMVIS IN antiquorum monumentis non extet hæc, quam coniectamur, nec asserimus à Plinio dictum Lupulum salictarium: tamen quia in Græcia etiamnum hodie vernaculè *βενανίαν* vocari audimus, non abs re hæc saltem de facie Bryonix compamus, nec enim Volubili aut Conuoluntis, vt Commentatori visum est. Cunctis gentibus hæc spontè, ad sepes & margines pratorum humentium educat longa, proluxa sarmenta, hirsuta, tactu aspera, albida, multis clauiculis virgulta & frutices intextentia: fronde multa Bryonix squabriore, aut viti nigræ modo triangula: floribus albidis in oblonga caudata congerie foliaceis, instar glumarum struiculi serie connexarum: semine compresso, pullo, Genistæ, sed minore, contento in illis cellulis, florum membrancis, quas colligunt Augusto & Septembri Septentrionales ad Bieram (potionem omnibus familijs consuetâ) parandam, quæ alia longè est à Dioscoridis & veterum Zytho: cui perperam pauca lectionis & peregrinationis quidam Medici, quos sequutus est Commentator, nomen Biere accomodat, & æquè inscitè Anglicæ Alæ. Quæ vtravis potio suavis & salubris, tam longè abest à Curmi & Zytho, Dioscoridis nouissemis, quam illa acidula potiucula plebeculæ utilissima in Hannonia & Picardia, *Brassim & Bullen* vocata, distat ab aceto: vt tempestius alibi excutiemus.

SATIVA Urbana.

MVNIFICA Phronæa miserta algidiores regiones, eis largita est hanc quasi vitem alterâ, qua quasi vita quapiam suas potiones animarent, & salubriores efficerent. Quare sedulo colunt hanc vulgò virem, depactamq; è syluestri Urbanam fecerunt, iam tot in locis, vt etiam tractus patentissimos vinetorum superent, depactis multis pedamentis & ridicis, quæ tenella clauicula & capreolos fulciant atq; maritè: hæc autè fulcra, quia saligna vt plurimum essent, idèò fortè salictarium vocarant Lupulum: solo humentiore, latiore, pinguiore, radicum fibras inserit hodie Germania, superior præsertim, atque Flandri, Anglia & Northmania, vnde vno aut altero anno post se porrigit viticæ propagines multis anfractibus proluxæ, amplexantes obuia quæque arborum & arbuſtorum, lucosque efficiunt fornicata pulchritudine viscidos: quippe lætior multò tota planta culta euadit, florumque thyrſis foliaceis & squamosis adulationibus, semine item multò maiore. Veluti forent viridimix, quo tempore vua, decerpuntur, & in saccos coguntur ad Bieræ siue Cereuissæ confectionem. Constat hæc hordeo & boni tritici farina: sed longè alio pacto paratis & subactis, quam Dioscoridis Zytho aut Curmi, quibus ex hordeo in aqua tubefacto, nihil Lupuli additur, cuius tamen permixtio plurimum iuuat neruorum & articulorum imbecillitates: tantùm absunt ab improbitate Zythi & Curmi Dioscoridei hæc Cereales potiones. Turiones etiam primulùm erumpentes primo Vere, tum sponte nascentes, tum satiuos, plebecula acetarijs indit: Cichorij sapore, non ingratos, calore temperatos.

VITIS VINIFERA, Syluestris spontaneæ
Oenanthe Labryſca.

{ Ger. Melareb.
Bel. wyngaert.
Gal. Vigne.
Ang. Wynde.

FRVCTVVM FACILE principem utilitate, speciositate, & suauitate, dat vitis à vino dicta, veluti *ῥαπῆλος*, aut *ῥαπῆλος* (quod *ῥαπῆ* fuit) id est, vinea, aut vinifuda vocabatur, eademque originatione *ῥαπῆλα* siue crapula Latinis è Græco manauit.

Nam *οἶνος* vinum olim fuit. Eius autem diuersitates prosequi nullum operæ precium: quando varietatem accipit multiplicem à soli cōditione, mote, & Solis ab æquatoris inclinatione. Neq; enim Aquilonium cœlum fert, aut certè fructum profert immaturum, ferotinum, minimum suauem.

Spontanea nec culta profundit vires infana lasciuia, & in sarmentosam, arboreamq; penè sobolem luxuriat, prolixitate anfractuam, vnde sterilescit, aut minores minusq; lapidas & maturas vnas fert: Qualis in Prouinciæ & Norbonæ maritimis, Gallia Lugdunensi, Italiæque plurima, squallidis agrorum marginibus. Sarmento duriote, cuteq; integitur timosa & villosa, Viornæ, aut satiuæ vitis modo.

DOMESTICA.

DOMESTICÆ autem viti, amputatione & interducatione sarmentorum præstatur ne succus sarmentis & palmitibus impendatur. Eoq; mitiores, maiores, & elegantiores botri sūt, suauiores acini, vberioresq; latice manant. Palmitum decora magis fronde, habitiore, latiore, diuifura Platani aut Aceris.

CORINTHIA *σινε ἀκνηερα vna.*

CORINTHIA quæ vocatur vna, nomen patrum testata, effigie nihil planè differt à communi: Sed algidioreis cœli impatiens, gracilitate tantum racemorū & exilitate acinorum superatur, qui gygartis carēt, suntq; *ακνηερα*, vt quædam mala Granata arillis vacua. Botri enim, siue racemuli ipsi, conflantur acinulis, Piperina aut Săbucina grana æquātibus. Ad topiariorum pergulas & fornices deducūtur hodie in Italicis & Pedemontanis hortis vites huius.

ASCLEPIAS *Victo xicm.*

QUANDO isti morosuli Critici, potius quàm Commentatores, nullum modum carpēdi, immutandi, improbandive aliena placita, faciunt, nostrāq; expectatione & æquanimitate abutuntur, exerceamus dehinc nos met conferendis plantis nobis plenè cognitis, cum antiquorum descriptionibus: innitis illis rigidis censuris, ad quas si vnuersum opus herbariū seuerius exigas, vix ceterisimam quamq; plantam legitimam dicas. Minus verè negant Vicetoxico nostrati deesse Hederæ folia, eaq;ue lōgiora: floremq; graueolentem: quos potuit docere vel inspectio meræ picturæ, quæ folia hederacea præfert: vel Dioscoridis etiam lectio, qui Periclymenum & Ethiopicum Seseh Hederæ folijs committit: additq; quantitatis dementionem, nempe longam, Periclymeni modo: & idem hic Hedera cœa facit, sed lōgiora. Stirpi aut pictæ, aut chartis affixæ, si odorem negāt, sortè assentior, sin florenti in montibus, dicam esse illi narem obefam, aut nunquam virentem visam. Tametsi tædet tot repetitionū de odoris incremētis & amissione variis in locis & plantis. Infirmum enim argumentū, quādo multa apertiora & potiora suppetūt. Quippe Vicetoxico vulgus præcantantiū nomen scisse à dote qua aduersum deleteria pollet, verisimile: vt i & Asclepias nomine tanti Medici nobilitata propter consimilē facultatem videtur. Radix porò huius innumeris sermē capillamentis fibrata, caules flexiles, vimineos, leues, sesquicubitum prolixos, edit. Folia quidē Hederæ rigida, ex atro virentia, sed aliquātō longiora, & quasi super nē mucronata: florem exiguum candicantem, odoris grauis, ingrati, quibus succrescūt oblongæ, teretes, Rhododēdri aut Apocyni persimiles filiquæ, semen subfuluum, Sefami aut Apocyni, lanugine obuolutum cohībentes, Apocyni ritu. Huius radice vsi primū periclitatores, cum aduersus venena, tum ad vlcera, magnū sibi & plantæ nomen pepererunt. Neq; posterī potuerunt pōstea adduci, quin pro Asclepiade agnoscerent & vterentur. Siquidem illis etiam natalitijs, nempe montibus aut aridis collibus, præsertim Narbonæ & ad Ligures Taurinos propè fruticat.

Sane Dioſco. APOCYNVM, Periploca Græca,
folijs latioribus hederaceis.

QVOD canes interimeret eſu, & πικρὺν, voce concifa, quaſi canicidam, dixerunt. Cuius deſcriptioni ſtudioſi poterunt conferre duas non minus raras, quàm elegantes & appriinè quadrantes plantas, quas Patavii iamdū etiamquē nou multis ab hinc annis in Piſano publico virore videre meminimus, & adhuc dono ſeruamus à Medico longè peritiſſimo Andrea Acroaria Cifaipino. Earum vtriq̃ue nomen Periploca erat. Altera fuit flexilibus ſurculis vimineis, gracilibus, leuibus, pediculos vtrinque habentibus, longiſculos & exiles, in quibus folia Hederacea, molliora, viridantia, læua, reſidentia, & quàm Vicetoxici rotundiora, nonnihil in ſummo acuminata: flores tenues candidi muſcoſi Valeriani; aut Drabę inter folia exeruntur: ſuccedentibus Auguſto menſe ſiliquis corniculatis, mucronatis, rectis, Aſclepiadis maioribus, claudentibus ſemen nigrius depreſſum, pappoſa lanugine obductum. Succus ſauet ſcit, ingratus, &, vti tota planta, viroſus videtur. Hæcſi cani nex ſit deuorata, Apocynum eſſe (& huius ſore antidotum Vicetoxicum) valde probabile eſt. Certum nos exploratumquē habemus iam diu, ſaltem alijs venenſi à cane deuoratis antipharmacū fuiſſe: vti Thorę Anthora, & Paridię herba Pardaliancis, ſunt.

APOCYNVM

PERIPLOCA ſerpens, anguſtior Periclymeni ſubo.

ALTERA verò Periploca repens vocata, prolixioribus & lenioribus viminibus ſerpit, variisquē flexibus arripit & amplectitur obuioſi caudices, Periclymeni modo. Folija vtrinque ex aduerſo bina, Periclymeni potiùs, quàm Hederę æmula, ſed apice vt Vicetoxicū donata. Flores in horto Piſano dudum deſluerant, dum inibi ſiliquas intueremur: quæ ſolertiore connexionione mutuis erant coniunctę quaſi roſtris, vna eſt floris baſi, ſeu calatho, vtrinque repandę, ſummis & imis infertę mucronibus, Rhododendri quadantenus in morem.

PERIPLOCA
serpens.

CLYMENON Italorum, ſive Siciliam, non eſt Androſemum.

{ Gallis. Toute ſaine.
{ Ang. Tuiſan.

AMBIGVI animi & ſententię in Clymeno videntur fuiſſe antiqui nonnulli celebriores, Galenus, Ægineta, & alii: qui eius hiftoriam & mentionem quaſi nullam, aut incertam, taciti prætereſcunt. Ac iam tum Plinii ſuo variabat deſcriptio & confuſa ex Clymeno & Periclymeno, alia Græcis, aliaquē Latinis erat. Quò minus nobis lubitum fuit proſus aquaticam Betoniam, eiùſve affinem Scrophulariam, verum Clymenū aſſeuerare, tametiſi vtriuſque nec facies ita diſpar, & vires neutiquam ſint appellatione Clymeni indigne. Quippe ſunt hæ non minus vulgatiſ Chirurgerum præconijs nobilitatę, atque planta Clymenum, Regiſ Clymeni cognomine. Verùm non minus inclito nomine fuit donanda ea, quam vulgi Gallici conſenſus Toute ſaine (quaſi Panaces omnibus remedia ſetens affectibus) vocat. Sępervirens hæc, virgis exit vimineis, ſanguineis, nitentibus, rectis, flexilibus, nonnihil anguloſis, aut ſecundum longitudinē ſtriatſ, Periclymeno, ſeu Matriculę concoloribus, & perquàm ſimilibus. Etiamquē folia bina ex intervalis, auerſa, cania, ſuperne ſaturato virore, niultum ſimilia, niſi quia eſt geniculis emicant, nec, vti illa, virgis traiciuntur, eoque puſillis intervalis, binis per eadem ſpatia foliolis, Androſemum reſerunt: verùm non perinde ſanguineum cruorem vel fundunt, vel allinunt aſtriſta chartę, vti diſtū in Androſemō vero: flores lutei nō diſſimiles ſunt, & baculę primū rubrę, deinde nigrę, cruore nitente, purpureo, & ſeminibus minutis, ſuſcis, turgide. Radix forſ ſuſca, intus alba, lignoſa, fragilis, pedem & ſeſquipedem longa: guſtanti reſinoſa, ſententiſ expers, nec tota planta ingrata, nonnihil gummi Elemni, aut trifolij odorati ſapit: moderatè aſtringit digerendo, & deſiccet, pauxilla, aut pulſa calſactione, Vulnerarijs remedijs, Baſſamſ, adeoque potionibus & oleis nata, vſu

A a. ij.

mul.

mentionem fecit Dioscorides vsus tamen, tum potiusculis, tum catapotijs valdè tutus: fo-
ris verò exploratè vilitatis ad eò nouimus, vt è penitioribus sinubus collectum pos, trans
spatia musculorum & densas cartilagineas eliciat. Est namq; epipalticum nulli secundù,
vt quis experiri potest, què iuuabit vires nosce Emplastri viscini, ab Scribonio Largo lau-
dati.

πολύγωνος. POLYGONVM maius.

Ang. White roots, or cely feale.	Bel. Salomons segel.
Offi. Sigillum Salomonis.	Gall. Signet de Salomon.
Ger. Weiss wurtz.	Ital. Ginechieta.

NOMINIS argumentù radix, geniculis còpluribus pyxidatim còsertis, Rusci modo
protuberàs, digitù minimi crassitie æquàs, in hui: quæ vagatur cespitè summo, mul-
tum fibrosa, cādore pellucid, marmoreo, Alabastrindis radicis aspectu, gustu insuauì dul-
cedine, substringente. Caules emittit rectos, rotundos, cubitales, virides, quos folia ambi-
unt Lilij conuallij, vel Bufolij, vel Lauri Alexandrinæ, Ellebori albi modo, liris vel rigis re-
ctis venosa: è quorum emissu pedicelli prodeunt: flores Vhedonis, seu Arbuti dicti, ex can-
dore herbidì, Lilij conuallium longiores: quibus excussis, Maio & Iunio, bacçe virides, de-
inde nigre subnascuntur, Corrudæ aut Ligulrì.

μυρρινάριον Myrthacantha RUSCVS.

Marina spina, sine Myrtus sylvestris.	Ital. Pongitopi.
Ger. Bruosch, aut Myrsebaum.	Ged. Baule.
Hisp. Iusfatzba, & Gilbarbera.	Ang. Becher's Brwme.

TAMETSÌ Myrthum humilem, syluestrem, & aculeatam vocarunt Ruscum antiqui,
quasi eiusdem naturæ, vt figuræ erat prorsum simillimæ: tamen dissete inter se indole
& natalibus certum est, cum ad Septentrionem populis sponte nascatur Myrthus:
Ruscus autem calidis & frigidis peræquè multa scateat, facie solijsq; planè Myrtheis, sed
rigidioribus, minoratissq; supernè, quibus medijs ritu Cocci baphicæ hæret singulis bac-
cæ singula, ruberrimæ, duriores, maiorèsq; quàm Asparagi, nucleo ossa planè duritia, vix-
q; vili trangenti idèi cedente. Floribus pusillis, in fruticantibus multa soboles virgii, præ-
duris, bicubitalibus, & tricubitalibus, rectis, striatis, viuacissimis, vt & radices, quæ quàm-
plurimos annos perennant, succrescente quotànus noua Asparagorum simillima turionù
propagine: aromatica, alitquantum amara, viscerum & ductuum farctui vñtatissima, nec
secus ac in officinis Asparagi vsurpari solita, vel Bonifaciæ, cui nò parum similis. Semen e-
tiam miscetur eodè scopò Benedicte laxatiuæ & Litontribis.

LAVRI ALEXANDRINÆ Dioscor. (qua Theophrasto Rusci folia

ἐν πύλλωρα καὶ, sine superfluo bacceferu, vocatur) cum HIPPO-

GLOSSO sive LIGVLATA discernunt.

ALIAM esse Alexandrinam Laurum ab Hippoglossò, cuius in promptu est de Theo-
phrasto & Dioscoride nosce: quippe fentum sine baccam coccineam medijs in solijs
hære, nullius ligulæ sãda mentione, vterq; asserit: folliq; molliora, maiora, & albidiora
quàm Rusci inesse Lauro huic, Dioscorides subdit, virèsq; diuersas reddit, & radice maio-
rem, molliorem, odoratam.

HIPPOGLOSSVM.

AT Hippoglossi siue Lingulæ radix minor, gracilior, breuior: folium tenue, parvù, cui
medio quasi cano aliud foliolum, lingulæ instar, insitum: aculeo rigido, infesto, mucro-
natum vtrūque, inter quæ baccula etiã rubra Rusci visitur, suspiciendo naturæ, propter ra-
ritatem, opere. Quare versionem Plinianam legenti, satis liquet diuersas esse plñtas, le-
ctionemq; Hippoglossi luxatam fuisse. Namq; sic Plinius:

HIPPOGLOSSA folia habet sylvestris Myrthi, non coccinea, spinosa, & in his, seu lingulas,
folio paruo quasi exsertum de folijs. Vbi videtur legisse non κόκκη, sed καὶ κόκκη, id est, non co-
cinea, sed coccia folia, siue inflexa cuiusmodi planè sũt omnia nostratis Bilinguæ siue Bonifa-
ciæ: hortis iãdian satis notæ, & viribus ad calculù dyssuriãq; eximijs celebris: presertim spòte

Al. iij.

nal.

Ger. sapffitruet
& anckbladt,
rub jungen
blatt.
Bel. Tongen
blad.
Ang. Double
tong.

nascentis, montosis, saxosisq; & asperis, incultis, Genus, portus Lunæ, Saonæ, Nicæ, alijsq; Alpibus sterilibus calidiorum tractuum.

Math. Laurus
Alexan. com-
mentitia.

Senilis noster, quæ ingenij est opulentiæ & liberalitate, ubi cæteri scriptores putarant descriptionem, nomelaturamq; geminam esse, duntaxat vnus & eisdem plantæ, non solum dedit, vt par fuit, Bonifaciam pro Hippoglossio, sed insuper duas scitissimè equidem cõmentatus fuit. Alteri nempe affixis affabrè ligulis, quàm posita pudentior factus, delendam curauit: Alteri datis in petiolis longis baccis, quàm Sigillum Salomonis meritò suspicatur, in illumq; quasi impostorem ignarum debacchantur mososuli isti critici, quod toties, totq; annos, cum versaret hæc quisquiliæ, tandem non animaduertit Theophrasto & Dioscor. Lauro medijs in folijs fructum, non in peciolis, inesse: sed illam demptam, quasi foret à se fictam commentarijs penultimis, commodiorem multò fuisse: quippe cui similior est ea, quàm quidam herbarum penitissimi in hortos colunt, & veram affigunt Alexandrinam Laurum.

Cucurbitæ.

Cucumis satiuus esculentus.

Cucumis flexuosus sive Anguinus.

Melo sive Cucumis antiquorum, Dioscor. Melo pepo.

eius varietates.

Citrullus officinarum, Anguria sua Batracia, semine nigro Alicenna, an

Pepones oblongi, quales vulgatiissimi.

(MELOPEPO)

eiusdem varietates.

Cucurbita varietates. { *longioria maior.*
minor.

eiusq; varietates.

Colocynthis.

Cucumis Elæstii Sylvestris.

Momordica, Balsamida.

Doronici, quoru noster est ACONITUM Perlebæobes.

Doronicæ varietates.

Xylon.

Minia.

eius varietates.

Barnia.

Syda Thomph.

Aburylon.

Athæa.

Athæa arbor.

Alcea.

Alcea Kenta.

Gerania.

Pes Leonis sive Alchimilla.

Senicula.

Epipactis.

Ranunculi.

Ranunculus flore albo.

Ranunculus gramineus.

Flammula.

Aconita. { *Lutans.*

Napelli. { *Lycotomum.*

Musca Napelli.

Anisora.

videndum moderatis ingenijs. Qui norint non vulgari moderatione & certa prudentia illius quantum licuit lapidibus vno loco tam multis occurrere conatum: Cum enim per opinionem tui fiduciam, tum etiam emuncte cognitionis, quam illis de se iamdiu excitarat, licuisset (illi si lubuisset) nō solum picturis mendolis, sed etiam verbis subdolis persuadere, picturis tamē cōtentus fuit, & silentio suae dignitati consuluit. Si qua tamen vltus est vasculā inuersionis, est illa leuius ferenda: Non enim nouerat aptiores: aut si norat, se tantoperē deceptum fateri, eius dignitatis non erat. Igitur quas potuit, dono puta emendicatas, ideo nec recens animā duersas, aut descriptas, in paginas congestas: eius pictor, perperā quidē illas omnes censitas, sed tamen earum vnam feruē correctam istam, quae est Sefeli Aethiopicū verum: cuius effigiem mutuatus fuit à Dodonēo Medico multum exercitato.

Ea Saxeis illis deuexis Masilex & maritimis,* tum etiā ad Cœti montis celsi radices, qua in Lacū vergit, fruticat vberi prouentu Julio & Augusto valde quā spectatu elegans, multis prouenit virgulis rectis, ligneis, nigricantibus, rigidis, binos ternosve cubitos altis, in varios surculos diductis, folia crassa, rigida, & leuore viridantia, vt Hederae, figura oblonga, propior Periclymeno promētibus. Luculētas, in sumis gerit umbellae, luteis florib* anethi, quas semē stipae fuscum, oblongum, coriosum, foeniculi maius: non solum semē, sed etiam vniuersus frutex gustanti aromatis saporem acrem, medicatum, & subamarū, sed gratum imprimit, suauemq; odorem spirat à summo ad imā vsq; radicem, quae lignosa est. Eximiae vis est huius semen, cuius copiam misimus amicis Veneris & Lugdunensibus ad Theriacem, quod etiā, vt Dioscorides inuit Masiliēsi multo odoratus & efficacius est. Quod



Sefeli, si vt pictum in Dodonēo, ita viuum in agro vidisset Cōmentator, lubens & volens suffecisset in locum illius plantae, cui videtur postposuisse: est enim illa non frutex, sed herba, quam Recentiores Libanotidem Theophrasti prodiderunt, viribus & figura aliena ab hoc Aethiopico, quem fruticem, adeoque magnum, Dioscoridis correctior codex statuit esse.

CAPPAIRES.

{ Ger. Kappien.
 { Hyb. Alcapparas.
 { Ang. Kapper.
 { Gall. Cappres.

FRUTICATURI in ora Thyrrhenici maris, Norbonēsi, & Hispanica Capparis vberi prouentu. Eadē hortis iamdiu innotuit, & fortis priuquam in florem se pandat, aut perdat, decerpitus, & muria conditus magno semper vsu fuit. Flos ei candidus inest, Rose aut Mali Cotonae: & semen in siliqua oblonga rufum Milij Panicis, medicamentis vtile. Ma-

CUCURBITÆ Sychia. Succba. Σικυς.

TANTA est Cucurbitarum, Cucumerum, & Poponum inter se cognatio, vt antiqui Græci & Latini, nedum recentiores, minus accuratè nomenclaturas discuerint. Euthydemus siquidem in oleraceo libro Syciam Indicam nominat Colocyntidem: puta post Hippocratem: cui vt etiam Theophrasto videtur, quamlibet varietatem & differentiam genericam horum fructuum *σικυδων* vox signare, *σικυ* namq; bullire est, vnde *σικυς*, quæ vas, ollam, & pyxidem significat, & sanguisugum vitreum, aut cornu instrumentum: indeq; fortè Latinis Cucurbita, tametsi Varroni à curuando dicta putetur. Aristoteles etiam Sicyas pepones appellat: & Galenus Pepocucumerem. Quare quò facilius percipiuntur & discernantur ab inuicem, quæ hodie in vsum culinariū & medicatum venerunt, genera cuncta non incommodè *σικυας*, vel Cucumeres, vocamus: quarum duos summa fastigia sint Curcubitæ & Melopepones, varia nomina adepta, propter fructuum, foliorumq; varietatem.

CUCUMERES SATIVI & Esculenti.

German. Cucumern.
Gallia. Concombre.
Belgia. Concommeren.
Angl. Cucumbers.

NOTISSIMI sunt, tum Meridionalium, tum Septentrionalium hortis Cucumeres, qui & suauissimi esu & frequentissimi, præsertim crudi, aut muria conditi, dum adhuc sunt tenelli, merito habentur. Foliis hispida, scabris, viridatibus, similibus Brioniæ, aut Vitis: maioribus, minoribus Bardanæ & Petalidissiflores ex luteo pallent liliacei, coniuuētque noctu, aut marcescunt, Volubilis ritu: reptantibus multis vitibus & clauiculis, proxima quæque implicantibus, fructumq; dant teretem, semipedalē, oblongū, cortice teneriore, maculoso, ex obscuro virore in flauum maturescēte, interdum spinulis molliusculis, asperato, & leuiter secundum longitudinem canaliculato, vel fulcato: semine referto albo, Melonis adeò simili, vt neuiquam, nisi quia angustius, & pusillo apiculo subtus protenso donatus est, discrepet: medulla lactescente, admodum suauis, & multi vsus Officinis, non item Cullinis.

CUCUMIS flexuosus, siue ANGVINVS.

RARIOR hic, & nisi in hortis herbariorum infrequens, prorsum simillimus superiori Cucumeri, flagellis, flore, foliis, & clauiculis, fructu autem faciliè discernitur, & agnoscitur, qui incurua fragilitate anguinum flexum, & longitudinem & crassitiem æquat; vnde nomen: tenera cute, nitore herbido;

MELO vulgi, siue Cucumis Antiquorum, Dioscoridis MELOPEPO,

German. { Melonen. } Gallia & { Melons, }
& Bel. { Angli. }

ILLIS affinitate foliorum, florum, & fructus proximus hic, simillimo etiam, vt diximus; semine, incluso tamen in globosum fructum, magisque ventriosum, & secundum longitudinem altioribus liris, & torulis sulcatū. Cortice duriore, nōnihil hirsuto, rugoso, pullo, vel cinereo. Carne fulua, sapore & odore mellito, vel saccharato, cuiusmodi in gulz delitiis crudos suauissimos habet vniuersa Italia, Galloprovincia, Norbonensisq; & Vastonica, Gallia, Hispania: estantur cum pauco sale & pane Iulio & Augusto. Cæteris regionibus ad Boream, vt Franciæ, Belgio, & Angliæ, ægrè aut insipidiore proveniunt, nec plerumque maturitate assequuntur, præ imbrium copia, & caloris inopia. Semen etiam vnum officinarum habetur, inter quatuor maiora vocata, primæ commendationis, & frequentioris vsus,

Varietas

Varietas pepomum, magnitudinis, coloris, & odoris. } Est quippe species quædam Moschatelina, quæ vix Colocynthisdem, aut Aratium superat, odore Moschi, sapore delicatissimo.

} Est & altera cortice carnæque alba : sapore etiam per-
iucundo.

VEl hoc vno argumento quilibet asseruerit Melones nostros, siue vulgi Italici Pepones, esse antiquorum (præsertim Dioscoridis) domesticum Cucumerem, siue Sicyam fatiuam, quia odore eximie fragrantis, & cytonii mali, aut pomorum redolentium, æmulo, restaret vires languidas & resiciat, spiritusque dissipatos reuocet animo lapsis: vt idẽ Dioscorides author est: eoque Melones, quasi Pomosi, merito vocati fuerunt à recentioribus Græcis, quod ori ac stomacho cibis sint gratissimus, omnium huius generis.

CITRULLVS Officinarius, Anguria } *san. Melopepo.*
siue Batecha Auicenna semine nigro

FMITATVR etiã Citrullus maiore aliquẽ Melonẽ effigie & carne solidiore, fragili: sed sapore vescendoque magis Pepones vulgatos refert: vn de Melopeponẽ istũ nomenclatura, vt ancipitis naturæ, dictũ de vtroque: mixta putamus, nẽpe Mali, siue Melonis circinnata rotunditate, non tamẽ torulis sulcata, & sapore magis Peponem, quàm Melonis dulcedinẽ melleam referente: quibus etiã, monente Galeno, discernitur à Melone. Seinẽ verò vnum è quatuor vocatis maioribus est; maius Melonis, minus Peponis, durior cortice septum, nigro, omnium durissimo: alioqui tota planta similis Peponum plantæ, sed foliis altioribus, laciniis Colocynthidi propriis. Seritur etiam & manditur caro cocta vel cruda, & plerisque Pedemontis Italiæque hortis enascitur.

salutis nouis. CUCUMERES Peponisve oblongi, siue onates,
vulgatissimi.

HORTORVM ruraliũ nullus Pepone isto notissimo vacat, eosdẽ vocatque cuncta Germania & Anglia Pepones magnos, admodum Meloni, vel Citrullo similes: flexuoso flagellorum, sed prociore reptatu, foliis latioribus, profunda Citrulli lacinosi que diuisura, flore maiore, fructu tereti, oblongo, oui struthii similis, maiore multò, flauo interdum, interdum & albicante cortice obducte. Semen Citrullo latius immersum carnilutæ, quæ hyeme super aut subter camino fumoque arefcunt, iis que tenuis sortis plebecula vescitur.

COMPRESSI rotundi, Melonis effigie.

VARIANT verò folio minori minisque inciso, alioqui simili, nec dispari flore, aut fructu, rotundo, compresso, Melonis effigie, nonnihil itẽ orbiculatim striato. Cortice delicatior, glauco, vel albidio, nitente. Semine albo Citrulli.

Varietas

LATIORES Clypeiformes.

NIHIL prorsum dissimilem in ramis & foliis alterum horti alunt fructum latiore, rotundo Galeri specie, aut Clypei vmbilicati, & ambitu rimoso, atque plicis fimbriis que rugoso cortice: delicato & concolori superiori, nec diuersi saporis à superiore. Vtrumque in talcolas scissos, frictosque in sartagine, & farina aspersos, suaves admodum mandunt, in Belgio, Gallia, & alibi.

STRYMOSVS.

PERLEGANS hic & rarus, foliis alloquin ficulneis proximis, fructu Melonem magnum æquante, sed Limunia mala exprimente, tuberosoque cortice, papillatim variegato: speciosa item tricolori strumarum bullatione. Semine non dissimili,

CV.

ADMODVM verisimile sit, Zucchæ nomē (sic enim Italicè vocant Cucurbitam deprauatis elementis) *συκία*, aut *συκία* (vtroq; enim modo scribunt nonnulli Græci) designare: nam *συκία*, vnde etiā ficus Latinis derivatur, generalissima fuit appellatio Cucurbitarum, Cucumerum, & Meloepopum, vt superius monuimus.

Quare Cucumerinæ familiæ maximæ vocari possunt Cucurbitæ, & commodiore etymologiam à curuando deducī, quasi curbando, vt loquuntur Vascones & Pyrenæi. Notissima & condituris aptissima, quæ anguina vocatur, omnium maxima, in arcum flexa, ternum seminumq; pedum longitudinis, cute polita, albida ex viridi, testaq; duriore quum arida fuerit. Carne alba, elixa non ingrata. Semine longo, lato, nonnihil quadrato. Folio Cucumeris rotundiore, minore, flore albo, in flexilibus caducisq; humi loris & capreolis, topiarias ridiculas & pedamenta implicantibus. Hæc maxima copia in taleolas longas dissectâ, saccharoq; conditam, Lusitani Hispaniq; adferunt venum in Septentrionem, vocantq; Carbafade. Siticulosi & æstu febrili vexatis gratissimæ officulæ sunt.

LAGENARIA.

LAGENARIAM vocamus, vt qua peregrè proficiscentes lagena vtuntur, præsertim in Gallijs, Hispanijs & Italia: commodius namq; gestatur vinum quam vitreo aut figlino vase, quæ oneri sunt & facilius franguntur. Semen illi minus quàm superioris: folium alioquin, flores, & reliqua non disparia.

Varietas.

LAGENARIA maior.

AB illa tantum differt fructu minore, lagenulamq; concinniorem exprimente, eoque lubentius commodiusq; gestatur itinerantibus. Semine, folio, & flore, delicatiore, non diuerso.

COLOCYNTHIS, sine Cucurbitula amara, Cathartica.

Ger. Coloquint Orffleim.
Bel. Quint appel.
Ang. Coloquintida.

QUIA consimili esset facie, sed multò minor tota, Cucurbitulam & *συκία* siue Cucumerulum vocarunt Hippocrates & Ægineta, ducti potius foliorum aspectu, quàm planè contrarijs facultatibus, qui bns insigniter pollet & documento est, sub ipsdem foliorum florūq; lineamentis, cognatarum specierum plerumq; esse perquam dissimiles vires: quæ quò melius innotescant, plantæ ipsæ sunt iuxta se ponendæ, & describendæ, vt frequenti intuendi in eas consuetudine & experiendi, periri earum euadamus. Idcircoq; vti superius semper, sic & hic nos hunc Cucumerē, & aliū agrestem vocatū, suis gentilibus subdemus. Hanc serūt Herbarum voluptatis studiosi Vere, in Gallia, Germania, & Angliā, fructūq; decerpunt Septembri, sed sublauum, virentem, virosūq; nec purgationibus perinde aptum, vt ea quæ ex Græcia Hispaniq; deferuntur Poma siue Cucurbitæ, excerpunt cortice flauescente candidè & fungosè, læuique concretionem, amarore viroso & exuperanti, & horrendo, fauces viscera intestinaq; lædente. Ortū & natalitijs lumentibus pendè Cucumeris satiui par, sed folio minore magisque lacinioso, ad Citrullum accedēte, luteolis nec diuersis floribus. Semen item simile, sed minus, durius, penèque lignum est, nō tanta virulētia ad purgandū, quàm caro ipsa siue medulla: dedimus namque multò maiorem dosim quàm medullæ, maiore commodo, nullo aut longè minore tumultu.

Satz Colocynthis in hortis Batavis, Gallicis, & Italis, vidimus triplicis aut quadruplicis varietatis: fructum nempe pusillæ Cucurbitæ aut Pyri & lagenulæ effigie, ex fusco viridante: cortice nonnihil maculis variegato, reliqua foliorum facie Cucumerem syluestre referente: tetterimi etiam saporis tota hæc est: videturque Syluestris spontēve nascentis ea species, quam mortem, siue exitium in cacabo, vocabant quæribundi Prophetæ illi, qui apud

pud Eliseum fame pressi, cum multi degerent, & cibum caperent, iussuq; esset quidam incoquere pulmento olera, collectam magnam huius copiam, ratus esse Cucurbitam esculentam, ollæ indidit: Illi verò vt esitare cœperunt, amarorem iustum, quasi mortē detecti sunt: nec porro vorare poruerunt, tū ad Prophetam protinus exclamare, & *Mors*, inquit, *Diuine aff. in cacabo nec possumus vesci*. Vates autem Eliseus miraculis potens, frētusq; multis, farinā adiectā pulmentum Colocynthidāq; sylvestres dulcorauit, edendoque cōmodas reddidit: quare oportuit esse amarissimas.

Meminimus etiam exactē sphericæ, maximum Arancium aut Citrium, vocatum Adami Pomum, æquiparantes, etiam nonnihil variegato cortice.

Videas & nonnisi quæ compressæ rotunditatis, subflauæ corticis, quarum omnium eadem vires, & ditus amaror.

Sæpissimè pusilli, Peponis oblongi effigie, ouum asserinū aut olorum equantes, corticis durioris, ex viridi in atro & cinereo maculati sunt.

CUCUMER Elaterij syl.

{ Ger. Wilde Cucumer.

{ Gal. Concombre sauage.

{ Ang. Noli me tangere, & Wilde Cucumber.

NO immeritò Cucumerem agrestem vocarunt hunc, potius quàm Asinū aut syluestre: quia omniū huius generis plātarum, suapte spontē importunōq; admodū prouentu oriatur circa vrbium mœnia, areas, & stabulorum fimeta, in Italia, & Norbonensi, Prouincialique Gallia, vbi vel puerulis notissimus, qui fructum turgentem vix dum tactū digitis ludibundi in faciem inuicē elidunt semine, succoque peramaro & viroso os oculōsq; perfundunt. Repens & humilis, non topiaria est, tota Cucumeris satui effigie, minoribus folijs, magisque scabris, & crassioribus, cineritijs, ab imo densè fruticantium caulium teneriorum, succulentorum: quibus exeunte estare, post flore luteos, pallescentes, Cucumeruli in pediculis per intervalla insunt, pruni instar oblongi, hispidi, cinerei, coloris quædamtenus Papaueris gemmantis glomerulos imitantes. Semine pullo colore, vel cinereo, nigricante, Colocynthidis non dissimili, sed minore: radice crassa, Raphani aut Bryoniz, aliquid fibrosa. Medulla candida minus quàm fructus, aut folia, ingrata: quæ præsertim Sole siccata, flammis admota, tota deflagrat vrendo. Vnde primū nobis coniectura fuit ex Plinio, monente etiam Præceptore accuratissimi iudicii Rondelletio, ELATERIUM verum ex hac plurima, & pauca ei hærente mucagine medullosa, non ex ipsi Cucumerulis parandum esse. Perquàm celebre fuit antiquis Catharticum, vt de Hippocrate & Theophrasto liquet, Elaterium, quasi dicas exagitans turbāfveciens medicamentum: vehementer namque superi nē, inferoq; alui citabat, pusilla dosi, nempe oboli, vel scrupuli, semisse, per se, vel adiecto salis altero tanto, & Stibij, quod colorando satis esset. Proberrimum fuit, læue, non asperum, nec ponderosum, sed album, nec aridum, vel exsuctum, vehementer amarum, & lucernæ obiectum facillè flagrans. Quæ notæ lectori plantarū consulto, non rixandi, sed cognoscendi cupido, facillè retegunt planè peruiam huius loci in Theophrasto & Dioscoride salebrosi intellectionem: cum namq; ex Cucumerulis istis succus effluat admodū tenuis, viridis, aqueus, igneq; densatus inæqualis, nigricās, ac obiectus lumini neutiquam flammam alēs, paucisq; annis mucidus putrisq; futurus, verisimile nobis fuit, vel Theophrasti, vel Dioscoridis Elateriū dici nō posse, tū propter illa omnia iam quæ diximus, reprobi inditia, tum quia nec durat, nec flagrat. Quare ipsi superiorib' annis cum in Gallia Norbonensi parassetur Dioscoridis & Theophrasti instituto, curasse mūsque: parādum multis modis: tandē maximā Cucumerulū copiam colligendā curauimus, & quibus super cribro incisus, seminis tuss, & crebrō manibus pressi, medullam siue mucaginē Psilij similē subter cribrum transmissam excepimus, Cucumerulorum eorūdem succo affuso, & aquæ sonanæ nonnihil, quod facilius gluten remitteret trans cribrū: istud partim Soli sub dio expositū nigricans habuimus, partim verò igne aut sub cineribus exsiccatū, albidū, & pullū. Vtrumq; tamen lucernæ admotū ætutū flammam dabat & alebat sua pinguedine: quin etiam, quale nobis adhuc in museo longè aridum superest, facilius

lius vret, cuiusmodi nunquam poterit parari ex sola Cucumerulorum aqua, mucosâve carne, vt probè norant qui sæpius periculum fecerunt. Eapropter Plinius videtur ceteris melius & verius ex Theophrasto, aut quopiam alio classico auctore, ad Dioscoridis sententiam accessisse, quum ex fructu & semine faciendum censet: nimirum vt obiectum flammæ flagret, quale optimum tradit Dioscorides: quem suum ducem ignauè hic deserit Senensis commentator, & insulse suggillare videtur, dum contentiosas textit ambages autoritatum farragine. Sanè par est, quo diximus modo, cominodius tutiusque purgare, adeoque diutius non putre durare quia acris virulentusque succus medulla pingui seminis retunditur & mitescit, nec perinde (quâ oleaginosum pingue) putrefcit: *M.* tior etiam vis in semine, & par ratio, quæ in Colocynthide. Radice huius multum vtuntur practici Monspellenses, cuius efficacitatem deprehendas ex vnguento Agrippæ, Ciclamini, & aliis etiam internis, vt Anasarca & Ascite.

BALSAMINA Cucumerina, Punicea.

COGNATA facie Cucumerino generi est prægregrinè venustatis Balsamina vocata Herbariis, qui eam in hortis colunt, vnde voluptatem & vtilitatem capiant ad vulnera glutinanda: dolorisque vlcera prauis humoris inulcendos Balsamo artificioso, ex pomis Charantiis confusis vel oleo bullitis parato, indidemque ipsa tota planta Balsamina & Charautia fortè dicta, propter gratiam elegantis effigiaturæ & coloris pomorum, quæ magnitudine & effigie vtrinque in conum fastigiata, medio ventriosa, Limoniū paruum imitantur, sed superficie carneque nitentis purpure pluenicæ: pusillis, & crebribus spinosis bullis, quadantenus Oportii, siue Ficus Indicæ dictæ Semine Citrulli, nigro, minore. Folia, farinosa, facies, & clauiculæ topiariis ornamentis aptissima, Bryoniam & Cucumerem imitantur; sed aspectu hilariore, folioque Vitis altioribus inclisuris. Floribus pusillis, minoribus Melonis, ex luteo in pallidum languentibus. Hortis calidiorum regionum adultior multo, & fructu maturiore frequentiorque est.

*DORONICI variis nostrates, quorum nullus est ACONITUM
PARDALIANCHES.*

MULTARVM Stirpium (fortè & Pharmacorum) nomen vnum fuit Aconitum: vt cuius succo, vel radice, quasi cote, spicula à venatoribus afficta, & subacta, celerius & subirent & perniciem adferrent. Aptior enim hæc nomenclaturæ interpretatio venit, quàm si è cautibus, aut è pago cognomine deducas: tamen non nesci sumus posse etiam ἀπὸ τῆς ἀκοντίου deduci: quemadmodum τὸ τοῦ ἀπὸ τῆς τοῦ βασιλ. non à Taxo dictum putamus. Sic enim in Cyri Pzdia Xenophon: ὅτι γὰρ τοῖς τέλει, ὅτι ἀκοντίου ἀποτόπου ἵμας. Non enim, inquit, iaculari, aut in hominem collimare vobis integrum facimus, quippe nefas: ἀλλὰ δὲ, quasi diceret, εὐχρη, feram, puta ceruam, aut damam. Cùm itaque inter multas lethales, essent compertæ hæc celeritine & certissimæ intercessionis, Theophrasto, Diosco. & aliis proditæ seorsim & distinctæ à cæteris sunt, tamen minus plenè, aut perspicuè: etenim, qui mos fuit sæculo illi, flores tacuere & alia multa, quæ non viderant, sed fortè legerant: idcirco stirpibus ipsis in aspectum iudiciumque adductis, nobis aliquid certi statuendum. Quales radices in Pharmacariis tabernis proflare vides Doronici nomine, nos non raro easdem meminimus erutas integræ plantæ in montibus etiamque collibus Pedemontanis. Ex triplici in differentia sunt, tamen non ita disita: nonnullis enim Franciæ collibus cæteris minores, minusque fibrosas radices hæc inuenias, nec appendiculis vtrinque, quasi brachiis seu Cancelli forcipiculis donatas, sed crebribus. Est itè duodecimus ferme annus, cùm quidā Risotomi Lutetiam indeque Antuerpiam quasdam plantas Doronici iam tum creditas, ex quibusdam Franciæ collibus erutas in hortos aduexerunt. Pusillæ erant totæ, caules teneri, folia mollicella, oblonga, vt Plâtaginis: non nihil ex viridi flauentia cõspicue, hirsuta, Pilosellæ modo, vel Cucumeris agrestis, sed attrectanti læuia, ambitu rotundo, sed

Doronicum.

nōnihil lacinioso & supernē angusto, Cucumeri agresti, quā Cyclaminis familiore, ter-
na vel quaterna, pediculis innatis radici exigue, tereti, orbiculatē, sed infernē in angustū
sensim adductū, subter & transversis quasi squamularum torulis articulatē, apprimē scor-
pionis cadauerulum & caudicellam exprimenti, pluseulis donatē fibris: color candidus,
sapor dulcis, amaricat, & lentorem multum pauxille coniunctū alitricioni præfert: ses-
quipalmum altus caulis, floribus in summo donatur luteolis, aut pallidis, radiatis, Buph-
thalmi, aut Mediæ consolidæ. Frequens hæc nunc in hortis Belgicis & Anglis, ac
prorsus eadem Doronico vulgatori. & minori Pharmacopœis dicto, apud quos cum
aliis sæpē, tum præsertim cum hæc meditemur, inter hæc radices duas alias Doro-
nici differentias obseruabamus. Alteram hac maiorem longioremque multo, pluri-
bus corticeis squamulis, nitentibus, candidis, marmoreis, transversim cinctam,
cui ala utrinque apta vna est, Squillæ marinæ, Cancellivæ, aut Scorpii forcipulis non
absumilis, dulcicula gustanti. Folia, florisque, & caulis, maiora paulo & rotundiora. Um-
brosus hæc montibus oblectatur, non solum Alpibus ad Meridiem, sed etiam rigidissi-
mis Angliæ ad Septentriones, vbi sibi visam & lectam in Northombriz arduis asse-
ruit nobis amicus multæ lectionis & peregrinationis pereruditus Medicus Pennius
Anglus.

*Varietas tertia
Doronici.*

PRIOR propior tertia est, si prorsus eadem sit etiam suffragio Herbariorū, qui ma-
gnitudine duntaxat distare aiunt: nam hic multus collibus nemorosis Taurini &
Allobrogum, tum ruri, tum domi oriundus, est folio hirsutior: flore & radice maior:
caulis sesquicubitalis: alioqui similes inter se sunt adeo hæc tres, vt Cyperorum ritu
discrepent, magnitudine tantū, situ, & numerosa foliolis propagine. Iam nequiquam
opus sit multa disquisitione ad statuendum, ecquid sit discriminis inter Theophrasti,
Dioscoridis, Plinii, & aliorum, Pardalianchen, Theliphonum, aut Cāmorum: quæ nomi-
na vnius huius plantæ diuersa putamus: nec videmus vlla insigni distinctione mere-
ri genericam differentiam: facies enim, sapor, odor, omnibus idem, itemque ferè nata-
les. Sed tamē paulum quid variat Diosc. de radice delineatio, quippe caudæ hic, Theo-
phrastus verò cadaueri toti cōfert. Id nō continuò alius generis stirpem astruit: sed ean-
dem brachiorum aut alarum expertē, vt sæpius orbata, quā eis dē donata vultur. Nec
dubium quin mutuatus sit ex Theophrasto, vel uterque de alio quopiam scriptore:
nam quæ de uocamentis & effectionibus prodita essent, vt lecta, non explorata, sub-
dunt. Plinianum non esse idem insciari eius interest, qui non meminit, pleraque
omnia in Stirpium historia illum accepta ferè Theophrasto. Ecquid loci sit isti com-
mento Pardalianche relictum, dicent consultissimi & stirpium exploratores indefessi I-
talorum doctissimi, qui nullum vspiciam sibi visum, vel auditiōne cognitum pleri-

*Pistum Parda-
lianche somnii*

Alpium & cautium, nemorum, & montium, perpetuo illo dorso à Lemano Clauenam,
indēq; ad Veronæ Baldiū: de uexa, nusquam tamen cōparuisse. Nostratis interim Doro-
nici plurimū diuersis locis obuium habuisse: eoque nobis tametsi inuitis suadebant
istum Senensem commentatorem, cui imposuisset, hæc leuiuscula, quam supra agno-
uimus, differentia, quasi vnam quampiam nouam & sui generis sanxisse. Indicio es-
se, quoties curauit recudenda illa commenta, toties variatam Iconem: nec nisi v-
nam misellam, caule florique mutilam, semel carthæ mancipatam, tot vbique gen-
tium vestigatoribus sedulis repertam fuisse, Historiæ fidem item temeratam audacia, vt
qui nullo periculo facto (nec enim potuit) illicò decreuerit Pardalianchen. Quo vero
fastu, astu, & palpo magni nominis eruditus inculcet illud, *Palpate & videte*, quoniam
Machiolum non scribit mendacia, se ridere & mirari: fore tamen iam, vt senior eoque
moderator factus, fateatur se lapsū, lug: atq; Doronici, sibi ignotū antea, quod sceles-
te nefas, illi Æsculapio Cortusio primū innotuerit, & per illum mortalium generi sit re-
tectum. Quod maleficiū eum nostræ memoriæ plerique notum esse sciuissemus, &
Cortusio in hortulo suo Patauī inter colloquendū respondiissemus, id verū quidē esse,
ceterū minimē mirum: vt qui experimento certum haberemus, Aloe saluberrima in-
terfici vulpes, caedemque enectas amygdalis amaris ex Plutarcho meminissimus, annuit
ille

ille Italicè cuidam compatri suo Pharmacopœo, qui vulgatum exemplum de nuce vomica subdidit, ea nempe feles, canes, auesq; interimi, quæ tamen tuto à magno commodo aduersus lethifera & Epidimicos morbos in Eleſtuarijs Liberâtiſ, datur homini. Immeritò proinde Doronicum verbo diro dum infame facit, quàm multum ſciet, & parum ſaperet, perſpicuum facit: Dzinones quippe ſœlices vocari, vel monachi norunt, qui Cacodemonæ hand atrociori conuiſio inſeſſunt, quàm ille Doronicum è republica Medicorum exigere nititur. Tantullam rem, tam valdè vulgatam, captum ſuperâſſe tanti Commentatoris, ſtupet vulgus, qui Philomeliſ, Alaudis, Hirudinibus, alijsq; delicatioribus auiculis non ſolùm nō noceat, ſed interdum cibis, ſep̃ſſimè remedium vnicum & pächraſton ſit. Quā multis tu Principibus, nos pauperibus, Doronici ignorance, exitio fuiſſemus: quantam ſtragem plus quingentis abhinc annis dediſſent Medici, ſreti eleſtuarijs de Gemmis & aromatibus & alijs Cordi amicis, quibus frequentiffimè vſi ſunt, tēq; monere poſſunt, Doronico ne tantoperè conuiſiētiſ, ſed potius doſim metiaris: alioqui Croci, Moſchi, ſimiliumq; dato quaternūm drachmarum demenſum homini, & comperies Dymonium tuū. Quin thus etiā, multò quibuſdā minore mole, meminimus perniciē attuliſſe. Tantæ expectationis Commētatoris intererat, ſaltē hac poſtrema Commētatorum manu & mole, an Pardaliāche eodē necaret modo, quo cætera Aconita, exquirere: quippe ſi nominis etymō & ſeriem Symptomatum perpendas, videtur, aut ſola (aut certè comite veneno) ſtrāgulatione, id patrare iquemadmodum fungi, pappoſaq; excrementa Typhæ & Caninarum, quæ belluiſ, præſertim ſiccis & anguſtiſ meatibus, nec ruminantibus, ſi cum eſca pauca multum conſertim vorarint, mortē moliūtur ſuffocādo. Quin non ſemel audiuiſſus venatores affirmātes, ſe fruſtrā dediſſe Napellum, Helleborum, & alia toxica, à feris ſtatim vomitu reiecta: at vbi pauxillū Taxi addidiſſent, prorfum nullū animal euadere, quippe nauſcare, ſed euomere nihil. Pereunt igitur partim veneno, partim ocluſo ſpiritu, puta ad fauces, tracheam, & diaphragma: plerumq; etiam euomere bilem, mucum, cibum, veneni autē nihil, niſi ob ſiccitatem, ſerò aut perparum. Non igitur reſpuemus nos Doronicum, ſed vtemur moderatē: ſi non vt aromate, ſaltem liceat nobis vt Theriaca & antidoto quapiam: cuiuſmodi inſtituiſſe vides in Degemmis Meſue, & aromatu Eleſtuario, celebres Medicos, quos temerè inſcitiz & ſceleris reos facis. Sed hæc inſius paulò mox, in Paride & Napelli muſcis, non muribus tuiſ, quos multi æquē cattī herbarij, atq; te non minus ſagaces, nequicquam venati ſunt. Iſtæ dudum deſcriptæ radices, à nobis Aconita cenſitæ, vt omnes cōgeneres, ſic ſapore penè eodē ſūt, nēpè ignauiore ſubdulci, & emplaſtico. Quò magis adducimur, vt credamus Dioſcoridiſ legitimā eſſe Adoniniſ, quippe aſcēſet ille, oculorū ſcilicet remedijs blandiſ temperatiſq; calore & craſſi nonnihil, emplaſtica, pauxilla aſtriſtione, digerēte,

Dira Mathiæ.

ξύλον ή γοσσίπιον. GOSSIPIVM ſive Xylon
Bombax.

Ger. Baumwoll.
Ang. }
Gal. & } Cotton.
Belg. }
Ital. Bombace.

QVEMADMODVM ſedulitate Europæorum factum eſt, vt ſericum ſit iam valdè plebeium & paſſim emolumentum ex eo multum ſentiat, ſic Goffipiū priſciſ ſermè ignotum, aded creuit noſtro æuo, vt ex tractibus & inſulis Arabicis iam non opus ſit petere: multis enim mediterraneis littoribus alitur, & venum inde deuehitur. Vidimus Patavij & Venetijs, aliquot abhinc annis in Treuiſani & publico horto fruticantē cubitum altū caulē, aliquot ſurculia & petiolis cinctū. In quibus folia Alceæ aut Vitiſ, ſed minora, molliora, incana. Flores lutei, nōnihil in medio purpuraſcētes, nonnīſq; relinquunt, aut potius mala exigua, pullo colore, Ariſtolochiæ rotūdæ magnitudine & ritu radiatim hiātiā, dūq; maturerūt bombace reſerta ambiēte intus, ſemē terebinthi aut Cubebe oblōgū, copioſū,

Bb, ij.

medulla

medulla plenū alba, oleaginoſa, non inſuaui guſtu, Pinez, aut Amygdalarū, præfertim dum recens eſt. Exigua radice, fibroſa, alimenti perboni: pulmonum & thoracis congeſtam materiam ad excludendum & detergendum apta: hepati & renibus amica, ſtomacho haud perinde, aut capiti. Dyſentericis etiam opitulari nouimus, eoque lubenter voluiſſemus quoddam hanc Dioſcoridis facere Gnaphalium, aut huius ſpeciem, & per deſcriptionem licebat: mollia namque & incana ſunt folia, vſus in tomenta optimus. Verum Theophraſti poſtea loco moniti, ad illius lanigeras vites referendam agnouimus. Sic enim ille: *Infulam eſt Tylem (qualem hodie narrant navigationes) non illum quidem algidum & cymeriam Septentrionalem, in ſinu Arabico ad Orientem, ſericeum arborum, aliarumque multarum ſtirpium lanationem, quibus ſolum in eſt vitis, ſed minus. Et fruſtu quidem orbam, (intelligit veſco) νίπρον δὲ ὅστις φέρει (legendum νίπρον) & hinc expungendum ſignum, & porro legendum ἐν τῷ φέρει in quo lanugo. Eundemque fructum parem eſſe pomo verno occluſo, maturo verbō pomo, euelli eximiſque lanuginem, qua texunt veſtes, partim eximias, partim plebeias. Eaſdemque plantas in India & Arabia oriri, vbi etiam eaſdem Plinius recenset, tametſi ſoliorum non meminit. Et, qui mos illi vertendi, paulum variat, aut aliunde mutatus fuit: Senenſis verò tantus veſtigator negat vſpiam factam huius mentionē à Græcis antiquis, nec tamen iſtum luculentum adduxit locum: alioquin velitationum ex Manardo, Braſſauola, Ruelio, & Fuſchio importunus meruſque interpolator & proxeneta: ſed impoſuit illi verſio Gazzæ, quæ videtur innuere (negleſta diſiunctione) Xylon arborem eſſe: atqui ne deinceps riſui ſit criticis iſtis, qui illum ne Latinè quidem, nedū Græcè ſcire inciuiſiter negant, adeat Græcum codicem Theophraſti, & diſcet non arbores ſolū, ſed etiam communi nomine ſtirpes, lanigeras inibi memoratas.*

Apricis maritimis ad Auſtrum iam multis, prouenit ſemine: quod ſuillo aut vaccino ſtercore triduum macerari olitores Candiotæ aſſerebant nobis. Sic enim vberius & felicius enaſci, nempe celerius emergit, copioſiusque fert, anteuertitque frigoris tyrannidem, & ſequitiâ. Sic enim induſtrij plerique omnes herbarij, etiam minus tepido & commodo cælo plantæ vel moroſiſſimas aſſueſciant cied & uberè ferendo.

Sylueſtris MALVA vulgaris procerior.

{ Ger. Pappel.
 { Bd. Malwe ende heekens cruyt.
 { Gal. Maulue.
 { Ang. Mallow.

CVILIBET genti notius nihil, aut vtilius Malua, appellationem ob præcipuam emolliendi vim aſſequuta: Græcè enim μάλακκ eſt: quam cultu teueriorem & ſuauiore ſapore frugi antiquitas in hortis efficiebat, famemque ea explebat quotidiano olere, & ventrem mollebat, vt feſtiuè dicit Poeta: *Exoneraturas ventrem mihi villica Maluas Attulit.* Etiamnū hodie primo Vere vnā cūm Aſparagi pullulationibus plebecula in agro colligit, & eſtat eius turiones teneros: nam hortis exulare, iamdiu iuſſit luxuſ ipſam, & officinis vtendam reliquit quotidiano ad varios morbos præſidio: vbiq; viarum & arearum propè vrbes luxuriat, caulium teneriorum flexili ſobole: folijs quā plurimis, craſſiuſculis, ambitu nōnihil lacinioſis, viridantibus, circinatis, partim & initio, partim & poſtea anguloſis: flores tota æſtate particulatim exeunt, colore ſubpunicante & ex purpureo pallidi: edentes clypeolos aut orbiculos ſeminum: radice puſilla, longa, digitum æquante, lignoſiore.

MALVA Sylueſtris.

MINVS copioſa, quæ puſilla viſitur Sylueſtris, ramulis repens minoribus, propè rudera, & inculta pagorum, minore folio, rotundiore, minutius crenato, radice penè parti ſuperioris, floſculis purpurantibus, albicantibus, vtilitate aut facultate non diuerſa.

MALVA arborea Sylueſtris.

EVENIT huic Malug quod Ficilici Sedo Arundini, atq; alijs non paucis plâtis, vt etiâ nô culta arboreâ proceritate, duratione, & ramorû magnitudine assequatur. Etenim quâ meminimus in cœnobio D. Spiritus prope Venetias, & alijs locis maritimis Thyrenæ oræ, pò procul Saona & Arbenga sponte adultas, Perficam arbusculam æquabat, altitudine & crassitie stipitis, qui ramis sparsis, frondis lzuore, virore, imò toto flore, semine, & facie Maluam testabatur: sed crassiores totam & habitiores, qualem Gallo Belgiz, Angliz, & Germaniz horti hodie colunt, qua driennium, quinquenniumq; edurantem, lignosiorè prægrandi radice, & solido trunco, duritie lignea, senum & octonum cubitorû, facultate non diuersa à Malua vulgari: nec tamen olitorum industria, vt falsò Senensis arbitratur, sed solo nativo debet: hanc differentiam specificam, è natalibus manifestum sit: nec enim vulgaris Malua stûdib, aut fortuito in holeraceis hortis culta, vsqiâ vîsî, tur arborescere, aut tot hyeme trunco perennare.

MALVA ROSEA FRUTICOSA, aî Galeni

Anadenromalache?

German. Ein Rosen und herbstrosß.
 Belgis. Winterroosen,
 Ang. Haly hocke.

QVÆ autem floris Rosei elegancia & similitudine à Septentrionalibus vocantur Winter roosen, id est, hyemalis rose, vel Malux roseæ, videntur ex equo cû Althea istis Maluis cognatæ: quippe foliorû & cauliculorû incana superficie, molliore, mucagineaq; radice Altheam referunt, ambitu verò Ficulneo, aut Maluaceo, & scapo arborescentem Maluam penè assequuntur, sed Althææ positu & modo oriuntur, quotannis etiâ moriuntur, radice denuò primo Vere sese propagante, culmósq; edente ternum & quaternû cubitorum: secundum quos serotini prodeunt Augusto flores, magnitudine, effigie, & elegantia tricolori Rosam ipsam prouocâtes. Trifarû enim variat hortis Septentrionalibus flos, qui multiplicior, confertiorq; foliorum serie struâli euadit, vt plurimum Fœoniz, punice saturè concolor: Sed cãdidus non rarò: interdû dilutè rubet, aut vtrîsq; confusus coloratur. Semen illi etiam similis, sed grandius, Althææ: cuius loco vtuntur plerique, nec enim etiam radicû huius dispar facultas ab Althæa: quare esse hæc Galeni Anadenromalachen certius quis affirmet, quàm arboream superius adductam,

ALTHÆA IBISCVS.

German. Ibisß,
 Gallis. Guimalues.
 Belgis. Witte huenß, & witte Malne,
 Ang. Marsh Maluwe.

RIË medicatricè vel medicâ vocarunt Græci hanc, vt quæ sit certissimi & ferè ingentis commodi ad quàmplurimos affectus morbosos: è Syluestrium Maluarum familia, sicuti etiam monet Dioscorid. esse, cuiuslibet primò intuenti fatis ostendunt folia Maluacea, lenia, sed oblongiora, incana, nonnihil tomentacea ad Populneam frondem accedentia: flores albidiores, & semina prorsum syluestris Malux: radice tamen multò habitiore, carnosiore, tota mucagine prægnat, & in multas fibras digiti crassitie diuincatur, ac prætensibus maritimis lubentius sponte propagatur, nec ferè alibi quàm in afflatu maritimo: idcirco afferunt quidam Pharmacopœi auillas radices è maritimis, & procul transmotas in hortos in Maluâ vulgarem abire. Medici & exercitatoriles Veneti Pharmacopœi, è mucagine radicis, ad tennes in pulmones defluxiones, offulas, morsellos vocatos, diuisculos ex saccharo excoquunt, vsque mouendo, ne vrantur, nec enim cuiusvis eû, propter lentorem, benè parare.

*ALTHEA arborea Olbia
in Galloprovinc.*

NON secus atque Malua Arborefcens à vulgari, differt hæc ab Althea cõmuni: sed paucioribus locis, & feruidio: re czlo (quale in maritimis Galloprovinc. ad Olbiam) prouentu tanto fruticat, vt ad sepes constituendas sat sit. Mul to autem solidiore scapo est, quàm Malua arborea, Salignæ quasi concrectionis, inque arboream texturam fermè verso: flos item Maluæ vulgaris, aut Altheæ, nec dispar semen: quod in Morgani hortis Londini satum, hac æstate plantam ipsam pepet it minas incanam, aut hirsutam, minùsque speciosam: tantum abest vt cultu aut mangonio arboream euasisset quis argutetur: perdurat etiam hic in Septentrione aliquot hyemes, nisi solitò sint fruioræ.



Althea palustris, Cytini flore, Aristolochia utriculis, SIDA Theophrasti putatur.

RARIOR & perelegãs Maluacea hæc. Altheis generica habenda certè est, eademque non abs re à quibusdam doctissimis SIDA Theop excusmata, cui quidè, vt si quæ alia, exactè æquiparatur. Nam SIDA Græcis dicta fuit à flore Balaustio concolori, nec abfimili, qualem venustum imprimis ostendit hæc planta, florere solita in locis riguis, lacustribus agri Ferrariensis, inter Patauium & Eridanum flumen. Radix hortensis Maluæ: caulis cubitorum duorum. Folia Altheæ, sed oblongiora, lacinis acutioribus. Flos illi purpureus, satior Peoniz, aut Maluæ fatiuz, aut Cytini inxta & in summis cauliculis videntur tempore vindemiarum utriculi rotundi, oblongi, phæo vel pullo colore, Aristolochiæ effigie, pregnantés semine Smirni, aut Milii colore & magnitudine.



LYTEIS floribus Altheæ, ex Theophr. Ibisens, & Auctenna Abutilon?

*Senensis videtur
foliaceæ Abu-
tuli inuolucrum
Sida appinxisse,
& Abutilon pu-
sasse Icon 926.*

NEc huius quidem vlla apud Dioscorid. mentio, cum tamen plurima occurrat in humetibus viarum marginibus, præsertim propè Ferrariam Bononia redeunti: flos- culis Iunio & Iulio luteis, Potëtillæ aut Altheæ Venetæ, per Augustum & Septembrem se- mina relinquentibus, parua, nigricantia, conclusa præsepaliis pilosis, membranis, accro-
lis

sis radiatim sese pandentibus : radice Maluacea, foliisque Althez, sed longiore, leniore, flaccidiore, supernaque acutiore; vt Sidz: nec gustanti ab vtrius diuersa, nisi quod non adeo est glutinosa. Quare cum nullam sciamus in Maluaceo celsu flore luteo, præter hanc, æquè tuto Ibsicum, vel Altheam Theophrasti profiteamur, atque Althez speciem.

EXOTICA Maluacea, Bania Eben quibusdam.

I AM DIU est quum rarissimam hanc primùm Veronæ in vrceis pensilibus vidimus: posteaquæ Monspellii seuiimus, & virentem habuimus anno 1555. in horto. Regii professoris perquam eruditū Iuberti. Et tamen si facie sit Maluz, sed arboreæ nondum adulez, nempe folio crassiore, rotundiore, minúsque sinuato, & magis ad Sidam accedente, tamē incertum nobis adhuc, sitne Maluaceo generi accensenda: florem quidem nullum promissit illi, & hyeme prima seuiente perit nobis: Semē autem à nobis terræ mādātum, allatum fuerat Alexandria aut Barutho, Maluz & Althez dissimile, teres, rotundum, pullum, Erui aut Orobi par: fortuita quadā ex Arabistis codicibus, vt videtur, cōiectura remotiore, quidam Baman Eben diuinarunt, quæ species Maluz videtur.

VVLGARIS ALCEA.

Q VASI cæteris robustior & efficacior foret, videtur antiquitas hanc etiam syluestre Maluam ista appellatione insigniuisse: ἀλκή siquidem robur, præsidium, & remedium Græcis est: multo autem notissima hæc ruri vbique: prodit quidem facie Maluz, ortu, & cauliculis, sed altius incisis, quinque partitis foliis, qualia sunt Maluz vetustiori, pusillæ, aut Geranio, è radice prorsum Maluz, & virgulis sequecubitalibus, numerosis, semē rotundum, orbiculatū, compressum edentibus, post florem copiosum; sed particulatim florentium, vtrūque item Maluz, calidis pariter & Septentrionalibus familiaris: plurima in Anglia, prope Couentriā urbem: magis digerit, muccaginis minus dat, quàm Malua aut Bis malua.

FRYTICOSIOR Alcea Pentaphylli folio.

PERVULTI Herbarii habent hanc, prolixioribus magisque vimineis surculis fruticans-tem, diuisura altiore, quinaria, & crenulis exiguis, planè rubrū Pētaphyllum, aut canabina folia exprimētib; purpuratē flores: nullatenus dissimilis superioribus tota herba, qualem meminimus ætate superiore in hortis videre.

PEREGRINA Alcea Solisæqua, an Theophrasti Malua?

Q VAMNIS quidam hanc Italicam & Venetam dicant, tamen nuspiā meminimus in Italia, nedum Venetiis, nisi in hortis vidisse, & multo plurem Herbarii Septentrionales habēt, quàm Itali. Emicāt in summis sesquipedalibus lentis virgulis peruenusti flores, aliquotq; foliolis constant, foris albidis, medio & intus purpurantibus, Abutili effigie & folliculo, è medio florum emergentē croceum cuneolum, teretem, oblongiusculum occultentes; nisi quando Sol ferè meridianus cæli nostrum verticē scandit, tunc enim, quasi sideris iubar inhiantes, se pandunt, vnaque aut altera horula post, illius veluti digressu & desiderio mæsti, marcescunt & ocluduntur, vnde quis Theophr. suspicetur Maluam esse Horariam, quam Columella Molochen videtur intellexisse illo versu: *Et Molochæ præmo sequitur quæ vertice Solent.* Radix exigua, tenera, folia ab imo terna quināve, Pentaphylli aut Papaueris Rheadis vel Alceæ: flexilibus cauliculis, hirsutis flores Maluz vel Anemones; Capita numerosa, secundum caulium longitudinem, lanuginosa, mollicella, strigata, membranosa, hirsuta, operculo tenui, radiato, clypei forma, obducto; vbi semeti nigrum, Nigellæ ferè. Admodum rudis est Cōmentator, qui Rutæ folia huic esse contendit, oculis redamantibus cæteris notis, & viris doctis monentibus ac negantibus, quibus feroculus insultat. Et quod deterius est, sibi nobisque discendi auidis, imponit, dum huic vires Opii asserit: nam gustanti potius insipidum quiddam & ignauum linguæ relinquit,

An Argemone
altera Eufhis

ab Opio prorsus alienum amaroze horrido: qui explorarunt gustu, humidum tantum & calidum secundo ordine, facile dicent.

GERANIVM Robertianum. Syderiti Achilleadem, aut congerer.

ROSTRATI capitis Gruini cum præferrent effigie cunctæ huius familie rostrata semina, nomen obtinuerunt Geranii: quorum non valde peruia sunt, quæ duo memoriz prodidit Dioscorides, multis Europæ regionibus, ubi nihilofecius vbertim tres quadrante luxuriant differentiz, eidem & plerisque præscis indiçtz, fortè nec isto nomine cognitz: nam etiam si inutiles putassent, non tamen tacuissent, cum hic alteram describat & dicat *αχελειον*, id est, nutilem suo tempore, hodie tamen vtilissimam. Eapropter operæ, precium nosset conatus faciet, si perspicuas omnes fecerit, atque cum inter se, tum etiam ab aliis, nempe Anemonibus ranunculis & Napellis diflunxerit, ne deinceps tyroni imponat, nève negocium facecat multiplex concurs & hallucinatrix parilitas.

Quocunque aciem vteris multis in ruderibus, parietinis, & imbricamentis, vel fugundis tectorum, denique segetibus & aruis videre est, tres notiores differentias herbulæ Robertianæ vocatæ, summo cespite virentis, cauliculis gracilibus, sparsis, multis, retrò deflexis humi, hirsutis, purpureiscentibus vel xerampelino vel phœniceo nitentibus, singula teneriuscula ferme folia educantibus, Pentaphyli, Artheniisq; & Ranunculi diuisura, sed profundiore: complures flores quinis item foliolis in summo constant, purpurei, circinnati, qui defluentem rostratos mucrones, aut acus, è latiori basi & rectum desinètes, relinquunt, ubi semen pusillum. Sapor non ingratus, altringens, vlnneribus peresthac; odor teter & vehemensior; notissima & vtilissima: radix ex flauo vires.

*Varietas
Robertiani.*

Hæc duabus adhuc differentiis donatur: quarum altera floribus maioribus visitur, foliorumq; altioribus incisuris, cætero similima. Tertia itè Robertiana pluribus, cauliculis, teneris, nonnihil hirsutis, reliquaq; similis: duntaxat radice dissidet sanguineo prorsum foris & intus colore, longiuscula, flore item roseo colore & ambitu. Est hæc tertia, quam Achilleam vocat Dioscorides sub eodè Syderitidis ambitu, tum quia descriptioni quadrat, tum quia præstat planè ea quæ eidè Diosc. reddit, eoque Blurwurtz Germani vocant.

PES Columbinus, seu Dioscoridis alterum Geranium.

RECHNITORATIS istud perutile agnoscat, & pedem Columbinum vocauit, ut cuius folia circinnata Alchymillæ vel Saniculæ similia, senis octonise incisuris laciniata, flaccida: singula in exili caule appensa, similibus flosculis Anagallidis minoribus, purpura dilutiorè, è quibus caliculi seorsim seminula oblonga cohibent, & acus exerunt prætenues, fuscas, & nitentes. Balneis percommoda asserunt practici (tamen si Diosc. sua memoria inutile) & ad intestinorum tormina vtilissimam scimus. Cultis & incultis passim inodorum.

*MYRRHIDA Plinii, Rostrum Ciconia, seu Acus Moschata
Officinarium, & Pastoris.*

*Germania Storken Schnabel.
Gallia. Bec de Cigogne. Ang. Storkes bill.
Belgi. Wyenarts bech. Hispania. Pico de Cigoua.*

PAVLO minus obuia ista, cauliculis itè gracilibus, cõpluribus, è radice exigua subpurpureis & hirsutis, præsertim adultis, è caule medio apice tenus foliis enascentibus Myrrhidis aut Cicutæ, positu Tanacetæ, in plumam tarsumve deductis: in summo flosculi superioris, qui caliculos in suis petiolis relinquunt foras intròque reflexos, collum ciconiæ effigiantes, stylûq; protendentem exilè, tenuem, & longum, vnde nomen, & acum Moscatum vulgus etiam dixit, ab odore suavi Cicutariæ veræ aut Myrrhi.

*BATRACHIODES, sine magnæ caruleum odoratum
Gratia Dei.*

F A M speciosius istud & calidos tractus euitans, amantius multo frigidiorum, pratis & glareosis etiam lumis vel senticetis Angliæ lasciuir, floribus czruleis, aut violaceis, Anemone magnitudine, conspicua: Folia rotunda, fissa, peramplis multisq; diuisuris, Ranunculi aut Aconiti viridantia, & interdum maculosa, è iuncis ramulis apta, glabris, pluribus ab vno caulium internodio ortis, qui copiosi à radice propagantur, & variè inclinantur: prorsum horsumq; procumbunt cauliculi: è pediculis ambiunt verulos crassiores cuspidè: ve tridentales, aduncas, breuiore quàm superior, apicibus dehiscetes, nonnihil inflexas, cum iam præzate maridi nutant deorsum flores: gustanti fici, nonnihilque astringentes, minus amari: odor quiddam Rosæ Moschatæ non absimile respicientes, cuiusmodi inest Acui Moschatæ Dioscoridi inditæ. Sed vulgus iam Plinij xuo Myrrhida vocabat, vti dictum: adeo efficax comperta vulneribus est, vt *Ged signab* Germanis, Deive gratiam nomen inuenerit.

BVLBOSVM Dioscoridis primum.

D I v est cum quidam Pharmacopœus Oenoponti, nobis istud Geranium pro Anemone venditabat: verum animaduertis postea rostellis, quæ huic toti speciei peruia sunt, facile calculum reduximus, & radicem pallidam, subliuidam, rotundam, sapore insipido, insulso, vel vesco animaduertimus, in petiolis prælongis, folia ab vno centro quinq; partita, & diuisura Geranij Robertiani donata. Flores non ita intensè purpurei fuerunt: nos primū Dioscoridis Geranij agnoscimus, tamen si nullum periculum illius fecimus. Rarè enim in Italia & Gallia obuius nobis fuit.

GERANIVM μαλ'αιουρας.

A P v clarissimū, nō labat memoria, Cæsarem Odonē Bononiæ istud vidimus, etiamq; Florentiæ Thomas Transylvanus summæ spectationis Iuuenis, in quopiam viroto nō procul ab vrbs pomerijs nobis cōmonstrabat, priusquàm luculentū prouetum nacti essemus ad MonsPELLIJ mœnia, porta Egidia, & via qua ad arā, dirutumq; sanū itur, in colle amœnissimo, nec non via qua itur Mōspellio Bessiers, 3. aut 4. ab vrbe lapide. Mollicella tota, cauliculis & folijs, Maluæ instar humi susus, sed longioribus, ex viridi pallentibus: flores minores, albicantesq; purpura, acus, verulive Venerei pectūmis, sed breuiore: Radix cuiusmodi Fumi terræ Senensis Commētatoris arguere videtur (vt non pauce aliz) hæc planta supinam securitatem, quippe quam paulo superius titubans in hortis sibi vitam, & Mordicam herbarijs quibuscum nuncupatam dicit: eandem postea rerum incertus, quasi alterius generis plāta foret, vt Calcicolarii donū, describit & appingit. Sed fraudi illi fuit, nolens tamen, ille qui à Sequino acceptā illam, quæ magis albida & tomentosa erat, misisti nec nouerat eam ipsam esse quæ Bononiæ hortis sata, magis glabra & minus cādida cernitur.

SANICVLA & Diapensia.

Ger. & } Sanikel & Sanicle,
 Rel. & }
 Ang. }
 Gall. Senicle.

A Potiore Medici munere, sanandi nempè, nomen factum Saniculæ: Sanat quippe potius vulnera, & prærogatiua quapiam interiorum excrementorum commotionem inhibet, sistitq; ne in partes imbecilliores corruentur, corruantq;. Hæc Septentrionalium & mōtanarum regionum, Syluofarumq; vdarum amantior, quàm calidiorum, Copiosissima & notissima Angliæ & Germaniæ. Folio quina diuisura altiore, & apprimè compto, crenatura fimbriata, Geranij columbini modo, rotundo, virète, & ex atro polito lzuore, nūme rosa, singula è singulis purpurascētibz quasi pediculis, ab ima radice multum fibrosa, El-lebore nigri aut Epipactidis, foris nigra, intus alba: è qua caules cubitum aut pedem alti folia superant, glabri, teneri, graciles: flores albos quasi vmbella collectos: semine hirsuto, aspero, & mordaci lanugine, Iunio Iulio etiam in hortis chirurgorum & muliercularum Belgarum floret.

ALCHIMILLA, *Stellaria*, & *Leontopodium*
recentiorum, non *Dioscoridis*.

Ger. Synnaum, Leuenfuss, vnd groß Sanikel. *Ang.* Ladies mantle.
Belg. Synnauwe, onser vrouwenmanet. *Gall.* Pied de Lion.

VMerosa etiam montosa & rigua editiora hæc amans, celebre Alchymistarum præconijs nomen indepta videtur, & Germanis Chirurgis, qui hanc multum vsurpant, Maior sanicula vocatur: uec abs re sanè, est enim admodum affinis viribus & facie, hæud ita folia dissimilia, leniora tamen, & multò minus altè incisa, rotunda, angulosa, Maluz, sed virentia, polita, senis pluribusve angulis, quasi plicis donata, & antequam erumpant, vnà facta & conuoluta, argutis crenulis fimbriata: interq; hirsuti cauliculi exeruntur, sesquipalium & pedem alti, albi, rotundi, quibus stellati, luteoli flosculi, vel herbidi, racematim congeruntur: & in tuniculis herbidis semen exile Portulacæ vel Papaueris: radice crassa, fibrosa, foris nigra, minùsq; calida quàm Sanicula, sed admodum sicca & astringens, vulnribus, si inflammationis suspicio adsit, admodum oportuna.

ALPINA *Eleborine Sanicula*, & *Elebori nigro facie*.

DE Eleborine aut Epipactide, multa lectorè monuimus in albi Elebori calce pag. 131: istam verò, vtpote Saniculæ & Ranunculì propiorè huc adduximus, iisdem quippe mōtosis, vmbrosis, sed celsioribus & Alpini oblectatur: è radice fibrillis vno nexu appensis donata, erigit pedicellos teneros, glabros, flexiles, in quibus summis folia quinquepartita, diuisa, & parum crenata, Geranij Columbini aut Saniculæ diuisura insūt: Floribus radiatis, foliolis senis, gustu non ingrato, sed acriore, Elebori nigri radice: quare nonnulli voluerūt Eleborum nigrum esse. In vallis Ostensis saltibus, non procul à Iouis monte, aliquot plantas collectas seruiamus.

ΒΑΤΕΧΥΡ. *RANUNCULI*.

Ger. Hanenfuss.
Bel. Hanenboet.
Gall. Bassuet & Grenouille.
Ang. Crofoote.

QUIVSDAM è Geranijs non parùm similes sunt Ranunculi, quos cognomines Ranis fecerunt, quia iisdem lacultribus oblectarentur, & floribus vt plurimum ranatis, vt loquuntur Græci, id est, luteis herbido permixtis, insignirentur, vnde facilis cognitu fuit semper planta. Eius autem multò plures differētias & varietates quàm Diosc. notauit posteritas. Et vulgatissima quidem est vbiq; pratensis à Brabantis ritè *Botterblom* vocata, vt quia tenera floribusq; onusta multū palte vaecæ, quò ad mulctrà veniunt vberius lac dant: idq; colore pallè aut subluteo, odore primæ bonitatis & uotæ: folia initiò rotunda, in ambitu Geranij columbini, deinde incisura Coriandri, maculis paucis, fuscis conspersa aut ferrugineis. Flores *Botterblom* Calthæ palustris fulgent nitore: foliolis concavis, peluim pusillam effigiantibus, aurei. Semen in racemosa, siue Adonidis simili cogerie, grumosa, minus vrente gustu, nec insuaui odore, quem etiam lacti impertire creditur: pascuntur enim hæc præ cæteris armenta, quia gratior & pratis pinguioribus vsque cunctis copiosissima.

PRATENSIS *Ranunculi varietas*.

EVNDÈM fere videas iisdemq; penè pratensibus & germinosis vdis marginibus hunc, sed minorem totum, folio altius & minutius diuiso, Coriandrinis simili, & in cauliculis pedalis summis multò tenuius inciso, flore aureo & capitulis congerie non diuersis.

POLTANTHEMOS, *multiflorus*, siue
Holeraceus.

Hunc

ET hunc putet quispiam duntaxat superioris varietatem, sed florum sæturâ perelegantē & multiplicē sortitū cultu hortensi: vnde *Polyanthemum* *Plinianum* arbitrantur recentiores. Nec sanè non alius videtur à vulgari pratensi, nisi quatenus cultu mitior & tenerior factus, quibusdā in holere manditur. Angli horti quendam habitu rotundiore Geranii folio habēt, florēsq; duplò maiores, & sepē geminos, nēpè inferius medio serē, caules, latiores, quos medios transadigit cauliculus, alterum in summo minorem florem ostentans, amœno in horticorum deliciis spectaculo.

BYLBOSVS Ranunculus, hirsuto mucicato semine.

NEc infrequens hic, sed amantior multò satorum, aut fabuletorum, quàm densi compactique soli pratensis: folio paucioribus, sed altioribus incisuris, superioris *Ranunculi* simili, sed feminis inuolucro villis asperiusculo, lapposo & tantillum echinato, *Xanthii* aut *Caucalidis* modo, radicis bulbosi Geranii, subtus fibrosæ.

PALVSTRIS rotundiore folio, semine Echinato, esse Apium Risus?

IN nullam magis quadrat *Ranunculi* nomen, quàm in hanc, vtpote ranis conuicticem, & aquarum potricem, quasi refocillationis & frigidioris egeret alimentum: quia omnium *Ranunculorū* habetur calidissima, eòq; *Apium Sardonium* *Discori*, putatur. Et certè rarius quidem, sed tamen alicubi in montosi strigosiq; agri lacultribus visitur, foliis albeantibus, nonnihil pilosis, Aceris, aut *Pampini* penè diuisura. Plurimum tamē est videre vulgari vbiq; torpentū, aut pigrè labētū aquarum, folia sublustri virore nitentia, *Smirni*, aut *Paludapii*, quæ idcirco ex *Dioscoride* nonnullis persuaserunt esse *Apium Risus*, nobis neutiquam inficiantibus, sed hærentibus aliquantum, propter caulem huius, qui vix superiores æquat: est hæc aureo flore & semine superioris, cæteroquin acrimonia rursus excitandis, & hemoroidibus referendus, si in Oleo *Violaceo* maceretur, aptissima, propterea dicta *Homeroidum Herba*.

Flammula RANUNCVLVS, aquatilis, angustifolia, Taracosis effigie.

PER quam familiaris hic riuisulis & propter steriles tractus segnius fluentibus Belgii, Franciæ & Angliæ, non perinde calidis tractibus, quasi frigidiusculo succo & aëre gauderet, quia feruidissimus: enecat quippe edendo pecora, & ideo arcent sedulò pecus opiliones, ne eo vorato inflamentur præcordia, indidēq; moriantur, vt videre est in balantum extis, quæ huius pabulo ambusta fuerant & summi floris quidem calyculi aurei lucentes *Ranunculi* sunt: folia tamen angusta, oblonga, carnosa, nitentia, *Lysimachia* rubræ paria, ambitu aliquantum serrata, in rubellis geniculatis rectis pedem ac cubitumq; altis, caulibus concanis, capillata radice, albida.

Pumilus RANUNCVLVS, gramineis foliis & geniculatus.

PALVMBobius hic, duntaxat *Norbonæ* pratensisbus ponē publicū diuersorū montis *Lupi*, & in arduis *Minden* *Ruthenorum* pascuis nobis repertus: aspectu latiore, & flore quidem, radice, ac semine racemoso, prorsum *Pratensis*: verum folia pauciora habet, & adeò exilia, vt vix nisi floreant, à gramine dignoscas, præsertim locis illis strigosis, vbi caulis palmum & sesquipalmum non excedit.



NEMO.

Nemorosus RANUNCVLVS, flore albo, stellato & luteo.

VIx nisi syluosis, aut frigidiusculis & montosis reperire est pusillos istos Ranunculos, primo Vere florentes, luteos interdum, sæpius candidos: foliolis stellatum dehiscen-
tibus, caule palmum alto, folio, diuisura Napelli aut Anthore, plerumque vno, nec pluribus,
radice Filiculæ, siue Polypodii, minore tamen, nec impressis cotyledonibus,

*MINIMVS RANUNCVLVS Septentrionalium,
herbula muscosa flore.*

VNacum Ranunculis istis & Vnifolio, in iisdem syl-
uosis & vmbrosis, frigidiusculis Angliæ, Belgii, &
Northmanniæ, non semel reperimus quandam tenel-
lam, petiolis gracilibus, viridantibus, flexilibus, palma-
ribus, folia laciniosa fulcipientibus, perquam similia Fuma-
riz Plinianiæ, vel superioris Ranunculi syluosi, sed ni-
tentia, ex pallore virentia; in cauliculo pariter Fuma-
riz, seminum glomerulus apiculis aliquantum verruco-
sis compactus visitur, etiam radice aliquantum asperata,
squamosis grumulis, candida, pellucida; sapore Ge-
ranii Robertiani, non ingrato.



ACONITVM Batrachoides, an sit Diofeo, albo flore Ranunculus?

FACIT arctissima Ranunculorum
Aconitis similitudo, vt vtri sint referē
dæ quædam plantæ, alioqui apprimè no-
bis notæ, nesciamus: E quibus est vna
hæc in montibus Veganiis Norbonæ,
Aruerniæ & Sabaudiciæ satis frequēs, iux-
ta Cacalia, & in medijs riuiis in Maio
prominentibus ramulis, caulis sesquicubi-
talis & bicubitalis, flores candidi, de-
licatiores, Ranunculi effigie, seminum
capitulo non absimili. Folia singula,
quinquepartita è pediculo, incisa Aco-
niti, Ranunculi, aut Saniculæ diuisura,
ambitu parû serrata, pallentia. Radix
cauo cauli subest, in multas maiusculas
fibras disparata; acris vt Ranunculus.



*RANUNCV-
lus quartus
Mathiol.*

Quem quartum non Mathiolus de-
scribit, sed eius pictor ostendit, totus est
facie Napelli; montibus celsis, sed vdis
oritur. Radice Hellebori nigri, floribus
albis, Ranunculo maioribus: caule ses-
quicubitali, foliis diuisura Napelli.

*BVLBOSVS vni folius aut Bifolius Batrachoides,
Eileboracea herbula.*

FSOLENTIORE effigie, hanc Venetiis in mercatu holitorio primùm à mulier-
culis herbilegis emimus, posteaquæ Patavio vicinis collibus, vbi viperæ capiuntur, e-

eandem euulsumus. Recto, vno, gracili caule surrectam, palmari & scisquipalmari, in medio quasi centro, singulum item folium (aut non plura duobus) fulciente, quod multis & altis incisuris radiatim diuisum Aconiti foliū refert, cuius in medio, quasi umbilico, flos vnicus, herbaceus, pallensq;: Aprili & Maio visitur, Hellebori prorsum: siliquosumq;: semen relinquitur, etiam stellatum, & effigie Hellebori: radices bulbillus, quantus Fumariæ Plinij, admodum acris gustanti, etiamnum nouem abhinc annis erutus.



ANTHORA seu ANTI ΦΘΟΞΑ.

ISDEM prorsum natalibus, nempe Rheticis atq; Sabaudicis alpinis, emicat æstate Anthora, quam quodam prouidentiz munere aduersum Thoræ perneabile virus comparatam rentur Taurini Ligures, & Lemani accolæ, quorum operâ plurima radicum copia cœpta Venetiâ ad ferri plusculis abhinc annis. Agrytis plurimi fit, ad omnium venenorum amolendam noementa, dum plebeculam panagyrice declamatiunculis excitam præstigijs illis oblectant & illudunt: etiam purgationi apta est, educit namq; muccosos ferrososq; humores & putredinem corrigit aut exugit, lumbricisq; exactis, materiam futuris præscindit. Amarorem auersatur plebecula illic, aitq; si quidpiâ peramarū gustarit amarior esse Anthora, id est vernaculè *L'Anthora*: tametsi scimus etiam alijs eos hanc nomenclaturâ indere. Quàm Thoro paulo altior caulis huic, rotundus, striatus, alterno foliorū ab imo summo tenus exortu, singulari, multiplici, folio altè & tenuiter inciso, quadantenus Delphini, Nigellæ aut Napelli: cuius floribus similes, sed luteos, minores, cuculatos, & rictu hiantes, habet galeniculos, geminas radices Cyperi aut Orchidis, foris rugosâs, solidas, fusco colore, intus albas.

ACONITVM Luteum Ponticum, Lupicida, Cenicida.

ALIA & natura & facies alterius sumi Aconiti generis, cuius differentiæ plures quàm recensuerit Dioscorides nostrum nouit æuum, tametsi ambigæ medicæ naturæ inter Ranunculos, Helleboros atq; Napellos videatur earum nonnullæ. Ponèdæ ex primū quorum vires certiores, exploratioreq; euentu representant facies, vt quæ folijs est viticeis altè incisis, nigricantibus & Geranij maioris, vt similibus sic maioribus edit. Caulem rotundū tenuem, bipedalem, lentum atque nonnihil flexuosum, petiolis nudis, alterno situ folia gerentibus donatum, floribus ornatum luteis vel pallentibus Linariæ colore, & effigie: sitiquilis subnascentibus, semēq; angulosum & atrum cohærentibus, Radix flexuosis & numerosis, nigricantibus fibris cyrriue implexis, montosis, & opacis saltibus amissq; nemonibus oritur in hortis Galliz & Belgiz colitur, proque deteriore cæteris veneno habetur à venatoribus qui Lupicidam vocant: non quod idem non faciant aliz, sed quia licet citius & certius: quin nonnulli in locis adultæ flores vel solo mansu fauces linguamq; tumore illico excitato adurunt, & vertiginem cieunt.

NAPELLVS verus, Caruleus.

CÆTERA Aconiti genera tametsi Dioscoridi nomine tenus duntaxat prodita sint, tamen quantum ex stirpium collatione & virium obseruatione assequi quimus, Napellus vulgaris vulgò Germanis Rapenbloimten, id est, flos Rapaceus, nam radix Rapi modo turbinata huic, non oblonga, aut conica, dictus vna fuerit differētiā: alterā arbitramur, Cc. j. quam.

quam Saenæ & Montepelliatæ accolæ perperam Thioram, nempe vagā cum cæteris nomenclatione vsūm propter, vocitant. Huic folia & facies luteo Pontico non disparia, sed minoribus pluribusq; incisuris molliora: radice tereti, nigricante, & quam Anthoræ graciliore, sed longiore, ima parte recta, obesa, caulem cubitalem, singularem exerit. Flores & semē in corniculis Aquilegæ Napellive modo. E deuenus horū Dei Linguagotticis memoribus nobis Canonici Lignipedes illic venationis callentissimi ostenderunt, huius copiam in hortos Montepelliacos transulimas: vixit diu in Hermeti Pharmacopœi vitidano ad Aegidiam portam.

Napellus.

Illud verò iamdiu etiam hortis præsertim Germanicis & Belgicis peruiulgatum, & florum amentitate dunraxat mulierculis expetitur, quos propter similitudinem Brabantij *Gunchocappen*, id est, monachi cuculam dicunt. Germania superior *Rappenblomen*, ex radice & flore conflata nomenclatione: insignis quippe radix, insignior & flos arguto naturæ opere: præ se namq; fert cucullæ hiantis aut cassidis speciem, cuius anteriore media parte demissior paulò frons in faucem pronissam inferiorē vergit, eoque medio exerit linguam geminam, paulam quid insulam, multis indidem porrectis villosis staminibus, quibus extrema panta lurida, viridiave iniunt: in thedis semen simile nigrum & angulosum ut iuteo. Radix orbiculata Apij modo, vel Dracontij oblonga, emittit caulem tricutibitem, petiolosq; graciles, prælongos, folijs nigris donatos, multis magnisq; incisuris, quadantenus pampiniceis, aut Platani. Huius videas accliuēs montium saltus Junio & Iulio perquam elegantem & luxuriantem fundere vberitatem in Reticis Alpibus, cui tamen cunctio illi atrofo gramine) parcat quantum est pecoris, præsertim secus iter, quo Constantia Nasarum velis itur, vbi à quouis animalij illibatum perlat, præterquam à muscis, quæ illi turmatim inident & aduolant, & floribus fortè innascuntur, sunt enim feruē concoctiores, maiores, quàm communes, alis capitulisq; ex lurido viridive cæso vireute, quasi canthrides, vel cincedulæ, hæc attentius obseruauimus quidem continenter de floribus restello delatantes: cæterum inurem Napelli frustra diu à multis ausulis plantis, quæsuimus, & an vidēsent opiliones percunetati, nusquam sibi visum negebāt: vix siue murem è muia fecisse, ne in pē è musca mure: igitur iam tum suspicio nos incesit, istos Arabas cum se, prout iussisset. Musca, Mure, n legisse: quippe nullam antidotum è mure parant: è muscis præstantissimam aduersum suueltum Tarantæ morsum atque Epidimicos morbos, cuiusmodi hæc.

Ree muscarum qua pastum ceperint de Napello N. xx. Aristolochia, Boli armeni. añ. 3j.

Nec in vlla planta huic congenere, muscæ hæc cæruleæ insidēt aut viciant, quò certior est coniectura illum Napellum esse Arabum, idēq; Dioscoridis vnum ex Aconitis: nam quòd quæ perfunctoriè paginulas perpauca Auicennæ lustrarunt, arguantur illum diuersis capitibus quasi diuersis de plantis scripsisse, quàm non multæ, neque accuratæ sint lectionis, iudicio sunt tam multa capita vnius rei, quas ille aut propter varias nomenclaturas putauit & descriptione secreuit, aut quò incertus rerum quæ parum plenè commentatus & set exactiore opera prosequeretur. Sic Serapioni non vno loco contigit: quin & Dioscoridi ipsi non paucis, magno flagitio eius dignitatis & dispendio posteritatis. Senensis vero, cum sepe ut alibi ostendimus, tum autem, quod mirum magis, isto etiam loco, easdem plantas bis terve inculcare, nimirum nomenclaturæ diuersæ ignoratione & suis imaginibus delusus, Quis enim imagines se dono accepisse iactat, easdē spectandas dat, nec descriptiones, quod illi familiare, apponit, sed meris, nescio quàm veris, picturis, dūtaxat oculos, non iteu animos pascit.

Elleboræstri & Consilidines.

Elleborus niger.

Christophoriana.

Astrantia nigra.

Pavonia

Paonia.	{	Mas.
		Femina.
		Promiscua.
Leontopetalon.		
Alabastrus & Coralloides Cordi.		
Staphis agria.		
Ricinus.		
Quinquefolium, siue Pentaphyllum.		
Pentaphyllum	{	Mixtus luculentus.
		Album.
		urpureus.
Alpinum petrosum, siue minimum argentatum.		
Eupatorium Gracorum, siue Agrimonia Officinaria.		
Agrimonia, siue Eupatorium odorato.		
Poentilla, Argentata.		
Leucas.		
Tormentilla.		
Fragaria	{	Alba, flauescens.
		Rubra.
Garyophyllata	{	Alpigena.
		Montana.
		Vulgaris, in Germ. Pl?

HELLEBORASTRI & Consilignes.

NONNVLLE adeo Aconitis germanæ, nec ita Hellebori nigri ab similes visuntur, vt cum neutrum verè exprimant, vtriusque tamen vel altervtrius emulantur faciem & vires impendio purgatrices: vnde quis coniectari possit Concilignes dictas primum, quòd cicerent aluum, non solum quia segetibus consererentur, aut adnascèrètur. Sic enim interpretatur Concilium, siue Còuoluulum Plinius, quia Venerem cieat, tametsi inter segetes luxuriat frequentissimus. Geminam autem Consiliginem nouit ætas nostra, nempe segetum sociâ, quæ passim Biturigas circum, & Beauciz variis aruis, Galliz Aquitaniz, & Norbonensis exit: vt iuxta Lanum amnè Monspelli, omniû maxima, sectura luculenta foliorum, florundque: caules sesquicubitales, geniculatos: cute ex virore pulla, vel atra, squamosa, multas semiuncialis latitudinis fundens alas, quæ densa pleraque folia fulciunt, singulæ septena, leuiter crenata, digitata, Lupini, Platani vel Viticis diuisura, figura, & folio, sed longiore, crasso, rigido: colore, odore, & sapore, ferè Laureolæ. Porriguntur indidem multiplices petioli, qui in flores herbaceos, Buxeoïve, pallentes, rugosos primum explicantur, Garyophyllatæ montanæ, Tithymallive Helioscopij modo: deinde succrescentibus corniculis membranceis, pallentibus, quadantenus Aquilegiæ, semen terès, atrum, & oblongum, grano tritici minus recludentibus, Sole arietem ingresso. Perennis Bruma rigidissima etiam Septentrionalibus perstat, florètque Christi sermè Natalibus: vnde Germanis *Christwurtz*. Radix durior, intorta, valdeq; fibrosa, nigricans, subamara, acris, virofa.

*Christwurtz Ger-
manis, quod flo-
reat ad natalem*

*Anglis à figura
Berwurtz.*

*HELLEBO-
rasti duplex dif-
ferentia.*

ALTERA, quæ minor tota, paucioribusq; caule & foliis, sed maioribus & latioribus, flaccidioribus, magisque serratis, è pediculis sesquipalium pedèmv longis, eductis, qui in tenuem fibrâ porrectû florè edunt, & siliquam & semè, cuiusmodi proximè descripta, sed non perindè copiosa; eodè tamen sidere & frigore: verùm syluis hæc & vmbrosis gaudet: fibris nigricantibus implexa radix, vt Vicetoxici, vpo quasi oblongo nodulo aptis. Hæc propior nigro Helleboro, illa Aconitò, viribus & facie. Hæcque, quasi sui dissimilis foret, si serius, vt Februario floreat, procerior: sin citius, multò minor sit, tametsi eodem solo & tempore sita: quin, vt crebrò notauimus, etiam clementiore hyemè, solutaq; nec gelida tellure, quæ minor, est florû partione alteri, mense, aut sesquimense ante-

vertit, Dudum monuimus, nostra memoria Pharmacopœos harum vtraque vſos fuiſſe, Hellebori nigri penuria & ignoratione: nonnulli etiam veri Hellebori nigri perſuaſiones qui tamen non parum accedunt, tamen illi neutiquam tuto vtendo ſuffici queunt.

HELLEBORVS NIGER.

German. Chriſtweitz. Belgia. Swert. Dieſcript. Ang. Oxe helc, and ſett er-worte.

NIGER verò Helleborus (nam Veratrum nigrum qui dicat, videatur & dicere poſſe atramentum nigrum, vti Seſquilongobardus ille ineptiebat) iam plurimus ex Pyreneis & Alpibus in hortos tranſuectus, qui ineunte hyeme, itidem paulo poſt brumam flores dedit ex candore Roſeos, interdum albos, nonnunquam purpureos, nec è foliis, aut caule, ſed è pedicellis ſtatim à radice ortos, cuiuſmodi Cyclaminis. Folia fert in ſingulo pediculo minora, breuiora, rotundiora, & reuſiora, ſuperne qua duntaxat puſillum quid crenata ſunt, diuiſura ſeptena, Peponiz ſemina, aut Smyni ſernè modo. Viridantia ex atro, minus craſſa, aut rigida Radix intexta, intricata, innumera fibrarum atrarum ſobole, eodem ſernè ſuperno complexu appenſa, amara valdè & ingrata. Morbis penè inuiſtis, non modo Melancholicis, ſed etiam nièrè pituitofis & ſanguineis eximium præſidium eſſe, certum habemus. Præter namque vertiginofos, amentes, & cancro vexatos, etiam paralyſi de ſanguinea pituitoſaque materia ſpiritu partim obſtruente, partimque neruorum & fibrarum tonum vigoremque laxante, correptos, valetudini reſtitutos fuiſſe ſcimus: & quid Arelatèſi cuidâ Monacho, colore & habitu vegeto, viribus athleticis, repente Paralyſi & Podagra petculſo, Rôdellæti præſtiterit, in memoria etiam nunc habemus. Vocabatur Apis Monachus perquam notus & ſcitus aulicus ille, id eſt, Abeille, vernaculo Narbonico. Nec tamè ac albus, eſt perinde formidandus hic: nam decoctis vnius libræ purgâtibz & mitificantibus, Melancholiâ drachmæ duæ trèſve radicû, inſuſo addebantur: quin & nonnunquam albi & nigri mixti, ana 3 ij. addidimus. Quò magis accedimus eorû ſententiæ, qui primùm è Pyreneis Perpignanæ, & Salas Hiſpaniæ cõterminis, eruti Hellebori periculû fecèrè. Poſtea nobis collectû idè in Apenninis Bononiæ accliuſibus, & valle Auſtèſi Pedemontana, ad Iouis môtis ſaltigia & ardua circû, nigrumque, nigri Hellebori opinionem auxit: alioqui minus cõgruit Dioſ. delineatio: nulli enim huic flores racemofi, ſemè Catthami Seſamoidis ſimile eſt: & caule glabro leiuique, nõ aſpero, aut niſi mauiſ in terpretari rigidum firmumque caulem *κατωχτιαν*, vt poſſe, nos alibi docuimus. Quod verò inter Platani & Spondilli folium, crebriusque incifum dicit, ſerendû Dioſ. deſcriptioni: non enim adeò rigidè ad normâ minima queque exigenda: verùm in floribus, ſemine, aliſque nonnullis, luto hærendum eſt. An ſuſpicandû luxam hic laceramve deſcriptionem, aut potius quodpiâ *μυμωνικὴν ἀμάρτυμα* ſubefſe? ſiquidè albi flores, muccoſi, racemofiſive cùm ſint, tamè deſcripti non ſunt, ſed fortè huic aſcripti. Huic excuſationi venia ſi deſit, veriſimile ſit, nos illo antiquo carere vetatro. Idcirco CHRISTOPHORIANAM illâ, Aconitum racemofum nonnullis cenſitam, Helleborum nigrû, non ſemel arbitrati ſumus. Radix quippe atra, confibrata, quàm plurimis appendiculis, morſus Diaboli aut Veratri: Folia crebribz incifuris, effigie Napelli lutei, ferratis, longioribus, pendulis, atrovrentibus, Spondylium, vel Imperatoriam aliquantum præferentibus: caulis ſeſquicubitum altus, gracilis, geniculatus: è quo extremo floſculi racematum coherentes, Oleæ, aut Helleborine albæ, albidî, Corylli nucamêto maiores: quibus dilapſis, baccula Laureolæ haud diſpares, acinorum modo in Botrum congeſtæ, cuiuſmodi in Liguſtro. Iunio floret ſaltibus montofiſ & dumetis gaudet. Prope Taurinum in Pedemontanis Trâſpadanis collibus, vbi & Laburnum vidimus: verùm cùm hanc tantopere nocuam accepſſemus, in ægroto vilo periclitari vires, religio fuit: eoque vulgarem retinere conſultius viſum fuiti erratum rati non in re, ſed in Dioſcoridis codice.

ASTRANTIA NIGRA.

TAN Tominus illi quadret Aſtrantia nuncupata Atra, German. Schwartz Aſtrentz, oder *Mitterweitz*, quàm periti Saniculam alteram putabant, alii Helleborum nigrum, lociuſcula

uiuſcula ſanè coniectura. E radice multum fibroſa, aliquantùm Helleboro nigro ſimili, atra, cinergunt complures petioli & cauliculi glabri, graciles, quibus folia quinis diuiſuris Pétaphylli, ſaniculæuè modo, per ambitum ſerratis, obſcurè virentibus: flores accuratim glomerulis collecti, muſcoſi, Bellidis, Succisæ uè modo & colore: luteum vniuerſa fūdīt ſuc cum, cuius modi Aſtratia maior, cui hæc etiam alijs notis meritiò aſſimilatur: idcirco nigra Aſtrantia vulgus dicitur. Sed enim huic cum Helleboris cognationis: montana tamen eſt, ſed vulneraria.

P O E O N I A ſemina.

A VSPICATISSIMO Apollinis cognomine, & ſœlici ope præſtanda, Pœonia notiſſima, quæ quaſi ſexu diſtincta foret, marem & ſœminam ſecere: vtramq; Genœuz Alpiniſ & Norbonæ arduis Veganij culminibus, & indidem ſyloſis non procul alio celebri monte Lupi vocato, ſœminâ eruiſus Vere florentè & ineunte æſtate: vbi perquæ frequè vtraq; hortis, tamen notior ſœmina, eoq; vſu frequentior. Quæ nâq; proſtât Officinis, Fœminæ ſunt, Aſphodeli, Cyperi maiores, aut Oenâthes, vno tuberoſo nodo pèdulæ, latè ſparſæ, glâduloxæ, ruſſeſcentes, oblôgæ, & tenuiores, quàm promiſcuz Pœoniæ: caules primulùm pullulantes puniceo rutilât: folia inter Helleborû nigrû & Smyrniû, diuiſura maris minora, auerſa, cæſia & albida: flores roſeis folijs & calycibus maioris, ſaturatis, vt Maluz hortèſis, ſuccedēte terno folliculorum ſœru, Amygdalæ putamini ſimili, & pari ſemē, concolori, dehiſcente per maturitatem, Hellebori nigri ſiliquæ ſitu, atque pendente purpureum ſeminis partum rutilum, oblongum, nitidum, feretem, ſerie mirabili ſtipatum, acinis Punicæ non diſſimiles: plenè maturum nigrum, lucidum, medulloſum: ſapore medicato, acri, ſubſtringent, nonnulla dulcedine cum amaritudine,

M A S.

R A D I C E ſimpliciore, nec ſparſa, ſed rectius altiùſq; depaſſa, & interdum binis, ternis vè maiuſculis flagellis, odora, intus albida, foris ruſſa. Folia Iuglâdis ſitu & ambitu minora, craſſiora, ad Terebinthum aut Staphyloedrum accedentia. Flores, ſiliquæ ſœminæ ſimilia, ſed ſemine exquisitè rotundo, concolori.

P R O M I S C V A ſeu Neutra.

Q VÆ nondû mari Pœonia reperto à nōnullis Mas credebatur herbarijs: nobis Promiſcuum, quaſiq; vtriuſq; cinnus eſſet, & neutrum, viſum fuit appellare. Quippe quantum à ſolo extat, ſi perpendas, Maſculum dicas. Sin erutas radices intueare, ſœminâ iudices: niſi quia pleniores & habitiores. Hæc Plinio Mas ſortè eſt, tamen id excutere noſtra hand magnopere intereſt, nec ocium eſt, nec lubet anxius proſequi, nū idē author errarit, dum marè folijs ait redolere Myrthâ, quippe cū Smyrniū Myrtham redoleat, perinde ſit, vtro modo dicas, omnes iâ in hortis & vſu ſūt. Radice rediuitua multos annos perſtât.

LEONTOPETALON.

M VLTIS ab hinc annis qui complures radices tuberoſas proſtare quibuſdam Venetis Pharmacopolijs ſepius vididiſemus, putabamus eſſe Cyclaminis adulterat viciet, pri mo intuitu. Poſtmodum ſciſcitati inſtitorem, reſpondit eſſe Leontopetali radices: cū quæ multis poſtea in hortis accuratius viuam perpenderemus, flores Anemones vel Ranunculi, in ſiliquis ſemen, caulem non ita procerum, adeoq; radicem magni Cyclaminis aut rapè foris fuſcam, tuberoſam, vt Dioſcorides prodidit, memineraſus. Cæterum folia tametiſi ampliora multo, tamen ſinuofa & circinato ambitu diuiſa, Pœoniæ modo: non Braſſicæ ſimilia, aut Papaueris diuiſura obſeruabamus. Iam inquilina cū ſit Italia & Gallia, leſiori integrum erit nihil aſſentiri, vſq; dum vices exploratas habuerit.

*Nemoraliſ Alpina Herbariorum ALABASTRITES,
CORRALOIDES Cerdi.*

P O T E S T I T E M P E N T A P H Y L L I V O C A R I E A, Q VÆ in vmbroſis ſaltibus Taurinenſis agri, Calcaris montis Seuenæ, & trans Rhenum non procul

Cc. lii.

Ba.

Basilæa reperitur. Folio è singulo pediculo quino & septeno, Ellebori nigri, aut potius Pœoniæ, serrato, in pediculis gracilibus, glabris, è caule singulari, seſquipederali, innixo radici crassiori, minimum digitiun æquanti, transuersim depaſſæ humi, quæ crebribus articulatur portiuculis, frustillifve marmoreis, & Polypodij modo radicem acetabulis insculptam, effigiem Coralli albi præferentibus. Flores in summitate pluſculi pallentes insunt Maio, postea siquosa vaginula erumpente, maiore Erucæ aut Chiledonij: semen puſillum claudente, gustu tota hæc amaricante & calfaciente.



RICINVS.

Cerua maior.
Cataputia maior.
Granum Reginum.
Mefua.
Palma Christi.

RICINVS siue *κίτσος*, semini imago, quæ animalculum cognominem imitatur, vocaturq; Ricinus, appellatione dedit, vti Echio, Phyllo, Verucanæ. Ceruam maiorem siue Cataputia passim officinæ appellat. Granum regium Mefuz: Palmam Christi vulgus, propter frondis digitatam effigiem, quæ volam palmamq; expansis digitis quadantenus æmulatur, oriunturq; ex caulis crassis, cauis, aut sex cubitorum, pixidatim consertis geniculis, depressis, alterno situ folia in ficulneo pediculo hærentia, septenis & nouenis altioribus diuisuris, Ficus, Platani, Castanæ equive Staphidis agriæ vel Ellebori nigri, subnigra aut subcœrulea, pingua. Siliquato secundum summitates fastigio, racematim compactis floribus luteolis, succedente, vbi conduntur plurima ternis costis, aut loculamentis, conspicua conceptacula orbiculata seminis tricocci medullosi, multumq; olei pressi reddentis. Vix alibi quàm in hortis videre est, tamè tum calidis, tum frigidis læta tota ex cæruleo in fuscum languet, annua est, nec rediuiua.

Lat. Pedicularis.
Gall. Pouilleuse.
Ger. Luyſcruyt.

σαδικ ἀγρια STAPHIS agria, siue *uirifolia*.

DVXIT à foliorum diuisura, quæ Labrascam siue vitem syluestrem imitatur nomenclaturam Staphis agria, quæ & pedicularis notissima est vocabulo, & compertissimo vsu, ad pediculos illius & suffitu abigendos: maceratæ namq; & tusc in aceto vegeto, grana si affricentur interulis, quantum est pediculorum vel lendinum enecant. Ad quod bel lum pediculorum in præsidij ipsa planta alitur vbiuis gentium, & nusquam vltro provenit, caule cubitali surrecto, fusco, folia ab imo in pediculis pampineis laciniosa, crebra, profundaq; Aconiti, Ricini vel Vitis diuisura. Cæruleos autem flores stellatos, Rapötij, Iulio & Augusto dat. In oblongiore siliqua multis, costis compacta, dehiscente, semina erumpunt triquetra, pulla, amara, & vrida, oleosa. Radix non ita magna, annua est.

QUINQUE folium.

FOLIORVM numero quinario notum Pentaphyllon, perinde vt Argentina cognata, frequentissimum vbiuis itidem marginum & viarum vdis cuiuslibet plagæ. Folia crentis & aspectu Agrimonie vel Potentillæ, in lorulis prælõgis, flexilibus, purpurascensibus, qui sese nouis, quæ solum subierint, propagantibus Fragariæ, Potentillæ vel Vincæ peruinæ modo quinq; partita effigie digitata, Ricini, aut Lupini, ad Saniculam etiam accedentia, Argentinæ luteis floribus. Radix quanta minimus digitus, longa, purpurea, vel Cætaurei maioris colore, quæ arida facta quadrata cernitur, verissimè monente Theophrasto: quæ etiam nota aduersante Barbarorû pertinacia, manifestò distare à Tormentilla quilibet in promptu sit nosse.

Huius

Huius animaduersa iamdudum quadruplex aut quintuplex varietas, in magnitudine florum, colore, & folijs sita.

PENTAPHYLLVM *Afinus Luteum.*

MINIMUM omnium differt Pentaphyllum luteum & minus vocatum, rarius tamen nisi syluosis pratis & herbidis muscosis occurrit, vbi Tormentilla, quā gracilibus tum folijs tum viticulis, simul ac pusilla statura (nec sese defixis ramulis propagante, vt prior) admodum representat. Folia qua terram spectant, albicant.

PENTAPHYLLVM *album.*

NEc multum magnitudine superatur commune luteum Pentaphyllum ab hoc, cui item quinq; partita & Helleborastri modo digitata & anterius duntaxat crenata folia, subtérq; in cauliculis hirsutis, flores conduntur albi, radice multis adnatis huc & illuc vagantibus. In Belgicæ & Gallicæ hortis meminimus vidisse,

ALIVD *album, & Purpureum.*

PRæ omnibus procerius & speciosius istud, quod in pingui pascuum solo vel pratorum Sanæ Norbonensis Iunio & Iulio flores edit candidos, interdum purpureos, & in caulibus ab imo, rectis, firmis, pedalis & cubitalibus folia sunt quinq; partita, sed altioribus & crebrius, Coriandri Geranii Robertiani vel Alceæ modo: foris nigricat radix, intus rubella, digitum lata, palmum longa, & sesquipalmū. Etiam in Apennino Italicæ purpureo flore, perquam aspectu ameno, legebat penitus Pharmacopæus & amicus non vulgaris Iacobus Rainaudet Massiliensis: Belgæ & Galli in hortis alunt.

ALPINVM *petiolum & minimum Pentaphyllum.*

NE hoc quidem adhuc descriptum, quippe non frequens occurrit, nec nisi celsioribus montium iugis gelidisq; cautibus, quales sunt Sabaudicæ, in Austriæ valle, & Norbonæ ad Calcaris hortiq; Dei ardua, & in verticibus editissimis Mindeni. Foliola sunt circinato & integro ambitu, quinq; partita, tenuia, & subtus candore nitido lucentia, aduersa, vindia, Saniculæ tenellæ multū similia, sed minora. Floresuli stellati, racematim collecti, candidi, interdū & purpurascens, Alchymillæ similes, defluunt ventis estate, in gracilibus admodum cauliculis, è radicibus fibrosis capillaceis, fuscis, purpurascens. Quidam Tormentillæ annuerant istud, cui multum sane simile est. Incompertæ tamen facultatis nisi exsiccantis & astringentis.



Incana Pentaphylli effigie, an LEVCAS Diosci

NON penitus nihil sentiebant docti amici nostri Valerandus & alij, qui hanc plantam intuiti, Leucadem censebant. non modò enim tota incana est, vt flagitare videtur ipsa nomenclatio, sed etiā Triflagini folijs est, qualem oportere esse, facit suspicionem consequutio. Folia sunt terna aut quaterna, crebra diuisura & magnitudine Triflaginis, furculis breuib; crassis, lignosis, subrubris, rugosis, fuscis, vt Pentaphylli, quod inæquali à radice exortu multis depacta portuiculis quodā habitu adubrat: item ex fusco purpurascens in alias fibras diuisis, gustu etiam Pentaphylli vel Tormentillæ, astringente, exsiccate. Quare & fortè non minoris quàm illæ duz efficaciz aduersum venena est, quæ causa fuit, vt illi, fortè vires radicū experti, ausi sunt Leucadè hariolari. Ex præstat (quādo nulla est Dioscoridis delineatio) hanc perpulchrā plantā nosse &



experiri, quam nullâ, nihil; periclitari ad eruditionis supplementa. Admodum inuentu rara, nec nobis lecta, nisi propè Allobrogum deuexa, plantie in arida, glareosa.

EUPATORIUM *Græcorum, Agrimonia Officinarum.*

Ger. Oberwets
nig. rud Bruc
Wetz.
Ang.
Gall. & Ar-
Bd. & Sine.

TAMETSÌ quosdam nouimus in Belgio & alibi, qui Agrimoniz, siue vero Diofc. Eupatorio in morbis hepatis, lubentius Canabinum aquaticum, à nobis superius memoratum, subdant, vsurpentq; frequentius, tamen quia non rei ignorance faciunt, sed viriū maiorum exploratione freti, eos adeo nō incesimus, vt potius laudemus, si veterū quopiā simplici per bono aliud melius vsu comprobarint. Agrimonia autem nostrarenī satis cum notæ cunctæ, tum nomen Argemone in Agrimoniam detorum, (non Arthemisiam, vt sub capitis finem Dioscorides monet) verum esse Eupatorium satis testantur. Quin vires multo magis, sed multo plures sunt, quā quas Dioscorides enarrauit. Estq; notitiæ vulgatæ planta frequentissimi commodi, vbiuis gentium in pratis siccioribus satum, viarū marginibus fruticat cubitum & sesquicubitu alta, striatum, angulosum, subpurpureum, hirsutū, durum, lignosum & vnicū sēpissimè caulem promēs, multis ramosis neruulis, folia quasi pediculo innixa, ad Vlmariā Potētillā, aut Rosam effigiaria hirsutæ, nōnihil incana, florēsq; in summo exiguos, luteos, stellatos, Pentaphylli minores, secundum totam summitatis longitudinē edit, vbi feminum series Lapposā hirsutāq; pannis hæret, quos vel tactos mordicus tenet: medulla intus albida, sapore non ingrata, vt nec odore tota planta. Radix crassior, foris fusco rubore, dura, exsiccante, & moderatè astringente, adeo apta foris & internis affectibus, vt decoctum dilutūve colore lymphoto vini gilui, placeat: & potu viscerum, hepatis præsertim, tonum restituat, intemperiemq; omnem fermè corrigat, obstructions referet. Eoque succum officinæ expressum in Trosciscos seruant, Xantis Picthæ Galliz finitimæ syluæ eandem Agrimoniam edunt, quam odoratam vocitant, propter odorem multo flagrantiorē, etiamq; in hortis colebar superioribus annis, & dabat nobis illic eruditus Medicus Lamoureux.

Ger. Greenfing.
Gall. & Ar-
Bd. & Sine.

ARGENTINA siue Potentilla.

Ang. Wildæ Tanfie.

TANTOPERE est hæc affinis facie Agrimoniz, vt & vulgus Syluestre vocet Agrimoniam, & non rarò mulierculas Agrimoniam se collegisse ratas fallat: discernitur verò reptatu viriculatorum teneriorum, gracilium, Fragariæ vel Petaphylli, cuius flores sunt similes, & concolores, lutei: folia autem supernè virent diluè, auersa autem argenteo splendens nitore, vnde Argentine dicta. Potentilla pariter à viribus, quibus eximij pollet, ad frangendū calculum, interiora vulnera & vlcera maligna, & dysenterias, viscera roborando, similiter Agrimoniz: cuius, potius quā Tanacetī, tēperamento exsiccat, siue calore moderato est, sed astrictione superat: multum sanguinē grumolū potu dissoluit. Viarum, vdarum præsertim, nulla amantior, frequentiorq; alumna vbiq; gentium dignū obseruatu. Hanc inditam pelui frigida aqua semiplenæ, & operculo oclusæ destillare, siue vapores in concavū operculi subuehere, quod sublimare vocant, ferū. Huius stillatitiam ad lēgines, pānos, & maculas, fuscūq; colorem Sole contractum delendum, Anglæ mulierculæ adhibent.

Ger. Brickwurz
rud rot heyle
wurz.
Gall. Tor-
Ang. Sine-
Bd. still.

TORMENTILLA vel HEPTAPHYLLON, an Chrysogonum Diofc?

QUI Pentaphyllon nouit, non potest quin norit Heptaphyllō, à septena foliorum diuisura sic vocatum: Tormentillam verò, quia tormentum, cruciatūve dentium sēuissimum placat, atq; venenatorum quorundam rerum compescat funam cruciantem. Nemotosa, montana, sicciora, macilentioraq; prata sternit, furculosis, gracilibus, senis vel octonis ramulis, folia Quinquēfolij minoris luri, sed septena diuisura, scaris, rubellis, nitidis ab radice exortis corpulentiorē, & crassa, pollicem ferè aquante, Bistortæ, & colore intus rubro, foris nigricante: Rosculis Potentillæ, vel Pentaphylli lutei minoris.

FRAGA Fragaria.

NON ITA diuersa ortu & habitu ipso vilitur in syluosis Fragaria, prætermissa etiam Diofc: sed versu Maronis signata: *Quæ legitis flores & humi nasci cū Fraga.* Fragrat nam.

namque non modò fructus & flos, sed etiam stillaticia; præsertim fructuum maturorum: qua mulierculæ Erisypelaceæ & sursuraceas lentiginosâque faciei sedationes leniunt & abigunt. Ad calculosos & inflammationes epotâ opimè facit. In bellariis, præsertim cul-
tæ plâte idè vsus, sed quàm Idei Rubi delicatior fructus. Humilis herba, syluosis familiaris
& viarû marginibus, primo Vere floret, & tota estate fructû fert, purpurei, sanguinei dilu-
ti cruoris saturum, folia terna Rubi, aut Idei, adeò similia, vt nonnulli somnariar eandè,
differt verò herbacea natura, (tacet si hyeme persistente, quando etiam Brumæ tempore
semioperta niue in Angliâ, nota est) autem nonnulla v) vticulis exilibus, enodibus, nu-
merosis, pilosis, nequaquam spinosis, ab radice tenui, superficiali fibrosa, prodeuntibus:
floribus in summo albis, Rubi, sed minoribus.

Vulgaris GARYOPHYLLATA, aut GEUM Plinij?
Germa. Benedikten wortz. Gallis. Galiot. Ang. Auent.

NVTRIVNT & syluosæ vulgarem hanc, illis non multùm absimilem, nec item Græ-
cis & Latinis (nisi fuerit Geum apud Plinium) dictam, cuius tamen radix eximii
odoris nullum latere debuit, qui olfecisset: quippe Nardi Garyophyliv suauitatem spi-
rat, nullum capilloso, rubella intus, caulem pilosum, subpuncicuum, sesquipedalem, &
bipedalem emittit, alis aliquot diuisum, quibus summis flores Potentillæ, aut Tor-
mentillæ insunt, & pilulæ deinde oblongæ, scabra hirsutæ mordaces, in pediculo singula
ad imum folia ferè Alchimillæ, in summo Fragaræ, sed hirsutæ & similitudine Agrimonie,
cuius qualitates ferè est assequuta: calore & siccitate temperatis: ad vulnera intus forisq;
vsu laudatissimo; quare & in hortis vbique herbariæ colunt.

Septentrionalium, rotundifolia Pappo flore GARYOPHYLLATA.

RABANTIÆ syluosis conterminis Meehliniæ, & in Northmannia frequens ista, in
Angliâ verò plurima: quæ magis totius plantæ habitum pendenti, quàm foliorum
expressionem, aut radicis, Garyophyllatam repræsentat: sunt etenim circinnatæ, & ali-
quantum cristatæ, ambitu Hederæ terrestris, in petiolis exilibus nonnulla foliola admo-
dum exigua habentibus, vulgaris Garyophylæ modo: radice crassiore, minus fibrosa, mi-
nimû digitû quante, Geraniû moscati momordicæ dicti, nec perinde Garyophylam, aut
Nardum halante: flore speciosiore, & caliculo pallidiusculo, relinquente papposam orb-
tam, quasi plumeis vndantibus, quadantenus Alceæ Venetæ radiatam.

Alpina Pentaphyllæ CARTOPHYLLATA.

IN Rheticis Alpibus nò procul Clauenia, hanc primùm na-
sti, putauimus esse Tormentillæ, aut Tetaphylli speciei: ve-
rùm radix Geraniû fibrosior, forisq; rubiginosa, parùm
quid suaue redolens, Garyophyllatam testatur. Quinetiam
erigit caules pedales, cui herent folia quinquepartita, am-
bitu serrata, Penthylli, aut Tormentillæ, flore luteo-
lo pallentè, staminibus lanuginosis, croceis, pappo-
sis, minoribus Garyophyllatæ.



VERONENSIVM Garyophyllata flore Saniculae Vrsine.

FNERE complures insigniores plantas, quas apud Veronensium Pharmacopœorum
peritissimos, Franciscum Calceolarium, & Andream Bellicoquum, partim in Offici-
nis, partim in hortis videbamus 1563. fuit quædam perueniulus florum quasillis, pusillis,
orta

ortu & similitudine Primulæ, aut potius Saniculæ Alpinæ, intus luteis, foris purpurantibus, nitidis, è medio filamenta crocea ostendantibus, & pluribus in singulo cauliculo, glabro, gracili, & radice numerosa comâ donata, quæ permultos petiolos latim fundit, quibus cunctis singulû foliû Geranii, Maluacæ, aut Saniculæ, rotundû nêpe: sed per ambitû altius sinuatû, minutimq; crenatû, asperiusculû, flexû humi, & fusius aliquatò se pendens, ritu Geranii. Quale meminimus in hortulo ponce ad es Jacobi Cortusii Patavini Patri- citi, rei herbariæ perquam periti & avidi, cui & nos vicissim quassâ transalpina & Nor- bonenses plantas, partim dono, partim spectâdas dedimus, sapore ex attritione siccante,

Imperatoria.

Podagraria Germanica.

Angelica sativa.

Varictal.

Angelica sylvestris.

Benzoin, Assa dulcis.

Panax Heraclea.

Altera Obscuri aut Pastinacæ facie, Panacis species.

Leser der Journale

Leucosticte

Scandinavian

Libanotis Theophr.

Coriandrum.

Asperula hortense.

Oroselinum, sine Petroselinum

Macedonicum.

Hippofelinum, sine Olusatrum

Συνυπάρχουν.

Lienhardts.

Pastinaca domestica.

Sylvestris Bancia.

Pastinaca marina.

Sylvarum, Asphodelus Hesiodi.

Peradex. sine Batades Lusitanorum.

Euphorbia

Costus adulterinus Illyricus.

Barba Cate. sine Vinaria. an Rhodera Plinii?

Flas. Apuricana, sive Othomina Italerica.

Centaurus magnificus duplex.

Phm. sine Valeriana tenuis.

Nardus montana.

Phytolacca Menziesii Nutt.

Saxifraga hircina { Major.
Minor.

Saxifraga oppositifolia { Minor.

Thellandrium Planch.

Pisopionella.

Dancus secundus Selinoides.

Ammonia vulgaris.

IMPERATORIA.

AVOSTO hæc propter raras facultates donata fuit nomine, seu quæpiâ lætæ mercis indicatura. Affiorant autem est facie fatiæ Angelicæ, quàm sylvestris: folia tamen propius Spondiliū & Hippopolitū æmulantur, vñ plurimum terna, statim ab humo cauliculis subactis: gracilis caulis, nodosus, sesquicubitū altus est: umbellæ & semē Angelicæ sylvestris, vel Anethi: radix digiti æquat, multis fibris in terram sparâ, foris fusca, albicans intus: multo

multo vehementioris & acrioris facultatis, & odoris quàm Angelicz. Iisdem gaudet naturalitj.

PODAGRARIA, German.

MVLTVM abest ab huius facultatibus ea quæ adeò resiliibili & importuno prouentu iuxta sepes hortorù & parietes vdis vmbrosisq; locis pinguibus prouenit, vt vix inde possit radicibus deleri. Pedem alto caule, candida vmbella, Imperatoriz, minora folia & radix, odore minus suauis, quo & viribus quadantenus ad Ebulum accedit. Ea propter plebecula rata Ebulum esse, vsa iam diu est, etiamnumq; experitur ad Ichiadicos Podagricos optimè facere. Vocantq; Belgæ *stercinrupt*, id est, Podagrariam. Sanè facultates Ebulo quàm Imperatoriz similiore fortita est.

ANGELICA.

VIx credi par est nostrates Angelicas Indicis delitijs aut præsidijs neutiquam posthabedas, Antiquitati notas, nisi sint apud autores veterinarios Gallorum Laserepitia memorata: nec enim siluissent illi tam diuinam fragrantiz gratiam, & vicarias diuinæ Beneficentiæ vires, siue Angelicas, triplicis nostratis Angelicæ. Quarum quæ procerior, radice crassa & aliquantum supernè tuberosa, multis appendicibus humi inerta intus candicat, foris pulla, odore perquam suauis, aromatico, pinguem, gummosum, flauumque succum remittente. Caulis bicubitalis huius triūve cubitorum: striatus pallefcens, ferulaceus. Folijs latis, Hypophyllini, Simonijs & xmulis, ex viridi in pallidum lauescentibus, mollibus, vmbellæ sunt Pastinacæ, domesticæ, luteique flores & semina toliacea, rotunda, compressa, & albida, acris gustu & odoris eximij.

Varietas.

Nonnullis in hortis hic Londini, Antuerpiæq; visitur alia, tota minor, cuius suauiore odorem radix spirat, prope quàm folia ima ex purpura rubescunt: superna autem ex rubore virefcunt: vmbellæ cæteræq; semina similia. Celso vtraque montes gelidæq; amat iuga, veluti Imperatoria dicta, cum qua in hortis colitur in Anglia, Belgio, Gallia.

STLVESTRIS Angelica.

SED quæ si luestris rariis hortis, sed sæpius vliginosis, pratensis locis frigidis, gaudet, radice pluribus fibris, odorèq; cæteris multo minore est, gustu non ingrato & Pastinacæ ferè minoribus folijs, acrioribus, paucioribus, minusq; incis: graciliori & humiliori cauli, vmbellæ albicant magis. Cuilibet hæc nota in Anglia, vbi lubenter vtuntur, quia aptior edulij condiciendis. Corrigit enim prouentum saburamq; crassiorum & viscidorum humorù, atq; fastidum halitum emendat tetri spiritus, ex præua concoctione manantis, copiosior etiam est gratio est.

ASSA fœcens, an sit succus Cyrenaicus mixtus. BENZOIN

recentiorum, non est succus Cyrenaicus.

SVCCVM Syrenaicum longè aliud fuisse, & Benzoino vocato excelluisse in promptu est nosse: cum legenti, alterum Ferulacæ plantæ, alterum verò arboris proceræ multo suauissimum excrementum esse: tum etiam facultates, qualitatès exploranti, quæ gustui in Benzoino, neque seruorem in intima sese dantem, neq; in corporis meatus peruadentem, sudorificè affatim cientè exhibet. Capite autè de Lacca, Benzoin inuentum recentioribus, & à Cancamo disse, disseuimus. Actianesi Syrenaicum illud celeberrimum iam tum defecisse Plinij æuo assentimur, nou tamen prorsum nullum extare in naturæ familia Lasere persuademur. Præter enim quàm quòd speciem nullam penitus posse interite docet Metaphysica dogmata, tum verò nobis suppetit Asia lætida, quæ potis est Syriaci, Armeniaci & Lybici laseris opinionè sustinere. Solitū enim erat istud notæ deterioris mixtum Sagapenò vnum veli. Sagapeni enim est odor Asæ fœtidus affinis, quod Lasere nondum lictato soliti erant remiscere, sicq; venundare, Dioscoride auctore, cuius refectione doceri oportet Lasere non adeò celebre fuisse, quia odoratissimum, alioqui primo libro recensuisset, aut hic vsum tam rari odoris addidisset, vel saltem odoratissimum dixisset: atqui dūtaxat Syrenaicū laudat, quia aptius cibis, maiore cōnuo, minore odoris saporisq; fastidio esitatur. Odo è nō suauè, sed intensū vegetūmve cōmendat, quo mixto sal: aut condimētis, otis sœtentē halitū corrigat, vt puta Ligustico Imperatorio, Zeduaris, Lenistica

non suauis, sed gratiores quàm naturæ placeat odore. Hunc Serenaico temperatiore multo esse, & os eo imbutum minus vehementer spirare. Ipsis subductis, si quis duplicem astringentem Arabibus dictam, alteram dulcem, alteram foetidam, vires nosset sic satis quadrare odorem verò mtiorem illius, quæ dulcis dicitur, agnosceret, ut cui minus aut nihil additum sit foetidi Sagapeni, aut alicuius consimilis gummi. Foetidam verò ubi multum sit remissum, eoque fit ut interdum liquidior, liuidior, rubicundior, remissior cernatur, prout mixta, reces aut vetulior fuit, neque dum exaruit, cuiusmodi interdum visere est in rancidis officinis.

*PANAX Heradium Herculeæ, sicut Heradia
fronde Pastinacæ.*

DIXIMVS antea Panacis nomenclaturam communem fuisse pluribus plantis, quæ neque inter se facie, nec planè viribus similes essent, magnæ tamen celebrætatæ commendatione præter prædictas, ceu quemlibet morbum dolorumve abigerent, dictæ fuissent. Hanc autem et si Herculis nomine claram difficilè noscitur sit, quia aliquam multis, quas nouimus in nostro cælo oriundas, effluat nullus succus, tamen non desunt qui quandam in hortis coli non ita diu ceptam, nobis etiâ (commostrate Doctore Assatio) rursus lectam, veram asserunt. Verum permultæ sunt aliæ huic nulla dote aut nota inferiores: radix exigua nimis videtur, dum cubitorum caule ferulaceo enim, folijs quadantenus Smyrniæ aut Imperatoris, sed lacinijs ambituque magis circinato, viridis pallentisque coloris, rigidis, & leuiter hirsutis. Radix non perinde succulenta Ligustici vel Angelicæ, umbellæ latæ, floribus luteis. Creuit suapte sponte in illo saxoso colle, qui Frontignana redeunti MonsPELLIUM ad læuam est, propè aut pone Sacellum dirutum, ut nos non uuit multiplicis industria atque indefessi laboris hac in parte Doctor & professor MonsPELLIENSIS Assatius: sed studioforum accursu, qui auidè istam plantam in chartis seruabant, deleta illic ferè fuit.

PANAX altera recentior Olusæi aut Pastinacæ facie.

VENETORVM quidam potiores, etiamque Leopilli circulator, alebant & ostentabant quandam Panacis speciem ferulaceo caule binum & 3, autem 4, assurgere cubitorum, multos in ramulos supernè diuisi. Ferulacea autè folia squabra, asperiora, in singulis petiolis, geniculis, singula prodeunt, ampla, tharsi, plumatimve ex interuallis æquis posita Pastinacæ, & folijs constans multi in vno petiolo, oblongo: Africani ferè floris luteoli aut pallentis: flores in umbellis pastinacæ aut Bæucis, quam etiam assimilat tota plantæ hirsutie incana, radice longiore, albida, nec ita dissimilis: in Venetiæ & Flandriæ hortis meminimus gustu aromatico, calfaciente, & digerente, gummeo, oponaceum succum redolente: quare meritò putetur hæc, ut si qua alia, Panax legitima.

LASERPITIUM.

CONTRA quàm sit hodie ab istis autoritatum racenatoribus, minimè nobis lubet multas accurare super hac historia paginas ex veteribus, quibus nunc quidem si viverent fortè essent ipsæ plantæ notæ. Laserpitij dico Sagapeni, permultarumque eiusmodi gummicarum, quæ videntur Dioscoridi & Theophrasto non visæ, sed lectioe aut auditione acceptæ. Eamobrem non multa hic verborum velitatione, ut moris hodie, sed sedula lustratione & peregrinatione opus esset, quando antiquiorum manca sæpe, sæpius nulla recensio extat. Igitur ipsi quantum inspectione assequuti fuimus, candidis amicis lubenter impertiemur. E regione Massiliæ, & non procul insulis, quas videtur vocasse Dioscorides Stachades (quæ tamen putantur hodie illæ è regione Olbiæ, à Massileæ ferè dei nauigatione, vti capite de Stachade dictum fuit) inter multas raras nascitur ferulacea

& visenda planta, cuius radix prægrâdis, intus albâ, foris cineritiâ, succo prægnans, mollis, pinguis, odorata, maior quàm Thapsiæ, aut Ferulæ. Caulis proceritate & crassitie Ferulam æquat. Folia Paludapii, sed crassiora, rigidiora. Umbellæ prægrandes Ferulæ, aut latiores quàm Anethi. Semē Angelicæ foliaceum, rotundum, compressum, odoratissimū, & colore buxæ. Hanc Iacobus Rainaudus Malsilenis Pharmacopœus, stirpiū valde cupidus & peritus, nobis misit : deinde attulit Monspelliū quatuor ab hinc annis : quæ præceptoris eximii ingenii Rondelietio visa fuit Laserpitio aptius congruere, quàm quæuis alia ex multis, quas ille vidisset, Ferulæ. Satum in Belgio semen, an creuerit, nondum scimus.

LEVISTICVM Germanicam Laserpitium.



Laserpitium è regione Malsilia reperitum.

SPECTIOSA minus hæc superiore odore nec tam grato, nec perinde suauis, quam Levisticū eiusve speciei censuere. Folio enim Apii palustrius maiore, radice crassa, fusca, odore graui usculo, caule & umbellis ferulaceis, semine oblōgo, foliaceo, Sileris motani dicti. Vtranq; proponimus doctioribus arbitris expendendam : possunt siquidē esse in dissimili similitudine, & tamen congeneres, veluti ferulaceæ illæ Afræ vel Cyrenaicæ : Quibus nostratis triplicis Angelicæ & Imperatoricæ (eximius & penē diuinis, tum noninibus, tum dotibus nobilitatæ) si non sunt affines, certē accenseri, ne dicam præferri, sunt mentæ.

SPONDILIVM, Germanis falso Acanthum.

NVLLE non regioni sponte oritur hæc, & pro Spondyllo etiam vulgò noscitur : siquidem præter odoris gravitatem, à qua propter virorem, Spondylium, qui itidē fœret & radici similis est, dicta videtur, etiam nulla prorsum deest, aut aduersatur descriptio. Plerisque locis vdis & secus scrobes oritur, foliis longis & latis, Passacæ Heracleo maioribus, & incisuris propē æquantibus, crassis, laciniosis, albicantibus : Caule, umbellis, & floribus Baucis, candidis, latis : radix Hyoschiani, candida. Vniuersa nonnihil scetidi olet, & ab Acantho vero non modo viribus, sed etiam toto genere differt : nec enim spinosa vspiam : aut perinde emolliens est, nescio quàm verè, sed monebat quidā Medicus, huius solum & merum succum curasse pro enemate indi, ratus esse Acanthum verum, & sensum primū glaciæ, deinde stuporē inuevisse, cuius tamē peticulum nullum facere licuit.

LIBANOTIS Theophrasti.

NON multum videtur abesse à Theophrasti Libanotide planra, Hipposelini, foliis paucioribus, parum in ambitu serratis, semine in umbella foliaceo, lato, oblōgo, odore & sapore Angelicæ, radice ferulæ, quæ comam promittit villosam, suruam, Peucedani semē, vel Dauci, albâ intus, foris pullâ, odoratu medicatâ, semē Sylvestris Angelicæ, hanc Commentator, nescio si vidit, certē non descripsit, verum suo pictori præcepit vt pro Ethiopico Sefeli sculperet, qui perperam æmulatus est ex commentariis Dodonæi, cuius mentio-

D d. i.

nem

nem nuspian cur non fecerit facilè subodorari. Folius Lactuce syluestris, sterilis, orba caule, flore, & semine, Theophrasto memorata, nusquam nobis uisa.

CORIANDRVM.

VB1QY1 hortorum peruium Coriandrum, à cymicum putore, aut potius cicutæ fectore uiroso, & consimili facie, nominatū: tametsi & simili, ut videtur innuisse Dios. viri-
Consule Diosco. bus eognatum. Cuius sententiam si accuratius subduxisset Senesius, non quidem iam commentator, sed Diosco. immerentis defector, neutiquam tam multas farragines ex Galeno, Auicenna, Ruellio, Brasauola, in suas paginas conuulsisset. Quin potius, quod solertis interpretis & candidi est, à veritate Dioscoridæque stetit, neque nostra oclusa spectatione sic, nihil docendo, elapsus abiisset. Licuij enim cuilibet Philosophiæ mediocriter imbuto, dimidio paucioribus versiculis non parū lucis huic diffusulati asserere. Et decuit etiā Medicum doctum hunc admodum pauca dissidere: Coriandri aut herbam totam, aut semen in vsum ut plurimum venire: & eius quidem, aut aridi, aut virentis: neque tam multis rixis, sed multiplici experimento, & antiquorum certissima obseruatione, eius expressum suecum herbæve contusam, illitu tumorum feruores cōpescere; semen verò stomacho multis de causis proficuum, concoctionem iuuare, vaporum sursum eruptionem statumque impetum sistere, temperatæque qualitatis alimentum esse, unde sanguinis feminisque incrementum, ac ne quidem correctum prodesse, ne tantoperè auersetur illud meticulosi isti declamatores: cum quisque Pharnacopœorum, aut etiam è plebecula quotidianis epulis aut medicamentis correctum misceat, nullo inde percepto nocumento. Plerumque etiam illud siccharatum officinarū, neutiquam correctum est: nisi putes saccharo, igneq; igitur non aceti frigiditate, sed potius feminis siccitate & tenuitate, virus fortidumque spiritum abstergi putandum.

Rationis subductio igitur hæc est: Coriandri herbam præsertim succo frigidam esse, adeoque nonnullis in locis, Arabum testimonio, eius suecum epotam exitio esse: quod de Hiuala recentiores etiam exploratum habent: Herba nempe vesca & boni alimenti, succus cuius, hominem necat. Quapropter & sacris ignibus illitus reprimet succus inflammationē, exceptus polenta panis medulla, quam Galenus haud reiciit, ut qui libello de paratu facilibus, ex antiquis doceat hordei farinam polentam panemque & similia addi solita, non tam quò agant, quam ut agendorum succorum vires excipiant. Tametsi videntur etiā iuuare digerendo, & siccādo, ut hordeacea, aut etiā demulcendo, ut medulla. Atque huic responsio eruenda obiectioni de strumis: multā namque sunt non calida, quæ strumas incipientes discutere valent: eoque hic farinam fressæ fabæ addi vult Dios. tum excipiendo medicinam, tum etiā iuuando actionē: Digent namque faba, cumq; Coriandri succo mixta moderatè repellit exsiccando: quæ etiam vi testium phlegmonibus opitulatur: sicca enim optimè id præstare, modò modicè refrigerent & discutiant, præsertim initio, Methodus Galenica docet: sic Plantago etiam Dioscoridi, sic capilli Veneris strumas discutiant.

APIVM Hortense. ΣΑΝΟΥ

Græc. Πιτρίγιον. Gallic. Persil. Ang. Persile.

MALE equidem elinon quasi Lunaticum dictum, ab illo formidando affectu, quem accerferet esu, quàm à palustri solo, ubi non semper nascitur. Ei autem non desunt vires quædam Coriandro analogæ. Siquidem eadē fermè vtrunq; præstat, experimento & Diosc. suffragio: non tamè cum dicimus analogas, easdē aut similes, intellectu iri volumus: sed sic loquimur, ut enucleemus istius authoris scitū solèsq; ingenij, pauci eloquii & veritatis amicissimū. Vt quid nō argutetur nūc criticus ex Galeno, hæc Methodis aduersari, calidū nempe Apiū? inflammationibus oculorū mederi, æstuantī stomacho amicum mam-
 misq; turgentibus: & tamè hæc Dioscoridica medicatio, eiusdemq; intellectio, est Galenicz Methodi anima, perquam digna cui nauet quippiam operæ sedulus Senesius: Sic-
 que se expedit, esse præsidia non parum multa, quæ contrariis, aut valde diuersis polle-
 ant

ant effectionibus, & tamen eidem medeantur affectui eiusdem incrementi & modi. Id in capitis fracturis atque vulneribus facile de Galeni Celsique lectione, & medicamentorum collatione discas: quorum hic siccantibus frigidis, ille verò calidis digerentibus, etiamque humectantibus feliciter vsi fuere: sicque testium tumoribus violaceum farinis exceptum leguminosis quidam, alij verò Cretensis seruido vino exceptum Cumini pollinem medetur. Sic hic nihil mirum Coriandro sicco refrigerante, & paulum quid alstringente partim dissilipari, partimque repelli materiam eiusque incrementum, vel Apio calefaciente digetentque in halitum per poros laxatos distillari. Multa cum sint Apij genera, omnium frequentissimum gratissimūque cibus est domesticū, eoque merito tacita cōiectura magis quam certa vlla expressa figura, verum antiquorum putatur. Nam illud perelegans & rarum, quale viruit in hortis Crispatum superiore anno è montibus allatum, nihil distat, nisi foliorum crispatis oris, argutioribus. Apium, que & minutioribus incisus. Istis haud absimiles ceteræ species, viribus tamen efficaciores & medicatæ magis.

Paludapium vocatum satiuo quidem maius, sed ingrati tum saporis, tum odoris, vt si PALUDAPIVM quod Apium metito fuerit Chrysippi Dionysijque consilij Medicorum, à cibus abdicatū, quia propellus paroxysmum epilepticum excitet, acieque oblit: istud palustre si merito censendum. Est tamen efficax valde, eoque Arabibus & Pharmacopœis nonnullis vsitatus in syru-
pis ad obstructions, Bisantino & ꝑ. radicum.

OREOSELINVM, siue Petroselinum.

OREOSELINVM verò radice est crassa, longa, alba, odorata, acri, aromatica, quam quā caulem promit, capillamenta quædam in ambitu habet Libanotidis modo. Folia à Venetis reperto Macedonico Petroselino similia & æqualia: caule non procero, sparsos: Semen & umbella non diuersa. Rarius istud, nisi montosis Lugduni, prope Sequanam, & in valle Ostensi Pedemontana.

MACEDONICVM.

A DOMESTICO perparum distat effigie Venetorum Macedonicum vocatum: Folia consimilia, aut potius Saxifragæ Pimpinellæ: caulis cubitalis, albicat umbellæ, semenque euaniidum, pusillum, minus, minorisque energiz & virium, quàm satiuū Apij, multo studio ceptum est coli, quia rorum, nescio an verum.

HIPPOSELINVM, siue Olustrum.

PERQVAM similes Olustrum & Smyrnum, adeò vt minus circumspectè vtrumque exploranti, alterutrum vtriusvis possit veram delineationem representare: at cui vtraque planta viridis præ oculis, atque descriptio non item. Magis conspicuæ differentiz sunt hæc. Istud genus, quod plebecula frequens esitat, præsertim primulū asparagos dum promit, vocitatque Macedonicum vel Alexandrinum, vt Angli, in hortis copiosissimum, vbi tædix illi crassior, magis succosa, vefca, & tenerior, quàm suapte sponte nato. Foris color pulchus, intus albus, odora, gustu grato, & nonnihil medicato. Caules edit alæve multas statim à radice, & folia Apij palustris, sed maiora, rotundiora, viridantia ex atrore, vel lurida: caulibus striatus, bicubitalis, concavus, Apij: umbellæ, chorymborum instar, pèculz visum turmatutatem assequitur, onustæ semine copioso, atro, vnde illi Olustram, pleno, graui, semisphærica figura, sed paulum quid utrinque retusa in basi, medicato gustu acri, ad Smyrnam accedente. Doctiss. Marcellus & Brassa: ola esse verum Hipposelinum asseruerunt, quod qui respuunt, anili prorsum argumento, non vt veritati, sed suæ potius dignitati consulunt, ne & Leuisticum vulgare abiutent, pro maiore Selino, nève verum Smyrnum, doctiorum omnium iudicio, melius & repertum posterius in Italia, in hulus locum sufficiant. Sicque volens vidētiq; errores ingeminat, cudit, & tegit Senensis dictator, in saceto hoc seculo plaudente. Virgilius Marcellus tibi peruetus interpres immeritò videtur, quippe hoc

Leuisticum
vulgare,

non est peruertere, si radices foris nigras, intus albas in quopiam non tibi viso codice aut exemplari legit & scripsit. Peruerteret autem, si contra quàm author innuerit sensum exponeret, atqui si, ut tu vis, Dioscorides nullibi meminit, igitur nec aduersatur, nec Mathi-olus merito Hippofelinum verum auerfatur. Quod tamen vulgus Italarum auidissimè expetit in acetarijs, non secus atque Germanorum, Anglorum & Græcorum, qui etiam- num, ut iam tum tempore Dioscoridis, cum Smyrnio confundunt. Valde familiare olus est, alit bene & præstat eadem quæ Apium, sed efficacius. Sic Augla plebecula Pulegium Origanum, Anagallidem autem Pimpinellam facit. Ex Hippofelinum Alexandrinum, Apium vocant. Leuistico aut est semen multum diuersum, sapor, odor, & tota umbella: nul- lus fermè vsus in acetarijs, non enim oleracea est, qualem optat Dioscorides, sed ingra- tissima & acerrima gustu.

SMYRNVM.

FAM in procinctu fuerit vera Smyrnis cognitio, & cum Hippofelino ac Leuistico di- stinctio, cui nota sit illa planta multis iam diu Belgic & Gallic hortis enata. Cuius ra- dix cõsimilis Hippofelini, aut Ferulæ: folia pauciora, maiora, crassiora, ima retusiora, sum- mo caule circumatæ rotunditatis: quo quidè traiecta, ut Perfoliata herba dicta, cernuntur, proxime ramicellos amplexa, umbellis Anethi aut Perfoliatæ donatos. Floribus albicanti- bus, aut pallentibus, ubi semen fuscum, subrotundum, Raphano minore, Brassicæ par & si- mile, prorsum Myrrhæ spirans, acre. Commentator commentatorum Senensis, morosè ni- mis, cum in superiori suo, tum in hoc Smyrnio semen Brassicæ exquirendo satagit, lecto- rem seque intricat suo more. Nam & illic paucis iuteriectis lineis sibi refragatur, & hic quia, ut fermè eius omnia, emendicatam habuit plantulam, radice mancarn, umbellis semineq; chartis fortè appressis, eod; minus exactè cognitioni aptis) Brassicæ simile se- men negat, nec quicquam melius indicat.

LYGVSTICVM.

SI quis Genua itinere terrestri proficiscatur Sauonam, & paulum ad Izuam Austrina- marè versus deflectat, magnam copiam videbit huius Lygustici, inibi propemodum ubi Saliunca visitur oriunda: verù illic, vnde nomen habuit, apud Lygures, quibus nummus fermè Numen est, non solum hæc, sed etiam pleræque multo præstantissime stirpes negle- ctui habentur. Vniuerso illo tractu maritimo reperitur hæc, cuius semen fuscum, odorum, Fœniculi fermè, vescum est, multoq; vsui illic motium accolis, Mei simile & par umbellis, è caule Ferulaceo, alis diuiso, folia ferentibus angustiora, Galegæ aut Sileris radice Pana- cis, odora.

PASTINACA Domestica.

{ *Ang. Persennipe.*
 { *Gall. Pastinades.*
 { *Ger. Mören.*

QUIA sponte hæc in agris nascitur, quamq; quælibet paupercula gens pascitur, Pastina- ca dicta videtur, quemadmodum etiam Staphylos à radicis rapo Bryoniæ (quæ σάφυ- λος etiam vocatur) non ita absimili, appellationem traxisse potuit. Tametsi non esse figu- ra diuersam à satiuæ Pastinacæ, sed viribus duntaxat ignauioribus quàm Sylvestris, ex Di- oscoridis oratione non liquet: tamen, quia posteritatis consensu, & multo vsu ista recep- ta est, ideò vt genuinam agnoscere visum est. Similis Sifaro facie, similior tamen Elapho- bosco, Sylvestri Pastinacæ, siue Baucis officinis dictæ, visitur: lutei namq; sunt Baucis flo- res, & radix concolor, & eiusdem saporis.

SYLVESTRIS.

SYLVESTRIS similis est tota Carotis, seu Dauco, cui Galeni Pastinacam Sylvestrem succedaneam faciunt etiamnum Pharmacopœi. Umbellæ densæ & fatis inagnæ sunt: flores candicant. Escalent arui & sata, minor multò superiore, & radix eundem gustum, sed medicatum exhibet: minus tamen cibis expetita.

SISARYM Angl. *scyrret*. Gallis, Ceruys.

NOSTRATE Sisaron retinet cōspicua vestigia appellationis & similitudinis Sionis: alioquin ex descriptione antiquorum, quibus notissimum fuerat, non satis notum, nisi hac nomenclaturæ & radicum coniectura: ideo quòd vulgò frequens Norbonensi agro (non perinde in Italia aut alibi) vescendi causa alitur, legitimum putatur. Sapor illi quàm Pastinacæ domesticæ gratior, cui facie similis est, aut Laueri, quem Pastinacæ aqua-
*Pastinacæ aqua-
tica.*
 tiam fecerunt: sed in radicibus discriminis plus: sunt enim ex vna quasi radicis basi pendulæ, bulbosæ, teretes & oblongæ, Oenanthes Asphodélivæ modo; quæ quia vefcæ sunt essentæ illæ ab Hesiodo stultis exprobratæ, ut quondam ambigeremus fecerunt. Nam
*Hesiodi Aspho-
delus.*
 Dioscoridis Asphodelus non homini, sed pecori potius, aut sui alimentum cedat.

BATTADES, Ignames. Angl. *Patades*.

HVIC Sisaro non parùm accedere videntur radices illæ, quæ insulis non procul nouo Orbe dissitis, sponte oriuntur. **POTADES** vernaculè tum indigenæ, tum Hispani illic vocant, quibus hæc in patinæ & Veneris illicia frequens veniunt: singuli bulbi teretes, oblongi, Napum vtrinque obtusum æquant, color pulchellus foris, albidus intus, sapor gratus valde & tener, quasi Milii delicatioris, aut fabæ frescæ, eoque gustu insulse sunt, nisi condiantur: salæque aceto & oleo interdū eduntur, & vino perfunduntur, nonnunquam coctæ prunis. Hisce congeneres sunt & persimiles quæ ab Hesperia, Æthiopia, & Guinea afferuntur, Ignames vocatæ, quales aliquoties escauimus: folia vtriusque hederacæ & Maluacæ audimus.



PASTINACA Marina, an *Secacul Arabum*?

ERVTA shuius radices in maritimis sabuletis Norbone inter Eryngia, dum esitat plebecula illic Pastinacæ Marinam vocat: sunt enim prorsum eodem sapore, nec longè à figura absunt, nempe longiore radice Pastinacæ aut Eryngii; caulem sesquicubitalem, ferulaceum, striatū, Eryngij fundens, quem multæ alæ & geniculi emergentes ambiunt per intervalla vtrinque: folia crassa, mucronata, pingua, in quo summo albicant flores, quædamque rudimenta umbellarum effigiant: vbi semen spinulis refertum muticatum & Calcitrapæ, aliquantò Pastinacæ gustu, sed salso,

Bancia, an **ELAPHOBOSCYM**?

DVAS PASTINACAS Sylvestres, alteram ex Dioscoride, alteram ex Arabibus, scitè statuunt plebs Pharmacopœorum. Illam Dioscoridis, vti iam monuimus, pro Dauco substituit ex Galeno. Hanc Arabum, quæ dissimilis est (quippe foliis, facie, floribus & caule similima Domesticæ, sed radix minor, gustu tamen magis vegeto & medicato, & paucioribus foliis) **BANCIA** nomine discernunt; quam si attentius expendas & cum Elaphobosco Dioscoridis conferas, nihil prorsum erit, quod requiras, Monspellensium autem pabulum Ceruinum Elaphoboscum putatum, multum abest à vobis notis, vt superius dictum.

Bancia.

HVC etiam pertinet noua & perlegans illa, quam quidam vocant hodie Costum Illyricum: folia enim sunt lineamentis Paltinacæ maioris, terram fermè radentia, in quæ ramulis caulem sesquicubitalem sceniculaceum amplexa: umbellæ summæ in cogerie ramulorum lutei flores sunt: radix pollicem crassa, admodum amara.

Barbicapra & *L. MARI A Vulgi*, æt. *Rhodora Plinii?*

MARGINENSES herbidi, aut prata umbrosa, vda, lætiora, tēperatiōnū regionum Galliar, Germaniar, Italiæ, & Angliar, vix elegantiorē habent herbam istā, quam recentiores vocant *Barbam Capræ*, propter ramulos florum sectura racemosa amictos, in prælongas quasi comantes barbulas effigiatos, aruncos, spirillōsque caprarum imitantes: candore nuceo, puniceo, roseo ve colori intermixto, visū & odoratu periuicundo: folia Caryophyllatæ, sed situ aut Agrimonie, Vini foliū admodum exprimentia, superficie, rugis, & ambitu Agrestis Valerianæ, vnde vernaculum nomen: nam recentiorum est herba, nec enim de antiquis noscitur, nisi pro *Rhodora Plinii* habeatur, quod studio hic relinquimus, nec alibi in aliis excutiemus, vt lectoris exercitationi simul & iudicio id relinquamus.

CENTAVRIVM Mains Duplex. *κενταύριον τὸ μέγα.*

Gallis. Grande Centauree. *Belgic.* Groot Centory. *Ang.* Great Centory.

EFFIGIX & natura abesse Paruum Centauriū à maiore, superius patuit in illius classe. Maioris autem duo genera, foliorum incisura dūtaxat differre videtur, magis quam radice, quæ vtrique, cum maxima, equat carpum humanum: colore *Pentaphylli*, lauo succo, subrufo scete: flos & semē vtriusq; eadē: folia verò ex vno octona, aut septena, non pediculo, vt in alio, sed medio nervo aptata, tarsi aut ferratulæ modo, ferratis & profundè laciniosa: radices cōsimiles, quæ siccatz, vtrius *Rhapōtico*, talso eadē olim putabantur. Iam vtrauis nullo discrimine vtuntur sanguinem spuētes & asthmatici: etiāq; matricis fordidus educitibus, vtitur *Dodoneus*, queni aptius possent hic erroris insimulare critici, quā eius Centaurii maioris iconem, vt non legitimam, recusare. Nam illic potuit decipi, *Arabas* sequutus, qui vires maioris & minoris ferè contrariis confuderunt, hic neutiquam. Vireta enim *Belgica* plurimas huius Serratifoliū alunt plantas, vsul optimas, & nulla nota à vulgatiore, nisi foliis Iuglandis, discretas. Semen vtrique *Cnici* simile & par, in capitulo squaroso lacez nigre maioris: flos purpura albicat. Hoc posterius, *Belgicis* hortis frequentius: rarius autem *Alpinis* tractibus, vbi alterum frequentius, etiā spontè.

OTTHONNA *Italarum*, aut flos *Aphricanus*, æt. *Lycopersum Galeni?*

Belgicè, Thunis bloemen.

EX *Aphrica*, *Italia*, *Gallia*, cunctisque ad septentrionem hortis factus est inquilinus flos hic specior, quā salubrior: quem idcirco *Africanum* vocant, vel *Thunethanum*. Foliorum magnitudine, ortu, positu & serrato ambitu, quadantenus *Valerianam* *Sylvestrem* imitatur: in ramulis sumis florum calyces, ocellive *Lychnidis* maiores, intus lauo miniatōq; rutilant, holoserici emula gratia, sed tetro putent comminus odore: semen villosum nigricat, oblongum, compressum: fibrosa & scetida item radix, non secus atque vniuersa plantarum venenata non immerito creditur, vt cuius esu porcis tumeat tostrum & fauces, ac nonnullis, vt audiui mus, exitio fuerit. Cuius potius varietas est, ille duplō maior aureus, & tantō pulchrior flos, quem *Itali* *Othonnā* decernunt: horti in deliciis habent ad coronamenta: quia aut minus, aut perparum tetrspiratī solūs, aut caule, non diuersis, sed multo maioribus: flores multipla serie maiores & confertiores cernuntur, aureo fulgore visum oblectantes: calida gustu vtrique videtur, vixque opinionem *Othonnæ* tuetur, vt diximus in *Othonna* *Monspelliensī*.

AN VALERIANÆ nostrates sint Dioscoridis?

VALERIANA maior.

Ger. Gros Baldaam. *Bel.* Speercreupt. *Gal.* Valeriane. *Ang.* Setivall.

IMPENDIO

IMPENDIO morosiores sunt, qui nostratem Valetianam maiorem negant esse Phu apud Dioscoridem; nam florum Narcissi collatio, quam vnā illi vellicant in Valeriana, potius auctoris incusare diligentiam videtur, vel vniū frequentem illam inuersionem, aut peruersam, quantitatis designationem, *μακρὰ pro μικρὰ; ὀβόρα pro μείζωρα* (cuiusmodi in Dioscoride & Theophrasto crebrò obseruatur:) quàm Valerianam improbare, vtpote quæ cæteris indicis quadret, & plenè respondeat antiquorum Phu facultatibus, quibus multis valet, vnde Valeriana vulgò vocatur. Eius hodie noscuntur quatuor differentie. Quæ in hortis vbiq; maior & notior vocatur, caulem emittit bicubitalē, glabrum, concauum, eque geniculis folia prælonga altius sinuata edentē, Erucæ aut Pastinacæ diuisura: flores sunt nō inuenusti, in summis ramulis vmbellatim collecti, purpurantes per initia, odorī radix transuersa, humi immerfa, crassa, pollicē æquat, calidiuscula & exsiccans, lotio ciendo efficax, suaue olens Nardum; sed tantillum grauitatis mixtæ prodiit; certiore adhuc coniectura esse antiquorum Phu, quam potest quispiā festinè dictā putare à putore grauiū odore mixto Nardæ suauitati, quem Phu, siue Phy, aduerbio admirantis & abhorrentis auersarentur subodorati, qui sic appellarunt.

VALERIANA Sylvestris.

SVNT & sylvestris in Northmaniz & Angliæ humentibus nascentis, caulis, ortus, & flores Domestice multum similia: quinetiam radix, suauitas, Valerianam testatur, folia autem in longitudinem pedem & sequipalmum porrecta, altius incisa, & crenata minutim sunt, Sionis, Laueris, aut Barbæ Capræ ritu, floribus candicantibus, penè Eupathorū Canabini.

VALERIANA MINOR.

EST etiam gaudent syluosi riuiuli, humentesve tractus, præsertim Septétrionallum, totaque effigie maiorem Valerianam fatetur, minor tamen multò, adque imum folia ali-quàm multa promens, Nasurtii aquatici quadantenus; in medio caule minora habet incisa, superioris Valerianæ similia, flosculis syluest. Valerianæ, aut Nardi Montanæ radice longiore, geniculata, reptandòque sese propagante.

VALERIANA Peregrina Belgarum, & Herbariorum.

EQUIDEM nescimus nos, nec sciunt fortè qui huic Valerianæ nomen impertierūt, quid hæc habeat Valerianæ præterquam exiguam cum foliis similitudinem, aut potius cum Astragalo: sunt enim in cauliculis & pullulationibus confertim enascentibus, rectis, folia pennatim gemino stipatu concinna, serie nervo medio hærentia, minutius ac elegantius quàm in Astragalo, exiguis flosculis, multis, cōsertis, viuida cæxula placentibus, eque medio breuiā staminula aurea emittentibus: postquæ senem ætate media nigrum pusillū in siliquula oblonga, creberrimis filamentis radice donata. hortis Francei, Belgii, & posissimū Angliæ familiaris, ad concinnandas ædes, olfactoria, & coronamenta.

PHY MINIMUM.

PRÆTER relatas hæc est quædam harum omnium minima, flore & vmbella ex candore purpurascēte Thlapsi, & foliorum diuisura tertiz simili, sed adeò exigua, vt vix minoris adiugæ folia æquent, palmum alta, radix candida, exilis admodum, & Nardi penè infimis fibris similis, odore tertiz: interdum montosis locis saxorum commissuris, interdū in segetibus, vt propè MonsPELLIUM, adolescit. Nec non sæpe nobis visa & enata in Anglia.



Dd. lili.

MON

MONTANA Nardo.

DE Montana Nardo Anguillarii iudicium & descriptionem sequimur, istaque planta admodum oblectatur, quam inuenimus tum môtibus Mindeno còterminis, tum Veganiis arduis accliuibus: natura paruula est, Valerianæ minori persimilis, flore & folio, sed purpurascente, Erucæ diuisura, & Valerianæ maioris: radici bulbi, bini, oblongi subsunt Orchis ritu, è quibus caules sesquipalmm alti.



PHYTEUMA Norbownsum.

QVAsi foret ad amorem serendamque prolem apta, Phytenua vocata fuit: fortè etiā seminis pertusi occasione, quale etiā copiosum in singulo pericarpio, sed exiguū Hyoscyami par, rotundius tamen, pertusum impressum è foraminulis, visitur hodie in Galloprovinciæ, & Norbong oliuetis propè Monspellium: vbi studiosis admodum notum est isto nomine, effigieque Valerianæ minimæ: verum folia illi in imo infectoris luteolæ sunt, superiora autè diuisura & magnitudine puillæ Valerianæ: plusculi sunt flores albi muscosi oleæ: semina pusilla instarq; vnionum rotunda: sed quæ paululū cernuntur compressa, vestigium foraminuli insculptum habentia, inclusa Plinianæ folliculo Rhedæ, in cauliculis palmaribus & sesquipalmaribus, reptantibus, Radix exigua Valerianæ minimæ. Tameñ non nescimus è tam concisa descriptione nulli fermè integrum esse quodnam Phytenua, verum sit asserere. Tamen patientius duximus istud coniectari, quàm vt Mathiolus Campanulam quandam, à Fuschio & Dodoneo iam diu depictam, intrudere.



PIMPINELLA, aut Bipinella. Arg. Burnet.

ANTRIQUI sntatnr indictz omnes Bipinellæ differētiæ, idq; recens nominis adeptæ à foliorū binis ordinibus pinnatim, plumatim tarsive effigie digestis: cuiusmodi Filipendulæ sunt perquam similia sanguisorbæ Bipinellæ, eoque hic recensendæ & distinguendæ quodam cognationis & consecutionis filo. Est itaque Bipinella quæ minima, frequentissima ruri & domi notissima, pedem aut cubitum alta, exili radice, exiguis Pentaphylli, sed numerosis & teneribus turionibus, oleraceis multis foliolis, æquis spaciolis Chamedri vel Eufrasie similibus, ambitu crenatis & bini ex aduerso positi: Summis in canlibus rotundi flosculorum glomeruli muscosi, interdū punicej ex candido, interdū subfului insunt, qui floribus elapsis Adonidis, vel Mori fructū exprimunt. Poculis gratiā conciliat sapore & odore aromatico & vinoso, quodammodo Melonis: nec minus in acetariis expetita, ex oleo namque sale & aceto Belgj, Angli, & Galli libenter esitant. Peramica visceribus, Hepati, Cordi, & præsertim spiritibus, perhibetur: magnè commendationis etiā ad Pestilētes morbos, vt cuius succo etiā abiguntur febres exitiales, locis gaudet incultis, aridis & squalidis collibus & marginibus: Alstrictoria vi & exsiccante pollet: citra mordacem vellicationem: Eoque internis & externis sanguinis eruptionibus & vlcerebus opitulatur: vocaturque Bloerwurte Germanicè, id est, Sanguinaria vel Sanguisorba.

SANGVISORBA altera, maior, sine Pimpinella.

HÆc tamen natalibus differt, & plusquam cultu, contrā quā nonnulli arbitrantur, tamen quanta quanta est, vt maior multo, sic similima est. Folium inrerdu Bëtonicæ par. In aliis & caule duum, triūve pedum alto. Capitulis item iisdem, sed lōgioribus, rufescentibus, semine anguloso, triangulari: herbidis, montosis lubens oritur, & plurima in Angliæ Northamptoniæ pratis & pascuis prope Aigshor: vtriq; vires eadem, sed hortensi gratioꝝ & potior est. Suauem tamen & maiorem vino mersam meminimus illic.

Bipinella Saxifraga vtriq; an PHELLANDRIVM Ph?
Ger. Bœrnerel.

QVIA Saxifragiæ nomenclatura planè diuersa genera notat hētbarum, & perquā diffita, vulgōq; indita, noluitus ita nominis aura sonōve abripi, vt naturæ vel cognatas classes, vel cognitioni mutuz accōmodas, facili diuelleremus: non enim magis hīc cū Dioscoridis aut Italicis Saxifragijs cōgruit, quā diuretica Rusco, Polygonato, vel Asperago. Harum aut notissima hircina, nonnullis Bipinella, cuius folio adeo similis exir, & facie, vt eadē planè putetur: nec eas sēper pilis discernere est, vt putat verifcatori *Pimpinella habet pilos, Saxifraga non habet villas*: nam eodē proximè loci tractu videre meminimus Saxifragam foliorum interna superficie pilosa: nullos tamen in Pimpinella, Sanguisorba, vel hortensi videas. Anne non folijs innaros, sed inter frangendum tractos villos, renuissimave & semē Arachneæ stamina, innuit, qualia in Scabiosa animaduertas? In caule rotundo, glabro, cauo, è geniculis, flores in vmbellis, albi, Dauci semē, acre, Carui, sed calidiꝝ, acrius. Radice multo acriore, albida, Dauci Syluestris. Germaniæ, Belgiæ, Galliæ, Angliæq; in pratis siccis, secus sepes.

MAIOR

In syluis verò tota maior & vmbrosis pratis, sed minus acris feruidave, quā minor, & folio longo propius exprimit Apium, quā Pimpinellam. Creberimus vsus apud Belgas vtriq; seminis & radicis calculo frangendo lotioq; proliciendo, vehementior siquidem vtrumque præstat, Proindeq; nulla magis Pliniani Phellandrii opinionem tuetur. Ruta quippe pratensis dicta, & Parisiēsis nostris præceptoribus Phellandrium putata, multo minus quadrat, multoq; ignauius præstat id muneris, quā Hircina Isthæc, neutiquā à viroso hircūmq; olenre sic dicta (Dauci namq; Pastinacæ vel Ligulstri quiddam, nec insuauē redolet) sed quia illa adulti hirci, eo quo docent Præctici modo, sanguis & carnes eximium sint calculosis præsidium. Etiamq; Ictericis & Hydropicis. Petrihindula verò vocatur etiam eadem prærogatiua.

DAUCVS secundus Selinoides.

VENETI Pharmacopei quā Matheolus Daucum alterum facit, Saxifragam dicunt, illiq; vires consimiles frequenti experimento asserunt: nihil tamen obstat quin sit Daucus alter Dioscoridis. Folijs namque Coriandri, aut Petroselinii Macedonici veri, do natur. Semen illi in vmbellis oblongum, angulosum, Fœniculi modo. Radix aroma olet, suavis gustanti, superneque comata, Mei modo.

VVLGATVS Ammi.

QVIVSVIS fossarum ripis, nec solū inter olera sponte Galliæ & Angliæ videas vulgare istud Officinis Ammi Iunio & Iulio, flores pusillos, in sumis albicātes, radia ros, vmbellis Carui gestare: semēq; Augusto exiguum, pullum, sed nulla aromaricitate, acrimonia pauca, amarore ingrato, & proinde verum Ammi inficiante: caulis sesquipedalis, & bipedalis est, rotundus, in aliis folia oblonga, bina, terna, & quina, singulo quasi pediculo, & alia pusilla latius sparsa, Hircinē planè, Saxifragiæ, aur Sisari, summas vmbellas obfident: radice Cicute, albida.

Anisum.
Carum.
Creticum verum.

Daucus niger Theop. sine Carotta rubra.
Carotta syl. sine Daucus Officinarius.
Cresofolium.

Ammi

Anni omne. { Creticum.
Gustu Origani.

Gingidium.

Secundus, peten Veneris.

Vifnaga.

Percepier Anglorum.

Caucalis triplex.

Oenanthe herba.

Filipendula.

Oenanthe sine Filipendula montana.

Oenanthe maxima Cicuta facie.

Cicuta.

Cicutaria.

Myrrhis.

varietas.

Seseli Peloponense folio Cicuta.

Seseli Creticum sine Torabon.

Siler montanum.

Seseli Pratenfe Monspel.

Thalictum, Sophia.

Delphinion.

Melanthium satiuum.

Melanthium syluestre duplex.

Cuminum vulgare.

Ethiopicum.

Syluestre villosis glomerulis.

Cuminum syluestre, siliquosum duplex.

Nucula fymestris Septentrionalium, an Bunion
Diofe. & Bulbocastanum Tralliani?

Pucedonifacie pusilla planta, an Pseudo Bunion
Diofe?

Heliochryson.

Sideritis altera Diofe.

Sideritis Achillea.

Achillea montana.

Millefolium sine militaris flore { albo,
purpureo,
luteo.

Millefolium aquaticum, Coriandrinis foliis.

Stratotes Millefolium.

Aquatica Sedis facie, sua reddenda classe.

Tanacetum { maius.
minus.

Matricaria non est Parthenium.

Abfynthium.

Abfynthium vulgare non differt specie aut si-
gura à Pontico & Romano.

Abfynthij veri due duntaxat differentia.

Abfynthium Sardinum Galatie, non Santa-
nicum Gallie, est Anglorum, Germaniū, &
Gallarum, Abfynthium Romanum.

Abfynthium Seriphium sine marium verum,
folio & facie Abrotomi facine.

Seriphium Egyptianum.

Seriphium Commentatoris falsum.

Santolina sine semen sanctum officinarum.

Capnos, sine Fumaria.

Fumaria varietates.

Fumaria lutea, montana, & alba, sine Split Iby-
rica, an Eriy Phragmites & Fumaria Cori-
dalis Galeni.

Capnos Plinij bulbosa.

Capnos bulbosa caua, & Varietates.

Chelidonium maius.

Aquilegia.

Artemisia.

Artemisia tenuifolia.

Artemisia altera.

Artemisia marina.

Ambrosia.

Abrotomum mas.

Abrotomum mas Monspellensium.

Abrotomum peregrinum.

Abrotomum formica, (hamacyparistia).

Cotula fatida est verum Parthenium, & an Ga-
leni & Pauli Amaracum?

Antemides, sine Chamamilla.

Leucanthemis.

Cotula merna.

Buphthalmum.

Heranthemum, Adonis.

Helleborus niger Theoph. folio Ferulaceo.

Pyrethrum vulgare.

Pyrethrum umbellatum.

ANISVM.

MAGNI fuit olim Anisum antiquis, præsertim Pythagoreis: non modò quia cibi ap-
petentiam reuocaret, vnde Anisū & Anicetum dictum putant, sed vt verisimilius èri
vixit tā; immodicus, remittit & laxat tensiones flatulentas internas, & externas. Et sanè
nullum è cæteris flatum emittentibus oleraceis seminibus gratius est ventriculo, minus ha-
bet acrimoniz, aut plus suauitatis, quàm istud semen, quod neutiquam, vt ex Diofco. Gale-
nus arbitrat, 3. gradu hodie gustanti apparet calidū: nisi quia ruri rarò aut nusquam apud
nos visitur, in hortis verò vbiq; gentium etiam Septentrionalium, vt Germaniz & Angliz
prouenit, cultu & solo nonnihil deponat caloris.

D. A. V.

D AUCAS Cretensis Ferus Diosc.

VI naturæ sic appellationis cum Cauclide videtur particeps Daucus, quæ etiam *Δαυκίος* vocatum, à feminis in umbella quasi surfuraceas verruculas & aspergines ostentantis effigie, à qua & viribus communis nomenclatura fuit, diuerso aliòque folio à Daucis est, nam quod primum designat Creticum vocatum Dioscori, à Selinoide non parum differt, nec tamen id sola Creta fert, quippe Germanicæ Alpes non modò, sed etiam Genuensium colles, & Geneuentium circa furam rupes, hoc Cretico abundant, vnde Lugdunum atque alia ad emporia hodie venum defertur: eoque plurius emitur etiam Venetiis, quia ad Theriacam & similia anthidota efficacius est, quouis alio congeneri Dauco, cuius folia exilia, inter Fœniculū & Carottā media sunt, vmbellis cādīdis, floribus Anethi, copiosum semen, oblongum, vt Cumini, sed lanugine albidum, gustu acre, odorum, & cuius vsus potissimum est: vsui etiam radix, quæ Pastinaca minor, gustu feruidiore, & odoratiores. Huic, quod minus sit Creticū, si quid deest, solum, celūve erit. Sanè effigie nihil, viribus autē perparū abest. Quo tempore Senensis cōmētābatur istud, Patauinū viretū vnam aut alterā plantā alebat, vnde ille habuit, quod opinione illi faciebat non nisi in Creta oriri.

VENERI Pharmacopei quam Mathiolus Daucū alterum facit, Saxifragiam dicunt. *SAXIFRAGIA Venetiarum*, illique vires consimiles frequenti experimento asserunt: nihil tamen obstat quin sit Dauca alterū Dioscoridis, foliis namque Coriandri aut Petroselinī: semen in vmbellis oblongum, angulosum, Fœniculi modo; radix albeat, aroma olet, suauisque gustanti est, su- *DAUCVS altera*, perneque comat, Mei modo.

D AUCVS Niger Theophrasti, CAROTTA Vlgario.

FECSY similitudinis cognatio, quæ Daucis cum Carotis intercedit, vt Theophrastus hanc Daucum nigrum censuerit. Est tamen duplicis à colore radicis differentia: Carotta: isthæ namque flauet, altera purpureum atrum remittit succum elixa fixaue, cuius vt plurimum gule iritamento apparatus est: at vulgus. Mediæ videtur inter Daucum & Pastinacæ naturæ, vtrique congener: neutra tamen dici possunt. His qui Behen *CAROTTA*, album & rubrum augurantur, suo respondetur loco. Istis nomenclatura indita fuisse videtur, ab illa quam cum Carui similitudine & cognatione fortitè fuerunt.

CARVI.

CARVI namque radix, & folia Pastinacæ agrestis similia, vsus, efususque non valde dispar: vtrumque enim olere mādītur: semen tamē vegetius & odoratius Carui, præsertim eo qui pratis Ostensis vallis provenit, albis floribus & vmbellis, caule pedali & sesquipedali.

Vsuarius D AUCVM Officina, inter Caryotam & Pastinacam Syluest.

NVLLI t huius deest copia Officinis Italix, Gallix, & Germanix, quæ istud frequentius Cretici penuria vsurpant, duplumque nonnulli subdunt, freti Galeni sententia: tamen non parum facultatibus & effigie à Dioscori. Daucis abest: edunt hunc loca tum frigida, tum calida, fragosa, & margines steriliores: è radice lignosiore & minore quam Carotis; cui multum similis, caule cubitali; foliis latioribus, lutescentibus, Coriandrinis, ad Bauciam accedentibus: vmbellis albidis, & semine.

AMMI.

COMPLVRTA Ammi genera, quæ passim vbiq; hortorū obuia, neque planè displicent, quia Ammi nescitur effigies vera; neque tamen placent, quia multa in semine considerantur. Quippe *ἄμμι* appellatio videtur perpassillū quasiq; arenaceū exilitate & colore semen designare, quale Diosc. *ἀρεμνίος* seminulūve dicit, Origanū respiciens feruidū, exsiccans. At quod passim in hortis visitur foliis Sisari, satis superq; patet è superioribus.

Et rursum illud quod in Patauinis hortis eultum, etiamq; non procul Ageno & Garumna in Aquitania lectum adhuc seruamus: foliis & vmbellis Dauci Cretensis, semine & radice hortensis Apii, neutiquam illis in Ammi semine viribus expetitis præditum est.

IGTVR quod semen plusculis abhinc annis exoptum fuit deuchi ex Syria, aut Creta Venetiis, hortensi Apio par, sed flauo, gustu aromaticum feruidum Origanum præfert.

præfert. & pius satum, non vietum, aut marcidum, delusit nos, & in eam suspicionem coniecit, quam quidam nos monuerat, fieri posse ad Theriacæ Venetæ mysteria, vt quispiâ hebræus mango, Cretensius & Syriacorum portuum Telonarius, decoctione dilutore semina maceranda meruerit: sicque compendii causa, cum Pharnacopœis Venetis non parum gratiæ inierit.

GINGIDII species videtur.

MVLTIAM sunt anni cùm industrius Pharnacopœus Martinellus nobis hanc allarâ ex Syria assererat: sed cōtrâ, nos esse indigenâ plantâ meminimus, & biennio post magna copia in vinetis & segetibus, inter Pila syluestria & Caucales crescentem vidimus: quam si facie & viribusad Gingidium alludit, tamen ex Diosco. & minus accurata descriptione nullus ausit pro Gingidio certò asserere: Planta enim est Caucalidis natalibus & facie eadem, folio tamen longiore & angustiore: illi umbella candida, semen lutescens, odore pastinacæ syluestris.

CEREFOLIUM.

Cerefoliū tamen, vt pro Senēsis cōmētatoris Syriaco deferant Medici multi & mulierculæ, nunquam efficiunt ipsius persuasiones: est enim cibus gratius, efficacius & multò exploratius, quod hinc amotum, quò relegandum censcat ille, peruelimus scire.

VISNAGA.

Visnagam verò peregrinam, vt solent pleraque sibi missa videri, multis Italiz locis, præsertim via Pefaro Romam, & Aquitaniz Ageni, secus Garumnam & Burdegalam vidimus & xque bene potest congruere descriptioni atque ceteris: nam de umbella, nulla mentio in Dios. Foliis est pastinacæ syluestris tenuioribus, & caulē, sed nudo, & minore diuirta prægrandi, adeò & rigida umbella, vt denticulatus sit apta, flore candido.

SCANDIX.

SI quid coniecturæ captari potest, cuiusmodi planta fuerit Scandix, id sanè ex capitum confectione stirpiumque cognatione accipiendum videtur. Descriptio enim non tam ambigua quam nulla est. Hæc tria serie recensita olera Syluestria; vixdum innotuere vlli, propterea quia incertis & paucis, partim etiam nullis verbis designata sunt. Nam Peccen Veneris, Fumariæ gustu, foliis, & vsu reperiuntur: vulgus Pharnacopœorum etiam Venetiis, putat & vsurpat. Acrimoniz verò & amaroris eiusdem momenti sunt argumenta, quæ sunt Galeni de Fumariæ acrimonia: quam sententiam merito docti viri vellicant, & ipsa reclamant res. Sic Chelidonii minoris, Ari & caprarum experimur multò mitiorem acrimoniam, quam illis tribuerint antiqui.

PESTEN VENERIS.

PERCEPIER Anglorum,

QVI Percepier Anglicum probè perspectum habent, harum duarum stirpium vtrius simile esse sciunt, & neutiquam isdem viribus secundum: amaror etiam & acrimonia in eo percipitur, & falsim valetudinis causa olere manditur: Figura ei Cerefolia nupernati proximi; sed herbula semper est, nusquam Spithameo adultior, toto anno suapte sponte erumpit, arido & trito solo luxuriat, sine caule, sterculis herbaceis: vehementer & repente vrinæ ciet, muria conditum seruatur: & ex eo aqua stillatitia magno vsu elicitur. Hanc plantam proponimus magis quam asserimus, quia Herbariis non valde notâ, nequid quod sciamus descriptâ. At Angliæ tamen Bristoliz arbitramur, frequentissimo apud mulierculas vsu receptus est.



CAUCALIS.

POTUIT dici Caucalis à seminum effigie, quæ vascula oblonga & semisphærica imitantur aut cùm præarida strepitum edunt hæc semina ventis concussa, vindemiis exarant. Et sanè luxata videtur lecto Dioscoridis, aut quispiam non impetitus videtur orz codicis

edocis hæc verba, folijs Apij similibus, adie-
cisse, quæ postea in contextu Latinum irrep-
serint: nam nostris Græcis exemplaribus de-
siderantur, & etiam superuacanea videtur,
vti vir magnæ sedulitatis & exercitæ cog-
nitionis Anguillara annotauit. Eam plâtam
quam ille Caucalidem autumat, nos iamdiu
collectam in præruptis S. Specus vocati, ad
Fanû Magdaleng in Prouincia Norbonensi
hic appingendam curauimus, & liberum sa-
cimus quid cuilibet ea de re videatur. Est
hæc caule Fœniculi, & folijs, & diuisura, cu-
bitum alta, vmbella albet, & odorata est, ra-
dix vnica, recta, humi pæcta, candida, sapore
pastinacæ. Verum hoc magis placent vulga-
res Caucalides, quia sût caule, folijs, vmbel-
la & semine hispidis, eodq; magis congruît
verbis Dioscoridis.



Dux namq; sunt in nostris vinetis & segetibus differētiz, altera enim candida, folijs mi-
noribus, sed caule proceriore, & hæc Matlioli. Altera purpurea vmbellis seu floribus, so-
lia habet latiora & crassiora: semē maius. Est istud semē argutū & elegans, nam triquetra
oblonga, & spinulis horrida habet glutinā, Glycyrrhizæ quadratæ similitudine, vespibus mordi-
cus hæret, ea exuta granum oblongū, Auenæ exenteratæ modo cernitur, haud gustu insua-
ue: qua quidem satis expressa nota insigniuit Caucalides Diosc. & similibus discreuit.

OENANTHE, *flor. viciena aut vinacens.*

NOMENCLATYRA ista tres designarunt varias stirpes, sed florum decore, odore, & quan-
tatenus colore non dissimiles. Ez sunt Labrusca, siue sponanea vitis, & eius cogno-
minis Vitis sylvestris, primæ florum eruptiones & germinationes suæ quiddam halâtes,
cuiusmodi Filipendulæ, præsertim quibusdam tractibus Linguagotticis & Aquitanicis, radix
& flores spirant, sed suauius multo: quam obesse naris Commentator non respiciisset, nec
doctiorum sententiam spreuisset, si verba Dioscoridis pressius perpendisset, & locis aridis
petrosilque plurimam eruiisset: Hic enim in Anglia, vbi libenter vitimur, non procul Bri-
stolia ad Vincentij rupes & cautes deuexas, etiam in Germaniæ aridis, plurima Iunio &
Iulio, floribus candidis, exiguis, stellatis, confertis, Brioniz & Ruta sita. Semine muscofo,
squammoso, rotundo, Pimpinellæ, cui folijs etiam similis, Pastinacæq; sylvestris diuisura: cau-
lis cubitum & sesquicubitum altus. Radix non altè in fossa, sed latè sparsa & ampla, è pendu-
lis fibris multis pilularum, Cyperi, Præniæ semine, aut Asphodeli modo: quæ per bellè qua-
drant Dioscoridæ effigiei. Nam *μυγαδαν ρίζαν*, radicem magnam, amplam, tutamq; ex rei
cognitione & alijs collatis locis interpretamur: *καπλή παχυν*, caulem crassum, sanè habet
pro altitudine sui, quem palmarem facit: cuiusmodi est hæc nostra, nonnullis glariosis mon-
tosis: Demum *κασφάλας τρυφας πλυνίας σπέρνιδας*, capita plura rotunda habens: cuiusmodi
planè hæc sunt. Verum versio fortè ista calamistrata, & Pliniana inuitatione oppidò tubero-
sa, illius fortè Commentatoris, aut eius Theseo Tridentino, adegit: vt Aristolochia rotun-
dæ & adultæ, perquam similem facie radicē asruerit: quæ ab Oenanthetâ tum distat, quam
Bunium vel Bulbocastanum Tralliani à Filipendula: quod plebecula Gallica, Germanica
& Anglica eum monuisset. Illa enim *F. uerottæ*, Germani *Leis nulis*: Angli vero *Kipper nuts*
vocât, vtriq; à nuce, castanea vel basilica, sapore & similitudine: neque enim eminet tubero-
culis, nisi valde vetus, vt Aristolochia rotunda. Et *Kipper nuts* opilionû nucem sonat, quia
illis cibo cedit: est enim oleraceus bulbus, edendo totus & gratus. Castaneæ sapore: folijs
Gingidij, vel Scâdicis, vti superius diximus, in pediculis & mollicellis caulibus, teneris & ca-
ducis: floribus itè pusillis, albis in vmbella, adeo eidè, vel Pectini Veneræ, similibus, vt ciuf-
dè naturæ videatur. Semine Cumino aut Fœniculo minore, odorato. Arua & pinguis vmbro-
sa amat. In Hollâdia, & Anglia plurima, præsertim ad Pagum Cleston propè Bristoliâ.

OENANTHE *vulgaris.*

Philipendulæ nomen assequutæ sunt itidem plantæ duæ, quæ vt Oenanthes non ita dissimi-
les, ita hic commodè referendæ. Ac si natalia species, minime Oenantè dicas harû duas:

Es. j. alterant

Bulbocastanum

alterum quippe plurimum solo viginoso & prateali, & tamen Commentatoristis nomen inscriptit Oenanthes, Filipendula ademit, quæ præterquam quod viribus, etiam natalibus risuosis & saxeis, vt diximus, magis quadrabat & recentiorum consensu.

Hæc quæ minor & veræ Oenanthes similior, radicibus amplis, globulis oblongis, prolixis, filimentis pendulis: turiones promit, imaq; folia Apio hortensi, teneriuscula, saturè virentia, cubitale & sesquicubitale caulem, geniculatum, alis folijsq; & umbellis Anisi vel Coriandri, flores albi, pusilli, ætate in conuallibus herbidis aut verrucis pratensis Angliæ: Möspelij etiam prope pontem Cellénou, Magalonæ inter Narcissos, atq; Grammontiam sylulam circum,

OENANTHE siue Filipendula altera Montana.

RARIOR multo quæ hæc depicta Filipendula, nulli dum memorata scriptori. In cellum montium verticibus, vt Norbonæ ad Vegani, in Dei paradiso vocato, Casceri contermino, nobis eruta, radice non æquè fusa vel ampla aut cirrosa: sed proxime caulè bulbosis, teretibus, longiusculis, æqualibus scemè processibus, modicè protuberantibus, Corradæ annotinæ partibus: Pæoniz modo radicata, Caule assurgit sesquipalmum alto, crassiore, rotundo, non nihil striato, & fulcato, imò mediocri sui folia alterno situ emittente Filipendulæ inter & Millefolij, exigua Cornucervi diuisura: extremum florum, thyrsus album, speciosum amplexa, cuculatis galericulis, crebribus, cõsertis, conflatum, in Cristæ Galli, vel Chynoforchis, vel Napelli speciem.

OENANTHE Cicuta facie succo viroso crocante.

NEC quidem admodum nota hæc, nisi Borealis præsertim Angliæ, erumpit ruuulis, lutulentis & riguis ripis, vbi Paludapium, cui folijs non absimilis, vel Ruta pratensis similior, multo pullulatu, virore tetro, colore & facie Cicutæ. Caules bicubitales spargit, è radice in pares Asphodeli albi bulbos multiplicata, & quasi brachiata, nullius fibræ vinculo aut interuētū (secus Mathioli) continuos, teneros: gustu acres & iugratos, succo lactico primū, deinde flauescente viroso & exulcerante pregnantès: Umbella cicutæ: cui affinem autumant, qui maleficio parè expertos se asserūt. Vfos namq; in acetarijs nihil factum fuisse propius quam vt interirent, aiunt: alios, qui elusissent, vertigine tenebricosa palantes, nutantes, attonitos, inq; gyrum versantes se vidisse. Et certè tam non est Oenanthæ, quàm ab ea distat Ruta pratensis aut Cicuta. Ijs igitur & quibus ægrè lotiū it, secundinæ cunctantur, suadente Senenli, dato, & Themiso non Medicus audies: tautominus epilepticis, analepticis, atq; vertiginosis propinabis, quos tamen eximia quadā prerogatiua magnoperè iuuant. Filipendulæ radices, quæ calculū è renibus, mucū è vesica dissipare atq; excludere mulierculis, ne dū nobis, creberrimis compertum experimētis.

Cicuta, Cicutaria Myrrhis.

Ang. Hom-
blacke.

Ger. Schürling.

Hel. Dulle her-

nel.

Gal. Cigue.

CICUTA quæ flagrauit olim infamia viq; perneceabili, fuit semper notissima, & vniuersè à Græcis vocata *κικύδα*, à circumuertendo, siue gylando ea potos, qui correpti vertigine tenebricosa humi prolabeantur. Omnium regionum hæc indigena est, figura Cere-



Cerefolii, siue Pastinacę syl. aut Myrrhidis, & figura adeo cognata Cicutarię vt indiscreta penę similitudo, necis occasio fuerit nōnullis, qui esitārē, etiā nostra memoria: radice etenim simili, alba, breuiore, crassiore, caua superius, quā caulē alit, qui planē ferulaceus, quatuor aut sex pedes procerus est, cauus: dēfē admodū geniculatus & maculosus interdum, vmbellis dēfis, flosculis minutioribus, & anguloso Anisi semine: odore quā quauis alia nota, discernitur à Myrrhide: tum parua, quę Cicutaria non fœtens vocatur: tum ab odora Myrrhide vera, & saluberrima.

CICUTARIA.

CICUTARIA FATVA quæ minus Fœtida.

NE quęquam fallat, quia nō se prodit odore hęc, aduertendus eius color, qui atrior aliquātō, nec maculosus est, nec adeo putorē halātibus scrobibus, vmbrosis, vdis exit, sed ad margines & sepes paulō editiores & ficciores: alioqui nō minor copia secus vrbū aggeres & vallū sepes visitur. Equidē noxia & inuisa olitoribus & hortis, vbi spontē, viridiorq; & nitidior, p̄sertim minus feruidis, Petroselinoprorior & cōcolor, & minor tamen vera Cicutā.

Parietas.

German. Wilder Kerffel MYRRHIS. Gal. Pet. sil. Dāne. Bel. wilde Bietel.

ODORATAM hanc, siue Salubrē & esculentā possit quis vocare Cicutā, quā Myrrhidē, siue Myrrham, propter sua uolentiam, quiddā Myrrhę resipientē, dixerūt. Nec hęc perinde seqēns, vt superiores, aut procera occurrat, sed rarior, & in pratis, vel germinosis marginibus: etiam olitoribus ad vescendum in Belgio multa colitur: & esitatur in iusculis Cerefolii vice, cuius nomen apud Germanos asciuit, vocant enim wilde Bietel, id est, syluestre Cerefolium, quod odore saporisque iucunditate imitatur, etiamque facultatibus diureticis: facie verō est Cicutę, albicantibus ramis & foliis, tenella hirsutie, Pastinacę satiuę, aut agrestem referente: radix prægrandis, altē depacta, proluxa, nec faciliē auellenda, Ferulę aut Pastinacę esculentę, quā sapore & odore, sed magis medicato, & ad Smyrniū accedente, repræsentat: semen admodū longum Cerefolii, duplō maius, striatum, angulosum, fuscum, odorum. Hęc etiam Myrrhis Pliniana videtur: folius Cicutę minutioribus, caule breui, rotundo, saporis & odoris iucundi: quā o tta consusione à Germano odoro, Myrrhidē Romani perperā faciebant: vnde quisp̄m Scandicę vulgarem oleaceam meritō suspicetur, aut illius aliquam speciē: nam Syriacam Scādicem valde variā prodire certū est, & Adagio cōstat. Varia enim olera in Syria ali dicitabat plebs olim.

Flosculi vmbellis non diversis.

Myrrhis Th.

MYRRHIS Altera.

CICUTARIA odore, siue Myrrhidis, affinis ea admodū est, foliis & ramosis vmbellis minoribus, delicatioribus tamen, & semine oblongo, Dauici Cretici, exiliore, nō hirsuto, nec ita absimili sapore: à Geneuz & Saleuz viciniis mōtibus: peritus iuxta ac amicus medicus Pennius Anglus Londini ferendam curauit, nobisque impertiuit.

SESELI Peloponnesse, Folio Cicutę.

AD montem Lupi & iuxta edes Sacrificuli, in decliuius salebrosis Insulę montis Cęti, quā mare se pandit, est plāta quidem copiosa, sed nō ubiq; obuia, cuius radix magna, intus alba, foris nigricans, recta & altē porrecta, Ferulę Thapsię modo, odorata, & aliquantū acris. Caulis digitum æquat crassitie, sesquicubitū altus, ferulaceus, à quo promuntur alę turionēsve cōplures in ambitum sparsi, vbi folia multa, Cicutę magnitudine, sed incurua, pilosa & crispa rugatq;. Vmbellę multę Anethi luteę sunt: semē latū foliaceum, compressum, Angelicę figura & magnitudine, sed multo minus grauius: color illi ex pallore flauescit: odor suauissimus, Æthiopici adeo similis, vt statim odoratu, cum primū videremus, Peloponnesē coniectarimus. Et coniectu.



Ec. 17.

ram

ram certiore exploratione notarum & virum præceptores Monspellienſes ſulciant, vt nullus illic ambigat de eius aſſertione; cùm tamen antea nonnulli Thapſiæ ſpeciem ſuſpicati fuerint. Verùm Thapſia, quæ vernat multa in Aquitania Vaſconum, multò ab hac diuerſa, colore & vultu.

SESELI Creticum, Tordaliens.

PASSIM in ſegetibus Norbonæ ſecusque vias occurrit ſurculoſa, hirsuta, rigida, aſpera planta, folio rotundiore, Cereſolii, vmbellis albidis purpureis, paruis: quibus ſuccedunt ſemina copioſa, circinnata, quaſi toreumatis elaborata, vnde fortè nomen peculiare fuit, orbiculata, compreſſa, atque geminis valuulis, vt Ferulæ ſemen, conſlara, clypeoli ſpeciem referentia, guſtu Myrrhidis. Numnâ hæc ſit illa, qua ſe deceptum Cômmentator conqueritur, cùm ille ſcribere aut nolit, aut non auſus ſit, ambigimus: volumus tamen hanc non ignobilem plantam ſtudioſis notam eſſe, vt horum iudicia ad collationes accuratiores excitaremus: ne deinceps ſaltui cômmentatoris, qui innumeras propemodum, aut non nouit, aut perperam prodidit, aut ſilentio abſcudit, aſſueſcere diſcant; luculento enim detrimento eius ignauia, aut ambitio Tyronibus fore certum eſt, quemadmodum & nobis multos annos per initia nimium credulis, fuiſſe mentium & dolemus: non tamen illi inſultamus, quin potius veniam danus, ſi docere non potuit quod neſcierat: liberèque proſiterhur, nos dehinc non modò non liberius quicquam animaduerſuros in iſtis pannofiſ centonibus & cômmentationum aduerſariis, ſed potius ſi minus de re herbaria bene meruit, & melius voluit, gratiâ habituros, & melius in poſterum bonas horas collocaturos: potius, vt certa prodamus, quàm vt incerta, ambigua, ambiçoſè emendicata munera, furta, verſuras, cenſuras, iurgia, ſimultates, obtreſtationes, conqueſtiones, Apologias, Apomaxeis & recantationes, retegamus.

SILER MONTANVM Officinarium.

GENVINS plantis Seſeli cognitioni præſe reſtitutis, in promptu eſt noſſe, aliud ab iſtis eſſe Siler montanum officinarum, ſiue Siſeleos, quæ retinuerunt bono quidem conſilio, qui Neotericiſ anſam errandi dederunt, atque ſanciendi nihil aliud eſſe Siler, ſeu Siſeleos vulgò dictum, quàm Dioſcoridis Maſſilienſe Seſeli: bono inquam conſilio ſui ſunt. Eſt quippe planta multò maioris acretinis & efficacitatis quàm vllum Seſeli, eoque menſtris ciendis valde quàm commendatum. Duum eſt cubitorum ſerulaceus canlis: radix odorata Liguttiſ, folia terna, nò modò ſœniculo, vt Maſſilienſi Seſeli maiora, ſed vel Peucedano latiora, ac paulò minus Liguttiſ, vel Coronariu m Roſmarinum æquantia, mollia: vmbellæ prægrandes Angelicæ: quibus ſemè foliaceum, longius Cumino, colore pallido, quod guſtu etiam ſaccharo conditum, acrius quàm Æthiopicum eſt: tantò magis, quàm Maſſilienſe, cui acrimonia præfert Dioſcorides Æthiopicum.

PRATENſE SESELI Monspellienſum.

TVPIOS Lutetiani & Monſpel. plantâ illam quæ in pratis frequentior occurrit, Saxifragiæ tenuiſolii ſimilis, vocat Prateſe, Seſeli. Radix illi Dauci, vel Peucedani: foris nigra, odora, caulis bicubitalis, folia Sileri montano minora, anguſtiora, rigidiora: vmbella candida: ſemè Mei, nigrius & maius quàm ſœniculi, omnium Seſeliu minimè odoratum, eoque perparum acre, ideoque putabant olim quidam Monſpel. eſſe Maſſilienſe ſeſeli Dioſcor. Anglorum verò Pratenſis Saxifragia, ne cui ſimilitudine imponat, huic quidè ſimilis, ſed tamen & diuerſa, vt mouimus ſuo loco.

Sine Sophia Chirvrgorum THALICTRYM Dioſcoridis.

TAMETI induſtrii quidâ Thalictrum Dio. eâ eſſe Pratenſem, quam Rutâ ſcetidâ, ſiue luteâ Saxifragiâ Prateſem, nobis cômmodiore loco redditum opinetur, tamè illa magnæ cômédationis

dationis & meriti vulneraria Sophia vocata, apud Septentrionales præsertim, cum propter figuram, tum vel potissimum propter eximias sanandi claudendiq; viscera antiquata & maligna, vires aptius forsitan Thalidro conferretur, & eadem tuto asceretur. Quæ quidem in admodum succincta, nec satis distincta, foret Diosc. descriptio. Est enim Coriandrinis ramulis, folijs, & incisuris, sed tenuioribus folijs, albicantibus, Abrotano non absimilibus, virgultis sesquicubitalibus, gracilibus, rotundis, rectis, lignosis, pallidulos vel luteos flosculos, Erucæ vel Synapi sylvestris, nec siliquas dissimiles, sed exiliiores edentibus: Semē exilē, rubellum, candidius: multa in parietinis & arvis propè vrbes Galliz, Nortmania, Belgiz, & Angliz: sed rarior calidioribus ad meridiem. Hac pollicentur Carbonituri Paracelsistæ nullum non vlcus se percuraturos, cuius curationis cognitionem, nō item salutem promittendi fiducia, didicerunt à Chirurgis practicis, qui ætate Guidonis & Petri Argelatæ vixerunt. Cæterum, quod sæpius inuiti monuimus, hic etiam inculcādum rursum est: apud Dioscoridem collationum plerumq; excessus non de plāta, quæ describitur, sed in ea cui cōfertur accipiēdos: vt hic, Coriandrum pinguiore folio esse: & superius aliquot retrō capitibus in Cotyledone secundo, prioris Cotyledonis folia latiora, non angustiora: sic in proximocapite de Verbasco, sic capite de Enula, & alibi frequens.

An Consilida Regia, siue Calcaria flore recentior, sit DELPHINIVM, vel Sasanidrum Diosc?

Ger. Kitter Spern
Ang. Lærkes
claw.

QUAMVIS nuspiamvlla mentio Delphinij apud classicos authores extet, tamen non illicō necesse est hanc Dioscoridis codici irrepisse. Fieri namque potest, vt ista appellatio, quam foliorum (aut potius florum tuculla infundibuli) similitudo plantæ inuenit, louette, autore Diosc. indita etiā fuerit Sylvestri Cumino, sicq; duo plurāve nomina à diuersis scriptoribus accommodata fuerint propter varias facultates: quod idem non parum multis alijs contigit plātis, vt diuersa designētur voce à ninium comuni totius Cumini speciei: siquidem indicio sunt, non modò notæ satis perspicuæ, quæ descriptioni quadrant, sed etiam virium, quæ vtiq; similes prodūtur, nempe aduersus venena & alia incommoda: quæ dotes in Calcari equitis nondum plenē compertæ, in Anthora Arabum & recentiorum exploratissimæ sunt: vtriusq; hic mentionem facimus, vt ista expēsiōe iudicium excitemus studioforum. Est enim Calcaria folijs minutim profundeq; incis, exilibus, longis, viridatibus, confertim, quasi ex interuallis, nascētibus, vt in equitis calcari. Flores item purpurei, corniculis repandi, in morem Napelli dispositi. Hæ itaq; duæ, duas Delphinij delineationes explere possunt: quarum Calcar in fegetibus frequens, Anthora verò non nisi asperis montosis, nec tamen inibi frequens obuia. Prope Geneuam & ad Allobrogum Delphinēsum Alpes multa.

MELANTHIUM, siue Nigella.

Ger. Schwartz
Kumich und
Schwartz Kummel
Bel. Barbus
fact.
Gall. Nielle.

MELANTHIUM genuinum eiusq; quatuor differentiz, Diosc. concinniore quā solitus est descriptione, perquā notæ sunt. Priori & potiori Nigellæ dictæ officinis, atq; alteri, quæ à Citreo seminis colore, Nigella Citrina nuncupatur (si colorem exceperis) idem odor, sapor, vis, vsus. Folia, capitula membranulis intercurfantibus discepta. Flores purpurei, pallentes, semen multum, pingue, odorum, oleoq; efficacissimo reddendo aptum, quo puerperæ mulierculæ excludendo partui atq; symphomati isferico propellendo multum vtuntur. Vocatāq; vulgi persuasione Nardinum: nempe odoris suauitate & efficacia haud dispari. Illud oleum prælis expressum, nigro sed lymphido colore, pauca quantitate haustu, splenis tumores duritiq; de molitur: sicq; foris illitum. Citrina ex Syria alijsq; Orientis Emponijs aduecta nigella Itali multum vtuntur, etiamq; in condimenta, in placentas synapiq; addunt. Anglis iam & item Germanis hortis copiosior quā Italicis: vbi quæ odo re cæteris excellit, Romana quodam nominis eulogio vocatur: nam alioquin Romæ vel in hortis pauca.

Citrina.

SYLVESTRE duplex.

QUÆ VERO INTER SEGETES NORDONÆ PASSIM ORITVR SYL-
vestris ab Hortensi nihil nisi exilioribus folijs & odoris præstantia discrepat, ærimoniaque vincitur, sed Capitula & flores in solo nativo aliquantum maiora sunt. Secunda autem sylvestris, quam in Normano agro inter Druidum & Carnutum
Ec. iij. legimus.

Sylvestris altera

legitimus: capitula mucronibus in ambitum repandis retroré flexis, cuiusmodi in Lycostor-
no aut Aquilegia fert. Spernuntur tamē vtriusq; semina, quia & meliorū copia suppetat

ΚΥΜΝΟΥ ἡμεζου CVMINVM.

Ger. Kimmel.

Gall. Comin.

TΑΜΤΑ feracitius est inter oleracea Cuminum, vt etiam maledictis satum vbererrimū
luxuriat, vnde Cuminum quis, quasi pręgnans, à κῶμα verbo manasse putet: nec sponte
tamen apud nos oritur istud vulgatius, quod quidem aliquantum diuersum diuersis è lo-
cis Syriz, Ciliciz, & Greciz allatum obseruatur. Quod enim albicat, hirsutumq; est semen,
pręstantius habetur, ac idem cum eo quod neutiquam hirsutum est, apud nos seri & virere
solutū. Nec item putandum discrimen aliud fuisse Æthiopici Gallatiue, quàm loci pręro-
gatiua: visusq; est Hippocrates satiū istud albicans hirsutumq; Basilicum, seu Æthiopi-
cum statuisse. Nec enim argumenti vllam vmbram habent Patauini quidam herbarij, cum
alius generis semē pro Æthiopico Cymini ostendant, pusillum enim valdē est, acerosum, e-
uanidum, viribus multum & odore ab communi deficiens.

Æthiopicum
Basilicum.

STYLVESTRE Cuminum Diof.

SPRCIEM præferunt vtriusque Sylvestris
duz plantæ, quæ locis glareosis prope Aquas
Sextias Galloprovinciæ vbertim crescunt: cuius
stirpes aliquot & semen ferendum nobis Mon-
spelliū misit Iacobus Reinandus industrius Phar-
macopœus Massiliensis, & indidem in hortos
quosdam Italiæ translātū fuit, vbi rarissimū à pau-
cis colitur. Prima foliola Gingidij vel sylvestris
Pastinacæ modo diuisa sunt, radix albicat, parua,
cauliculi inflexi, exiles, Scandicis, seu Pestinis Ve-
nerci modo, sed albidis, rotundis, villosisq; glo-
merulis, globulos Arction imitantibus, vt per-
quàm scitè Dioscorid. notauit, tenera papposæ
lanugine cinctos, in spherulam densam, magnitu-
dine Pimpinellæ, Platani modo Globulariæ
Monspelliensibus dictæ. Semen dentis Leonis vel
Platani, sed multò minus.



ALTERVM Diof. Siliquosum.

ALTERI verò Sylvestri duz sunt plantæ, quæ effigie
sic facis & peræque congruere vidcantur: Ea namque
quæ ininus cognita, exigua & pulchra, nō procul Aquis
sextijs oriunda, compluria gerit cornicula, filiquosa, a-
dūca, Scorpiodes dictæ modo, sed crassiora, semine intus
præsepiolis distincto, colore flauo, oblongo: cauliculi
graciles, teneriusculi, & folia parua, Carui aut Scandicis.
Pestini Venerci Fumarizæ incisuris, profundis: exigua
radix, lutei flores Maio mense, Chelidonij maior aut E-
rucæ, sed minor.



ET eidē iisdemque natalibus siliquosa perquam similis sociatur altera hec, nec nisi folio tenuiore, angustiore, Sefeli Massiliensis diuisura, & ad imū radicis albidæ Cerefolij plurimum nascente distat, cauliculis fermē glabris, siliquaque maiore, semine inibi contento, Galegæ, subfuluo.



REGIA verò consolida alibi dicta, Cumini folijs, floribus purpureis & interdum candidis, speciosis, coronarijs, Calcaris antiqui in speciem, è quibus cornicula oblonga, recta promitur, semine Nigellæ nigro, adeò hortis mulierculi sç; familiaris est, vt minime notio- nis dilucidioris egeat: hæc itaq; ceu veras, nō mutis picturis, sed verbis volumus subdere, vt cuiq; quod visum sit de illis statuatur. Cum enim Cumini satiui sapore odoreve grati non polleat, nedum vt id superet, dubium est villanē sit Syluestre Cuminum. Alteri nam lutei flores insunt, & semina Melanthij defunt. Sola horum Regia, quam proinde herbam cul- cariam, Delphinium inferius dicendum, Cōsolida vocata, videtur adhuc Cumini sylvestris coniecturam posse fouere: tametsi vsus medicamentis aut cibis vel nullus, vel incertus.

NUCULA terrestris Septentrionalium an sit Bunion
'Diof. & Bulbocastanum Tralliani?

Bd. & Eid noten. Sebautis. Fauertottes. Ang. Kipper nutz.

VB1 superius distinximus Bunion à Buniade, maluimus præ cunctis alijs hanc Bunium Diofco. asserere, vt cuius nomenclario reliquam Diofcoridis descriptionem expen- denti, videatur à similitudine radicis bulbosæ Buniadis, siue Napi, appellata, & vsu, quia si- militur vt illa editur à plebecula: vnde fortè Trallianus Bulbocastanum, quasi castaneā Bul- bosam vocauit: alioqui nimis tota facies à Buniade dissidet: Anethi enim est conus, folijs imis, aliquantū latioribus, ad Coriandrum accedentibus: floribus in umbellis Anethi, sed albis. Semine Anisi minore: Radice rotunda, Cyclaminis, Castaneam æquante, fusca foris, intus alba, gustu Sisari.

PEUCEDANI facie pusilla planta, an. PSEYDOBVNION Diofco?

NEC non concinnè huc quadrat pusilla illa palmaris plāta, Peucedani facie folijsq; sed breuioribus & ad Fœniculum tortuosum Nefeli Massiliense accedentibus, ramulis intortis latus, in alas sparsis, cōcoloribus: umbel- la exigua, candida, Anethi semine, Anisi breuiore, exilio- re, gustu grato, aliquantū acri: radice crassiore, comosa superne, gustu Orcoselini, non lōga, parui napi, crassiore quā pro sui paruitate, cibo idonea: Qualē Bristolæ in Anglia, ad rupem Vincentij, nobis primū magna copia repertam, & icone damus.



ΕΛΙΟΧΡΕΣΟΝ vel ἡΛΙΟΧΡΕΣΟΝ sileris silos Chrysanthemum.
Ee. iiii.

ELIO.

HELIOCHRYSO eximium aurei floris decus, coronamentis, vt Theophrastus innuit, addi solitum, adque radiorum Solis repercussum, coruscant lucem & vegetam intuentibus vibrantes, corymbi nomenclaturam speciosam reliquerunt, nobisque signarunt certissima illius cognoscendi indicia, qualia in illo vulgato cernuntur, vmbellæ Corymbaceæ multis & bullis extantibus circinata, & aureo aspectu micantes, Tanacetis & Ageratis diuturnam coloris gratiam tutantes: in rectis virgis, gracilibus, viridatibus, pedem & cubitum altis, duris alis & folijs per interualla Abrotani, vel tenuifolij Arthemisiæ: exili & lignosa radice, Niceæ ad Thyrrenum mare, Genus Lygusticæ, & in Galloprovincia asperis, macilentis conuallibus, & desertis incultis, fruticat: pollet multum ad podagras & vlcera maligna, humorum impetum illuc incitum & ruentem reprimendo, lotium deriuando, & saburram vehementius impellendo: & eadem semine quæ Millefolium promittit.

SIDERITIS altera Diosc. an nostras Sanguisorba Bipinella.

APennatis pediculis & folijs quadantenus Filicis, nostram esse dictam Pimpinellam, vel Etymon plebeium testis locuples est. Esse verò vulneribus valde accommodam, nullus non nouit, qui audit vocatam esse Sanguisorba: cuius cunctas partes si Dioscoridis conferas descriptioni, nihil planè deesse, nihilque superesse facile intelligas: quin qui nobiscum sentiunt & faciunt doctiores, narrant etiamnum in Chio insula Sideritidem vernaculo adhuc superstiti dici. Sanè folia in celsura prolixoque; neruo, modo, situ, vtrinque; pinnata, Filicem fatentur. Deinde in ramulis gracilibus & longioribus, tenuibus viticulis sphaericos glomerulos, superne cacumine asperiore capitato gestanti, vbi clausum est semen: omnia demum suffragantur, & nobis inuitis Senensem præcipitis inscitæ specimen dedisse clamant: vbi caperebat quosdam, qui Pimpinellam hanc 3. Sideritidem autumabant. Nam folijs, inquit, Coriandri. Atqui nullam tam inscium putamus, quin facile videat, cum tertia nihil prorsum, sed cum secunda penitus quadrare Pimpinellam: quam præstitit retinere, illamque; nec descriptionem, neque; capitatam, fortè, neque; notam, magis spectandam, quam percipiendam, proponere.

SIDERITIS Robertiana.

CRATEVA Herculeæ est nostras Robertiana notissima & vulneribus sanguisque eruptionibus non solum, verum etiam vlceribus, adeoque potius nobis vulnerariis certissimi præsidij exploratione merita nomen hirsutæ Sideritis: folijs Coriandrinis, qualem Geranijs recentiorum ascripsimus, est.

*SIDERITIS ACHILLEA, latea, odora,
Alba purpurea eadem.*

HVC Sideritidi laudatus Chirurgus Achilles, Chironis discipulus, nomen famamque dedit, vt qua Telephij vulnera medicatus fuisse creditus sit: Ac quò citius quiuis nosse queat vel ab intuitu solo (quam in Recentiorum vel intempestiuas, vel salebrosas, vel confusissimas pedicas impingat) quid distet Achillea hæc Sideritis à Militari (rectius quam à Plinio millefoliū) vocata, sic discernat: Achillea hæc multo prioribus est scapis, numerosioribus, pedem & cubitum altis, & folijs tenuioribus, natisque; ac profundius incisis, Arthemisiæ tenuifolij similitudine, muscaria congesta, gerentibus, pusillis flosculis, dense numerosis, & quam Militaris maioribus, albidis, odorem medicatum spirantia, Arthemisiæ vel Matricariæ, cui etiam similis est, in æstatem duratura: radice fibrosa, lignosa: tota odore & sapore Matricariæ, vel non fortentis cotulæ, sed minus amaro. Solum in aruo edito amat pingue & lætum: cuiusmodi in Italij Romano & Tusco agro, & non procul Rioli, Pedemontis. Et passim etiam Gallij Lugdunensis ac Allobrogum.

ACHILLEA Montana, Artemisia tenuifolia facie.

PERLEGANS est, & parum frequens hæc, nisi celsioribus Calcaris & horti Dei, montium Norbonensium iugis: vbi Julio & Augusto. Umbellis aureis Millefolii, & quadratenus Parmicam nostram præferentibus lueat, è sparsis multis caulibus, pedalibus, gracilibus. Folia quàm superioris tenuiora, hãbitiora, succulentiora, viridiora quæ, Cotulæ odoratæ: radice pusilla Senecronis, Tanacetii, aut Abrotani: oblongo semine.



MILITARIS terrestris, &
Militaris aquatica diomotio

MILLEFOLIUM militare duplex proponitur ex confusa vel ancipiti descriptione; nempe Filici-folium terreste vnum; alterum aquaticum, & Cumini sylvestris folio; duabus fortè plantis, vnam in descriptionem congeffis. Vtramque seorsum damus: postremò aliud palustre fœniculi folium, vnde nomen factum.

hæmo alioque patitur, ut penitus rostrum, vnde nonnulli fecundum
 Hæmo d' d'par huius Militaris terrestris æchilleæ facultas, vti neque facies; verum, no-
 men si non vtraque ex æquo merita est; sanè magis debetur Millefolio, quàm huic
 Sideritidi: quippe, illo vlcera vetusta & fistulosæ, sinuofavæ, eximia quadam dote percu-
 rari, testatur Dioscoridis: quare isto videtur vñus æchilles, & postea fortè similitudine
 deceptus populus, nomenclatura est abusus, aut potius vsu suadente: magnopere
 namque iuvat vlcera, aut fistulas, nedum vulnera istud Millefolium, tum oleo, tum
 confuso. Plebeium istum consensum, & merito sanè, est sequutus Plinius, quem imiga-
 ritò lapsus insimulat istæ dentatæ censuræ nostræ ætatis:

MILITARIS, sine *Millefolium*, flore albo, purpureo, & luteo.

Germa. Gurben. *Gallis.* Millefucille. *Ang.* Tartarve, nose blede.

*FR*ÆQUENTIOR multò & nusquam non occurrit, tum terrestris, tum aquatica Stratiotes, seu *Militaris*, sic dicta, quia militibus vulnere sauciatis erebto & consueto iumento siue ferrumini esset, veluti Sideritis Aehillea, cui tanoperè sunt affines, præsertim terrestris Stratiotes) figura & effectus, vt cum Plinio vtranus recentiores quidam prævitaliter acceperint: adeò vt si illas non cognitas habuissimus, illis etiam ipsi nos subscripturi eramus: verùm è rebus ipsis faciliè discrimen perceptu: Terrestris namque Stratiotes paruior est, furculis rectis: foliis verd alatis pennatisve, Filicem inter atq; Filipendulam: sed minoribus multò & quàm Achilles breuioribus: Umbellæ ex disparibus ortu furculis gracilibus circinnantur atq; constant, plurimùm & passim pratorum & aruorum marginibus, candidæ: sed præter hæc etiam purpurascentes, & luteo aspectu micantes umbellæ Norbonæ in montosis, squallidis, editis, sed æstuosis inuenimus, & ad Magdalenæ faxem specum Prouinciæ Galliz, & Italiz Genensis asperis, vbi cinetq; colore, & lanugine pubet tota.

Varietal.

P u r p u r a
scens.

MILLEFOLIUM AQUATICUM

alternum Coriandrifolium.

Luteis floribus

¶ Vandoquidem hæc mutila aut deprauata visa fuit lectio nobis, post multam perpen-
sionem, animum aduertimus hanc repetitam foliorum Millefolii cū Cumino syluestri
colla-

MYRIOPHYL-
lon.

collationem, aptius nulli quadrare posse quàm illi Millefolio in aquis nascente, eiusdem cum isto speciei & facie, cuius folia quàm plurima à media ad imum scitè exprimunt Cuminum syluestre, aut Coriandrum: superiora verò sunt Feniculi, sed tenuiora, delicatiora, molliora, vt aptè etiam quadam habet lectio: non amaraci (vt falso legunt) sed Maratri: reliqua minora, sed similia supernè floribus Millefolii: vnde perspicua supina Commentatoris somnolentia, dū vsque & vsque carpit hunc & illum, ipse carpendus & ridendus magis, qui non videat hanc neutiquam foliis esse Semperuium maioriibus, magisque refrigèrantibus, sed potius Cumini sylue. Coriàdri, & Maratri, qualeni ipsius Senensis bellè pinxit. Umbella etiam huius est Millefolii, aut syluestris Cumini, cui hic Dios. confert, post fatuum fuit Mathiolo expendenda: vbi etiamnum animi pendemus nos, si non est luxata orationis series

STRATIOTES, sine Militaris Aizoides, inter Aizon species
reddenda fuit Dioscorius.

ENIM verò si huic sunt folia Sèperuiuo similia, sed maiora, nomenq; eidem inditū sit, quia incubet aquis, Dios. interprete, & innatando latiore sessiliq; basi suas occultat radices subtus, vel, vt verisimilius, propter facultatem vulnerariam, militi necessariam & notā, (nam alioqui effugit, imò omnibus notis, dissidere videntur: nisi quis harioletur militarem, quia sine radice, quasi sine lare & re, vt miles, victit vitam incertam & fluctuantem) sanè nequaquam illa Commentatoris erit Stratiotes. Sed diuersa facie à Millefoliis potius vera fuerit illa, quæ multis fluentis pigrè & fermè stagnantibus riuiulis in Belgio nò procul Antuerpia & ad Lisam flumen prouenit, Semperuiui maioris figura, maioribus multò foliis, mucronatis, angustis, Lanceolæ, Plantaginis longioribus, sed extremo angustiore & rigidiore stilo: E medio autem foliorum & ad latera exortis pediculis non longis insident flores ternis foliolis, quadatenus Ranunculi albi, sed medio lutei, & pillis hirsuti, è carinula, aut forcipula cancri marini trifida emergentes. Ei subest contractior radix, foliorum sessili latiori & quasi basi radicem compressam obtegente, sed indidè tenuissimæ & penè aciem fallentes fiducialè trans aquam humi demittuntur, alimentumq; lateñter sugunt, vermiculorum speciè emittentes: vnde plebi mentiuntur scelerata scamundicorum colluies, quæ mulierculis istis radículas in aque plena Thiola, quò maiores apparent ostentatas, iactat se eduxisse ex intestinis vermes, vt doctissimus spectatè modestè Dodonæus affirmat, & Ioannes Cruthmanus Mechliniensis, sibi visum nos certiores faciebat. Huic temperamentum esse Potamogetonis, siccandi & refrigerandi, certum: quare facultates sunt dispares (ne dicā cōtrariz) superiori Millefolii: quod renibus sanguinem potius prolectaret, dū vehementissimè vrinas mouet, cruenta ducit, vti nos scimus.

PEDICULARIS Alethorolophos, Pedicularia Tragi,
an. Scelopuros Plinii?
Germa. Kadel. Belg. Koode Kactelen.

SVPERIUS in Gallinacea Crista hanc minus quadrare Pliniano Alethorolopho, & inter Filipendulas aut Millefolia reddendā censuimus; quòd illis nō ab similibus sit ortu, & foliis itè minutim discēdis, in tenellis, palmaribus, gracilibus cauliculis, partini erectis, partim humi fuis exeat: propter autè flores Cristæ Gallinacæ, purpureos, aut albos, Alethorolophon & Cristam Galli, fecerunt recentiores: vsu alioqui hæcenus incomperta.

TANACETVM Millefolii, foliis, floribus Abrotani
femine, aut Agerati,

PROPRIUS Millefoliis quàm Arthemisiis, aut Parthenio, est Tanacetū dictū. Folia siquidè emittit pinnata Millefolii & Filicis media: Caules è radice lignosa, reptrice, fibroso-re, plures, fuscos, sequicubital'es, rotundos, geniculatos, nō nihil striatos, per summa alis diuisos, quibus flores aurei in umbellis Agerati, aut Menthæ Corymbifere insunt, semēque Seriphii Absinthii, aut Abrotani femine: quo vtuntur mulierculæ ad vermes necandos

dos & vitz stillicidia: gustu subacre amaricantis, cum graueolentia. Nascitur pratolis marginibus, & iuxta fepes & fossas agrorum.

Illud idem in Angliæ hortis in delicijs habetur, longè argutionibus sinibrijs, minutiori- *Varietat.* bus, & latioribus folijs.

Tanacetum non odorum Syluestre, in Galliæ Delphinatis sponte, prope Valentiam frequens oritur: nullo odore prædium, floribus Matricariæ, quibus à superiore discrepat: alioquin cuncta sui parte prorsum simile.

MATRICARIA nostras, non respondet Parthenio Paul. & Plin.

ABVNDS differimus inter Anthemides, cur magis quadret vulgi Cotula, Parthenio Plin. Pauli: quàm herbariorum Matricaria, quàm si vsum odorinæ respicias, quibus virginis morbis Matricidis opitulatur, vtrique possit Parthenium dici: verum hanc, quia longius abest à Dioscoridis lineamentis, postponendam illi duximus. Fruticat autem siccis vbiuis viarum, & hortorum marginibus squalidis. Folia Arthemisiæ aut Absynthio Romano propiora, quàm Coriandro: flores Chamæmeli Iunio & Iulio edit multos, sed odore Cotulæ, radice fibroso.

ABSYNTHIVM vulgare, non est aliud à Romano & Pontico.

*It. l. Assenzo.
Ger. Wermuot.
Bel. Absene.
Gall. Alluyne forte, ou Absynte.
Ang. Common Wormwood.*

NOscitur à *ἄσυντον* quia id pecus nō pascitur, neq; vlti bitur, vnde *ἀσύντον* dictum. Cuius veri nō pūi duz videntur differentiz, tamen et multæ sunt *ἀσύντον* species: Quod namq; vulgariū & amariū est, sponte natum vel cultum, caul. sicut cat. ramosus, folijs, figura, Arthemisæ incisus: incanis hofculis, rotundis, aureis, raze natione apertis: Ponticum est, tum antiquis, à præstantia & regione cognomine, tum recentioribus barbaris abstrictione, quàm in Ponticum saporem sua, non Latina voce, appellat, quem laudabant in Absynthio Pontico Diof. Cuiusmodi est vulgatissimum vbi peruium nostrum, sed Natalibus Capadotici Iuri montis & Pontis, vt pote puriore celo & aere perfato commendatus, magisque aromaticū, vt *ἄσυντον*; alia idem author & Galenus calem commendatione celebrauerunt. Et inter Arabes Mesues interpres, cū Romano Ponticitatem vindicasset, id est, abstrictionem siccat, & valde Medico vsui oportunam, idem Ponticum atq; Romanum esse, nihil forte huiusmodi meditatus, verū melius mandauit: de Pharamacopœorum tam fœdela habet Romani conquisitio & exploratio etiam nūciat. Romanum enim, id est, optimum, vti Canonillani Romanam ceteris præstantiorem & genuinam, expectunt. Quin ne Barbaros illud nomen Romani, & ceteris insigniorare conque-
ratur noster Verceletis Apollon, sciat Romanum id commendatissimū inter paucas herbas & sacrū plebi Romanæ fuisse, quod quidē victori famulatis præmio, & quasi omine fausto propinabatur, vt Plinius auctor. Et quod nostro æuo in Romano agro antiquisq; rudibus passim vifitur, non aliud à nostro est, & vtrunque Pontico idem est, Quæ non oratione descripsit Dioscorides, sed quoque regionum copiose fructus et, tantum in cunctis quod loci præstantius nouit, et, eodem enim illo monte cetera duo describit & commendat, nō quod non passim alibi, vt iam diximus, nascantur, sed quia vbi præstantius. Nec idem vbi specie aut figura discrimen assignat Galenus: sed tantum Dioscoridis huiusmodi sequutus, vt plurimum solet, vires præstantiores, non duersas. Ponticū habere ætate natura, sed vbi prærogatiua, quæ etiam in multis in regionibus vltionem ostendit. Liliū vbi odore non insuauis, vbi odoratum, & vbi ferè fœtidum percipiat. Sic Agamonia odora locis non nullis vt Xantonici, alij autem in experts odoris, qui in vltionem præstantius feret odorem.

Folia verò magnopere doctos torserunt: nam vbi videtur Ponticum minora habere folia, legebat codice & rei exploratione fretus præceptor Romanus, maiora esse, quæ Metathelis, vt facilius, ita nō quàm familiaris ferme omnium de plantis fœdentibus, extat sæpè in Theophrasto, sæpissimè in Dioscoride, vt capite de Herbario, Meo, & alij sint. Idem & in Gal. non suo, sed amunicium vito. Sed quod ex *ἄσυντον* obijciunt, non sufficit, nihil efficiunt: nam si magis odoratum, igitur & odorum erit alterum, quod vltionem non

gratia odoris vel suauitatis, sed fragrantia & vehementia plerumque; iudicatur, ut in Vngue odorato, Myrrha, pice, aliisque. Nec plura (ubi data opera) Absynthia meminit Galenus, capite de Abrotano; tres inquit sunt species vel differentie: una generis nomine designata, Absynthium vocata, cuiusmodi est Ponticum: Secunda Santonicum: Tertia Seriphium: Seriphium autem & Santonicum admodum sunt insecta ventriculo. Solum enim inter ea Absynthium, & maximè Ponticum, id est, Ponto natium, gratum stomacho existit: Quo ex loco istorum velitatorum placide derinuntur certamina: absolute enim vulgare nostrorum vocat Absynthium, quod in Ponto scilicet ex Dioscoride prouenire indicat, semoto specie vel generis discrimine. Sic certum stat nostrum Romanum, vel vulgare, à Pontico non aliud esse: sed loci gratia vegetioribus, non diuersis viribus pollere. Anarorem in hoc agnoscit Galenus, & buliosis vomitionibus atque obstructionibus extergendis necessaria asserit astringentem, ventriculo gratam, cui robur & vires conciliat: quæ quotidianis & infinitis propemodum, etiam vulgi, nedum Medicorum, experimentis, scimus præstare istud nostrate intus, forisq; admotum. Vina hodierna factitia tam multa optima sunt, & idcirco multis locis Germaniæ plusquam satis expetita, non Pontico, sed Germanico imbuta, foetorem nullus incusat: quin potius siccum, sicuti vino, inditur odore aromatico, & viribus recreandis apto. Quare ubi Galenus Pontico vtendum dicit, potius duo videtur respuisse, Seriphium & Santonicum, quàm istud, quod simplici & absoluto nomine vocat Absynthium. Si grauer olebat Galeno in Græcia, non foetet Romanum, seu vulgare, in Italia, Germania, Gallia & Anglia. Quin cætera potius à foetore & putredine tuetur. Nec huius foetoris Dioscorides mentit aut Plinius: Nam cum Lucretius pueri tetra Absynthia potui, valetudinis ergo, dari canit, non odorem, sed saporem amarum & tetrum, ut Aloe, innuit: vnde nomen Gallis *Allayne*. Sic ubi Theophrastus, ut illa, Absynthium & Fel terræ, amara & malè olentia dicit, non foetore, ut interpretes: sed odoris intensam vapidaque; iaculationem indicat, quæ nares rugat, crebrumque; ferit, ut multa odora, Myrrha, Vnguis odoratus suffitus. Plinium hic mēdaci, ut sæpius aliàs, accersit Senensis, ut qui Poticum amarus Italo Absynthio censuerit: sic ignauus fucus, nec Comenatoris partes agit, sed potius meri recitatoris, & nos quippiam eruditi haurire expectantes, abiens deludit. Respondeat Galeni doctrina, Galeni autoritate. Amari est aperire, abstergere, urinas ciere, & bilem purgare: id videas in Aloe, Centaureo minore, Chamæmelo, aliisque. Iam si Ponticum Absynthium Galeno tantoperè ad bilem laudatū ex Theoph. & alijs Medicis: id potentius præstat cæteris, potentiorè igitur pollet ea facultate, cuius ope potētius agitur: ea sanè est amaror. Igitur quo vegetius, eo amarius: & quātò Italo melius, tāto amarius fuit, ut Plinius, non sua, sed antiquorum Medicorum sententia, vnde hæc vertebat, asseruit, ut videre est cōferepti illius & Dioscor. capita. Vbi vero mera amara non cōgruere ventriculo Galenus inquit, si ut alimento vtaris, vetum: si ut medicamēto, contrarij ratio & etuentus docet. Aloe enim gratissima & vtilissima ventriculo, & istud medicamentum potius he pati quàm vetriculo cōparatum. At gustati Santonicū & Seriphium, minus quidem amara, ut Plinius notauit: sed tamen ingratiore multo odore & gustu.

SERIPHIVM Dioscoridis, Abrotani
fœmina facie.

Seriphium & Abrotanum fœmina mutua collatione Dioscoridi assimilantur: proinde perpessus apprimè notis & argumentis quibus utraque dignosci queat, tandemque naturæ cognitione ducti, & virum exploratione, sic statumus. In Galloprovincia montis celsi Magdalenz celeberrimi accliuibus quæ S. Maximinum oppidum spectat: re deuenti item Olbia maritima vulgo Galloprovinciæ Hyeres dicta, multum obuuium istud Absynthium fruticat: exilibus, leuibus furculis, pedè altis. Radix albicat, prolixa, furculosque; statim ab humo numerosos promittit, crebribus foliis minucim



minutim crenatis, teneriuscula lanugine incanis, vti Gnaphalium summo tenuis obstitosi vbi extrema capitula aureis floribus ballata fulgent: semine paruo, copioso referta, similitudine Tanacetii, sed minore: tota, candida, sapore & odore illius quod Romanū & Ponticū falsū putatur Absinthii Belgis, prouinde Romsche alse dicit. Adeoq; simillima Abrotono Fœminæ vulgaris, hortorum (*Francis Cypres*) est, vt haud faciliẽ vtramuis ab altera discernere sit: nisi quia hæc tota minor, odoratior, candidior, tomentosa, quod alteri deest, cui folia breuiora, sapor non adeo ingratus, aut vehemens. Atq; hoc non ambitosè, cæteris è sua classe amotis, huic inseritur, sed quia propius est Abrotono fœminæ, cui comparat Dioscorides, præfertur, propter summam affinitatem, qua vix credebamus differre à Fœmina Abrotono, nisi vtrumq; contulissetus Frequentissimum Norbonensi Nitiobrigum agros spontè frutescens & eadem Londini Sata in horto Hugonis Morgani & enata, neque quidquam mutata, vidissetus.

Galatium Sardonium, perperam Santonicum vulgi: est Officinarium Absinthium Romanum falsò creditum.

GE O G R A P H I A & Græcè peritis Lutetianam versionem, Græcūmve codicem Aldinum legentibus, faciliẽ licebit nosse, neutiquam Alpes Gallicas in Xantonum agro, vulgò Santonge existere, vbi crescat cognomen Absynthium Santonicum: sed secundum Alpes Galatiz, vernaculo cognomine Sardoruni, Sardonium vocatum. Sic enim etiam hodie legatur & restituitur, facili intellectu & proximè sequentis capitis repetitione, vbi in Galatia Asiatica Abrotonum, vtpote cõgener, oniri dicit: & quot Absynthii sunt species, tot iam eodem Galatiz & Cappadocia loco commendat Dioscor. vt ratio nulla sit hæsitacionis, aut in Santonicū Gallicū deprauacionis. Tota Plata Absynthio simpliciter dicto similis est, sed minor, minùsque candida: seminibus non adeo multis, floribus exiguis. Nonnullis Germaniz locis frequens: in Flandriz & Angliz hortis copiosa, & visu multò expetita, illic vocata Romsche Alse, id est, Romanum Absynthium, publica perũsatione. Quam sequutus Senésis (si Esculapio placet) in Hugaria, & Bohemia, Ponticum, istud seu Romanum sibi repertum prædicat. Nam Romsche Alse Conseruam, in officinis Antuerpianis & Belgicis paratam, mulierculæ Mulomadicæ & clinicæ lubentius emunt, quia non ita amaram, facilius deglutiunt. Deceptæ quidem, na si sic caret amarore, igitur & facultate amica, & grato calore. Atqui Ponticum verum, seu vulgare, viuus argumentis docuimus amarius esse: & Dioscorid Serphium ac Sardonium dicit aliquantum (non multum) esse amara. Nec minus Romanum posse, quam Seryphiũ odor & sapor indicio sunt.

Gallis Barbotine, Belgis Semen Zedaria.

E Q V I D E M semen sanctum, vel Contra, officinarum aut Santolinũ dictum, horum triũ Absynthiorũ, nullũ esse videtur: nam tametsi nonnulla amaritudinis & figuræ similitudo illis interfit, cunctis: tamen non adeo sunt plenè adulta horum semina, aut horridè amara. Ex satum nonnullis in locis vidimus semen peregrinum istud, ex quo fruticulos surculosus enatus fuit, vnde quaq; seminibus gliscens, pluribus semine quàm foliis. Quodque semen nondum, victum, sed plenum & recens qui sit nactus, si serat variis locis, faciliẽ plantam assequitur.

Aliud Peregrinum, sine AEGYPTIVM Absynth.

A G Y P T I V M quoppiã vocatum Absynth. Pollitrici formæ, foliolis albis, alterno situ digestis, digitum, altis apud Gesnerum iamdiu, & post penes Valerandum Demec sicum videramus, infirma aut certè nulla coniectura, Agyptio cognomine in scriptum & à quodam herbario missum, qui ex hoc semen sanctum produci coniebat.

CAPNOS FVMARIA.

German. Erdtrauch, KatzenKosuel.
Belgic. Scysecam ende Dypntheruel.
Gal. & Ang. Fumeterre, Fumiterte.

CAPNON, siue Fumum, fumidam, fumariamque è Græco dixere Latini, quia succo oculis illito, non secus ac fumo, exprimerentur vellicando lachrymæ: maximo hodie vbique vsu & veris reitibili prouentu notissima herbula est inter segetes & proxime margines, ramulis fibrosis, & fruticosis, quadratis furculis, ex viridi in cinereum pallorem languentibus, emergens: folia diuisura Coriandri: floribus purpurantibus, interdum albidis, & interdum rubellis: semine rotundo, viridante ex fusco, & æstate colligi oportuno; viget verò & floret herbula Vere, quum succus illi efficacissimus, & exprimi solitus ad Syrupos, electuaria, & pilulas Officinarum: amaro gustu & subacti.

VARIETAS.

IN Norbonensi agro minor multò, sed minus frequens inuenitur quædam Fumaria, ramulis & foliis palmaribus, Scandicis, nec procumbentibus; sed surrectis, & albicantibus, tum foliis, tum floribus: radice exili, gustu amaro. MonsPELLII rure propinquo Boutonet nuncupato, aliisque aridis glareosis vere etiam visitur.

FVMARIA lutea, montana, & alba, siue SPLITH Illyrica, an Asiæ
 PHRAGMITES, & Galeni CORIDALIS?

NOBILITAVIT hanc raris laudibus nostra ætas, charamque etiam fecit hortis & notam carenti metus & paucitas, paucis namque locis obuia, nec nisi calidiorum Regionum montibus Illyriæ, Dalmatiæ, Hetruriz & Norbonæ Galloprovinciæ. Serius nempe quam vulgaris Fumaria flores luteos, stellatos, Chelidonii minoris, Iulio & Augusto edit: folia verò Fumariæ bulbosæ, vel Chelidonii maioris, minora multò, glauca, cineritia, exilibus cauliculis, pluribus, sesquipalmaribus, & pedalis: è radice latus (parfa, fibrosa, Robertiani Geranii. Semine rotundo, depresso, atro nitente, in corniculis Fumariæ bulbosæ, vel Chelidonii maioris, minoribus multò, cui admodum similis facie & colore est, vnde scitè conieceret quilibet esse Capnum, siue Chelidonium Phragmitem Ætæ. Quam Coridalim Galeni qui assueverant, propter colicum dolorem, cui opitulatur, nimis anticipi vtuntur argumento. Quippe nostras etiam Fumaria idem interdum non instrenuè præstat, digerendo, discutiendoque viscidam pituitam, è renibus eliciendo saburram, quæ non rarò colicum dolorem efferat & ementiatur. Quin Coridalim videntur vocasse potius Bulbosam Fumariam, ab effigie Maudeæ auiculæ, cuius capitis galericulatum verticem emulantur flores cristati, turbinataque cornicula. Huius sapor sermè qualis vulgaris Fumariæ, sed efficacius videtur sacculus tenuare, atque incisos in lotium deriuare, vnde laus magna ad Hydropsen. Robur etiam addit visceribus, reliquaque præstat quæ Medici de Fumaria vulgari narrat, de qua quod ille dixit, contrarium de hac dici posset, scilicet raritatem auxisse opinionem, at vulgatam copiam nostratis Fumariæ laudi offecisse.

VARIETAS.

QVIA via ducit Flotentia Pistoiæ & Lucam Tuscam, hanc eandem Fumariam floribus albis fert, vt ferunt quidam amici nostri admodum periti: nobis tamen nullibi illis in monticulis, nec quidem in Iuliano, vlla visa fuit superioribus annis.

CANA radix Herbariorum, siue Bulbosa Fumaria Plinii, non est Magorum
 Frispha, nec Psyllochua.

QVANDIV, quàm falsi fuerint scriptores minimè mali, qui hanc Aristolochiâ rotundâ esse prodiderunt, quiq; etiamnù eandem quasi verâ rotundâ vsurpant, in Clematide obiter diximus: nomen autè occasio plantæ huic, & erotis illis fuit radix, quæ rotunda cum sit
 bu-

bubosq; & perinde vt Aristolochia rotunda faciat, ad vermes & maligna vlcera, facile opinionem illis fecit Aristolochiæ, qui veram nondum vidissent. Sed dissuadendo sat fuerant folia & flores, qui Martio & April in vmbrosis decliuibus & nemorosis saltibus frigidioribus erumpunt purpurei & aliquando albi, more, & similitudine Fumarie vulgaris, ad cuius folia multum accedit laetore calio & diuisura foliorum, maiorum tamen: semen pellucidum est in corniculis: in hortis autem Belgij alitur frequens, & reliqua Germania, vbi etiam è montibus oriundam habent.

FABACEA radice, altera CAPNOS.

Bel. Woonkens holwoytele.

Singularis item & penè par huius radix, sed minor, maiore tamè commendatione apud Chirurgos & mulomedicatrices mulierculas. quæ istâ puluerem efficaciorẽ & delicatiorẽ ad lumbricos interimendos prædicat. In Belgio, Germania, & Sabaudia, vt Geneæ aruorũ quorundam sepes & margines hac scatent. Meminimus etiam in Veganijs hortis Dei nos eruisse: non vlla totius facie nota, præterquàm radice exilitate, nulla insignita cauitate discrepans, etiamq; natilijs, nam iubi nuspium superiorem reperias, quæ alioqui multa occurrit, vbi neutiquam hæc.

CHELIDONIUM maius, Hirundinaria maior.

Ger. Groß scholwurtz, Schwalmenkraut, Goldwurtz.

Bel. Souwoytele, ende Groote Souwe.

Gall. Esclayre, & Chelidoine, Felongne.

Ang. Celadine.

PRIMA hirundinum translatione, vernaq; nostratis: scoli tempetie occit maior Chelidonia, non secus atq; minor, à qua tamen multum alia est, aliq; occasione dicta, nempe cum aciem oculorum succus illius acuat, hirundinulisque suis occæcatis visum restituere credantur herba ipsa marres: radicem etiamq; totam plantam in hortorum scrobiumq; marginibus multum obuia, & succo croceo, fuluiore, virosiore quàm Papaueris Cornuti gliscentem, neminè latere quit, tota reliqua facie ad Plinianum Capnum vel Aquilegiã comparata, folijs cæsijs, & siliquis tenerioribus, non ita diuersis: lutei autem sunt flores, Keiri violæ, feruidiore tamen acrimonia & foetidior est, minimè gustu aut odore grata: rarius intrò vtenda, commodius foris ad impetigines & ploras puerorum, necnon metallorum chymicas medicationes.

AQUILINA, Aquilegia recentiorum aut Columbina, nem sit

Panthos Theophrasti, sine Desiderium, Gaza interprete?

Ger. Ackley.

Gall. Ancholies.

Ang. Columbine.

SI hæc antiquis innotuisset, non dubium quin illis coronaria futura foret, est enim non vulgari nec inuenusta florum elegantia, carula purpura nitentium, aliquot calyculis cornutis aduncis vtrinq; gracilitate ceruicem & rostellam columbarum adumbrantibus, vnde Columbina Anglis dicitur, & doctissimo Aldrouando Bononiensi professori Panthos Theophrasti, cum illic versaremur, putabatur. Frigidiusculos Meridionalium tractus amat, pratensis etiam est Franciæ & Angliæ, sed squalidior minúsque hilari aspectu non culta, nam in hortis duplò, triplò, & multiplò flores densioribus & nitidioribus caliculis stipatur, triplici varietate coloris seorsim conspicua, aut in eodem vno flore distincta, albo, purpureo, & cæruleo. Reliqua foliorum totiùsq; facies Chelidonij compar & similis: maior & similima Plinianæ fumarie: semine itè lucido in foliosis recuruis infundibulis Consolidæ Regalis aut Melanthij, gustu tantillum astringente, temperatè ex calore siccitatis: eoque ad faucium pharyngis & tracheæ incendium & vlcuscula vitur plebecula.

Ff. ij.

ART E.

agrestis. ARTEMISIA.

Ger. Heyfuss. Groß Keynsam.
Bel. Bpnoct
Gall. Armoise, ou herbe S. Jean.
Ang. Mugwort.
Offi. Mater herbarum.

COGNITIONIS ordinisq; consequentione Absynthij generi Artemisiæ succedunt tribus hodie quatuorue differentijs distinctæ, quas, valere iussis ostentatorum velitationibus intempetibus, perspicue paucis secernemus. Quæ vulgaris cognitionis & vsus perpetuò fuit Artemisia, plurima vbicinis locorum secus sepes, & initetum margines, Absynthio vulgari, seu Romano, similima fruticat, procerior tamen, & folia maiora: supernè nigricantia infernè incana, habet: Semen item illi Absynthij, & flores albidì, odore non insuauis, sapor minus aut parù amarus. Viribus hæc exploratissima, quia in vsu aut sola, aut frequētissima, & vtilissima. Sed & eadem quibusdam locis inauspicatè telluris & præaridis adeò strigosa, parua, & odore quadam grauitate feriente visitur, vt alia protum putetur: vti Absynthio nostrati & Pontico solo nascenti euenire monuimus.

Varietas.

ARTEMISIA tertia Dioscoridis
 Leptophyllum.

HVIC studio nōnulli qui Dioscoridis aucto operam nauabant, Artemisiam vnicaulem nuncupasse videntur herbulam sesquipalmm, cubitumque altam: folijs minutis, Abrotani mari similiter incis, paruis, virentibus ex atro, lignosis in ramulis, floribus, semineq; quāplurimo tēsertis, parnis, & ex viridi luteolis, flauescentibus. Prope cistæ & oliueta Mōspelij alijsq; quāpluribus Norbonæ locis multa & nota: sed vulgo quodpiam Abrotani genus credita. Equidè per Dioscoridè licebit sic appellare, quia nō de sua sed quorundam sententia, hanc inter Artemisias recenset. Odor tamen illi non Abrotani aut Absynthij, sed Arthemisiæ prioris est, & prorsum eadem videtur, quæ Leptophyllos tenuifolia, seu Leptocarpus, ptoximo capite indicata, & in eulcata, duntaxat explicationis causa: & facultates autè videtur à quopiā auctore, cuius oratio multò cultior & pollicitatio maior de Artemisia est, quàm quæ Diosco. conueniat. Sed ille potius deceptus non pauca similitudine odoris & foliorum, indicasse videtur herbam illam fruticosam, odoris suauissimi & Sampsucum imitantis, quam fecimus cum doctis Abrotanum mare, vulgus Picardorum & Francorum: Herbam & lignū S. Iohannis vocitant, eoq; in coronamentis & lūborum superstioso cinctu ad epilepsiam morbū, D. Iohannis putat, auerruncandā expetūt. Hinc D. Ruellio dubitādī ansa iudicij hallucinati, quam factiosè vt solitus

Abrotanum
 mas Monisfel.
 alterum.



est

est illi improperat ille Bambalio commentator, qui omnia conuiciis hic miscet & dicit, docet verò nihil, aut dicit.

ARTHEMISIA Marina.

TAM nuppiam in mediterraneis, quàm frequens in maritimis istam reperies, eoque meritò maritimam voces. Pluribus fruticat sarmentis ab vna radice lignosa, fibrosa, surrectis, alternis interuallis, cineritii colore, muscosoque semine. Similiori Absynthio communi, quàm Arthemisia: flores item lutei, numerosi sunt. Folia ima & semè humi strata, paucioribus, sed maioribus incisuris: media vrò, aut superna, angustiora, minora, interdum vna, aut altera incisura, Portulacę marinę, aut Feniculo marinò non absimilia, carnosu, albertia, vti vniuersa planta, quę gratum de se emittit odorem, Abrotani maris semè: sapor subsalsus, perparum amarus, cuiusmodi Arthemisia prioris. In sinu Adriatici littoribus ad Lyo insulam & Venetam plurima.

AMBROSIA.

EXimia fragrantie gratia etiam Diuis expetita, nedum coronamentis, Ambrosia nomen finxit: apud nos autem nuppiam nisi satiuā Ambrosia visitur, eoque procerior meritò est, quàm quę sponte oritur. Nec quisquam argutor nostratis magnitudinem obicit, quam tripalmarem Dioscorides facit: multis enim, nec magnis de causis, incrementum decem tuncve capit hic fruticulus: cubitum altos edens complures ab ima radice caules, ramulosque roto è caule multiplices, striatos, graciles, à medio semè fummo tenui semine & stoculis quàm plurimis alternatim disitis, luteolis, muscosis, fursureisve acinulis, vt olea, racemosis, sed rotundis semper, nec latius sese aperientibus. Quibusdam inter folia è pediculis vtricoli emicant, angulosi, Echinati, minores & similes tribulo. terrefltri. Semen nigricans, rotundum, aut potius Gygarti vix æmulum, gustanti non ingratum. Folia Rutę similia, & circa imum æqualia, sed supernè maiora, maioribusq; diuisuris, Arthemisia, vel Absynthii, teneriora & tenuiora: vniuersa albicat planta, odorēque perbonum halat. Labruscę florentis vniuersę ut vix antiquis dicti, id est, boni odoris Bononię in hortis lectam multis ab hinc annis meminimus hanc, quę eadem etiam nū viret Londini fata, radix gracilis, palmi vel sesquipalmi.

ABROTONVM Fœminā.

{ Germa. Garten Cypres.
{ Gal'is. Petit Cypres & Garderobbe.

CHAMÆCYPARISSO, seu pumilla Cnpressus dicta, vulgò *Peris Cypres*, in hortis frequens colitur, & Galliz Norbonensis Nemauensi vnetis & campis patentibus fruticat plurima, via præsertim quę MonsPELLIUM ducit, sesquileuca ab vrbe, ad dextram, sesquicubitum alta, ex virore candida, Corymbis bullatis, crebribus, fuluo colore renitentibus. Mense Iulio est cætera hortenſi similis, sed odoratior, lignosior: huius semine necant lumbricos quotidiano experimento mulicreule esse: Idcirco Abrotonum fœminam minime ambigimus: tam quia notis candoris, amaritudinis, fruticis arborę habitu, Corymbis aureis, refertis foliis, minutissimè incisis, Seriphii modo, quadrare videtur: tum quia viribus scimus iisdē, nec ignauioribus pollere, quas Diosc. & Galenus illi vendicarūt. Huic quàm bellè cōgruat Diosc. gemina collatio Seriphii & Abrotoni. Siquidē Senēs Seriphio nullis notis & autoritate confirmatū, nō foret verum. Foliis enim Arthemisia est, aut Absynthii vulgaris, seu Pontici, cui Dioscorides & antiqui dissimile faciunt istud viribus & forma. Et cum asserat Galenus Seriphio & Abrotono vires consimiles & noxias esse, etiā fœmorē, acrimoniā ingratā cum fœlledine: nempe vbi mari propius oritur: vtrumq; autem viribus & forma sepius comparet, Seriphiumq; vltimo loco ponat, & vicinus Abrotono: sanē nullū inuenies Absynthiū Abrotono per omnia similis

Dodonæo responsum, in procinctu illi non est: merito ambigendū fuisse super Abrotano, cui perperam fuisse agnitum Seriphium: nam qui explicatiorem Abrotoni descriptionem haberet, potius ex isto de Seriphio, quam ex hoc de Abrotono iudicium suum eliceret, aut confirmaret: illa enim Arthemisiæ species, potius vulgare refert, floribus, foliis, & semine, ut metipse fatetur: minutissimis incisus foliis, Seriphii modo neutiquā est: ideo non Seriphium Pontico contulit Dioscorides, sed semper Abrotono semine.

ABROTONVM Mas. ἀβρότονου.

Germa. Siabwurtz, Scheswurtz, seu Sertwurtz.

AVRONE Gallicè vocata, & hortis rurique oriunda, Masculum Abrotonum meritò censetur, sarmentosum duriusque: seminibus tenuibus, odorum, subalbidum, amarū, foliis sceniculi modò minutim incisus, paulò latioribus, erigendis hortis & deambulatoriis concinnandis coluntur: flore luteolo, Absynthii, minore.

ABROTONVM Peregrinum. Cupressi folijs.

SABINA *Ægyptia.* **P**LVRIORIBVS ab hinc annis hanc elegantia & raritate memorandam stirpem eiusque nomenclaturam dono accepimus ab illustri professore Publico Medico Cesare Odone Bononiz, qui hanc Sabinam Ægyptiam vocabat, huiusque mentio facta capite de Sabina, exigua radice, ex vna stirpe pluresculos viticeos, caules rigidiores, nigricantes, folia Cupressina, aut Sabina, textura reticulata effigiata, longa, angustia, & per virgulta crenatis extremitatibus denuclatis foliis.

Arthemidis vulgarior, sive CHAMÆMILLA.

PYRETI.

ANTHEMIDI odor suauolentis mali, nomen fecit Chamæmilū, seu Chamæmalon, plebs autē Chamomillā, & Cotulam non feridā vocat: huius ē floribus & odore quaduplex est conspicua differentia, nominibus secernēda. Et Europæis regionibus frequentior vberiorque: luxurians vulgaris, dicta Germanis Chamamillbloemen, quæ Græcorū Leucanthemon: furculis numerosis, cubitū altis, erectis, in alas diuisis: quibus ab radice pusilla folia crebra minutim incisā & perangusta diuisura Anethi, vel Coriandri, viridia, tenuia hærent: flores in summis cauliculis numerosi, candidi, Bellidis, radiatim bullatum glomerulum luteum, quasi modiolum, ambientes, Cytonium malum quadantenus redolentes: semine pusillo, luteo, ineunte æstate segetibus tam frequens & satis, ut non parum incommoda sit: ingentis hæc commodi & vsus Gallis, Italis, & Germaniæ nonnullis locis, quibus desit copia alterius Leucanthemi, quem iam dicemus.

Arthemidis sive LEVCANTHEMVM odoratus, Rememororum.

Belg. Bloemische Camillbloemen.

VT suauius multò, quiddamque aromaticū Amaraci, aut Abrotani halat Romana hæc, sic multò ad aspectum hilarior & comptior est: ea denique notione dicta, qua Basilicas præstantiores plantas vocare soliti fuerant, uti Romanum absynthium, & Basilicum asparagon: Tenellis cauliculis repit, haud diuersa foliis, & floribus vulgatæ syluestri, resubili item fertilitate & perenni radice, qua sese instaurat, & fundit propagationes proculcationis contemptrices: eoque voluptatis ergò totum vertentem annum in Anglicis virentis attondetur, secus puluillos & toros infernens & ambulacra neglecta namque, protrecta, & resecta, foelicibus & vberius vernal & luxuriat. Siquidem Angliæ vniuersæ haud alia ferme nota, vel vsu recepta quàm hæc: Ruri miliari vno aut altero ab vrbe Lōdino plurima, herbida, arida, vbi sponte orta florū capitula & folia gracilitate elegantiora à cōmuni discerni queunt: Galliz & Italiæ meridionalibus (tamenti Romana dicta) rarior sponte. In Belgio & Northmannia ad Druidum vrbeulam, quò loci religionis ergò cōmissum fuit funeste & cruentum prælium, multa. Qui syrupus huius floribus, succo, & vino albo confit, multò ad splenis & icterum hydropis præsidium optimus.

Angl.




BVPHTHALIN, Oculis Bonis.
Millefolij folio, Chrysanthemi flore.

HÆc Germaniz, & Angliæ hortis inquilina. Romano autem agro, Hetrusco & Galloprovinciæ prope Olbiã ad mare Hieres vocatũ, sponte secus vias & margines satorũ, cubitales & sesquicubitales crebros spargit ramos, graciles, teneros: folia similia, sed latiora, ad Cotulę & Tanacetum nonnihil accedentia, creberrimis minutissimisq; plumatim & scitè ductis diuisuris Abrotami, Arthemisię concolor, floribus Anthemidis prorsum & odore: sed intus forsque luteis, vt Chrysanthemi vulgaris, aut Calêdulę: quos æstate, etiãq; in vsque brumam hic Londini vegetos vidimus in horto Morgani, & Bristoliz.

BVPHTHALINVM alterum, folio & facie Cotulę Fætidę.

NOw inelegans istę nobis reperta secus Arantiorũ lucos Olbiz in Galloprovincia maritima. Caules promit flexuosos, cubitales, & duos pedes altos: quos ambiũt folia tenella Anthemidis, latiora, Cotulę scetentis paria: flores sunt radiati, lutei, Chrysanthemi aruorum, aut Calendulę sponte nascentis. Hanc etiam nobis repertam in agro Romano meminimus.



Ff. iij.

CRAN.

Anglorum NIVEVM λευκακθελος, flore multiplo.

CULTIORES horti hanc eandem alunt, sed floribus adeo multiplici folio & radiata serie propagatis, vt cador eximius bullatum centrum prorsum operiat: nec alius, aut odoris sapor illi.

CHRYSANTHEMOS Anthemis dicta, vmbellis aureis-
ve bullis, folij facie, odore & sapore Romanz Cham-
milę est: Sed magnitudine vincitur, nullisq; foliolis radia-
tim cingitur eius vmbo prominulus: Belgio, Anglię, & Gal-
lię, non nisi hortensis est, vsus non dispar.

HERBARIO
rũ Anthemis
Chrysanthemos.

ERANTHEMON.

QVAM plantam Eranthemon Gesnerus, cui ostendimus, opinabatur, quia aptior haerens defuit, etiamnum veram esse coniectamur, similitudine & viribus Anthemidis persuasi: est enim Anthemidis facie, sed maior tota, & Cotulae similis, vel species, latioribus maioribusque floribus, Bellidis maioris, infernè rubentibus ex purpura, superne cā dore intermisso, melinaque bulla media, interdum inter alias Cotulas satis enasci solet (apud ingratus illi, odor Cotulae: Tamei periculosus est alex res, de icone lectione duntaxat notas, illico propter nonnullam similitudinem, quae nam sint, certo statuere, Amicus quidam Pyrrhetrum vulgare tuebatur Eranthemon genuinam, ob flores subtus purpureoscentes, & folia Anthemidis haud ab similia: verum radicis figura & sapor, utrensatus, nos dedocuerunt.

ADONIS.

TANTO minus sit Adonis, ut nonnullis visum fuit, ut cui bullae luteolae mediae, flores autem Anthemidis, semen & facultates longè absint: quare commodius nos inter Anemones.

PARTHENIVM, vel Virginea, est Cotula fatida, non Matricaria.

AMARACVS
Gal. & Pauli.

NON nescimus morosulos istos censors leuiuscula plerumque adductos notula, auctores perbene de re herbaria meritos, inscitiz traducere, atque irridere plerumque, ridendi ipsi cum forent: idque in Parthenii disquisitione liquido videre est, quod nolunt esse Cotulam, sed Matricariam autumant, propter duntaxat Coriandri folia: at tenuia Dioscorid. dicit: φύλλα τριῖ καὶ ἑξά, λεπτὰ: Intuere igitur Coriandri adulti in ramis media & summa folia, & fatebere collatione apprimè congruā, imò omnia Coriandri sunt: folia consimili diuisura, rami, situs, tenuitas, figura, præterquam ima perpaucata folia, quae latiora sunt Apii aut Oenanthes, quibus eadem soliorum dispartitas contigit, eoque scitè addidit λεπτὰ, nimirum vel collationem nō ad ima, sed ad media pluraque folia faciendam innuet. Matricariae enim nequeunt esse Coriandro, & λεπτὰ seu tenuia: sunt enim ipsa Coriandro maiora, nedum tenuiora, Arthemisiæ & Absinthio propiora parique reliquæ plantæ partes, floribus duntaxat Anthemidis. De amarore autem quod blaterat, indicat in legendo supinam negligentiam, atque in gustando satium palatum: est enim Cotula amarore inameno & perquam ingrato, ut Parthenion: verum hic nulla exuperantiz adiectione, foetidam subuirosamve & amaricantem dicit, πικρὸν, quo indicat non excellere amarore, sed, uti Anthemis Leucanthemon, amaricante sapore esse. Cui etiam, quia similis erat Partheniū, seu Cotula, idem nomen factū Leucanthemidis, è Græco contextu discas. Iam vero si ad facultates & usum animum aduertas, quod intererat Senensis Commentatoris, neutiquam viterius inficias ibis, Parthenium esse Cotulam foetidam. Meminimus namque, quod probè nouit clarissima Agathopolis Schola, Rondelletium aliōsque professores præclaros, sæpius addere Cotulam foetidam decoctis, ad serosos, adustos, salios, melancholicosque Elephantiaecos, & mali mortui vocatos, per inferiora educendos: purgat etiam aliquantum succus per se iusculis inditus, magnoperè in syrupo, ab iisdem laudatus: quia thoracis & pulmonum farctus, lotium euidenter ciet, & tumores emollit, digerendi vi pauloquā Chamæmili vegetiore. Sumus & nos vti percommode totum hoc sexenniū Rondelletii imitatione, multorū cōmodo. Eapropter multum nouit, maleque actum cum studiosis hætenus, quibus persuaserant πικρὸν ἄρτα ista cōmentaria, Matricariam Partheniō esse: deterius verò multo cum ægrotis, qui herbæ duntaxat ad menses ciendos vsurpatæ, purgatoriz (ceterum amarioris horrendi, & foetidi) visione vexati fuerunt: nec enim Matricariae, ut Arthemisiæ, niēsisbus eliciendis aliusve matricis particularibus affectibus prærogatiuam, sed tantum ad duritiem & Phlegmonas commendat Parthenion Dioscorides.

MATRICARIA

Varietas.

PARTHENII igitur, seu Cotulae, varietas duplex à magnitudine & odore. Notior & frequentior quæ foetidiior, caulibus & alis teretibus, succosis, teneris, viridibus, crassioribus, longioribus, quā Leucanthemidis agrestis: foliis verò & floribus illi adeo alludentibus, ut

bus, vt vel exercitato, nisi nares consuluerit, illudat: attentius tamen intueſti folia latiora, & florum mediæ bullæ depreſſiores, latiores, iſdem ſatis æſtate cum Chamæmelo Leucanthemo floret.

Inodora Cotula.

MINOR itidem inter ſegetes, ſuperiori Anthemidi Cotulæ dictæ proſum ſimilis, eoq; ad diſcernendum magis difficilis, quia magnitudine penè par, & odore imbecillo aut nullo eſt. Flores tamen latiores habet & teneriores caules: radix quotannis reſurgit.

COTULA, ſine Partitione præcipuum minimum.

AD Ceti montis Norbonenſis radices, non procul piſcatorum attegijſ, hæc frequens, oritur: & Cichorio Bulboſo ſubens aſſociatur. Exilibus palmaribus cauliculis humi ſternitur, quibus folia inſunt Bupththalmi vulgaris paria, diuiſura Bellidis maioris, carnoſa, odore feriente, putidulo, Cotulæ vulgaris: Floribus item non ita abſimilibus. Vires autem nec inferiores, nec diſparces.



BUPHTHALMVM Oculus Bonis.

ENIMVERO Galenus & Egineta, quaſi Chryſanthemum foret Bupththalmū, aut nomine tenuis diſtarent, nuſpſiam Chryſanthemi meminerunt ſed Bupththalmum iſdem quibus Dioſcorides verbis poſteritati ſua mandarunt, penèq; perſuaſerunt commentitiū vel ſpurium caput de Chryſanthemo eſſe, vel cuiuſpiam amanuenſis induſtria nominis & ordinis quadam cōſequentione illeſti, illuc inter Chryſogonum, Chryſocomen, Heliochryſon & Ageratū apud Dioſc. aſſectū, eodēq; penè orationis ſilo & viribus, quibus Bupththalmum. Tum vtroq; poſterior Plinius, videtur vnā tantum deſcriptionē legiſſe, vel, quod verifiſimilius, vtramq; ratus candē, Bupththalmi vnā delineationē conſaſſe & Chryſanthemi. Bupththalmos, ait, ſimilis Bouū oculis, folio Fœniculi, circa oppida naſcens, fruticofis caulibus, qui & mandūtur decocti, quidā Cachlā vocant, hæc cum cera ſciromata diſcutit: Vbi vides coaluiſſe οφθαλμωδῶς ſive οφθαλμοειδὲς & καὶ οὕτως ἀνθῆμας, colorēq; melinū, folia multiſida, ſeu ſenſiculacea, & circa oppida oriri. Verū addita eſſe ex Chryſanthemo, caules mandi decoctos. Ab eſſe verò illi flores vehementer ſplendidos, caules leues: variante nimirum nonnihil deſcriptione ex Bupththalmo atq; Chryſanthemo conſata. Hæc ſatis viſa fuerunt non paucis doctioribus ad aſtruendum, non niſi eandem vnāq; plantam & deſcriptionem vtrūq; eſſe. Quibus ſanè & nos aſſentiremur, ni & ipſæ ſtirpes, quaſi ſe amotas ſua tribu & capite diminutas quererentur, nunc poſtliminiò reduces ſe ſe nobis offerret atq; lectio paulò vtrobiq; attentior liquido præluceret. Siquidē Bupththalmo caules ſunt teneri, tenues: folia Fœniculi ſpecie, flores lutei, ſimiles & maiores, quàm Anthemidis (nempe Leucanthemi) oculi imagine. Chryſanthemo autē fruticofa faciēs, leues caules: Folia multum incifa. Flores vehementer ſplendidi, vel rutili, & caules holeracci, eſculēti. Quā propter oppida, nō itē in agris, oriri tradit. Quæ quidē varietas cū par ipſis in plātis cernatur, facit, vt arbitremur Galenū, quē ſequitur Paulus reſeſione hæc ſuper ſediſſe, dū ex Dioſcoride excriberet, quia plātas inter ſe non compararet: aut vt lenius dicamus, Chryſanthemi hiſtoriā eius monumentis interciſiſſe: quemadmodū in vulgata cognitionis Inde contigit. Facultates præterea ſi quis arguetur eaſdem vtriſque redditas, idem factum in Schænantio cum Calamo, Myrrha cum Bdellio Iberide cum Cardamine, Cichoriis cum Hieracijs, & non paucis alijs. Ea propter exercitatoribus binum damus Bupththalmum, & totidem Chryſanthema, quorum acceſſione ſaltem naturæ familiæ duæ æſtiores locupletioresq; ſunt futuræ.

HELLEBORVS ferulaceus. Bupththalmum Dod.

Theop. Helleborus ferulaceus folijs fœniculi, huc accerſiri ex capite de Elleboro: per plantam Dod. Dod. ſed flores nō ita congruūt. Facultates minus multò catharticus enim eſt

vt ex Germanis asserit Mathiolus. Sin verò non vehementer purgat, non perperam quadraret: quippe durities inque scirrhum abituras collectiones dissipare certum: quod tamè haud perinde videtur præstaturum primum Bupththalmum.

PTRETHRVM Officinarium, flore Bellidis maioris,
folio Anthemidis.

AFFVORE igneo Græcis, deinde Latinis dictum Pyrethrum nullus nescit: & isti Officinarum Pyrethro, quò minus censetur verum, nihil est quod derogat; præterquam flores, quos in umbellis Anethi circinatis tradidit Dioscorides (aliòquin radices illi, cum adolefcit, cuiusmodi plurimum in fasciulis ex Hispanijs ad Septentrionis emporia conuehuntur, nonnunquam non adultæ Pentaphylli radicem, interdum etiam vetustiores pollicem æquant) cauliculos plurimos, sesquipalium altos, crassiusculos, folijs Anthemidis stipatos, crassioribus, longioribus. Florem item Anthemidis æmulum, aureo in medio umbone, sed magnitudine Bupththalmi. Radicis feruor igneus immanem dentium eruciatum placat: oleum ex recenti radiceeductum mirificum est. Vernat hæc etiam non semine, sed duntaxat cauliculo, depacta tantum in hortis Belgie & Anglicis.

PTRETHRVM alterum.

ALIAM plantam Pyrethri veri nomine donabat Guilandinus, & alebat in Patavino horto, cui radices & folia Cotulæ foetidæ. Umbellæ ab vno quasi eentro multis pedicellis innixæ, Veneri pectinis ritu, aut Anethi, candidis stoculis, feruido & amaricante gustu. Sed illud lectori Senensis, qui hanc non nisi labore arduo sibi comparatâ, neque omnibus cognitam asserens, quasi inuideret nobis tyronibus cognitionem, aut metueret criticorum reprehensionem, tacendo docet, nisi quænam illa esset, nõ perspectum planè fuerit illi. Et sanè minimè habet hæc alterius illius mirificas vires: vt neque nonnullæ aliæ, quæ quia gustu feruido sunt, & nonnullam foliorum similitudinem sortitæ, illiè ab intempestiuis herbarijs Pyrethri nomen accipiunt, quasi id præstaret Pyrethrum feruore tantum, ac non potius alia comite facultate.

Faniculum. { *vulgare*
 dulce.

Anethum.

Meum.

Ferula.

Ferulago.

Sagapenum.

Galbanum.

Ammoniacum.

Euphorbium.

Sarcocolla.

Thapsia.

Peucedanum.

Panax Asclepium.

Libanotis seu Rosmarinum recentiorum.

Helleborus niger Ferulaceus Theophr.

Saxifraga tenuifolia, Ferulacea.

Saxifraga vulgaris.

Seseli Masiliense.

Asparagus.

Corruda.

Nigella.

M yrio.

Myriophyllum vel Matriphyllum palustre.
Myriophyllum Equiseti folium flumatile.
Polygonum foenum.
Equisetum omne sine Hippuris.
Tragacanth.
Scorpio Theophr.

μαράθρου. FOENICVLVM, sine MARATHRYM

Vulgatus.
Dulce.

German. Senfel.
Belgis. Genthel.
Gallis. Fenail. Ang. Fenell.

QUONIAM multus vsus in cibis Foeniculi eunarcidi & arentis, Marathrum quidam doctissimi dictum volunt, satius tamen è Græcis Latini, quod quasi foenum in hyemes arefactum & marcidum reponetur, fœniculum dixerunt. Id autem apud nos in triplici differentia vîsur: vulgare, & omnium vsu frequentissimum apparandis cibis, Dulce vocatum Officinis, semine maiore Cumino, gustu Anisi, dulci, colore albedo, minus acri, breuioreq; caule & exiliore, folia itidè sunt Anethi: tû coquis, tû Pharmapœis vsui. Hyemes illud non perinde fert vt vulgatus, nec perinde frequens feritur, vtpote semine è Græcia, aut Syria allato. Vulgaris autem spontè virentis feracissimus ager Norbonensis, sicior, squalidus.

DULCE.

Hippomarathi autem ab antiquis proditi syluestris, semine præsertim ab isto diuerso, cuius plantam, quæ apud respondet, similem equidem habemus nullam, Guilli. Driesch probus & peritus Pharmacopœus aluit superioribus annis Antuerpiæ, procerum, prægrædoq; Fœniculum, communi simile: caule ternum, quaternumve cubitorum, foliis breuioribus, aliquantò rigidioribus, albicantibus Corruæ. Semen par, aut paulò minus altero, rotundius, & Aniso propius. Illi Hippomarathi nomen fecerunt.

HIPPOMARATHRUM.

ANETHVM.

German. Dyllen. Gallis. Anet. Ang. Dill.

ANETHON, quasi ἀνέθον dictum volunt, quia appetentiam cibi excitet, sed etiam antrû & congressus, & coitio est, ad quam Venerea læsât Anethi esus, vt antiqui prodiderunt: tametsi plurimo vsu tandem genituram exhauriat, Dioscor. teste, dissilatq; quippe è stomacho crassum spiritum, quem tenuatum in intima & vasa spermatica vrget, sed demùm populatur. Hortis hæc frequentissima, spontè interdum nata, etiam in Anglia & Northmannia: teneræ comæ in iusculis esitantur à quibusdam calculosis, quibus nõ parum prodesse certum est, sed cibo, parum grato sapore: tantoperè Fœniculo simile a libi diximus, vt ipso Pharmacopœo interdum deludat, nisi sapore facillè discernetur, ingrato, calidiore, & colore obscurius virente Anethum.

MEVM. German. Beetwurtt.

MEI veri plurimas sæpissimè vidimus plantas in Germaniæ, Italiæ, Galliæ, Hispaniæque locis Alpini: Quin nuper etiam dū hæc meditaremur vireto peritissimi Pharmacopœi Londinensis Iohannis Ricci, Radix odore suauis, spicæ, vel Angelicæ, caule & foliis Anethi, umbella candida, Iunio & Iulio floret. Semen Hippomarathi, odoratum, Eadem in celissimis montium iugis sterilibus Seuenæ, præsertim loco cui nomen Gallicè *l'Esperon*, id est, calcar latinè, monticolis *Cestre* nuncupatur vernaculo nomine, vt Placentari & Pandedarari duo, cui nulla doctiorum omnium suffragio deest nota vti Mei Dioscoridis: Cuius etiã



senten-

Feniculum tortuosum.

sentia est, noster eruditissimus Turnerus Anglus, qui in ore Septentrionalis Alpibus Cheuoticis Scotis finitum, magna vbertate scaterere hanc stirpem nos monuit. Vix enim quadrienniu est, cum primum hæc planta Venetis Pharmacopœis innotuit: nam tamen radices ad Theriacæ cōfectionē ex Syria & Apulia aduectas norant, & in singulas libras singulum aureum ducatum iustiori pendebant, tamen exoticam putabant, nec villo loco Italiz oriundam, vt qui neque caulem foliaue vidissent, & Herbariorum Senensis directoris, summi placitis acquieuisent. Hic enim Masiiliensium & Mōspelliensium Anethum feniculūve tortuosum, tortuoso errore verum Dioscoridis Meum astruxerat, anfastūque illis errandi præbuerat. Quin ne nunc quidem, vt errorem aut teget, aut foueat, in istis postremis Commentationum recoctionibus atque recantationibus, nisi iniuriis hanc genuinam esse fateretur: Et fatali sua modestia argutatur, odorē quadantenus virosū, folia non Anethi, sed Asperagi, radicibus non adeo tenuibus, Tum paulo mox subdit, Appuli Imperatricem vocant: quo quidem vocabulo, vbique fermē locorum ignara herbarum plebs solita est alicuius incognitæ plantæ eximium & gratum odorem & vires insignes signare. Sic enim vulgò etiam Angelicam Imperatricem vocat: alioquin Angelicæ, aut Imperatoricæ, cum Meo nihil est asiniuitatis, nisi odoris, qui in Meo perinde iucundus est. Et peritis indicio est eum neque multas radices huius eruisse, neque folia planè perspecta habuisse, sunt enim situ & similitudine Anethi, non Asparagi, vt asserit: cui etiam si essent similes, tamen ambitionem sic suam magis proderet: Asparagum namque, metipse feniculo asimulat, & Anethum adeo similem feniculo suo capite asserit, vt plerumque colligētes fallat. Ne porro in multo reconditionibus plantis deinceps fallamur abs te, nos tyrunculi, cautio vna & summa erit, non temerè tuis argutis inductionibus picturisve credere. Penet enim nos feceris libri initio de Iride syluestri, quam Medio ex Plinio cōparabas: at nobis post lōgè aliud Mediū dedisti, quam inibi præ te ferebas. Hic porro de Scēli, Androsache, & alijs permultis plantis, fauere linguis consilium est. Qui non nesciamus, te tantum Dictatorem iamdiu supra aleam humani iudicii vel erroris summo ignauorum quorundam suffragio euectum esse, & vereamur scuticam Reuerendi fratris Adriani Veneti, qui in vasa tui operis vestibulo & Priuilegio, dicit totum volumen, tuum à sua Paternitate examinatum, approbatum, & ab omni supicionē erroris liberatum.

Νάγτις FERULA & Ferulago. Hispan. Cananheia.

QVEMADMODVM Νάγτις? virgultum, thyrsū aut bacillum Græcis signat, sic Ferula Latine à ferendo, quòd illius scapi pedamenta fruticibus, & senibus pedum ac scipionibus essent. Plurima & procera in Galloprovincia & Norbonensi Gallia, præsertim illis rupibus præruptis que saxis prope subterraneas cryptas, via qua Monspellio Frontignanum itur ad rectam: itidem in cellis squalidisque saxorum sinibus, qui soles æstiuos & feruores exceptos totū fermē fouent diem, prope oppidulum Rochæve Castrum vocatum, quòd austrum vergit: quinim cubitorum caulis, radix magna, recta & alte in saxorum commissuras hiantes rimas descendens, euulso difficilis, candida, lacteo pinguique succo turpida, odorem vehementem vibrans, folia feniculo maiora, pinguiora, crassiora, vt & caulis: umbellæ prægrandes Anethi, Iunio & Iulio siscalis luteis defluentibus. Semē foliaceum, compressum, oblongum, rotundum, rotundum, duplō maius.

Alia FERULA & Ferulagones, eorumque succi & excrementa
SAGAPENVM.

SVNT etiamnū daz in herbariorū hortis huius classis, naturæ & similitudinis plantæ, quas idcirco Ferulagines vocant. E videntur distare duntaxat cultura, statura, elegantiā & succi copia, prout sunt nactæ radices aruum aridum, magisque excoctum, sub celo fudo & feruidiore, vt in Aphrica, Media, Cyrene, & alibi. Quare, minus mirum est Dioscoridem paucos & obscuras notas de Sagapeni, Galbani, Ammoniæ, Euphorbiæ Ferulis, aliisque permultis gummiiferis scripto reliquisse: cum ne nunc quidem sint nobis cognitæ, postquam à nostris hominibus terra & mari lustratæ sunt Lybia, Æthiopiæque cuncta.

Et, multoq; plures regiones, & magis diſtitz noſtro orbe. Equidem Dioſcrides videtur agnoſcere Ferulam eandem eſſe atque Sagapenum: nam è radice Ferulæ ſauciata manare Sagapenum primum dixerat: deinde inferius, quaſi ſuperius nihil dixiſſet, alteram plantã Ferulaceam docet, ex qua alius generis Sagapenum effluit: quæ arguunt potius ſuccos ipſos agnitos illi, quàm plantas. Quippe Plinij etiam Sagapenum in Ferula oriri tradit: fortè quia eadẽ plantam cum Ferula vulgari putauit. Cum autem multis è plantis, gummeus, pinguis, & reſinoſus ſuccus exeat, vt Coniſeris, Amygdalis, Maſtiche, Terebintho, Ceſaſis, Hedera: herba Rutha, Dragacantha, Ixia, & alijs non paucis: tamen omnium nobiſſimum excrementum medicamentũq; videntur Ferulacea remittere: & earum quædam parçẽ, nec niſi alicubi, vt Fœniculum in Hiſpanijs, Thapſia apud nos: de quorum natũra, viribus, & mixturis, commentationem plenam inſtituimus inter ſuccos medicatos, vbi facilius cum cæteris liquoribus concretis, pinguibus, & cognatis comparabuntur. Nunc tantũ ſi quæ faciunt ad hæc plantas veſtigandas, pauca leuiter attingemus. Diximus haud dudum in Laſere, ad quam vocem alludit Aſia cætes, ſoliti olim niſſeri Silphio ſiue Laſeri Sagapenum, eoque, tum propter alias rationes, videri nobis cognatas plantas: quã cõiecturã fouet Dioſc. qui Sagapenũ neſcio quid mediũ inter Laſer & Galbanũ olere aſſerit: idq; ſenſu perceptio hodierna confirmat, adeo namq; ſimilia colluſit ad nos, vt ex ercitate ſit opus oculo & nare ſagaci ad ea inuicem diſcernendũ. Purius ſiquidem Sagapenum, & illud recens, quale nõ multis ab hinc annis cõperũt Venetias aſportare inſtitiores, concolor eſt Aſſig, purius, odore item ingrato. Porrum reſipiente, vel Galbanũ, quum præſertim recentiſſimam & efficaſiſſimam intueris glebam lachrymis thuris concretam.

Quin & Galbanum: Ferulæ item Syriacæ ſuccus gummeus, Aſſam multo propius aſpectu imitatur: odor tamen minus teter illi, & Gpoponacis quadãtenus cognatũ videtur: cuius modi habemus hodie ex Officiis Venetis quoddã ſuluũ, molle, Ceram nouam referens: cuius grumos glebulasq; lachrymis pinguibus congeſtas ſeruamus, aliorũq; multorum leſtiorum gummoſorũ ſuccorum ſpecimina, vt quidam iumentis nobis aſſerant, etiam ad plantas ipſas noſcitan das, intèr; ipſas diſtinguendas. Siquidem veriſimile ſit, ſic inuicẽ hæc Ferulæ ſe habere, vti ipſorum gummi ſunt aut diuerſa aut aſſina. Nam Hammoniæ gummi, quod perquam recens optimum & copioſum hodie adfertur, tametſi plantam ferulaceam eſſe, ipſa fruſtilla ſectuaſiue hamudinacæ corticis, quæ inter glebam reperiũtur, fidem faciunt, & Dioſcorides aſſermet: tamen longius abeſſe videtur ab illa comuni ferulæ ſpecie, cuius cognatiõẽ Aſſam, Galbanũ, & Sagapenum ſuſpicabamur. Iſta etiam ſemina latiuscula ferulæ, quæ inibi immixta glebis conſpiciũtur, cauſiq; vti dixim⁹, fruſtitia, arguunt ferulam diuerſam quandã, ſed tamen congenerem: tamẽ vides ipſũ gummi alio odore, figura, & copia multo maxima. Adde quòd Euforbij ferulaceam arborem etiam tradit Dioſcorides in Mauritaniæ Athlante monte, cum tamen ipſe liquor concretus non parum diſcerpet à ſuperioribus gummis, ſimilior multo Sarcocolla. Quare vtri credendum ſit, meritò hæremus, Dioſcoridinẽ, qui ferularum, aut ferulæ arbori ſimilem tradidit: an recentioribus, qui iſtos cunctos tractus Mauritaniæ admodũ exploratos habent, ipſamq; plantam Euforbij frequentiffimã ſibi viſam eodem quidem loco vbi Dioſcorides, ſed longè alia ſpecie repræſentant. Nempe ſpinoſam plantam, Acantho aut Cynaræ ſimilem, cuius radici innaſcuntur cumerorum eſſigie fructus prægrandes, ſucco illo ſeruido turgentibus, quibus per maturitatem inciſis, lac effluit, colligitur exceptũ in vtribus, molliſſum quàm quod habemus Euforbium. Verũ qui ſæpius obſeruauimus inter glomerulos & aceros Euforbij multa ſemina tricocca Chamælez, Lathyridisũe modo, guſta acra, lubens audi remus, num hæc ſint eiũſdẽ ſemina plantæ, quod tamen minus videtur, ſi ea ſit Cynaris ſylueſtris ſimilis. Nõ aut eſſe Euforbio congenerem Sarcocollã, tametſi admodũ ſimilia ipſa grummi grumofa ſint, Dioſcorides monet, & ipſe ſeruor in Euforbio, amaror autem in Sarcocolla, tum facultates diuerſæ, quas nos proſequemur, quo loco polliciti fuimus,

THAPſIA Turbith Gallicum, & Turbith cineritium Officinarium.

Gg. j.

Potuit

POTVIT dici Thapsia, nō solum vt placuit Dioscoridi, à Thapso insula cognomine, quæ una è Sporadibus est: sed etiam propter flammæ calorem, quem corpori adnota inureret, adeoq; eminus, præsertim aduerso statu spectanti. Valdequàm similis Tapsia habitu toto & viribus: tamen si vñ multo præstantiore atq; purgatrice vi. In Aquitanix macilentioribus montosisq; squalidis inuentam nobis dedit præceptor Rondelletius, prope vadum quâ traicitur in Hispaniâ, tum ad radices Pyrenæorū, non procul Perpignano vrbe: crassior radicis cortex, fusco foris colore, intus pallet, succoq; multo gliscit lacteo, gummeo, sed inibi loci neglecto: caulis Peucedani gracilior, quâ Ferulæ, foliaq; Fœniculo latiora, breuiora, in umbellis semen Ferulæ minoris, oblongum, angustius, montani Sileris. Merito desita ex istius succo purgandi antiquis consuetudo, vt quo multum noceatur præcipuis visceribus, & tormina dira interdū excitentur. Verū siquidē miscentur leuioribus & naturæ amicioribus, proderit Sarcocollæ, Hammocami, Turpetiue succi modo. Nec Ferulæ Peucedaniq; succis gummeis desūt vires purgatrices: verū tū quia planta tum succus fetidus cerebro aduersatur, ideo non correcta plus discrimini nis inferret. Sagapenū vocatur gummi ex Ferulaeductū, vt Hæmoniacy, Galbanū cateriq; congeneres ex Ferulis consimilibus, sed tamen pro succorum natura inter se differentie eliciuntur, de quibus paulò mox.



Herbariorum THAPSIÆ Vulgaris, Carotæ effigie.

QUAMVIS sit hæc vulgatio Thapsia officinarum verior existimata, & superiori Thapsia radice non parum assimilis, tamen certum est longius à descriptione abesse: est enim folijs potius Carotæ, siue Dauci agrestis quâ Ferulæ: ex Italia iamdiu hortis Belgicis & Francis translatisq; notitiæ. Sed quia Aquitanica radice vtuntur plerq; omnes Officina Septentrionales, ideo se putēt vtī istius vulgatiois radicibus, quia nō ita sūt abssimiles,

PEUCEDANVM. Fœniculum porcinum.

Ger. Hasstrau, Schebel Wurtz, vud Senw Genschel.
Belg. Wercens denckel.
Ang. Hertsfrange.

EFERULÆ COGNATIS hæc, cui radicis succiq; gummeus, resinofus, piceus fœtor, Peucedani nomen fecit: Apuleius Pinaſtellam, tamenſi potius horrendum amarorem & fœtorem apud Poetas πικρὸν ἄλγος vox ſignet. Multum creſcit in Italiæ Hetruſcæ æſtuofis atq; Nordonæ glareofis collibus, præſertim in Luci Garamontij adita & circū inter ſentes, lumas, & dumeta. Radix proſudā nigricat foris, intus virescēs, ſuccūq; remittit gummeum, flauum, odore grauis & fœtentis: comatq; ſuperne denſo capillitio fuſco, ambiente caulem gracilem, ſeſquicubitale: multis interdum ab imo ſureculis diuiſa. In folia terna Fœniculi modo, quàm Ferulæ duplò latiora, longiora, minus craſſa, umbellæ latiores, luteis ſiſoculis prægnantes, ſemine Angelicæ haud abſimili; ingrato. Sic & purgandi vi donata fuit radix herbæ, ſed propter fœtorem vtriuſq; minus in vſum deduſta.

PANAX Aſclepium Ferula facie.

NEC diuerſi generis eſt Aſclepium Panax à Ferula, nec item figura abſimile, præſertim iſtud doctioribus verum putatum, fortè quale in Mathiolo pictum vidimus: Sed quia iſe autor admodū notas plantas oratione prolixiore proſequitur, rarioreſ autem tacitas præſent, aut nomine tenus indicatas pictori relinquit, nos potius dubios quàm certiores ple-

plerumque facit intocti omni hanc iconē, illicō Ammi, Mei, Anethi, aut similium, veniet in mentem, nisi quispiam aperiat descriptione concinna, sintne folia fœniculo minora, odoratiora, hirsutiora, quæ vmbellæ, quæ flore donatæ, sic paucis Cômmentatoris officio & pollicitatione defugeretur, præclarè opera posita, nec inulta: quæ tamē multum plus tibi honoris, & vtilitatis nobis esset allatura, quàm ex Authoribus, qui peruii sunt studiosis, paginas suas infarcire, vt plebi multa loquutus videatur, quum dixerit aut docuerit nihil. Ex Illyrio tractu, cui Histrix nomē, hodie plātas non paucas asportauit industrius Valerā-
dus Iulianus Lugduni Pharmacopecus, quib' multa cū hac Panace affinitas, quas in Hor-
to Doctoris Iuberti Monspellii seimus: Ferulæ similis erat effigie, sed multo minor ma-
gnitudine. Semine tamen non Fœniculi, sed vt Ferulæ, lato: foliis & floribus haud dissimi-
libus, caule & radice, magnitudine atque similitudine Anethi odorato.

ROS MARINVM ferulaceum, Fertile Diof, cuius Semen Cachris dicitur.

DI^{VER}SI admodum generis plantæ Libanotidis appellationē afsiuerunt, ob odorem quem spirarent, quadam sui parte Thuris quadantenus zinnulum, cuiusmodi primæ Libanotidis radicem olere Dioscorides author est: qui idem à Theophrasto quandā Li-
banotidem niemoratā, cuius folia agrellis Lactuce amaræ cādidiora, asperiora: radice bre-
ui, narrat. Nobis autem nulla hodie plenè innotuit Libanotis ē tot Ferulaceis, quæ vulgò *Libanotis Theo*
Libanotides putantur, perinde descriptioni consona, vt hæc, quam Patauinus olim ha-
bebat hortus, quæ etiamnum hac ineunte hyeme lzta virebat Londini in horto Iohan-
nis Ricci, non vulgaris peritiæ Pharmacopei. Surrigite ea caulem quinum & senum in-
tet dum cubitorum, fœniculaceum, aut ferulæ, nitidum, obscure viridantem, alis multis *Alteram vido*
& ramulis diuisum, ē nodosis geniculis excurrentibus, foliaque gerentibus crebra, Fœniculo *prope Olusatium,*
crassiora, Cotulæ maiora, auersa, virore cæso & glauco, vmbellæ per ætatem latiores Fe-
rulæ, aut Tapsiæ, floribus luteolis resertas, & semina Fraxini, folliacea, oblongiora quàm
Ferulæ, & Cucumerino semini maiora, cōpresfiora, striata, acerosa, resinaceū, aut Thu-
reum halitum dum fricantur, Sileris Montani, aut Pelopōnenfis Sefeli dāntia, mansuæ
os resinaceo & Thureo sapore complentia, acriora: reliqua planta tenera, calidiuscula,
sed non ingrato holeraceo & Smini gustu, quo quidem facilè dignoscitur à Ferula: nam
alioqui lætè multo turgēt tota, vñ Ferula, sed albidior & minus feruido, aut graui odo-
re, quin potius odorō.

HERBARIORVM Septentrional, notior Libanotis.

NON perinde Libanotidi congruit hæc ferulacea, quàm multi Herbarii horti in Gal-
lia, Germania, & Angliæ fouent. tametsi caule gracili, recto, Mei, aut Anethi, stri-
to, atrouirente, bicubitali sit, paucis alis & geniculis donato: in quibus, imis præsertim,
Peucedani prolixiora folia, fœniculi tortuosi, angustiora Saxifragiæ Anglicæ, medio &
superiore caule pauciora; Vmbellæ & floribus pusillis, candidis, Mei: Sed exiguum semē,
sub hyemē maturās, minus Carui rotundi, serē Ammi officinarum par, quod neutiūquam
potest conuenire Rosmarini fertilis Dioscoridis semini, Cachryn, aut Cāncryn vocāti,
quia grano hordeaceo esset simile, aut potius quod vrentis facultatis cū esset, similem
escaram inurebat cuti, atque pilula Catri propterea ab antiquis vocata.

*NIGER HELLEBORVS Theophrast. caule &
foliis Ferule, radicibus nigris.*

ETHIC cogimur etiam assentiri doctioribus inculcantibus nobis istū Senensem minus
verūtam stirpium in inspectione, aut authorum classicorum lectione: nam vbi Tra-
gii vestigatoris pertissimi & Gesneri indefess' laboris viri iuacium, vt vanum plerūque
incusat, nē ille quā non esset multæ exercitationis, aut lectionis, liquidò prodit. Sal-
tem debuit monuisse, Theoph. fortè & Hippocr. Helleborum descripsisse Cotulæ & foliis
ferulæ.

ferulaceis nigris radicibus, albi similibus: vsum qualem nescius & auius pseudocōmentator, isti pseudohelleboro attribuit. Radix quamplurimis, nigris, tenuibus nervulis, Helleboro similis, ternos quaternosve erigit cauliculos, pedem ferme altos: foliis densis, tenuiter incisiss, virentibus, Ferulæ Adonidisve potius similibus, cuius flores etiam æmulos, sed luteos & maiores Calthæ palustris, aut Ranunculo propiores, suboriente consertim crebribus conflato seminibus pusillis capitulo orbiculato, oblongoque, Morum imitante, simili eidem Adonidi, vel Ranunculo: In variis Hæstatiæ locis oritur, & hortis colitur. Iam vero si neutiquam Hellebori vires habere verè tuentur & profitentur obseruatores, non fit igitur Helleborus: floret tamè viretque Bruma, Ianuario & Februario, vt Helleborus & Ferula.

SAXIFRAGIA Ferulacea Italorum.

QUIDAM horti Italici, vt Urbini & Florentiæ, alebant Saxifragiam bicubitalem, foliis ferulaceis, aut fœniculi, minus aut minimè geniculatis, tenuioribus foliis, obscurè virentibus: floribus umbellatis, albidis, Mei, cuius videtur species. Radixes albicant, Pastinacæ sapore.

SAXIFRAGIA Anglorum, facie Sefeli Pratenfis Montpellierensium.

AB ætymia dote in frangendo calculo, Saxifragam scitè dixerunt Angli hanc plantam, pratensis vdis familiarem: foliis fœniculi latoribus, pratensis Sefeli minoribus. Radix odora foris nigra, intus alba, Peucedani facie. Flores in umbellis candidi: semen fœniculi, caulis sesquicubitalis & cubitalis est: hac stillantiâ parât mulierculæ dynicæ in Anglia.

SESELI MASSILIENSE, folio fœniculi crassior.

PASSIM & vberè crescit Massiliense Sefeli illis in tractibus qui Mafsilia Aquasextias ducunt, transq; Rhodanum in MonsPELLI agri asperis: Nobis etiam collecta, via qua Roma Senam itur, propè colles oppidi *Monsfalcone*, vini optimi Muscati commendatione, potioribus magis notis, quàm Botaniciis studiosis. Radix illi alba, fœniculi effigie & magnitudine, altè humi depacta, & euulsu difficilis, quàm fœniculi odoratio & calidior: caulem vtplurimum sesquicubitū ferulaceū, hincinde alis multis ex geniculis prodeuntibus reflexum emittit, prædurum, rigidum: Folia pauciora, sed firmiora, crassiora quàm fœniculi, & albida sunt: umbellæ consertæ Anethi floribus candidis, & semine, Aniso similiori quàm fœniculi: gustu suauis, acris, & medicato, cuiusmodi Mei aut Panacis gustu, Planta illic valde nota, fœniculi tortuosi nomēclatura: singularis indubitræ amicus Iacobus Reinaudus Mafsiliensis cuius & Pharmacopœus primus hanc Lugdunensibus medicis, etiamque Valerando *Domrez* illic Pharmacopœo, huius cognitionis suprà quàm dici queat consultis, miserat, ad Theriacæ exquisitâ confectiōe, cui etiam MonsPELLIensium Doctōrum instituto, Rondeletii præsertim, additur, cuius sententiâ non rarò sequimur. Neque quantū illic locorū est Mafsiliæ circum lustranti, vllam plantâ videre est, quæ magis quadret Sefeli, proindeq; hallucinantis commētatoris Tridēntinū Sefeli neutiquam genuinū esse quit: quid verò sit, cum ille describere non ausus sit, nobis ignorandum. Illud tamè asserendum, nos in Tridētinis alpiibus hanc plantam vspiciam vidisse, ac ne in Baldo quidē monte longè illis feraciorē.



*An sifer Mons-
tani Ma. Sefeli*

Ma-

Maritimus Diofc. ASPARAGVS idem cum
hortenfi & holeraceo.

Aug. Sprage, or Sparache. Bel. Corael cruyt. Gall. Asperges.

TENELLÆ & prinulūm à fatione erumpentes holeraceorum germinationes Asparagi dicebātur, quia σπῆρμα Græcè fero, & σπαράω fatio dicitur: proinde fatius quispiam coniecit Asparagos è Græco Latinis deductos, pace multificij Varronis, quàm quia exasperis virgultis legerentur. Dux autem differentiz, quales antiqui scripserunt, passim vulgò noscitur, & in hortis feruntur: nam spontè natæ potius gaudere videntur maritimis locis: sed ea species quæ vulgaris siue altilis est, depressiora decliuioraq; pratensis maritima amat: iam admodum nota & frequens primo vere Asparagis punctim emicantibus, multis crebribusq; tenellis thyrsialis, caudæ Equinz quadantenus similibus, esu in acetarijs admodum quæsitis: affecta postea ætate & æstate, multis fruticant ramulis caules adulti, proceritate ternūm & quaternūm pedum, densissimis foliorum exilium comis Fœniculi aut Anethi, flosculos edentibus oleæ luteolos, qui patiuntur bacculas rotundas, Rusci duplò minores, pares fructu Ribæ.

CORRUDA differt ab altili Asparago.

SED enim Corruda magis montosis & collibus in deuexu & affluatū maritimo delectatur, perperamq; à nostris Herbarum Doctõibus hodie cum Altili confunditur, cū eadem putatur: tamen rarior multò occurrit, neq; enim Veneto tractui maritimo, Germaniz, Galliz, Angliæ maritimis visitur, vbi nihil oleci altilis frequens oritur. Facilis autem à superiore dignotio, quia hæc tota cādidior & rigidior est, & ramis diuacatis funditur per sepes. Folia acutiora, breuiora, & magis in ordines stipata: flosculis oleæ luteolis, crebribus, subter alis emicantibus: & semē illi, nō vt Altili, Coralli colore, sed vbi maturum nigricat ex viridi, magnitudine aliquāto inferius, quod glomeratim proximè furculos adnascitur: quas si seorsim species genericas vidisset & obseruasset Commētator, nec falsus ipse nos sefellisset, nec Corrudam apposuisset, non illius loco Asparagum altilem & velsam sponte erumpentem illi subdidisset. Is quippe nulla re prorsum quā transplantatione aut cultu, à seipso hortensi distat. At quid differat ab horum vtroque Corruda, satis iam liquet, vbi Altilis & maritima bacca coccinez sunt: Corrudæ autem ex nigro virides semper, & Asparagi marini baccæ multò maiores quā Corrudæ.

NEPA apud Theoph. diuersa est à Scorpione, quam inter
Cali collocatam oportuit.

HVC autem properatione non ita incommoda irrepsit Nepa: quippe cui spinæ horridæ & infestæ, nomen commune fecerint cum Scorpione, qui etiam ab spinis punctim
Gg. iij. tan.



tangentem fauciatibus dictus est: & similiter Nepa vocatur cognomine ab animalculo caudæ ita matuendo. Hanc autem sèrmè indifferetæ similitudinis esse cum Corrudæ prodidit Theophrastus: qualem plantam paucis adhuc notam, nullidum recentiorum descriptam: tum ob sui cognitionem, tum ad Corrudæ collationem apponemus: non pauci enim sunt, qui ad eandem quam Senensis salebram impegerunt, rati Corrudam nihil aliud esse quàm maritimum Asparagum, passim locorum proueniètem, vt superius duximus. Sed enim qui nouerit hanc, Corrudæ simillimam dicet, non item Asperago: Eam nullibi præterquam in Prouincia vidimus, locis montosis vberè fruticantem, præsertim prope montium radices, qui Magdalenæ celebri Fano & specui sancto nuncupato finitimi sunt, via qua Aquasextias itur. Ligneæ sunt radices, multiplices, implexæ, tenues: à quibus mox orsz spinulæ, rigidulæ, dentæ, Corrudæ simillimæ, aliquanto maiores, vniuersa virgulta summo tenus vestiunt, sicq; tota planta densis horret aculeis pro folijs: & faciem, Corrudæ præfert, gustu amaricante. Locis saxeis & aridis, & Sterellæ montis decliuibus, ac propter argenteum annem, *Argens* vulgo Galloprovinciæ dictum, multa.



MYRIOPHYLLUM aut Maratriphyllum palustre.

AFFINES nomine plantas Militares, siue Dioscoridi dictas Millefolias, scilicet Semperuiifolio Stratiotem aquaticæ, & Filicifoliam terrestrem, ac Cumini syluestris foliâ quamlibet suis alibi notis discreuimus: à quibus iam hanc scæniculi foliam diuersam agnoscere in procinctu cuiuslibet est. Quippe quam sæpius reperies in leui agmine fluentibus aquis & palustribus, innumeris foliorum capillamentis exilibus, è nervis per æqua intervalla pinnatim exeuntibus, teneritudine & diuisura Fœniculi pullulantis, aut Corrudæ, mollioribus, colore ex viridi fusco, mollicello, teneroq; caule in aquis fluitante: eque radice exigua, cutilsu facili, pallidula, lutea umbella emicat, gustu quadantenus palustris Equiseti. Qui, hic nulla de causa Marathrû vocem dispungunt, vt Amaracum subdant, gnauius in nihil agendo, & sibi molestiam asciscendo, sudant: nec vident nomen à Marathro deductum, monente stirpis effigie & codice.

Myriophyllum Equiseti folium Fluiuatile.

FSTVO Dioscoridi prætermissum, mediæ figuræ inter Hippuridem & Myriophyllum aquaticum existit. Caulem siquidem edit caui, striatum, & glabrum, duum trinumq; pedum: sifculis albidis, confertis, fastigiatum, Nasturtij aut Cardami aquaticæ similibus. Aquarum residuum & riuiulorum vadosis innascitur lubens: folijs multis, flaccidis & languidis, fluitantibus, caudatis, aut setaceis, Equiseti, vel Millefolij fœniculacei.

POLYGONON Fœmina femine vidua.

PROPTER crebras geniculorum cômiffuras Polygonon dictum liquidò constat, sic valde diceret multinodiam: propior tamen & similior hæc species Equiseti, quàm masculo Polygono videtur, natalibus, culmis, folijs, crebribus in geniculis, per interualla fermè æqua exortis, tanta cognatione itidem virium, vt non valde sit dispar aut modus, aut emolumentum vtèdi. Habet siquidem ternos & quaternos caules, sed læuioribus, glabros, neque strijs asperos, rectos, folia angusta, longiuscula, sese per radiatos exortus, & articellorû pixidatas infertiones stipantia, Equiseti, aut asperulæ angustiora. Radix albidâ, longius propagata, & de se nonnulla germina Asparagosue promens, tenera. Vliginosas cõuales & quas riuiuli inter

interluunt, crepidines sectatur in herbis vdis, ad cellam Nouum Monspellio exeuntibus occurrit. Rara tamen illic & nec multum alibi, nota: sicca & alstringens valde.

HIPPVVIS.

Ger. Kossich
want.

QUI LIBET è triuio Hippuridem nouit, sic dictam vt loquitur Plin. ob setas vel pilos equinos & foliorum similitudinem, caudæ equinæ imitatos, vnde etiam Equisetum dictum. Herba siccissima, æquæque tamē vocata quia vdis, humēbus pariter gaudet scrobibus Ital. Asperella, & satrum marginibus, plurima quocunq; iueris obuia sit, & in duplici differentia cernitur. Equisetum istud notius, culmos arundineos, vel iunceos, cauos, nudos, asperiusculos, de cheual, & geniculatos, & siccitate firmiores, detergendæ omnigenæ supellestili à mulierculis expectatos, initio edit, exiguis articulorum velligijs per initia, & racemosi in summo donatos: Ang. Horse floribus oblongis, rotundisq; asparagi nouellæ nucamentis, albidis, & herbaceis: progressu ex vertebrosis quasi articulatis commissuris, quas in ambitu per intercapedines radiatim cingunt multiplices exilium foliorum quasi setæ asperiusculæ, prolixiores, Laricis folijs, Myrtophylli aquatici comas, aut Equinam caudam satis emittentes. Minor interdum tota hæc rotundos fert asparagos, teneros, summos, non clauatos, sed racemulis longis, & spicatis donatur ramulis, comosis etiam è lateribus.

Minor fontalis HIPPVVIS.

PRODIT & istud subtilis & sabulosis aruis, vti in Anglia passimè viuus ipse scaturiginibus trans vndantem aquam erupens prope Castell Cary: estque secunda Dioscorid. species, quæ autores implicuisse & confundisse videtur. Est ea recto caule, crassiore, magis cauo, habitiore: per interualla carnosos exortus foliorum multo breuiorum, albicanatium & teneriorum edente: radix nigricat, geniculatis articulationibus & fibris donata viribus videtur impar superiori.

An racemosa Equiseti facie planta sit TRAGOS
vel Tragonon Diosc.

CEREALEM frugem multum acerosam Tragon vocant, qua ratione nunc pari & hanc innuit Diosc: cuius vtriusvis origine vocis nequaquam ad hircum intelligas allusum, sed potius τράγος τὸ τραγῶν, ab comedendo, vnde Traganon & Edulem, & Tragemata Bellaria Latinis dicta: Galis etiamnum dragee. Sic in Trasi dolce Veronenſi, quia edendo esset, eadem vocis vestigia remanent. Est aut Traganon, quæ hic verum profitemur, fruticulus raritate & elegantia in primis cognitu dignus, nequedum vlli recentiorum memoratus, quæ primum in siticulosis arenis oræ maritimæ ad Ceti promontorii Agathæſis sinus radices, & finitimis aggeribus arenosis, inter mare & stagnum Lateresem, tres quatuorve Leucas Monspellio distantem, legimus, eiusq; fructum, siue acinos, quos hic Diosc. ἐᾶρας vocat, ex granulis tritico parib' congestis, ternis aut quaternis, mori Bati effigie, vinaceis aut arillis perquam alstringentibus, magnâ cum voluptate esitauimus: vbi vulgus piscatorum & naucleri accolæ, etiamq; studiosi Monspellij Rasini de mar, seu marinâ vna vocat. Luxuriat inibi tanta vbertate, vt ea plaustro onerare queant. Foliorum prosum expertus est, sarmetosis, gracilibus, copiosissimis, & confertis viticulis, iuncum, aut potius spartum, partim & Equisetum referentibus, ramosis comis, humi accubantibus, ex crassiore, duriore, rufescente breui stipite, arenosæ superficiei multis anfractibus immerſo, & radiçi continuato, quæ in senos octonosue pedes tortuosâ excurrit, genicula ruffa, graminea,



crebrioribus etiam geniculis in breui sparteo, crassitie & duritie stipitis, in alas exeunte geniculofas, comofas Equiseti, sed duriore, amaras, siccitate & astringitione mira, vti vniuersa etiam planta, secundum autem ramulorum inferiores superiorisque exortus, in iuncis innumeris cuspidibus minutim racemosi (Iulio & Iunio) erum punt flosculi, semel iunci aut botridis, albicantes, herbidi: post quorum defluuium, ingens acinorum agmen totam operit fruticem, coccinei enim grani triticei sunt, pares acinuli, & purpureo multo pingues, Rubi idej, non prorsum maturi exiguos fructus referentes: si quolibet eorum gygartum durisculum, triquetrum, vtrinque acuminatum, grani tritici aut Sefami Theoph. similitudine, fuscum foris, intus albu, medullosum, astringens, non ingratum, gratus vero esu ipse fructus & prœdulcis, etiamnum vrinam multum ciens, biennio, triennioque regustatus. Satum item in Belgio amicis, nobis istud Londini bellè enatum fuit: nondum tamen acinorum ornatus comparuit, Rupellæ etiam mantimis exire, & ex aduerso Salinorû insulis Oceani Oc- cidui, nobis amici non vulgatæ fidei retulerunt. Nos tamen Autumno 1566, qui multa illic rara nati sumus, non animaduertimus. Quæ Tragon non sit hic genuinus agnosce- dus omnibus eruditus, causam haud dicit Senensis, qui triuiale & claudum nominis Scorpij argumentum a cupatus, illic solita qua est fiducia, Cali dat speciem spinosam, ean- demque Tragon Dioscoridis ratur, confundit cum Theophrasti Scorpio, quem alium à Ne- pa docuimus, & suo loco vtrumque dedimus.

TRAGON improbus Math.

EST enim ille Crithmi Salicornij seu Cali congener, propius ad eam speciem spinosam accedens, quam Passiuacæ aut Secacul, aut alterum Crithmum faciunt, pedem & cubi- tum altam, intortis, crassis, densis, ramulis diuisam, & aded horridam, armatâque, folijs pun- gētibz Aizoi colore & figura, carnosus, crassioribus, numerosis in imo, in summo murica- tis, cuiusmodi in tribulo terrestri & aquatiko, vt impunè effringere furculum nequeas: his- ce ad imam basim interiorem, flosculi herbacei rotundi, ex quibus semē exit compressum, Kali modo (puto) in volute speciem. Radix cespite summo exilis, lignosa, Cali, & herbaceo prorsum gustu, succoque multo glutinoso prægnans, minimè astringente, salso, & alioqui nullius excellentis qualitatis: quam si Commentator propius gustu & visu exploratam ha- buisset, descriptione declarasset, nec Dioscoridis Tragon fecisset. Est enim succulenta her- ba, non frutex, nullus acinos habet rufos, tritico pares aut supernè acutos; numerosos, mag- nopere astringentes: quæ omnia in sunt prorsus nostro Trago, quem siue folijs, nec spino- sam Dioscorides tradit: At hæc folia aizo carnosæ habet, spinis horrida, astringitio penitus nul- la & prorsum à Scorpio Theophrasti non alia, qualem descriptum eleganter Theophrasti Scorpium leges. Qui quàm exquisitè huius inspectione herbæ percipitur, tam longè abest à Dioscoridis Trago: cui ex proximo superiori capite potuit irrepisse Scorpij vox, vt multa nomina casu inserta sunt, aut frequenti amanuensium lapsu, qui etiam isto lo- co florere Corradam & Scorpium μετὰ καὶ τὸν φθινόπωρον, cum tamen longè ante flo- rere certum sit, eoque μετὰ τὸν φθινόπωρον quinoctium vernum, vel Plin. lectione, qui non rarè non notæ res aut dispares, simili descriptione amplectitur, vt multis locis ostendimus,

Rubia utraq.
Eribrodanum Marinum Nerbonsense.
Aperine.
Aspergula, siue Asperago Ph. Gallis Muguet.
Spergula.
Gallion. glutinum & album.
Cruciata minor.
Polygonatum minus.
Pascierina Tragi.

RYBIA utraque, Eribrodanum marinum.
Ang. Madder. Gall. Garance. Belg. Grappe.

VBERTUM prouentum, tam quæstu oritur & colitur Rubia vbiuis locorum, præsertim in Germania & Belgicæ Insulis vrbe dicta, vbi radices prolississimas & numerosas, flexibus multis humi sparsas, rubentes intus, forisque Coralli nondum perpoliti colore: *Ang. Maddet* erutas hyeme, pœnte, mense Nouembri, siccatas trapetis subdunt, confringuntque, quo commodius ad extera empiria compendii causa venum vehantur. Infecturæ lanarum coriorumve impendio expetita, necnon officinis medicis notissima: hæc maior & melior vocatur.

Altera verò, vt minor, sic deterioris est notæ, minus aspera tota, cuius radices è ru- *Syluestris Rubia* bello in luteum languent, flosculi nec luteo pallent, sed candicant, folia minora, numero- *Muer.* siora, geniculos frequentiores radiatim ambiunt, cauliculosque triquetros, semine rotundo, prorsum maioris Rubicæ similitudine, vsus rarior huius.

RUBIA MARINA *Norbonensium.*

PALCIS locis oriunda spectatæ elegantie planta, quam non temerè nisi in Norbonæ Martimis, & squalidis sabuletis Magalonæ & Perusæ circuectis reperies, nec commodiori quam huic loco referas. Radix pedem aut sesquipedem longa, nuda, sarmetosa, arida, rubra, Anchuræ colore, modo, & magnitudine: intus ruffet obsoletius cuiusmodi Iuniperi, aut Cedri ramenta: graciles numerososque cauliculos ab imo surrectos, teretes, geniculis crebribus cinctos habet: è quibus foliola Saturei aut Rubicæ minoris, tenuia, rigida, mucronata, sed incana, vt plurimum quaternis decussatim promittunt, quæ suis axillis acerosos glomerulos foliorum pusillorum cõdunt, deinde summis in cauliculis è medijs istis glomerulis flosculi prodeunt ex herbido lutei aut pallidi, magnitudine Amaraci, & lasmini modo oblongi sunt.



APARINE.

ERYTHRODANI vniuerso generi videtur congener Aparine: valde quippe similis, & eadem penè syluestris forer, nisi intercederet seminis discrimen, tum etiam scabritia hirsutaque cuticula caulium & foliorum, quibus sese vestibus pertinaci applicat hesu, vnde Philantropos, seu Hominis amans, vocitata fuit. Semen verò umbonis umbilicæ figuram celatam medio sui habet.

Aspergula odorata nostras, aut ASPERULA, an Mollugo, aut Asperugo Plinii? Gallis, Muguer.

HISCE proximè accedunt duæ plantæ præcis, vt videtur, incognitæ, nisi sint Plin. Mollugo, & Asperugo dictæ. Altera, Asperula vocitata, tamen non est nisi semine aliquantum aspera. Cauliculos complures quadratos geniculis multis cinctos edit, circum quos stellatim foliola Aparine, latiora, magisque virentia, septena vel octona sunt: floresque exiguè candicant in summo, Valerianæ ænuli: tota planta odore suauis cuiusmodi Lilij conualli: semen rotundum & nonnihil asperum. Rarè alibi quàm in hortis, vbi odoris commendatione colitur, Gallis Belgis per familiaris.

Sagina SPERGULA, sive Spurry Belgarum & Anglorum.

SPERGULA verò radicem exiguam: à qua statim præerigitur palmum alti cauliculi rotundi, graciles, geniculari, crebrioribus folijs, sed exilioribus, circum in stellæ morem radiatis

diatis Galli folijs similibus, flores in extremis albidii, caliculis coercentur semē nigricans. Brabant hac, vniuersa pascim conferunt veruacē, vt cuius pabulo mirificē vaccas saginari, lactisque copiam augeri, veterinā iam diū exploratum habent.

GALLIVM *Luteum.*

Gallium album. PERQVAM simile Gallium huic, sed folijs minutioribus, luteisque flosculis, racemosis, oleæ modo, pascum obuium & notum, odore suau. Huius altera frequenier visitur differētia, floribus candidis, & folijs aliquantō latioꝛibus, ad Rubiam syluestre eiꝛ propius accedentibus, sed minoribus, quod Gallium album nuncupant.

CRUCIATA MINOR.

ACCENSUM potest isti classē Cruciatā recentioribus vocatā, iisdem quibus Gallium gaudens natalitjs. Pusilla radice, fibrosa donatur, à qua cauliculos quadrangulos egerit rectos, pilis hirsutis, ex æquis interuallis geniculatos, quaternisque folijs brevioribus, latiuscālis, hirsutis, & flano pallentibus decussatim stipantur, è quibus flores exeunt lutei, pusilli, singuli, oleæ, racemosi, sed in summo numerosiores, confertim aggregati, thrysulum Pulegij constituūt. Vulneraria hæc, haustibusque prolapsorum ex altō, atq; sanguinis expunctioni admisceri solita, vti Rubiæ cæteræ.

POLYGONATVM *micus, Rubia folijs, ambitu stellato.*

Secacul Arab. *Bathades.* *Polygonatū Pl.* A FOLijs agnoscitur altera differētia Polygonati, Sigilli Solomonis vocati, cui radix & caulis, plantæque habitudo, & natales sunt eadem: verū folia angulihora multō, & ambitu stellato, Rubiæ maioris, vel Asperulæ, quaternæ, aut quina: minores etiā flores inter folia herbacei, bacculæq; Piperis minores: multis hic collibus Ruoli & Taurino Pedemontium collibus syluosis vicinis, & arduis Vegani Norbonensis, Belgicis hortis charus & multus, vbi maius etiam in pratis syluosis spontē luxuriat. Ruri etiam Gallicæ & Germanicæ prouenit crebra, vbi iamdiu & etiam nunc nostro tempore, officinæ cōditi solitæ sunt, ad Diastatyonis Veneris illicium, persuasæ esse Arabum Secacul, multis recentiorum authorum negantibus, inter quos Senensis, qui quid illius Indici Secacul radices penuria subdendum foret, vt solet, silet: nos suo loco commodissimē vtendū monuimus radicibus Pastinacæ marinæ (quæ domesticæ vegetior est) esu gratis, boni succi, nonnihil statulentis, sanguinem, semen & spiritum augmentibus. Eryngij, etiam Pastinacarum & Zingiberis viridis conditura posset vicem expletæ, vti nucis Indicæ pulpa vesca; & Indicæ Bathades, seu Ges vocatæ, quas inter Syssarum retulimus.

Ruellius perperam astruit Polygonatum Syl. Pliniani, folijs Rutæ, Polemonij fruticē, quē non nouit isto nomine, & fieri potest vt hallucinatio sit Polygonati ad Polemonium.

Herbariorū PASSERINA vniculis, Linaria, aut Luteola figura, Lini semen vesco.

HANC aptius quis inter Linum & Scopariam inserat, quam nisi perpauca in locis Germanicæ videas, ynde habuit industrius & magnæ spei medicus Anglus D. Pennius, vbi wild æget Dicken vocatur, id est, Milium syluestre, quia Milii semen non dispar dat, gustu, & similitudine, quodque passerculi depascuntur, ynde Passerinam vocauit Tragus. E singulari, exili, paulum flexuosa, albida Lini radice, caulem erigit vnicum, innceum, gracilem, sesquicubitalem, medio tenus nudum, sed indidem summo tenus, pusillis crebris foliolis Saturæ aut Thymi angustioribus, inter quæ granula multa, oblongi-ascula, Milii magnitudine & sapore, sed calidiusculo, amaricante.

Phyllis.
Hemionitis.
Ceterach, sine Asplenium.
Linaria minor.
Ophioglossum.
Tragium alterum Scolopendrij facie.
Adiantum.
Trichomanes.

Adiantum { album &
nigrum.

Salvia *vita sine Ruta* *maritima*.

Filix mas.

Femina.

Osmunda *regalis* *sive Filix florida.*

Polypodium.

Dryopteris.

Lanchitis.

PHYLLITIS & Hemionitis.

LVET inter pretari Phyllitum quasi foliosam dictam plantam hanc, vt quæ caulis, floris, & feminis expers prodeat, nec nisi folia aut foliosus cespes appareat: è radice namque multis capillamentis fibrosa, nigricante, capilli Veneris, eriguntur senæ, octonæ, vel denæ frondes, crassiores, rigidiores, Vulgaris Lapatij effigie, passim viarum parietina & sylvarum amantes vda, magnitudine & mucrone sesquipalmaris (piculi: interius leuore semper vi- rente, aduersæ, repandæ: à tergo autem transversas multas habent ferrugineo colore pluma- tim exiles lineolas, aut liras extantes, ab ima & latiore sui parte, plumatim secus medium netum digestas, summo tenus quæ in mucronem Lapatij vulgaris, aut linguæ oblongæ similem deficit, vnde Ceruina lingua Officinis vocatur: quare neutiquam iam ambigitur, Phyllitum veram esse hanc, sapore exsiccatæ, nõ ingrato, & acerbo, subastringente, mul- ti ad splenem vius.

HEMIONITIS *sive sterilis.*

SED enim parum adhuc noscitur nũ ea quæ à non nullis recentiorum pingitur, non item descri- bitur Hemionitis, sit ne speciediuerfa ab vulgari lin- gua Ceruina dicat, quam idcirco fecerant docti quidã Hemionitidem, siue tu dicas mula- riã: quamuis eam mulæ nõ depascatur: malim tamẽ sterilem dictam, quod feminis, caulis, & floris sit expers, eoque perquam affinis & germana nostrati linguæ Ceruinæ nobis vide- tur. In quibusdam Italiz hortis eandem hanc, sed aliquantum loco latiorẽ, diuersam, me- minimus, hortatuque quorundam Italorum frustra hanc Romæ quesuimus, quo loci no- bis indicarẽ illi in augustæ antiquitatis ruderibus ædiũ collapsarũ, quas etiamnum verna- culè *Septe Sale*, id est, septem triclinia, illic vocant. Quin sciscitantibus nobis negabant Romani Pharmacopœi se vspiam inibi aut circum in vinetis vicinis Hemionitidem vidisse: sunt enim maceria tantũ illic & cementorum diruræ moles aridissima & præ sole ser- uido minime alendis plâtis, nedum Hemionitidi, apta. Attamen nihil diffiremur viro per- quam sedulo Anguillaræ, qui nos idem quoque monuerat: nempe plantam indidem se ha- buisse, sed adeo obscuris notis distantem, vt perparum aut nullatenus differre videretur à lingua Ceruina. Nec enim minus fibrosam radicem nigricantibus villis, summo cespite vel superficie hærentibus, huic inesse: folia autem auerfis exarata decliuibus lineolis, seu obliquis liris, alterius similibus: basim tamen latiorẽ habere & versum circũque: pedicu- lum falcatam arcuatamque Volubilis modo. Hæc ille. Sed aliquot annis post, in Anglia oc- cidua, ad rupes antrosasque cautes D. Vincentij, vno aut altero miliari ab vrbe peramena Bristoia, vberissime luxuriantem quandam, facie linguæ Ceruinæ, plantam inuenimus: sed ternis quaternisque folijs, minoribus multo: vix enim quum maxima, tres digitos longitu- dine excedunt: minime crassa, aut rigida, sed mollicella, quasi Acanthi veri, inter quem & alias plantas capillares, alioquin lætas & bene adultas irã exilis nascitur: nec vllis à tergo fi-
turi

Hemionitides variantes.



*Harum diuersa
qua ferrato am-
bitu tantum dis-
tat nobis repera-
ta in montibus.*

PAVLO superius spinam Albam, propter folia candidiora quam albi Chamæleontis sic dictâ, à Patavinis hortis recensuimus: unde liquet hanc Albam spinam ab illa non parum dissidere, contrâ quam nonnullis persuaserat vocum paritas: illius namque descriptio satis plena, huius serè nulla, præterquâ radicis quæ Cyperi describitur. Tamen ex Dioscoridis serie & aliis cõiecturis dignoscitur hanc esse spinosum quendam Carduum, non arborem solido ligneoq; trunco, vt audent affirmare nuper quidam scriptor, non inuentus Philologus medicus. Hanc autem Monspeliacam hic depictam si Mathiol. nouisset; potius puto, Albâ spinâ opinatus esset, quam Carduum Argentæ Marizue dictum, cui radices Cyperi nullę, reliqua indicia zquę incerta omnia. Locis vdis & pratensibus Mõspelliũ circũ Cardus hic oritur frequens, inter Narcissos & Aristolochias, cui folia palmum alta, pingua, aut crassiora, in ambitu laciniosa & serrata Acanthii modo videntur, tenuibus spinis ambientib. Caulis binos cubitos altus, gracilis, cui in sũmo capitula, floribus purpureis staminibus oppleta, semine Cnici, sed minore. Radices multe, confertę, ex vno quasi nodulo aptę, in multos oblongos globulos diductę, Asphodeli, Cyperive modo. Quę nobis persuaserant gustu explorantibus, & etiamnum hæc scribentibus, nullam stirpem propius accedere ad Leucacanthã mandenti multũ glutinis exhibet radix, nonnihil caloris & tenuiũ partiũ, tamen amaroris penę nihil Sed malumus vera & nobis cõperta prodere, quam rerum naturas apparatus mendacionũ ad nostrã gloriam detorquere, aut aprosappingere Syluis.



CARDVVS Pratenfis
Tragi Acanthis facie.

INTE Acanthum & Acãthiũ, medius videtur Cardus ille pratensis, luculentę magnitudinis & venustatis, pratıs Heluetiæ & Germaniæ familiaris: Folia namq; habet Acanthii, siue Brancę vrsinę similia, diuisura & ortu paria, sed molliora, flaccidiora, pallidius virentia sunt, in caule quaternum quinũve cubitorum flores congesti papposi, Senecionis maiores, ex luteo purpurantes: semẽque Cnici multo minus. Radix proluxa, crassa. Morganus noster Londinĩ aiebat in horto.



CARDVVS STELLATVS, seu Calcitrapa & Tribulus Ruellii
Coronopus.

NON minus notus quàm infestus Calcitrapa vulgo nuncupata, quia non manibus, sed calcibus atteritur, passim vbique segetum & viarum obuia. Radice longa, colore fusco foris. Folia lanuginosa, lacinia, undulata, profundiora, quàm Erucae, Coronopi modo, caulis seiquipedem altus, multos turiones promit, qui radiis stellatim distincti, mucronati, acutissimi, Calcaris speciem referunt, floremque Attractilidi simile purpureum claudentes. Semen exiguum, rotundum, compressum, Lenticula simile. Decocto huius radicis plurimum vtuntur plebei ad calculum extendendum, vrinæque ciendas, vt & semine contuso, cui tanta vis, vt etiam anabomosi facta venarum emulgentium, aut vtererum cruentum lotium proiciat. Hanc non nouisse, aut neglectui habuisse, multis in locis contemptum Medici parit. Tantò minus decuit istum Medicum & Commentatorem indictam præterisse.

SPINA SOLSTITIALIS, Auriolos
Provincialibus, an Planana?

STELLATO Carduo similis, nec minus nobilis Spina, seu Stella Solstitialis: In Galloprovincia tanta feracitate luxuriat, vt segetum incremento nò parum officiat, & messorum manus pedesque læpissimè cruore & vulnusculis afficiat: radice parua: folia incana, lanuginosa, caules multiplices secundum longitudinem ambientia, pinatim vtrinque surrecta graminis magnitudine, quasi pennæ suæ arundini affixæ, aut innatæ, & quædam striarum tentameta: murices tribuli terrestris maiores sūt, Cardui stellati similiores, fului, lucidi, rigidi, pungendo valde quàm infestissimi, præsertim Solstitio exacto, quum maximè exaruerūt, tunc enim sepes harum aggeribus soliti sunt armare coloni. Flores Cardui stellati, sed filamentis luteis: semine Cnici paruo, paleo colore. Balneis admisceatur ad tinea & Lichenas: stillaritia dicunt tuberosas laringis glandulas & scrophulas sine dolore dissipare.



Empyrici etiam eiusdem stellis crura prætumida frequenti ictu aperiant, & sanguinem vulnusculis eliciunt, vt idem agifolii ramis soliti sunt, ipsi meriti vt non crura, sed terga flagris lacera gestent.

ATTRACTILIS.

EST Attractilis Cnici sylvestris species Diosc. Gal. Plinij, Pauli, & Aetij suffragio. Ea plerisque locis, præsertim Norbonensis Galliz, floribus, tum purpureis, tum luteis spontè oritur. Radix digiti crassitudine, folia longa, magnis incisuris & aculeis in ambitu: caule bicubitali, spinoso, cauo, & capite spinis horrido: flore stamineo, luteo, vel purpureo. Semen Cnico simile, sed minus, & nigrum. Colitur etiam in Belgicis voluptatis causa & simbrofis.

CARDVVS Benedictum.

QUAM benedictam, seu felicitatum Carduum plebeius consensus nuncupauit, alteram Cnici sylvest. speciem esse iamdiu doctis nobisque ex collatione perpendentibus persuasum est, ea omnibus vsu & visu cognita est. Hanc colunt magno studio Chymistæ &

*Recentiorum OSMUNDA Filix florida, Intecolia sine flosculis
& racemosis ligulis.*

MINVS verò nota Italicis Gallicisque tractibus mediterraneis Osmunda, Filix dicta Regia, regijs sanè ac præclaris viribus. Multa hæc in Pictauum nemorosis syluis, itemque Belgio & Anglia plurima, Maris Filicis radice quasi costis compacta multis, & folijs lysdem, sed neutiqum crenatis. Caule striato, quem bicubitalem folia nonnulla tarsum ælæve imitantia æquis ex interuallis stipant, lateratinq; emittunt palmares & sesquipalmares thyrsos, & florū ligulas oblongas, densis racemulis, Lunariæ & Ophioglossi æmulis, aut potius Tamaricis Norbonensis nuper erumpētis, quæ ex ferrugineo fuscunt, inque cariolum & puluerulentum situm satiscunt, seminum speciem aut spem ostentantes. Radices autem amplexæ, & toruli complures costis similes, squamatis sibi incumbūt, ad Hernias, ad vlcera exploratissimi commodi. Quinetiam colicis & spleneticis plurimum conferūt. Nonnihil calida est, & acris gustus, odoris non ingrati.

ωδυνία Polypodium.

Ger. Baumfarne

Ang. Oke fern

Bel. Boom va

ren.

Gal. Polipode.

EIVSDEM classis sunt Polypodium, Dryopteris, Lonchytis utraq; ac Polypodium quidem Romanis Filicula dictum, notius quàm vt delineatione egeat. Potissimum radice, prolixioribus anfractibus, nodulis acetabulisq; donata & flagellis Polypi piscis similibus, cuiusmodi ferè coralli albi sunt: crassitudine digiri minimi, intus porracea, gustu nonnihil astringens & subdulcis, quærna præsertim hæc, sola in vsu, nec alia visitur, nisi si quando macilentius nacta solum, gracilior, strigosiorq; fiat. Sic etiam quibuscum opacis nemoribus paululū folio est adultiore, neutiqum tamen specie diuersa, vt frustra faciunt quidā,

DROPTERIS, aut quærna Filix.

HANC de vultu & de quercu Dryopterim, Filicem quænam dixerunt: folia hnic Polypodij sunt prorsum, aut filicis Fœminæ, minora multo tamē (nō minoribus lacinijs) delicatiora, tenuiora, & teneriora: exilibus lincis pedem altis plumatim foliorū exortus ex aduerso exactè gerentes: auersa item folia, notulis aspersa, non exstantibus, rubiginosis, sed candidis, apicatis, serie gemina, secus folij neruulum medium. Radix verò longa, variè inflexa, humi decurrens, fusca, subhirsuta, & villis cirriforme fibrata, Polypodij (nisi quia gracilior multo) perquam similis. Hinc ansa Pharmacopœis minus peritis erroris plethēdi fuit, dū huius radices dilutis decoctisque miscuissent, à medico institutis, rati Polypodium hanc esse: quæ exitio fuit ægrotis, vti superius in Pliniano Adiantho monuimus. Radici sapor acerbior multo quàm Polypodij, non gratus, & siccitas nonnihil calida, cuiusmodi in Tormentilla apparet, sed huius exitiosa.



LONCHYTIS prima.

ATRIANGULA SEMINE, CUSPIDE, LANCEOLÆVE mucrone, dicta fuit Lonchitis, sed hæcenus ignota prorsus illa galericulata, quæ mirum quantum torfit & transuersos sui desiderio egit animos vestigatorum melioris fragis, Guinuni, Marantham, Anguillaram, quin vel Commentatorem ipsam pepulit ad Montes Italos, & Germanicos, sæpè diuq; tamen nequicquam quæsitā. Idcirco puderet nūc (temet si non deerat aliquid quod satis bene quadrabat) nostram tenuitatem, multum impendio minorem, quasi faciliorem aut diligētiorem, illius Heroicis conatibus intempestiue præferre.

Hll. ij.

Verum

Lonchitis altera

verum Lonchitis altera asperave nuncupata, quæ Polipodij folijs minoribus, tenuioribus minutiusq; incisis, palmos binos alta, pusilla Polytrici, Ceterachue radice est. Locis nemorosus asperis occurrit, vti nobis in Anglia, Belgio, & Basileæ, prope montem arduum, vno ab vrbe miliare distito: muscosi apiculi, vermiculorum in modum, præsertim prouecta ætate, glomerantur, spemq; & speciem dant seminis luteoli & racemosi, Oleæ semine: tamen si sint euanida rudimenta, vti Filicis.

CARDVJ & Acanacea.



Munificus naturæ luxur, Carduorum siue Acanaceorum familiam tam profuse auxit. vt non minus operosum fuerit antiquis, omnes differentias nosse, quam parum facile, exacte vel describere, vel notis inter se discernere. Quo minus licet nobis utiq; eorum hærere vestigijs, aut obscuris designationibus, præsertim cum longè plures notiorèq; inspectione, quam de eorù lectione habeamus Carduos: & nostro sæculo Cardui innotuerint non parum admirabiliore nostratibus, neq; vsquam memorati veteribus. Quare lubuit, si quæ possent ad antiquam cognitionem referri, ita expendere, vt interim alias complures species & varietates indictas neutiquam transleremus, eoque hanc recensio nem seorsim auspiciari & digerere commodius duximus, quam Sonchis (quibus cum tamen pluculum similitudinis sortita videbantur) subnectere. Sunt quidè vtraq; spinosis folijs, latis, & ferè holeraceis, sed Carduis sui generis peculiare discrimen statuunt capitata muricataue cacumina, vnde Acanacea dicta fuerunt.

Carduorum frequentissimi, hi sunt.

Acanthium maius, vinarum.
Acanthus hortensis & sylvestris.
Scolymos vtrag, siue Cinara.
Sylbium seu Carduus Mariæ argentatus.
Calciatras siue myacanthos Theophr. vel Ruell. Tribulus ex Theophr.
Atractylis siue Cnicus sylvestris Galeni, Pauli, Theophr. primus.
Carduus benedictus, siue Cnicus syl. secundus Theophr.
ex Ruellio putatus.
Crocodilion Fusch: Ruto seu Ruto Theophr. Anguillara, seu Echinopus
Gesneri. Carduus peregrinus Dodonæi.
Astione Anguillara.

Rariore sunt.

Acanthium Illyricum.
Chamaelon } albus,
} niger.
Chamaelon non aculeatus Theophr. seu Carduus pinus Monspellensium.
Spina alba. Arabibus Bedeguard.
Spina alba altera Anglica.
Spina Arabica, Mauritanis Sucaba.
Leucacantha, radice Cyperi, an Chamaelon niger Monspellensium?
Eringium } Alpinum caruleum Geneuense,
} Montanum, Illyricum & Italicum.
Chamaelontha Monspellensium.
Scolymos Theophrasti, seu Eringium luteum Monspellensium.
Spina Solstitialis quia Solstitij post festus segetes in Narbonensi agro, infestis
muricibus totos operis tractus,
Picnones seu frequens aculeata parua Solomensis Creta, vulgo Cran.
Carducellus id radices montis Lupi.

Carduus

Echinomelocactus Peruvianus, magnitudine & effigie
 Melonis, vallata, sulcata, striata,
 Hippophaes Hippophaeston.
 ANTHIDIS. ACANTHIVM.

German. Weiß wege distel. Belg. witte wech distel. Gal. Chardon argentin.

MALIM per olei ακανθίου, & grandæ spinæ, & vepribus infestissimum, quale est
 istud creditum, vbique viarū obuium, radice crassa, à qua folia statim complura e-
 mergunt magna ferrata, in sinu lanugine obducta, & aculeis horribilibus donata: caule cras-
 so, & striis, spinis, Echinato capitulo, staminibus purpureis referto, & refertis sentibus
 armato, semine Cnici, sed compressius, Cardus Maris non absumili. Hæc foliis utcum-
 que accedit ad Carduum illum Bulbosum, quem Leucacantha coniectamus.

ACANTHIVM Ilyrium.

SVPERIORIBVS annis indefessi laboris Pharmacopœus singularis amicus noster Vale-
 randus Domez Flander Insulanus, ex Sclauonia rediens, huius semē attulit, & Lugdu-
 ni in Gallia seuit, vnde miræ altitudinis Carduus feliciter adoleuit. Folia Acanthi ma-
 gni, vel Sylibi maiora sunt, proceræ caulis spinosæ hasta hominem duobus tribusque cu-
 bitis superat: capitellū Acanthi amplum, floribus stipatū purpureis fert: semine Cnici
 factum. Vniuersa planta magnitudine speciem præfert arbusculæ, & adeo aculeos quo-
 quod versum protendit, vt nullus subter impunè transmittere possit.

ACANTHVS SATIVS & Sylvestris.

{ *Gra. Ακανθὸς καὶ ἄκανθα.*
German. Brennflaw. } *Officina Braggæ Vrsinæ,*
Belgic. Berckelantw.

SPINOSA duntaxat thyrso ακανθῶ ex Diosco. descriptione, & columnarum apud Vi-
 truium epistulis, vulgatæ cognitionis & vsus est, nusquam tamen eam nisi satū enatā
 vidimus, præterquàm inter oliueta Mespelliensibus mœnis proxima, & exeunti ex Eg-
 dia porta, inter fontem & riuulum, prope murum, vbi Pharmacopœi colligere solebant
 ad zncematum emollientium decoctiones, cui solo vsui duntaxat etiamnum in hortis sa-
 tinum habetur: nihilque differt ab illo, nisi mollicit & magnitudine. Videtur Galenus,
 aut eius amanuenses, quas facultates Dioscorides Acanthio attribuit, Acantho huic assi-
 gnasse: cuius tamen, vel diurno & diurno vsu teste, radices emolliunt, vniuersaque
 planta mucaginosa est. Et vbi interpret vertit luxationes, aptius diceret torsiones, liga-
 mentorumve tractiones, cui medentur, initio suauia malactica dolorem sedando, & leni-
 ter digerendo, si quid doloris appulsæ parti influxerit. Nam luxatis artubus potius obe-
 rit, fractis & conuulsis proderit.

κνίδα. SCOLYMOS, seu Cynara, Cactos Theophrast.

{ *German. Strohbolden.*
Gallis. Artichaut.
Belg. Artichauts.
Itali. Articoa.

NON à cinere quo graudeat, vt Columella vult, sed potius à canedictā malūt κνίδα,
 Huius compluria vesca sunt, sed gratiora quæ cultiora: nam sylvestris delibatis cau-
 libus teneriusculis, & capitulis nondum in flores erumpentibus, vti aselli, victant etiam
 rustici Itali. Cultu adeo adolefcunt & tenerescunt caules & conī, vt gulonibus etiam tra-
 gemata minime spernenda sunt. Nec sunt Cardui illi, nomine Cactos Theophrast. aliud
 quàm Scolymi, quorum descriptiones, vires, & mangonia iamdiu notissima sunt.

SCOLYMOS SYLVE-

*stris siue Chamæleontha Mon.
spelliensium.*

QUANTVS quantus est, spinis re-
fertus est ille, vsu, quàm nomine
celebrior, Carduus syluestris, coagu-
latorius, Norbonensi agro pluri-
mus: quem, quia tota facie Scolymū
refert aculeatum, Cinarum sylue-
strem appellamus: Hoc tantum in-
terest, quod foliis angustioribus,
aridioribus, & multo densioribus
spinis sit. Flores item eleganti pur-
pura multi, conferti lanugine; qui-
bus coloni, antequam in pappo
abeant, decerptis, lac coagulant, nul-
li vsui alii illic seruit: tamen non
insuauis gustu, nec absimilis Cyna-
ræ. Capita altero tantum quàm Sco-
lymo minora. Semine Cnici, com-
presso, aut Sylibi. Chamæleonthā
vocabant præceptores nostri.



SCOLYMOS THEOPH. seu Eringium, batum,

Monspelliensium.

SCOLYMOS SEU Theophrasti Scolymos haud parum à Dioscoridea abest, vt faciliè animaduertere
Theoph. diuersa teum vocant, illiusque loco nonnulli sufficiunt locis à mare remotis. Frequens hæc locis
à Cynara & Ca maritimis Norbonæ: radix pollicem æquat, magnitudine Raphani, sed fuluescens, suc-
co prægnans lacteo, vti Dens Leonis, quæ cruda vel cocta estur à nonnullis: numerosos fun-
dit caules bicubiales, in ambitu circum sparsos, foliis obductos, caulem ambiētibus, quæ in
imo maiora sunt, longioræque, virēntque: intenso virore nigricante, & maculis lacteis pas-
sim impressis: adeo tota horret aculeis præduris, vt quæ arripias, nescias. Cinaræ conum
profert, Nucis Moschatæ magnitudine, vbi flores luteoli, non Cnici concolores, sed si-
miles: Semen compressum squamis conii coerctetur.

SILTBVM, CARDVVS Maria, & Lactem.

Germa. Maryen distel. Belgis, Onser vjoutwe distel.

Ang. Our Lady distel.

LACTEO Carduo, vel Mariæ dicto, adeo folia Chamæleontis albi similia sunt, vt non
parum multis doctis persuasum fuerit Spinam albā esse, quam illi assimilat Diosco-
rides. Sed quia seueriores animaduertores, solo magnitudinis argumēto, inficiantur, sal-
tem, puto, pro Silybo non respuent, quæ lata spina proditur: cuiusmodi est Mariæ Car-
dus, foliis prægrandibus, latis, spinosis, maculis & ductibus lacteis, crebribus, aspersis, vi-
ridibus. Caulis bicubitalis, crassus, spinosus, & echino donatus, spinis cincto, purpureo flo-
re referto: semen Cnici compressum, lapidi extenendo optimum, etiā muliercularū ex-
perimento. Imum caulem pullulantem delibatum, & radicem in acetariis aliās esita-
mus in Italia, vbi risum Germanis mouimus. Plebecula muliercularum copiam lactis
illius

lius esu prouocat. Dodonęi sedulitas, vt multis aliis locis laudanda, ita plerisque minus tēpestiua, vbi ignotis plantis facultates certas asserit, quas ē Dioscoride accepit, magno detrimento ægrorum, & experimentatorum, qui quod vident à viro bono, & veritatis amico scriptum, illico vt verum arripiunt, & per experimenta mortes agunt. Sic virpius & eruditus Turnerus Anglus, in suis herbariis Alphabeticis Anglicis.

*Herbariorum Carlinæ, ē varietate, non genere duplex, non est Leucantha,
sed CHAMÆLEON ALBVS, Diosc.*

*German. Eberwurty.
Gallis. Carline.
Belgis. Euerwoutel.
Ang. Mylike theffell.*

PLERISQUE omnibus officinis persuasum est duplicem esse Carlinam: quippe quam caule donatam, & carentem viderint. Sed hi, si (vti nos) vtriusque radices, & vtriusque gummi subflauum vermiculosum, non nihil pellucidum, odore viroso, gustu & visu explorassent: demumque eadem radice & flore caule donatam, alias verò caule carentes: Et alibi etiam proximè vbertim enatas, partim caule viduas, partimque vtroque donatas, obseruassent, volentes sententiam mutassent. Id nos accuratè expendimus, non procul ab arduo & gelido dicto D. Bernardi monte, atque etiam via qua Alburgo itur Tridentum, locis lapidosis & siccis.

THEOPH. CHAMÆLEON non aculeatus, interdum
aculeos, aliàs caule donatus.

Sic videas Monspellio finitimis locis glareosis, inter Cystos & cocciferas Illices Carduicellum foliis Scolymi non aculeatis, radice nigricante, digiti parui crassitie, cuius caulis palmum, sesquipalmum, & pedem altus, lumbum fert intus florum, multis purpureis aggestis & collectis staminibus, foris squamulis lucidis, albicantibus, sibi imbricatim incumbenibus, compactum, visu pulcherrimum. Hunc sæpius pluresculi studiosi cōsultiones inibi copiosum collegimus caule carentem, & eodem donatum: flos tamen, folia, radix, gustus, omnia eadem: quin & nobis tunc mirantibus, dictum fuit, hunc caule carentem, cultum, caulem promere primoprouentu.



*Iacea montana,
& Caranus pa-
nus Dobsonii.*

IXIA, sine viscum Carlinæ.

GVMMI verò Ixia dictum, Carlinæ caule viduæ & donatæ radici exudans virosum, & gustu ingratum scimus: venenum sit nec ne, nondum compertum habemus. Sed id asserere possumus, non nisi vnam esse plantam vtrunque Carlinam, vti dictum: quod præstaret istis nostris ampullatoribus docere, quàm cogerie autoritatum omnia turbare, neque etiam Dioscori. Viscum vllum in nigro Chamæleonte agnoscit, aut vilius illius noxiæ vis meminit, quæ pariter nostram fulciunt sententiam. Quid balbutiat de Ixia noster Plantarius Senensis, ne quidem à Ruellio doctus differentiam visci & veneni, alibi dicemus, vbi, si tene illud deleterium intrò ingestum, discutiendum. Immeritò namque & ingrato animo falsidire videtur Marantha Neapolitani Chamæleontè pictum, sibi munerè missum. Nam, inquit, folia rubris maculis nulla habet, non variegata, nec rubet caulis, non exesca, non acris, nec flaua radix, caules non digitali crassitie videntur. Quasi verò ista indicia ei, quem ille Senensis alterum statuit, insint.

*Nos Maranthæ
nec Maranthæ
Chamæleō niger
pictus, est Diosc.
genum.*

Hh.iiiij.

Qui

Qui norunt Galenum mutatum è codice, potius quàm de Dioscoride mera & metipfa verba, vt plurimùm suspicabuntur iniscuisse illum albi cum nigro facultates, huiusque radicem venenatam prodidisse: quod neutiquam de isto, sed de albo, propter, vt videtur, gummi ignis, dixit Dioscorides. Idem contigit sapissimè Arabibus, vt capite de Centaureo, & alibi nonnulquā Galeno, vt de Irde & aliis: nec tamē vllam Theoph. venenatæ qualitatē facit mentionem, tantum canes interimere posse ait. Sic possunt multa cani & pecori noxia dici, quæ sunt salubria homini, vt nux vomica, Doronicum, & alia. Cum autem etymon huius Cardui Chamæleontis, Dioscoride interpretē, à coloris & foliorum varietate deducendum sit: planta sit oportet varicolor, variis in locis, vt Chamæleo, cuius cutis cuiusque solo incubuerit, concolor fit, iam nigra, viridis, aut albicans. Quantum verò coniectari licet, nulla est planta, cui magis hæc Dioscoridis nomenclatura faueat, quàm ERYNGIO vulgaris: nam montanus totus caeruleus fit, campestris albus, interdum & purpurascens, vt etiā in maritimæ ora Sclauoniæ inuenitur, & ad xdes virginis manufactæ Lauretanæ, vernaculè *Lurette* vidimus. Albus verò secus Rheni & Sequanæ ripas, in Germania, & Burgundia prope Maconem, aliosque tractus.

CROCODYLION.

NE cum multum liquet nomenclaturæ huius Cardui ratio, neque descriptio animum explet: & Carduorum tam latè patet familia, tantæque inest similitudo, vt vix ne antiquis quidè probè aut distinctè, aut cognitè fuisse putemus. Nam antiqui, Galenus, Oribasius, Paulus, duntaxat verba hinc videntur mutuati, aut è Crateuz, à quo Dioscorides & Plinius, qui locis non syluosis, vt ille, sed fabulosis, codicis errore, non suo, oriri scribit. Sed in Crateuz fragmentis desunt verba paucula ista: *καταπέπλησεν οὐκ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὕδατος*, rotundum & duplex, vt scutum, vel potius, vt quis posset suspicari, instar aspidis serpentis in spiram vel gyrum conuoluti, vt esset quædam allusio nominis argumenti ad Crocodylum, nisi fortè eò alluissè nomenclatores videntur, quia Crocodylion aquaticum sit, & ripis fluminum plurimùm degat. Ideoque ab Etio mentio facta sit magnæ Crocodyliadis iuxta aquas nascentis, ad dolorem capitis. Quin neutiquam puto istam vim tacitos præterituros antiquos fuisse inter Elenchos hamagogorum remedium, si plantam familiarem notamque habuissent. Nam puerili acclamatione fœlices ominatur in Italia Medicos futuros Senensis Commentator, si hæc inibi nasceretur. Potius gratulandum foret Empyricis circulatoribus, & vulgo *Scannidici* vel *Montebancis*, quàm emundæ naris Medicis, qui cum è naribus ducendus sanguis est, longè tutiora & potiora remedia in procinctu habent.

Ansit CROCODYLIVM, niger Chamæleo Maramba?

MARANTHA verò & Anguillaræ depictus Chamæleo, videtur aut verè esse Crocodyliū, aut certè germani opinionè sustinere posse, vsquedum doctis exactior descriptio, aut planta Crocodylio aptior occurrat: adeò enim descriptioni accedit, vt illis nigrū esse persuaserit Chamæleontem. Qui verò sanguinis è naribus prolectionem desiderat, serò Crocodylion agnoscat, quia probationis incertus modus, experimētū etiā periculosum & incompertam doctis, non tacituris, si nouissent. Cardaus verò quem Fusch. fol. 235. Crocodylium statuebat, huc pariter posset asserri.

RITRO, seu RVTRO Theophrast. Crocodylion. Fusch. Echinosus,
seu Carduus Echinasus Gesneri, Sphaerocephalus Cordi,
Spina Peregrina Dodonæi.

{ *Germa. Weische distel.*
{ *Belgic. Koomsche distel.*

Hæc inter spinosos carduos valde quàm elegans, duplicis differentie visitur, & (quæ namq; in Anconesi, Romano. & Norbonensi agro ac Auinienensi, habentur, duplæ magnitudinis sūt) Chamæleontis ritu variat. Etiamnum siccas habemus, radice exigua, pollicem æquantē, folijs Chamæleontis albi longè minoribus, caule nullo, interdum exiguo, nonnunquam palmum & aliàs cubitum alto. Folijs semper proportionē exiguis, & Spinæ albe modo profundè incisis. Echinus illi cæruleus, eximia cærulea purpurescēs, orbiculatus, spectatu iucundissimus, & magnitudinē, quantā spherula lusoria. Semen & eius glumæ similia Spinæ albe: nullas tamen sursum rectas procul vaginulas aculeatas porrigit: tametsi sint acerosæ intus & lanuginosæ, vti in Spinæ alba. Rutrum siue Kitron Theophrasti censet Anguil-lara: qui tamen proximè, vt videtur, immemor descriptionis, eandem spinæ albe notis ac-



Fuschij Crocodil- lion.

Altera, quam Crocodilion Fuschius putauit, proius genere eadem huic est, sed magnitudinē impensè maior, vt plurimum, visitur: In sylua tamen Valena, qua Gangem oppidum itur, collegimus cæruleā, & hanc excaulem, & caule palmū alto præditā, quæ albi ad duos, ternos & quaternos cubitos assurgit. Echinus cæcidus est, nō cæruleus, & cum maximus & rotundus, magnitudinem mediocris Arantij assequitur: semine alterius, sed multò maiore. Cauli imo secundum longitudinem striato, adnascuntur permagna folia, & Acanthi similia, spinosa. Belgici horti & Britanici hanc spectaculo alunt, vbi luculenta magnitudine Spina peregrina dicitur.

κάρθα λεύκη **SPINA ALBA**
Bedeuard Arabibus.

ARABICO idiomate Spinam albam *Bedeuard* vocant, nec tamē vllis notis notiore faciant Mesues aut Serapionis interpretes. Quænam autē verior sit ex permultis, quæ proditæ sūt, paucis dicendum. Plurculis superioribus annis in horto Patauino illustrissimū Senatus Venetorum, indicante Melchiorē Guilandino, inibi præfecto (qui in stirpium historia quantè sit peritiz, & indefessū laboris, non nisi perdocti norunt) visus fuit Cardus totus albidus, infernè lanugine incanior, quā superne: folia Chamæleontis minora in regionibus siccioribus: nam quem in Anglia seimus, latiora aliquatò habuit: fuitq; caulis bicubitalis, interdum tricubitalis, digitū crassus & incanus totus: Echinos marinis similes, rotundos habet: quando florent, ex albo



purpu-


purpurascetes. Inter quos defluentes sese in summo multò altius erigunt ternæ, quaternæ papposæ glumæ confertæ, rigidis, mucronatis, tunicis, semen claudëtibus oblongû, auenæ excorticatæ æquale & simile. Hæc posterioribus & acuratiorebus peritiorebus sententijs omnium maximè quadrare videtur Spinæ albæ. Semen tamen cuiusmodi diximus auenæ aut Secalo similis, sed rotundius Cnico. Non est hæc, quam sibi missam olim Patuio Senensis dat, cæteris omnibus iugulatis sententijs, vt suam ambitiose intruderet ridèdis argumentis, & plus momenti allaturis ad suam ipsius, quàm ad aliorum refellendam.

SPINA ARABICA, siue Suchaba Mauritanic.

CONSECVTIO docet hanc Carduum quèdam Arabicum esse, non arborem: nec tantùm natali solo, sed potius facultate diuersam esse ab Alba spina: & tamen hic quidam profligati pudoris scriptor viros lectione & omnium artium exercitatione cultos gratis incommodo posteritatis lacerat: doceret potius, cur non sit hæc spina Arabica vna ex Egyptijs, aut cur non possit congener esse, Dioscorides similem albæ spinæ, naturam enipè dicit, quia alstringere asserit. Illa vrinas ciet, conuulsionibus prodest: hæc si alstringit, filamenta ductûsq; fibrarum rugat, & conuulsionis causam impingit, inculcatq; materiam. Quare hic *κατὰ φύσιν* non vires, sed figuram interpretadum: nec enim, vt aiunt, duo capita repetit, & locis diuisa eadem an verò quod Philosophis summis contigit, sit *μικροῦ καὶ μεγάλου*, id Commentatori propinamus: non litibus, sed modestis & parcis disquisitionibus dirimendum. Quando vtriusq; vires eadem: Et videntur huic potius subdi debuisse succedaneum Bedegardum siue Cynorodi glomeruli ex varij coloris filamentis conuoluti, quàm illi: nam alstringere hanc signanter notat: illà potius digerere.

TOMENTOSVS carduus Anglicus, aprior ne videtur descriptioni Acanthæ Lenæ, quàm superior Patavicus?

NEc longius abest à genuina Dioscoridis Spina alba hæc, quàm superior memorata, facie, caule ternum quaternumve cubitorum, in caula lanugine obdito, Spinæ albæ Patavinae, aut Scolymi Iyluestris similis. Florum capitula rotunda, compressa, Echinum marinum, (quum nondum hiat) bellè referunt, aculeis mollioribus, villosisq; quas Arachneis sericeisve Filis concinnè reticula tim implicata. E quibus per maturitatem staminea purpurea florû, Cynaræ aliquantò minorum, exeruntur, succrescente femine Sylibi, rotundiore, corpulentiore. Radix magna, fusca foris, intus alba, Personatæ similis, gustu non ingrata, diuretica. Frequens hæc in Angliæ collibus strigosis agri Sommerleti, iuxta ædes generosi huius historici perquam audi & studiosi Eduardi Saintloos.



ADIANTHVM, sive Capillus Veneris verus,

QVINQUE congeneres pusillæ stirpes sunt, quas hic cõmodum discernere inter se opẽ
re precium non vulgare erit, propter istos rabiosulos & prolixos commentatores,
qui dum rabie Cerberæ ad Dryphacta se mutuo proscindunt latratione, nihil aliud quàm
tyrones nos, nostròsque commilitones, hæc noscendi perquàm auidos, torquent potius
quàm docent: vt quibus forrè scripturientibus non res ipsæ præt oculis, earumve cog-
natio, sed potius ostentandi declamandi quẽ in animo ambitio esset.

Primò Adiantum verum Dioscori. nullibi quàm Nor-
bonensi tractui frequentius, faxis & riguis vmbrosis pe-
trosi quẽ, Veanio, sterilis Seuenæ finitimus, ac rupium,
fontium, & puteorum labris vel asperginibus Monspel-
lii Namausi quẽ: rarò alibi in Gallia, Germania, Belgia, &
Anglia, aut nusquam prouenit: quin ne Italiz quidem
locis multis, aut nulum videre meminit; duntaxat
quibusdam in puteis Rioli vrbis Pedemontanæ regio-
nis, id quẽ perpaucum: fibrillis verò capillosis, plusculis,
fuscis hæret, vno omnes amplexu aptis, vnde panduntur
numerosi cincinni iuncæ iue loruli prætenues, prolixiori-
bus sed tenuioribus quàm Trichomanes staminibus, pal-
mum aut sesquipalmum altis, sericeo nitore & fusco co-
lore nitentibus: folia Anisi vel Coriandri diuisura, latius-
culis alterno situ cirrulis appensa, penè visum præ tenuitate sallentibus, tenella, vtrin-
quẽ lateribus rectis clausa, trianguli speciei; sed supernè ambitu laciniato & circinato. Hęc
omnium præstantissima, quæ indidem Lugdunum, Lutetiã, Antuerpiam, in quẽ cetera Em-
pora celebriora asportatur, caro quẽ à Sepalsiariis emitur, ad Capilli Veneris Syrupi di-
cti apparatus. Galliz ditiores & aulici sibi curant non rarò MonsPELLI conficiendum, in-
dè quẽ adferendum, quò recentiore, & præsentiore vtantur: mirum enim quantum tho-
racis affectus, hepatis renum quẽ iuuat. Immadidus, vt species ceteræ, in aqua perstat mer-
sus, quasi luis esset in natalibus, & tamen siccius creditur, aut potius ambigitur ab illis me-
rito, qui ex huius expressa libra bessem ferrẽ succi promanare asserunt.



TRICHOMANES, Polytricum.

VIRIBUS & sapore proximus huic Trichomanes, & Polytrici nomenclatura officinis
non consuetum minus quàm cognitum: vbique Belgiz, & Angliæ parietinis, glareo-
sis quẽ opacis viis vberimum, radice fibris nigricantibus comante, crassioribus quẽ
breuioribus capillamentis, fuscis, nitidis, rigidiusculis, gemina vtrinque foliorum serie,
Astragali Tribulive terrestris æmulis, ex atro aduersa parte virentibus, subter verò macu-
lis ferrugineis signatis.

ADIANTHVM ALBUM

& nigrum. Plinij.

PLERQUE omnes Belgiz, Germaniz, Burgundiæ,
Franciæ, Sabaudiz quẽ officinæ, non modò hoc
æuo, sed etiam ab omni memoria Adianthi duas
differentias hæc habuerunt; quibus semper vsq;
sunt albi & nigri Adianthi vocabulo. Radix pusilla,
filamentis crebribus compacta, atris, rectis, crebri-
bus iuncis, paulò crassioribus & prolixioribus quàm
Trichomanes; ex herbido pallentibus aut albicanti-
bus: folioli vtrinque & altrinsecus plumatim disitis,
Filicis maris diuisura & situ, sed multò minoribus,



Hb.i,

altera

& clinici, morbi Gallici linitores. In arduis alpibus Galloprovinciæ prope Monstérias Marignols vocatis, ubi vndiq; effodiuntur Crystalinæ, Irides, & varij coloris alij lapides, crefcit: in summo montis rigidior & aliquantò minor hortensi. Senēsis suo more mordet, & nihil docet. Nam eius Attractilis nullis depicta aut asserta verbis iacet spectanda, non vt nos certiōres, sed vt dubios reddat: parū enim Dioscoridis descriptioni aut receptæ Attractilidis accedere videtur: verū verb illius silentium, an pictoris in exprimēdo solēissimus & cacofilia, inculcāda sint, viderit lectōr. Fortē huc nullo delectu intrula fuit, quia in penul timis illis Commētarijs abfuit, nec dum vlla certa, vt videtur, authori nota fuit. Ideo suo more, ne nihil ibi egisse videretur, vel itandī ansam arripuit: ait Attractilidē non esse Car thami syluestris speciē, duntaxat quòd argumento triuiali sanguinē succū nō remittat. Hæc iamdiu sibi scripturo obiecerat Ruellius, & responderat, nō quouis anni tēpore, sed mēssibus præsertim, nempe maturo & copioso succo, id deprehendi: tunc enim nonnihil cruenti coloris emanare. Quod etiam Lutetiz in vireto Ioannis Hebræi singularis Rhiso tomi meminimus iam multis annis ostensum nobis in Attractilide: etiamque Mon spellij in benedictō Carduo & Carthamo idē cōperimus: nam florū & succorū colores, odores, aliāq; accidentia incrementa, decrementāque, assequuntur alijs locis & tem poribus alio modo. Quin multa succo sunt aut suluo, aut purpureo, in quibus non nisi as frictu, maturatione, maceratione, aut expressione percipitur, vt in Androsamīs, Rheadis, Papaueris radicibus incisis, Verrucaria, siue Tornesole, & alijs plerisq;. Sed testam ambiti onem prodit imprudentia, nam qui vidisset antiquis classicis medicis nixum Rue llium, Galēno, Dioscoride, Ægineta, & cetero eorum sententias, contrā quā solitus est, in capitis calce reticuit.

Sequanorum Cirsium luteum, an ACARNA & Erythral Theoph?

FNCULTIS & aridis Ericetis visitur carduus quidam, quem Acarnam Theoph. aut Carlinam Syluestrem, alij Erythralem nuncupant. Exigua radix, folia Carlinæ aut At tractilidis, minora, spinosa sūnt. Caulis gracilis, rotundus, cubitalis, quo tria quatuorve tu bercula echinata aut acanacea gerūtur, radiatis stimulis cincta: è medio patuli, Echyni ex eruntur flores, ex luteo pallidi, sed multo minores. Hanc Anguillara Erythralem fecit, Sequani Cirsium luteum vocant.

PICNOMOS Creta, Salomensis Galloprovincia.

VT pusillus ita pulchellus & rarus est Carduus, quē solum in arida spatiosaq; maritima planitie, inter duas antiquas vrbes Arelatem & Salonem, cui quia, vt coniectura fert, cretaceum solum subest, nomen vernaculum Crau indictū est. Ædicula media in planitie est olim D. Martino sacra, propēquā ex aduerso minoris diuersorij huc Carduus nobis pri mū lectus fuit, vti etiā alijs postea locis incultis & deujs. Radice est exigua, mansu quidpiam glutinosi præferens, longa folia secus longitudinē cauli adhzrentia, Chamæleontæ Mōspelliensis modo, sed angustiora multo, in ramis magnitudine Calcitræ, & illi modo in ambitu sparsa, spinosa, logisq; aculeis aded stipata, vt arrepturo nihil pateat aditus. Vm bellæ numerosæ, flosculis Senecionum æmulis, luteis, pallentibus cōstatæ sunt, quæ in pap pos duriusculos Attractilidis modo euolant, semenque exiguum Cnico simile relinquit pulaceum. Hæc quò sit referenda, nescimus, nisi inter nigri Chamæleontis species. Picnomon non asseueramus, sed quia spinis munitissima est, significationi alludentes, ita vocitamus.

DIPSACI satini Fullonum, & sponte nascentis LABRI VENEREI, discrimen.

QUAS I sitibundus potōrve vocatus fuit hic carduus, quòd foliorum iuxta caulem alis & cauo plerumq; torem aut imbrem excipiat & seruet. Eius autem varietas

Iu. j. duplex

dup lex hodie nota vulgo est. Nec enim videtur solo cultu euenisse, vt Fullonum Dipsacus aculeis aduncis, recuruis & rigidioribus, à Labro Veneris sponte prodeunte tantū cultu distet. Nam plerique omnia culta molliora & teneriora, minúsque spinosa euadere solita sunt: at hic satius capitibus est reductioribus, obliquis spinis, crebribus, aduncis, ter ram versus reflexis, adeo rigidis, vt flamina carpendo & vellendo filamenta non facillè effringantur.

VIRGA pastoris.

SEd alter mollioribus, miuoribus surrectis, nec aduncis, longioribus multò, inibecillioribus: folijs itè mollioribus, minoribus, haud dissimilibus, capitula crebribus, & bituminosis trifolio similibus. In Anglia Cantia fecus vias & suburbia Rhiz Sandvicium.

Tertium & minimum, non adeo frequens, vsui incertum nam cetera duo refrigerantis & siccantis sunt facultatis, Cancerosi vlcerationibus multum conferentibus.

CNICVS Carthamus.

MOrdacem pungendo spinosusque carduum Cnicus significat, purgatricem autem eius facultatem Carthamus: Non est autem regionum Septentrionalium nisi culta & inquilina: vbi tamen læta adolefcit, sed nò parum virium purgantium semini decidit. Nam Orientale multò facilius & vtilius minori quantitate purgat. Norbonense, vt quod *Maffi* lages quatuor à Monspellio leucis colitur à Pharmacopœis, imbecillius multò est, vtque quod non minore quàm duarum vnciarum, sed saltem vnius & semissis mole, aluum subducatur, nec obstructions meseraicarum equè probè referet. Quia satis innotuit plura adde re non, operæ precium fuit, cum etiam de Carduo Bene dicto congenere satis cognoscatur.

CARDVNCCELLVS montis Lupi.

IN Norbonens agri montanis, ad montis Lupi ima, Meridiè versus oritur prope pusillū amnem aut torrentem hæc Cardui species omniū minima, coque Cardū cellus nobis nūcupata. Plantulæ huic radix est implexa, altè humi depacta, à qua mox foliola plūscula, exilibus & altis diffusis dentata. Caulis vix spitemeus, leuis & gracilis: humi demissus, flos seu caput, maius quàm pro foliorum responsu, spinis horridis, foliosis cinctum florem claudit purpureum *Attractilidis*, cui etiam folia ipsaque vniuersa planta valde similis est, sed longè similior. Etij *Attractilidi*, purpurea flore vocata, fottè & eadem: vsus incognitus, quia planta vix nota.



Vulgo *Astone Italica Anguillara*, Spinem *Ceanoton Theoph.*
tametsi multa nisi radice nota vaga.

PTauino agro subter humū prolixe propagatur huius radices. Folia similia, sed spinosiora quàm *Sonchi*: caulis striatus, cui summo insunt paruuli multi *Echini* purpureis staminibus florentes, & in pappos vbi maturuerint euanescentes: Semen paruum, & simile *Cnico*.

ACVLEOSA Gasse in Polyacantha Theoph?

Carduus ille trix cognitionis, qui spinosissimus Polyacantha merito videtur: adeo enim quasi densis villis senticosis obuellatur tum caules & folia & foliorum capita, vt quacunq; intueare, multas spinarū phalanges animaduertas: flos illi puniceus & purpureus. Capita eclinosia, oliuam equantia. Caulis sesquipedem altus: folia spinosa *Acanthio*, minora, nec lanuginosa, sed ex atro virentia, radix fibrosa, numerosa: Hæc tametsi, vt plerisque spinis refertissimè aculeosa siue *Polyacantha* dici potest, non tamè continuò *Theoph.* sit aut *Gasse*, quæ videtur ex subfruticum genere: Tametsi putet quidam *Polyacantham*.

ERIN.

Vesum ERYNGIVM Marinum: Campestre, Mediterraneū & Montanum.

GRÆCI Philosophi Eryngium quasi ἐρύγην, siue ructum dictum autumant, quia ea- Ang. See bohye
 sequentem quasi stupore attonitum sistunt, donec Eryngium ructu reiecerint. Belgus. Eryngium
 rum perspicuè calamus humanus, etiam res minimè suapte natura obscuras describat, vel woptele.
 hinc liquet, quòd cum Dioscorides oratione dilucida Eryngium repræsentarit, tam-
 nondum liceat statuerè, utrūne Marinum dictum an vulgare Montanum in-
 sinuarit. Omnia tamen iudicia propius Marinum referunt, quàm vulgi Montanum,
 duntaxat loci mentionem excipias, notam lubricæ fidei, & non adeò magni momenti. Ma-
 rini primùm folia teneriuscula sunt, neque statim aculeata, eòq; in acetaria veniunt, quem-
 admodum Crithmum aculeatum, seu Pastinaca marina, huic natali bus proxima: Deinde
 lata, spinosq; fiunt, ex tremo ambitu minus profundè sinuata & asperiora quàm montani
 gustu etiam plus gratiæ & aromaticitatis habent, ambitumque asperum: adolescenti
 spinæ succrescunt: & cauli magis sphaerica capita insunt, rigidioribus, aculeis stellatim cir-
 cundata, vt vult Dioscor. color vero vtrique variat, sed vulgari non nisi variante loco. Ma- Montanum
 rinum ipsi vidimus ad Aquas Marianas & alia complura litora, colore cæsis, albo & viri- carnuleum.
 dante: Radix ei longissima, & quæ denos duodenosve pedes excedat, crassior etiam
 quàm Montani, odoratior, cibo, medicamento gravior, efficacior: non enim nisi hac de-
 ficiente vtuntur docti illa, non perindè freti viribus illius. Aspera Maritimū amat, editio-
 ra: vix nunquam enim in monte Ceti & similibus inter zedita saxosa occurrens, sed semper Campestre.
 depressis, asperis, vel arenosis, incultis locis, interdum sesquimiliare à mari remotis. Cam-
 pestrem verò superius cum Chamæleonte, cui magis accedere putabamus, contulimus, &
 obtulimus iudiciis emunctis tametsi ab isto, colore, & foliorum laciuiata altè incisura ma-
 gis, quàm natura dilet.

ALPINVM carnuleum Geneuense perquam venustum Echini Disfati.

HVIUS Eryngii inspectio tantè volupta-
 tiest homini plantarum noscendarum
 cupido, vt faciliè, non modò labores herba-
 rios intempestiue improbos leuare, sed etià
 ad magis indies vestigandum excitare va-
 leat: miræ namque est elegantiz: vniuer-
 sus renidet colore cæsis, caelestina purpu-
 ra, hilariore multò, & quàm in vulga-
 ri montano viuidiore: radix Enulæ penè
 par, Eryngio concolor, similis, & similiter
 odorata: caule erecto, ferulaceo, sesquicubi-
 tali & bicubitali, striato, què folia per inter-
 ualla ex geniculis orta ambiunt radiatim,
 supernè molliorè & delicatiora, quadan-
 tenus Eryngii Capèstris, spinulis pluribus,
 sed ignauioribus. Ima autem statim à radi-
 ce exeunt folia hederacea, ambitu delicatius
 ferrata, leuia Trachelii, aut Epimedii à no-
 bis depicti. Capitula echi nata, similitudine
 & magnitudine Labri veneris, sed colore
 foris cæruleo. In arduis montosis lurs pra-
 tosis, & finitimorum Geneuæ imminentium montium iugis, atque etiam Claudii celsi
 reperitur: radix nigra foris, intus candida, boni odoris, gustus Eryngii.



HIPPOPHAES Hippophaëstrum.

OPem pollicetur veterinariz Hippophaëti nomē claturæ explicatio: φῑλός enim vox, non
 1 i. ij. modò

modò lucem, sed etiam salutem, præsidium & remedium signat. Hanc fulloniam Dioscorides tradit, ac scitè sic delineat, vt nullū paulò diligentiorē nō veltiguoem, siquidem eam nactus fuerit, latere quæ: t quò factum vt iamdiu deserimus quærēdo nos torquere, cum post lustrata multa litora, præsertim Tirtheni & Norbonensis maris, vbi quidam spicilleguli scriptores oriri sibi & nobis falsò persuaserunt, nullibi aliisq; amicis magis sedulis comparuerit: aut vsquam in vsu esse fullonibus Mediterranei, vel Occidui maris accolis audire à quoquam licuerit: fidem tamen gratiamq; habemus fidissimò nec vulgari amico, huius huiusmodi peritissimo Anguillaræ, qui sibi hanc visam coram verbis nos certiores fecit. Sabulosis Pelopónensis mariimīs oritur, vocaturq; vulgò, inquit, *Spina Purgatoria*: radicibus palmum longioribus, lacteum succum frangendo tundentibus, amarissimum, odore graui. Florem aut fructum nō vidit: cetera lutilia Hippophæsto fuerunt. Huius fulloniæ multa hodie simplicia vices supplerent, quemadmodum Cardui Dipsacivæ plantæ fatiui fullonibus vbique idem commodi præstant, quos tamen antiquitus ad vellendos carpēdōsve pannos vsurpatos fuisse, nulla in Dioscoride mentio: huius verò multa, cum apud alios, tum apud Theophrastum, qui Hippopoleos, non Hippophaes vocat, & paracanthophyllis, siue iuxta solium spinas habentibus, vt sunt Anonis & Tribulus, accenset, quod iudicium certius est, nostro in solo non provenire.


HIPPOPHÆSTVM, nominis vsu, fortè & effecit quiddam commune cum superiori habuisse.

SE D haud perinde nota fuisse videtur, atque superior fuit antiquis hæc: quippe cuius Galenus & Paulus non meminerint: Cum tamē hic Hippophæstū exscripserit ex Dioscoride, qui etiam paucis verbis incertisque describit, cauliculo florēque viduam, spinosis foliis plantulam, fullonis spinę speciem, qualem ē Norbona aduectam se vidisse, eruditior auctorum lectione, quàm stirpium inspectione, vnde quaque literatissimus Ruellius, suis commentariis mandauit. At eandem nos putamus illam Norbonensem spinosam Echivatā, Ritro Theophrasti inter spinas dictum: qua de re iudicium peritissimo cuique deserimus.

ECHINOMELOCA.

Elos, siue Melocardium echinatum India occidentalis.

QUAM non inuat in hoc miræ raritatis & vniuersitatis Carduo, solertem Naturę opulentiam contemplari, is se putet auerso natum ingenio à lautiore Philosophia. Hanc autem sponte edunt noui orbis insulę occidentis, præsertim ea quę Diuæ Margaretę sacra est, vnde reduces naucleri Anglicis oris, Morgano peritissimo & perquam liberalis ingenii Ciui, & Pharmacopœo Londinensī, attulerunt: in cuius officina iustratissima, plerq;que eiusmodi stirpium nouarum deliciae seruantur, quales suis locis appinximus. Sit ne coeli Europæi patiens huius semen, nondum scimus; sed primo Vere experiemur. Videtur autem hic quasi quidam naturę Cinnus, ex Pepone, Melone, & Carduo coaluisse: eoque nos Echinomelocædon, siue Melocardium Echinatū, signata magis quam recepta nomenclatura vocauimus: Turbinata illi metę effigies, torulis, callosisque quatuordecim quasi collis canuleata, à sessili & latiore basi secundum longitudinem in conū obtusorem cōeuntibus: ex quo, quasi vertice, emicat tomentosa, vt in Cynara, ceriæa



bom.

bombax admodum farcta & delicata ferè quas lapidis Amianthi, qua inuoluuntur mucronate vaginula, siliquosæ, sanguineæ, Capsico concolores & similes, sed perquam exiles. Semine pusillo, rotundo, Amarâthi plenæ, multis setis croceis supernè sese exerentibus, sed rigidis & pungentibus. Dorsâ autem summa striarum, quâ latius protuberât, exerunt infelto veluti liliicis aut Echini aculeos aduncos, corneos, denos, & duodenos quasi hamos, radiatim septenas vt plurimum stellas effigiantes. Adeoq; vniuersum cotium armant, instar Echini, vix vt intus manu premas. Est autem cutis externa callosior, crassiorque tota, Aloes aut Cucumeris colore & concretionem. Caro subtus albi-
cat, pinguis, flaccida, Melonem aut adipem referens. Gultu insulso & acidulo, non ingra-
to, aquo, refrigerante. Cuius frustum ex eaque decoctum experiendi causa vomuit &
hausit innoxie, vir impendio doctus, & pius D. Foxius Anglus. Quasi autem Melo foret
interiore & superna sui parte, quæ floribus subest Acanaceo, carnem firmiorem discipit me-
branula per medium iens, cellulamque efformans, ferè qualis, Cucurbitæ. Sed seminis vi-
fungosiore niuisq; compacta medullam inibi intoluit. Eius natales qui viderunt tum
nauderi, tum familiares quidam, maritima sabuleta esse referebant; cum natusuiq; Pe-
ponem mediocrem vel maximum Melonem æquans, nouemq; & vnius trictem libras pen-
debat hæc. Humi sessilis est, nûpiâ cõparentibus nequidem foliorum vestigijs in ipsa pla-
nta aut radice, quæ exilis est, aliquot appendiculis vimineis, pullis, prolixis, firmis, nec
fractu facilibus, sparsa.

Poterion.
Tragacantha.
Onotis.
Varietates.
Natrix Pû. Recentiorum.

POTERION aut *rougâA.*

QVOD neruis peramica sit, *rougâA* vocarunt, & *Poterion* fortè, quia potrix paludo-
si riguiq; soli amans sit, vt dicit Dioscorides, qui fruticem hanc ramulis & folijs Tra-
gacanthæ aptè confert: eiusmodi namq; primum vidimus multum in quadam areola
horti Patavini, opera eruditissimi Guilandini. Deinde ex australi tractu Pedemontanæ re-
gionis vultu nobis misit peramicus iuuenis doctus Pharmacopœus Massiliensis Iac. Rai-
naudetus. Sparsa & latè porrecta fruticat, multis cauliculis exilibus, cortice nigricante,
tenui vestitis, etiam aridis, non rectis vti Tragacanthum, sed vtrò citroque flexis & ordi-
nè intortis, vt in Nepa aut Corruda: sic etiâ spinulæ nulla serie digestæ, sed multò delica-
tiores, quàm Tragacanthæ, & minores, passim cancellatim & reticulatim implicantur folijs
nudæ. Foliola non albidia, sed nigricantia, quæ non ex aculeis, sed è caule fibrillis delicatis-
simis, triplò quàm Tragacanthæ minoribus Lenticulæ modo vel Astragali exeur: semè pusil-
lum, rubellum, Sumacho simile, & minus. Hunc receptum scimus viris Doctis. Nec mi-
ramur tantoperè visum fuisse accedere ad Tragacantham, vt congener esse videatur Ma-
thiolo, qui suû *Poterion* Constantinopoli, nempe vèdibilliore & plausibiliore loco, sibi ab
Oratore Imperatorio missû dat. Cû nihil aliud quàm Tragacantha sit, aut ex eius icone de-
pictum: non enim spinæ, non cortex similia, neque in spinis folia, neq; multa alia à vero
dissidentia. Idèò vir prudens suo honori potè consuluit, cû descriptionem tacuit, vt
solitus est; verumtamen dicit esse Tragacanthæ simile, sed verius dixisset eadem esse.

TRAGACANTHA *hircinus spicillis*

et armos imitata.

II. iij.

Vera

VERA Tragacantha, cui spinularum barbulae vindicant nomen, plurima fruticat in Galloprovinciæ prope pomeria Massiliæ in marinis collibus ad *Aultrun* denexia, alijsq; finitimis locis passim multa, vernaculo ibi vocabulo *Barbe Renard* & *Renobue*, id est, vulpina barba, & surculus hircinus vocatur. Frutex humilis, densus, totus ca indicat, vno cespice multa copia aggestus. Radice alba, longa, lignosa, crassitie digiti, prolixis flexibus subter humum merfa. Caulis cum procerimus cubitalis, ex quo spicula foliata vtrinque quasi pinnis oriuntur, quæ ima & vetustiora, nihil aliud quam veprem, aut aristæ spina nudatæ effigie ostentant. Superiora pallentia perpetuis sunt, etiam peregrino solo, vti *Mecliniz*, vbi domi, totam glaciale hycem fouit mercator in dulcius & harum amantissimus *Georgius Ric.* Caulis ab vna radice multiplex, rigidus, lignosus, candidus, quem vestitus spinæ foliatæ, vepribus rigidissimæ, stellis horridus. In summo inter spinosa folia & spinas stipantur multi flosculi inuicem collecti *Genistellæ* similes, sed albi. Silicula etiam numerosa, recta, *Ciceris* aut *Genistellæ* spinosæ modo, sed multo minor & candida, in qua semina exilia, albicantia includuntur, Sinapi magnitudine, angulosa. Illic planta nullius vsus, sed negotium dedimus cuidam *Illic amico*, vt radices vulneraret, ac si quippiam Gummosi deflueret, seruaret: sic nos in *Terebintho*, *Leutisco*, inibi lacrymas compereramus, quamuis exigua quantitate.

ONONIS aut *Anonis Asinaria* sine nocua Offic. Arista bonis.

SPINOSA hæc, cui pruriginosi & strigosi Afelli sese lubenter affricant, *Ononis* quasi *Asinaria* Græcis dicebatur: aut potius *Anonis* quasi inutilis noxiæq; agrum defrugando & aratrum sistendo, quod vulgus allodës, etiamnum *Arestum bonis* vocat: adeo namque plenè respondet descriptioni nostra vbiq; fructicæ, vt qui quodam ostentandi studio verâ inficiantur, ipsi si non vt *ovæ* ridendi, certè inutiles balbutiores & nocui bouis studijs, sine habedi. Quæuis in plaga calida frigidaue fruticat flexilibus pluribus, sesquicubitalibus & bicubitalibus surculis, per initia cum adoleseunt proximè & subter folia uonifol geniculatis: postea spinis armatur adutiore facti, & floribus ornatur vt plurimû pisi purpureis, in pallidum languentibus: demû filiquæ erumpunt exiles, vbi semen, radicibus instar funium flexilibus & tenacibus, prælongis, prolixis.

Varietas.

Quædam occurrit in pratis maricimis & vdis Angliæ, præsertim ad *Bristoiam* & prope *Londinum*, folijs maioribus, & tantillum crenatis, similibus superioris, sed floribus luteis, prolixioribus, & magis lentis farmentis. Non rarò vidimus albidus, immò & candidis admodum floribus, allicubi etiam nunquam spinis armatur: nullas enim vidimus ipso Autumno exeunte in hac posteriore, quæuis in agro fruticantè & in hortis eam obseruauerimus.

NATRIX Pli. *Herbariorum.*

HARVM VTRIVIS perquam similis herba illa inter segetes & crepidines cultorum *Monspelli* frequens, & via *Boutonnet* ad nouum castrum, Radix pusilla, caules promit surculosos multos, geniculatos, pedem altos, & ab imo summotenus folijs exilibus, longis multis, *Fœni Burgi* diaci æmulis, obseffos: sed adeo viscida tota plâta est, vt vix manus attrahant liceat se interdum extricare. Odorâ impendiô est hæc, sed quippiam minimè grati spirat, odoris fortè vehementia, qui quibusdam *Conizam* fœtidâ lapit. Flores nili lutei pallentes *Aronidis*: è quibus *Delphinij* cornicula, semine plena, sed pullo colore. Hæc natricem *Plinii* coniectabant nonnulli: quibus autè argumentis non vacat ariolari, neq; per authores incerta spe quærendo vagari.

AL-

379

STIRP IV M aduersaria nona.
ALTERVM FRVGVM GENVS nempe
graminis Trifolij, & Leguminum.



OVVM initio ordiremur plantarum ex similitudine historias, decreueramus graminis & triticeæ frugis recensione absolu-
 ta, è vestigio hâc quasi alteram graminum familiam illi proximè
 annectere, aut inter consimiles alias plâtas alicubi quàm cômôde
 fieri posset, inserere: sed nuspiam occurrente satis apta statione, in
 hunc locum, vt nō lubenter, ita non inuiri eam distulimus. Quare
 si cui visum fuerit ad calcem graminum vel harundinaceorum referte, illi liberum reliqui-
 mus. Hic porro hâc ita secum, vt quouis reponi queât: & sic exequemur, vt loco & folijs
 potius quàm serie aut vsu distare videantur, hæc duo summa graminis fastigia: est enim
 par penè cognatio collatiôq; acuti folij graminis ad triticum, atque trifolij graminis ad
 leguminum. Nam vt frugis voce à fruendo, tum triticum, tum legumen complexa fuit
 antiquitas: sic graminis appellatione, non modò quæ folijs triticeis exeunt, sed etiam quæ
 leguminosis, designauit, vt sunt trifolia Loti, gramen Parnasium foliis hæderaceo, flore al-
 bo: apud Dioscoridem, & Cerinthe ignobile gramen apud Marorem: perindè enim vbe-
 rè gliscunt ista gramina, cespites herbidos prætergrediendo, inque pabulum cedunt peco-
 ri, vnde Galli hodie Medicam, scenaciam vocitât, & scenum Burgundiacum saginandæ vete-
 rinæ impendiò laudant.

Trifolium pratense.

Varietates.

Trifolium Menianthes, sive Asphalictes.

Oxytrichum Scribonij Læpi.

Oxytrichum aliud Herbariorum Scribonij attributum.

Trifolium latum minimum.

Oxy Pliniana, & Alleuia Officinarium.

Quadrifolium Tetrachylum fuscum herbarum.

Trifolium paludosum folio crasso Fabaceo sume potius ISOPTRYM,
quæ Melanthij species?

Hepaticum trifolium.

Fenum Burgundiacum.

Medica, & varietates.

Medica incana, maritima.

Lagopus.

Lagopus scythicum Alopecuri facie.

Lagopus maximis folio & facie Trifolij pratensis.

Lagopus angustifolio.

Sylvestris.

Loti { *Trifolia pratensis subquosa Montpellierensium,*

Egyptia.

Syriaca.

Italica.

Meliori. { *Gallica.*

Germanica.

Londonensis.

Coronata.

*Famigracum.**Cytisus Diof. & Gal.**Cytisus altera minor & vulgarior.**Polemonium.**Dorychnum Monspellienfum.**Sylueftria maior.**Hortenfis.**Syl. minima.**Syl. altera.**Harmala Syriaca, an Sefamoides magnus Diof.**Pratenfis duplex.**Carina Monspellienfum.**Galea.**Viburnum.**Anagyris.*

TRIFOLIUM PRATENSE & eius varietates.

*Ger. Wyfenlee.**Bel. Clauer.**Gal. Treffe.**Ang. Herbetrifolis.*

N Vspiam igitur defit trifolium pratense, trifariam floris colore, variis, quippe quod flore purpureo purpureum, & albicâte albu dicitur, & maioribus etiam folijs discernitur: utrouis nihil notius, frequentius aut vtilius pecori veterinarizue saginandæ. Nec aliud ab isto est, quo mortales miri, Hybernæ delitias, irritamenta que palati spreti placentas, lagana & panes pifunt, exque butyro subigunt, quæ latranti obtrudant stomacho, nonnunquam triduum fame exercito & penè rabienti, Sed hæc tollerantia prædonibus præsertim consueta itemq; militibus. Inter quos superioribus annis nobis noti generosi cum militia mererent propter defectionem latronum in Hybernia, mirabantur eos probè pastos, cingulo arctissimo cinctos, circum umbilicum tamdiu esse, quoad proximo triduo rursû cibum ingurgitarent. Qui ne præpropere elaberetur, persuasi erant multum profore ad roboris &imenti supplementum, si vinctu cinguli quàm diutissimè inibi coereretur. Idq; natura docente potius quàm Seytarû imitatione factum reor, de quibus idem prodidit grauis author Plutarchus. Indigenæ enim insulæ cû sint hi & longissimè absint, Hæcque vis vbiuis gentium prata alit, ambo sæpius guttais & falcatis superficie foliorû maculis.

ASPHALTEVM.

A Sphalteum seu Mœnianthes Dioscoridis non temerè alijs regionibus quàm Sole feruidiore lustratis, vti Monspelij & Massilez in Norbonensi & Galloprovincijs, videas. Quin ne Longobardis quidem aut Venetis, nisi cultum in hortis reperias, vbi ineûte Hyeme non secus atque Flandris & Anglis vtplurimum interit. Fruticosa est, sesquicubiti vel duûm cubitorum. Surculos præduros rigidôsve multos exiles. In ramulos hebetes, exiles, quibus in viticeos fermè pediculos exeuntibus singulis, folia terna insunt, nec plura. In imo sæper initia circinatæ rotunditatis, sed in pediculis superioribus adulta, oblonga, an gustiora, & in mucronem desinentia, lanugine horridiuscula, hirta, nigricèta, vti & virgultâ, interdum albida. Florem purpureum, compactum, in oblongam glomerationem villosa textura fert. Semen pullum, asperum, superne mucrone piloso clausum, tetra odore, cuiusmodi vniuersa planta, quam qui legitimum bitumen non norint, si odorantur, vix vnquam olfacent postea bitumen, quin illico etiam nondum visum agnoscant, Consimili Asphalto, sed excellentiore, quod mirum magis est, dote, tum occulta, tum comperta,

nam

nam, & Theriacis miscetur præsidio non vulgari: & foris admotum, multò vehementius & euidentius prima etiamque specifica vi venenum è summo corpore reuellit, secumque educit, quasi vincit, idè coarctat: quodq; sanæ parti appressum, virus non minus in-
uoluit, quàm erat insiditura serpens, vt puta Vipera, aut quæpiam alia: non illud suo sibi insito nocendi vicio, sed ascititio veneno: quemadmodum capite de Anchusa, vel Echio, liquidò patet.

OXYTRIPHYLLVM Scribonii Largi idem videtur cum superiore.

EST D Asphaltium non aliud esse quàm Scribonii Largi Trifoliū acutum, Oxytriphyllūve dictū, propter mucronatum extremum, quasi eminentem aculeum, quem habet, & lanuginosā, plenioraque folia, vti author delineat, duum pedum fruticem, grauiter odoratum, montibus oriundum, sed Siculis plurimum, Italiz rarum, nec nisi ad Lunæ portum, qui est Thyrræni maris ora, inibiq; sibi repertum profecturus in Britanniam cum suo Deo Cæsare Claudio, facillè sibi persuadet, qui meminerit supernus dictum, haud facillè nisi æstuosis regionibus provenire, nisi colatur, vt in horto Patauino & alibi. Nec quisquam putet aculeatum intelligi debere, sed folii extremum in angustum quasi aculeum porrectum, cuiusmodi visitur in isto. Et de vsu ad quem commendat, noscās certius.

OXYTRIPHYLLVM alterum Scribonii, Herbariorum.

LV BENTER assensu essemus nostris perdoctis amicis, quos sententiam rogaramus super alio trifolio, in syluis aridisque collibus fruticante, què primùm tum visum Scribonii Oxytriphyllum autumabant: nempe quia procerius, lignosius; atque hirsutius visitur, sarmento & foliis alioqui similibus, sed minoribus, ternis & quaternis, albicantibus magis, & obtusioribus: flores non adeò in globum compressi, sed hiantes magis, & depressi, atque albicantes: odor aut nullus, aut perexiguus, nedū vt grauem tetrūmve olfactas, vti in bituminoso superiore: quod idèò huic præferendum ex Scribonii verbis expreſsius, ducimus. Prope Lugdunum & Taurinum, etiamq; MonsPELLII iuxta Gramuntiam Syluam istud abundat.

Trifolium luteum minimum.

EST luteum minimum omnium, & non ita peruium, gracilibus, pusillis, reptantibus-iuueis; folio terno aliquantum crenato, luteolis floribus, in orbem compactis, in pratibus & cultis visitur.

OXY PLINIANA, Paris Cuculi, Allehya Offic.

Trifolium acetosum.

TRIFOLIA OXY PLINIANA, Oxytriphyllum idem vocata fuit, non quidem folii acutis, sed potius aciditate, qua cūmvtilissima, tum notissima est, pusilla videtur Lotus, opaca vmbrosa que sequens, radice ima fibrosa, summa mediaque squamatis loricata, è qua plusculi



pluſculi exeūt pedicelli iunicei, glabriq; & præteneti, quibus ſingulis in extremis tria ap-
tantur folia retrò & mutuò inflexa, quæ turbinis cordiſve picturam præferunt. Flos ſtella-
tus, candidus, nonnunquam & luteus, vt ſemen luteum, in thecis oblongiſculis, & per-
paruis.

QUADRIFOLIUM Phyllanſuſum herbarum.

NE foret huic generi proprium vtique terna habere folia, factum ne Naturæ inſtituto,
aut mangonio, incertum nobis: nam quæ ſpectantur in hortis voluptatis potius quàm
utilitatis cauſa, è prætenſum genere, tametiſ quaternis, quinis, adeoque ſeptenis donata
foliis, non diſparibus Oxy Plintanz, cernantur: ſed colore phæo, vel liuido, rubentes
flores quales prætenſis, albidus ſunt, reliquæque non diuerſa.

*TRIFOLIUM paluſoſum folia craſſa Fabaceæ, ſunt potius ISOPTON,
quam Melanthij ſpecies?*

PER QUAM frequens paluſoſis riguiſque prætis Angliz, & Belgiz, & Germaniz, alibi
non item, aliud trifolium: quod quia non niſi in aquis viuunt, aquaticum vocant. Radi-
cem, vt pleræque aquaticæ, crebriſ geniculis diſtinctam, & fibris meſam habet: folia
craſſa, viridia, tenera, vt Phafioſi, aut fabæ, terna, in ſingulis pediculis craſſis, cauiſ, & po-
roſis, viridantibus, è geniculis egreſſis radicis: indidemque cauſis oonſimilis, concolor,
cubitalis, in cuius ſummo flores candidi, ſtellati, Ornithogali vel Sagittæ Plinii, alterno ſitu
viſuntur, de quibus mediis nonnullæ prodeunt fibræ, eodémque tempore floribus deſlu-
xis glumæ, puſillæve pericarpia, Hyacinthi ſimilia, ſemen ſolum cohibentia, Miliũ, ſed
minora. Huic, cur, quaſi potius Iſopyton, Mathiolus quoddam Melanthium prætulit,
vix coniectari licet: quando ille quæ maximè opus eſſet, muſſat, nec hiſcere audent, in tritz
cognitionis rebus alioqui tantus hiatus: eſt tamen hæc multa & vocata *Biberklee*, quaſi
Caſtoream Germanis, Belgis, *Borboonen*, id eſt, faba hircina, ab odore olido.

HEPATICUM trifolium, ſine Trinitatis.

EOSDEM fermè hæc natales & vires, nec ita diſſimilem vultum ſortita eſt, cum Oxy
Pliniana, præterquam quod acidum non eſt trifolium iſtud: Quibuſdam Italiz &
Norbonz montoiſis locis vmbroſiſque ſyluis & vdiſ obuium & multum, præſertim Tauri-
no collibus Eridanoque Circumpadano conterminis. Rigida hyeme Ianuario incunte,
vel exaſto, primulũ pediculi Violæ martiz, aut Bellidis, piloli, tenelli, palmum alti, ſlori-
bus cæruleis, pallidiſ, ſtellatiſ, Chelidoniũ minoris nõ diſparibus donantur, qui inuito in-
terdum frigore, trans niues ſuperſtratas ſeſe exerunt, nondum ſoliſ enatiſ, quæ in diuerſiſ
(vt Violæ Martiz) & ſinguliſ pendula pediculiſ, diuiſura, colore, & fermè magnitudine
Hederæ heliciſ, aut potius Ciclaminiſ hederacei, etiam vrgente niue perſtant. Semen mi-
nutum capitula cohibent, apiculiſ herbidiſ, fuiſciſ, conſtata, conuli modo, aut potius Ra-
nunculi. Radix capilloſa, ſparſa, nigra.

FOENVM BVRGVNDIACVM & Medica.

Galliæ. Foin de Bourgoingne.

EMEDICÆ regionis pascuiſ iſtud trifoliũ habuit & coluit Græcia & Italia, vnde vocant
Medicam, veluti etiã Medicũ malũ citriũ dicunt: Quare potuiſſet ſcænũ Burgundiacũ
vulgò dictũ, ſaginandiſ veteriniſ natũ, opinione Medicæ facere, & hæcenus fouere, cum è
Trifoliorũ prætenſum genere ſit, & folliculũ ſiliquoſum, cõplicatum, orbiculatum gerat:
ſemine Fœnigræci aut potius Meliloti prægnantem. Flores ex corulco purpuraſcentes.

Medica tres in semine variata.

Sed cum aliud sit genus Trifolij longè pecori gratius & antiquorum notis aptius, nobis ex recentiorum vestigatorum sedulitate geminæ suppetent Medicæ: quarum prior & certior est ea, quam vulgus in Galloprovincia vocat *Laufredo*. Ea satua propter utilitatē, illic est trisera, trifolio prorsum similis, prolixioribus tamen caulibus, humi sparsis, vbi magis fœta luxuriat, in quorum alis frequentes sunt folliculi orbiculati, qui dum digitis in spiras expanduntur, volutæ figuram exprimunt, dum autem contrahuntur, numeros exiguos multiplices sibi aggestes pueri dicunt. Interdum siliquæ hispidæ sunt, interdum spinosæ, quæ flores lutei, exigui, terni quæ sunt. Visitur & quibusdam locis tantæ proceritatis, vt duplò maior excreseat, siliqua vero glomeratur in nucis galbulum uic Cupressi ferè figurâ, cui semina Genistæ semen ferè æquantia insunt.

*MEDICA marina.*

HANC *Sæpius* vidimus illis perquam similem maritimis passim oriundam, Venetijs & in mari mediterraneo, superioribus tota minor folijs, & siliqua & semine: caules verò humum præreptant prolixi. Lutei flores sunt: caules & folliculi densiores, omnia tomēto-sa lanugine obducta, vt *Gnaphalium* & alia maritima pleraque. Hanc cur respuant viri docti haud indignam vel animaduersione vel descriptione, causam habet nullam, neque exemplum: si namque antiqui hac ignauia suam ignoracionem aut posteritatis ignauiam fouisset, longè plurima desideraremus, quorum beneficio plurimum profecimus. Hasc enim inspectione & vsu præstat notas habere, quam nullas.

*LAGOPYS.*

Lagopyrò, quia inter triticeas segetes nasceretur, quasi leporeum aut leporinum triticum iam tum Hippocratis tempore vocabatur: Dioscoridis autem duo etiam *Lagopon* quasi pedem leporinum, propterea quod in pilosa spica glumas villosasque, quasi aristas mollicellas, Leporini pedis, hirsutis & coloris æmulantes haberet. Sic enim in libro de viceribus coniecit, sed scitè describit Hippoc. Replet maximè cœcua, pura vlcera *Lagopyros* vocata. Est aut triticeis, aut, vt alij legunt minus aptè, fursuribus similis, quādo arefcunt, solium pusillum, instar oleæ folij, & minus. Vnde non difficile coniectari istam plantam in arvis

inter

inter segetes frequentem vniuersæ Europæ valde vulgatam, & gramineis Trifolij accensendam, esse genuinum Lagopum antiquorum. Siquidem triticea est spica, inter triticum, melampyrum, & Alopecotum nascens, quibus est nomine & facie similis lanugine & pilis, mollicie & fuscedine concolor Leporino pedi: folia Oleæ, sed multò minorà & ternà, è vticulosis cauliculis, pedè altis, in multas alas diductis. Semine exiguo Sefemi, minore, Sophiz pari, glumulis obstituto, ericeis, aut trifolij bituminosi. Non parum huic astrictionis, siccitatis verò tantum, vt mirum seminis profluui laborantibus præstet præsidium. Ea propter vlcibus canis, sed iam deterfis & mundatis, non dubium quin carnis prouentum, & cicatricem acceleret, vt vult Hippocrates, tumoribus verò inguinum & laxis Hernijs cohibendis peropportuna.

*LAGOPVM MAXIMUM, folio & facie
trifolij pratensis.*

NOX perinde frequens, sed tamen inter easdè plantas & segetes nascens gemina huius differentia, altera cuius folia planè eadem, minus tamè acuta, & trifolij pratensis propiora, caules simpliciores, enodes, serè rectos, cubitales ambiunt, spicatas item sumitates gerentes, binos pollices longas, crassiores: pilis & lanugine hispidiores, villosis floribus trifolij pratensis, purpura rubellis, fuscis, fœniceis, pallentibus. Hæc Veganij, Norbonensis in pratis, & ad fontem publicum elegantissimo aspectu florètem colligebamus, Iunio & Iulio mens.

ALTERA angustifolia.

ALTERAM Lagopum Angustifoliam vocabamus, iuxta agrorù & viarù margines Sellenoux Môspellij enatà, in Delphinatu, & non procul Rhodani ponte S. Spiritus dicto, alibiq; passim, angustioribus & longioribus multò folijs, ternis inter Peucedanum & trifolium ambigentibus, viridantibus, pedali caule, aliquot geniculis donato, ex quibus nonnullæ alæ, in summo itidem caudatas spicas ferunt, isti proximè descripto pares & maiores: quarù flores purpurascens per menses desflorescentes, relinquunt aristas horrentes, & spicas aridiores, scirpopsis glumis pungentes: vbi exiguum continctur Sellenam rotundum semen. Omnium horum partes, spicæ præsertim, desiccant & astringunt. Sed prioris potissimum, cuius vtilitatem certam nouimus & partim diximus.



Hortorum odora LOTVS, est verior Diosc.

Ger. Stüben gezeiten Kraut. Bel. Scuengeryden clauer of krupt.

CVM arbores, frutices, & aliz, specie, facie, fructu, & floribus differentes plantæ, Loti dicantur, quæpiam bonitatis eommendatione, potius quàm inter se conuenientia, videtur hæc nomenclatio huic trifolio attributa, quasi quòd cæteris trifolijis excelleret, inq; paradisis & lætioribus locis oriretur, dictum foret Trifolium λωτοσ, siue volupe & voluptas, à verbo λω, vt sit adlusum ad λωτοφάγος Vlisseos, & Epithetum apud Homerum, qui vocat roscidum Lotum, Deorum lubelcentiam. Proinde coniectura plena fert, veram Vrbanam illam verè dici Lotum, quæ domi hodie in Belgia, Germania, Anglia, colitur, decerpiturq; ad oleum conficiendù, celebratum valde tumoribus contumacioribus, & topheis demoliendis, à Pharmacopœis præsertim, qui vernaculo nomine vocitant hanc Scuengeryden clauere, quasi septies mutans die, nempe odorem, quem illi amisisse, & denuò recepisse singulo die arbitrantur. Sefquicubitalem leuiter striatum ramosum à summo ad imù vsq; videas caulem. Pediculus & folia è geniculis educta, cuiusmodi Trifolij pratensis, Fœ

nigræci

sunt Meliloti germanici, sed ambitu oblique dentata, pinguis, crassa, habitiora, subpallida: flore & glomerulo pallido, Asphaltidis Trifolii, semine Milii pallco. Eximii odoris Meliloti, non nihil gummi Elemnium redolentis: vnde mulierculis Balsamum dictum, & sanè vulneribus paramici. Digerit quippe leuiter, & inflammationes ingruentes reprimi non deeratè, robur partim tutando, nec sanè multò dispari vi quàm Fœnigracū aut Lotus, oculis opem laturam putandum.

LOTVS STLVESTRIS Diosco.

PASSIM plurimæque, quæ dicitur erratica Lotus, secus Lanii amnis Monspelliaci pontem & crepidines pubet, in Angliæ etiam vdis scrobulis. Graciles, numerosos, bicubitales & tricubitales, sparsos multos alis promit à radice lignosa, fibrosa, caules, quos proximè ambiunt folia terna, mollia, rotunda, fusco virore, læuia: flores lutei, Genistæ aut Meliliori veri modo, è geniculis imis summisque copiosi, quorum caliculi postmodum fouent numerosas vaginulas, teretes, oblongas, rectas, rubentes, nitidas, intus semine Sinapi pari, cinericio colore. Sapor, qui leguminum quorundam & medicatus, vti Lupino, Phasolo, & Cytisi, quos odore etiam refert. Verum non interest cuius sit odor ista, sed quàm bellè referat Lotum bicubito maiorem, multis donatâ alis & Loti pratensis trifoliz foliis. Semine aut potius siliqua (nam vtrumque apud Diosco. illud *αίγις* designat plerumque) fœnigraci, sed minore, qualis nostra planta est, quam gustu, non etiam odore medicatam optat Dioscorides.

LOTVS TRIPOLIA pratensis siliquosa, Monspelliensem
cum assimilatur superior sylvestris.

NON paucis locis Monspellienfis agri & decliuis pratis, Lanio Grammuntizque Syluæ interiectis, humilis siliquataque Lotus inter Aristolochias, Scordium & Narciscos repit, angulosis cauliculis, geniculatis, pedem longis. Folia in pediculis per totum caule terna, pauca, subrotunda, crassiuscula, subpallida. Extrema caulia germinibus nonnullis, multifida, luteum florem, buxæ, fabæ similem, singulū singulis alentibus: etiam cuilibet, siliqua succrescente quàm fœnigraci maiore, sed recta & superius retusa, quibusdam secundum longitudinem impressis striis, fœnigraci flauescens semen dum maturuit, diffusiliante & ostentante.



ÆGYPTIA LOTVS, vel NILOTICA,
aut Euphratica.

UT PERMVLTA sunt quæ nusquam in naturæ dititione ditissima & inexhausta extare suspicari ausi essemus, priusquam vidissemus: ita plerumque fit vt nonnulla etiam nunc hodie anxie minus venemur, quæ aut præ oculis & pedibus iacent, sed male aut mutilè literis mandata, eoque incognita sunt, aut nusquam terrarum, prout historiarum produnt, oriuntur. Idque cum nostratibus non paucis, tum vel maxime peregrinis in stirpibus agnoscendis nobis vsu venire veri sit simile. Hæc enim non visu, sed auditione plerumque discere soliti fuerunt scriptores, eoque fidem liberandi causa perire, vel idcirco, aut simile quippiam addere soliti sunt, quasi non asserant, sed duntaxat historiarum texendæ gratia inferant: Quod videtur vsu venisse in hac Loto, Theophrasto: fusiore

enim quam certiorē descriptionem dat, omīssis foliis & contrariis seminis comparationibus repetitis, quæ suspicionem faciunt luxatæ literæ, aut recensionis mendosæ. Plurimas videas stirpes pluribus locis obuias, imò & mensis, quarum aut perperam aut fabulosè multa commentitia in literas missa fuere. Exemplo sunt niandragoræ radix, filix, tripolium, Quercus Larix perennis, vel ipsa faba, fungi, tubera. Ac ne longius abeam, nobis etiam perplexius minima quæque de plantis vulgus, & interdum eruditos consulentibus, quàm multa & sæpè relata sunt, risu quam assensu digniora? Et miramur postea, grauissimis etiam viris quædam ex cidiisse, multis è millibus pauca, minus accurata, aut vera, auditione teus proclita? Nec potius miramur non plura lapios, puta alienis fretos assertionibus, aut lectionibus, quod Dioscoridi è Crateua, & Theophrasto huic contigit ex Aristotele, huius Alexandri iussu & sumptu, innumeris è priuatis hominibus conflata historię fuerunt.

MILILOTVS Syriaca.

MELITI odoris & coloris gratia Meliloto, siue Melita Loto dicta, coronas texerunt prisca, quibus caput redimendo, non voluptas modo peteretur, sed etiam xestus febrilisque distemperies arcerentur. Omnium quas nouimus huius familiæ longè optima & elegantissima, quæ è Syriaco Alepo ferri cœpta fuit & coli superioribus, nec antea, annis, 1562. et tertio, cuius etiam culeos refertos proflare meminimus Venetiis, in Martinelli ad Angelum officina. Copiosis fruticat ramosisque cauliculis hinc inde deflexis, cubitum altis, geniculis crebribus distinctis: vnde emicant folia in pediculis terna, loti Melilotivæ communis, minus acuta, nec multum serrata: & flores lutei pallidi, stipati certa serie & modo, vt in Securidaca, aut Astragalo. In summo vaginulæ hamatæ & latiori basi, in mucronem aduncum exeunt rostri Psytaci non disparem: semen Fœnugræci compressius, exilius odore Meliloti Germanicæ, vel Gallicæ, hic proximè dicendæ, sed multò fragrantiorē, etiam in decennium perdurante. Sata Patavii, quasi soli natui oblita, non nihil corniculis minus falcatis, lunatis, & ignauiore odore degenerat: illic nomen retinuit Italicæ; vbi tamen quia deficit copia, pratensis ista sertula, seu corolla Supplemento est.

Italica Melilotus.

Germanica & Gallica.

NOSTRATES verò duz germanicæ, Gallicæ nuncupatæ, odore quidem inferiores sunt, sed multò prociorebus fruticant, ternos namque cubitos æquant virgulta crebra, teretia, ramosa, lenta, crebribus foliis in exili pediculis ternis, fœnugræco aut potius Burgundiaci proximis, leniter dentatis, carnosis, subpinguibus. Cauliculorum summitates stipant complures flosculi, serie apti, penduli colore & modo genistellæ, siue Luteolæ Pliniaz, sed minores, interdum & cani. Semen in vtriculis, luteolis herbidis exile, & perpaucum. Vbiq; iamdiu huius inoleuit vsus, propter facultates compertissimas emolliendi, digerendi, tantillo calore peptico, naturæ amico & alfectione moderata.

Londinensis Melilotus altera pusilla.

LONDINI in horto amici cuiusdam alitur huic per omnia similis, nisi quia cubitum non superat, & in siliquis paruis Araci modo, semen non dissimile habet, vtrique odor gratus, Syriacæ gratior: sed quia aliis de notis pusculum differant, hæcë putarim corollis non adeo expectatis fuisse. Illis tamen vutiquam ad Medica commoda cedere.

MILILOTVS CORONATA.

NON DE MINILO erat, quod quidam persuasi fuerunt, illam Lotum quæ siccioribus pratis, viarumque marginibus lætatur, Sertulam esse campanam, aut saltem pro Meliloto vtendam esse. Quippe præterquam quod nulla propius ad Syriacā accedit, etiam siliquosa est, & florē perquam hilarē, corollæ aureæ sertivæ persimilē habet, vnde plebi Gallicæ Corona Regia dicitur, indidemque Romanis Sertula fortè dicta. Ra nulos spargit hinc indè copiosos, virentes, graciles, pedales, copiosos, teneros, foliis ternis


terius trifolij pratensis cæsis caule enatis plurimum quinis, sed in pediculis ternis, uti in Loto syluestri. Flores luteoli vel melini, nondum explicati ex flauo rutilantes, pisi effigie radiatim & æquis spatiosis distiti Coronidem exprimentes, Sapor qui leguminum plerisque: odor imbecillior floribus, aridis & aceruatim congestis nonnihil gratus diffilatur, quod mellis odorem præfert, quem linimentis relinquit, uti etiam colorem: vñ sepe fumus illatione ad viscenum feruidorum materiam concoquendam in tertianis nothis, ex floribus oleo imbuto, quod etiã oculis optimè facit. Ea Pharmacopœi Galli præfertim, plurimum vtuntur æquè tuto atque Meliloto, nusquam non Angliæ Galliz, Belgiz frequentissima, Siliqua Loti Syluestris.

Trifolium FOENUGRÆCVM dictum.

RARO aut nusquam nisi culta: nam quod ruri ortu putatur Fœnugræcū, quibusdam locis in Italia, ambigit inter Lotos. Et Fœnogræcum hodie adeò notum est ut qui lotos norit, neminem latere possit: duntaxat differre videtur siliqua, qua maiore magisque adnata, acutiori stylo est fœnigræcū, albicant flores parui: inq; caulibus parum striatis, cubitum & sesquicubitum longis à teretibus folia sunt, ternis è pediculis, loti æmula, aliquantū erenata. Seminis fului angulosi Securidacæ, sed rotundioris, maximè in re medica utilitatis foeta cornicula. Quo paratur oleum viribus quam quisquam credat maioribus, ad intestinorum latètes scirros dissipandos, & strumis perutile,

CYTISVS.

TRifolius iste frutex Lotusue gentilem cognominis insulæ Cinthyæ quæ vna è cycladibus est appellationem satetur, vnde reliquæ Græciæ Latioq; factus communis fuit. Et mirum quanti putatus ad pecoris pastiones, lactis & proolis prouentum. Quare qui auctores ex Poetis legunt, possunt apte interpretari secundum fœnum, quod multum sanguinis vitium & seminis absque quo friget Venus, suggerit. Diu nos anxios & ambiguos animi habuit Cytisi veri historia & expensio. Verum subductis hinc inde rationum momentis & collatis varijs plantis, quas respuebamus speramus tandem probarum iri candidis arbitris. Quamuis Roma regia via Florentiã adir, oppidulo, cui nomē Aquapèdulæ, (ni perperâ in Pàlinxesto herbario notauim) declinij & depressa etiam planitie feracissima Cytisum fruticem 5. sexue cubitis pro-



ceriorem Genistæ sarmetis pluribus, gracilibus prædoris, striatis, vidimus statim ab imo aut paulo superius lignosa radice è tenuibus pediculis: folia terna, non ita numerosa similia fœnugræco, angustiora, habitiora, rutacea: genistæ vel Sparti aut pisi flores lutei, sed minores: Siliqua Genistæ par, cinericia, gracilior, compressior, intus loculis sunt discepta semina nitèda ex atrore Genistæ, est cana vniuersa plâta: uti Rhamnus Mòspel. aut halimus

Kk. ij.

Sapores

Sapor Ciceris aut similis leguminis odoris sanè iam non succurrit : aridam enim & inodoram duntaxat habemus ualsam Norbong, præsertim, ad radices môtis Calcaris prope Veganiû: minus procera tamen, sed tenerior pabuloq; aptior est, fortè quia dum in montes abigunt pecus, vt quotannis faciunt, pastionis lætioris, atq; æstus conuallibus declinandi causa, ineunte Maio & Iunio, Sole in Arietem ingresso, teneriusculos germinationum foetus, florum siliquarumq; spem liguriunt oues, & capellæ. Eôq; Poeta venustè ex Theocrito canit. *Florentem Cytisum & Salices carpetis amaras.* Hæc, vt si quæ alia, apprimè quadrat Dioscoridis, Gallenique Cytiso : nam ecquid eadem sit, Theophrasti haud magnoperè sollicitos facit nos, quando ille in describenda minus sollicitus fuit, qui de Lotis alicubi monuit, plerumque vñ venire, vt eadem voce plurimùm diuersæ plantæ, effigie tradantur. Qua propter vti Antiqui Cytisum vocarunt Fœnigræcum, Lotum magnam, & Trifolium, propter figuræ aut naturæ coniunctionem, sic ex varijs consimilibus fruticibus Anagyridi, Laburno, Coluteæ, incertum vagumq; vocabulum remansit.

Altera Cytisus minor & vulgarior.



*Munus foetens Anagyris vel LABURNVM, Foetida
ANAGRIS arborescens.*

NOTIOR & frequentior multo, quæ Italiz, Galloprovinciæ, squalidis saxosisq; collibus inter cocciferas Ilices & maiores Ericas viret, florumq; amœnissima fœtura oculos capràq; pascit æstatis initio: sesquicubitales spargit fruticosas, lignosas virgas, tenues, ramolas: & folia terna virgultis oriuntur, & quàm prioris Cytisi maiora, rotundiora, viridantia ex atro: Genistæ flores in summis cauliculis luxuriant, lutei pusilli, sed stipatu longè pluri, quàm pro magnitudine plantæ, quò aduolât mellificatum apum examina læta: odor gratus illi, sapor alterius: Siliqua & semè minora.

Terna item prodeunt hinc folia, sed putior, quia emarcuerat, minus animaduertitur.

Non foetens.

AVT regio aut putor quem ciet, huic nomen fecit, locumq; pro uerbis dedit: idcirco nauteam, à nautica, quam mouet, Plautus vocauit. Cognati autem generis videtur, si non genericæ differentiz, Anagyris æluosis conuallibus & riguis, præsertim Galloprovinciæ oriunda, cum illa montana & aliosus Alpibus proveniente, quam Laburnum & Anagyridem non foetidam nonnulli conspiciat luteis, prælongis, pendulis, congestis multiflororum serie, sparti Genistellæ aut Cytisi non dissimilium: folia terna Asphaltidis trifolij, Cytisi, aut Polemonij longiora, ex pallore viridia, siliquulis, multis Genistellæ aut Cytisi, vñ pedicello hærentibus, minoribus, minùsq; latjs: semen item Cytisi aut Galegæ, oblongum, vel Genistæ fruticat ad arboris proceritatem, prædura materia, tusticoque instrumèto nata, intus nigricante, foris Fulariz colore, ex Alpibus Heluetijs in Germaniæ & Flådriz hortis florentem vidimus, sed perparum aut nihil foetidam, tanetsi fœteat vernaculo solo: esse Laburnum Plin, vt non magnum operæ precium puta-

putamus probare, ita est valde verisimile: sed huius Romani ne imparatiores minusque accurate fuerunt in hac historia tum synopsis, tum versiones, uti sexcentis locis, ac proximo Anagyridis capite, manifestum fit.

ANAGTRIS.

SEME lectum Anagyridis eminus etiam fortentis in crepidinibus Argentei ammi vocati, Briniolam inter & Vallū vrbeculas Galloprovinciæ, in Belgio creuit, etiamq; Londini nobis prouenit in Morgani Vireto: folia item terna virgultaque Memantis Trifolii: minor tota fruticat, minus dura materia, cortex nigricat, flores in muscosis thyrsis racemosi, Napi aut Raphani, aut Brassicæ, luteoli, siliquis longioribus, latioribus, semen cohiberetur, renis Phasolice effigie, durissimum, pullum, nitidum, subpurpureum: quin sit vera nulli iam dubium reliquit semen & foetidissimus odor, unde nomen illi & Adagio locum, Mouere Anagyrim, *ἄναγρις*, id est, sibi rem molestatam & prorsum ingratam exciere, quia rarius, vsus hodie paucus aut nullus.

DORYCNIVM *Monspellensium.*

ὀφύων, quemadmodum toxicum, quibus spicula cuspidatave tela infici solita fuerant, quò celeriore molirentur perniciem, nominatum fuisse par est. Multum verò abest illud hic appictum ab illis duabus, aut tribus plâti, quas nonnulli hariolabatur fore Dorychnion, quæque nullum operæ precium commemorare, uti Phyllerzæ, Vesicariū cordis effigie legumen, & alia: Nam iamdiu Rondelleti Præceptoris, & Scholæ clarissimæ Nitiobrigum penè cunctæ familiæ diurna coniectura, istam plantam Dorychnion statuere: creberrima quippe illic & in Galloprovinciâ fruticat (non perinde in Italiâ) sarmentosis, lignosis, durissimiq; virgultis, tenuibus, flexilibus, rectis, sesquicubitum, & binos altis; numerosa alarum sobole è geniculis imis summo tenus per interualla foliola habente, incana, còpluria, Rutaceis, Chamelez, aut Oleæ nuper pullulâtis multò exiliora, multis flosculis muscosis Oleæ, vel Quercus, per cacumina candicantibus, & in radiatis quasi umbellis relinquentibus theculas vel folliculos albidos, membranosos, rotundos, oblongos, teretes, Loti sylvestris semina quina, aut sena, nigricantia, arentia, Araci sylvestris, aut Loti sylvestris condentes: radice lignosiore, gracili, proluxa, saxosis sterilibus ad Frontignanæ & maritima Norbonæ oritur. Gustu est insipido ferè planta, & ut reor, refrigerantis, non humectantis facultatis.

POLEMONIVM *Monspellensium.*

HVIVS est similitudinis Polemonium, quasi dicas bellatum & bellicosum, ut de cuius inuentione sibi vendicanda certatum inter Reges fuerit: Quippe quæ herba esset *χολοκιννα* vocata, id est, mille viribus prædita, auctore Dioscoride. Nullidum recentiorum nota fuit Polemonia, ac ne quidem illi nouo huius cui radiato Appollini Vercellensi Math. alioquin amico non vulgari, & hac in palæstra riuali: ac ne nos quidè fortè nouissemus, nisi Rondelleti præceptoris & Guilliemi Pelisseri Monspel. Episcopi, & Assati sagaci vestigatione, factum fuisset, ut non multis ab hinc annis vniuersæ Academiæ illic fuerit notitiæ vulgatissimæ, etiam viribus explorando compertis: nam frutex ipse vndequeque exquisitè quadrat delineationi Dioscoridez. Virgultis multis, lignosis, rectis, rotundis, gracilibus, cortice pullis ex virore, ternos & quaternos cubitos altis,

in quibus ad vsque summum heret vtrunque pinnatim ramuli & folia ternâ Cythisi, aut Rutæ, maiora, saturè virentia, crassiuscula & rigida. Flores Maio & Iunio emicant lutei, pusilli, vt Ialemîni, qui cedunt baccis nigris vnâ circinnatim collectis, plenis, paribus ligulstri, aut Corni fœminæ, succo hyanthino; vel atro purpureo inficiente prægnantibus. Radice proluxa, lignea, implexa, & vario flexu sparfa, intus alba, saporis nonnihil acris & amari, euulsu difficilis. In Monspelio agro, ad Castrî noui aridos colles & æstuosos margines oliuetorû & in luci Grâmütii cæpestribus saxosis quamplurima. Gallicis, Belgis, & Anglis hortis iam quidè culta, sed putata & vocata ab illis genistæ peregrinæ quædâ species. Pueriliter hic nonnulli ambigunt super foliis Nepetæ: qui si meminissent esse speciem Calaminthæ Pulegii, planè foliis similibus, & paribus, lubenter de *Behen* albo & rubro vltius ineptire desinere: sunt enim Pulegii, Rutæ, & Polygoni, folia non adeò disparia inter se magnitudine, vnde etiam discas, quid Calamintha altera, seu Nepeta Diofcoridis, sit.



MAIOR & hortenſis Rutæ, Sylueſtris, & ei perquam ſimilis facië Norbonenſium Peganium, ſive anguſtifolia Rutula.

Sylueſtr. Rutæ. **S**EMPER virentis hortenſis figura trifolia, ſatis ex ſuperioribus innotefcet, tum etiam quia nihil hortis vulgatiuſ *πυγανον* dicta, ἀπὸ τῶ πυνυγία τὸ ἀπὸ τῆς, quia ſemen genitabile ſuo præſeſco ſpiritu calidoq; vapore & tetro coaguletur, quaſiq; areſcat, vnde ſterileſcunt, præfertim viri. Agreſſi autem Rutæ vires vegetiores, & odor vehementior multò, adeoque viroſus & aſſatu periculoſus eſt: interdum enim vaporem ipſa planta inſuſcentis vultui aſſat, aut tangentis manui inurit, qua ſi faciëm attigeris, Eriſypelas, aut Scabiëm excitabis: alta cubitum eſt, hortenſis, & caule minore, ſed foliis fermè iſdem exilioribus, Peganio paucioribus, ſiliqua & ſemine non diſpari: ſed nò perennat, ne in hortis quidem Gallicis & Batauis ſedulò culta, ſtoſculis herbaceis. Minima maximè omnium virulenta, anguſtiſoliola, tota pallido virore albicat: empetri fermè habitu, ſitu, & rigiditate, cætera non niſi magnitudine multò diſparia. Aridi Monſpeliaci colles & ſaxeideuexi vtraque ſcatent. Vtriuſque ſemen, præfertim minimæ, maximi ad arthritidem, & molas, & humiditates veteri vſus Medicis illic.



PEGAMION
Norbonen. ſive
Rutula.

AN. Harmala Syriaca ſu SESAMOIDES magnum
Dioſcoridis?

VERVM illi Syriacæ, quæ non modò Venetis, ſed etiam Belgicis & Anglicis viretis facile propagatur, tametiſ ſunt capitula, ſeu pericapia, ſimilia & triſida, aut triangula, tamē

men odor ille vehemens nostratis illi defit, quem si quis soli mutatione amissum dicat, sciat ex Syria quàm recentissimo semine satam, in odorem prouenisse. Atque inter Rutaceas, quas plures habemus quàm Diosc. nulla minus hac Rutam præferat, & sapiat odore & gustu, quam Martinellus misit è Syria, Harmalámque primus fecit: non incerta cōiectura quispiam possit illam eandem Sefamoidem maiorem opinari: est siquidem Agrestis Rutæ tenuifoliz, siue Norþonenfis Harmalz foliis longioribus, maioribus Senecionis, & Arthemisiz tenuifoliz, flore Hyperici, sed albo: siliqua triquetra, Sefami minoris effigie, semine intus pullo vel cinereo, gustu acri, amaro, maiore Hyoschiamz albi: tenui radice, lutea. Ex Syria per Italiz hortos, indèque Gallicis, Belgicis, etiámque Anglicis viretis nota. Nec si non esset purgatrix hæc, illicò foret idèò reicienda: quippe antiqui Helleboro soliti erant addere quædam, quæ vires catharticas, vel accelerarent, quasque stimuli vrgerent excretionem, vt sal, acetum, & alia tñm Helleboro, tum Elaterio: vel quæ impetum effrènd medicamenti moderarentur, vt pulcillas, aut lactis dulciculum potiunculam, cuiusmodi posterior etas quàm plurima meditata est admodum oportuna: Barbaris nostris apud Meusum consolatoria dicta. Nec hanc infernè delirare dicunt Dioscor. aut Paulus, nec per se, sed additum tribus semiobolis albi Hellebori, vt fufius in Helleborine.

RVT A triangulo pericarpio.

QVANDA habuit nobisque ostendit Rutam aliam Regins professor Monspelliensium Iubertus, cui triquetraz siliquæ aut vascula erant, nec tamen sapor ceteraque faciès diuersa à vulgari Ruta: quam obrem arbitrabantur Itali (quorum in hortis adoleuerat) hanc esse propiorem Syriacæ Harmalz, quàm superiores dictas.

CANINA RVT A.

RECENTIORVM insuper quatuor sunt plantæ, quæ virium aut odoris efficacia, itemque effigie, Rutæ nomen vsurparunt. Nec enim Caninz Rutæ vocatæ Ruta vulgaris cognata est, nisi paucis & vagis notis. Sed id vulgo moris est, vt cum præstent quædam herbæ opem celebrationibus solitam ascribi, si nomine deficiantur, illo communi impertiantur. Rarò, nisi locis siccis & feruidis, latis, & marginibus, cuiusmodi Norbonæ, Rauenæ, & Romæ, circum oriunda hæc. Surculis virgulteis multis, sesquicubiti folia Rheadis, Papaueris, aut Argemones incisura, magnitudine minora, crassiuscula, ex viridi nigricat: vt & flosculi, æstate hiantes, alterius Veronicæ vel Anthirini modo. Granè tota virosumve Rutaceo ingratiorem vibrat odorem: exili pericarpio, Rutæ ferè aut Blattariæ ritu, sed multò minore claudit semè. Rutā istam, Math. reiectæ Alceæ Venetæ, quam solus & odore viroso refert, suffecimus: odor quippe etiam Meconii quiddam virosum halat, ramulique exiles sunt. Succus verò, quem Meconio æquiparat succo, idem: qui nobiscum suspicatur hanc esse Hippococum, vires cum succo corniculati papaueris, aut spumei conferendas interpretatur. Verùm è tam parua designatione iudicium differendum censemus.

RVT A Pratenfis Herbariorum, nunc PHELLANDRIUM Plin.

quod potius SAXIFRAGIA Hircina videtur.

MVLTO adhuc magis Ruta pratenfis dicta abest: Plinianum hanc Phellandrium dictabant Luteiani nonnulli nostra memoria, quòd propius Apium accederet quàm Rutam, cuius nihil nisi odorem virosum sortita est: eodemque argumento ad calculum laudabant, & Saxifragium nuncupabant alii nuperi intempestiui nomelationum ærasticatores, qui tum demùm se opere præcium putant fecisse, si ex Plinianis incertis herbarum elenchis potius, quàm descriptionibus, aliquot selegerint minns auribus vulgi assueta nomina, & plantis itidem nondum agnitis indiderint. Horatiiq; consilio locum fecerint, qui pisces appingere syluis vetat. Pratis vdis & riguis oritur hæc passim, caulem promit sesquicubitalem, folia quadantennæ Apii palustris, sed minora, rigidiora, nigriora, radix luteola,

Nam illi vulgò
pharmaco. Ru-
barbari mona-
chorū à rubore
vocantur.

Ruta pratensis
renuifolia.

Thalictrum te-
nuifolium Cordi.

teola, fibris multis donata, latèque humi fufis, Afclepiadis modo: flores ex luteo herbacei, pufilli, numeroſi radix pediculis & atomis, cironibusq; interficiendis, in balnea inditur, ſuperiore gracilitate diſſerre tantum videtur, alioquin iſdem natalibus & facultatibus, ſed remiſſioribus prædita eſt.

GALEGA.

GALEGA foliis eſt Glycyrrhiæ, vel Lentis Glauci, cui etiam nomen ab Herbariis factum alludit: duum cubitorum illi caulis, flores albi, purpuſcentes, in teretibus, oblongis ſiliquis ſemen exile. In Pedemontana planitie, iuxta Erdani fluenta & Taurinum vberim luxuriat, paſſimq; alibi. Satis liquet, non ex delineatione, ſed potius ex effectione, Rutę nomen inditum illi, quia vel odor ipſe potius Leguminis, cui videtur ſimilis: ſed quia venenis efficaciffima, vti Ruta, perhibetur, cõſimili vulgò nomenclatura donatur. Veneti namq; Pharmacopœi atque etiam Circulatorum illic ſex, qui viperas ſtipis colligendę cauſa citumferunt, ſimulatque demorſi ſunt, nihil cetius hac aut præſentius habent; eadẽ multo magis, freti, quàm illis decantatis Theriacis.

LEGUMINA.

Faba { Maior vulgarior, non eſt eadem antiquorum faba, ſed congener.

Minor.

Sylueſtris Norbo. an ſit Faba antiquorū.

Phaſcoli.

Varietates.

Phaſculus ſylueſtris.

Smilax borſenſis Dioſc. ſive Phaſ. vulgaris.

Seſamum.

Frumētum Saracenicū, num ſit Eriſimū Theop?

Lupini.

Eorundem. Varietates.

Maius.

Minus.

Piſum

Spontanæum.

Cordatum, & Cor. Indicū, Halicacabū

Peregrinū Offic. an iſopyrum Dioſc?

Eruilla ſyri. ſive Ochrochum.

Lathyrus, ſive Cicercula.

Lathyrus ſylueſt.

Pſeudoapios, Germanorum Terra glandes.

Cicer

Domæſticum.

Arætiſimum.

Sylueſtre duplex.

LEGUMINOSA.

Lens.

Orobis, ſive Eruum.

Vicia.

Cracca, ſive Aracus.

Cracca altera.

Hediſarum vtrumque.

Glaux vulgaris.

Caput gallinaceū Belgarū, an Onobrychis

Dioſc?

Ornithopodum.

Ferrum equinum. Ferro Cavallo Italorum.

Scorpioides leguminosa.

Tribulus terreſtris.

Antibilis prior Dod. & Herbariorum.

Aphaca.

Eruum.

Glycyrrhiæ triplex.

Colutea.

Colutea Scorpioides.

Sena.

Diſſammi albus Officina. an Tra-

gium Dioſc?

F A B Œ antiquorum & recentiorum.

Germa. Boonen. Gallis. Feues. Ang. Beanes.

AGNOVINVS ſuperius triticea cum Leguminofis magis quadã vſus & partium proportionẽ conuenire, quàm delineatione: nã vt illa ſpicatur glumis & arifis, ſic hæc grauidantur ſiliquis & vaginulis, vtraq; magno vſui tum pecori, tum homini: illa à terendo, hæc à legendo Latini dixerunt, quia non falce vti illa, ſed manu vincte auellẽdo legerentur. Græcis verò σπείρα, quaſi fatiua aut ſerenda, quod ſementẽ multo ſcenore penſarẽt: ſunt enim legumina nõ parũ ſecũdiora triticeis, niinoreq; tempore & labore, ſed maiore prouẽtu colũture à qua quidẽ ſecacitatis facilitate κωλύς vocarũt, vt Ga'enus annotat, antiqui ſerẽ cuncta legumina Fabas, quaſi prægnantes & feraces, id enim valet verbũ κωλύς, quod prægno; vnde κωλύς, teſticulari dicti olim. Speciatim poſtea indicarũt legumẽ fama multo omniũ notiffimũ & fami plebeiz adeo vulgare ſubſidiũ, vt nõ ſecus atq; genẽra, aut diuerſitates Tritici, ſic fabarũ

barū delineationem nō tam rudem, quā nullā reliquerint. Cū autē pt̃x Fabā Theop. Diofc. & aliorum antiquorum istam vulgarem nostram, vt pote maiorem, pinguioremq̃, potiorē duxisset posteritas, ea penē cōtemp̃ta, hęc nostrā sola nomen Fabæ subripuit, retinetq̃; etiam nūti hodie: Antiquorum enim Fabulæ sine Fabellæ, pusillæ tametī, veluti p̃res, Loto & Terebintho comparantur. Taxiq̃; bacca maior quā faba asseritur apud Dioscoridē, & rotunda iuxta & æqualis asellis subter vrinis delitescētibz, *xyxus* vocatus Galenus: Aristotel. autē pulli decimi incubitus diei oculos maiores Fabā facit: tamen non illic nostratē ē Fabarum censu amouent, vt placet doctissimo & modestissimo Dodonzo: sed id nos docent, eorum Fabam fuisse minorem, quā hodierna, nec tamen specie diuersam, sed congenerem, & potius fructu, magnitudine, figura, quā plantæ natura temperamento, aut lineamentis distare. Nam Theoph. & Plin. Fabam, qualis nostras est, describunt caule recto & vnico, solamq̃; inter ligamina, vt plurimū, culmo tradunt: & multis locis Dioscorides caulem Fabæ quadratū dicit, & florem Fabæ Peryclimeni asserit. Sed id euenire, quia variant magnitudine, colore, effigie latiore, compressiore, tereti rotunda. Et frequentissima hodie Fabā nostra maior, raro vs̃piam tamen nisi fata prouenit, ferunt quippe in scrobillas paxillo depressas: Quare vt non est difficile nosse istam vulgarem Fabam, maiorem, longiorem, minūsq̃; rotundam esse, quā antiquorum Fabā fuerit, sic eandem Phasiolum Dolicumq̃ asserere, ne utiquam licet per eosdē auctores.

FABA Minor.

Altera, quæ minor est, Italis & Belgio satū frequentissima ad veterinā alenda, sed nuspiam vs̃us frequentior quā in Anglia, vbi panes Fabaceos veterinæ potius quā triticeos dant. Hæc non multum videtur abesse à Græcorum, quā superius expendebamus, Fabā: Est enim ea illis adhuc vs̃itatissima, fresa inibi vocata, ad pulmenta expetitā & Italiz, Venetijs p̃ferretim, vulgo *Faba metada diola*.

Sed syluestris, qualē sæpius in Galloprovincia & in Botoneti Ericetis sterilibusq̃, non *Sylvestris*, procul Monpelli enatim legimus, tota minor est, sesquicubitalis & cubitalis: & culmi quadrati, minus rigidi surculi, communis Fabæ folijs, quasi egens adminiculi, & supernè in cirros, capreolōse Pisi desinentibus, flore Vicie obscurè purpureo, & siliqua dum matu ruit aliquoq̃ non discrepantē cohibent autem quaternas Fabas aut quinas, gustu Fabaceo, sed non ita grato, odore grauiusculo, magnitudine Orobi, quem Dioscorides Tithymali Paralij femini comparat. Plinius quasi æqualitatem hanc & parilitatem inueniens, Fabæ partem tradit: quæ nos adducunt, vt non inuiti credamus hanc præ ceteris delineationem Græcæ explere. Quando etiam hæc non secus atq̃ antiq̃uorum Fabæ sponte prodeunt, in locis Galliz paulo antè dictis, quemadmodum illæ ē Fabarijs insulis, quibus cognomine fuisse ferunt auctores: tametī nialim esse illam Cherrouensem in Mari Euxino, quā in Germania siue Arctico Oceano, vbi terra alsiosa, & minus olim nota Græcis aut Romanis fuit: nec puto in Dania insolis finitimis hæc reperiri, eam tamen volunt esse Cymbricam Cheronefium siue peninsulam Plin. autoritate. Itaq̃ illam vulgatissimā Fabam amissam putare, tam parū verisimile est, quā siligine laudatione tritico carere nos, de quo tamen fuerunt controuersie multæ. Sed nostratē Fabæ cū caulem quadratū, rectū, surrectū, vnicū, vt plurimū folz leguminum habeant Theoph. & Plin. autoritate, & particulatim florent, ipsiq̃; flores nigricantibus lituris (quas lituras lugubres rati Flamines Romani, non mandebant, vt tradit Varro) insigniatur, nō esse *uulgare* sine fabas nōlim assentiri. Et in ipsius fructus latiore quasi basi, qui cernit nigrum vestigiū illud, quod hilum antiqui vocarunt, quasi germinis vmbilicellū & inuolucrum, ne utiquam vulgares respuet fabas, quibus penē id signi peculiare est. Ipse etiam in duas semisses sponte serē & natura diuellunt: & planè tot isdemq̃ facultatibus comperiuntur, quas antiqui prodiderunt, tum cibo tum medicamento: nam stans & tetra in somnia excitare, vulgus etiā queritur, & ad vlcera abstergenda, atq̃ carnem procurandā quiuis chirurgus harum farina vititur. Quamobrem non aliō dissident à Græca notissima illa nostratē Fabæ Germanorumū Boone, quā magnitudine & oblongiore teretive figura: quæ cū in plerisque eiusdem speciei & naturæ pomis, nucibus, & seminibus, tum in Cicere satiuo & sylvestri, discrepant, Diofc. monente: nam, inquit, à satiuo nihil differre, nisi semine tantum.

PHASELI à Fabis & Phasiolis discrimen.

Per pauca extant apud scriptores antiquos de Phaseolo, quem Diosc. ægrè concoqui, in flationes aluum & vomitum ciere tantum dicit: Galenus autem à *φασόλω* Dolichonem discernit, eundemque Cicerculæ aut eiusdem speciei vult: Quod Plinius videtur innuisse, & Maro ubi canit *Seu pinguem viciam feres, vilémue Faselum*: vilis enim meritò dicitur, vt cuius tantum quasi noxij aut parum vtilis meminerunt antiqui, eoque incognitum penè reliquerunt, nisi quantum ex Cicerculæ collatione percipi potest, deq; Galeni sententia, fortè & Plinij verbis, qui Fabæ folia rotunda, Phasiolo autem Pifo & Erulix longiora & venosa scribit: quæ accipienda esse de Phaseolo potius quàm de Phasiolo videntur, quia Phasiolo folia sunt rotunda, nec venosa. Et apud Columellam etiam pusillum legumen vileque intelligi videtur: quando Phasioli modi quatuor obruuntur à totidem operis: nec enim Phaseolus nisi rara & peregrina in Italia fuit. Eapropter nobis videtur sui generis legumen ignobile quoddam, Phaselus, simile tamen Erulix aut Ciceri, quale est quod pictum damus, in huius operis extremo, Phaseoli facie, sed siliquis Ciceris aut Vicix: congruis item Sparto, aut Genistæ, quales Dioscorides annotauit. Sponte hæc in Heluetia exit, folijs ab vno pediculo gracilibus, ordine positis, senis & septenis in caule geniculato, striato, cubitali & sesquicubitali, gracili, lento, flexili. Folia ipsa minimè crassa, aut carnosæ, sed venulis perquam exiguis secundum longitudinem intexta, magnitudine ferè, sed non positu Phaseoli. Floribus purpureis, Phaseoli minoribus, in proluxi oribus clauiculis: è quibus postea siliquæ fuscæ visuntur complures, magnitudine & effigie Genistæ aut Cicerculæ: semine intus pullo, Eruium æquante: radice multum fibrosa, nigra, maiore quàm cæteris leguminibus, fortè quia Syluestris est plâta, nam ruri repertam nobis dedit optime spei doctissimus amicus Penius Medicus.

Cicercula altera, an Phaseolum Diosc?

Est & quædam alia, quam nonnulli Phaseolum suspicati sunt, ea etiam in agris, & syluis occurrit, unde hortus Morgani habuit. Cicerculæ similiter hæc folia, cauleque emittit, venosa, tenuisque, auriculis Leporis similia: siliquis Vicix latioribus & longioribus, flore purpureo, & quàm Pisi minore: harum vtramvis malunt Phaseolum antiquorum recentiores doctiores, quàm Fabam nostram, vt quæ sit legumen neuitquam contemnendum, imò tanti faciendum hodie, vt vere & totam æstatem, multis in regionibus magnum sit annonæ supplementum, & nō parum multæ gentes panes ex Fabis depſant Veterinariz, etiamque plebeculæ non incommodos: farina autem, aut ipsa tota fresa Faba pulvis sapidus, & placentas conficiant, efficiantque, vt de hac nostrate Faba dictum putemus quod antiqui scribunt. Fabæ maximum honorem habitum fuisse, vt quæ panis attentatus sit.

*PHASIOLVS vulgaris Turcicæus multicolor Faba,**est SMILAX herethis Diosc.*

NULLIUS vetò laboris est istud legumen trifolium, folijs hederaceis, Faba tereti, oblonga, renis effigie, tricolori, esse antiquorum Dolichum Phaseolumve dictum, asseuerare, hanc non perinde triuiale fuisse & longè abesse à Phaseolis certum: tametsi nomenclaturam Phaselus, quasi minoris fructus à Phaseolo retinuerit, propter quandam similitudinem, fortè fructus & foliorum, potius quàm ob magnitudinem. Dolichum autem & Phaseolum effigie siliquarum & fructus, qui Lintrem Lembumve nauiculam exprimunt, vocantur. Nūquam autem nisi saci peregriniquæ hortis nostris, non secus ac Romanis olim, visuntur Phaseoli, cuius enatæ frondes hederaceæ prolississimis in viticulis deducuntur ad topiariorum ornamenta, quæ de causa vocauit Dioscorides hortensem Smilacem, cui perquam similis esset folijs & vultu, tametsi diuersa fructu. Est autem fructus Phaseoli per-

perquam ameno aspectu, plerumque bicolor & tricolor, maculis atris, pullis gilosis, rotundus, guttatis, oblongis, obliquis, circulatim, tæniatim aspersus, nitens: plerumque ebori concolores fabæ totæ, nonnunquam flauescunt, interdum atræ prorsum, plurimum renuelli effigiè referunt, vnde notissimæ sunt vbiuis, & apud Italos teneræ integræ siliqua in iusculis multum estantur, multoque magis quam vulgares Fabæ expetuntur: tamen si paræ lautus cibus nobis estantibus fortè non aliuets, videbantur.

Permultas accepimus à naucleris fabas Phasiolòsve ex Americæ nono orbe, èquæ Hesperia Aphrica allatas, quæ mixtæ naturæ videntur, sed propinquioris Phasiolo: nam earum quædam exigua, minor multò Phasiolo, ex fusco purpurea scit: quædam latissimæ & candida, compressæ rotunditatis, ambitu fere vnciam æquat, gustu, concretionem & Phascoli similitudine, hanc non demptam ex arbore Phasiolisera, vt quidam putant, norunt amici quidam, qui seuerunt, legumenque non ita dissimile Phasiolo habuerunt: Sed alias perquam raras habemus nos, monere lectissimæ, literata virtute & familia in Anglia illustri, Heroïnæ Catherinæ Killigree, quas ferunt repertas magna copia ad Cornubiæ littoræ, & quod non parum mirum, eo loco nullam meminuit vllus nauem illisam, nullumvè naufragium factum: & tamen quotannis nouæ inueniuntur, partim fluitantes & partim effodiuntur immerse fabulis littoreis, quasi, vt putant Cornubiensis maris Anglici accollæ, secundis Austris, aut Zephyris è nouo mundo appulsæ fuerint.

Belgarum Bouckwoey, vel ERTSIMVM
Theophrast?

ET si in segetum censu ponunt Theophrastus Plinius atque Galenus Erysimum quoddam Sesamo simile & cognatum, cibus aptum; tamen delineatio magis folia leguminosæ testatur. Nulla autem planta videtur affiniore eruditorum sententia, quàm illud frugum genus, quod Belgis Brabantis, Helueticisque tanta copia feritur, vt isto vniuersa sata, quasi purpurea operta eminus rutilent. Vniuersa planta, præcipue quando maturescit, purpurascit Amaranthi colore: caulis bicubitalis, striatus, folia Smilacis minora aut Atriplicis: flore candido: semine glumis contento, triquetris fuscis, quæ molendo exuuntur, ex Farina, lacte & butyro pinguuntur placente, & sartagine friguntur, pueris expetite. Belgium, & præsertim Antuerpianus ager, huius est foecundissimum. Quod si oculis vidisset sedulus & perpetuus Hermolai, Ruelli, Leoniceri, cæterorumque doctiorum carptor Mathiæ, veniam potius præcipitis iudicii, & pauca inspectionis, ne dicam lectionis, ab illis doctis exorasset, quàm eorum nomen lacerasset. Vt quorum nonnumquam multis studiorum anxietatibus comparata, illi quasi offam præmanfam in os inferuerint, amplissimæque segetem (sed immeritè) laudis suggererint. Intuere eius duo argumenta: Triticum Sarracenicum Tridentinis *Formentone*, tantum caule rubet, non foliis: alterum argumentum, ab omnibus auidissimè depascitur. Respondeo, *Formentone* totum rubrum esse demptis floribus albis: rura Belgica & Gallica id affatim edere, & tuam Dialecticâ hic captionem moliri, quæ dum ab omnibus auidè vorari argutatur, viriditatem, vnde tota vis rationis pendebat, reticuit: nò enim dicit non edi Theoph; sed virentia folia non edi: misera tamen utraque argutatio. Rubor inest palmitibus, Titymallis, Atriplicibus aliis, & similibus multis in locis, alibi nullus. Et Basileæ agnum habuimus cicutæ Helluonem; at alibi passim animantia respuunt: hic in Anglia virentes asparagos veterina non tangunt; post fœnicetum in maritimis, illis aridis velcuntur.

Math. pag. 373

An Officinarium SESAMI semen sit Dioscoridi?

SEMI in istud perpetuo nomine & vsu Sesamum fuit, quod satum, vidimus adustum in horto Trevisani Doctoris Patavini, siliquolis cylindricis, præsepulis distinctis, semine isto flauescente, oblongo, Sesamino plenis. Caule sesquicubitali crasso, foliis Amygdali, vel Ocyimi. Flores, Ruborem, & alia non meminimus, nec putabamus vllum fore, qui plantam, hanc Sesamum inficiaretur, si semen semel intueretur istud dictum.

Quare

Quare si ruborem desiderat in Sesamo Senensis, docti in illo pado rem, vt qui vnus plantulæ fortè aride, in solo peregrino adultæ animaduersione, de Sesamo aduersus omniū iudicia statuerit, nec quidquam potioris docuerit. Quantam enim seminis istius Sesamini Venetias, Pisas, Genuam, Lucam, Antuerpiam ex Alexandria Candiaque, venum venit, huius plantæ est, quam monitus fortè inuitus depinxit.

SATIVS LUPINVS.

Nec ita procul absunt à Fabaceis & Phaseolis fructus quos *βίαν* vocarunt Græci, quia calidiores cæteris leguminibus essent, aut potius quòd *βίαν*, id est, calida aqua lauantur & macerarentur quòd amarorem exuerent tristitem & molestum, à quo etiam *Λύα* & *Λύπος* & *Lupinus* dictus, vnde Virgili. *tristisque Lupini sustuleris Calamos*. Quamplurimis in hortis præsertim Pharmacopæorum habetur satiuus, culmum edens, perinde ac *Λάβα*, rectum, & suapte natura stantem, sed rotundum, cauum, nonnihil tomentosum, è radice ferè singulari, nec multum fibrosa, à qua fere per totum caulem & ramos alterno situ exerantur in pediculis folia fena & septena diuisura, digitata Vitis, aut Staphidis agriz similia, aduersa, virentia, subtus incana, hirsuta: siliquæ Fabaceis minores, latiores quàm Phaseoli: durus fructus, rotundus, compressus, albidus foris, subluteus intus, perquam amarus. Flos ter èstate spectandus, nam initio ex imo emicant albi, postea è cauliculis affecta æstate & per Autumnum extunte. Pedemontani præferunt patentes planities satiuo, quos maceratos estat plebecula.

Segetum SYLVESTRE flore purpureo.

FNatis & cultis Gramuntio luco circumiectis non procul Monspellio sæpè occurrit hic, qui illicò intuentratium superius descriptum refert: nisi quia gracilior multò est, caule, pedalis folio quinque partito, angustiore, & flore purpureo & puniceo, Pisi minore: fructu etiam minore, gutratis, aut fortuitis asperso maculis, pulvis, cinereis, & cæsis. Inibi etiamque in hortis herbariorum visitur hic idem floribus luteis Genistæ, fructu nihilo secius amaro.



PISUM VVLGATIVS Maius.

{ *Germa. Erwyssen. Ang. Pease.*
{ *Belgæ. Stock erwitten. Ital. Piso.*

E quadam vrbe Pisi inter Ossam & Olympum montes sita Pisum allatum & dictum volunt: de quo nihil extare apud Dioscoridem non tam mirum sit, quàm certos nos facit, multa eius operi intercidisse, quæ illi notissima fuerunt. Nam nullum legumen notius aut præstantius secundum Fabam Piso est: quod græce etiam *Λύθος* dicitur, quasi dicas oui vitellum, quem colore & similitudine exprimunt, vbi per maturitatè flauent viridescuntve, sunt in siliquis cylindraceis ipsi semina, quæ vnà cum membraneis vaginulis, verè & èstate iusculenta commendant: harum seges prolixè admodum luxuriat, humi semper caduca, nisi ridicas, pedamentave sit nata, prælongis, gracilibus, fistulosis caulibus, per media foliola euntibus Persoliatè ritu: supernè lentis in clauiculas exeunt, folia rotunda, oblonga, in duos ferè semicirculos oblongos diuisa: flore effigie papilionis, albicante sui medio purpureo, radice exili, quibusdam Germaniæ locis sponte germinante.

An Pisum angulosum Hortorum quadratum Plinii?

ALTYA vultæ in semine varietates visuntur Pisi non secus atque Fabarum: nam prægrande quoddam in Belgicæ & Angliæ hortis colitur, angulosa & quadrata corpora-
tura

tura ciceris maiore, mediocrem Fabam æquante, ferrugineo aut ruffo colore: nec tamen gultu distat: sed multum longius in denos, duodenosve pedes porrigitur: videatur hæc angulosa Plinij Pifa.

PISVM minus ex luteo virescens.

Ital. Piselli.

Propter corticem viridantem interioremq; medullam, oui luteo concolorem, certum est vocatum fuisse *ῥιγγον* id est, luteo pallidum, vt est terra Ochra: vnde etiam *Λουτός* nomen superius dictum in maiore Pifo manauit: præterea autem commendatio in iurulentis, quia illico tenerefecit, vtpote minores, pinguiore, deliciores, facilius elixantur, facilius concoquantur. Seruntur in agris, vbi minore cultu, nec fulcris ægent.

PISVM Sylvestre.

IN Heluetia & superiore Germania, non secus ac Phaselus sylvestris, obuian se dant peregrè eunti, etiam sponte Pifa. Figura nō absimili, sed radice multo adultiore, fibrosiore, crassiore, & perenni, quales illic collectos, chartis inseruit noster Penius. Quidā in suis vnius paginulæ rariorum stirpium libello, memorandum mirūq; quiddā affirmat: in faxis littoreis, nulla terra opertis, tantam tamq; portentolam segetem Pisorum sponte nulloq; fatu enatam in Angliæ Suffolcia, inter Otfordum & Alburnum, etiā Autumno 1555 quantum fati, vtmillibus hominibus suppeteret.

Pisum cordatum, sit ne potius ISOPYRVM, quàm Melanthij quadam species, aut Trifolium palustre?

Quoniam nomenclaturæ Isopyri atq; Phaseoli innuebant hæc plantam esse leguminū naturæ asine, aut similem saltem, non abs re solertes vestigatores trifolium Fabaceum, Faseoli folium aquaticum, nobis commodiore loco memoratum, autamarunt verum Isopyrū esse. Quod valdè simile vero esset, si vocula Anisi abesset: quæ obstat quō minus hæc aquatica Germanicè faba vocata, verè designationi satisfaciatur. Desideratur namq; non tam Phaseoli *ῥιγγον* (quod nonnulli etiam folium interpretantur) in hac, quàm Anisi foliū, quod quibusdā repetitum frustra, aut luxatæ lectioni Dioscoridis additum, opinantur. Qui verò vulgarem lectionem tuentur, quandam Melanthij speciem appingūt, nulla prorsum Phaseoli siue ortus, siue lineamentis similitudine: sed muta pictura, qualis Commentatoris est, vno aut altero Anisi ramulo, ad radicem Melanthij expresso. Quare si coniecturæ indulgendum & codici assentiendum, malim cuiusdam amici exercitillimi amplecti sententiam, quæ Cor Indicum, ortu, summitatibus & clauiculis Phaseoli, folijs verò Anisi diuisura, Isopyrum statuit. Suffragāte ipso fructu, queni ternum Melanthij colore & sapore Pisi, aut veræ & antiquæ Fabæ siue Phaseoli Sylvestris similitudine & magnitudine Halicacabi, folliculus claudit. Id Cordis aut Pyramidis effigiem media sui parte conspicuam refert, vnde Cor Indicum vulgo passim vocitatum, & notū. Officinis propter folliculum laud admodum diuersum, nisi colore, ab Halicacabo, Halicacabū peregrinū vocatur.

Ochru syl. siue ERVILIA.

Sylvestris indolis velutiq; degeneres à Pisis Ochrisq; Eruliz, quasi eruendæ & eliciendæ dictæ, rarius nisi in hortis Septentrionalū herbariorum hodie seritur: iuxta tamen fæpes, vias, in Linguagotia sponte reptat imbecillioribus viticulis, membranula triplici aut duplici secundum longitudinem veluti pinnatis, ima folia oblongiora & latiora, in clauiculas desinentia serentibus: supernè verè foliola partim in plura & minora diuidiuntur, partim etiam clauiculis donantur cædidis, & interdū purpureis, flo. e & siliqua Cicerculæ, cui admodum similis.

LATHYRIS Norbonensis latiore folio.

Valde verisimile est à Lathyridis Cataputiz granis quæ Orobinis similia seminula Diofcorides dicit, nomen factum Cicerculæ vocatæ, quæ hodie differentias duas habet ex agro Norbonensi allatas, vbi sponte frequentior erumpit ea, cui latiora supernè acuta bina, nervosa per intervalla oriuntur folia, citu & imitatione auricularum lepuſculi arrectarum, aut Bupleuri herbariorum,

Angustiore gramineo flore Lathyrus.

Alteri in nudis ibidem enatæ folia admodum angusta, graminea, Venosa, & mucronata, è pediculo bina in tortiles capillaceasque clauiculas desinentes, Catanacæ ferè sunt: deſtutis albidis & luteolis floribus succedit filiqua compresior, duplò breuior, latior superiore, vbi grana angulosa pusilla, Pisi aut Heruiliæ sapore.

ARACYS aut Cicera.

Quamuis distinxerit Galenus Aracum citra aspirationem scribendum, ab Aracho aspiratione scribi solito, viciumque & exitium quoddam illud polterius Lentiù & aliorum leguminum dixerit: tamen vtrumque videtur ab Indole sui cognati leguminis quasi in spurium abiisse, vt de illis diximus, & in istis obseruamus: Est enim prorsum cognatus & similis, fortassis idem ille Aracus, quem quidam Cicerculam alteram volunt: nec abs re, cum eius grana fordidius nigricantia inter Pisa, Orobos, & Vicia pullulent, à quibus videntur degenerasse. Quod idem Columella affirmare videtur, quando nihil sapore, sed tantum colore à Cicercula distidere, eoque Cicera vocari asserit. Ramosis è radice fibrosa prouoluitur calamis, flexilibus per longitudinem quasi teniolis membranulisue pinnatim angulosa: folijs Cicerculæ.

Est vbi luteo flore inuenerunt amici quidam, quem nisi Ochre vicium putant esse, vt steriles Auenæ, Lolium, Melampyrum, alijque segetum morbi.

APHACA.

Mixta videtur hæc è Piso & Lenticula, vt cuius filiqua m, semenque simile est fortita: Pisi autem folia, caules & capreolos, longè exiliores quam Lentis, cuius semen refert, sed minus, nigrius, durius, esu ingratus, filiqua non dissimili tamen, latiore, longiore: tennella sunt folia, ex aduerso bina, culis geniculum Pisi modo amplexa, vnde exeruntur capreoli.

Terra GLANDES, sive PSEUDAPIOS

Germanorum, an ASTRAGA.

LVS Dioſc?

Leguminosa huius gentilitatis est bulbosa, quam Germani Swart Mettich, id est, Raphanum nigrum, & Erwbyot, id est, Suillon panem, Alter ephel & grand ephel, id est Balanum terreſtrem vocant. Spargit humi tres quatuorve ramulos in imo rubellos, Ciccris aut Pisi folio & clauiculis donatos, quibus, si adsint, proximas quasque plantas amplectitur: flores item purpurei Pisi sunt: & in filiquis paruis exiguum semen. Radices verò oblongæ oliuarum glandisue instar sunt, foris nigre aut pullæ, intus albidæ, multis quasi tractatæ vel appensæ fibrosis loris, seu funiculis variè inuicem implexis, & latè fufis. Angliæ, Germaniæ, Galliæque Nortmaniz Syluosis opacis, iuxta sepes: Norbonæ autem, Italiæ cæterisque æstuosis regionibus, non nisi in arduis & niuosis eruitur: cuiusmodi sunt illi Vegani montes & colles Martij Galloprovinciæ. Sapor illis subdulcis, glandis, aut Castaneæ asstringens. Siccatur in ultum dureſcunt, vt Peroniæ radices, nec minus solidæ sunt: nec minus contumaces tundendo (quas seruamus) quam Thoræ glandulæ. In hanc veram & meram recensionem videant illudiosi an possit quadrare Astragalus, cuius lectionem apud Dioſcorid. luxatam esse ex Paulo perspicuum est, qui non Memphiticum sed Pheneum Astragalum legit, & Plinius idem confirmat: Ac tametsi descript-

descriptionem dat paulum diuersam, nullam tamen facit mentionem; fortè quia iam tum in Dioscoride lectio deprauata erat, vel quia ex alio scriptore verterat. Ad hæc, Galcus & Ægineta, Astragalon paruum fruticem *ἄστραλον ταχέως*, altringentes, quasi plures, nec tamen Raphanum memorant. Quare, tanquam non in Dioscoride in, sed ab isto codice male acceptam animaduertamus hanc lectionis deprauatione, quipiam erit nobis audendum. Eapropter nos, ubi *σκόρυον ἄστρον, ἄστρον ἄστρον*, habetur, *σκόρυον*: vnius literulæ methatesi, & alterius caudicella sursum versus reposta, repostum vellemus: qui lubricus lapsus est amanuensis: quum enim Glandulam, Ficem terræ & talum vocarint Romani, Astragalum, non Raphanum, sed potius vetam, nec huius nostri fortè disparem effigiem intellexerunt: nec solum talum, Olisculum lusorum Astragalon vocarunt Græci, quale referunt hæ radices, sed etiam flagra, nodulis, aut ruberculis asperata. Sic enim *μάστιξ ἀσπεράδαντος*, scutica talosa seu nodosa fontibus exsurgendis apud Lucianum usurpatur. Hæc tamen ineptiusculis scholiis facilius quis obstrepet, quam meliora subdet: Ceterum candidus arbiter, minima quæque in Priscorum designationibus scit non esse seuerius exegenda: de Apio, quem quidam putarunt cum hac eundem, manifestum fiet: Eam siquidem, similem dicit Asphodelo, ut idem fecerat Theophrastus, cum tamen vnico sit bulbo.

Erium Sylvestre Herbariorum sitne Κατάναρον, sine amatoria, aut necessaria, non Bulbosa vnguimilua Dioscoridi?

QVAST necessitate inconcussa & fatali adigeret ad amandum, Catananæ vocarunt, quasi amoris illicitum necessarium; quia omnia vincit amor improbus. Eam autem neutiquam notam probe nostro xuo, minus mirum est, cum etiam si stirps de facie nota, & apud nos nata foret; tamen incertum adhuc esset, num vera esset censenda: nullis enim viribus, nisi præstigiis & Fascinatricis insanæ, amatoriis illecebris commendatur, quas Thesalicæ tribades & lenæ prætexebant, fortè suis carminibus, ut hodie faciunt impuræ forde Italæ, verbis abusus nefariis ad insanum amorem conciliandum, quas vires attribunt herbis vulgaris. Idcirco Pilnius, cuiusq; coxui cordati viri, consulto figuræ harum tacerunt. Nec sanè eas nosse, vilius est operæ pretiū: nec Dioscorides vires, sed historiam duntaxat alienam citat. Quodpiam genus leguminis fuisse hanc descriptio ostendit, cui non malè quadrat ea herbula, quæ in hortis herbariorum Iulio & Augusto, post hoscules Pisi delapsos, filiquas longiores, exiles, teretes fert, semine refertas rufescente. foliis angustis, graminis, binos pollices longis, Lagopi angustifoli, quæ marcida, recurua instat milui conuulsi cruris videntur: radice exili, simplici. Visitur etiam in agris litorum maris Septentrionalis.

ALITERAM Cicetis semine, olinam radice æquante, mali parui magnitudine, quæ vel adumbret, nullam nouimus plantā: tara namque admodum effigie oportet sit hæc: si descriptio vera est. Videtur persuasio hæc, deliri amoris conciliandi etiam nolenti volenti. à feminis peritus mysterio hausta: quam si fas fuisset, nec nos ineptæ piguisset, in Phytumate, Leontopodio, & proximo Antyrthini capite patefecissemus.

CICER satium, arietinum Dioscoridis.

OFFICINARVM Cicer rubrum vbique in Italia, Germania, & Gallia feritur, & adeo noscitur, ut nullus nesciat iam esse antiquorum verum Arietinum, qui modò videat in filiqua tereti, & instar marsupii tumida, hirsuta, vnciā lōga femina, Piso maior; caput Arietinum frontata effigie, & angulo aliquantum mucronem emulante: color albus quibusdam, quæ minus in medicamēta veniunt: alia obsoletè nigricant, plurima ex fulco putrescunt, qualia efficaciora ad medica commoda habent officinæ omnes: sementem & messem faciunt Itali, apud quos estantur magna copia: folia lætis posita, medio neruulo hærent, tantillum crenata: flores purpurant puniceantes, *Varietates.*

CICEROrobæum Theophr., ab Orobo nigro dicto tantum distans.

Ll. ij.

Dip.

Sapor Ciceris aut similis leguminis odoris sanè iam non succurrit: aridam enim & inodoram duntaxat habemus uallam Norbong, præsertim, ad radices môtis Calcaris prope Veganiû: minus procera tamen, sed tenerior pabuloq; aptior est, fortè quia dum in montes abigunt pecus, ut quotannis faciunt, passionis lætioris, atq; æstus conuallium declinandi causa, ineunte Maio & Iunio, Sole in Arietem ingresso, teneriusculos germinationum foetus, florum filiquarumq; spem liguriunt oues, & capellæ. Eoq; Poeta venustè ex Theocrito canit. *Florentem Cytisum & Salices carperis amaras.* Hæc, ut si quæ alia apprimè quadrat Dioscoridis, Gallenique Cytiso: nam ecquid eadem sit, Theophrasti haud magnopere sollicitus facit nos, quando ille in describenda minus sollicitus fuit, qui de Lotis alicubi monuit, plerumque usu venire, ut eadem voce plurimùm diuersæ plantæ, effigie tradantur. Qua propter uti Antiqui Cytisum vocarunt Fœnigræcum, Lotum magnam, & Trifolium, propter figuræ aut naturæ coniunctionem, sic ex varijs consimilibus fruticibus Anagyridi, Laburno, Coluteæ, incertum vagumque vocabulum remansit.

Altera Cytisus minor & vulgarior.



*Munus foetens Anagyris vel LABURNVM, Fœtida
ANAGRIS arborescens.*

NOTIOR & frequentior multo, quæ Italia, Galloprovinciæ, squalidis saxosisq; collibus inter cocciferas lices & maiores Ericas viret, florumq; amœnissima scetura oculos capràq; pascit ætatis incitid: sesquicubitales spargit fruticulosas, lignosas virgas, tenues, ramosas: & folia terna virgultis oriuntur, & quàm prioris Cytisi maiora, rotundiora, viridantia ex atro: Genistæ flores in summis cauliculis luxuriant, lutei pusilli, sed stipatu longè pluri, quàm pro magnitudine plantæ, quò aduolat mellificatum apum examina læta: odor gratus illi, sapor alterius: Siliqua & semè minora.

Terna item produnt hinc folia, sed putior, quia emarcuit, minus animaduertitur.

Non foetens.

AVT regio aut putor quem ciet, huic nomen fecit, locumq; prouerbio, Ne moueas *εἴτα γένεα* dedit: idcirco nauteam, à nausea, quam mouet, Plantus vocauit. Cognati autem generis videtur, si non genericæ differentia, Anagyris æstuosis conuallibus & riguis, præsertim Galloprovinciæ oriunda, cum illa montana & aliosis Alpibus proveniente, quam Laburnum & Anagyridem non foetidam nonnulli autumant. Plurima hæc Taurinis montosis & collibus Pedemôtanis, Vere ligulis vel pannulis conspicua luteis, prælongis, pendulis, congestis multa stoculorum serie, Sparti Genistellæ aut Cytisi non dissimilium: folia terna Asphaltidis trifolij, Cytisi, aut Polemonij longiora, ex pallore viridia, filigulis, multis Genistellæ aut Cytisi, vni pedicello hærentibus, minoribus, minúsq; latjs: semen item Cytisi aut Galegæ, oblongum, vel Genistæ, fruticat ad arboris proceritatem, prædura materia, rusticaque instrumèto nata, intus nigricante, foris Fusariæ colore, ex Alpibus Helueticis in Geraniæ & Flâdriæ hortis florentem vidimus, sed perparum aut nihil foetidam, tamen si foetèat vernaculo solo: esse Laburnum Plin., ut non magnum operæ præcipuum puta-

putamus probare, ita est valde verisimile: sed huius Romani ne imparatores minusque a-
curatz fuerunt in hac historia tum synopses, tum versiones, vti sexcentis locis, ac proxi-
mo Anagyridis capite, manifestum fit.

ANAGYRIS.

SEME N lectum Anagyridis eminus etiam fortentis in crepidinibus Argentei ammi vo-
cati, Briniolam inter & Vallū vrbeculas Galloprovinciaz, in Belgio creuit, etiamq; Lon-
dini nobis prouenit in Morgani Vireto: folia item terna virgultaque Memantis Trifolii:
minor tota fruticat, minus dura materia, cortex nigricat, flores in muscosis thyrsis race-
mosi, Napi aut Raphani, aut Brassicę, luteoli, siliquis longioribus, latioribus, semen cohi-
betur, renis Phasolice effigie, durissimum, pullum, nitidum, subpurpureum: quin sit vera
nulli iam dubium reliquit semen & fetidissimus odor, vnde nomen illi & Adagio locum,
Mouere Anagyrin, *αναγυρίν*, id est, sibi rem molestat & prorsum ingratiā exciere,
quia rarior, vltus hodie paucus aut nullus.

DORYCNIVM *Monspellensium.*

οφύκνιον, quemadmodum toxicum, quibus spicula cuspidatave tela infici solita fuerant,
quò celeriores molirentur perniciem, nominatum fuisse par est. Multum verò abest illud
hic appictum ab illis duabus, aut tribus plā-
tis, quas nonnulli hariolabātur fore Dorych-
nion, quęque nullum operę precium com-
memorare, vti Phyllerzā, Vesicariū cordis
effigie legumen, & alia: Nam iamdiu Ron-
delleti Pręceptoris, & Scholz clarissimę
Nitiobrigum penē cunctę familię diuturna
coniectura, istam plantam Dorychnion sta-
tuebat: creberrima quippe illic & in Gallo-
provincia fruticat (non perinde in Italia)
sarmentosis, lignosis, durissimiq; virgultis,
tenuibus, flexilibus, rectis, sesquicubitum, &
binos alios numerosa alarum fobole ē geni-
culis imis summo tenus per interualla folio-
la habente, incana, cōpluria, Rutaceis, Cham-
eleę, aut Oleę nuper pullulātis multo ex-
ciliora, multis flosculis muscosis Oleę, vel
Quercus, per cacumina candicantibus, &
in radiatis quasi vmbellis relinquentibus
theculas vel folliculos albidos, membrano-
sos, rotundos, oblongos, teretes, Loti sylue-
stris femina quina, aut senę, nigricantia, arentia, Araci syluestris, aut Loti syluestris conden-
tis: radice lignosiore, gracili, proluxa, faxosis sterilibus ad Frontignanā & maritima
Narbonę oritur. Gultu est insipido sermē planta, & vt reor, refrigerantis, non humectan-
tis facultatis.

POLEMONIVM *Monspellensium.*

HVIUS est similitudinis Polemonium, quasi dicas bellatum & bellicosum, vt de
huius inuentione sibi vendicanda certatum inter Reges fuerit: Quippe quę herba
esset *αποδύκνιον* vocata, id est, mille viribus prędita, auctore Dioscoride. Nullidum re-
centiorum nota fuit Polemonia, ac ne quidem illi nouo huius quī radiato Appollini
Vercellensī Math. alioquin amico non vulgari, & hac in palęstra riuali: ac ne nos quidē for-
tē nouissemus, nisi Rondelleti pręceptoris & Guilliemī Pelisserii Monspel. Episcopi, &
Assatii sagaci vestigatione, factum fuisset, vt non multis ab hinc annis vniuersę Academię
illuc fuerit notitię vulgarissimę, etiam viribus explorando compertis: nam frutex ipse
vndequeque exquisitę quadrat delineationi Dioscorideę. Virgultis multis, lignosis,
rectis, rotundis, gracilibus, cortice pullis ex virore, ternos & quaternos cubitos altis,

in quibus ad vsque summum heret vtrunque pinnatim ramuli & folia terna Cythisi, aut Rutæ, maiora, saturè virentia, crassiuscula & rigida. Flores Maio & Iunio emicant lutes, pusilli, vt Ialemuni, qui cedunt baccis nigris vnà circinnatim collectis, plenis, paribus ligustri, aut Cotni scemina, succo hyanthino; vel atro purpureo inficiente pregnantibus. Radice prolixa, lignea, implexa, & vario flexu sparsa, intus alba, saporis nonnihil acris & amari, euulsu difficilis. In Monspelio agro, ad Castrum noui aridos colles & æstuosos margines oliuetorū & in luci Grāmūtii capeltrib⁹ saxosis quamplurima. Gallis, Belgis, & Anglis hortis iam quidē culta, sed putata & vocata ab illis geniste peregrinæ quēdā species. Pueriliter hic nonnulli ambigunt super foliis Nepetæ: qui si meminissent esse speciem Calaminthæ Pulegii, planè foliis similibus, & paribus, lubenter de *Breben* albo & rubro vterius ineptire desinere: sunt enim Pulegii, Rutæ, & Polygoni, folia non adeo disparia inter se magnitudine, vnde etiam discas, quid Calamintha altera, seu Nepeta Dioscoridis, sit.



MAIOR & hortenſis Ruta, Sylueſtris, & ei perquam ſimilis facie Norbonenſium Peganium, ſive anguſtifolia Rutula.

Sylueſtr. Ruta. **S**EMPER virentis hortenſis figura trifolia, ſatis ex ſuperioribus innotefcet, tum etiam quia nihil hortis vulgatiſ *πυγαριον* dicta, ἀπὸ τοῦ πυγνέειν τὸ ἀνέμα, quia ſemen genitabile ſuo præſcico ſpiritu calidoq; vapore & tetro coaguletur, qualiſque areſcat, vnde ſterileſcunt, præſertim viri. Agreſti autem Ruta vires vegetiores, & odor vehementior multò, adeoque viroſus & aſſlatu periculoſus eſt: interdum enim vaporem ipſa planta intuenſis vultui aſſat, aut tangentis manui inurit, qua ſi faciem attigeris, Eriſypelas, aut Scabiem excitabis: alta cubitum eſt, hortenſis, & caule minore, ſed foliis ſermè iſdem exilioribus, Peganio paucioribus, ſiliqua & ſemine non diſpari: ſed nō perennat, ne in hortis quidem Gallicis & Batauis ſedulo culta, ſtoſculis herbaceis. Minima maxime omnium virulenta, anguſtiſoliola, tota pallido virore albicat: empetri ſermè habitu, ſitu, & rigiditate, cetera non niſi magnitudine multò diſparia. Aridi Monſpeliaci colles & ſaxideuexi vtraque ſcatent. Vtriuſque ſemen, præſertim minimæ, maximi ad arthritidem, & molas, & humiditates veteri vſus Medicis illic.



PEGANION
Norbonen. ſive
Rutula.

AN. Harmala Syriaca ſiſeſe **SESAMOIDES** *magnum*
Dioſcoridis?

VERVM illi Syriacæ, quæ non modò Venetis, ſed etiam Belgicis & Anglicis viretis faciliè propagatur, tametiſ ſunt capitula, ſeu pericarpia, ſimilia & triſida, aut triangula, tamen

men odor ille vehemens nostratis illi defit, quem si quis soli mutatione amissum dicar, sciat ex Syria quàm recentissimo semine satam, in odoram prouenisse. Atque inter Rutaceas, quas plures habemus quàm Diosc. nulla minus hac Rutam præferat, & sapiat odore & gustu, quam Martinellus misit è Syria, Harmalámque primus fecit: non infcita cõiectura quispiam possit illam eandem Sefamoidem maiorem opinari: est siquidem Agrestis Rutæ tenuifoliz, siue Norþonenfis Harmalz foliis longioribus, maioribus Senecionis, & Arthemiz tenuifoliz, flore Hyperici, sed albo: siliqua triquetra, Sefami minoris effigie, semine intus pullo vel cinereo, gustu acri, amaro, maiore Hyofchiami albi: tenui radice, lutea. Ex Syriaper Italiz hortos, indèque Gallicis, Belgicis, etiámque Anglicis viretis nota. Nec si non esset purgatrix hæc, illicò foret ideò reicienda: quippe antiqui Helleboro soliti erant addere quzdam, quæ vires catharticas, vel accelerarent, quasque stimuli vrgerent excretionem, vt sal, acetum, & alia tum Helleboro, tum Elaterio: vel quæ impetum effrenè medicamenti moderarentur, vt pulciculas, aut lactis dulciculum potiunculam, cuiusmodi posterior etas quàm plurima meditata est admodum oportuna: Barbaris nostris apud Mesuem consolatoria dicta. Nec hanc infernè deicere dicunt Dioscor. aut Paulus, nec per se, sed additum tribus semiobolis albi Hellebori, vt fusius in Hellebotine.

RVT A triangulo pericarpio.

QUANDA habuit nobisq; ostendit Ruram aliam Regius professor Monspellensium lubettus, cui triquetra siliquæ aut vascula erant, nec tamen sapor ceteraq; faciès diuersa à vulgari Ruta: quam obrem arbitrabantur Itali (quorum in hortis adoleuerat) hanc esse propiorem Sytiacæ Harmalz, quàm superiores dictas.

CANINA RVT A.

RECENTIORVM insuper quatuor sunt plantæ, quæ virium aut odoris efficacia, itemque effigie, Rutæ nomen usurparunt. Nec enim Caninæ Rutæ vocatæ Ruta vulgaris cognata est, nisi paucis & vagis notis. Sed id vulgo moris est, vt cum præstent quædam herbæ opem celebrationibus solitam ascribi, si nomine deficiantur, illo communi impertiantur. Rarò, nisi locis siccis & feruidis, satis, & marginibus, suisque cubiti folia Rheadis, Papaueris, aut Argemones incisura, magnitudine minora, crassiuscula, ex viridi nigricat: vti & flosculi, æstate hiantes, alterius Veronicæ vel Anthirini modo. Gravè tota virosumve Rutaceo ingratiorem vibrat odorem: exili pericarpio, Rutæ ferè aut Blattariæ ritu, sed multò minore claudit semè. Rutā istam, Math. reiectæ Alceæ Venetæ, quam foliis & odore viroso refert, suffecimus: odor quippe etiam Meconii quiddam virosum halat, ramulique exiles sunt. Succus verò, quem Meconio æquiparat succo, idem: qui nobiscum suspicatur hanc esse Hippocoum, vires cum succo corniculati papaueris, aut spumæ conferendas interpretatur. Verùm è tam parua designatione iudicium differendum censemus.

*RVT A Pratenfis Herbariarum, num. PHELLANDRIUM Plin.
quod potius SAXIFRAGIA Hircina videtur.*

MVLTO adhuc magis Ruta pratenfis dicta abest: Plinianum hanc Phellandrium dictabant Lutetiani nonnulli nostra memoria, quòd propius Aspium accederet quàm Rutam, cuius nihil nisi odorem virosum sortita est: eodemque argumento ad calculum laudabant, & Saxifragium nuncupabant alii nuperi intempestiui nomèclationum æriscaltores, qui tum demum se opere precium putant fecisse, si ex Plinianis incertis herbarum, elenchis potius, quàm descriptionibus, aliquot selegerint minus auribus, vulgi assueta nomina, & plantis iidem nondum agnitis indiderint, Horatiiq; conuicio locum fecerint, qui pisces appingere syluis vetat. Prati vdis & riguis oritur hæc passim, caulem promit sesquicubitalem, folia quadrantentis Apii palustris, sed minora, rigidiora, nigriora, radix les-

Nam nulli vulgò
pharmaco. Ru-
barbari mona-
chorū à rubore
vocantur.

Ruta pratensis
tenuifolia.

Thalictrum te-
nuifolium Cordi.

teola, fibris multis donata, latèque humi fusis, Asclepiadis modo: flores ex luteo herbacei, pusilli, numerosi: radix pediculis & atomis, circumbusq; interficiendis, in balnea inditur, superiore gracilitate differre tantum videtur, alioquin iisdem natalibus & facultatibus, sed remissionibus prædita est.

GALEGA.

GALEGA foliis est Glycyrrhizæ, vel Lentis Glaucii, cui etiam nomen ab Herbariis factum alludit: duum cubitorum illi caulis, flores albi, purpurascetes, in teretibus, oblongis siliquis semen exile. In Pedemontana planitie, iuxta Eridani fluenta & Taurinum vberim luxuriat, passimque alibi. Satis liquet, non ex delineatione, sed potius ex effectiōne, Rutæ nomen inditum illi, quia vel odor ipse potius Leguminis, cui videtur similior: sed quia venenis efficacissima, uti Ruta, perhibetur, cōsimili vulgò nomenclatura donatur. Veneti namque Pharmacopœi atque etiam Circulatorum illic lex, qui viperas stipis colligendæ causâ circumferunt, simulatque demorsu sunt, nihil certius hac aut præsentius habent; eadē multo magis, freti, quàm illis decantatis Theriacis.

LEGUMINA.

Maiores vulgarior non est eadem antiquorum faba, sed congener.

Faba Minor.

Sylvestris Norbo. an sit Faba antiquiorū.

Phaseoli.

Varietates.

Phaseolus sylvestris.

Smilax horiensis Diosc. siue Phas. vulgaris.

Sesamum.

Frustrum Saracenicū, num sit Erisimū Theop?

Lupini.

Eorundem Varietates.

Maius.

Minus.

Pisum

Spontanæum.

Cordatum & Cor. Indicū, Halicacabū

Peregrinū Offic. an isopyrum Diosc?

Eruilla (syn. siue Ochrum).

Lathyrus, siue Cicercula.

Lathyrus sylvest.

Pseudoapios, Germanorum Terre glandes.

Cicer

Domesticum.

Arietinum.

Sylvestre duplex.

LEGUMINOSA.

Lens.

Crobus, siue Ervum.

Vicia.

Cracca, siue Aracus.

Cracca altera.

Hedysarum utrumque.

Glaux vulgaris.

Capni galinacei Belgarū, an Onobrychis

Diosc?

Ornithopodum.

Ferrum equinum. Ferro Cauallo Italarum.

Scorpioides leguminosa.

Tribulus terrestris.

Ambulus prior Dod. & Herbariorum.

Aplaca.

Ervum.

Glycyrrhiza triplex.

Colutea.

Colutea Scorpioides.

Sena.

Dissolimus albus Officina, an Tra-

guum Diosc?

FABÆ antiquorum & recentiorum.

German. Bohnen. Gallis. Feues. Ang. Beans.

AGNOVIMVS superius triticea cum Leguminosis magis quadā vsus & partium proportionē conuenire, quàm delineationē: nā vt illa spicatur glumis & aristis, sic hæc grauidantur siliquis & vaginulis, utraq; magno vsui tum pecori, tum homini: illa à terendo, hæc à legendo Latini dixerunt, quia non falce uti illa, sed manu vincōe auellēdo legerentur. Græcis verò σπείρα, quasi sativa aut serenda, quoddā sementē multo scēnore pensarēt: sunt enim legumina nō parū fecūdiora triticeis, minoreq; tempore & labore, sed maiore prouētū colūtur: à qua quidē feracitatis facilitate κωμῆς vocarūt, vt Galenus annotat, antiqui ferē cuncta legumina Fabas, quasi prægnantes & feraces, id enim valet verbū κωῆ, quod prægno, vnde κωμῆς, testiculi dicti olim. Speciatim postea indicarūt legumē fama multo omniū notissimū & fami plebeix adeo vulgare subdidit, vt nō secus atq; genēra, aut diuersitates Tritici, sic fabarū

barū delineationem nō tam rudem, quā nullā reliquerint. Cū autē prae Fabā Theop. Diof. & aliorum antiquorum istam vulgarem nostram, vtpote maiorem, pinguioremq; potiorē duxisset posteritas, ea penē cōtempta, hęc nostrās sola nomen Fabz subripuit, retinētq; etiam nūci hodie: Antiquorum enim Fabulz siue Fabellz, pusillz tametsi, veluti pases, Loto & Terebintho comparantur, Taxiq; bacca maior quā faba asseritur apud Dioscoridē, & fortūda iuxta & æqualis asellis subter vrinis delictiscentibus, *xxv* vocatus Galenus: Aristotel. autem pulli decimi incubitus diei oculos maiores Faba facit; tamen non illicd nostrates ē Fabarum censu amouent, vt placet doctissimo & modelissimo Dodonæo: sed id nos docent, eorum Fabam fuisse minorem, quā hodierna, nec tamen specie diuersam, sed congenerem, & potius fructu, magnitudine, figura, quā plantz naturā temperamento, aut lineamentis distare. Nam Theoph. & Plin. Fabam, qualis nostras est, describunt caule recto & vnicō, solamq; inter legumina, vt plurimū, culmo tradunt: & multis locis Dioscorides caulem Fabz quadratū dicit, & florem Fabz Peryclimeni asserit. Sed id euenire, quia variant magnitudine, colore, effigie latiore, compressiore, tereti totunda. Et frequentissima hodie Faba nostra maior, raro vsipiam tamen nisi fata prouenit, serunt quippe in scrobillas paxillo depressas: Quare vt non est difficile nosse istam vulgarem Fabam, maiorem, longiorem, minūsq; rotundam esse, quā antiquorum: Faba vterit, sic eandem Phasiolum Dolicūmē asserere, neutiquā licet pereoidem auctores,

FABA Minor.

Altera, quæ minor est, Italis & Belgio satū frequentissima ad veterina alenda, sed nuspiam vsus frequentior quā in Anglia, vbi panes Fabaceis veterinæ potius quā triticeos dant. Hæc non multum videtur abesse à Græcorum, quā superius expendebamus, Faba: Est enim ea illis adhuc vsitatissima, fresa inibi vocata, ad pulmenta expetitā: Italicæ, Venetijs præsertim, vulgo *Fava merada diu'a*.

Sed syluestris, qualem sæpius in Galloprovincia & in Botoneti Ericetis sterilibusq; non Sylvestris, procul Monspellio enat: in legimus, tota minor est, sesquicubitalis & cubitalis: & culmi quadrati, minus rigidi furculi, communis Fabz folijs, quasi egens adminiculi, & supernè in cirros, capreolōve Pisi desinentibus, flore Vicie obscure purpureo, & filiqua dum maturuit aliqui non discrepat: cohibent autem quaternas Fabas aut quinas, gustu Fabaceo, sed non ita grato, odore grauifculo, magnitudine Orobi, quem Dioscorides Tithymali Paralij seminī comparat. Plinius quasi æqualitatem hanc & parilitatem innuens, Fabę partem tradit: quæ nos adducunt, vt non inuiti credamus hanc præ ceteris delineationem Græcæ explere. Quando etiam hæc non secus atq; antiquorum Fabz sponte prodeunt, in locis Galliz paulo antè dictis, quemadmodū illæ ē Fabarijs insulis, quibus cognomine fuisse ferunt auctores: tametsi malum esse illam Cheritonensem in Mari Euxino, quā in Germania siue Arctico Oceano, vbi terra alsiosa, & minus olim nota Græcis aut Romanis fuit: nec puto in Dania insulsiuē finitimis hæc reperiri, eam tamen volunt esse Cymbricam Cheritonensem siue peninsulam Plin. autoritate. Itaq; illam vulgatissimā Fabam amissam putare, tam parū verisimile est, quā siligine laudatione tritico carere nos, de quo tamen fuerunt controuersiz multæ. Sed nostrates Fabz cū caule quadratū, rectū, surrectū, vnicū, vt plurimū solz leguminum habeant Theoph. & Plin. autoritate, & particulatim floreat, ipsiq; flores nigricantibus lituris (quas lituras lugubres rati Flamines Romani, non mandebant, vt tradit Varro) insigniatur, nō esse *uæquæ* siue fabas nolim assentiri. Ecin ipsius fructus latiore quasi basi, qui cernit nigrum vestigium illud, quod hilum antiqui vocarunt, quali germinis vmbilicellū & inuolucrum, neutiquā vulgares respuet fabas, quibus penē id signi peculiare est. Ipsæ etiam in duas semifles sponte serē & natura diuellantur: & planē tot iisdemq; facultatibus comperiuntur, quas antiqui prodiderunt, tum cibo tum medicamento: nam satus & tetra in somnia excitare, vulgus etiā queritur, & ad vlcera abstergenda, atq; carnem procurandā quiuis chirurgus harum farina vitur. Quamobrem non aliō dissidit à Græca notissima illa nostrates Fabz Germanomū Boong, quā magnitudine & oblongiore teretive figura: quæ cū in plerisque eiusdem speciei & naturæ pomis, nucibus, & seminibus, tum in Cicere satiuo & sylvestri, discrepant, Diof. monente: nam, inquit, à satiuo nihil differre, nisi semine tantum.

PEr pauca extant apud scriptores antiquos de Phaseolo, quem Diosc. ægrè concoqui, in flationes aluum & vomitum ciere tantum dicit: Galenus autem à *φασόλη* Dolichonem discernit, eundemque Cicerculæ aut eiusdem speciei vult: Quod Plinius videtur innuisse, & Maro ubi canit *Sen pinguem viciam feres, valemus Fasellum*: vilis enim meritò dicitur, vt cuius tantum quasi noxij aut parum vtiles meminerunt antiqui, eoque incognitum penè reliquerunt, nisi quantum ex Cicerculæ collatione percipi potest, deq; Galeni sententia, fortè & Plinij verbis, qui Fabæ folia rotunda, Phasiolo autem Pifò & Erui- liz longiora & venosa scribit: quæ accipienda esse de Phaseolo potius quàm de Phasiolo videntur, quia Phasiolo folia sunt rotunda, nec venosa. Et apud Columellam etiã am pusil- lum legumen vileque intelligi videtur: quando Phasoli modi quatuor obruuntur à toti- dem operis: nec enim Phaseolus nisi rara & peregrina in Italia fuit. Eapropter nobis vi- detur sui generis legumen ignobile quoddam, Phaseolus, simile tamen Erui- liz aut Cice- ri, quale est quod pictum damus, in huius operis extremo, Phaseoli facie, sed siliquis Ci- ceris aut Vicie: congruis item Sparto, aut Genistæ, quales Dioscorides annotauit. Sponte hæc in Heluetia exit, folijs ab vno pediculo gracilibus, ordine positis, senis & septenis in caule geniculato, striato, cubitali & sesquicubitali, gracili, lento, flexili. Folia ipsa mini- mè crassa, aut carnosa, sed venulis perquam exiguis secundū longitudinem intexta, mag- nitudine ferè, sed non positu Phaseoli. Floribus purpureis, Phaseoli minoribus, in prolixi oribus clauiculis: è quibus postea siliquæ fuscæ videntur complures, magnitudine & effigie Genistæ aut Cicerculæ: semine intus pullo, Eruium æquante: radice multum fibrosa, nigra, maiore quàm cæteris leguminibus, fortè quia Syluestris est plāta, nam ruri reper- tam nobis dedit optime spei doctissimus amicus Penius Medicus.

Cicerula altera, an Phaseolus Diosc?

ES t & quædam alia, quam nonnulli Phaseolum suspicati sunt, ea etiã in agris, & syl- uis occurrunt, vnde hortus Morgani habuit. Cicerculæ similiter hæc folia, cauleque e- mittit, venosa, tenuisq; auriculis Leporis similia: siliquis Vicie latioribus & longiori- bus, flore purpureo, & quàm Pisi minore: harum vtamuis malunt Phaseolum antiquorum recentiores doctiores, quàm Fabam nostram, vt quæ sit legumen neutiquam contem- nendum, imò tanti faciendum hodie, vt vere & totam ætatem, multis in regionibus mag- num sit annonæ supplementum, & nō parum multæ gentes panes ex Fabis depſant Veteri- nariz, etiãque plebeculæ non incommodos: farina autem, aut ipsa tota fresa Faba pul- tes lapidas, & placentas conficiant, efficiantq; vt de hac nostrate Faba dictum putemus quod antiqui scribunt. Fabæ maximum honorem habitum fuisse, vt qua panis atten- tatus sit.

PHASIOLVS vulgaris Turcicæve multicolor Faba,

est SMILAX hortensis Diosc.

NVLLIVS verò laboris est istud legumen trifolium, folijs hederaceis, Faba tereti, ob- longa, renis effigie, multicolori, esse antiquorū Dolichum Phaseolūve dictum, asseuerare, hanc non perinde triuiale fuisse & longè abesse à Phaseolis certum: tamen si nomenclaturam Phaseolus, quasi minoris fructus à Phaseolo retinuerit, propter quan- dam similitudinem, fortè fructus & foliorum, potius quàm ob magnitudinem: Dolichū autem & Phaseolum effigie siliquarum & fructus, qui Lintrem Lembūve nauiculam exprimūt, vocarunt. Nulquam autem nisi sati peregriniquæ hortis nostris, non secus ac Romanis o- lim, videntur Phaseoli, cuius enata frondes hederaceæ prolixissimis in viticulis deducun- tur ad topiariorum ornamenta, qua de causa vocauit Dioscorides hortensem Smilacē, cui perquam similis esset folijs & vultu, tamen diuersa fructu. Est autem fructus Phaseoli per-

perquam ameno aspectu, plerumque bicolor & tricolor, maculis atris, pullis giluis, rotundis, gurtatis, oblongis, obliquis, circulatim, tæniatim aspersis, nitens: plerumque eborei concolores fabæ totæ, nonnullæquæ flauescunt, interdum atræ prorsum, plurimum reuoli effigiè referunt, vnde notissimæ sunt vbiuia, & apud Italos teneræ integra siliqua in iusculis multum exstantur, multoque magis quam vulgares fabæ expetuntur: tametî parâ lautus cibus nobis esitanti bus fortè non assuetis, videbatur.

Permultas accepimus à naucleris fabas Phasiolôve ex Americæ nouo orbe, & quæ He-speria Aphrica allatas, quæ mixtæ naturæ videntur, sed propinquioris Phasiolo: nam earum quædam exigua, minor multò Phasiolo, ex fusco purpure ascit: quædam latissimâ & candida, compressæ rotunditatis, ambitu fere vnciam æquat, gustu, concretione & Phascoli similitudine; hanc non demptam ex arbore Phasiolifera, vt quidam putant, norunt amici quidam, qui feuerunt, legumenque non ita dissimile Phasiolo habuerunt: Sed alias perquam raras habemus nos, munere lectissimæ, literata virtute & familia in Anglia illustri, Heroinæ Catherinæ Killigree, quas serunt repertas magna copia ad Corquibiz littora, & quod non parum mirum, eo loco nullam meminit vllus nauem illam, nullumvè naufragium factum: & tamen quotannis nouæ inveniuntur, partim fluitantes & partim effodiuntur immerse fabulis littoreis, quasi, vt putant Cornubiensis maris Anglici accola, secundis Austris, aut Zephyris è nouo mundo appulse fuerint.

*Belgarum Bouckwoy, æl. ERTSIMVM
Theophrast?*

ET si in segetum censu ponunt Theophrastus Plinius atque Galenus Erysimum quoddam Sesamo simile & cognatum, cibus aptum; tamen delineatio magis folia leguminosæ testatur. Nulla aurem planta videtur affinium eruditorum sententia, quàm illud frugum genus, quod Belgis Brabantis, Heluetiisque tanta copia feritur, vt isto vniuersa fata, quasi purpurea operta eminus rutilent. Vniuersa planta, præcipue quando maturefcit, purpureasit Amaranthi colore: caulibus bicubitalis, striatus, folia Smilacis minora aut Atriplicis: flore candido: semine glumis contento, triquetris fuscis, quæ molendo exuunt, *Mab. pag. 573* ex Farina, lacte & butyro pinsuntur placent, & sartagine friguntur, pueris expetitur. Belgium, & præsertim Antuerpianus ager, huius est foracissimus. Quòd si oculis vidisset sedulus & perpetuus Hermolai, Ruelli, Leoniceri, cæterorumque doctiorum captor Mathiæolus, veniam potius præcipitis iudicis, & pauce inspectionis, ne dicam lectionis, ab illis doctis exorasset, quàm eorum nomen lacerasset. Vt quorum monumenta multis studiorum anxietatibus comparata, illi quasi offam præmanfam in os inferuerint, amplissimæque segetem (sed immeritè) laudis suggesserint. Intuere eius duo argumenta: Triticum Sarracenicum Tridentinis *Formentano*, tantum caule rubet, non foliis: alterum argumentum, ab omnibus audivissimè depascitur. Respondeo, *Formentone* totum rubrum esse demptis floribus albis: rura Belgica & Gallica id assatim edere, & tuam Dialecticâ hęc captionem moliri, quæ dum ab omnibus auide vorari argutatur, viriditatem, vnde tota vis rationis pendebat, reticuit: nõ enim dicit non edi Theoph; sed virentia folia non edi: misera tamen vtraque argutatio. Rubor inest palmitibus, Titymallis, Atriplicibus aliis, & similibus multis in locis, alibi nullus. Et Basileæ agnum habuimus cicutæ Helleuonem; at alibi passim animantia respuunt: hic in Anglia virentes asparagos veterina non tanguit; post senectutem in maritimis, illis aridis velcuntur.

An Officinæ sum SESAMÏ semen sit Dioscoridis?

SEMI in istud perpetuo nomine & vsu Sesamum fuit, quod satum, vidimus adultum in horto Trevisani Doctoris Patavini, siliquis cylindricis, præsepulis distinctis, semine isto flauescente, oblongo, Sesamino plenis. Caule sesquicubitum crasso, foliis Amygdali, vel Ocyri. Flores, Ruborem, & alia non meminimus, nec putabamus silium fore, qui plantam, hanc Sesamum insiciaretur, si semen semel intueretur istud dictum.

Quare

Quare si ruborem desiderat in Sesamo Senensis, docti in illo pudorem, vt qui vnius plantulæ fortè aride, in solo peregrino adultz animaduersione, de Sesamo aduersus omniū iudicia statuerit, nec quidquam potioris docuerit. Quantum enim seminis istius Sesamini Venetias, Pisas, Genuam, Lucam, Antuerpiam ex Alexandria Candiaque, venum venit, huius plantæ est, quam monitus fortè inuitus depinxit.

SATIVS LUPINVS.

Nec ita procul absunt à Fabaceis & Phaeolis fructus quos *βίαν* vocarunt Græci, quia calidiores cæteris leguminibus essent, aut potius quod *βίαν*, id est, calida aqua lauerentur & macerarentur quò amarorem exuerent tristitem & molestum, à quo etiam *λυπα* *λύπη* & Lupinus dictus, vnde Virgili. *tristisque Lupini sustuleris Calamos*. Quamplurimis in hortis præsertim Pharmacopæorum habetur satius, culmum edens, perinde ac faba, rectum, & suapte natura stantem, sed rotundum, cauum, nonnihil tomentosum, è radice ferè singulari, nec multum fibrosa, à qua fere per totum caulem & ramos alterno situ exerantur in pediculis folia fena & septena diuisura, digitata Viticis, aut Staphidis agris similia, aduersa, virentia, subtus incana, hirsuta: filique Fabaceis minores, latiores quàm Phaeoli: durus fructus, rotundus, compressus, albidus foris, subluteus intus, perquam amarus. Flos ter estate spectandus, nam initio ex imo emicant albi, postea è cauliculis affecta æstate & per Autumnum extunte. Pedemontani præferunt patentes planities satiuo, quos maceratos estat plebecula.

Segetum ST LVESTRE flore purpureo.

FNatis & cultis Gramuntio luco circumiectis non procul Monspellio sæpè occurrit hic, qui illicò intuenti satiuum superius descriptum refert: nisi quia gracilior multò est, caule, pedalis folio quinque partito, angustiore, & flore purpureo & puniceo, Pisi minore: fructu etiam minore, guttatis, aut fortuitis asperso maculis, pulvis, cinereis, & cæsiis. Inibi etiamque in hortis herbariorum visitur hic idem floribus luteis Genistæ, fructu nihilo secius amaro.



PISVM VVLGATIVS Maius.

{ Germa. Erwysfen. Ang. Pease.

{ Belgii. Stockerwitten. Ital. Piso.

E quadam vrbe Pisæ inter Ossam & Olympum montes sita Pisum allatum & dictum volunt: de quo nihil extare apud Dioscoridem non tam mirum sit, quàm certos nos facit, multa eius operi intercidisse, quæ illi notissima fuerunt. Nam nullum legumen notius aut præstantius secundum Fabam Piso est: quod græce etiam *λίανος* dicitur, quasi dicas oui vitellum, quem colore & similitudine exprimunt, ubi per maturitatē flauent viridescuntve, sunt in aliquis cylindraceis ipsa semina, quæ vnà cum membraneis vaginulis, verè & estate iusculenta commendant: harum leges prolixè admodum luxuriat, humi semper caduca, nisi ridicas, pedamentave sit nacta, prælongis, gracilibus, fistulosis exeunt, folia rotunda, oblonga, in duos ferè semicirculos oblongos diuisa: flore effigie papilionis, albicante sui medio purpureo, radice exili, quibusdam Germaniæ locis sponte getmanante.

An Pisum angulosum Hortorum quadratum Plinii?

ALIA multa in semine varietates visuntur Pisi non secus atque Fabarum: nam prægrande quoddam in Belgicæ & Angliæ hortis colitur, angulosà & quadrata corpora-
tura

tura ciceris maiore, mediocrē Fabam aquante, ferrugineo aut ruffo colore: nec tamen gustu distat: sed multum longius in denos, duodenosve pedes porrigitur: videatur hæc angulosa Plinij Pifa.

PISVM minus ex luteo virescens.

Ital. Piselli.

Propter corticem viridantem interioremq; medullam, ouij luteo concolorem, certum est vocatum fuisse *ἄραρον* id est, luteo pallidum, vt est terra Ochra: vnde etiam *λευρό* nomen superius dictum in maiore Pifo manauit: præterea autem commendatio in iurulentis, quia illico tenescit, vtpote minores, pinguiore, delicatiore, facilius elixantur, facilius concoquantur. Seruntur in agris, vbi minore cultu, nec sulcis agent.

PISVM Sylvestre.

IN Heluetia & superiore Germania, non secus ac Phaselus sylvestris, obuiam se dant peregrè eunti, etiam sponte Pifa. Figura nõ absimili, sed radice multo adultiore, fibrosiore, crassiore, & perenni, quales illic collectos, chartis inseruit noster Penius. Quidã in suis vntus paginulæ rariorum stirpium libello, memorandum mirũ, quiddã affirmat: in saxis littoreis, nulla terra operis, tantam tamq; portentolam segetem Pisorum sponte nulloq; fatu enatam in Angliæ Suffolcia, inter Otfordum & Alburnum, etiã Autumno 1553 quantum satis, vtmillibus hominibus suppeteret.

Pisum cordatum, sit ne potius ISOPYRVM, quàm Melanthij quadam species, aut Trifolium palustre?

Quoniam nomenclaturæ Isopyri atq; Phaseoli innuebant hæc plantam esse leguminũ naturæ affinẽ, aut similem saltem, non abs re solertes velligatores trifolium Fabaceum, Phaseoli folium aquaticum, nobis commodiore loco memoratum, autamarunt verum Isopyrũ esse. Quod valdẽ simile vero esset, si vocula Anisi abesset: quæ obstat quò minus hæc aquatica Germanicẽ faba vocata, verẽ designationi satisficiat. Desideratur namq; non tam Phaseoli *ῥαλον* (quod nonnulli etiam folium interpretantur) in hac, quàm Anisi foliũ, quod quibusdam repetitum frustra, aut luxatæ lectioni Dioscoridis additum, opinantur. Qui verò vulgarem lectionem tuentur, quandam Melanthij speciem appingũt, nulla prorsum Phaseoli siue ortus, siue lineamentis similitudine: sed muta pictura, qualis si coniecturæ indulgendum & codici assentiendum, malim cuiusdã amici exercitissimũ amplecti sententiam, quæ Cor Indicum ortu, summitatibus & clauiculis Phaseoli, folijs verò Anisi diuisura, Isopyrum statuit. Suffragãte ipso fructu, quem ternum Melanthij colore & sapore Pisi, aut verè & antiquæ Fabæ siue Phaseoli Sylvestris similitudine & magnitudine Halicacabi, folliculus claudit. Id Cordis aut Pyramidis effigiem media sui parte conspicuam refert, vnde Cor Indicum vulgo passim vocitatum, & notũ. Officinis propter folliculum laud admodum diuersum, nisi colore, ab Halicacabo, Halicacabũ peregrinũ vocatur.

Ochru syl. siue ERVILIA.

Sylvestris indolis velutiq; degeneres à Pisis Ochrisq; Erviliz, quasi eruendæ & eijciendæ dictæ, rarius nisi in hortis Septentrionalũ herbariorum hodie feritur: iuxta tamen sepes, vias, in Linguagotia sponte reptat imbecillioribus viticulis, membranula triplici aut duplici secundum longitudinem veluti pinnaris, ima folia oblongiora & latiora, in clauiculas desinentia ferentibus: supernè verè foliola partim in plura & minora diuiduntur, partim etiam clauiculis donantur cãdidis, & interdũ purpureis, flore & siliqua Cicercule, cui admodum similis;

descriptionem dat paulùm diuersam, nullam tamen facit mentionem; fortè quia iam tum in Dioscoride lectio deprauata erat, vel quia ex alio scriptore verterat. Ad hæc, Galenus & Aegineta, Astragalum paruum fruticem *ἔχοντα τὰς ῥίζας*, astringentes, quasi plures, nec tamen Raphanum memorant. Quare, tanquam non in Dioscoridem, sed ab isto codice male acceptam animaduertamus hanc lectionis deprauationem, quipiam erit nobis audendū. Eapropter nos, ubi *σπέρμην ἔχοντα, ἐξ ἁπλῶς ὀνύχας*, habetur, *βόλαν*; vnius literulæ methatesi, & alterius eaudicella sursum versus reposta, reposti vellemus: qui lubricus lapsus est amanuensis: quum enim Glandulam, Ficam teretē & talum vocarint Romani, Astragalum, non Raphanum, sed potius veram, nec huius nostri fortè disparem effigiem intellexerunt: nec solum talum, Ofsicalum lusorium Astragalum vocarunt Græci, quale referunt hæ radices, sed etiam flagra, nodulis, aut tuberculis asperata. Sic enim *Μέγιστον ἀσπαραγμώδεις*, scutica talosa seu nodosa fontibus exdendis apud Lucianum usurpatur. Hiscæ tamen ineptiusculis scholiis facilius quis obstrepet, quàm meliora subdet: Ceterum candidus arbiter, minima quæque in Priscorum designationibus scit non esse seuerius exegenda: de Apio, quem quidam putarūt cum hac eundem, manifestum sit: Eam siquidem similem dicit Asphodelo, vt idem fecerat Theophrast. cum tamen vnico sit bulbo.

Ernum Sylvestre Herbariorum sitne κατὰ φύσιν, siue amatoria, aut necessaria, non Bulbosa vnguinulosa Dioscorid?

QVAST necessitate inconcussa & fatali adigeret ad amandum, Catananzen vocarunt, quasi amoris illicium necessarium; quia omnia vincit amor improbus. Eam autē neutiquam notam probè nostro xuo, minus mirum est, cum etiam si stirps de facie nota, & apud nos nata foret; tamen incertum adhuc esset, num vera esset censenda; nullis enim viribus, nisi præstigiosis & Fascinatricis insaniz, amatoriis illecebris commendatur, quas Thessalicz tribades & lenæ prætexebant, fortè suis carminibus, vt hodie faciunt impuræ fordæ Italæ, vebulis abusiue nefariis ad insanum amorem conciliandum, quas vires attribuant herbulis vulgatis. Idcirco Pilnius, cuiusq; coxui cordati viri, consulto figuras harum tacerunt. Nec sanè eas nosse, vilius est opetz pretiū: nec Dioscorides vires, sed historiam duntaxat alienam citat. Quodpiam genus leguminis fuisse hanc descriptio ostendit, cui non malè quadrat ea herbuli, quæ in hortis herbariorum Iulio & Augusto, post flosculos Pisi delapsos, siliquas longiores, exiles, teretes fert, semine resectis rufascente. foliis angustis, gramineis, binos pollices longis, Lagopi angustifoli, quæ marcida, recurua inftar milui conuulsi cruris videntur: radice exili, simplici. Visitur etiam in agris litorum maris Septentrionalis.

ALTERAM Ciceris semine, oliuam radice æquante, mali parui magnitudine, quæ vel adumbret, nullam nouimus plantā: rara namque admodum effigie oportet sit hæc: si descriptio vera est. Videtur persuasio hæc, deliri amoris conciliandi etiam nolenti volenti. à feminis pertusis mysterio hausta: quam si fas fuisset, nec nos ineptiæ piguisset, in Phytumate, Leontopodio, & proximo Antythini capite patefecissemus.

CICER satium, arietinum Dioscoridis.

OFFICINARVM Cicer rubrum vbique in Italia, Germania, & Gallia scitur, & adeò noscitur, vt nullus nesciat iam esse antiquorum verum Arietinum, qui modò videat in siliqua tereti, & inftar marsupii tumida, hirsuta, vnciā lōga femina, Piso maiora; caput Arietinum frontata effigie, & angulo aliquantum mucronem æmulante: color albus quibusdam, quæ minus in medicamēta veniunt: alia obsoletè nigricant, plurima ex fulco putrescunt, qualia efficaciora ad medica commoda habent officinæ omnes: seminem & messem faciunt Itali, apud quos esitantur magna copia: folia lætis posita, medio neruulo hærent, tantillū crenata: flores purpurant puniçantes.

CICEROrobaum Theophr. ab Orobo nigro dipe tantum distans.

Ll. ij.

Dif.

DIFICILE tamen sit statuere quodnam sit Dioscori, domesticum primum: nam nouū quod hiedamus, tantopere simile est Norbonensium Orobo, siliqua præsertim, vt certos nos reddat esse illud quod dulcissimū & Eruo similimū à Plinio dicitur: sed ambigimus iā, sit ne idem illud cum Diosc. satiuo: cui eundem fecit Orobu vulgatum & receptū officinis doctus & perbonus scriptor Dodonæus, qui nondum, hanc nouisset. Norbonē & Galloprovinciæ plebisque satis per menses flauet hæc, culmo assurgens sesquipedali, geniculato lateratim, quasi in obliquo flexo, leuiter striato, fistuloso: foliis in imo neruulo prolixo hærentibus, Lentis aut Araci: à medio itē ramulis donatur & foliatis pediculis: & iuxta summos alarū geniculos complures cōfert siliquæ, vno fere exortu nixæ, sese tangūt & stipant, cylindricæ, viciam longæ, rectæ, teretes, inter transversa pusilla interualla asoras protuberantibus singulis quasi torulis, ternis & quaternis, articulatim distinctis: ipsa intus semina nulla membranula distincta, Pisum Arietinum semine quant, obtuse triangula: Orobi duplo maiora, colore albida, pallida & subfula, non ingrati saporis, Ciceris aut Pisi.



O R O B V S receptus Herbarior.

RO B V S, color rubeus antiquis fuit, qualis in russiis bobus, & Orobis cernitur. Hodie nihil penè ab illo dudum dicto disidet receptus in Officinis Italicis & Norbonensib. Orobus semine & siliqua præsertim, nisi quia huius altero tātò minor est, cōpressior, nec vno loco, sed variis ex alarum geniculis, secundum summū & imum caulis exorta, pendula, alioqui terna & quaterna claudit semina Ciceris minora multò, tangenti hebetius angulosa, & vno latere aliquantum acutiora, gustu lentis, folio & facie Pisi Lentis aut viciæ: ramosis sparsis luxuriantibus, caducis fere ramulis: minus tamen est plantula, hic quam superiores duo, minūque ingratus gustanti: nec enim nostro ingenio conuenit, stirpium vel figuras, vel qualitates plumbea Lesbiae norma ad nostrā sententiam exigere, aut flectere, vt nimis multi fident: sanè par est alterutrum horum leguminum, verum esse Orobum, cum è tam multis nihil penitus similis occurrat, oritur hic assatim in glareosis.

CICER SYLVESTRE VERIVS.

VIRVI hac ætate in horto Morgani quoddam Cicer parū adhuc notū è Sabaudorum & Heluetiorum finibus huc accersitum, facie & siliqua Arietini Ciceris, quod eousque præfert, vt primo intuitu quilibet Cicer dicat: Siliqua quippe brevis, foliosa, compressior paulò: flores item purpurantes, non absimiles, sed semina multò minora, compressa & potius Lathyridis Cicerulæ: habitu tamen lætior tota, latiusque plures ramosos alis & firmiores spargit culmos, cubitales & sesquicubitales: folia edentes Loti sylvestris semine æqualia, Ciceris Arietini maiora, crassiora, rotundiora, & tantillūm etiam crenata: Radice quotannis rediuiua. Quare non ab re quis conieceret istud Diosc. Sylvestre esse.

CICER Sylvestre herbariorum aliud folliculis Coluteæ.

LONGIVS adhuc videtur recedere à Dioscoridis sylvestri istud, quod caducis ramulis serpebat superiore anno in eodē hortulo, flexilibus gracilibus ramulis, proprius Securidacæ minorem aut Lentem, quam Cicer designantibus: & quidem floribus luteis pallentibus Lycopodium, cui folliculis penè par est, sed Coluteæ figura & Arietini Ciceris ritu vnà plures collecti, hirsuti, atri, repleti perpusillo semine Sesamineo, aut Genistellæ, duro, compresso, nitido, gustu Phaseoli. Mathioli, huius suam picturam mentionemque

tionemq; ridicule inculcat in Indice, quod tamen non describit, quasi super eò nihil am-
bigendum esse nobis imperasset, vt alibi passim facit.

Φάνος LENS.

Gal. Lentille.
Ger. & Belg. Linzen.

NVLVM minus ambiguz notitiæ legumen quàm Lens, quam quòd lenes æquan-
mellæque vscentes efficeret, Plinio auctore, sic dicebatur *φάνος* autem Græcis ab
vire qui fuit *φανος* metathesi & mutatione vnus elemēti. Facile de siliquula & granulo ro-
tundo, æquabili circinatione compresso, lagenulam effigiente, quilibet eam noscit. Ca-
lidiore solo, & sudo, sic còq; cælo præferi gaudet, vbi latior, lautiorque quolibet legumine
habetur. Ei Ciceris syluestris siliquula compressior breuior, penè quadrata: vbi due vt plu-
rimum lenes insunt, sæpe Fusæ & interdum albæ nigricantes. Foliola qualia hærent su-
perne in Piso: segete humi fusæ & reptrice.

Βίσιον VICIA.

Ger. Wicken.
Bel. Witsen.
Gal. Vesce.

A Vinciendo ducit Vatro: malim tamen *βίσιον* esse, nempe lagenulæ effigie semē, quod
etiam *ἀγανος* Attici vocabant. Nulla autem regio algidior calidiorue Vicia satua &
Syluestri vacat. Seritur enim in subsidium Auenæ ad iumentorum pabulum. Siliquæ sunt
Genistæ: semina compressa Lentis, nigra, quina aut sena, præstè totunda, ingrata gustu, nò
dissimili Lentis aspectu, sed habitior tota: folijs maioribus Pisi Minoris aut Ciceris.

ΑΡΑΚΥΣ, siue Aracca & Cracca maior. Vicia syl.

Ger. Wild Wicken.
Belg. Erck.

Aedz quasi pestes perniciosq; leguminosæ frugis dicunt vnde *ἀράχοι* & Craccæ, vecijs in
satis associatur, & valde assimulantur: siquidem iu vna quasi *εραχη* siue spinula aut dor-
sulo insūt veluti plumatim in alæ modum foliola perquam exigua è viticulis, multò quàm
Viciæ aut Lentis exilioribus, iuxtaq; alas Viciæ ritu & similitudine, flores purpura diluti-
us rubent. Siliquulæ longiusculæ Cataneæ propior est, vbi sena aut septena semina rotun-
da nigricant, penè Raphani: non autem compressa vt Viciæ & Aphacæ, qua quilibet eam
discernere valeat.

ΑΡΑΧΥΣ siue Cracca minima.

Nimisquàm exilis & penè capillacea hæc tum viticulis, tum foliolis ipsdem, dispo-
sitis Lētus modo, sed delicatioribus & angustioribus multò: perpussillæ siliquulæ
pediculo, non caule ipso vt superior subnixa & quaternis intus granulis nigricantibus, ro-
tundis Rapi aut Brassicæ inclusis, florum apiculis pallidulis.

ΗΕΔΙΣΑΡΥΜ, siue SECVRIDACA maior & minor.

Ancipitis Securiculæ emulo semini fertur accepta *πυλαίηγο* siue Securidaca vox quam
etiam *ἀδύραγον* ob sua uolentiam vocarunt. Ea in aruis & segetibus quas rapidi tor-
rentes ex Alpibus Taurinis præcipiti al luvione, plerumque vastant, & ad Ceuacium via,
satis multa oritur, leguminisq; modo serpit & fertilitate restibili sese reparat, foliolis Len-
tis vel Altragali maioribus, procurtētibus viticulis & floribus Ciceris purpureis: siliquæ
hæret, humi item stratz, compressæ rostellis aduncis, quatz Fœnugræci seminis & simili-
tudine, sed còpressiores vtrinq;: & angulosā aciem Securis effigiente radice leguminosa
fibrosâ, sapor amaricans & Lupini ferme odor fœnugræci vel Meliloti, cuius commendat-
ione Myropolę nomen dedisse Hedisari videntur. Vtebantur fortè tunc non secus
L. iij. atq;

atq; veneti suffitores, quâq; Melioli ad Chyrotechas aliâq; fragrantia grata imbuêda, multum vtuntur.

Securidaca minor.

ASTRAGALUS
Monipet.

Legumen illud multo minoribus ritaliculis, folijs & floribus purpureis exiens, è peciolis quina & sena cornicula introuersus falcata habens, mucronibus reflexis infernè cò iuncta, & duplici intus serie digestû semen, subrotundum, subfuluû, est similis Gallegg vel Araci quàm Securdacæ. Idcirco præceptores nostri Môspellienses huius speciem esse inficiabantur: Inibi quippe & cæteris Norbonæ Ffontignanæq; aridis, glareosis, maritimis totû viret annum radicèq; complures profundè mersas, prolixo implexu spargit, gustu leguminoso, nec perinde vt Securidaca, amaro. Eapropter Astragalo propiorem altruebant, quò nos etiam referendam duxissemus, nisi Raphani bene magni radix illi & astristoris, cætereq; facultates ad vlcera desissent. Quare vniuersas stirpium gentilitates animo volenti, nulla quæ explendæ descriptioni satis sit, vsipiam sese dat. Non ea, quam in collibus Lugdunensibus prope Trenon, & in horto Patuino floribus purpureis & folijs similibus ciceri, sed gracilioribus, vidimus. Radix certè dissuadet, nam Senensi herbariorum Dictatori, licuit pictoris opera ad quiduis lubitum fuit, alludere & nobis illudere, idèò nunc illum illius picturæ postremò puduit.

GLAVX vulgaris.

De colore foliorum, quæ aduersa spectarentur glauca sine pallentia, χαλκæ dicit Diosc. nomen huic ascitum fuit. Fruticat autem ramulis, bicubitalibus vimineis, flexis, sparsis, stratis, rotundis, gracilibus, lignosis, bina crebrâq; foliorû serie, à radice crassioribus & duris, & intortis propaginibus præcurrente, quasi Arthemisiæ: cernuntur folia cæcio virore supernè, auersa verò pallore glauco, Cythis maiora multò, Fabæ, situ & crassitie propiora: purpurascunt flores extremis ramulis Galegæ. Siliquis tamè multo maioribus, crassioribus, quæ per menses maturæ dehiscunt in binas vaginulas semine plenas, colore, sapore & odore leguminoso, cuiusmodi tota planta: quæ tamen proceritate speciosior multòq; maior est, quàm vt Glaux prodita videatur: multa in Belgio. Ex Angliæ nos litoreis, item mediterraneis procul mari, Londini Serendam curauimus.

GLAVCA vel Glaux, quadam leguminea herbariorum floribus purpureis.

Iuxta agrorum viarûmq; margines obuiam sese dat in Francia, Anglia, & Belgio hæc, caule rotundo pedali, radici exili, singulari uitente, à qua statim folia, erumpût Ocyroidis aut halimi, albida, Glauca, oblonga: è medio autem caule aliquam multa exeunt minora & minutim Lentis modo aut Vicie diuisa. In summo caule pallido, conspicui flauent aut puniceæ flores, congesti in glomerulû, ex calyculis multis conflatum, obsidentibus squamosis folliculis, acetosisq; veluti glutinis, vbi semen. Tota plâta læto aspectu.

Caput Gallinaceum Belgarum, an Onobrychis Diosc?

Quasi fursum vnâ cum scaturiginibus erumperet àνδ̃ ξέφυγον ονοβρυχis dicta, circa namque fontes oritur. Non labor, non herbarum desuere complures, quæ se nobis obtuderent, quasi legitime forent: quas tamen omnes respuimus, propter vnâ aut alteram quæ propius Diosc. descriptionè, tametsi valde ieiunâ & parum signatâ, accedere visæ sunt. Harum notior Galega riparum & viginosi foli alumna, nò perperam putaretur, ni folia multo maiora essent, lentis, procriorèsq; caules, quæ excessum, (nam tota facies leguminosa, flos & vires perbellè suffragantur) si quis obijciat, similia collata in Cappare cû malo Cytonio, & cætera componat. Et interim, dum ille nosq; melius quid vestigamus, hanc iam describendam habeat, vt rariore ita minorem & multo figuræ propiorem: quam in hortis Belgicis colunt herbarij, è radice parua fibrosa, cauliculis pedales, exiles habet, & folia lentis angustiora, aliquantò longiora, sine capreolis: in cymis, teneris, Galegæ flosculos, purpureos, dilatos, albedine mixta gestant. Quibus per ætatem marcescentibus, quibus

quibus siliquulam pro semine, casside, cristata insignitam, spinulis muricatum, quadante-
nus Tribuli terrestris, ostentat. Eruditus Coldenbergius nos semine primus doctavit, atq;
in Hollandiæ & Zelandiæ aggeribus & litoreis aduersum maris alluiones & procursus
erectis repagulis, nasci sponte monuit. Monspellij in hortis enatam habuimus.

ORNITOPODIUM, sive Pes avis.

Scitam vocem aptarunt isti legumini Docti recentio-
res, ad huius herbulæ siliquas, pedem avis effigiantes
describendum: constant quippe vni pediculo nixæ, qua
ternæ aut quinq; expansæ mucronatæ, quasi stillis adun-
cis, articulatis, curuatis, in pedis avis æmulatione: pal-
mares & sesquipalmares sūt viticuli, sparsi hinc foliolis
Araci minoris: flosculi melini Coronatæ Meliloti.

Varietas.

Quam elegans hæc varietas quam pictam damus: O-
ritur in marginosis herbidis Grinwicij Regiæ, ad Tame-
sim flumē, nō procul Lōdino: vix tota binos aut ternos
superat pollices: ramulis in terram sparsis, exilioribus &
crebrioribus, venustius ordine positis quàm superior
quæ non alijs ab ista natalibus gaudet.

Perpusillum Ornithopodium.



S FERRO Caulis, Ferrum Equinum.

Planta etiam leguminosæ familiæ est hæc, cuius siliqua multū mirationis excitauit istis
nomenclatoribus, qui *Sferro Caulis*, id est soleam equorum refringentem fabulati sūt.
Nam nobis experienti auidis, magna copia reperta propè Massileam, frustra sæpius fa-
ctum fuit periculum: etiam via quæ ad prædium Rondelletij mareq; ducit, ad dexteram,
propè rusculum in squallidis dumetis & marginibus plurima gliscebant, æstate minus tor-
rida. Siliqua affabrè plantam hanc à tribulo terrestri, Scorpionide leguminosa, & Ornito-
podio, quibus alioquin foliolis albidis, & comptis similis est, discernit. Flores item pusilli,
lutei: intrò nonnihil compressæ siliquæ, veluti securiculatæ, vndosa & semicirculis sinua-
ta acie, ternis aut quaternis equinæ soleæ vestigijs continua & distincta spectantur, semi-
nullis soleam, equinam effigiantibus, aut dimidiatam lunam, vnde illi quidam nomen Lu-
naræ affinxerunt: gustu leguminosa, radice Londini hortis viuaci.

SCORPIOIDES leguminosa.

ES & alia nec minus venusta aut rara, segetū Nor-
bonfium alumna: Radice nittitur fibrillis multis,
cauliculos rectos, graciles, binos aut ternos, pedales &
sesquipalmares erigente: quorum in summo, admodū
incuruis mucronibus adunca cornicula, Fœnugræci
rotundiora, graciliora insunt, introflexas Scorpionum
caudicellas, transuerfis articulis & argutulis iris imi-
tata. Flosculi pusilli lutei, alterius Scorpioidis: Foliola
Ornithopodij, aut Tribuli exiliora, ab imo statim ces-
pite, in neruulis vtrinq; ordine sita.



TRIBVLVS terrestris.

Ll. iiii.

Soliti

Soliti erāt projicere hosti murices infestis aculeis armatos: quos quia protereretur reuſa
 λαγς nominabant: vnde huic ſiliquæ plantæq; muricatæ Tribuli nomen. Videas pra-
 tentes pulverulentas & ſabuloſas planities maritimas Adriatici, Thyreni & Gallici Medi
 terranei, iſto terreſtri & minori Tribulo itineranti, exutis præſertim calceis, inſeſtas & pro
 pemodum inperuias. Môſpelij etiam aridis & oliuetis ſerpit, aſpectu liguminoſo Ciceris,
 ramulis compluribus exilibus, gemino foliorum verſu reſertis, nô Portulacæ, ſed Lentis
 vel Araci: eoque labeculam in Adrachne ſuſpicamur, & legere Arachi *ἐλαφία* aptius rei ve
 ritati ducimus, id eſt Vicie, vt indicio ipſamet eſt plâta. Puſillos ſiſculos luteolos, in pe-
 diculis ex alis exeuntibus, vbi emergunt inſeſtis aculeis rigiduſculis, ſexanguli, quin-
 quamguliue murices, medullam & ſemen oſtêtantes, per maturitatem & ætatem dehiſ-
 centes, radice parua, fibroſa nec altè depaſta, nullius hodie ſermè commodi, niſi Aſinis,
 quibus pabulum illic eſt. Commentatoris Senenſis ſolitam ſedulitatem duo teſtâtur Tri-
 buli: alter qui iam nobis diſtus. Hunc Doſt. à Guino Piſano dono acceptû quali in Italia
 præſertim Venetijs, rarum foret, dicit: alterum Dioſcoridis folijs portulacæ ſibi in D.
 Nicolai ædis Veneto littore viſum, quam eius ſanè non vulgarem cognitionem & in ſtir-
 piû inquisitione operam poſitam, quidam peritus locorum illorum & herbarû Italus ſa-
 cetus ſic nobis exponebat: Commentatorem inquiring nonnam niſi aridum aut pictum
 vidiffe vulgatiſſimum Tribulum, eoq; deſcribere neſciuiſſe: deinde Crithmum ſeu portu-
 lacam marinam illic frequentem, pro Tribulo Portulacæ folijs accepſiſſe: non tamè deſcri-
 bere auſum: forſan quia nullus ex tabat author aquo deſcripti onem ſubriperet. Poſtremû
 eſſe in Lio Venetæ inſulæ ſabuletis, cuius Pharmacopœorum notiſſimum tertium eſtrem,
 eoq; minimè Piſis accerſendum.

ASTRAGALI perſimilis palmaris puſilla planta.

DVm peregre eſſemus in collibus quibuſdam Gallo-
 provincie, hanc ſublegimus elegantia nentiquam
 ſpectatu indignam: radicibus namque prorept ligno-
 ſis, implexis, corticoſis, denſo exortu, numeroſos cauli-
 culos, fruticâtes, duſos, ſed breues, vix binas aut ternas
 vncias excedentes, & foliola emittentes puſilla Lentis,
 Aſtragali, aut potius Tragacanthæ, quam tota reſert
 rigiduſcula, incana hirtutic: ſiſculis, luteolis, aut albi-
 dis, Ornithopodij: guſtu præſecco & æquè duro.



*PIOLYGONIVM Herniaria folijs & facie, per ampla
 radice Aſtragali.*

N^Ec hæc deſpectui futura erit diſcendi cupidis: Eſt e-
 nim perquam parum nota, per puſilla quidè her-
 bula, & humi accumbens ceſpiti ſemimerſa, ramulis cre-
 berrimè geniculatis: foliolis & feminulis albidis, prorſum
 Herniariz: tota incana, quàmæ xiguo, muſcoſo flore. Ra-
 dice ampliore quàm pro plantæ modo, dura, ſurculoſa, im-
 plexa, & in ſe reticulatim conuoluta, auulſu difficilis: gu-
 ſtu præſecco, calliduſcula. In ſuſſiſſima Crete ſalonenſis
 Galloprovinciæ planitie, media via inter Aralatè & Solo-
 nam ad diuerſorium D. Martini.



HELIANTHES species rara, figura leguminosa, floribus aureis.

NON perinde formosam iconem hanc, atque naua facie dono misit nobis hanc noster industrius & peritus Pharmacopœus Iacobus Raynauder, quam è iugis arduis montis D. Bonauenturę, non procul Aquisextis eruerat: Radice lignosę fruticulę, ceruicent paulum inflexam habente, supernę & infernę nodosam, e qua emergunt viticuli palmares iuncea, recti, flexiles albi, foliolis Lentis aut Coluteę Scorpionis ex glauco virentibus, ab imo summo tenus stipati: floribus aureis & calyculis Helianthes vulgaris: semine item non dispari, pusillo Cisti Ledi, amaro gustu.



GLYCYRRHIZA Echinata & filiquosa.

SI qua est sterilis Glycyrrhiza, vt Math. sibi re vera certũ esse auditione postremis cõmentariis prodit, tres forent Glycyrrhizzę species, nobis tamę quot de facie notę, tot frugiferę sunt. Ac primum Dios. dulcis radix nota & culta variis locis, etiã horridioribus, vt Germaniæ & Belgię, fructũ fert vaginulis muricatis Caucalidis emulis, denis aut quindenis, vno imo apice hærentibus, & in orbẽ sese explicantibus, eminus intuẽti quadantenus Platani Echinum ementientib. proceritate interdũ assequitur, quanta proceri est hominis. Radix, nõ vt alterius numerosa passim & fusę humi sparsa, sed recta, altę depacta, adeo vt quãdã humo mergitur radix, tantũ solo extent caules: singulis vaginulis vnũ dũtaxat semẽ rufum lentis effigie inest. Huius vsus officinis rarior hodie; quippe, seu arida seu recens, vt nos, periculũ sepe fecimus, lõge vulgata dulcedine & gratia vincitur, eoq; tantũ voluptatis causa colitur.

Communis verò nulli nõ nota, quę ex Hispaniis Londinum, Antuerpiam & Lugdunum defertur, & vili vbique locorũ distrahitur, non paucis Gallię No: bonensis locis multũ spontere oritur, etiam prope Latera oppidũ, cuius meminit Plinius, Mõspellio leuca. i. dissitum: radicibus, flexilibus, multis implexis, caule & foliis pinguibus, & dum eam euelleremus manũ glutine insipientibus, floribus purpureis albicantibus; mense Iunio & Iulio filiquas fert paruas Cicerculę magnitudine. Cuius radix nuper ex Hispaniis aduecta & hortis Pharmacopœorum depacta, facillẽ succrescit & reuiuiscit.

COLUTEÆ Scorpionis.

SOLERTIS ingenii præceptor Ron-delletius nõ raro ratus fuit Glycyrrhizam minorem nuncupandam esse plantam locis multis nemorosis inter buxos erumpentem, Iunio & Iulio: floribus Coluteę, vel genistę, minoribus: folio itidem Coluteę paulo minore: caulis similis est, gracilior: radix buxæ minus dulcis, aut potius dulci amara dicenda, & minus grata: siliquę Math. Scorpionis vsqueq; similes, vnde vocatur nonnullis Colutea Scorpionis. Norbonę copiosa in valena sylua & prope fluminis crepidines cis Lanum.



VAL.

Glycyrrhiza spiciosa Antiochena.

VALERANDVS Domrez Pharnacopœus Lugdunenſis plantarum rariorum vt quis alius ſtudioſus & peritus, cui certò ſidimus, ſiliquas paruas geniſtæ, aut acatiæ, ſed minores, ſecundæ nobis dedit, ſemine exiguo Geniſtæ: hanc Antiochenam à loco, Glycyrrhizam à ſimilitudine & ſpinis, quibus donata erat, faciebat. Sed nihil niſi ſiliquas vidimus, eoque nihil dum aſſerimus.

Arabum & Aethiopiæ SEN Aſiatia & ſylveſt.

SENO & magno ægrotantium incommodo innotuit Græcis Sena, quam vnà & appellationem Arabibus debemus: Albaſemer vocant illi, vnde detortum Sena. Hæc autem hodie nullum purgans frequentius, tutius, aut præſtantius eſt. Ea herba, æſtiva & parua eſt, vultu, leguminoſo Securidacæ, Glycyrrhizæ, aut Coluteæ: In Liguriæ, Thuſciæ, Romani agri & Appulijs varijs locis, legitur Autumno, nec ſeritur ante Maium, quia frigoris impatiens: eoque hortis Septentrionum vix trimembre viuunt, nec promittit, nec maturat flores vel ſiliquas. Quare Officinæ potius è fundo vernaculo, nempe Orientis emporijs, petunt, plurimique faciunt, quam uſam aut Italicam: duas enim foliorum differentias, aut varietates habent inſtitores è diuerſis plantis Senæ: probatius ſolum & laudatius ad purgationes (ſinum vocant) eſt oblongius, acutius, Myrthi maioris effigie: alterum rotundius, breuius, quod vilius habetur: quare non ſecus atque Myrthus maior & minor, folijs videntur hæc duo inter ſe diſtare, vt præſtantius ſolum ſit Domeſticæ, alterum ſylueſtris Senæ: duas itidem Meſuez agnoſcit: & ad perſuadendum alterutram earum eſſe ſylueſtrem, multum ſpirilli pilulæ ſtercoris caprini aut ouini faciunt, quæ frequens inter Senæ Orientalis, folia, folliculos & quiſquilias paſſim apud nos allata reperiuntur, ubi empturis proſtant, ſeritur namque & adoleſcit probatior in ſinetu ouilio inibi: alioquin vtrique ſiliqua eſt effigie Coluteæ, compreſſa, vt Arboris Iudæ, ſed ſcalculæ in modum conuexa, ſuſca aliquot ſerie digeſta ſemina, Gygartis ſimilima, compreſſiora, claudens. Flores ex pallido lutei ſunt, rubellis veſtigijs venoſi: graciles caules Meliloti, pedem & ſequipedem alti: ingratuſcula tota guſtauti, tantillum amara, calida & ſicca: tamenſi veluti ſenugrecæ aſſiua, muccagiноſum reddunt mandendo (putuma: folia, quibus ad purgandum conſultius ſemper, quæ ſtatum diſcutient & nonnihil lubricent, adduntur, quam ſi per ſe, puluere inſuſo aut decocto, dentur: Sic enim turbaram multum cœre, & inteſtina, ſtomachumque torquere, vel plebecula conqueritur. Eapropter qui aduerſum Meſuem tuetur non eſſe corrigenda, imò ſiccitate ſua atque quadam altitudine vetriculum iuuare, neſcit quid commentetur: nã ſic Braſſicæ marine, Thymelæ & Chamæleæ ſiccitas, ſtomachum iuuaret, quem tamen lædunt illo viroſo odore, & purgatrice qualitate, à qua non longè abſunt ſolia Senæ, vt dum virent adhuc, aut macerantur, odorantur. Proinde ritè Meſuez folliculos tutius purgare monet: nèpe membræni ſunt, miniuſque ſtatulæ ſemina, quam folia: ſed hæc plus mouent, præſertim inſuſa, quam decocta: quia ebulliendò nonnihil virium abſumitur & ſtatus diſſipatur: vt uſus ipſe caſtigare valeat illum Commẽtatore, qui nihil addendum ad eius noxam corrigendam autumat. Sed hæc explicatius in remedijs.

COLUTEA Galliæ, Baguenaudrier.

PUTATVR Colutea dicta, quod mutilari effraſtione eius ſtipites aut virgulta (non præciſa) intereant, vt Theoph. autor. Tanta autè ineſt foliorum & ſiliquarum paritas Coluteæ cum Sena, vt plerique non inruditi Senam ſylueſtrem hanc eſſe vulgò perſuaſerint: at Colutea cum Theophrasto arboreſcat, nobis autem fruteſca, Rhamno penè par, nec herba vt Sena ſit, iam quilibet poteſt à Sena eam diſcernere & diſcere: quippe folia colore, ſit, magnitudine, & ſuperficie Senæ, Hedifari, aut ſuperioris Coluteæ Scorpioidis, paulò antè dictæ ſunt, floribus item luteis, nec diſparibus: Folliculi veluti membræne veſicula, teretes: quæ ſtatu turgent, & tactæ, ſtrepitum edendo crepant: ſemine intus hærente Lætis (non Gygarti) minore guſtu, leguminoſo. Auguſto ſiliquam maturat, ubi ſpontaneus arbuſtus eſt, in Linguagotiz iſdem ſaxoſis ſterilibus ad Frontignanam, quibus Chamæzindem otiri monēbamur: ſed ea etiam vulgatio hortis Galliæ, Germaniæ, Italiæ, & Angliæ: nuſpiam tamen arbor magna futura: eapropter apud Theophrastum ſatius legeretur, *ἀλδρεν μέγα μύλας* non *ἐν γένει*, nempe arbor non ita magna, ſive arbuſcula: quod ex conſequentione paulò

paulò pòst inferunt verba Theophrasti: $\alpha\chi\iota\sigma\tau\alpha\iota\ \kappa\alpha\iota\ \alpha\pi\theta\acute{\alpha}\nu\epsilon\sigma\tau\alpha\iota$ id est, finditur, siue diuarietur in ramos, et aborescit: non igitur initio arborem esse, sed aborescere dicit, qui ortus & adolescentia planè conuenit nostrari Colutææ.

*Spartium, Genista scoparia vulgi.
Genistella infectoria, an Lutea Pl?*
Hippospartium, vulgo Rapum Genista
Spartium Dioscorideum Hispanicum
Spartium minus, vulgo Elpho Hispanica
Genistella Graminea montana,

Spartium fruticosum apophylon, iuncis aculeis lanatè
Genistella aculeata.
Genista Spartium spinosum manu
Acacia secunda.
Acacia Egyptia.
Fraxinella siue Dictamnus albus Offici: an Tra-
gium Diosc. facie & solis Lenticis?

SPARTIVM. Genista scoparia vulgi.

VULGATISSIMÆ notitiæ & vtilitatis Spartium vbiuis gentium fèrnè antiquis Gall. Genest. semper fuit, vt etiamnum est. Sic vocatum, quia vinctiundo, nectendo, adeoque tex- Ang. Braume. endo, fili, lorivæ vices explet: sonat enim Spartium fuhiculum vel loruluin: Genistam Bel. Brome & indidem à genui flexilitate deducunt nònulli, quæ duntaxat species Sparti dici potest. Bitem, Est autem hæc omnium notissima tum apud Græcos tum Meridionales, sterilibus præsertim, arenosis, montosis, frigidioribus, Vargis fruticat densè pullulâtibus, hominis proceritate interdù superantibus, rectis, gracilibus striatis, duris, sed flexilibus per intervalla foliola numerosa promès, Hyperici, nigriora, minora, abundeq; luteorum florum suauè olentium Pisi, post quos falcata effigie, siliquas Iunio & Iulio maturat, seminis atrii lucidi plenas, Lenticulæ similes, quo vomitum, non secus ac Spartio Dioscoridis, sæpius duarum viciarum decocto propinato, citra magnam contentionem motiuus. Verùm flores recens decerptos sæpius quàm plurimos, & per se acetariis inditos vorat Plebecula Auerniæ & Aquitaniz, maxima copia, innocuos non modò, sed etiam admodum gustu suas: nequicquam vomitionis nauææve vilius aut còmotionis mouere solitos. Quin apud Brabantios gèmantès condiuntur sale & aceto flores, mensilique inferuntur, capparium olearumve pari commendatione: credâtur etenim non modò cordi vires, stomacho appetitum alere, sed etiam obstructions referare, calculum frangere. Id circo falluntur, falluntq; qui hosce flores vomitioni mouendæ officinis siccandos præciipiunt, rati istam genistam, esse Dioscoridis Ellebori subpar deiectionum Spartium. Quantumvis enim seminis incoheris, vix aliufmodi vomitionem moueris, quàm quæ com. unibus emeticis Raphano, sicu vel oleo ciuntur: nec enim deiectione insigni, sed tantum leuiore conatu excludant, qui hauserunt.

Vulgi GENISTELLA infectoria, an Lutea Pl?

VEgeto & perquam hilari florum luteo, micantium thyrsulis crebribus editiora prata Ang. Dicweed. ornata copiosissima hæc, instar Lini segetis æstiuæ: nec vsprim frequentior quàm Taurinis, Pedemontanis, & Angliæ occiduz. Virgultis rectis, pedaliibus & sesquipedalibus densè fruticat Lynaria folio, & flore concolori, sed Genistæ similiore, minore siliqua & semine, amaricante gustu tota: Lanarum infectoribus expetita, sed vt proceritate, sic virium efficacia Sparti superatur. Ger. Gerden smuct.

Herbariorum RAPVM Genista, siue Hippospartium, $\alpha\pi\theta\lambda\alpha\upsilon$, floribus gal:atis Tragorchulis.

Radicibus Genistæ & Genistellæ adnascitur quasi soboles spurtia, sed specie visenda & raritate, excrementum Rapum Genistæ vocatù, non ab simile ortu, concretu, incremento, caule, & effigie Hypochistidi vel Orobanche. Quod magnis votis & peregrinationibus Chymistæ Maio mense venantur ad vtriusq; Genistæ radices, subiectos teneriores asparagos, cum radicibus siue appendicibus à Genista auellendis alembico indut. Inde q; igne oleum eliciūt ad calculosos perquam celebre. Id auulsimus in Flädrig, Gallie, & Angliæ locis maiore Genista scatentibus, alioqui frustra quæsitū & diu alibi. At Sabaudiz &c

& Pedemontanis colles, paruz Genistæ feracissimi, etiam istud copiosum fundunt.

*SPARTIVM Dioscorideum, Hispanicum & Norbonense,
viminum modum.*

E iam adductis moxq; adducendis Spartio congeneribus plantis, nulla propius explet Dioscoridei notationem, paucifolio frutice, siliqua & semine, quam illa. Quæ Hispanijs & Norbonensibus, præsertim maritimis, vel nõ procul à litoribus, vt in Grammuntia Sylua MonsPELLIJ, & vicinis collibus, passim obuia fir. Etiam Taurino finitimis, & in Prouincia nobis vsam monuimus. Stipire eadem maiore & lignosiore adolefcit in Angliæ, Belgiz, & Galliz hortis, ramorum propagine arborefcens, virgas multas fundentes, rectas, glabras, iuceas, nec striatas, vt Genistæ, sed vimineas, flexiles, & sequaces: quibus foliola insunt adeò exilia, vt iam marcidia facta in suis natalitijs æstuosis, nulla prorsum extitisse videntur, maxima anni vertentis parte: Quod illic obseruauimus vsu venire *Sfero Canallo* dictæ folijs, & ei nouæ plantæ, quam Iuncum asperorum eliuorum vocat illic *Aphyllon Scola MòPELLIACA*. Quò factum, vt Dioscoridi tantilla res aut non fuerit curæ, aut non animaduersa. Siliqua, semè, & flores, prorsum sunt Genistæ, sed maiora, & efficaciora: cuius modi vult Dioscorides & Mesuz, qui à dnabus ad 5. drach. florù, dandas vomituris imperat: seminis verò, à duabus ad quatuor. Quum ramè Genistæ vulgaris flores plenos discos multi in acerarijs ex multo oleo vorent, nec quicquam nause er: & seminis tripla aut quadupla dosi, opus sit vomituro etiam puero. Vnde liquet nõ Genistæ, sed huius semina & flores in officinis habenda, vtpòte legitimi Sparthi, cuius ne pictam quidem effigiem, nedum viuum stirpem, videtur intuitus Commentator insulsus balbutor, quem miseræ si puduit recantationis, cur non piguit etiam calumniæ Mesuz inuictæ, qui Lentis semè dixerit esse Genistæ, sequutus Dioscoridem. Hunc tamen se nunc postremò antequam sua alia agnosceret errata, sibi sedulò perfectum profitetur iste Senensis, qui vitio præambitionis caligans, non respexit ad Viciz, Erui, & Genistæ semina, lippis & tonsoribus nota.

*SPARTIVM vulgo Elpha Hispanica Iunca, nautica, vulgi Furi-
spartium, an Linospartium Antiquorum?*

*I*toribus Mediterranei maris vtrisque Africæ & Hispanicæ hæc non minus frequens quàm nota, ac ingenti copia deuehi solita Antuerpiam, Massiliam, Genuamq; ad eorbes, stragula, atq; triremium nauiumq; rudentes peraccommoda. Virgultis iunceis, gracilioribus, durioribus, glabris, ex viridi pullis, multis, rectis, flexilitate Lini durior, radice simpliciori, exili, exit: semen & flores eiusdè Antuerpiæ satæ in viridario optimi Pharmacopœi Gulielmi Drieseh non meminimus: certum tamen habemus, nonnulla, sed tantilla habuisse foliola, delicatiora, vt tota planta fuerit iunca, cubitalis, & semè textrinæ apta sportularum, quas adhuc vocant *Sportels*, nempe ab Spartio dictas, quò minus dubitamus esse speciem veri Sparti.

GENISTELLA Graminea Montana.

*S*parteæ & hæc herbula est, & paucis duntaxat montium celsiorum conuallibus aridis obuia, vt Calcari montis Norbonensis, propter Cœnobium: in Germaniæ etiam arduis multo longiore spargens culmos vtplurimum sesquipalmares, graciles, spartos, cnodes quibus lumnis singulis spica mollicella, tométosa, Lagopij quadantenus, sed minor flauer: aliquot fibrillis radictur: indidem erumpentibus gracilibus foliolis, palmum altis & sesquipalmū articulatim veluti genieulatis, per spati-



spatiola & commissuras infecti, ea videre est virentia et iamnum Londini.

SPARTIVM aphyllan fruticosum,
Iuncea aculeis, lanatis capitulis.

ET inuenta minus frequẽs hic asperioribus præruptiq̃ue decliuibus Alpium Magdaleuẽ in Galloprovincia fruti cellus, latiusculẽ in latera, aliquot sparteos striatos, ex pullo buxeos è radice Tragacanthæ prolixiore, lignosos, & sesquipedales surculos spargit; nullis foliis, sed multis senticosis, rigidis stilis pungẽtib; iuncea, aduncis in summo tantum: quibus singulis aduoluũtur fastigiola, tomentaceæ gemmule Viris, minores, sed concolores, partim longiusculæ & incuruæ, partim breuiusculæ: nullum folium, florẽmve vidimus; gustus perparum amaricantis, exsiccantis, alstringentia.



GENISTELLA aculeata.

EX VCTI colles, squalidæque Angliæ & Belgicæ ericeta hanc plantam abundẽ dant: Eradicẽ exigua, virgas graciles, rectas. complures, spinulis infestas submittentem, quibus foliola Thymi vel Ericæ, flores luteo pallentes, Genistæ minores, etiamq̃ue breuiore rotundiorẽque siliqua, & semine Erui subruffo: Hac penẽ carere videtur adhuc Italia & Norbonna. Et hortis negligitur.

GENISTA, SPARTIVM spinosum maius.
Belgic. Waspeidojen. Ang. Brake Brume.

PRORSVM cognata Genistæ hæc, sed admodum aspectu horrida, sentibus præduris, innumeris, cancellatim armata, semper virẽtib; striatis, lignosis virgultis, sparteis, spinis penẽ folia occultantibus. Quare Doctiorum nonnullis placuit Nepam esse aut Scorpion: sed obstant siliquæ genistæ aliquantum breuiiores, & flores non absumiles, concolores, & eiusdẽ saporis, qui particulatim emicant aurei tota æstate, etiamq̃ue hyeme in Anglia, ubi frequentissima in sterilibus & ericetis, in Prouincia item Norbonensi penẽ par proceritate. Sed Montpellii ad Lanum, in saxosis collibus triplo minor, rigidior, & squalidior est, adeo vt parum Genistam representet, foliis ternis Rutæ. Illic Spalathum vulgo opinabantur & vocabant: plerique omnes, tametsi inodora & funis instar pertinax frangendo sit: floribus quidam lubentes ad ietherum viridem vtuntur, & toto cremio calfaciunt furnos.

Montpellienſi
& Anglic. Asp
palathus secunda.

Spina ACATIE Dioſcorid. prima, frutex arborescens, leguminosus Lentis folius,
Siliqua torulis Lupini effigie distincta, plurimum bigrana, aut tri-
grana, cuius GYMNI ARABICVM.

FRUTICIS huic arborescenti Egyptiæ nomẽ Græcum additũ ab ἀκάτω verbo, id est, acuo, vnde Acatia, quasi acuta. Septimus iam agit annus cùm huius Venetos, Patavinos, nosq̃; ceteros fecit Medicus & peritus Pharmacopœus Sequinus Martinellus, missis è Syria siliquarum faccis plenis Alberto Martinello fratri suo, perquam sedulo & erudito Pharmacopœo, ad Angeli symbolum: ex quo semine in horto Patauino aliisque quàm plurimis Venetorum locis sato, orta est ista Acatia, cuius siliqua penes nos est, accepitq̃; nosser Morganus plantam nonper ex maris Occidui Insulis Peruanianis, ne quis putet peculiarem Egypto aut Arabiæ. In nerualis prælongis foliola sunt Scorpioidis leguminosæ, aut Sferro Canallo, in toto virgulto gracili, aliquot rigidis spinis in surculis exsertis. Seminis tota siliqua non maior vno alteroq̃ue Lupino simul iunctis, sed suis alueolis distincta. Quare ridiculam nobis

SPINA ARABICA EGINTA.

SPINA ARABICA Dioſcor. id
Caranus.

M. i.

dedis

dedit Acatiam Senensis, cui si spinas demas, arborem Iude iudices, & meritò suspicere spinas non naturę, sed pictoris aut Cōmentatoris commentum fuisse: nec huius siliquę, siue Lobi sunt Lupini similes, sed Genistę duplò latiores, vt Senz compressę. Et Plinio cuiuslibet Acatiz semen lenticulę est, equidem minore grano & folliculo. Quam obrem nostra hęc propior, illa verò Cerecis arbor erit, quam ille, nec cogitans relatu Oratoris exquisitus delineat.

ACATIA ALTERA Diofco. notior Europaa, foliis Cytisi facie
& siliquis Genistę sporsu spinosi.

CONFIRMAT etiam superiorem spinam Acatiam altera hęc quam illi assimilat Diofcori. foliis Rutę aut Cytisi ternis: siliqua Genistellę, aut vulgaris Glycyrrhizę nouaculam effigiat dorso obtusiore, & altero latere, quasi acie acutiore, tria aut quatuor Genistellę etiam semina dura claudit: quę nondum matura flauent, postea nigricant, similiter Spartio effigie & parilitate magnę spinosę Genistę, non arboris, vbi quidā deceperunt Mathioli, qui æquę incertus vt in superiore, illam quam candidus scriptor Anguillara dat, & tamen fidem illi abnegat, eandem ipse ridiculè asserit. Quippe altera Diofcori. specię, vniuersum Tirrhenum, Ligulicum, atque mediterraneum litus scatur, vti pleraque Italiz loca.

FRAXINELLA A. siue Dictamnus Albus Officinarum apud
Τριφυλι. Diofco. Lenticis facie.

HIRCINVM modorūve putorem monet Tragii huius appellatio: Quare docti quidam Barbari, qui huius delineationem, natales, & vires compares Dictamo Cretensi, præsertim ad euellenda spicula capris infixæ, legissent, eidemque nostrā fraxinellam contulissent, putarunt eam Dictamnum album esse vocandam: recentiorum autem quidam & exercitatoris, Tragium istud Lenticis facie à Diofcoride descriptū, huic planè quadrare asseuerarunt. Quippe scapos edit plures, sesquicubitales & bicubitales, ramulis & foliis Lenticis Glycyrrhizę aut Fraxini, vnde Fraxinellā herbarii vocāt: flores Iunio & Iulio admodum speciosos & numerosos promit, Thyrsum sesquipalmi, lōgioreme obfidētes, Asphodeli quadātenus similitudine, sed ex cādore purpurantes, è quorū medio staminula quędā pendula porriguntur: radices albide, multiplices, mutuo amplexu herētes, minimum digitū crassę; quas cruebamus turgidas & fœtentes, sacco luteo, viscido, digitis pertinacius herēte: quod Gūmi videntur suggere, aut scētari muscę luride, cluniūmq; & alarum virore conspicnē, cuiusmodi ferè cantharides in Fraxino, vt nos studiose obseruabamus, in quodam pago trans Rhenum, altero à Basilea fere miliari, prope rupes quasdam apricas, vbi maxima copia sponte fruticabat. Semina penè Lenticis paria, nigra, lurida, in folliculis Helleborastri aut Napelli. Quam obrem non pessimè videntur arbitrati esse Tragium: Nam quòd obiciunt de Creta Insula, cuius vnus hęc sit alumna, non officit assertioni nostrę: cum multæ hodie in nostris tractibus: & plurimæ ex insulis, nō aliis admodum, & fortè nūquam prisę gēti notis, asserātur æquę rare, & eadem etiam metipsę, quæ solius Cretę putabātur indigenæ. Ceterum, μικροτέρα πύλα, id est, minora cuncta, sanè potius intelligendum de vniuersa Fraxinella, quàm de eius foliis, quæ minora sunt, eoque à Plinio Terebintho scitè collata: ne nunc ad toties iteratam literulę in μικρῶν & μικρῶν voce, commutationem prouocemus, vt trituali argumento Senensis, ne sit locus. Huius ad venenata non temerè vñ sunt practici radicibus, quæ etiamnum in officinis multi commodi sunt: fors ad motz opis epispasticę, intrò verò sumptę, non modò venenatos succos, sed etiam putridos & fœtentem illuuiem foras exigunt, decantato Agyrtarum & quotidiano in pueris experimento, lumbricos funditus omnes interimunt.

FRVTL

FRUTICVM, SVBFRUTICVM, CRE- miorum & Arborum aduersaria, concisæque recensiones.

411



Ossteaquâ cœpta via prolixissima simul & ope-

rosissima, herbarum necessitudines & gentilitates in suas classes redeigimus, ac pen-
sam opinionum salebras emensi, Herbariorum tenebras discussumus: reliquum est, ut
quoad eius fieri poterit, fruticum, arborum, & vtriusq; anticipis constitutionis plantarum
comparaciones, ad easdem Philosophia leges exigamus. Orsi quippe sensuum
indagine à simplicioris minusq; operosa maiora plantis notissimis, decet nos, uti fecimus, per notas simili-
tudinis & cognationis, ad perfectiora, quasi cōposuitorum gradum facere: quibus tandem præceptis, eucha-
mor ad tales principiorum: unde fontes scaturiunt certa & subda cognitionis facultas: tum & usus. Est
enim hæc particulari plantarum enarratio quasi quadam aurium pictura: quoniam nisi accuratè intuitum
fueris, frustra cognitionem earum prosteris. Sed cum herbarum, fruticum, suffruticum & arborum na-
tura, non videatur forma generica distare à se ipsa, quando easdem plantas videas herbæ promissum,
deinde in frutices, demum in arbores abire: & e contra, hæc in herbarii modulū penè desicere, nec mu-
tata effigie totius vel partium: huic cognitioni melius consilium putauimus, si interdum nonnullos per-
quam similes frutices aut arbusculas incrementi anticipis inter herbæ adduceremus, & alibi frutici-
tas herbæ cognatus, arborum explicationi relinquere. Jam verò plurimæ fruticum parti, cui maxi-
mæ cū arboribus necessitudo & similitudo est, non erit opus multa designatione, tanto minus arboribus,
ut quas occisus frequens, diuturnitas, magnitudo, & omnium stirpium tam prægeßtū comparatio,
cullebet manifestas reddat.

Lentiscus.

Terebinthus { maior Latifolia Nerbo,
minor* Lentiscifolia.

{ Obliquum,
Cariariorum.

Rhus {

Plum.

Plum alterum, Cotinot, Theophr. &

Coccigria.

Pistacia,

Gloss Vnguentaria.

Lilac.

Staphyloleandrum Pl.

Siliqua, sine Caroba.

Cassia Solutina.

Lasminum { vulgare,

luteum, Caruleum.

Balsamum, Carpobalsamum, Xylobalsamum,

Sorbus { domestica

Sylvestris } Alpina.

Fraxinus.

Nux ingrans.

Nux peregrina Indica.

Zizipha candida Montpel. perperam Venetorum

Sycomorou, an ASARADARACHI Aucel

Vaccinia rubra & nigra, an Idæa radix?

Vaccinia palustris.

Sagel Germanorum. Gold Angl.

Chistus omnis.

Chistus Ledi species folio Pinnæ,

LENTISCVS.

L Entorem foliorum attrectatu quilibet percipit, unde Lentiscum dicunt, partim etiam
è Græcis mutuati, qui ὄξινος quasi ὄξις, aut hille vocarunt, quod facili & frequens
funderetur in dentiscalpia, ad nitillam alboremq; dentium, ut etiamnum sit hodie. Fruti-
cat & arborefcit folionibus & caudice concolor & similis Terebintho minori, sed bo-
tris & vtris initio ex fuluo purpurantibus, maturefcendo nigricantibus acinis, nitidis, Su-
machij Phylerez, & Sambuci: vtriculis folliculisq; oblongis, rotundis, aut incuruis, tereti-
bus, quibus insut culices & effigies ite Terebinthi, adeoq; flores similes, racemosi, musco-
si, quos primo vtre Aprili mēse promit, non particulatim, ut putarūt ex Arati & Ciceroni-
nis versu, Lentiscus triplices solita prædesere fructu, quod Theophras. merito Scille attribuit, hi
autem vocis affinitate decepti, Lentisco. Quare non esse contemptui habendam nomen-
clationum perpenzionem, alibi iure asseuerabamus. Semperviretes autem Lētisci feracis-
sima vniuersa Norbonensis ora maritima, quæ ad Taurinorum iuga, quæq; ad montes
Mm.ij. Pyrcneos

Pyreneos protēditur. Illic namq; Lentisci, Rosmarini & Lavendulæ virgultis ac cremijs, quàm quouis ligno magis ad calcacienda clibana vtuntur. Nec præterquam vnam norūt speciem, quam *Resinole* vocant. Ideoq; fallitur & fallit Senensis, quod pumillas reseces Lētiscos, alias à procerioribus specie facit: sit enim tantum reseces cymis ad vsum, ne in arboris æmulationem assurgant. Et hunc errorem cumulauit inscitia, cum vninerā plātam grauius olere ait: at nobis aliisq; studiosis saltus & colles aridos Norbonæ peragran-tibus, inserta in/osa folia, non modo suauiter spirabant: sed etiam, quod fortē nescit Cōmentator, sitim arcebant, & fauces humidas tuebantur. Itaq; nobis silētibus, qui norunt Mastichen, & sciunt Lentisci furculos, vt Xylobalsami succedaneum in Officinis vsurpa-ri Lētiscinisq; dentificalpijs post epulas dentes emundari, illius resellent & ridebunt cōmentatiniē. Porro quomodo & quamnam ementiātur Caphuram hodie Veneti mango-nes, in succis Medicatis docent.

TEREBINTHVS *Lentisci folia minor.* *TEREBINT.*
maior Pistachie folio.

*Terebinthi lati-
folia species.*



*Polucella sine
Culices è folli-
culo.*

*Folium Tere-
binthi minoris.*

Coccinæ racemorum baccula aut acini rubelli similes & concolores quadantenus Ciceri, nomen Terebintho potuerunt fecisse: nam *ἰκκίριος* Græce Cicer est. Huius autem semper-virentis & perpetui folia, nullus collis aut deuexus paulò aprior Norbonæ aut Galloprovinciæ non feracissimus: vbi duas folio renus discendendas meminimus. Frequentior quippe est angustiore Lentisci positu (non Fraxini vt Senensis) colore & habitu, folio duplò maiore.

Alteri autem folia multò latiora, rotundiora, vicina Lauro & Pistachiz, aded vt eminens intueitem fallat. Vox vtriq; ædem, acinulis quàm Lentisci maiori-bus, coccineis, purpurantibus: demum ex viridi in ceruleum murescentibus, non per initia (vt putauit radiatus Apollo) flore Lētisci aut Sumachi racemosis: folliculi cartilaginei, teretes, aut co-

nici, angulosi, vel sphærici: vnde culices è fuliginoso excremento euolant, succo salinari ad Balsama laudato, effluente. Vbi latiores, & adulescentes sunt arboream proceritatem affe-ctant: & ferro vulnufculis factis in Valena Sylua Monspelliensium, sæpius nobis non pau- cam Terebinthinam extillarunt lucidam.

RHVS Cbsemorum & Coriariorum quid.

Color item coccineus flāmeusve acinulorū in racemulis nomen huic fecerunt: *ῥεος* an-tem *ῥεος* interpretantur vnde Russus vox Latina, & *ronx* vulgo Gallorum, Acidulāntem racemi olim, & etiamnum hodie ad condimenta, multus in culinis vsus: eoq; culi-narius siue obsonarius vocabatur. Cortex autem & folia alutarijs ad pelles dēfandas cō-quistis, vnde Coriarius dictus. Quare non sunt vt falsò produnt duarum plantarum, sed vnus arbusculæ partes: hanc multò proceriorem quàm Dioscoridis sit, penē Sambuci maioris magnitudine, serunt Monspello & Castronouo contermina. Oliueta quādam glareola & macilentiora. Sorbo vulgari aded similia sunt folio superficie & positu, vt vix sit internoscere, nisi attentius perpendenti. Locis Galloprovinciæ aridioribus & rude-rosis, desitis in cultis pumilla, & quanta qualisque apud Diosc. descripta bicubitalis ar-buscula, visitur.

RHVST Plinii *Myrsifolia Mos-*
pellensis.

EODEM ex vfu ad coria firmanda,
nō de semine, duo frutices apud Plin-
nium *Rhus* dicuntur: horum notissimus
& vfitatissimus cunctæ Norbong, præfer-
tim *Mospellensis*, apud quos vbetè
ad Lani amnis crepidines fruticat, vir-
gultis ramulisque quadratis, frequenti-
bus, viridatibus, folio *Rufci*, *Myrti*, aut
Iuiubæ. Seminula intra angulosam tuni-
ceam thecā inclusa sunt cochleata, Ca-
limodo malto minora.

COCIGRIA Theopb. *Cotinus* Plin:
& Theopb. *Rhus alaternum*.

COTIVOS sunt circivè flocci, quales in galeis,
aut galligallinacci vertice vifuntur, qua de
similitudine floris, dictus fuit hic frutex, qui
è summis virgultis, quinūm cubitorum altis,
pulcherrimum lanitiū tollit, Sericeo vellere
& contextu calamistratum. Quod crispatur &
explicatur in latam casariam, crinibus puni-
ceis, fuscis, tortilibus, semine Lētis minore, ex
nigro rufefcente; caudice & virgultis fuscis,
vimineis: foliis circinatis, densis, rigidis, *Cas-*
paris, *Pistachiam* aut *Terebinthum* redolen-
tibus, & concoloribus. Auræico agro quatuor
miliaribus *Auinione*, qua *Insulas* & *Aquas-*
sextias itur, magnus proventus est: Vidimus e-
tiā in agro *Veroënsi*, *Venetis*, ex locis *Histræ*
alpinis. Quò magis miramur, tantè venustatis
stirpem frequētī vfu & mercatu ad coria cu-
randa expetitā, indicā fuisse Cōmentatori.

Terebinthus Indica Theop. est *Pistachia* Dios.



Anuculis Pi-
ceæ strob-
ilos imitantibus
πισαμει di-
ctæ, Hodie sunt *Officinæ* notissimæ, & edi solitæ: non secus
atq; *Pinæ* vscæ sunt: porraceo colore intus, mēbranula exte-
ma & cortice amictæ *Auellanz*: Arborem qualē in hortis *Li-*
talicis vidimus, etiam quæ in horto *Grati seduli Pharmacopœi*
& stirpiū percupidi, ad *Londini mœnia*, prorsum dic-
cas *Terebinthum*, ramorum & foliorum ortu, habitu, ma-
gnitudine: flores item racemosos purpurantes *Terebinthi*
edunt in *Italia*, & *Galloprovincia*, vbi feruntur, sed maturi-
tatem non assequuntur.



PER QUAM vilem arborem istam Aegyptiis Arabibusque debemus, à quibus, aut ab illa odorata, est nomenclatura profecta. nisi sit *ααυς* Græcè, quod coriaceum vocant, quasi sit coriacea ipsa siliqua insignis, quam nullus non nouit, cuiusque si semina lata, quæ intus transferlis membranis alu colis dissepuntur, seras, prius macerata in aqua frigida, & terræ infodias, videbis planè ortu totoq; ipso habitu Carrobbiam imitari. Flores lutei sunt, Chelidonii minoris, odori, plusculi, vno exortu, senis aut septenis folioli radiati, quales multaque perquam raras vidit & attulit ex Insulis Americis & D. Dominici, exercitatisimè cognitionis peritissimus D. Iohannes Brion Hoppeuilleus Northmanus.

GELSEMINVM vulgatius, flore albo.

CONCINNIOTIorem quàm certiorē asciuit sibi appellationem de sententia quorundam doctiorum, quibus Iasme dictum putatur, quasi viola odora, quia oleū apud Persas olim solum esset istius floribus imbui: quod tamen grauius spirat Dioscoridi, eoque arguit non esse nostrum Gelseminum. Et violæ vox, laxior multo est, quàm vt certā quampiam plantam designare valeat, nedum hanc quam Mauritani Zambac & Gelseminum dicunt: vbiuis in hortorum angulis apricis, & pro prædiorum caudis surculo pangitur, adque ornamenta pergularum, industria & pedamentis erigitur ad fornices. Folia sunt in imolatoria, lateribus vtrinque reducta, acutiora superne quàm Lentisci: flores albi vt plurimum, Polemonii, in flexilibus prolixissimis virgultis octo & decem cubitorum, Clematis alteræ riget. Patauina & quædam Gallica vireta luteum habent. Sunt qui cœruleos flores fundere dicant. Luteum semen habet, Polemonii minus, rubrum, aut nigrum, ni labat memoria.

BALSAMVM.

PRO Dioscoridem vires melius quàm surpem notam habuisse: de viribus namq; multa, de figura nihil. Hanc sic amici nostri oratione referunt: Humilis est frutex, aspectu deformis, cineracei coloris, flore pusilli Iasmini lutei simili, minore, perpetuis virgis, folia horna exiit Decembri, quibus nonnisi mense Maio noua sufficiuntur. Cari atq; Babilone satã viget. Decembri mense ramuli præciduntur, quibus cæra oblitæ appenduntur amphoræ, excipiendo aureo liquori, qui moschum sapit. Hunc nosse non difficile, sed vbi noueris longè difficilissimum habere. Opera danda accuratissima, quod eius vires quàm exploratissimas habeamus, vt quando non licet illo frui, saltem bonitate proximis & simili facultate præditis vtamur. Tribus huius plantæ partibus tria succedanea est meditata posteritas: Liquoris namque loco sua: Balsama vnguinâque vulneraria nostri Barbari in Theauris habuere, quorum mirificas vires literis & experimentis proditæ sunt. Lignum verò, quod Xylobalsamum dicunt officinæ, Lentisci sunt furculi, plerumque carioli, tamen neutiquam contemnendi, modo recentes sint, nec odorem amiserint; gratissimus namque puluis intus & foris, stomacho, propter naturæ amicum temperamentum: cuius argumentum faciunt dentisicalpia, quæ aromatica & moderata astrictione & calefactione dentes, gingiuaque perpurgant, roborant, & mulcent. Idcircoque eorū multæ myriades parantur à miseris mancipiis, qui in tremeis Lygurarum sub neruo vitam degunt. Pseudoxylobalsami huius magna copia paucò ære parari potest ex Italia & Gallia Norbonensi. Sic semen, id est, Carpopalsamum officinarum, cum neutiquam fructus Balsami sit, imò cuiusnam plantæ, incertum sit, rancidum, vietum, exoletū, inodorum, minimè Carpopalsami loco usurpari debet: quin potius huius penuria, semen Terebinthii, vel Lentisci immaturū eximix vires, omnes Carpopalsami facultates, & dote, vt si quod aliud, explere mihi videtur. Quin Terebinthii & pullulantis botris atque flagellis tempore verno laticem limpidissimum, odoratissimum, non parum tenacem emunximus, qui digerendo, glutinando, doloremque mulcendo, omnia quæ Opobalsamo Insunt, conferre videtur. Quod non modò doctiorum antiquorum, sed etiam Barbarorum Barbitonsorum consensum sequutus est. Nullum enim videre est ex illis vnguinibus, quod viriū præstantia nomen Balsami meruerit, cui non sit admixta Terebinthina vulgata: Quid putas futurum, si genuinum Terebinthii liquorem admiscuissent, qualem descripsimus Capite de Terebinthio? Ea de causa nullum præstantius succedaneum arbitramur, cuius omnes partes omnibus respondent

M m. iiii.

partibus

partibus, ligno, liquori, semini respondeant, quàm Terebinthum genuinum. Mathiolus & qui suum Garyophyllorum, nucis myristicæ, aut Cinamomi oleum, huic liquori præferunt, suauitati & saporis plus quàm oporatis facultatibus deferunt. Hæc namque tametsi eximios fundant liquores: tamen nec Dioscoridi nota, nec venenis aut Theriacis comparata fuere. Er præterquàm quòd plerumque vel scetent vel feruent ignis empyreumate; etiam si sint optimè parata, tamen sæpius acriora sunt quàm par sit, & intemperiem feruidam imprimere nata: Oculòrum verò hebeti aciei si quis admouere aufit, ne ille hominem ex luscioso cæcum faciet: corrugat enim pupillam, nec penetrat: sed viam sibi intercludit, & dolore vexat: Myristicum verò oleum, laxando & inquinando, nec foris vulneribus glutinandis, nec stomachi vires colligendo idoneum est, nec quidquam Balsamo simile habet.

SORBUS domestica & Sylvest. Alpina.

SORBUS hodie notissima in Gallia, Germania, & Italia, arbor magna est, foliis & facie Fraxini, Sumach, aut Sycomorì Venetorum: colore partium ex luteo pallescente, partim punicante, fructu rotundo, aur Pyri parui effigie, perquàm astrigente: floribus albidis, racematim coherentibus.

Fraxinus bulbula Dod.

HUIUS prorsum simili montibus oriunda frigidioribus, floribus iisdem, sed umbellatim candidis. Fructu multò minore, copioso, maiore Oxyacanthæ vulgaris, concolore, acerbò gustu, auiibus potius quàm homini, ubi vidimus, expetito.

FRAXINUS.

EX superioribus Sorbis facilè innotescet Fraxinus: cuius semen Officinis Lingua aui vocatur, quòd auium lingulas imitetur, gustu acre, amarum.

NUX JUGLANS.

NEC infrequens puerisque notissima Juglans, foliis prægrandis, nervosis, Terebinthi, aut Fraxino multò maioribus, Centaureo magno paribus. Cuius nuces condiuntur die vna albæ, hoc modo: Teneræ nucis cortex putaménve antequàm lignescant, deglubuntur illicò cultro, testa albida & teneriuscula tenus, è vestigioque ne nigrescât, in aquam puram proiciuntur, & vsque dum mollescant coquuntur, Cinamomi & Garyophyllis traiectæ, saccharo in Syrupum perfectè cocto bulliunt tribus quatuorve ebullitionibus: tumque quò saccharum ebibant, triduo, aut quattriduo inibi sinuntur. Et quia Saccharum recrudescit, propter humorem quem imbiberat, illud idem saccharum per se denuò, coquitur, & sic bis tère repetitur.

NUX peregrina Indica, non biforis.

ADVENTITIA quidam fructus ex occiduus, aded nuci Juglandi similis, vt nondum inspectum, sæpius putauerimus nucem Juglandem esse: sed effractū, caro fuit vesca, intus albida, Castanæ sapore, nullis distincta nucleis: putamine, & testa vtraque crassiore, quàm nucis Juglandis. Hunc Rocellæ nobis dono dedit eruditissimus Doct. Launus Medicus.

ZIZIPHA candida Monspel. quæ perperam Venetorum Sycomorus, aut ASARA Daractii Anicena?

HANC à fructus & totius arboris figura Monspellienses candidam Zizipham dixerunt, quamvis facultatibus sit prorsum absimilis, vt pote gustu admodum ingrata, virosa, amaricante, sed Zizipham satis referente, carne & nucleo; colore tamen buxæ, pallido. Flore stellato, Flammulæ, aut potius Circeæ concolori, folia Fraxini, Staphyllodendri, aut Sorbi, atrovirentia. Venetiis & Norbonæ frequens. Belgis colitur in hortis.

VACCINI Angra & Rubra, an Idea Fadiæ Myrtillus.

NON

NON PERDERAM quadrat hinc Idæ plantæ vteruis horum fruticum aspectu Myrtum aut Ruscum illicò referentium, vnde Pharmacopœi cum plebecula quasi Myrtillos vocarunt & vsurparunt, astringunt etenim & exsiccant ambo, non nihil refrigerando, quæ omnia appositè quadrant Idæ radici, cuius fuit potissimum vsus, cuiq; nomen inditum à monte, quia non iussu montosis locis & accliuibus arduis calidarum regionum, quibus saltus & nemora frigidiorum plagarum respondent vtplurimùm. In Anglia, Belgio Gallia & Germania, Seuenæ inaccessis Tridentiq; alpinis vtrumq; fructum esitauimus. Sed virent initio, deinde rubent tandem nigræ bæcæ suauiores maturitatem assequutæ vineo succo turgent, prædulci gustu. Proxime folia lignosis furculis crebrius sarmentosis multi harent: floribus Ericæ aut Vuedonis minoribus, pallentibus. Radix lignosa multa edit virgulta, pede altiora. Folia virent obscure, effigie Myrti aut Rulci, rotundiora, molliora, sed Hyeme decidua.

VACCINIA rubra.

Idem natalibus Rubræ frutex latiore & habitiore aspectu semper viret: non perindè vt nigra, frequens, nec tamen nigræ dissimilia folia, sed paulo maiora, & ad Myrtum albam siue maiorem & Rhus Plinianum accedentia rotundiora. Bæculæ non minores nec dissimiles sed rubræ, astringentes magis, nec perindè succulentæ. Radix æque lignosa fibris serpit Ericæ ritu, Flores oblongis caliculis paruulis subpurpureis apiculos è medio exerunt.

Palæstria VACCINIA.

Sunt etiam parum frequentia alibi quàm in Germania & Bataniæ paludosis & maritimis hæc Vaccinia, quæ Iohannes Cruthmanus Mechliniensis, vocatus de Vroede, alinc Antuerpiam nobis primum adferebat non dissimilia colore, longiore tamen & nonnihil turbinata figura, parua lachrymam Iob effigiente, in viticulis sarmentosis exilibus quamplurimis humilibus breuib; foliolis Serpilli minoris, vel Herniariz. Interdù bæcæ quæ rubræ sunt maculose punctis vituntur, acerbi astringentisq; gustus. Hanc cur Com mentator Ericam bacciferam indigitet, neq; causam dicit, neq; ratio subest, neq; quidquid Ericæ illi inest. Exilitatem quippe foliorum, esse vagam notam quamplurimarum plantarum Ericæ valdè dissimilium, & hanc refrigerare & humectare qui aiebât Seuensem meritò subleuabant: calida enim, valdeq; sicca Erica est.

Sagel Germanorum vel Gold & Anglorum Myrtus

Brabantia quibusdam.

IN Ericetis vmbrosis, nemorosisq; saltibus fruticat multis ramulis ab imò, alterno exortu ab radice ligata flexilibus, duris fuscis Vaccinijs superioris. Folia punici Chamælez paulò latiora. Seminum crebri racemuli conferti & conflati quasi spicis post pusillorù, luteorum florum pallentium Lapsù apparèt: in quibus semen pingue odorù Stachadis citrinæ vehementius, & trifolij odorati quadatenus simile. Iunio & Iulio Anglæ mulierculæ venù adferunt ramos florentes ad concinnanda ædiù, conclauia & triclinia suauis odore quem halant flores, imbuenda. Adduntur etià idè flores potioribus cõsuetis Septentrionalium, penuriam Lupulorum interdù resarcituri. Interdum ad hylaritatem bone potis conciliandam: ferit namque caput latiore temulentia Sagel



*Glycyrrhiza sp.
nosa Anthi-
chena.*

VALERANDVS *Demet.* Pharmacopœus Lugdunenſis plantarum ratiorem vt quis a-
lius ſtudioſus & peritus, cui certò fidimus, ſiliquas paruas geniſtæ, aut acatiz, ſed minores, ſe-
cundæ nobis dedit, ſemine exiguo Geniſtellæ: hanc Antiochenam à loco, Glycyrrhizam
à ſimilitudine & ſpinis, quibus donata erat, faciebat. Sed nihil niſi ſiliquas vidimus, eoque
nihil dum aſſerimus.

Arabum & Aſſenarij SEN Aſiatia & ſyberſt.

SERO & magno ægrotantium incommodo innotuit Græcis Sena, quam vnâ & appella-
tionem Arabibus debemus: Albaſemer vocant illi, vnde detortum Sena. *Haec* autem ho-
die nullum purgans frequentius, tutius, aut preſtantius eſt. Ea herba, æſtîua & parua eſt, vul-
tu, leguminoſo Securidacæ, Glycyrrhizæ, aut Colutæ: In Liguriæ, Thuriæ, Romani agri
& Appulijs varijs locis, legitur Autumno, nec ſeritur ante Maiû, quia frigoris impatiens: eoque
hortis Septentrionû vix triemeſtre viuît, nec promit, nec maturat flores vel ſiliquas. Quare
Officinæ potius è fundo vernaculo, nempe Orientis emporijs, petunt, pluſquæ faciunt, quàm
iſtam aut Italicam: duas enim ſoliorum differentias, aut varietates habent inſtitiores è di-
uerſis plantis Senæ: probatius ſolium & laudatius ad purgationes (ſinum vocant) eſt obſo-
leſcens, acutius, Myrthi maioris effigie: alterum rotundius, breuius, quod vilius habetur: quare
non ſecus atque Myrthus maior & minor, ſolis videntur hæc duo inter ſe diſtare, vt præ-
ſtantius ſolium ſit Domelticæ, alterum ſylueſtris Senæ: duas itidem Meſuæ agnoſcit: & ad
perſuadendum alterutram earum eſſe ſylueſtrem, multum ſpirilli pilulæ ſtercoris caprini
aut ouini faciunt, quæ frequens inter Senæ Orientalis, folia, ſolliculos & quiſquilias paſſim
apud nos allata reperiantur, vbi empturis proſtant, ſeritur namque & adoleſcit probatior
in ſuncto ouilio inibi: alioquin vtrique ſiliqua eſt effigie Colutæ, compreſſa, vt Arboris
Iudæ, ſed ſcalculæ in modum conuexa, ſulca aliquot ſerie digeſta ſemina, Gygaris ſimilima,
compreſſiora, claudens. Flores ex pallido lutei ſunt, rubellis veſtigijs venoſi: graciles cau-
les Meliloti, pedem & ſequipedem alti: ingratiuſcula tota guſtanti, tantillum amara, calida
& ſicca: tamenſi veluti ſenugræco affinia, mucaginofum reddunt mandendo ſputuma: fo-
lia, quibus ad purgandum conſultius ſemper, quæ ſtatim diſcutiunt & nonnihil lubricent,
adduntur, quàm ſi per ſe, puluere inſuſo aut decocto, dentur: Sic enim barbarum multum
ciere, & inteſtina, ſtomachumque torquere, vel plebecula conqueritur. Eapropter qui ad-
uerſum Meſuem tuetur non eſſe corrigendâ, imò licitate ſua atque quadam attritione vè-
triculum iuuare, neſcit quid commentetur: nâ ſic Braſſicæ maris, Thymelæ & Chamæ-
lez ſiccitas, ſtomachum iuuaret, quem tamen lædunt illo viroſo odore, & purgatrice qua-
litate, à qua non longè abſunt folia Senæ, vt dum virent adhuc, aut macerant tur, odorantur.
Proinde ritè Meſuæ ſolliculo tutius purgare monet: nèpe mèbranei ſunt, minùsque ſtatulèta
ſemina, quàm folia: ſed hæc plus mouent, præſertim inſuſa, quàm decocta: quia ebulli-
endo nonnihil virium abſumit: & ſtatu diſſipatur: vt vſus ipſe caſtigare valeat illum Commē-
tatore, qui nihil addendum ad eius noxam corrigendam autumat. Sed hæc explicatius
in remedij.

COLUTEA Gallie, Baguenandrier.

PVTATVR Colutea dicta, quod mutilati effraſſe eius ſtipites aut virgultæ (nò præciſi)
intereant, vt Theoph. autor. Tanta autè ineſt ſoliorum & ſiliquarum pariſitas Colutæ
cum Sena, vt plerique non ineruditi Senam ſylueſtrem hanc eſſe vulgo perſuaſerint: at Co-
lutea cum Theophrasto arboreſcat, nobis autem fruteſcat, Rhanno penè par; nec herba vt
Sena ſit, iam quilibet poteſt à Sena eam diſcernere & diſcere: quippe folia colore, ſitu, ma-
gnitudine, & ſuperficie Senæ, Hedijari, aut ſuperioris Colutæ Scorpioidis, paulò antè dic-
tæ ſunt, floribus item luteis, nec diſparibus: Folliculi veluti membranæ voſculæ, teretes:
quæ ſtatu turgent, & tactæ, ſtreptum edendo crepant: ſemine intus hærente Lētis (nò Gy-
gari) minore guſtu, leguminoſo. Auguſto ſiliquam maturat, vbi ſpontaneus arbuſtus eſt, in
Linguagotiz iſſidem ſaxoſis ſterilibus ad Frontignanam, quibus Chamziridem oriri mo-
nebamus: ſed ea etiam vulgareſcit hortis Galliæ, Germaniæ, Italiæ, & Angliæ: nuſpiam tamen
arbor magna futura: eapropter apud Theophrastum ſatius legeretur, *Αλδραγ νερα μύ-
δης* non *μύδης*, nempe arbor non ita magna, ſiue arbuſcula: quod ex conſequentione
paulò

paulò post inferunt verba Theophrasti: $\sigma\chi\iota\sigma\tau\alpha\iota\ \kappa\alpha\iota\ \alpha\pi\tau\alpha\lambda\acute{\alpha}\delta\ \epsilon\sigma\tau\alpha\iota$ id est, finditur, siue diuiscatur in ramos, et arborefcit: non igitur initio arborem esse, sed arborefcere dicit, qui ortus & adolefcencia planè conuenit nostrati Colutæ.

Spartium, Genista scoparia vulgi.
Genistella infectoria, an Lutea Pl?
Hippaspartium, vulgo Rapum Genista
Spartium Dioscorideum Hispanicum
Spartium minus, vulgo Elpho Hispanica
Genistella Graminea montana.

Spartium fruticosum aphyllon, iuncis aculeis latis
Genistella aculeata.
Genista Spartium spinosum manu
Acacia secunda.
Acacia Egyptia.
Fraxinella siue Dittamnus albus Offici: an Tra-
gium Diosc. facie & solus Lentisci?

SPARTIVM. Genista scoparia vulgi.

VULGATISSIMA notitiæ & vtilitatis Spartium vbiuis gentium fèrmè antiquis Gall. Genest. semper fuit, vt etiamnum est. Sic vocatum, quia vinciendo, nectendo, adeoque tex- Ang. Broome. endo, fili, lorivæ vices explet: sonat enim Spartium subiculum vel lorulum: Genistam Bel. Brome & indidem à genui flexilitate deducunt nonnulli, quæ duntaxat species Sparti dici potest. Bzem, Est autem hæc omnium notissima tum apud Bergos tum Meridionales, sterilibus præfertim, arenosis, montosis, frigidioribus, Vargis fruticat densè pullulâribus, hominis proceritate interdum superantibus, rectis, gracilibus, striatis, duris, sed flexilibus per intervalla foliola numerosa promès, Hyperici, nigriora, minora, abundeq; luteorum florum suavè olentium Pisi, post quos falcara effigie, siliquas Iunio & Iulio maturat, seminis atrii lucidi plenas, Lenticulæ similes, quo vomitum, non secus ac Spartio Dioscoridis, sæpius duarum viciarum decocto popinato, citra magnam contentionem mouimus. Verum flores recens decerptos sæpius quàm plurimos, & per se acetatis inditos vorat Plebecula Auernæ & Aquitanæ, maxima copia, innocuos non modò, sed etiam admodum gustu suasos: nec quicquam vomitionis nauææve vilius aut cômotionis mouere solitos. Quin apud Brabantios gémantes condiuntur sale & aceto flores, mensisq; infesuntur, capparium ob aromæ pari commendatione: credûtur etenim non modò cordi vires, stomacho appetitum alere, sed etiam obstructions referare, calculum frangere. Id circo falluntur, fallentq; qui hosce flores vomitioni mouendæ officinis siccandos præcipiunt, rati istam genistam, esse Dioscotidis Ellebori subpar deiectionum Spartium. Quantumvis enim seminis incoxeris, vix aliusmodi vomitionem moueris, quàm quæ communibus emeticis Raphano, sicu vel oleo ciuntur: nec enim deiectione insigni, sed tantum leuiore conatu excludant, qui hauserunt.

Vulgi GENISTELLA infectoria, an Lutea Pl?

VEGETO & perquam hilari florum luteo, micantium thyrsulis crebribus editiora præta Ang. Diuweed. ornat copiosissima hæc, instar Lini segetis æstiuæ: nec vspiam frequentior quàm Tau- Bel. Aher bren rinis, Pedemontanis, & Angliæ occidentæ. Vitgultis rectis, pedalisbus & sesquipedalibus Ger. Geyden densè fruticat Lynaria folio, & flore concolori, sed Genistæ similiore, minore siliqua & semine, amaricante gustu tota: Lanarum inflectionibus expetita, sed vt proceritate, sic virium efficacia Spatti superatur.

Herbariorum RAPVM Genista, siue Hippaspartium, ἵππασπον, floribus galatæ Tragochulis.

RADICIBUS Genistæ & Genistellæ adnascitur quasi soboles spuria, sed speciei visenda & raritate, excrementum Rapum Genistæ vocatû, non ab simile ortu, concretu, incremento, eaule, & effigie Hypochistidi vel Otobanchæ. Quod magnis votis & peregrinationibus Chymistæ Maio mense venantur ad vtriusq; Genistæ radices, sublectos tenetiores asparagos, cum radicibus siue appendicibus à Genista auellendis alembico indût. Inde q; igne oleum eliciût ad calculosos perquam celebre. Id auulsimus in Fladriæ, Galliæ, & Angliæ locis maiore Genista scatentibus, alioqui frustra quæsitû & diu alibi. At Sabaudia &

& Pedemontanis colles, parua Genistæ feracissimi, etiam istud copiosum fundunt.

SPARTIVM *Dioscorideum, Hispanicum & Norbonense,*
vulnereum montanum.

E iam adductis moxq; adducendis Spartio congeneribus plantis, nulla propius explet Dioscoridei notionem, paucifolio frutice, siliqua & semine, quam illa. Quæ Hispanijs & Norbonensibus, præsertim maritimis, vel nõ procul à litoribus, vt in Grammuntia Sylua MonsPELLIJ, & vicinis collibus, passim obuia sit. Etiam Taurino finitimis, & in Prouincia nobis v. sam monuimus. Stipite eadem maiore & lignosiore adolescit in Angliæ, Belgiz, & Galliæ hortis, ramorum propagine arborescens, virgas multas fundentes, rectas, glabras, iuceas, nec striatas, vt Genistæ, sed vimineas, flexiles, & sequaces: quibus foliola insunt adeo exilia, vt iam marcida facta in suis natalitijs æstuosis, nulla prorsum extitisse videantur, maxima anni vertentis parte: Quod illic obseruauimus vsu venire *Sfetto Canale* dictæ folijs, & ei nouæ plantæ, quam Iuncum asperorum cliuorum vocat illic Aphyllon Scola Mõspelliaca. Quò factum, vt Dioscoridi tantilla res aut non fuerit curæ, aut non animaduersa. Siliqua, semẽ, & flores, prorsum sunt Genistæ, sed maiora, & efficaciora: cuius modi vult Dioscorides & Mesue, qui à duabus ad 5. drach. florũ, dandas vomituris imperat: seminis verò, à duabus ad quatuor. Quum tamẽ Genistæ vulgaris flores plenos discos multi in acerarijs ex multo oleo vorent, nec quicquam nauferet: & seminis tripla aut qua drupla dosi, opus sit vomituro etiam puero. Vnde liquet nõ Genistæ, sed huius semina & flores in officinis habenda, vtpote legitimi Sparti, cuius ne pictam quidem effigiem, necdum viuam stirpem, videtur intuitus Commentator insulsus balbutor, quem miseræ si pudit recantationis, cur non pigrit etiam calumniæ Mesue inuistæ, qui Lentis semẽ dixerit esse Genistæ, sequutus Dioscoridem. Hunc tamen se nunc postremò antequam sua alia agnosceret errata, sibi sedulò perfectum profitetur iste Senensis, qui vitio præ ambitionis caligans, non respexit ad Viciz, Erui, & Genistæ semina, lippis & tonsoribus nota.

SPARTIVM vulgo *Elpha* Hispanica Iuncæ, nautica, vulgi *Fur-*
spartion, an Lunospartion Antiquorum?

*L*itoribus Mediterranei maris vtriusque Africæ & Hispanicæ hæc non minus frequens quã nota, ac ingenti copia deuehi solita Antuerpiam, Massileæ, Genuamq; ad corbes, stragula, atq; triremium nauiumq; rudentes peraccomoda. Virgultis iuncæis, gracilioribus, durioribus, glabris, ex viridi pullis, multis, rectis, flexilitate Lini durior, radice simplici, exili, exit: semen & flores eiusdẽ Antuerpiæ satæ in viridario optimi Pharmacopœi Gulielm Driesch non meminimus: certum tamen habemus, nonnulla, sed tantilla habuisse foliola, delicatiora, vt tota planta fuerit iuncæa, cubitalis, & semẽ textrinæ apta spertularum, quas adhuc vocant *Spartolæ*, nempe ab Spartio dictas, quò minus dubitamus esse speciem veti Sparti.

GENISTELLA *Graminea Montana.*


*S*parteæ & hæc herbula est, & paucis duntaxat montium celsiorum conuallibus aridis obuia, vt Calcari montis Norbonensis, propter Cænobium: in Germaniæ etiam arduis multo longiore spargens culmos vtplurimum sesquipalmares, graciles, spartos, enodes quibus summis singulis spica mollicella, tometosa, Lagopij quadantenus, sed minor flauet: aliquot fibrillis radatur: indeinde erumpentibus gracilibus foliolis, palmum altis & sesquipalmũ articulatũ veluti geniculatis, per spatium



spatiola & commissuras infecti, ea videre est virentia et iamnum Londini.

SPARTIVM aphyllum fruticosum,
Iuncea aculeis iunaris capitis.

ET inuentu minns frequēs hic asperioribus præruptisque decliubus Alpium Magdalens in Galloprovincia fruti cellus, latusculē in latera, aliquot sparteos striatos, ex pullo buxeos ē radice Tragacanthæ prolixiore, lignosos, & sesquipedales surculos spargit; nullis foliis, sed multis fenticosis, rigidis stilis pungētibus, iuncea, aduncis in summo tantum: quibus singulis aduoluūt fastigiola, tomentaceæ gemmule Vitis, minores, sed concolores, partim longiusculæ & incuruæ, partim breuiusculæ: nullum folium, florēve vidimus; gustus perparum amaricantis, exsiccantis, alstringentis.



GENISTELLA aculeata.

EX v c t i colles, squalidæque Angliæ & Belgicæ ericeta hanc plantam abundē dant: Eradicæ exigua, virgæ graciles, rectas, complures, spinulis infestas submittentem; quibus foliola Thymi vel Ericæ, flores luteo pallentes, Genistæ minores: etiamque breuiore rotundiorēque siliqua, & semine Erui subrufo: Hac penē carere videtur adhuc Italia & Norbona. Et hortis negligitur.

GENISTA, SPARTIVM spinosum maius.
Belgicæ. Gaspeltoexen. Ang. Brake Broom.

PROSTVM cognata Genistæ hæc, sed admodum aspectu horrida, sentibus prædatis, innumeris, cancellatim armata, semper virētibus, striatis, lignosis virgultis, sparteis, spinis penē folia occultentibus. Quare Doctiorum nonnullis placuit Nepam esse aut Scorpion: sed obstant siliquæ genistæ aliquantum breuiiores, & flores non absimiles, concolores, & eiusdē saporis, qui particulatim emicant aurei tota æstate, etiāque hyeme in Angliā, vbi frequentissima in sterilibus & ericetis, in Prouincia item Norbonensi penē par proceritate. Sed Montspelli ad Lanum, in faxosis collibus triplo minor, rigidior, & squalidior est, adeo vt parum Genistam representet, foliis ternis Rutæ. Illic Spalathum vulgo opinabantur & vocabant plerique omnes, tametsi inodora & funis instar pertinax frangendo sit: floribus quidam lubentes ad iterum viridem vtuntur, & toto cremio calfaciunt furnos.

Montspelliensis
& Anglicæ. Aspalathus serena
dum.

Spina ACATIAE Dioscorid. prima, frutex arborescens, leguminosus Lentis foliis,
Siliqua toralis Lupini effigie distincta, pherimum bigrana, aut trigrana, CULINA GYMNI ARABICVM.

FRUTICI huic arborescenti Egyptiæ nomē Græcū additū ab ἀκᾱτῶ verbo, id est, acuo, vnde Acatia, quasi acuta. Septimus iam agitur a nouis cum huius Venetos, Pataunos, nosq; certiores fecit Medicus & peritus Pharmacopæus Sequinus Martinellus, missis ē Syria siliquarum faccis plenīs Alberto Martinello fratri suo, perquā sedulo & erudito Pharmacopæo, ad Angelī symbolum: ex quo semine in horto Patauino aliisque quāmplurimis Venetorum locis sato, orta est ista Acatia, cuius siliqua penes nos est, accepitq; nosser Morganus plantam nuper ex maris Occidui Insulis Peruanianis, ne quis putet peculiarem Egypto aut Arabiæ. In nerulis prælongis foliola sunt Scorpioidis leguminosæ, aut Sferro Canalis, in toto virgulto gracili, aliquot rigidis spinis in furculis exertis. Seminis tota siliqua non maior vno alteroq; Lupino simul iunctis, sed suis alueolis distincta. Quare ridiculam nobis

SPINA ARABICA Aegina.

SPINA ARABICA Dioscorid. id Caranus.

M. i. dedis

dedit Acatiam Senensis, cui si spinas demas, arborem Iudæ iudices, & meritò suspicere spinas non naturę, sed pictoris aut Cōmentatoris commentum fuisse: nec huius siliquę, siue Lobi sunt Lupini similes, sed Genistę duplò latiores, vt Senę compressę. Et Plinio cuiuslibet Acatę semen lenticulę est, æquidẽ minore grano & folliculo. Quamobrem nostra hæc propior, illa verò Cerecis arbor erit, quam ille, nec cogitans relatu Oratoris exquisitus delineat.

ACATIA ALTERA Diosco. notior Europæa, foliis Cytisi facie
& siliquis Genistę sparsis spinosiss.

CONFIRMAT etiam superiorem spinam Acatiam altera hæc quam illi assimilat Dioscori. foliis Rutę aut Cytisi ternis: siliqua Genistellę, aut vulgaris Glycyrrhizę nouaculam effigiat dorso obtusiore, & altero latere, quasi acie acutiore, tria aut quatuor Genistellę etiam semina dura claudit: quę nondum matura flauent, postea nigricant, similiter Spatio ciliigie & parilitate magnę spinosę Genistę, non arboris, vbi quidã decepterunt Mathioliũ, qui æquę incertus vt in superiore, illam quam candidus scriptor Anguillara dat, & tamen fidem illi abnegat, eandem ipse ridiculè asserit. Quippe altera Dioscori. specię, vniuersum Tirrhenum, Ligulicum, atque mediterraneum littus scætet, vti plerique Italię loca.

FRAXINELLA siue *Dictamnus Albus Officinarum* an sit
Τριφυλλ. Diosco. Lenticif. facie.

HIRCTIVM odorũmve putorem monet Tragii huius appellatio: Quare docti quidam Barbari, qui huius delineationem, natales, & vites compares Dictamo Cretensĩ, præsertim ad euellenda spicula capris in fixa, legissent, eidemque nostrã fraxinellam contulissent, purarunt eam Dictamnũ album esse vocandam: recentiorum autem quidam exercitationes, Tragium istud Lenticif. facie à Dioscoride descriptũ, huic planè quadrare asseuerarunt. Quippe scapos edit plures, sesquicubitales & bicubitales, ramulis & foliis Lenticif. Glycyrrhizę aut Fraxini, vnde Fraxinellã herbarii vocant: flores Iunio & Iulio admodum speciosos & numerosos promit, Thyrsũ sesquipalmi, longiorẽmve obsidẽtes, Asphodeli quadatenus similitudine, sed ex cãdote purpurantes, è quorũ medio staminula quędã pendula porriguntur: radices albide, multiplices, mutuo amplexu herẽtes, minimum digiti crassę; quas eruebamus turgidas & scetentes, sacco lnteo, viscido, digitis pertinacius herẽte: quod Gũmi videntur suggere, aut sectari muscę luridę, cluniũque & alarũ virore conspicuę, cuiusmodi ferè cantharides in Fraxino, vt nos studiose obseruabamus, in quodam pago trans Rhenũ, altero à Basilea fere miliari, prope rupes quasdam apricas, vbi maxima copia sponte fruticabat, Semina penè Lenticifinis paria, nigra, lurida, in folliculis Helleborastri aut Nappelli. Quamobrem non pessimè videntur arbitrati esse Tragium: Nam quòd obiciunt de Creta Insula, cuius vnius hæc sit alumna, non officit assertioni nostrę: cum multę hodie in nostris tractibus: & plurimę ex insulis, nõ aliis admodum, & fortè nõquam prius gẽti notis, afferatũr æquẽ rare, & eadem etiam metipsę, quę solius Cretę putabatur indigenę. Ceterum, *μυρσίνη* *τριφύλλη*, id est, minora cuncta, sanè potius intelligendum de vniuersa Fraxinella, quàm de eius foliis, quę minora sunt, eoque à Plinio Terebintho scitè collata: ne nunc ad toties iteratam literulę in *μυρσίνη* & *μικροῦ* vocẽ, commutationem pronocemus, vt triuiali argumento Senensis, ne sit locus. Huius ad venenata non temerè vsũ sunt practici radicibus, quę etiam nũm in officinis multi commodi sunt: foris admotę opis epispasticę, intrò verò sumptę, non modò venenatos succos, sed etiam putridos & scetentem illuuiem foras exigunt, decantato Agyrtarũ & quotidiano in pueris experimento, lumbricos funditus omnes interimunt.

FRVTI-



Osteaquâ cœpta via prolixissima simul & ope-

rosissima, herbarum necessitudines & gentilitates in suas classes redeamus, ac pen-
jam opinionum salebras emensi, Herbariorum tenebras diffusissimam reliquum est, ut
quoad eius fieri poterit, fruticum, arborum, & vtriusq; antiquis constitutionis plan-
tarum comparationes, ad easdem Philosophia leges exigamus. Orsi quippe sensuum
indagine à simplicioris munusq; operosa natura plantis notissimis decet nos, uti fecimus, per notas simili-
tudinis & cognationis, ad perfectiora, quasi cūposiora gradum facere: quibus tandem præceptis, encha-
mur ad ideæ principiorum: unde fontes scaturiunt certa & subdæ cognitiōis facili-
tas: ut & usus. Est enim hæc particularis plantarum enarratio, quasi quadam acrium pictura: quam nisi acuerat intuitus
fueris, frustra cognationem earum profiteris. Sed cum herbarum, fruticum, suffruticum & arborum na-
tura, non videatur forma generica distare à se ipsa, quando easdem plantas videas, herbas prunellam,
deinde in frutices, demum in arbores abire: & contra, hæc in herbarum modulū peni-
desicere, nec muta-
tata effigie totius vel partium: huic cognitiōi melius consultum putauimus, si interdum nonnullas per-
quam similes frutices aut arbusculas incrementi anticipiū inter herbas adduceremus, & alibi frutic-
tes herbas cognatas, arborum explicationi relinqueremus. Iam verò plurimæ fruticum parti, cui maxi-
ma cū arboribus necessitudo & similitudo est, non erit opus multa designatione, tanto minus arboribus,
ut quas occursus frequens, diuturnitas, magnitudo, & omnium stirpium iam prægressū comparatio,
turbet manifestas reddeat.

Lentiscus.

Terebinthus { maior Latifolia Norbo,
minor* Lentiscifolia.

{ Obseuriorum,
Coriariorum.

Rhus

{ Plini.

{ Plinij alterum, Cotines, Theoph. &
Coccigria.

Pistachia.

Gleni Unguentaria.

Lilac.

Staphyloleandrum Pl.

Siliqua, siue Caroba.

Cassia Solitaria.

Asminum { vulgare,

{ luteum, Caruleum.

Balsamum, Carpobalsamum, Xylobalsamum,

Sorbus

{ domestica

{ Sylvestris } Alpina.

Fraxinus.

Nax iuglans.

Nax peregrina Indica.

Zizipha candida Montpel. perperam Venetorum

Sycomorua, an ASARADARACHI Auc?

Vaccinia rubra & nigra, an Idaæ radix?

Vaccinia palustra.

Sagel Germaniorum. Gold Angl.

Chistus omnis.

Chistus Læd species folio Pannua.

LENTISCVS.

Lentorem foliorum attritu quilibet percipit, vnde Lentiscum dicunt, partim etiam
è Græcis mutuati, qui ὄξινος, quasi ὄξις, aut ὄξις vocarunt, quod facili & frequens
funderetur in dentiscalpia, ad nitillam alboremq; dentium, vt etiamnum sit hodie. Fruti-
cat & arborefcit stolonibus & caudice concolor & similis Therebintho minori, sed bo-
tris & veris initio ex fulgo purpurantibus, maturefcendo nigricantibus acinis, nitidis, Su-
machij Phylereæ, & Samhuici: vtriusq; folliculis siue oblongis, rotundis, aut incuruis, tereti-
bus, quibus insut culices & effigies ite Terebinthi, adeoq; flores similes, racemoli, musco-
si, quos primo vere Aprili mense promit, non particulatim, vt putarūt ex Arati & Cicero-
nis versu, Lentiscus triplici solita gr. vnde feri feta, quod Theophr. merito Scille attribuit, hi
autem vocis affinitate decepti, Lentisco. Quare non esse contemptui habendam nomen-
clationum perpenfionem, alibi iure asseuerabamus. Semper virētes autem Léntici feracis-
sima vniuersa Norbonensis ora maritima, quæ ad Taurinorum iuga, quæq; ad montes
Mm. ij. Pyrcneos

Pyreneos protéditur. Illic namq; Lentisci, Rosmarini & Lauendulæ virgultis ac cremijs, quàm quouis ligno magis ad calcifienda clibana vtuntur. Nec præterquam vnam norūt speciem, quam *Resinice* vocant. Ideoq; fallitur & fallit Senensis, quòd pumillas refecit Léntiscos, alias à procerioribus specie facit: sit enim tantùm refectis cymis ad vsum, ne in arboris æmulationem assurgant. Et hunc errorem cumulaui inscitia, cùm vniuersâ plâtam grauius olere ait: at nobis alijsq; studiosis saltus & colles aridos Norbonæ peragran-tibus, inserta in osolia, non modo suauiter spirabant: sed etiam, quod fortè nescit Còmentator, sirim arcebant, & fauces humidatuebantur. Itaq; nobis silētibus, qui norunt Mastichen, & sciunt Lentisci furculos, vt Xylobalsani succedaneum in Officinis vsurpa-ri Léntiscinisq; dentificalpijs post epulas dentes emundari, illius resellunt & ridebunt còmentatinē. Porro quomodo & quamnam ementiâtur Caphuram hodie Veneti mango-nes, in succis Medicatis docent.

TEREBINTHVS Lentiscifolia minor. *TEREBINT.*
maior Pistachia folio.

Terebinthi lati-
folia species.

Polucella siue
Culices è folli-
culo.

Folium Tere-
binthi minoris.



Coccinz racemorum bacculæ aut acini rubelli similes & concolores quadantenus Ciceri, nomen Terebintho potuerunt fecisse: nam igitur Græce Cicer est. Huius autem semper-virentis & perpetui folia, nullus collis aut deuexus paulò apricior Norbonæ aut Galloprovinciæ non feracissimus vbi duas folio tenus disciendas meminimus. Frequentior quippe est angustiore Lentisci positu (non Fraxini vt Senensis) colore & habitu, folio duplò maiore.

Alteri autem folia multò latiora, rotundiora, vicina Lauro & Pistachia, adeò vt eminens intuentem fallat. Vix vtriq; zedem, acinulis quàm Lentisci maiori-bus, coccineis, purpurantibus: demùm ex viridi in ceruleum maturiscentibus, non per initia (vt putauit radiatus Apollo) flore Léntisci aut Sumachi racemosis: folliculi cartilaginei, teretes, aut co-

nici, angulosi, vel sphærici: vnde culices è fuliginoso excremento euolant, succo salinari ad Balsama laudato, effluente. Vbi latiores, & adulescentes sunt arboream proceritatem affe-ctant: & ferro vlnusculis factis in Valena Sylua Monspelliensium, sæpius nobis non pau-cam Terebinthinam extillarunt lucidam.

RHVS Obscurum & Coriariarum quid.

Color item coccineus flâmè siue acinulorù in racemulis nomen huic fecerunt: eous autem (eouso interpretantur vnde Russus vox Latina, & raux vulgo Gallorum, Acidulæ autem racemi olim, & etiamnum hodie ad condimenta, multus in culinis vsus: eoq; culi-narius siue obscurarius vocabatur. Cortex autem & folia alutarijs ad pelles dēfandas cò-quisitus, vnde Coriarius dictus. Quare non sunt vt falsò produnt duarum plantarum, sed vnius arbusculæ partes: hanc multò proceriorem quàm Dioscoridis sit, penè Sambuci maioris magnitudine, ferunt Monspellio & Castronovo contermina. Oliueta quædam glareosa & mæilentiora. Sorbo vulgari adeò similia sunt folio superficie & positu, vt vix sit internoscere, nisi attentius perpendenti. Locis Galloprovinciæ aridioribus & rude-rosis, desitis inculitis pumilla, & quanta qualisque apud Diosc. descripta bicubitalis ar-buscula, visitur.

RHVS Plinii Myrsifolia Mon-
speliensis.

EODUM ex vfu ad coria firmanda,
nō de femine, duo frutices apud Plin-
nium Rhus dicuntur: horum notissimus
& vfitatissimus cunctorum Norbonæ, præfer-
tim Monspeliensibus, apud quos vberè
ad Lani amnis crepidines fruticat, vir-
gultis ramulisque quadratis, frequenti-
bus, viridatibus, folio Rusci, Myrti, aut
Iuiubæ. Seminula intra angulosam tuni-
cam thecā inclusa sunt cochleata, Ca-
li modo malto minora.

COCCIGRIA Theop. Corus Plin:
& Theop. Rhus alterum.

Κόττωι sunt circivæ flocci, quales in galeis,
aut galligallinaei vertice visuntur, qua de
similitudine floris, dictus fuit hic frutex, qui
è summis virgultis, quinum cubitorum altis,
pulcherimum lanitiū tollit, Sericeo vellere
& contextu calamistratum. Quod crispatur &
explicatur in latam cesariem, crinibus puni-
ceis, fuscis, tortilibus, semine Lētis minore, ex
nigro rufescente; caudice & virgultis fuscis,
vimineis: foliis circinatis, densis, rigidis, Cas-
paris, Pistachiam aut Terebinthum redolen-
tibus, & concoloribus. Auraico agro quatuor
milliaribus Aumione, qua Insulas & Aquas-
sextias itur, magnus prouentus est: Vidimus e-
tiā in agro Veroënsi, Venetiis, ex locis Histrie
alpinis. Quò magis miramur, tantę venustatis
stirpem frequētī vfu & mercatu ad coria cu-
randa expetita, indicatam fuisse Cōmentatori.

Terebinthus Indica Theop. est Pistachia Dios.



Anuculis Pi-
ceæ strobil-
los imitanti-
bus ὠστῶναι δι-
ctæ, Istodie sunt Officinæ notissimæ, & edi solitę: non secus
atq; Pinæ vefcæ sunt: porraceo colore intus, mēbranula exte-
ma & cortice amictę Auellanz: Arborem qualē in hortis It-
alicis vidimus, etiamque in horto Graui seduli Pharmacopœi
& stirpium percupidi, ad Londini mœnia, prorsum di-
cas Terebinthum, ramorum & foliorum ortu, habitu, ma-
gnitudine: flores item racemosos purpurantes Terebinthi
edunt in Italia, & Galloprovincia, vbi seruntur, sed maturi-
tatem non assequuntur.

M m. iij.

LAN



PERUAM vtilem arborem istam Aegyptiis Arabibusque debemus, à quibus, aut ab illa odorata, est nomenclatio profecta. nisi sit nazus Græce, quod coriaceum vocant, quasi sit coriacea ipsa siliqua insignis, quam nullus non nouit, cuiusque si femina lata, quæ intus transuersis membraneis aluolis dissepuntur, seras, prius inacerata in aqua frigida, & terræ infodias, videbis planè ortu totoque ipso habitu Carrobiani imitari. Flores lutei sunt, Chelidoni minoris, odotici, plusculi, vno exortu, senis aut septenis foliolis radiati, quales multisque perquam raras vidit & attulit ex Insulis Americis & D. Dominici, exercitatisimè cognitionis periculis D. Iohannes Brion Hoppeuilleus Northmanus.

GELEMINVM vulgatum, flore albo.

CONCINNIOREM quàm certioremsciuit sibi appellationem de sententia quorundam doctorem, quibus Isane dictum putatur, quasi viola odora, quia oleum apud Persas olim solitum esset istius floribus imbui: quod tamen grauius spirat Dioscoridi, eoque arguit non esse nostrum Gelseminum. Et violæ vox, laxior multo est, quàm vt certam quampiam plantam designare valeat, nedum hanc quam Mauritani Zambac & Gelseminum dicunt: vbiuis in hortorum angulis apricis, & pro prædiorum caudibus furculo pangitur, adque ornamenta pergularum, industria & pedamentis erigitur ad fornices. Folia sunt in imo latiora, lateribus vtrinque reducta, acutiora supernè quàm Lentisci: flores albi vt plurimum, Polemonii, in flexilibus prolixissimis virgulis octo & decem cubitorum, Clematidis alteræ ritu, Patavina & quædam Gallica vireta luteum habent. Sunt qui coruleos flores fundere dicant. Luteum semen habet, Polemonii minus, rubrum, aut nigrum, nil habet memoria.

BALSAMVM.

PRO Diofcoridem vires melius quàm surpem notam habuisse: de viribus namque multa, de figura nihil. Hanc sic amici nostri oratione referunt: Humilis est frutex, aspectu deformis, cineracei colotis, flore pusilli: siliuini lutei simili, minore, perpetuis virgis, folia horna exiit Decembri, quibus non nisi mense Maii noua sufficiuntur. Cari atque Babilone satà viget. Decembri mense ramuli præciduntur quibus ceta oblitæ appenduntur amphoræ, excipiendo aureo liquori, qui moschum sapit. Hunc nosse non difficile, sed vbi noueris longè difficilimum habere. Opera danda accuratissima, quò eius vires quàm exploratissimas habeamus, vt quando non licet illo frui, saltem bonitate proximis & simili facultate præditis vtamur. Tribus huius plantæ partibus tria succedanea est meditata posteritas: Liquoris namque loco sua Balsama vnguinâque vulneraria nostri Barbari in thesauris habuere, quorum mirificas vires literis & experimentis prodita sunt. Lignum verò, quod Xylobalsamum dicunt officinæ, Lentisci sunt furculi, plerumque carioli, tamen neutiquam contemnendi, modo recentes sint, nec odorem amiserint: gratissimus namque pulvis intus & foris, stomacho, propter naturæ amicam temperantiam: cuius argumentum faciunt dentis calpia, quæ aromatica & moderata astringitione & calefactione dentes, gingiuasque perpurgant, roborant, & mulcent. Idcircoque eorū multæ myriades parantur à miseris mancipiis, qui in tremibus Lygurum sub netuo vitam degunt. Pseudoxylobalsami huius magna copia paucæ are parari potest ex Italia & Gallia Norbonensis. Sic semen, id est, Carpobalsamum officinarum, cum neutiquam fructus Balsami sit, imò cuiusnam plantæ, incertum sit, rancidum, victum, exoletum, inodorum, minimè Carpobalsami loco usurpari debet: quin potius huius penuria, semen Terebinthii, vel Lentisci immaturi eximæ vires, omnes Carpobalsami facultates, & odor, vt si quod aliud, explorare mihi videtur. Quin Terebinthii è pullulantibus botris atque flagellis tempore verno laticem limpidissimum, odoratissimum, non parum tenacem emunximus, qui digerendo, glutinando, doloremque mulcendo, omnia quæ Opobalsamo insunt, confert videtur. Quod non modò doctiorum antiquorum, sed etiam Barbarorum Barbitonorum consensus sequutus est. Nullum enim videre est ex illis vnguinibus, quòd viri præstantia nomen Balsami meruerit, cui non sit admixta Terebinthina vulgata: Quid putas futurum, si genuinum Terebinthii liquorem admiscuissent, qualem descripsimus Capite de Terebinthio? Ea de causa nullum præstantius succedaneum arbitramur, cuius omnes partes omnibus respondent

NON PERFERAM quædat huic Idæ plantæ veteris horum fruticum aspectu Myrtum aut Ruscum illicò referentium, vnde Pharmacopœi cum plebecula quasi Myrtillis vocarunt & vsurparunt, astringunt etenim & exsiccant ambo, nonnihil refrigerando, quæ omnia appositè quadant Idæ radici, cuius fuit potissimum vsus, cuiq; nomen inditum à monte, quia non nisi montosis locis & accliuibus arduis calidarum regionum, quibus saltus & nemora frigidiorum plagarum respondent vtplurimum. In Anglia, Belgio Gallia & Germania, seu enç inaccessis Tridentiq; alpihus vtrumq; fructum cistauimus. Sed virent initio, deinde rubent tandem nigræ bacce suauiores maturitatem assequutæ vineo succo turgent, prædulci gustu. Proxime folia lignosis furculis crebribus sarmentosis multi hærent: floribus Ericæ aut Vuedonis minoribus, pallentibus. Radix lignosa multa edit virgulta, pede altiora. Folia virent obscure, effigie Myrti aut Rulci, rotundiora, molliora, sed Hyeme decidua.

VACCINIA rubra.

Idem natalibus Rubræ frutex latiore & habitiore aspectu semper vitet: non perindè vt nigra, frequens, nec tamen nigræ dissimilia folia, sed paulo maiora, & ad Myrtum albam siue maiorem & Rhus Plinianum accedentia rotundiora. Bacculæ non minores nec dissimiles sed rubræ, astringentes magis, nec perindè succulentæ. Radix æque lignosa fibris serpit Erica ritu, Flores oblongis caliculis paruulis subpurpureis apiculos è mediis exerunt.

Palustria VACCINIA.

Sunt etiam parum frequentia alibi quàm in Germania & Bataniæ paludosis & maritimis hæc Vaccinia, quæ Iohannes Cuthmanus Mechliniensis, vocatus de Vroede, alinc Antuerpiam nobis primùm adferebat non dissimilia colore, longiore tamen & nonnihil turbinata figura, parua lachrymam Iob effigiente, in viticulis sarmentosis exilibus quamplurimis humilibus breuib; foliolis Serpilli minoris, vel Herniarie. Interdum bacce quæ tubræ sunt maculose puncta visuntur, acerbi astringentisq; gustus. Hanc cur Com mentator Ericam bacciferam indigitet, neq; causam dicit, neq; ratio subest, neq; quidquid Ericæ illi inest. Exilitatem quippe foliorum, esse vagam notam quàm plurimarum plantarum Ericæ valdè dissimilium, & hanc refrigerare & humectare qui aiebant seuensem merito subsanabant: calida enim, valdeq; sicca Erica est.

*Sagel Germanarum vel Gold Anglorum Myrtum
Brabantia quibusdam.*

IN Ericetis vmbrosis, nemorosisq; saltibus fruticat multis ramulis ab imò, alterno exortu ab radice lignea flexilib; duris fuscis Vacciniæ superioris. Folia punici Chamæx paulò latiora. Seminum crebri racemuli conferti & conflati quasi spicis post pusillorū, luteorum florum pallentium Lapsū appatèt: in quibus semen pingue odorū Stachadis citrinæ vehementius, & trifolij odorati quadàtenus simile. Iunio & Iulio Anglæ mulierculæ veniū adferunt ramos florantes ad concinnanda ædiū, conclauia & triclinia suauis odore quem halant flores, imbuenda. Adduntur etiā idē flores potioribus cōfuetis Septentrionalium, penuriam Lupulorum interdū resarcituri. Interdum ad hilaritatem bene potis conciliandam: ferit namq; caput latiore temulentia Sagel



ad euerficandam animalcula, quæ eius odore fugantur sufficiuntur quædam loca & suffulciuntur summitatis vestes.

CISTVS mas, Fæmina, & Cistum Ledon.

V Eluti hederaceus folijs circinatis atq; rotundis *κίσε* videtur vocatus, & quia non erāt læua, nitida, sed potius squabra & pannosa *κίσε* dicta. Vniuersa plaga quæ ab Eridano amænissimo ad Rauenam, quæq; ab Hetruria ad Massiliam, frequenti ornatur Cistum Mari vocato, Fæmina & Ledo, quæ importuno penè prouentu in collibus macilētioribus, exuētis Norbonæ nasciuit. Vtriusque eadem facies, sed fæminæ rotundius folium & minus nec adeo squabrum aut lanuginosum: flos etiam roseus, sed decolor & obsoletior minore frutice tota, sesquicubitali & cubitali, Mari verò longius, maius, hirsutius; caua pubens folium, quadantium Saluæ, roseus, Cynorhodi flos.


Sedenim Ledon cui frequentior Hippocystis adnascitur, folia admodum angusta, tangenti glutinosa & squabra, nigriora Roniniari culti, paulò latiora: flores candidi fæminæ Cisti minores omnibus, semen in triquetto & tricocco pericarpio, pusillum Hyocyami.

CHISTVS LEDON *latifolium.*

P Ræter hæc tres semper virentes, rarior species, est quædam Ladanifera, virgis surculis. folijs multo crassioribus, latioribus, longioribus: Sumachi Plinii aut Rusci modo fruticæ, semineitem tricocco: multa nasciuit quopiam in môte celsissimo agri Isterilis Sauenæ, cui nomen S. Colubæ. Alioqui gustu Cisti Ledi, & fragrantia grauiuscula.

Hanc demum monuit nos se habere flarentem Coldenbergius. Semine & flore alterius Cisti.

Caudici ad radicem Ledi adnascitur Hippocystis, frequens Galloprovinciæ & Norbonæ, sobole fungosa, ex luteo in puniceum Granati bicolis genimante, cætero Hypo sparti & Otobanche æmula.



Hippocystis.

Myrtus maior baccis nigris oblongis seretibus.

Myrtus maior baccis albis.

Myrtus minor.

Buxus.

Lycium sive Pixacantha Norbontensium.

Malum puniceum.

Lignastrum.

Phylerea maior Oleastri facie } Norbontensium.

Phylerea minor angustifolia }

Phylerea arbor an Macaleb Arabum?

Bau gessine Monspeliciensium.

Olea.

Olea syl.

Salix { Oleaefolia.

Latifolia.

Americana.

Salix humilis repens.

Persicamalus.

Nux Myrsifica.

Arbutus.

Lacum

Larvis vulgarior duplex.	Pencire, Adami poma.
Larvis Tuius.	Limes.
Arantia mala.	Canella folium.
Limonet.	Cinamomum.
Citrcum malum.	Macer Græcorum.
	MYRTVS minor.

VOLUNT sic vocatam propter Myrrhæ quandam æmulam odore gratiam, qua pollent semperiuirentis Myrti bacculæ. Est autem minor. Officinis notior suis baccis, adeoq; tota hortis Septentrionalium delitiæ & ornamentum est. Fruticat virgis tonsilibus, rectis, flexilibus, nigricantibus, effigie Buxi, folio minore, sed Rusci mucronato, baccis nigris Hederæ, vineum succum pressu remittentibus: eis post vindemias saginantur aues, tamque suaves ededò fiunt, vt integras, nõ exenteratas esitent, eòq; prouerbio feratur, sterus earũ prestare carnibus, in Galloprovincia maritima, vbi siccaneus collis nullus, cui arideat paulò placidior aura, vbi non multa vernet hæc myrtus. **MYRTVS Maior.**

VBRIUS illic etiam fruticat hæc, propter baccas, lagenulas effigiantes, maior dicta: folia item maiora Phylereæ aut granari minoræ: floribus item albidis & superioris similibus. Alterius modi ex hortis Franciscanorum Venerorum habuimus folijs albidioribus, & fructu albo, pari, & simili, nec alioqui ita diuerso, illic alba Myrtus vocata. *Varietas.*

BUXVS.

PERPETVI folia etiam buxus, siue *ωύξ* Græcis vocata, vt ex qua tabulæ ad scribendum fiebant, *ωύξ* dictæ, vnde & pyxides. Nulla autem magis quàm hæc gliscunt montes & colles in Delphinatu & Galloprovincia. Quibusuis etiam alsiosis ad Septentriones, cliuosis, incultis frutescit & arborefcit, prædens rigidis virgultis & ramis admodum foliosis, graueolentia & ad myrtum similitudine cognita facilibus; luteus siue buxeus ligni perquam solidi color: bacculæ tripodes, coronula denticulata insigniuntur, Myrto alioqui non abfimiles.

Lycium, siue PYXACANTHA Norbomensum.

SOLITVM fuerat aduehi Lycium ex Lycia, vnde nomen illi: verum quid sit hodie norūt perpauci; nec tamen pigebit (quod nos vsus docuit & coniecturæ adeo vero similes, vt verisimiles credamus) hic addere. Est in Prouinciæ Norbonæ plerisque locis arbuscula Oleæ syluestri similis, Arbuti magnitudine, folijs Oleæ, sed breuioribus, rigidioribus, rotundioribus, minoribus; caudicis foliorumque viridi, obscuro, satiore colore, subfulso, spinis crassis, atque rigidis, præduris. Baccæ sunt vt Phylereæ maioris, sed rotundiores quàm Oleæ, succo subrubro, Oleaginoso, vt Phylereæ: qui succus amarus, ingratisimus, accensus, cum strepitu quodam flagrat, exinctus rubet. Hanc tamen præ se vndique ferat Lycium, ramen non auderemus asserere eandem esse: Id tamen audeo dicere, vix maiore posse vsurpari commodo Lycium, quàm istud nostrum: & posse longè propius, aptiusq; subdi illi quàm Amurcā: habet namque vires digerendi, quadam cum astrictione. Quod si non sit Lycium; fuerit sanè species Oleæ syluestris, cuius Amurca omnium præstantissima, vice Lycii est; nam quò minns pinguis est & oleaginosa, eò melior: Nocet enim oculis; præsertim olei pinguedo, vt docet ratio Physica. Valde putamus Senensem exercitatum apud declamationes, aut lationes oratorias Quintiliani: nam vt illic Methrodorus vltur imaginibus, pro locis; sic is non modò iconibus abutitur, sed etiam Anguillaræ & aliis doctioribus vera monentibus conuiciatur.

MALVM PYNICVM.

LVBERITER coniectatur *ῥῆα* dictam ab acinorum colore Cythiniq; & Banlausti aspectu roseo: etiamque ad Rhus, de quo superius egimus, quadam similitudine, & vsu, in culinis, ad coria edensanda, non diuerso. Sponre arboream magnitudinem assequitur sylvest. in Italia Hispania & præsertim Mauritania, vnde pulcherrimæ feruntur allatæ, Punico item cognomine: Septentrionis celi non fert, nisi ægrè & in hortis: horto Regio *Wassmes* floret quotannis, Belgio & Francia, gigartis ipsis terræ mandatis, germinare in arbusculam vidimus, Myrti rotundiore fronde. Pomum ubique citatur, anguloso acinulo, dulcis acidi, mixti viniq; saporis, deliciis & medicamentis expetenda.

*Ger. Grenae
seppel.
Gal. Pommes
de Grenades
& Mygraines.
Ital. Melagrano
pomo Granato.*

DE florum speciosa fœtura Cyperus dictus Græcis videtur, *καραζω* enim floreus est, quod alluisse visus est Maro ubi *Alba Ligustra cadit*, canit. Nulli a uteni calidiorum aut frigidiorum regionum hæc hodie deest, semperuirente frõde Oleæ, atriore, latiore, molliore, horrorum septis & areis accommoda, & ronsilis: flores muscaceos, candidos, odoros, ceu vuz oblonge rudimentum edit Aprilis & Maio in lætioribus Galloprovinciæ conuallibus, aut colliibus Angliæ non perinde strigosis, Septembri: racemuli: Lentiscis, aut montanæ Sani- buci, quos Auicenna esu sanguineum lotium, aut potius colore cruentum ciere dicit: quod præstitisset quibusdã refractariis experiri, quàm istud Ligustrum verum esse inficiari: gustu autẽ & facultate astringit. Quæ ramẽ nomine Alkanæ afferuntur assulæ, vel bacilli, ex transmarinis Africæ emporiis, Juteo sunt intus ligno, eoque si crinem (vt videtur Auicenna ex Diofcoride velle) ruffant, sunt sanẽ aut melioris notæ Ligustri, aut diuersæ plantæ.

PHYLERÆ due Norbontensis Galloprovinciæ.

FRONDOSA millam ramis patulam Theoph. *Φυλλεῖα*, ex qua Phylluræ, siue assulæ fi- duntur, Tiliam esse, non hanc, certum est. Sed germanitas vocis imposuit doctissimo interpreti Diofcoridis. malim tamẽ legere *Φυλλεῖα*, siue Oleæ amasiam istam, quam Diof- rid. describit, & nos pingendam curauimus, percongruam descriptioni, & Oleæ non mo- do similem, sed etiam sociam, vt ab oleastris, quibuscũ frequẽs reperitur, nihil serẽ discrepet.

PHYLERÆ minor.



Huius autem duo modi arborefcunt in Galloprovinciæ viarũ marginibus, & oliuetis Ma- filiz vicinis: & quæ maior, rarior, per similitis pumillæ oleæ, caudice ramisq; nigrioribus, lon- gioribus quàm oleæ Agrestis, & folio magis Ligustrum accedentibus: bacculz multæ in ramis, etiam oliua agrestis minores, non amaræ (vt oliuæ) sed subdulces, nucleo intus Cerasi. *Minor* multo frequentior iisdẽ natalibus & Mõspelli colliibus glareosis: folio equẽ longo, sed angustiore duplẽ: duploquẽ minor tota planta. similes acini Lentiscinis, & si- militè racematim proximè herentes admodum curto pediculo, quæ item mature subdulces sunt, aliquantũ acres, sed neutiquam ingrati, vt sunt Oliuæ satiuæ & agrestis


Senensis

PHYL.
Minor.

Senensis infarcit plaustra verborum autoritatum, nec tamen quam dat describit.

PHYLERA ARBOR Gallo-
provincia, uerius **MACALEB**
Serapionis.

Expressam de viua arbore hanc iconem, prorsum refert prior maiorque dicta *Phileræ*: reperitur in Galloprovincia prope Tholonam, æquat scapo & sparsis stellonibus Prunum aut Cerasum, folio planè *Phylerez*, aliquantum latiore: flos Illicis muscosus, albidus & plusculis vna aceruatis baccis Terebinthi maioribus, nigricantibus, herbidis, dulciculis nucleoli intus crassi: quales prorsus prostant hodie in Officinis nomine *Machaleb*. Et certe si *Ligustru Serapionis* sit *Machaleb*, erit hæc illius *Ligustrum*, non illa quam *Matholeus* dat nec describit.



*Diffidentur
hic multi flores
congesti in bacculis,
quas pector
amissis.*

Vulgo *Morspellienfium* **BOVRGES-**
PINE perpetuò virens, æt **A-**
PHARCA Theophr.

Frontignanæ Linguægotiz Illiceta istam arbulculam frequentem pariunt: cui facies & habitus superioris *Phileræ*, sed Illicis adolescentis folia: rigida, rotundiora, latiore quàm *Olea* ambitu, tantillum denticulis aspero: muscosis, numerosis, racemosis, Lentisci flosculis, subter folia aggregatis: Baccule sunt *Lauri* Tynni didimæ, bino veluti gigarto vix cõflatæ: furculis ramisq; magnitudo & habitudo etiam Illicis: gustu amaricat folia, & tantillum astringunt.



Nn.j.

OLEA

HELLADI Athenisq̃ue Græca accepta ferenda appellatio Ὀλέα enim primum vocavit Minerva, quæ arbore Oleæ, præstantissimo quàm potuit munere Atticâ ditavit. Huius lucos perennes densissimos & amœnissimos alunt apricæ tepidiores conualles Hispaniæ, Galloprouinciæ, & Norbonæ, vbi in Monspellij vinetis duplicem perquàm nobilem fundunt laticem: nimirum oleum, bacca callo: & mel, siue Elæomeli, quod mirum dictum, sed verissimum, caudice vulnerato: de quibus cum lachryma oleæ Æthiopice, in succis dicendum, Eleonidi iam memorauimus in Manna. Bacca caro callusue immaturæ virefcit: nigricat autem nitior cuticula maturæ: elegatior ad Frontignanam via, ex purpureo puniceant, rariore hæc alibi: Fronde exit flaccidiore, latiore, & ferè Saligna, in solo & cælo Septentrionali, vbi nihiloscus perennis viroris est, Londini in vieto operis & stirpium nouitate visendo, Cæcilij regni florentissimi Angliæ incomparabilis tum sapientiæ, tum eruditionis Nestoris, Amurcæ siue fœcis, quæ oliuæ effractæ atq; expressæ fraces sūt, efficaciam eodem relegamus: hac autem non lubenter carerent Medici, si quot & quanta ad morbos quàm difficillimos curandos præstet remedia, scirent: nec enim vel Lycio vel Acciæ cedit, quin potius quibusdam viribus excellit.

Varietates.

Amurca.

OLEA Syluestria siue Oleaster.

Q Vos vnquam meminimus spontè arborescentes olearū frutices, duntaxat magnitudine & habitiore corporatura videtur distare à satiuâ, quâ hæc profusè ostendit, nõ secus atq; Prunella Prunum satiuâ, altera quippe in alteram, trāsmotione aut inoculatione, aut neglectu abit, rigidiuscula enim fit Oliua, impexo atq; horridiore aspectu: interdum feticosa, quando in saxosis desitis, eius radix pastinatione non diffiatur, aut nocitura pululatio, & feticosa ad caudicem soboles, non interlucatur. Quare huius non effigiem, quæ alioquin eadem superiori est, sed vires, vtpotè in ficiore adultæ loco, vt magis astringētes, terrestres, vegetiores dicit Dioscorus: folia duplò minora, Phylereæ, sed subtus glauca: fructus numerosior, similis & par Myrto maiori: flosculi racemosi, candidi, odori, Lambruscæ foliati.



SALIX.

GLISCIT OMNIBVS VDIS AQUARVM POTRIX ET AMATRIX salix, à saliendo Latinis, veluti Græcis τὰ δένδρα τὰ ἰατρικὰ, quia ocysime quasi saliendo in incrementum eat: Oleæ fronde latiore, glauca, auersa, amara, supernè virente, floris

floris vice lanitium amenti sesquiunciam oblongum & teres propendet, nec semina per-
da semper est, vt Homerus vult, quia alicubi semen excipitur & satum oritur.

Platiphyllus

Plerisque non adeò depresso lubentius oritur quæ vocatur *Platiphyllus*, ea cinerea est
magis, folio latiore, inlo siue catulo hirsutior, breuiore, Salicis amerinz vimineis vir-
gis, cereæ flexilitatis & coloris, aptissimis ad quas illos texendos; fronde longiore *Lysimachiz* purpureæ.

SALIX humilis, repens.

PRÆTER vulgatas Salices est quædam humilis, ser-
pens humi, pedem & sesquipalmum alta: foliis par-
uulis, Myrti minoribus; flores amento *Musco* in pu-
bem auolante, cani. *Montibus Sabaudiz, Lugdunensi-*
bus & Vegenis multa, aspectu decora.



Ἀνιάτρον *THEOPHRAS. sine*
Agnus Castus.

VEL VT Salicem frugiperdam, sic ἄτρον, siue castum hanc vocarunt: quòd vtra-
que, frigidityte quapiam Venereos prolificosque seminis spiritus videtur enecare, aut
eneruare. Hortensis est Europæis, Italis, Gallis, & Anglis; tametsi amantior sit agri cali-
dioris: Expandit in pediculis frondes digitatas, plurimum foliis septem, Salignas, Lupini,
aut Ricini posita: in ramulis summis Lauendulæ concolores flores, & alicubi albicantes,
vt in Cœnobii Itatorum funecinctorum, qui virgarum cinctu ad Venereos frenandos in-
sultus, quasi Amuleto, hac freti erant: tametsi semen Coriandro par, nonnullis esitatum
libidinis inciet impetum, non secus atque Ruthæ semen, nonnullis adimit.

ONAGRA,
sine Mulicbrata

BELLVARVM, cum fera rabie corda tument, domitricem hanc & demultricem in
Apenninis iugis & plerisque Alpibus, ac in ipso Veronensi Bado sciscitati sumus, num ini-
bi vsipiam comperissent: sed id responsi tulimus, nullam repertam plantam, quæ quadret
Onagraz, præterquam *Rhododendrum*, *Sambucum montanum* & *Laurum Thynum*.
Se facile deprehensuros si ea occurrisset, ex radice odore, foliorum florum luculenta magni-
tudine. Et certe non ea fuit negligentia Guinis eruditissimus & strenuissimus herba-
rum venator, vt si veram innouisset, tam raram, tamque expetendam, non & cultu in
hortis, & literis posteritati propagasset. Aiunt amici eruditiores, hanc esse *Lysimachiz*
speciem quandam circa *Lugdunum* oriundam: at ea herba, non arbor est.

PERSICA
Malus.

Germ. Pfersich
baum.
Bel. Perschebo.
Ang. Percheret

VULGARIS *Persica* solo mutato & venenata vi, patrio nomine notissima hodie
est arbuscula, qua consistunt pleraque omnia Europæ vineta: fronde Salicis est, aut *Per-*
sicariz, *Amygdali* item flore. Poma succos oblita priores venenatos, iucundi odoris & sa-
poris, nec insalubria sunt. Carne foris succulenta, pube albida obducta, sublutea quædam
albam pulpam habent. Lutea tota alia præstantissima: non pauca sanguineo cruore ma-
dent: omnibus Labyrinthis alueolis sculptis; amaro iustus nucleo.

AMYGDALVS.
Germ. Almandel
baum
Gal. Amâdiar.
Belgie. Aman-
delboom.

VOCANT *Amychas* Græcè putaminis *Amygdali* maturæ rimulas, hiulcâsq; fissuras, quæ
les autumno vbiq; cernere est in *Galloprovincia*, *Delphinatu*, vbi consurgunt planities

patentissimæ Amygdalo arbore, cui facie, fronde similis, & par Persico, procerior tamen & frondosior. Egrè floret Aquilonio cœlo; tametsi in Anglia maturat interdum nuces. Hę interdum peramaræ natura, cultu dulcescunt, esculentæq; Theop. & nostro tempore.

Moscata NVX, sive Myrsica Macis Arabum & Officin.

AFFINEM fronde & fructu Persico esse arborem nucis Myrsicę, quam frequentem habent insulę Orientis & Moluscis, vnā referebant, qui attulerunt eandem nuces decerptas suis manibus amici, & triplici cortice protectas, quales conditę prostant in Officinis, & posse nostro cœlo assuescere negabant. Tota vescendo est condita: nam callosum extimum putamen est, cui proximè subest Macis Officinis notissimus; Cutaceus deinceps liber interiacet Macerem ipsū & nucem, quę est lignosa, odora & perpinguis, dum recens est, & matura.

ARBVTVS, sive VNEDO d'Arboux.

*De Macere in
Cinnamon.*

*Galeno perperā
Epimelis.*

FRONDIS Cītri & Lauri, nō tenues, vt perperam legitur apud Dioscoridē huic sunt Arbuto, quę secus montosas & Maritimas vias Galloprovinciæ Norbonz, æstate numę, rosa Fraga edit, Cocineo hilaris purpurę aspectu micantia, & quasi superbiētia, acerosis compactis partibus, comosis intus, edendoque guttur asperantibus conflata; vnde fortē nemusq; dicta. Berberidi concolor flos calyculis luteolis.

Vulgius LAVRVS baccifera Laurier.

*Laurus humilis
virgultacea, non
Baccata.*

FATIDICÆ Lauro flauescit flos, nigrescunt baccz maturę: frondes autem sempiterno nitent virore; iniectę igni fragorē edūt salis strepitu, vnde Daphne quasi Duophne dicta. Sponte multa calido solo, non nisi satū in Anglia & Belgio. Alia Gigartifera surculo, non semine oritur, hyeme in Belgio emoritur, & arbusculam tantū æquat.

*Laurus regia I.
salicornia.*



*Laurus TYNNUS cerula
bacca.*

VTRANQVS earū proflum vultu emulatur Laurus Tynnus, valdequā elegās & noua, assurgitque in arboris æmulationem. Fert Corymbaceam vmbellam multis constatam Terebinthi feminibus, aut Gigartis vuarū similibus, sed ex argenteo in cœruleum luridis. Flore ex albo purpurascente. In Valenę nemore Norbonę plurima, & plerisque locis Ceti montis, inter Coxice-ras Ilices, frequens. Premitur oleum ex bacculis, quibus valdequā lubenter vescuntur sturiones, turmatimque ad illas conuolant.

CEDRVS Theoph. cuius Diofc. MEDICA MALVS, sine
Cidromela. ARANTIA, LIMONIA, CITRIA, LI-
MÆ, & Pomum ASTRYVM.

Hanc antiqui à solo Medo Medicum, ab odoris dinina fragrantia Cedrum & Citriū dixerūt quasi Cithyō odoramentū Diuis libandū: tamen hęc in Africa fit syluestris, & Olbæ Galloprovinciæ adeo familiaris in afflatu oræ maritimæ, vt sempervirentium Lucorum amoenitate & Pomorum fœtura perenni, neutiquam inquilina videatur. Si quis horum Pomorum duo summa statuatur quali fastigia Arancij & Citrij, vno intuitu cunctas varietates discernet: Nam Arantio folium non planè Lauri, sed veluti geminum, nempe vnum in petiolo quasi pinnatim inest, maioriq; subest, quod nonnihil angustius superne videtur quàm Laurinum. Ipsa autem mala Arantia etiam cortice sunt reliquis flauiore: nā ex aureo vel herbaceo Charātiz fiunt concoloria, minus medicati saporis, succo gratiore & magis culinīs familiaria, interdū dulcia, interdum acida. Cætero Citrij generi irondes sunt Arbuti aut Lauri, sed latiores, nec pinhatæ, multis itē intercurfantibus secundū ramos sentibus: flores niuei Ornithogali aut Styracis, qui condiūt & miscētur cardiacis: aut stillatitiam dant multo suauissimæ fragrantiz.

Hac autem Citri tribu poma *Limonia* vocata frequentiora sunt, eoque minoris sūt: ob-
lōga, succo acidiorē, acerbiorē, frigidiorē. Cortice & carne magis esculentis, nec perinde
vt Aranciorum amaris, maioris ad incidendum efficacitatis. Limonet,

Deinde *Medicum* Diofc. malum, tres amplexum est varietates. Vulgatius est similis *Citrum*,
Limonio, oblonga oui effigie: Sed maiore, cute rugosiorē, magisq; caperata, odoratius est
medi catius, antidotis commendatius: Pulpa & succo in acetariis multo gratius.

Lima autem quæ dicuntur, illis duplō ferè maiores sūt, callosio carnosio corio, pollicem
interdum crasso, oblonga Cucumeris aut Melonis effigie, superficie concolore Limonio
aut Citrio: puluillis & torulis rugosis papillatim extuberante, vt Citri sapore condito, &
crudo grato. Lima,

Pomum *Astryum* Adami vocatum, è latiore basi in obtusiorē cohū rotundius tur-
binatur, vertice circulatim obtuso & quasi vmbone depresso.

CINAMOMVM & CASSIA Græcorum
XTLOCASSIA Offic.

Distincta sit fortè Græcis καρύ, quod corticem coriaceūve operimentum designat, cuiusmodi Cassiæ tubuli erant: istius autem Cinamomi, puta folia, corticem, & surculos, quæ vidimus, quæ partim audiuius à peregrinatoribus, partim & legimus, testantur esse arborem assimilem Oleæ magnitudine: adeo similitudine Lauri & Arbuti, vt quidā recentiores minus consideratē hanc fecerint cum nostra Lauro eadem, sed duntaxat solo diuersā. Iam non ambigitur, an vera extet Cassia, sed disceptatur, quid ab hac Cinamomum distet. Istud autem hodiernum Cinamomum, neq; idem Cassiæ, neq; tamen multo diuersū esse, certū est. Nam si vtriusq; ex Dioscoride notas perpendas, videbis ferè eadem esse vires, non item disparem vsum. Si recentioribus assentiaris, & exploratoribus, eiusdem arboris non ita diuersas partes esse discēs. Quod etiam percipitur de Galeno & Plinio. Nam quod vterque suspicatus est, adeo verisimile est, vt verissimum videatur: nempe, esse variz arboris, aut eiusdē diuersas partes. Descriptioni Diofc. nō magnopere attendendum: nam cum dicit varias species esse, intelligit gradus potius & varietates, etiam vnius speciei. Locuse est Arabia, nempe Emporium, que madmodum hōdie Veneta vocatur Terebintha iris & alia multa. Planta ipsa stolones exsistit, id est, rami, *καρχήλιος*, id est, Cassiæ corticis: igitur non arborem, nec quidem ramum, sed potius eius corticem describit, colorisq; notam apponit *καράδρυσον*, id est, Coralli emulam, nempe nondum perpoliti aut nirentis *σύν*, id est, angustam valde: Nam si crasso sunt cortice, tubum non valde latum relinquunt. Ideoque crassam & latam addit. Quibus è coniecturā
Nn. iij, quid

quid inter Cinamomum & Cassiam sit differentia percipi potest. Nos verò meminimus duodecim annis ferme elapsis, Cassiam ad Cinamomum verum proxime accedentē uos uidisse in officina Gulielmi Dries Pharmacopœi Antuerpiensis, in hac parte valde exercitati. Erat verò multorum iudicio surculus ille Cinamomi, bacillo solido, fractu facili, Cinamomo cortice obteſto, cui etiam dum cuticella pnillo colore obducta fuit. Folium vetò seu pictum, seu siccum multis in locis videre est.

XYLOCASSIA

Dum hac meditaremur, quidā Veneti insitiores, qui Londini negotiantur Morgano nostro, corticem, ferme pollicem crassū, scabrum, calosum, & foris līci aut Oleæ concolorē, interius verò connexum mollius superficie: odore, sapore & colore quadantenus Canellæ vulgaris, quam prorsum gustando præferet nostra: idcirco & quorundam consultiū medicorum sententia fert esse Cassiæ arboris extimum & crassissimum corticē, ut iam vnius arboris duos cortices habuerimus, quorum hic sit crassior, alter delicatior, odoratior, multoq; ad vtendum commodior. Est hic gustu astringenti, sicco, adq; sistendū fluore, ut putarim non parū oportuno. Eius interior superficies videtur à caudice arboris Canellæ auulsa, odoris præsentia nares feriens, & os manſu, complens gustu Cinamomeo. Quare non modò non deest nobis Cinamomum verum, quod conqueruntur ex Galeni descriptione, sed etiam adſunt plura quàm ille memorat: nempe illud graciliore fistula, colore fusco, sapore & odore vegetissimis, quod plurimi, hodie sit Venetus, & Theriacis ut verum additur Cinamomū: deinde nostra Canella vulgarior: postremo iste cortex iam dictus, qui nequitiam est contemnendus, oleæ caudici concolor extima superficies, quod magis fulcit coniecturam.

*Cortex XYLOCASSIÆ facie an sit Diosc.
& Ph. MACER.*

Inter superioris corticis magna fragmēta, etiam repertus est alius qui ex cuiusdam arbusculæ stipitis imo exēptus: interiori sui parte valde similis & concolor superiori est, sed minus crassus, ferè inodorus, aut quiddam iuglandis & Lauri redolens, gustu: perparū caloris glutinivæ mixti astrictioui habens, cum autem Diosc. & Galeni alitrigens sit & calfaciat, arboris cortex hic videtur.

Piper { album,
 nigrum,
 longum.
Cubebæ Offici.
Caryophylli.
Asphaltus { Rhodius.
 Rosens.
Agalochus.
Lacca.
Myrrha.
Bdellium.
Thus.
Thus Lymphidum.
Syrax.

Cotonea malus.
Ilex humilis coccifera.
Aquifolia.
Ilex arbor.
Suber Olbia Gallopronincia folio rotundior.
Suber angustiore folio.
Phellodris.
Quercus.
Cerris Plinij echynata.
Glādes Guineæ.
Galla.
Fagus.
Castanea.
Castanea equina.

PIPERIS ROTVNDI duplicis frutex, longè diuersus à Piperis longo.

Minus veram antiquis Piperis plantā, minusq; notā fuisse putamus, aut cōfusi proditā notis, quando etiamnum hodie ab istis naucleris qui magnā Piperis nigri vim ad Septentriones asportarunt, rite referatur effigies: Eam dicebat quidam eorum non imperitus esse arborem, plurimi iam fruticem aduolui solitam Periclymeni modo, ramis crebris

bus, tripedalibus. Citrij folio, magis exucto, minus nitido, inia parte perquam venoso. In prælongis racemosisq; gracilibus pediculis gemina serie racematiq; acini condūtut, vocātur hi nigrij: Rugosi sunt lauiore & sæpissime vieti.

ALBI verò rotundi, tamen si scanilis planta sit, similia nigra: tamen calidioris esse naturæ indicio est feruor, qui maior multò in albo Pipere percipitur, & carius habetur, pauciorq; copia mittitur ex Orientis, sub Æquatore, Insulis Molucia,

Piper autem Longum, longe alia planta, alia loco dicenda.

CUBEBE Offic. non est Carpesium.

Fstius Bacculæ, quæ Officinis notissima est Cubebe nomenclaturæ planta, iisdem pene in locis oritur, & paritet Hederaceus frutex describitur, folijs Myrto latioribus, angustioribus Mali Granati: acinuli in singulis pediculis singuli propendēt: fieri potest vt sit Nigro Piperi congener quando rugosum & euandum videmus.

CARIOPHYLLI.

Non nisi recenti otibus Græcis innotuere Cariophylli, vt pote ex maximè distitis oris Indiæ meridionalis Orientis adferri soliti. Eius folia quæ habuimus, fuerūt A rantij magnitudine minus virentia: alia latiora & rotundiora ostendebant Doctissimi Comasus & Anguillara, hic Ferrarj, ille Venetijs: spirabat istud Cariophyllum. Flores conditi cum petiolis & ramulis teneris, nonnullis Emporij celebrioribus, vt Antuerpiæ, Venetijs, & Genue sæpe viſitur. Alioquin floridi ipsi clau denricellis stellatim decussatis cristati, noti sunt omnibus, notamq; arborem facile tedderēt: Eius Gummi quod eximij odoris est, glebe Ammoniæ cōcretionē & colore, seruamus hic mularū thesauris.

ASPALATHVS.

Haud dispar Aspalathi difficultas, sed non perinde magna necessitas fuit hæcenus. Verum, recentiorum secula vestigatione factū est, vt tres lignorū differentiz nobis innotuerint, quarum quælibet Aspalathi nomine digna est. Prima nobis viſa Veronæ & mureri data ab eximij Pharmacopœis Francisco Coelearto & Andrea Bellicoco, qui suis Theriacis mysticis, de Doctorum Veronensium consilio, miscuerunt. Frustrum quod habemus densum solidū & compactum fuit, quasi cuiusdā fruticis imæ parti reſectū, radiatis fibris, ponderosum, colore buxæ sed saturiore, suauissimo odore & pertinaci. Eū esse verum Aspalathum tum persuasi fuimus. Sapor non ita amarus nec gustu infuauis.

Altera species Venetiæ aduecta Rhodo missa fuit: Nicolao Comasco Medico imprimis erudito, apud quem tum maximum tūcū vidimus, cortice exutum, rubentē, taxo concolorem, odore adeò fragrantem, vt quam latè patebat cænaculum eximio imbueret odore. Eiusdem nos adhuc frustulum seruamus dono missum à peritissimo Pharmacopœo Valerando Donnez, qui ab eodem accepit.

Aspalathus

Supereſt tertia, albida foris, intus torulo subflauo aut citreo, sandali albi & Citrini simillima albam Rosam sapit, nullam gustanti manifestam exhibet qualitatem, nisi tantillum calidi, quod vix gustu discerni potest. Hanc primum nobis dono dedit optimus vir Pharmacopœus Londinensis Morganus & nomē id indicauit. Alioqui Oliuastri Rhodiensis aut Sandali speciem arbitrantibus



Aspalathus Resin.

Quot sunt paulò instructiores Officinæ, tot sunt ferme Agallochi species. Quædam enim Ebenum, Aspalathum, Aliæ nonnullæ Sandalum, Citrinum; aliæ autem nant. Sed charissimum & vfu probatissimum hodie magna copia Venetijs habet insitiores, gustu astringenti, præscisso, non multum amaro, suffitu suavisimum reddit odorem, & succu aut liquorem pinguem, odorem, qualem in Ebano vel Guaiaco videas, cui concolor, & fortè congener.

Arabū Lacca & offi. an sit Diosc. **CANCAMON.**

Laccam arborem & nomenclaturam Arabicam esse quadantenus arbutu & pruno similem multi referunt, cuius sint frustula & furculi, quos vulgari Lacca obduos in officinis habent: quam nullis rationibus seueriores veri exactores, Laccam Arabum Dioscoridis Cancamū esse inficiantur: hinc perspicuum, quòd alius alio vergit, omnes diuersi abeunt. Censet Anguillara à docto Montano persuasus, Benzoin potius esse Cancamon. Quia, inquit Montanus, Cancamum odoratissimum est: Lacca non odorata: sed neutrum verum. Quia nec Dioscorides odoratissimam dixit, sed tantum odoratam: & sanè eius odor suauis & gratus suffitu, quomodo Dioscorides vsus fuit. Addit vir doctus: Itaq; Benzoin putarim, cui congruunt ea quæ de Cancamo antiqui dixerunt. Neq; istud quidem compertum, nam adeo non magni fuit apud antiquos Cancamū, vt Theoph. Galeno atq; Ætio, magno medicaminum recensenti, silentio præteritum sit, qui tamè toties Balsamū, Laserpitium succum, Cyrenaicū, Myrrham, Aspalathum, cæteraq; id genus, inculcāt. Deinde aliunde deuehit Benzoin quàm Cancamū, siquidè hoc Arabicæ plantæ Lachryma est, illud nō Arboris lōgè alius solo, effigie, & viribus. Iam si propterea quia odore fragrat vegetissimo, & adeo myrrhā emulatur, vt nō rarò imponat (sic inquit Mōtanus) nōidcirco illicò probatum est, nam non similitudinem, sed quadantenus simile Myrrhæ dixit Dioscorides. Et etiā si dixisset, parū Montano id argumentū fauisset. Quippe Styra, Bdellium, Thus Limpidū, Album animæ, multeq; aliæ Lachrymæ, Myrrhæ similes sunt, & proinde huic Lacce: non tamen sunt idem, non est igitur Benzoin, Cancamum Diosc.

An verò sit Chermes, cuiusvis est sciscitari, at non nisi erudi ti statueret. Excrementum namq; licis illud insectoriū quæadmodū cætera quæna, quæ in vermiū excrementū etiā fatiscent, vnde vermillo, crassariū est partiū, altringit nō inciditq; odore nullo, & incerto ex ratione euentus est. Nā quòd sua experimēta quasi argumēta certa venditāt recentiores, facta tua meraq; est insecti: a nō enim per se dant neq; certi sunt, illiusue, an aliorū sudoriscolorū viribus & merito prolaciatur sudores. Hic tamè cum anxij animi quid tanta de re statuendū foret alternaremur, Oraculū, id est, Appolinis speciosū illud delubrum, quod illi glorio

so Vercellensi hiatori in honoris ade erectū sperabamus, consultū rogatūq; sententiā ire visum fuit. At ille illudit nobis, nec dubiū exemit, sed turbellæ Pharmacariorū risum iocōsq; mouit.

Ceterum, si cui minus placeat ista valde bona, & iā inde ab vsq; Arabū primis tēporibus vsurpari cæpta ad omnes illas affectiones, quas Dioscorides cōmendat, potius, quàm illa incerta & inerti vtatur, Myrrham vel Bdellium optimum per nos vsurpare liceat. Quid verò cui magis quadret, in antibalomenis latius.

Myrrha.

Myrrha, quasi suauiter & odore fluentis vnguētariæq; dictæ, nomen indicat Lachrymæ, sed cum tam multa sit affinitas huic cū Bdellio, Styra ce, Cācamo Benzoino, Albo animæ, facit illa arcta similitudo, vt neq; penitus nullā, neq; planè optatā nanciscamur. Mirrha tamè nō carere nos certū, vt neq; Bdellio, sed quia vtriq; tanta necessitudo, vt nō tam specie quā accidentib' distare videatur. Vtrū Bdelliū præferēdum sit, meritò ambigimus. Etenim quod Bdelliū putatur, quia certò scimus

Myrrha aut
Bdellium suo trū
co & succulo spi-
noso hærens.



& à Rondelletio experimentis persuasi sumus optimè viribus Myrrhæ respondere, putamus illud Myrrhæ speciem esse, nec vulgare rationis momentum illud. Londinum superiore anno allatæ multæ peregrinæ merces fuere, inter quas quàm plurimos huiusce ligni furculos expiscati sumus, solida substantia, cortice duro, nigricante, spinis multis & rigidis, crassiusculis, horrentes, quibus multa copia Bdelii erat aggregata, intus forisque valde quàm amari; Cætera descriptioni Discordis perquam similia. Cæterum frustra vellicant scriptores isti, & de colore refragantur herbariorum Senensis: nam vidimus nos in Oificina Guilielmi Driefch periti Pharmacopœi Antuerpiensis, fuluam, albescentem, adeoque viridem Myrrham. Itaque illud $\chi\lambda\alpha\sigma\sigma\upsilon$, vt est vagum significatione, ita congruit resiliabile varianti colore. Siquis namque expiscetur sedulo, videbit interdum frustula viridantia, cuiusmodi nos vnum habuimus, quod multis ostendimus.

BDELLIUM.

BDELLIUM quasi olidum putridumve dictum. Quia autem à nemine proditum est, qua planta Myrrha manaret, eaque adeò similis proditur Bdelio, vt ferè indiscretæ similitudinis sint, valde verisimile est eiusdem esse similitudinis spinosæ arbores. Nam & nobis compertum est crebro vsu, vtrâvis ciere menses, mollire ad motu, illitu, suffitu, ac quouis alio modo, tametsi maioris, minoris virium momento quâdantenus, vti cætera omnia, differant, colores, varietates, sapores, ferè easdem. Nam si qui de odore vellit, sciant suauitatem in odore, non semper ab specie, sed gradu mixtionis manare. Etenim eiusdem generis plantæ scetent quædam, aliæ suauiter olent. Itaque sic accipiendum, Bdelium suffitu $\omega\sigma\delta\eta\mu$ siue odoratum dici à Dioscorid. quemadmodum Vnguis odoratus, Castoreum, Muscus, Styra liquidum, Caphura, aliæque multa, quæ præ vehementia scetent, aut ingrata sunt. Quare cum vtraque proximè alterâ spinosa arbor describatur, & Gummi adeò simile effigie fundat, voluerunt quidam, non nisi tanquam syluestrem à satiuâ Myrrha distare Bdelium. Porro Myrrhæ descriptio, quam dant, non est ita diuersa ab eâ quam Plinius Bdelii scripto reliquit, Bdelium nominatissimam arborem, nigram, magnitudine Oleæ, folio Roboris, fructu Caprifici, naturaque. Quem Caprifici quâdante nus effigie fructum indultria peritissimi exoticarum plantarum Caroli Clusii in versionibus è García habemus.

STYRAX.

QUOD ex hac emanaret liquor, ac veluti stigmatum ex tillaret, Styra dicta videtur. Eius feracissimus ille tractus Galloprovinciæ, qui à trium Mariæ Sororum sano antiquissimo, ad forum Iulium vsque porrigitur: est namque prope oppidum Solarium collis lætissimus & opertus frequenti Styrace, nullidū illic cognita, quam primi nos iuuenique multi tum Pharmacopœis & studiosis, tum Monipessuli Professoribus ostendimus, nam iamdiu videramus Venetiis in Franciscanorum horto: truncus ipse similis betulæ ligno, aut mali cotoneæ: folia vtrâvis minora, & quàm Cotoneæ minus rigida, minùsque aucta parte cana: flos albidus, Arantiæ magnitudine, nō odore. Baccæ aliquam multæ Staphylodendri magnitudine, rotundiores tamen, quas excipiunt vngulæ ternæ atque amplectuntur, quæ pediculo longo hærent. Inibi tametsi tanta copia est, nihil tamen liquoris effluit, sed Lacrima Styraçis Venetiis defertur purissimâ perquam odora, inque grana & glebas hammoniæ modò coactas, quibus inest quidam melligeni similis liquor, qualis è facis defluit.



CYDONIA MALA.

DE **P**OMI orbiculata circinnatione turbinati Cytonium vocarunt ipsam arborem, quæ vbius valde ferax est, sed præcipue in apricis & viretis Ælidiarum regionum, vbi malo speciosiore, aureo, melino, sæta visitur, lanugine tomentacea obducto, ipsa sit odore grato, perutili stomacho carne.

THVS.

THVS *ῥαπὴ τὸ ῥύπον* dictum, quod Diuis faciebant & adolebant thuris glebam, uti etiamnum vulgò fit. Est itidem & Thus Lacryma Arabicæ arboris, quæ multis iamdiu sæculis cognita & vñ recepta, vera genuinaque est: Verùm ipsa planta vixdum cognita planè est, nisi de paucis notis, quia pusilla est arbor, foliis Lentiscinis, Arabicæ indigena. Eius sunt vires mirificæ, intus & foris aduersus morbos perquam graves magnæ & conspicuæ utilitatis, quas recensere longum foret.

THVRIS *Limpidi folium cauit.*

THVRIS Limpidi, pellucidi & resinæ Cedriæ emulsiore puritatèque Succini assequuti, nobis & visendi & habendi fuit copia multis in locis, quod non perperam Dioscorid. notis quadrat, si notas, vñ quæque perpendas: nam & dùm adoletur suauissimum halat odorem, & vulneribus, tumoribus, discutiendi vi, nonnulla relicta astrictione, ad tobur partis opem certam fert. Rupellæ occidui maris quadrienniũ sermè est cum doctus medicus Launius nos gummi istius glebis, arboris fructu & folio, donauit. A fetebat nihil tamen, sed sibi relatum à nautis utrũque, trunci Pino similis sobolè esse. At folium, quia valde quàm rarum, nequedum ab vñlo depictum, hic dedimus, magis sciscitaturi, sitne Resiniferæ plantæ, quàm asserturi. Est namque, quod raro contingit aliis, ab imo pediculo ad summum vsque cuculæ verticem, duplicatum, quasi ex geminis conflatum tenuibus tunicis, vagina, sesquipalmum longa, instar infundibuli, hiantis histriosis speciem præferentis superne Galeata videtur, quod de floribus Nappelli & Lonchitide, non de foliis vñlis, memorant autotes.



COCCVS *infectoria, seu Ilex Coccifera, æn Aquifolia Pl.*

INFECTORIUM granum cruore miniato & muricato pannos imbuens, nomen Arbusculæ fuit. Si, quam sæpè meritò & profusè laudat, suam Italiam Senensis Commentator tam diligenter illustrasset, neutiquam dubitasset, an huius arbuscula, ut vocat, reperiri in Italia, ac multò minus Bizancio Cocciferam Ilicem hanc accersiuisset. Si quidem frequentissima hæc humillima Ilex, cum plerisq; Italiæ locis, tum præsertim in Hetrusco, Romano & Senensi finitimo agro, locis montosis, glareosis, sterilibus, inter varias Ilices, Smilacæ asperas, Terebinthos, Lentiscos vbi etiam, tametsi paucæ & parum, nec quotannis, tamen nonnullæ Coccum ferunt. Sed quia minus Coccinum & paucum, citòque euanescentes, partim ignoratur, partim negligitur. At in Galloprovinciæ Aralateni planitie patetissimæ, foliis æstiuè retorrida, lqualida, glareosa, lapillis silicibusque constrata, & Frontignanè Norbonæque maritimis hanc legunt mense Maio, annis adeò æstiuosis, ut totum semestrem nihil penitus pluat. Plebecula tunc turmatim & vicatim confluit illuc Coccum lectum, quem Vermilionem voce vernacula vocitat, atque venundat in mercatu singulam libram 12. & interdum vicenis assibus Gallicis. Perelegans naturæ opus & visendum, non tamen fructus aut semen, sed excrementum nobile tantillæ Ilicis, quæ à cæteris Ilicibus exilitate tantum differt, horridiore aspectu, & rigidis spinulis, densis, crispisque foliis ac sinuosis, angulosis, minoribus, semper virentibus, sed Agrifolium præ se fert. Coccum autem ferunt copiosum, & amplexantur folii imi introflexæ spinæ, atq; surculi

culi præduri copiosiore, nitidum, Agrifolij aut Asparagi hortensis planè similem, concolorẽ. Fusciore tamen & obscuriore foris, intus verò sanguineo cruore lucido gliscit, quẽ pressu excipit recẽtem ad medicatas cordi; amicas, Alkermes præsertim cõteñtiones, Pharmacopœi Möspellienses, Aquisextienses, Massilienses, & Arelatenses, crudo, candido, vel fuluo serico, illic etiam à Serificis vermibus neto & glomerato. Verum insectiores, qui magnam vim coci emunt, non premūt: sed aceto aut albo vino irrorant, ne in vermiculos, aut vinifugas exiles muscas abeat cruor, penè vacuis relictis tunicis. Sicq; in puluerem rubellũ miniatum redactũ seruāt, vnde Scoletium antiquis dictũ, seu vermiculosũ istud esse, satis liquet: & cõpertissimum non esse fructum, sed excrementũ Illicis: cui in furculis sunt glandes longiores, nitidiores, nigriores Quernis, sed Echinato acetabulo, non bullato ima parte, inclusę. Flores verò Martio illic promit musculos, sublateos aut herbaceos Oleę Illicis, aut Querqus. Cuius etiam medijs folijs & trũco non rarò animaduertimus excrementa rotunda, rubella, & interdum flaua, maioraq; istis, in varijs locis Galliz, Italiz, Germaniz, quercetis prope Basileam in Heluetia plurima. Quæ non alia videtur ab ea, quam mulierculz, Dioscoride dicente, legebant ore, & vocabant Coccum, fortassis quadam, vt verisimilius sit, similitudine. Sed cum nostratũ Norbonensĩ & Hispano nullus hodie notior aut potior habeatur, virisq; eidem omnes congruāt, quas meminerint scriptores, frustra istum improbat, & aliũ expetit, qui neutrum probè nouit Senensis Commẽtator.

Septentrionalis AQUIFOLIUM, siue AGRIFOLIUM, non est

flex, neque Cratægum, neque Aphricana Palyurus.

Lybens hæc & perquam frequens arbor crescit in frigidis regionibus, vt Anglia, Germania, & Francia: calidorum autem duntaxat montosis aliosis rarò & ægrè frutescit: quare nequit esse Palyurus Aphricana, cum sit etiã eius iniucundi saporis bacca. Neq; esse Illicis speciem certum: non enim glandifera est, & natales Illicum seraces, adeoque æstuosos odit. Quare indicta fuit Dios. nec sortè valdè nota Græcis. Est tamẽ persimilis Cocco, insectoriz folio, quod perpetuò virescit, sed lætius hyeme, spinis horrido, in margine multilatero, leniter sinuato: bacca Oxyacanthz, Kermes, aut Asparago cõcolor, sed ingrati saporis: cortice ad gluten aucupatorium conficiendum apto.

Vtrauis superiorum adeò huic similis est, vt non sit discernere illicò facili, à Cocco præsertim: huius tamen glandosus Echinator fructus oblongior est, dactylum æquas, nuscifera Illici plenè suppar, folio Aquifoliæ, quæ fobæ,

Dicta ægũo, quia ferra propter duritiem fuit secanda: syluz quædam in Galloprovincia & Norbõna, quantz quantz sunt, Illicta sũt, cuiusmodi est Garantotius lucus ad Möspel-
lium, vbi proceras & querna elegantia quàm plurimas videas, sed oblongo Arbuti folio, arborea.
tantillũ dẽriculus per ambitũ asperato, perpetuò atrovirente, oblongiore, graciliore fuisse Syderifera hunc accersa.

pernẽ: Querqus glande propendẽte, nucamento muscoso, luteolo, non diuerso. Eadem illic variat stipite humiliore, albidiorẽ foris, & Olez similiore: itemq; glande, Varietas, altero tantò minore.

Est Aspũ, erumpo, pullulo, vnde vox Aspũ, qua designarũt potissimũ glãdiferũ genus, Quercus, & præsertim Quercũ, quam tum dictz iam arbores, tum frequentissimus occurfus, ipsaq; celsior & ramulosior species, frondis grandioribus anfractibus sinuat, quauis notatione notiorẽ faciũt, tum frigidis, tum calidis plagis. De cuius adnata, excrementiũque multiplici fobole, plantis, fungis, fructuum rudimentis, musco & vellere nouitate spectando, iam quædam diximus, & multò plura in Agaricis dicemus. De Quercu marina inter Algas, de esu & vsu Medico omniũ partium & fructuum, deq; Querno sale conficiendo ad corporis humani & metallorum medicamenta, inter remedia.

Querqus æryndantes siue præcella dicta CERRIS 7 lb. tristi prægrandi Echinato glandes:

Quæ itur Pesarò Romam publica via, visuntur celsissimz, alibi minus peruiæ, nec valdè notz hodie: cuius glandes prægrandes capulum habent Echinatorum, ambitu squamis præduri sibi mutuò incumbentibus, horridum, magnitudinem fere Echini marini aut semiconi laricis æquans, cuius nonnullam similitudinem retinet: valde crassus est, interiori sui parte lenis: glans, quam claudit, non nisi magnitudine differt, folia maiora multò: eadem alioquin Quercui.

Ex

Suberifera latifolia Ilex glande echinato.

EX vnaqualibet superius narratarum primo quoq; intuitu cuius suberiferā noscitet Ilicē, & apud cortice dictā quia semper altipetus & innumerabilis vndis manet quē si excora, item detata: cortex geminus stipitem amittit, alter interior qui perpetuo haret: alter crassior duos pollices, rimosus rugulos, perquam levis, qui deglubitur, & quolibet gētiū defertur ad crepidarum soleas suffulciēdas, aliāq; multa necessaria. Multa Galloprovinciæ maritimis Tholone, Olbig & alijs adiectis, & in Tuscaniæ Lucē pretura.

Suberifera angustifolia Ilex.

SE ad Apēnini radices & Anconēsis agri nemorosis collib' multo frequentissima, quæ angustiore, longiore, minusq; crenato folio est, ad arboream Ilicem accedēte: glādofo semine, cupulo foris pungenti, asperedine squabro.

Phellodiu.

Quasi ē cōfusis Ilicis & querquus in hac principijs, nomenclaturam Theophrasti. φησι ὡς ἄρα, siue Suberiquerum cōflavit. Etenim de facie & folijs Ilicem quampiam dicas: ipsū autem lignum mollius & laxius Ilice, sed folij incisura serrata Castaneæ, non Querquus: reliqua effigies Ilicis, minor tamen Querquis: maior Ilignis, non glandes, sed ἄνωγα exiliora & oblongiora.

Salsicortex Robur.

EX hac tribu eam merito quis putet apud Theophrastum dictam Salsicorticem ἀλσίδιον, quam hodie robur vel *Roure* vulgus nostras vocitat, ut quæ sit perquam solido cōpacto trunco, multum cineris vrendo relinquente, qualem etiam ē vulgari Querno trunco nos parandum curavimus.

An Theophr. Fagus.

Vz autem Gallas dat Quercus, duplex videtur: Earū vulgatissima nemorum & saltuū Pedemontium Delphinatus aliarumq; regionum temperatiorum est alumna, minore stipite, brachijs & fronde. Huius quædam varietas aut differentia videtur Fagus Theophrasti. dicta vocis argumēto Latinis Esculus, cuius esculenta glans & post Quernā dulcissima celebratur, sanemq; explebat primis mortalibus: hodie *Fagni* & *Farguo* Italice: *Hægm* Gallice: lignum istius firmitus proditur, quam vrbanz Quercus.



Citimus hic ramulus Phello diu Ar cadum est apud Theophr. & Ilex famina lib. 3. cap. 16

Fagus vulgaris, glande diuersa à Querna est, triquetra, pusilla, utrinque acumi-
nata, unde eorum Theophr. videtur vocata: Ligno etiam est minus compacto & rō-
busto, fronde Populnea, aut Alni: longiusculæque videtur abesse à Quercu; tamen si &
hæc potuit Fagus ab edendo dici; cuius glandis nucleus esca pauperulæ plebi & vris
quæ sita, regionibus frigidis & calidis.

CASTANEA sylvarum sunt Allobrogum & in Aluernis, quamplurimisque nemorosis, al-
tissimis, regionum tamen non frigidiorum; nam cælum Aquilonium non ferunt: præ-
grædæ, stilis muricatas, echinosas glandes edunt: medulla omnium glandiferarum sua-
uissima, & ad panificium aptissima: frondibus longioribus Canabinis, aut Ilicis grandio-
ribus, similiter Fago aut Ilici, sed angulosis plicis.

MIXTA quasi naturæ ex Fago & Castanea est ea quam nucleis vocant Equinæ: spon-
dibus digitatis Hellebori aut Ricini, Castaneæ alioquin fimbriis donata: in qua Echis-
nus octennium aut decennium Castaneæ, eiusque, nucleum claudit & tuetur saporis perbo-
ni, ut nonnullas incorruptas prædulces gustabamus in Museo præceptoris Rôdelletii; &
etiamnum habemus dono cuiusdam Pictavi, qui multa rara ex Barutho & Ægypto no-
bis communicauit. Affabre visitur expressa, ut quamplurima, in Commentariis Mathioli.

Sambucus vulgaris corymbacea.

Ebulus, siue pumilla Sambucus.

Malus.

Pyrus, Pyraëster.

Mespilus.

Aria Theoph.

Alpina arbuscula, hæc Oxyacantha, recen-
torum Chemamepsilum.

Emorymos Theoph.

Cornus arbor & frutex.

Cornus scæmnia siue virga sanguinea.

Cerasa & varietates.

Cerasa racemosa.

Chamaecerasus.

Prunus syl. { Vtraque.
Domesica.
Varietates.

Prinosperisicum.

Armeniaca malus { Maior.
Minor

Sebesten.

Iunibe vtraque

Paliurus

Paliurus altera Theophr.

Paliurus altera peregrina.

Pyracantha.

Berberis.

Myrobalani Arabum.

Thamarindi.

Latus arbor Diofco.

Latus arbor Theoph.

Gnæacum Patanicum.

Gnæacum Officinarium.

Palma sancta siue Palam sanctum.

Ebenum.

Tala { Fæmina } Theoph.
Mas

Vimus.

Carpinus.

Betula.

Alnus.

Alnus nigra siue Frangula herb. arborum.

Nuces anellane.

Populus { Alba
Nigra
Lybica

Arbor Iuda.

Populus Novi Orbis arboris Iuda folio.

Morus omnis.

Sycomor.

Ficus granis.

Platanus.

Acer.

Sorbus torminalis.

Oxyacantha.

Mespilus Aronia.

Sambucus { Aquatica.
Varietas.
Montana.

Piper longum.

Ribes vulgare & nigra.

Vua crispia, siue Vitis præcia.

Amomi & Cardami differentia.

Rosa satina, sylvestris, carulea, lutea, & vari-
tates.

Effidentine.

Rubus omnis.

Gynobates.

QUA EST LITTORVM CREPIDINVM QVE opacarū amans, Αβγα, siue ακτι; quasi littoralis dicta videtur: Sambucus etiam Latinis vocata, aut potius Sabucus, Sereno monente, à Sabuce instrumenti similitudine, quę illi cum cauis virgis tubifvę medulla exenteratis, quibus nulli non ẽ plebe notissima. Sambucus est: fraxinea facie, & fronde, sed latiore, nonnihil ambitu crenato: umbellis candidis, Drabz, latioribus, circumnatis, magisque speciosis, & corymbacea sętura acinulorum sanguineorum, nigricantium per maturitatem, luxuriante, ad Vuz ximulationem, Augullo; quando decerpuntur transmittunturq; cribris ad pulres, & condimenta, p̃sertim apud Germanos & Heluetios, vbi pueruli cruorem esculentum farina densatum auidẽ sorbent. Acetum Gallia ẽ floribus & racemorum succo admodum laudatum & rubrum parat.

*Aldermost Hel
vetiorum.*

ANNOSA arboris, apud Boreales p̃sertim, ramis accrescit excrementum corticosum coriaceumve multis dotibus cognitu dignissimum, plebique Anglę & Germanz, Iudz aures vocatum, propter effigiem auris, quam cartilagineo concretu rugosq; complexu multis plicis & mandris ximulatur: sed colore pullo, p̃rdurum, aquis merum mollescens, spongięq; ritu tumens: anginis certissimo experimento vtilissimum, & tumoribus intus forisque nunquam satis laudatum: gustu penẽ insipido, cutis elixz, aut cori.

Luricula Iude.

EBVLVS, sine pumilla Sambucus.

SCITE adinodum hanc pumillam humilẽmve Sambucum Dioscorides dixit, quippe tanta vtriusq; inter se cognatio, vt primo incunte Vere, nisi quis radicem & furculos huius minores teneriorẽsq; perpendat, non sit cuiuslibet discernere: verum hæc annua herba est: Sambucus autem annosa sit arbor: & Ebulo fronde, faciẽq; minor sit; scapi dum cubitorum, odor tetrior, & purgandi vis vegetior. Vm bellę corymbaceę perquam similes, sed vescendo vix ferendz. Radix flexuosa, tenerior, humilate sparsa. Vrticę modos purgando ferum efficax; primo Vere colligi solita.

MALI.

MALI; MALA.

MALVM arborem, eiũque tum diuersitates, tum fructuum varietates, accuratins explicare, vt prolixioris esset instituti, ita nullius ferẽ operę precii; quando Malus urbana est arbor p̃rdiis & paradisis perquam familiaris & nota, cuiuslibet cœli admodum patiens: Sed amant oramen humidioris, sapidior fructus siccioribus, primę hodie commendationis *Curripendula* ad nobilem Alkermes confectionem.

Alia quàmplurima Mala, cultu mangonio, transplantatione diuersa, in Anglia, Belgio, & Northmania, quę foris intusq; coccinio succo & aspectu micant.

PYRA.

ETIAM Pyra, à turbinata effigie pyramidis in modum dicta, frustrā quis vel discernat à superiore, vel literis mandet: cum perpetua consuetudine videndi in viretis, & estandi in mensis, nihil frequentius Gallię, Germaniz, & p̃sertim Septentrionis plagis, Belgio, Northmaniz, Angliz. vbi *Cidre*, & *Pere* admodum suaves potiones vini vicarias faciunt. Lubens quàmplurimas differentias & nomenclaturas satiaz & sylvestris, tum fructus, tum arboris tacemus, rariora simplicia hic tantum cœqui polliciti.

MESPILVS.

EST MESPILVS arbuscula congener & similis Sylvestri Pyro, non solum folio, quod tamen longius & angustius est, sed etiam pomo, quod item pusillum fert, Sorbo domestico aut Pyro sylvestri par magnitudine, gustu, & effigie; vmbilicello tamen supernẽ extatẽ, aliquot diuisuris & vnguiculis foliosis redimito. De isto politissimę Politianus cecinit: *Regum imitata Cerasas Mespila*: nam de prima MESPILA, in Oxyacantha.

ARIA



Arbuseula frutæve Alpinus folio Mali, Bacca
Oxyacantha aut Pyracantha.

ET hæc Alpini soli indigena in asperis Minde-
nis Norbonæ, & saxosis ad Baldum Veronen-
sem : Flagellis exit vimineis nigricantibus duos
tresve cubitos surrectis: folia item subtus glauca,
supernè virentia, propiora nano Pomo, cui nō ab-
similis tota plāta præterquam fructu, qui bacca A-
riæ similis, æqualis Pyracanthæ aut Oxyacanthæ. Qui
dam apprimè docti Chamæmespilium nobis sua-
debant: alij Euonymum Alpinam faciebant. Præ-
siccò gustu nonnihil tamen calido, acri & astringe-
nte.

NEC ita dispari aut effigie aut fa-
cultate, sed longe rarior, amā-
tiorque Alpini cœli, Aria vocata Theop-
hra, quam in Angliæ frigidioribus
sylois frequentem videas: rarius ca-
lidioribus, nec nisi Alpium iugis Nor-
bonensis Sauenæ & Sabaudiz. Folio
Pyri, Fagi, aut Alni, auerso, glauco, su-
pernè atrovirente: floribus plufculis, in
ymbella candidis Pyracanthæ, aut O-
xyacanthæ: exiguo pomo, rotundo &
gustu Aroniz Mespili, aut Cynorhodi
alabastriculum æquante: sapore nō in-
grato, nec perinde astringente, auicu-
lis expetito.

Chamæmespilium.



SED vt verior, ita & frequētior infœlix Euonymos: nulli enim regioni calidæ aut frigidæ E V O N Y M O S
iuxta fœpes & margines deest, aut ignota est de siliquula quadrangula, quadricoccoûe Theoph.
folliculo, quaternis loculis carinato, quæ totidè claudût semina: extimus colos ex puni-
ceo flauet: folia, rami, reliquaq; facies illi Mali Punicæ, sed pallidè ex luteo virgæ, qua nul-
la materia commodior verunculis culinarijs aptandis, ad carnes laridis ligulis transigen-
das, ideo Lardariam vocant: tota quiddam spirat ingrati: flores luteoli.

VIRNIA vel
gi Gallorum &
Ruelli, an Vi-
burnū Virgily?

Ride Sen. Cer-
berens Iuratio-
nes in Guiliad.
epist. pag. 385.

CORNVS ar-
bor.

FOEMINA
Cornu.
Pseudocrania
Cordi.
Virga sanguinea
CERASA.

RACEMOSA.

CHAMÆCERA-
SVS.

PRVNVS fl.

Varietates.

PRVNEPES.

Gal. Apricos.
Præcopia.

*F*N Italiz, Angliz & Galliz Burgūdz senticetis & syluosis passim fruticat hæc, cuius Ru-
ellius nomē, quū accepisset *Puarnam* dici à suis popularibus & colonis, Viburnū esse Vi-
gilianum coniecit, autē, è quo prædatus Senensis, & vt forex suo iudicio captus, Fluidā pro-
didit. Sedenim neq; Viburnum potest hæc asseri: non enim lenta est, neq; vllum indicium
nisi nomen vagum, ex antiquis monumentis superest. Fluida autem Rhus, quasi fluens,
Gazæ interpretatio est, vt prius monuerat Ruellius. Alioquin cognator est folio & flore
Ariæ & Mespili, pariter acino in umbella condito, sed compresso, oblongo, nondum ma-
turo rubro, maturo autē nigro, non (vt doctus Ruel. scripsit) rubro: folia Alni pubent cani-
tie, & totus frutex albicat, ternū & quinū cubitorum.

*F*lli consimilis aspectu ligni & foliorum Cornus, sed plusquam cornea stipitis duritie,
interdum iusti modi arboris, interdum tantum fruticis. Floribus luteolis, mucosis, ip-
sum ver ortu antevertentibus: fructu Cerasi oblongi, cōcoloris, oliuæ effigie, Gallis & Ger-
manis nota & frequens inter dumeta minus arida, aut iuxta fluenta: gustu perquam auster-
ro, acore non ingrato.

*A*ltera, autē quæ vocatur femina, foliorum & ramulorum effigiatu adeo appropin-
quat huic Euonymo, vt Cornū dixerint. Licet ea nō sit soliditate ligni aut bacæ venu-
state; fert enim pusillas baccas nigricantes Hederæ aut Polemonij, & edendo ingratas, non
acidas: flores albos Ligustri, in virgis cortice amictis, ex viridi in fuscum purpurantibus,
vnde Virgæ sanguineæ dictæ.

*T*riualis etiam cognitionis Cerasus, & multiplicis est differētiæ, quæ magnitudine arbo-
ris, fructus sapore discernenda est, aut ex vulgatis libris holitorij percipienda. Flos
Persici candidior: & rotundiori folio satius quam syl. quæ passim arborefcit fructu acido
mixto, aut dulci. Suauissima omnium Cerasa acidula, quæ *Agrestes* vocantur, veniuntq; in
culinas & Officinas.

*H*æc non differt nisi quia minor tota est, congestimque in racemulis Cerasa fert, flores
pariter albos, quales nobis ostendebat ex Labaudi Alpibus delatos Valerādus noster

*P*erquam rara & Alpigena humilis Cerasus, cubitum pedū equans, folijs, ramis &
stipite Cornus, albidis, squallidis nodosis. Floribus albidis, pallidibus, aut luteolis Fru-
ctus binos maturat in pediculis longioribus, pendulis, Cerasi ritu, sed in imo duo forami-
nula albidā, quoddam rudimentum pupillarum aut oculorum adumbrantia: Gigarta
quina, aut fena, albidā, lucidā, Oxyacanthæ paria.

*V*Bique viarum agros sepit, aut sepes fulcit inter arbuta vitæ contumacis Sylvestris
Prunus: iam lætiora edens, iamq; & vt plurimum, pusilla pruna: quarum frutices ge-
mina in differentia sūt, altera horridior, minor, spinis rigidior, fructu minore, acerbior,
ex quo fit Prunellorum Acatia. Lætior autem sylvestris transplāratiōe, insertione, & cul-
tu, in grandē, proceram, & domesticam abit: mutiore pomo, succulentiore, suauiore. Cū-
ctas differentias nec otii, nec animus est perséquī, cū liceat bene longas paginas multo-
rum scriptorum de istis consilere: Maſcenis omniū olim præstātilimis, Brignolensia
hodie in Galloprovincia palmam præripuerunt bonitate, salubritate, & sapiditate.

*P*Omaria quædam cultiora Gallica quandam Prunopersicum colūt, cuius fructus caro,
Pruni est: cute subviridi Pruni, sed nucleo Persici.

ARMENIACA malus { maior
minor.

*S*Ed innumeram serē turbā Prunorū, Malorum, Cerasorum, & eiusmodi fructū, para-
diūs nimisquam notorum, nec lubet, nec licet per angustia temporis & paginæ proſe-
qui, quando ea possunt ex varijs & prolixis Rei Rusticæ, scriptoribus peti, vt & arborum
quæmplurimarum, quæ communionē principiorum, cultu mangonio, & insertione quæ-
piam diuersam vel figuram, vel speciem obtinuerunt: vt sūt Prunopersica fortè, & Ma-
la Armeniaca, Præcopia dicta, quæ figura & folio referunt Pyrum, pomo autem ipso Ma-
lum Persicum.

PER.

PERSEA aliam esse à Persica & temperamento vario, vel de Dioscoride discas, ne-
dum ex Galeno: Id aliqui folia astringentia produnt, & is nullas tota ditione Ro-
mana, sed duntaxat Alexandriæ fuisse dicit Perleas ex Perside allatas, quum indidem
allatis Persicis vniuersa Italia abundaret, non relinquit id controuersum. Eapropter ea
non nisi paucis nota hodie, quia, uti tunc, rara est. Facie est apud Theophrastum præcocius
Mali, aut Pyri, cuius magnitudinem æmulatur: alitricione & magnitudine Pyro fini-
hor, fructu autem Persico.

PERSEA:
DE PERSE-
ca m. n. superius
de Persica
luce.

ISTÆ Pruna quæ voce Maura ex Setapione notissima sunt Officinis. Nec nisi Græco-
rum recentioribus niemorata, propterque mucosum succum Mixaria vocata, sunt ar-
boris Pruno congeneris & consimilis facultate, quæ ægrè solo Italico, vel Norbonico as-
suescit: tamen Plinii memoria in Italia creuerit, & nostra ætate in Monspellensis agri
vrbeclula vernaculè *Masillanges* nominata, quidam amicus aluerit: sed neglecta, non diu
illuc superfuit, & tantum arbuscula fuit, facie Pruni & folio, sed latiore: fructu Iuiubæ
cognato, atro & magis viscido.

Agineta M.
XA & Officina,
Sebesten.

HÆC vix vllam reperias quæ ramis foliis totoque senticoso occurfu magis æmuletur Iuiubæ.
Paliurum (quem Rhamnum tertium faciunt) in aridis & glareosis strigosis Norbo-
næ arboris alicubi, alibi duntaxat fruticis magnitudinem, ut Monspellii & Anconensis
agro in Italia, assequitur: furculis præduris, foliosis Lentisci, aut Rhamni, multis adun-
cis spinis, intercalantibus, præcatis: flos muscosus Oleæ aut Rhus Pliniani, luteolus
fructus, dalsis, Pruni cute Phenicea, vel Rubella.

CUM sint tam laxæ descriptiones vtriusvis, & ex facultatibus valdè imbecilles conie-
cturæ, nullum puto posse statuere quænam cui sit præferenda. Quæ huic Dioscori-
dis descriptioni valdequàm accedit, est Rhamnus tertius, nam frutex quantus est, præ-
durus est stipex, aculeatus, semine pingui, lincoquenon fuliginoso, sed satis duro, ut lini:
vires huic congruunt: nam lapillos exerit potentissimè: diureticus est ita proinde haud
abs re doctus Anguillara ambigebat esse Rhamnus Paliurus alio nomine (ut sæpè sit)
nota Africanis transmarinisque regionibus, vel Dioscoridis fuerit vitatus codex. Quod
ad semen attinet, huic sunt terna oscula, uti Theophrastus vult, semine Lini æmulo, non
fuliginoso, uti corruptè legitur, læue, non lentum tangenti, & in siliqua lata folliculari
specie, terna, quaternave habet, ut sanè hæc ipsissima videatur.

Paliurus &
Rhamnus,

QUAM verò lib. 4. & capite Theoph. meminit Paliurum, si quis expendat, comperiet
alterum esse Iuiubam Syuefrem: nam fructus rotundus est, ruber, quantus Cedro,
cui nucleus inest eiui non ineptus: vino immerfus fructus, an conciliet suauitatem, non
tam scio, quàm facile credo,

PALIVRVS
altera Theoph.
an sit Iuiuba Syl-
uest.

PALIVRVS alter peregrinus.

SVNT & alia nonnulla, quas si ausi esse-
mus hic addere, potuissimus pro Pa-
liuro subdere: nam satis cōgruunt. præ-
sertim quædam quæ Monspellensi agro
oritur, spinis horrida, foliis Oleæ, mino-
ribus, bacis nigris, tricoccis, Smilacis,
gravidis, succo fuluo, tincturæ apto, præ-
grandibus, Berberidis modo, granis ter-
nis, sed minoribus, oblongis, gustu sub-
acri, cuius hic picturam damus, non
procul Monspellis, qua itur ad scaturi-
ginem Lani amnis, secus ripam & præ-
viam multa.



RHAMNVS
primus Diosco.

PRIMVS Rhamnus Italiz, Gallie, & Hollandie maritimis pluribus in locis, ramosus ab imo summo tenus frutex, aculeatus, surculis albidis, foliis angustioribus, multis, herentibus, Chamælez longioribus: iuxta alas fructu denso, racematim aggesto, Asparagi, aut Agrifolii, minore, succo flavo, turgido.

RHAMNVS Secundus
Monspelliensium.

SECUNDA species Cōmentatoris minus exquisitè respondere Dioscoridi notis videbitur, illis qui secundam speciem Rhamni Monpellii sepibus muniendis aptissimā viderunt: nam tota planta alba & minoribus floribus, foliis Oleæ, sed candidioribus Iesamini pubet, at herbacei coloris: cortice ex viridi pallescente: vtriusque rarus vus: Monspellienses hunc Rhamnum secundum vocant.



SPINA INFECTORIA,

Rhamnus Catharticus, Recentiorum
folio & flore Mali sylus. Bacca
Atri nigra sive Fragula.

SPINA infectoria plus est similitudinis facie cum Pruno sylvestri, quàm cum Rhamno, cui spinistenus tantum nonnihil assimilat; & vis est purgatoria illi, vnde Symplicius paratur, quo nostri præceptores iam multis ab hinc annis Lutet. & vsi sunt; certiores viri quàm Senensis: vt qui non ad pituitam crassam & viscidam, sed potius tenuem educendam, & impetum eius in articulos citatum auertendum & cohibendum prudētius vtuntur. Nam sine calfactione purgat, & nonnulla astricuuncula partibus robur conciliat: neque liquefacit humores, vnde maior fluxus subsequatur.

PYRACANTHA.

EST in Galloprovincia & Italia arbuscula sepibus non ita frequens, cui facies & folium Pyraltri; aspectu squalida: eius baccæ rubræ estantur pueris. Semina oblonga habent, quasi Pyri aut Berberidis. In umbella flores racematim candidos & fructus Oxycanthæ pares edit, quem, propter foliorum similitudinem, nonnulli Pyracantham vocant. valde est spinosis ramis, non foliis: vsus hodie nullus aut neglectus.



ALgidioris foli aut Montani Berberis est indigena: fruticat & arborefcit senti- BERBERIS
 Acola tota, rectis, præduris virgis quinum aut senum cubitorū; folia numerosa, rigida;
 crassiuscula, Pyracanthæ aut Myrti, crenata, gustu acidula edentibus floribus muscosis,
 emicantibus, Ribes, aut Cornus: per pusillis acinis, racematim in pediculis conditis, ob-
 longis, Cori item effigie, colore & penè sapore: cortice cinereo, libro subtus luteo, quem
 Officinæ *Bugiam* vocant.

HI Syriaci fructus vulgatius quàm verius Myrobalani vocantur: neque enim glan- MYROBALA-
ni Arabum,
de Græco Myo-
balano superius.
 des sunt, neque odori, vnguentis ve apti, potius Persicis aut Prunis accensendi: Quo-
 rum etsi complures oriuntur differentie in Syriacis, Arabicis, & Calecutiis regionibus,
 quibus debentur à Græcis & à nobis: tamè quatuor quinqueve duntaxat hodie prostant
 in Officinis differentię è totidem arboribus. Nam Cepuliferæ & Citriniferæ eadem vi-
 detur arbor, proferiturque à nuperis nauigatoribus, Persici aut Amygdali folio. Bellerici-
 feræ autem latiores Laureæ sunt frondes; sed Indiciferæ Salicis, cuiusmodi etiam Em-
 blici videntur: alioquin inter se congeneres arbores promunt ipsi fructus; me-
 diam quandam naturam inter Oleam & Prunum fortitæ. Horum plurimum duo gene-
 ra condiuntur, aut huc condita adferuntur: pluris institores faciunt alterum horum, qui
 Kebulus, aut Cebulus vocatur, omnium maximus: is oblonga pusilli Limoni, aut Persici
 effigie, compacta callosa nigraque carne, sapore iuglandis cõditæ. Alter minor est, totun-
 dior, tenerior edendo, Bellericus vocatur. Kebulo sunt Citrini similiore facie, cute, nu-
 cleo oblongo, & pulpa, sed fulva, vnde nomen. Indi nigri dicti & notissimi de colore:
 nuclei expertes, callo penè lapideo, quos concolorem melancholicum humore, vt ce-
 teros, quemlibet suum aptius educere putant. Vltimò Emblici potius fragmenta, quàm
 integra Pruna, quadantenus triangula, Bellericis minora.

Nec magis Græcis olim, nec minus nobis noti hodie fructus quos Thamarindos, THAMARINDI
 quasi Palmulas, aut Daçtylos minus aptè vocarunt. Non enim Indi Orientales, vnde
 aduehuntur, Palmæ similis arboris tradunt esse, sed Prunis, folio Saligno, vt Fraxini, mi-
 nutum incisio, magnitudine Querci, tametsi effigies fructus Daçtylon, siue digitum, in-
 flexum præferat, cute, pulpa, fibris nervosis, fuscis, & atris intertextum, qui cohibet semina
 terna ut quaterna, Cassiæ, compressa, & angulosa: gustu quouis Pruno acid: ote.

Lotus imulæ arbores in Gallia Norbonensi miræ & spectatæ proceritatis occurrunt: LOTUS ARBOR
 superant namque magnitudinē quamlibet maximam, vel querquum, vel iuglandem,
 præsertim loco non procul Monspelio, cui *Boussonnet* nomē: foliis est Populi nigri, vel
 Betulæ, sed aliquantò angustioribus: baccis nigris, Piperis maioribus, aut Myrthi, rotun-
 dis, prius Æstate virentibus, Autumno nigris, maturis, nusquam rubris, vt meminit qui-
 dam: intus Inbebarum nucleolo, fructus suavis esui: vulgò pueris expectitus, dulcis nam-
 que, neque astringens est, & tamen dysenterię prodest, hæc Dioscoridea vulgatissima.

Quoque in horto Patauino elegantissima visitur, & digentissimè colitur, iamdiu à GYATACUM
Fallopis Patavi-
ninum
 Docto, Fallopio sata, & Guaiacum credita, videtur esse vera Theophrasti: nam ma-
 gnitudo & folium Pyri, Lauri, aut Ilicis maioris, niger fructus, magnitudine Cerasi, qui
 per initia viret, sine pediculo: vel admodum exiguo, deinde fuscfcit maturus, & dulcis
 valde siccatus, id testantur: & hæc Theophrasti Plinique Lotus. Quam cum turbulen-
 tus Commentator nescit distinguere, nihil aliud quàm ineptè congeila verborum mole
 onerat lectori discendi audiam. Namque quam sibi Constantiæopoli missam iactat,
 non alia est certò, tametsi ille non depinxit, quàm Patauina. Sed quia illa sicca missa
 fuit, paulò ardiore strigosiorve erat, alioqui foliorū & vniuerse stirpis idem modus: quod
 nobis certò licet aspectu ipso & doctissimorum fide asserere, nempe Bauhini nostri Me-
 dici Lugdunensis, omnium stirpium consultissimi, atque Valerandi *Dumez*, peritissimi
 inibi Pharmacopœi, qui eandem in Syluis Lugdunensibus copiosam colligit. Itaque duæ
 sunt omnino cognitæ species: altera Dioscoridis, altera Plinii & Theop. nam illius corti-
 cè scarificabamus adactò scalpello nos, intus libro luteo, foris fusco colore tum fructu.

FSTVD lignum ex Orientis Calecutii Indiis, eque Occiduis insulis & continenti noui GYATACUM
 orbis maxima copia minimo pretio cõparatum, vel Barbitiones & Mulomedici non
 norunt, nedum eruditi artifices, qui lubente Deo, huius ligni & artis ope, diuam Indicam
 luem, quæ longè lateque per vniversam Europam scruiter serpsisset, eodem vnde irrepse-
 rat.

rat, penè iam repulerunt, tamen nondum plenè innotuit arboris ipsius figura natua, quam exactè delineatam dabimus nos breui, modò amicos nostros frustrata non fuerit nauis & spes: aunc in proceram speciosam arborem esse: folia quidam Maligranati, alii Ilicis, aut Arbuti modo, firma, minora, nitida, frondes dicunt: caudici corticem albidum, quadam nigritie viridante, maculosum: flores luteos plerique omnes faciunt: fructum naucleri nesciunt delineare, sed rotundum, nec ita niagnum dicunt. Hispanenses scriptiores luteum itè cum maturuerit dicunt, geminis quasi Lupinis constatum: Lignum præstantissimum quod nigerrimum & pinguisimum: de cuius immensa utilitate & oleo, quod sine Alembico elicitor, dicendum postea.

India Occidua
Palma sancta
PALMA SAN-
CTA *similis ar-*
bor.

P**X** eiusdem classis Naucleris, qui indidem superiore æstate in Angliam remearunt, habuit Morganus & nos ab illo furculos, quos per sculptorum paucitatem non licuit hic appingere; ita nec alia quamplurima, quæ in operis calce cernuntur. Rami sunt arboris grandioris, recti, cortice arboris Indæ, folio Citrii, carnosio, nudo, Lauri latiore, breuiore, ueruofo, horum in summis hærent folliculi pallidi, coriacei, circinate rotunditate admodum compressi, numo coronæ Gallicæ ferè parès, quorum medio insunt semina Lentis effigie & colore, compressiora, gustu amaricante.

Palum Sanctum
India Occidua.

H**A****N** c quidem arbitrabantur Palmam, aut Palum Sanctum, quæ species diuersa à Guaiaco est, quamuis similis designetur: nempe nõ vasta, vt Fraxinus, sed minor, & ei còcolor cortice: folia cuiusmodi Plantago, sed crassiora, minora, pinguiora, breuiora: fructus iuglandis magnitudine, aluo subducendæ idonei.

Hebenum, sine
Xylæos Officin.

O**F****F****I****C****I****N****A****R****I****U****M** Hebenû quin sit species Guaiaci nihil obstat: nã præduræ assulæ, grauiusculæ, quæ in officinis visuntur, & aquæ mersæ sident, tum pinguedo, quæ exudat igni, perinde atque è Guaiaco, tum aspectus ipse, & vires, ac sapor, videntur testari: nam odor etiam ei inest Guaiaci, vires ad eadem quæ Guaiacum cõmendantur. Ne porro quis obiciat, solam Indiam nigrum ferè Hebenum ex Poëtâ; dicimus, Hebeno idem euenire posse vt Guaiaco, quod non modò in Trapobanie finitimis ad Orientem Austrum, sed etiam in India occidua longissimè diffusa, syluestris frondet.

TILIA fami-
na Theophr.

A**L****T****A** est hæc à Dioscoridis Phylerea, & per y scribenda, quod in tenues assulas & phyluras discerpatur. Frequentior multò Septentrionis frigidioribus Germaniæ, Belgicæ, & Galliæ, quàm Italiæ, vel Norbonæ: pulcherrima Basilicæ Helueticorû in Diui Petri aræ, patulis ramis, sparsis, inque vastæ magnitudinis ambitum fornicatum propagata, folio latiore, Populneo aut Betulæ, serrato ambitu Loti: ramis item frondosis, & Amentis per initia Coryli aut Iuglandis.

TILIA MAS.

M**A****S** autem non perinde effigie tota atque folio differt, tametsi exiguum sit discrimen: folia Vlmi scabra rugosave sunt: flosculos, non baccas, vt femina, fert, sed semen & flores in folliculis Carpini modo.

VLMIVS.

V**L****M****V****S** multò vulgarissima notatuque facillima est: folio non adeò illi dissimili, aut Alni. Folliculis vermium volucellorum & fuliginis refertis, saluaris limo aut liquori manantibus. Buxi color ligno.

CARPINVS.

V**O****L****V****N****T** recentiores hanc esse Carpinum Theophræ. tametsi Vlmo congener sit: foliis quippe iisdem, sed folliculosâ sobole seminis, cuiusmodi fatuagines in caudatis floribus Lupuli.

BETULA.

E**T** Betula perinde pueris nota, vt de virgis infesta, folio Alni aut Fagi: virgis flexilibus, rectis, gracilibus, ad scopas necendas idoneis: nucamento Coryli.

Alnus nigra,
Germano, Faul-
bom an Cobyce
Theo. Frangula.

V**D****O** s salicum natales crepidinæque ripulorum sequitur hæc, ad insectoriam quæsitâ, & valde nota de Coryli figura consimili: cuius corticis potissimus vsus: ruffescit is ex fusco.

Nuc Aueellæ

O**B****V****R****A** paucioribus locis hæc, nisi ad Septentriones, vt Angliæ, Germaniæ, & Northmanniæ: syluosis vdis, folio Alni aut Cerasi, aut Cotnus, fusco: flores albi, nec dissimiles. Baccæ exiguæ, quantæ Piperis grana, quæ primùm virent, deinde rubent, demùm maturæ atræ sunt, insuauis gustu: virgultis frangendo teneris: ideo Frangula nonnullis dicta: cortice nigro, sed glaucis maculis asperso, libro subtus flauo, vomitum ciente, & aquas secessu deturbantur.

Vix illius locus paulò asperior montanæ Galloprovinciæ est cui desit huius fruticis pro-
uetus. Surgit autem quâplurima virgulta recta, læuia, polita, prædura; cortice obdu-
cta nigro, & folijs oblongis, Kerberidis, maioribus, firmis, inter quæ crebra setura bacca-
rotundæ admodum nigre & plenæ erumpit, magnitudine Myrti, sapore planè melleo,
& pergrato plebeculæ, quas ideo vocat Amelâchos, quasimellea. Virgis sutrigitur virenti-
bus & ramolis, omnium rigidissimis & durissimis, quatermos aut quinos cubiros longis
quibus in scopas vinctis, vtuntur ad areas verrêdas. Scatent hac loca aspera prope Diui-
am Mollerias & Sisteronem illic vtbeculas.

Corylus persimilis, Alno.


R Amis & fronde Columnus superiori Alno similis admodum sed catulis pendulis hyeme,
Vitimoris betulæ quàm Alni: nuces ipsæ pistachijs pares, tû fatiunt, tum syluestres: vel
puetis esu notissimæ.

EST fluenterû rigororum uic vtraq; populus assecta, sed nigra frequentior, folio rotundo, **POPULUS nigra**
oblongo, superne acuto, initio atrovirente, hederaceo, in cuius pediculis obliquis race-
matim hærent acinuli, Piperis rotundi ritu. Quæ verò alba vocatur, frôdibus est perpetuo
tremulis, superne virentibus, subtus incanis, Tussilaginis, interdum in angulos excurrentibus;
catulos ante foliorum exortum, latifolio Salici modo edit.

Alba.

Lybica ex vtrauis carû facile noscitur, sed magis nigre assimilatur, totidiorè, minore, & Lybica,
breuiore folio, duriore, albiore, obtusiore, sed crebrò cristato, aut sinuato, adhuc magis tre-
mulo: vnde Gallis *Trebbi* dicta.

Cercis Theoph. ob siliquam
semenq; lentis effigie indi-
catur pervenusta arbor hæc
quæ itidem propter riuos aut
latiores margines interdum &
in collibus Veronæ amœnis &
Norbonæ, hetrurij etiâ nò pro-
cul Sienas, quò min⁹ decuit hæc
ignotam fuisse Senensi, nam si
nouisset, qui alioqui solitus est
vel triuales quasdam Constati-
ni poli accerere, & occasione
dicendi parû tempestiuam de-
plantis arripere, exq; alijs Côm-
mētarijs in suos rapere, istâ suâ
popularem tacuisse. Venustus
hanc illic oculis commendat &
notam facit. Flos copiosus cõ-
fertim pullulâtibus aut nondû
exortis folijs, purpureus puni-
câs, hilaris, Cicerculæ aut Psî.
Siliquæ per Augustû maturât,
semè Lentis effigie, cõpressum,
Genistæ uic: ipsæ fotis Xirâpeli
no siliquæ aut spadiceo fulgo-
re micât cõpressæ, digito latio-
res & longiores, quadantenus
Senæ sed rectæ: folio exactè ro-
tundo, Afari, neruofo & veno-
so, Cyclaminis, crasso nitido.



Arbor IVDÆ
Mousspellensium
sane CERCIS
Theoph.

E Noou orbe nò ita dudû nec min⁹ elegâtes nec parum similis arboris ramos prægrâdes
Angli mercatores illinc reuerfi attulerûnt, quorû Morgani dono iconè exhibem⁹ inferi-
us: virgulta sût aliquât um flexuosa, & per semipalmû palmûq; erebra, geniculata, veluti
insertione cõmissurâq; partiû nodosa vnde exeût è singulo pediculo singula folia, ora ex-
quisitè rotunda, nec vspici nisi quæ pediculis hæret, intercisâ crassa, rigida, latiora Arboris Iu-
dg: cui Populi alternatim exeût prælôgi loruli, stipati acinulis multis exiguis, planè Populi
ritu

Prægrandi folio
rotundo noui or-
bis populus.

ritu, quare & hanc Populum Perunianam vocare visum fuit: gustu perquam astringente, æquarum calfaciente, subtili.

MORVS omnīs

IVV A r morum temperie celi moderatior, cuiusmodi est agri Veronenſis, Auinionenſis in Galloprovincia, & pleriq; locis, vbi ex viui radice panguntur ad solertis vermis Scitici passionem: vulgatioꝝ morus serotinos flores edit, catulos hirsutos & folia Alni oblongiora, maiora, rotundiora, nigriora, squabra, laute crenata mora, matureſcētia cocci nis conſtata primum acinulis: matura cruentatis, & ſuauiſſima in delicijs. ALBA.

Pumilla quam
vocant Chama-
morum nonniſi
modo magnitu-
dine pro totius
rata parte di-
ſt. Nec talem
Chamaſſycus, ſive
humilis Ficus.

SE n enim albæ minora imbecilliora ſunt folia, tenuiora, ſinuata ambitu, albæ populi, aut Sambuci montanæ albida flacida gratiora, ſed mora multo inſipidiiora, candida nitent, ad nauſeam potius quàm a lendum nata, caduca ſarue dulcia, tota arbore minore: quam tamen pluriſ faciunt coloni ad velleris opus.

SYCOMORVS.

EX SXria & Ægypto Sycomorum aut potius Moroficum (vt Celfus diceret) quidam fruſtra ſunt cōati Italiæ Hispaniq; tum Europæ, tum Indiæ inquilinam facere: nam ne germinauit quidem: tamenſi in ſyluis Syriacis per familiarem eſſe, vel Propheta teſtatur Amos, qui ſe Opilionē dicebat & legere ſolitū Sycomora illic aut locis vicinis: nec pauci ſunt hodie qui eādem inibi illuc peregrinati viderunt, Amiciſq; noſtris & nobis quidā ſtudioſiores ambulones Monachi, Veronę & Bononiæ ita oratione rapreſentabāt, ſimiliorem multo moro quàm Ficui: fronde Apoci aut Mori, & cognitu faciliſſimā de fructu, qui caudici, aut imis ramis propē alas hæret, media inter Ficū & morum conſtitutione & figura, p uſillam Ficū æquante, granulorum tamen intus experte.

FICVS.

Et magno ſubſidio fructus ficus Hispaniæ, Italiæ, & Galloprovinciæ, vbi ſyluulas verna & Autumnali ſætura biſeræ Ficus, perelegantes videas: fronde prægrandi, lacinijs anfracuoſis quinquepartitō ſinuata, aſperā, glauca Mori albi & ſpondyli: fructu ſuauiore pleniore, recenti, ſicco ſolito, cuiusmodi vbiq; eſtantur.

PLATANVS

Perquam familiāris Macedonio & Pæloponeſo Platanus, quæ alibi rarō oritur, & vaſtam magnitudinem ad vmbracula comparatam adipiſcitur: Italiæ multis in locis coſtitur, & ſpeciōſa viſitur, nec minus annoſa Florētiz prope pomeria, & in ſuburbio quodā, nō procul moenijs vrbis, vbi hoſce ramos & ſurculos deſregimus au guſto, cum penē echini inatutuiſſent: penduli hærent hi pediculis ſingulis longioribus & breuioribus, non æqualibus, aut vno exortu innēſis (vt pingunt qui non viderant) parillitate vuedonis ferē, Bardanz concolores, apiculis acroſis aſperati, Sphærophali in modum, quę ſunt ſemina

ipſa



ipsa scabioſe montanz non diſſimilia, tomento leni ſubruſſo intexta: ſronde perquam lata (vnde Platanus dicta) Vitis aut Aceris, ſed alioribus ſinuū diuſuris, & lacinis portetioribus, denſatis: ligno non valde compaſto.

ACER.
Gall. Errable.

ACUTIE foliorum cognitu facilis Aceris ſpecies illa, quam antiqui vocarūt *αὐτρεῖος*, tāta quippe ſolia ſimilitudine ſunt cum Platano, vt Panepiſtemos Cardanus ille ſibi viſas Platanos frequentes in Scotia literis mādarit, & nō niilli prope Oxoniā eaſdē oīri ſponte nobis aſſeruerint, etiamq; oſtēderint hanc rati eſſe Platanū: eſt quippe ambitu & diuiſura Platanī aut Sorbi Torminalis vocatę, nō tamē adeo profundē acta; anguſtius folium eſt, nec ita cōpleta circinatione, vt ex ramuli huius cum cōmuni Aceris intuitu pictura hīc monet. Foliaacea ſiliqua cōpreſſa, bipennem expāſam, & inuerſam, aut Papillionis alas imitata, vno vtrinque ſemine donata: muſcoli flores, lateoli, Corni, aut Aſaræ Darac.



Varietatis.

HVIS congeneres duz ſunt: vnius ſolia

(quz Theophr. Sphendamos eſt) angulis Hederaceis, ternis & quinis, ſuperiorem zmulantur, ſunt minora tamen, & minore folliculo. Hæc vbiuſ præruptis & ſyluoſis frequentior. Infrequentior altera Septentrioni, quz fortē apud Theophr. Zygia ſit: tamenſi & frigidis proficiat, folio & ſuctu minus lacinioſo, minore: ſlauente intus ligno.

SORBUS TORMINALIS.

CALIDARVM & frigidarum, e Anglię, & Norbonę Valena ſylua familiaris hæc Sorbus, flore, fructu, & nucleis Ariz vel Meſpili Aroniz. Folio Aceris, Vitis, aut Populi albz.

RECEPTA iā vſu & nomine Oxyacantha verā eſt illa, quam Galli *Aubepin*, Angli *May* dicunt: folio eſt Meſpili Aroniz, Apii incifura: ramis duris & mucronibus ſeptis: floribus cādidis vel rubentibus, odoratis, fructibus baccisve rubris, guſtu ſubauſteris.

HVIC eſt perquam ſimilis arbuſcula in ſylua Valena, tribus à Monſpellio leucis ſponte orta, ſolia edens ſimilima, ſed latiora, fructum rubrū, quadruplō, triplōve maiore. Auellanz parem, ſuauem guſtanti: nucleis ternis, duruſculis, Septembris initio maturis.

OXYACANTHA.
MEſPILVS
aronia.
Vulgo Monſpell.
Pometz.
Ita, Aſſides.
MON-

MONTANA
Sambucus racemosa
E205a.

MONTIVM & Nemorum amafia Sambucus, superioribus perquam similis, facie, cortice & ligno concolor est, sed fronde minore: flore autem non in umbella, sed racematim Ligultri in morem ex luteo albicante, racemosisque multis acinis congestos, odoratis, Cocineis & puniceis, vna integræ exprimentibus relinquente, nõ insuaves per Augustum esui, vti certius, frondes, quas depasci dicuntur avidissimè, præsertim dum prægnantes sunt foemina. Frigidi est temperamentum somnũque conciliare potis, adeoque veterum, præsertim baccharum esu: qui si nimius, admodum noxius proditur.

SAMBUCUS MONTANA racemosa.

• AQUATICA.

ROSEA.



AQUATICA **N**ihilo secius & hæc sibi nomē Actæ vindicat, vtpote umbrosarum amœnarumque riparum, quas rblandè igitur aquæ, alumina, in Germaniæ, Galliæ, Angliæ, Italiæ, Pedemontiumque prætensibus, vdis, conualliumque marginibus: verum fronde potius propiusque Aceri, quam Ribes nigræ, vel quam Sâbuce accedit; virgis gracilioribus, geniculis, politis, fractu facilibus, Sanguineæ, frutici siue cornui foemine concoloribus, nec medulla pluri: florum foliolis Thlaspi Candiz, latioribus quam Sambuci, sed effigie & odore similibus, vti & semine ruberrimo, compresso, Viburni, dictæ fluidæ Theoph. gustu nauseam faciente: Gallinis, & auibis in cibum cedit.

ROSEA.

ELEGANTIOR, hilarior aspectu, & rarior Rosa. **SAMBUCUS** hæc, herbarum studiosis in hortis alitur: Folio, stipite, toto habitu aquaticâ Sambucum præfert, flore tantum visu iucundo, multiplo, glomeratum congesto, Rosam candidam equante & effigiente, discernitur.

Bryonia folio
Amomũ Græcorum & Plinij.
Alterũ apud Plinij
Punicea folia.

Non parum affinitatis Amomo esse cum Cardamomo, præter ipsam nomenclaturâ & vires aromaticas, in antidota addi solitas, itemque sonificas, tum Theophrasti & Plinii autoritas nos certiores reddunt: vt enim Dioscor. posterior vixit Plinius, ita certiore collationem reliquit: vbi inquit; Simile est Amomum Cardamomo nomine, frutice, semine oblongo: metatur eodẽ modo & in Arabia. Dixerat idem paulò superius: Amomi vna in usu est, Indica vna Labrusca, quare quam Labruscâ Indicâ vocat hic, videtur cum Amomo Dioscor. folio vitis albæ, eademque cum doctos diu exercuisset, & eos peregrina planta defecit.

defecisset, nostram Ribes nigram epinati sunt: quæ ut vera non sit, saltem non onumento esse poterit ad ve ram vestigandam. Et alioqui non indigna cognitu, folio viticeo, aut Bryonia, virgultis odoris, interfindendum virentibus, nigra vix inodo racemosa, flosculis herbidis, iuteolis: locis syluosis Alpinis frequens, & in hortis culta, ut Hypris, & alibi, in Occidua Flandria.

Ribes nigra & Rubra.

Est alia Ribes longe similima folio, facie & furculis, bacis non nigris, sed rubris, pellucidis, suauioribus multò, & notioribus, tum officinis ad Rob. de Ribes, tum hortis.

V Erum, & alterum describit Amomum Plinius, quasi exscribens aliorum sententia, qui existimauerunt esse fruticem Myrtuosum, Palmi altitudine: laudabatur quàmmaximè Punicis mali folijs simile, nec rugosis, colore ruffo. Preciù vix in libras x. & xl. Adulterabatur autem folijs Punicis. Hanc item factum, ut accuratiores expensores arbitrati fuerint, illum fruticem acini Alkekengi, & folio Punicæ aut Persicæ, qualem in Solonis descripsimus. Et quàmvis auctores consulturo, in promptu erit nosse nos hodie vtroq; vero Amomo carere: tamen hæc plantas huc adductas esse par fuit, ad veras, quando sese offerent, certius dignoscendas.

Q Uo vero ignauiores huius vnam ducerent, aliam peregrinam plantã, ut multò Amomum aptiorem, adducunt: quæquidem ipsis acinis, aut granulis Piperis minoribus, Cubebæ rotundioribus, pedicellis extantibus. ipsòq; demum gustu, illam Amomi vnam adumbrat. Sunt tamen ea quolibet Piperis feruidiora, aciora, nec aromatica. Eoq; Pimento del raba vocat Lusitani, quorã cõmercio ex Indijs habemus: sed iam desitũ adferri in Septentrionem, ne vulgatum Piper vilesceret. Piper met Sterren vocabant Belgæ, id est, caudatum Piper: folia produntur vitis Anguillaræ.

Piper candidũ.

E Adem delineatione persuasi, non paucis placuit Rosa Hiericoutea vocata pro Amomo: quod tamen minimè deuit eos asserere, incertos foliorum, quæ meminimus vidisse, & creuisse Doct. Treuisano Patavij. Crescit enim haud ita difficile ex semine recenti hærent autem seminula complura, racematim vnã stipata, glumosa, Sorgi minora; & intra fruticis, cancellatim, reticulatimque implexi glomum contenta. Folia verò non succurrunt.

Rosa Hiericoutea

F Am autem qui nonit Amomum Dioscoridis & Plinij, illicò noscet eorundem Cardamominum, utpote Amomum simile nomine, frutice, semine oblongo: & idem discet nostrum siliquosum, Cardamomum Officinarũ, aut Græcorum non esse, aut descriptiones prorsus de prauatis esse: nam Galeni locus adductus de exenterato fructu Cardamomi, potest intelligi de glumis mundato: nec vllus locus aduersatur ex Dioscoride, Neutiquam tamen contemnendi vsus hæc siliquas putamus: tum quia tacito consensu, & prerogatiua vsus receptæ sunt: & fortè Arabum sunt. Earum quæ maxima, Melegetta, aut Millegetta dicta à semine crebro, facto, occluso in folliculo membraneo, Ficum foris effigians nomine Grani Paradisi notissima est, & ex Occidua Aphrica frequens allata. E quatuor alijs siliquis, quæ inter se perquam similes sunt: ea quæ Officinis, inaius Cardamomum vocatur, oblonga triquetra, lapidi dactyli concolor & par. Semen condit angulosũ, Millegetta minus. Triquetra item siliqua, sed breuior est media vocata, nec dispari semine, quã verius putant Cardamomum, propter amarorem & acrimoniam non exiguam. Minimapariter triquetra, sed vix nucleum Pruni æquat. Perelegantem aliam habemus à Morgano quandam, recens allatam ex Indijs Occiduis, pusillæ Melegetta penè parem: sed triplici carina triquetra graciliorem, & admodum Xyridis siliquæ accedentem: sed corticoso capillatio obdusam, albidam, intus oppletam semine pari, albedo, lucido Melegetta sed albo, mansu facili, & gustu multò gratiore, Gingiber prorsum testante: subustiam, quã siliqua hæst scapo, arguit Gingiberis stipitem: quare istas omnes siliquas Cardamomi, esse plantarum consimilium, nec Gingiberi absimilium, non abs re quidam peregrinator narrabat.

Millegetta.

Piper Longum.

C Vm è superius dicto Pipere nigro, tum è fructus nucamento Officinis notissimo, satis constat diuersam hanc esse plantam, quam recentiores folio Mori delineant.

B Orealem hortis, ut Angliæ & Belgij, loco Vitis viniferæ est hæc: eoq; vix crispam vocant hebarij, vitacea item fronde, aut Ribes, sed incana totis virgis, & spinis horridis, Pp. ij.

Vna crispâ sine Vitis præcia.

acinuli crebri, singuli, in virgis tamē pellucidi, pallidiores, intrò maturi, subsulvi, cultu multò suaviorēs & maiōres.

*Sature ROSÆ.
Rubra Proximi.
Candida.
Pallida.*

Orbis deliciz, florum princeps & honos Rosa, Angliz florētissimī Sceptri, petinde auspiciatissima, ac mericissima tessera, vt in quo regno hunc fruticem, non modò ipsa bruma virentē, & interdum penē perpetuifolium, sed etiam mirē feracem, biferum saepe, quādoq; triflorum videas. Triplex est vulgariorē colore differētia: nam aut purpura sanguinea, saturē punicea: vel aspectu niueo micant: aut candore & rubore consulis, flammæo rutilant, virgineis genis, & malis concolores, quas plebecula pallidas vocat. Tres hæ insigniores satiuæ differētiæ sunt, quæ, quòd sexcentis ferē lenocinijs, colores, odores, sapores, magnitudinem, numerumq; foliorum, & vires demutare queant & soleant fieri præpropere, ferotius, brumales, non sunt huius instituti.

Cinamomea.

Sylvestris tamen natiua sunt varietates, & notatu perquam dignæ: eius præsertim quæ boreales Canel roose, siue Cinamomeam appellant: hæ foliolis, sunt omnium florum minimæ: Franciæ, Belgio, Angliz, ruri sponte crebræ, ipso odore notissimæ.

Moschata.

Moschata videntur sylvestrem exuisse animum, mangonio, & hortenses duplè factæ: vbi fragrantiz comendatione coluntur, condunturq; & esitantur passim in Italia, Venerijs præsertim: alui iucundius, sed vehementius cient: & animi deliquia, stomachi, cordisq; lacerationes accerfunt.

Lutea.

Cerulea.

Pares & cognatiores illis Luteas, cum aliàs saepe vidimus Argiera Affricæ ex Numidia, Galliz inquilinas factas: tum in Anglia consimiles, solerti manu in Genistæ scopis inlitas, vnde colorem, odorem, viresq; mutantur nouas. Est & iamdiu videre Caruleas in hortis Italicis.

*Eglentine ou
Eglentier.*

Species est altera folijs minoribus Myrtinis, sed latioribus, flore & elegātia Rosæ Moschate: fructum similem cæteris fert, & æqualem: tota planta multò odoratior, vulgò *Eglentine*. Angliz & Flandriæ hortis, ad odoris gratiam colitur.

Spongia Bedeguardis.

Ramis omnium, sed præcipuè huius villosum, colorumq; mucidum excrementū hæret solitum floccis, velleris Sericeis, instar, Bedeguard vocatur.

Dumet Rosæ.

Pomifera.

Morsifera.

Baccifera.

Batis Rubus

moraq; Batis

na.

Inter Sylvestres non postremæ venustatis alia Angliz perquam familiaris, & Eglantina cognatio: fruticat pumilla, bicubito non altior, sed inodora: folio minore, & pereleganti: Mespilo Aroniz non dispari: pomo donata minore multò, colore viuidiore, rubello subpunico, per Augustum maturo: flos Rosæ sylvestris est.

Sunt Rosæ perinde facie, vt viribus & nomine affines Rubi Batis, vt sint vbiuis perinde notæ & inuisi, importuna, nocuaq; feracitate: duplici in eis differētiā facile percipias: vnus namq; vulgarissimus, quo intextæ vincitūte sæpes: inter dumeta & lumeta nihil isto frequentius: virgulta crassa, quadrangula, sentibus infesta promit: folia spinosa, serrata, terrena, & mora edit planè Fragræ similitudine: ad Diamorum confectiōem Officinis vtitissimæ, floris Eglantinæ.

Reptans.

Alter Rubus nullum latere quit, in aruis passim restibili, seque progignenter rediuiua sobole gramineis feminibus sparsim pululāte, in satis plurimum triticeis: prorsum si milis, sed tantum minor reptansq; est: minorem minusq; succulentum maturat fructum.

Rubus IDEA.

Hec item spectat *Framboysier*, quasi Fraga lignea aut syluosa Gallis dicta, & admodum nota Septentrioni: vbi nullus saltus vnbrosiorum syluæ, isto Moro caret, duplò maioribus acinulis confato, cerula purpura nitentibus: conduntur mora & esitantur, ad voluptatem & sitim qualita, aspectu amēniore. Minus horridus spinis frutes, folio terno, uon dispari Fragranz, crenato.

Cynosbaton.

Nescio qua sui fiducia nos inuitos nihil scire docere vult doctif. Math. qui iādiu nō nouit, nequidē postremò monitus agnouit Cynosbaton. Cuius duo frutices, vt nomenclaturæ, sic effigiatæ ex antiqua descriptione persimiles, certos nos faciūt, aut saltem ex nō carere nos hodie. Est autē frequētissim⁹ Cynosbatos Rubi persimilis valde quā spinosus sepe arborefcit, & amplexu arborū accrescit, florē & fruticē Rosæ sylvestris promēs: eius baccas cornui aut ceralo pares & cōcolores, intus lanugine fæctas, pueri esitabamus.

*Cupressus proximi
Sabinæ red-
denda.*

Vgiter virētis Cupressi lucus est perquā amēnus & venustus propè Burdegalam, alibi- que hortis ad Septentrionē pulchre adolefcit, vt in Anglia, Ramis & folijs Sabinæ baciferæ, sed nucula oblonga, pusilla, sculpta aut rimosa, ouo columbino pari, intus semine compresso, perpusillo, Quod.

QUODLIBET solum æstuosum & aliosum modo macilentius sit & sterilius, tam abundè Erica fundit, ut ea neminè latere queat: vulgatiores bifloræ purpureis floccellis Tamarisci Norbonensis, cui usquaq; similis est & cognata facultatibus, ad splenem atque calculi affectus. Saxosis tamen montibus Angliæ occidua ad Brisoliā exiit, tota festo Vnedonis flore quipalmaris, sed densior fruticat: flore calyculato, longiore & Vnedonis ferè, hilarius purpurante, nec cæterò diuerfa.

Sed quasi gaudeat aridis & squalidis, speciosior strucosiorq; euadit in Romano, Thuscoco, & Norbonensi agro: raris folijsq; prolixioribus, caudatis, comosis, Chamæpitis effigie, flores edentibus calyculatos, venulè purpurantes, similitudine Vnedonis, apiculis fibrarū. Et hanc, si, uti nos floridam pedibus triuisset in Italia Mathioli, neutiquam Fallopio, seu plantam peregrinam acceptam tulisset.

Non eodè hæc nacta natales, sed sabuleta maritima Veneta: eandè studiosiores videbāt Mospellij fecus patibulū Castrī noui: humilis reptat humi, sesquipalmaris, folijs pusilli Germanici Thamarisci, Lini pericarpis aut Cythi: semine, floccellis luteolis, item Cythi aut Helianthes: quare Cytium quintum opinatus fuit Doctor & Præceptor Allatius,

Vulgatiorem prorsum, facièque Ericæ prioris videas, præcipuè in riguis & maritimis Galloprouinciæ & Lio Venetorum in Cotonzi magnitudinem caudicemq; abire, è quo ad splenes detornantur pocula. At quam hic Meditæranæ proximam appinximus, ad Rheni ripas in Germania spòte frutescit: sed exilior humiliorq; multò, nec arbor sit. imò plerumq; in hortis Angliæ Brumâ interit. Et flores huic tomentosi, papposiq; dissuunt vnâ cum semine, maioresq; sunt ferè pares & similes vulgaris Lampfang, sed purpurei. Norbonensi autem ramosi exigui flocculi, nec papposi, sed rotundi Olex, ex albo punicantes sunt, & acinulis, quos interdum totum triduum Soli obiectos obseruanimus subsilientes & tripudiantes, vermicello intus orto agitante, & tripudij autore, qui pertusis aut desilientibus tandè granis, foras prodibat.

Sabina baccifera.



BOreales Meridaniq; horti, præsertim in claustris Vestalium, Sabinam vulgatiorē alunt longè notissimā de Thamarisci folijs, sed rigidioribus, pungentibus, tetrū que odorem halantibus, perpetuò virentibus, baccarum expertibus.

CAlldioribus autem Lyguriæ gaudet, mōtosiq; ut Norbonæ Ceto monte, hæc, baccas oxycedri maturās subpunicæas, refinosas, minus fortente tota planta, quàm superior: odore tamen non absimili, folijs ut plurimum Cupressi: sed interdū in Galloprovincia, folia ima sunt Iuniperi, superi

Pp. ij ora

Sabina Aegyptia,

IVNIPERVS vulgarior,

*OXYARCEV-
tis, sine acuta
Juniperus*

CEDRVS Phœnicea

Cedrus Lycia

ora Cypressi minus aspera aut pungentia.

Quandā ægyptiam Sabinam Bononienſes profeſſores faciebant, quæ à nobis inter Abrotanum relata eſt, caule pedali et ſeſquipedali, in ſummitates caudatas, comoſas exeunte, pullo pallentēve colore.

Glareofis tum Meridiani, tum Borealis ſoli ſterilis, inter Ericeta, fruticoſa ſobole ſempervirente, fruticat minor: folio & facie Ericetæ aut Sabinæ, fructu Piperis, grano ſubduli, odore, vñ lignum totum.

Vigatiſſima eſt etiã in Galloprovincia Juniperus maior hæc, inibi Cade vocata: folio Juniperino maiore, acuto, mordaci, pungente bacca triplò maiore, Sabinæ perſimili, & concolori, reſinoſa tota: ſpirat ſua uolentiam lignum, funditq; liquorem, quem illic Oleum de Cade vocant.

Ex Iſtria quaſdam habuimus plantas, non diſpares fronde & figura, ſed fructus erat teres, oblongior, mediocriſ Oliuæ par.

Eadem Norbouiſi agro viſitur bacca, buxæa, tripode, quæ quidem non peſſimè quadrat Cedro Phœniceæ.

Lyciam Cedrum iamdiu vidimus Lutetiæ in quibuſdam hortis, folio Juniperi multò minore, ad Sabinam accedente: bacca Phœniceæ minor eſt.

CEDRVS Libania & Paleſtina præceſſa,

Aliæ ſūt Cedri Græcorum, quarum nonnullæ in Citijs diſtæ: hæc autem illis indiſta, Paleſtinorum in Libano Alpigena, ex ſacra pagina admodum celebris & nota fuit: Eius autem puſilla cupreſſi ſemina, ſed cōpreſſiora, in Figulinis ſata, nobis arbuſculas tres aut quatuor pepererunt: quæ perquam venuſtum arboris cōmenſum, & indolem, iam tum per initia præferebant.

Parauij ſemen habuimus, vbi induſtrius & generoſus vir Cortuſius etiam ſeuerat, & colebat: vt mirum ſit tantillum ſemen alio cœlo & ſolo, tam celeriter & eleganter in arbuſculam ſeſquipal marem aut cubitalem erumpere: hic pictas ex conis & icone has plâtas exhibemus: & facile deprehendere ſit, min⁹ verè in Mathiol.

deſineatas. Sempervirent folia Abietina: aut Pino breuiora: Ligni autem materies & aſulæ, hilari ſunt & nitido aſpectu, ex Phœniceo purpurâtes, non valde duræ, odorem roſeum, quàm Sandali ſuauiorem aut Cupreſſi habentes, præſertim dum pruni adolentur: Galliæ, Northmanæ, Lōdini, & Belgio, iam valde nota materies: hæc fortè innuit Poeta, cum de Circe canit, Vrit odoratam nocturna in lumina Cedrum.



EDVABVS quas veluti summas coniferarum differentias statuit Dioscorides, vulgarissimam Pinum multis hortis cultam in Belgio & Anglia, Italiz & Norbonæ ad aquas Marianas spontè natam in promptu nosse est: quippe arbor euadit celsa, prægrandis, foliorum prolixioribus longioribusque, quasi comosa, pilis & cono ampliore, crassiore, breviori, pressius Cedrinum conum exprimente: nucleis compactis, esculentis, item habitioribus, quos officinè vocant Pineas.

PINVS.
RESINIFERA
& conferta.

HVIVS autem sylvestris videntur esse plures varietates è conis, foliis, totiusque magnitudine ductis: duæ namque in Lyguriz, Galloprovinciæ & Norbonensis, ora maritima passim sylvestrunt: foliorum prælongo rectòque capillitio illi persimiles, sed vna brachiata est, cui folia manipulatim erumpunt è medijs glabris ramis, æquabili plurimum exortu, cæparum instar.

Pinus sylvestris
& Varietates.

ALTERA persimilis vndequeque stipite ramorum, foliorum, & capitata facie, utriusque eorum conus oblongior, minor & angustior supernè, quàm Pineæ.

EA autem, quam vocant quidam Cembronem, vndique item foliorum comosa densa; sobole stipatur, conis obtusioribus, brevioribus donata, per maturitatè facillè hiulcis.

SUNT adhuc sylvestres duæ, quæ breviori foliorum sætura, magis circa ramos reducta, pressius Piceam præferunt, aut Abietem. Quarum quæ ampliore cono & longiore folio donatur, Mugo vocatur.

MUGO.

ALTERA exilijs viliusque comatur, donaturque nuce multò minore, & ferè Larigna, **LARIX.**

LARICIS ne nomen quidem Greciz olim innotuisse certum est: quippe quæ oblectetur frigidiore & Boreali celo. Ac tametsi Diosco, alicubi huius resinæ meminit quasi pergrinæ & ex subalpinis Galliz & Germaniz in Græciâ aduehi solitæ: tamen arbore minus novisse indicio est Agaricû: quod ille radicem esse dicit, & ex Armenia peti. Iam verò perquam nota, & nobilitata triplici extremèto & præsidio Larix, Manna nempe, Agarico, & resina Larigna, quæ *Lagrino* hodie Venetis dicitur & falsò Septentrion. & Trâsâlpinis indicatura Terebintinæ venû mittitur: folia plurima, sed delicatiore potè frondet, nobis etiam Bruma sæuente & niuibz Alpes infestante. In Germaniz Alpinis Montes Nicolai & Allobrogum Sabaudis, per exortus quosdam eadem folia manipulatim & penicilli in morem promit,



Agaricum Larignum.

*PICEA, &
Abies.*

*Sapin Gall. est
Pteroporus
Theo. hac mul-
tum theda dat.*

*σμυλαξ TAXUS
μυλ. Theop.*

PICEÆ autem & Abietis vastissima nemora transmittunt, qui ex Germania, Triden-
tū, Veronā, Venetiā se petūt: cognata vtriq; facies est, & plumatim ramos pinnatim-
que folia vestiunt breuiora ferē Taxi, pungentia, rigidiora; sed *PICEA*, in extremis, rectis
flexilibus ramis Coni grandiores, ventrosiorēque, & aspectu iucundiorē: Abieti au-
tem præcelsa proceritas, erecti, crassique caudices, adque nauum malos succindi soliti, nō
modò antiquitus, vt in Nemore Peliō, cuius execratur abiēgnas trabes, Poëta sed ho-
die ad Aquilonem in Noruegia & Russia. Et huic vni suuini in ramis, & in cælum ob-
uersi mucionibus sunt coni.

QUAMVIS prorsum feralis & pernecabilis credita TAXUS, & sic vocata sit apud Pau-
lum origine Græca, à sagittis inficiendus, venenōque armandis (cuius etiam stolones
curuantur in arcus, vt canit Virgilius) eius tamen baccas rubentes, Coccinas, teretes, per-
similes & subpares Smilacis asperæ, vel Asparagi granis, innoxie pueruli esitant in An-
glia, nosque gustauimus sub hyemem, non ingrato sapore, sed satuo, vel amaiicante, vbi
porci passim eas, quasi glandes pascuntur. Nulli sanè Angliæ angulo deest hæc, vbi sem-
peruirente vmbrosa, densaque ramorum iuba latissima, similiter Abieti, plumatim lon-
gis quasi pectinum radiis atrovirentibus comatur, inq; sepulcretis & arēis pro templo-
rum foribus pangitur, ad arcendos Solis æstus à concione, plebēq; sub tegmine Taxi vm-
brose & annose conuentus religiosos agere sæpius solita, nullo percepto inde vel tan-
tillo incommodo.

PALMÆ PINUS, siue Conifera.



VEGARIS palmę congene-
res esse multas syluestres in Si-
nu Guineæ Oceani occidui, quæ
steriles sunt, nec nisi exilitate à
satiuis absunt, narrabant nobis
mercatores industrii Gallobrito-
nes, qui illuc quotannis fermè cō-
mercii causa adeunt. Inter quas &
aliū Angli insitiores non parū ve-
nustam & miram hanc, iconē hic
expressam, inibi oriri assirant;
cuius ramos luculenta conorum
fœtura onustos dono iidem attu-
lerunt stirpiū cultiorisq; artis pe-
ritissimo Pharmacopœo & Cui
Londinensi Iohan. Riccio, qui
nos donauit isto palmite, aut
potius Pinopalmę termite: cuius
arborem, quasi quandam ex

Palma & Pino hybridam natura ludibunda videtur conflasse: est quippe lignum ipsum fun-
gosa Palmæ prorsum textura, in villos tota dehiscens, & squamosa cute loriatum, fastigiatum ter-
mitis

mitis numerosis, & in orbem exortis furculosis ligulis quadraginta, aut quinquaginta compactili vertibulorum & squamarum serie pyxidatim articulatis, pedem longis, rotundis, parum compressis. Quorum singulis commissuris, singulis, numerosi coni altius inseruntur triceni, aut quadrageni, qui mediocrem conum Cedri ementiuntur, puluillis in quinquicem digestis, reticulatq; & unbricatim extuberante vetricioso nucis cortice, lusco, nitido, polito, crassitie & concretionem nucis Indicę: intus nucleum glandemve oblongam, sesquiunciam aut duas uncias longam, præduro, inque sarinam ægrè friatili, gustu glandis & castaneę: quæ sunt ei genti panis supplementum.

P E R M Y L A sunt Palmæ species, non parum inter se fructu, præsertim & fronde diuerfæ, & omnes orbi nostro peregrinæ, ægrèque assuescunt. Nam nostras quæ Norbornæ & Lygurię maritimis, & præsertim ad Olbiam Galloprovinciæ frequenter & felicitè enata videntur, fructum non maturat; eoque potius volupratis, quàm utilitatis causa alitur. Seruntur autè non in iucundo spectaculo & Naturæ silentio Dactylorū tria officinosa, vnâque iuncta panguntur: tres inde oriuntur exiles stipites, sed in vnum conlati: foliorum tamen pusillorum & harundinaceorum trina pullulatione distincti, cuiusmodi in Francia, etiâque in Anglia facile proueniunt: adultæ, sunt squamatim imbricatimve tecto caudice, crasso, harundinacea cultrata fronde Xyphii, vnde Spatię vocantur, quas, vt & flores, & fructus & ramos è cacumine ferè promunt.

Chameriphei.

C H A M E R I P H E S, siue reptatrices & humiles apud Theophrastum palmulę, notissimæ sunt Hispaniæ, Galloprovinciæ, & Italię maritimis, tum ad scoparum vsum quæsitæ, tum ob encephalum illud, siue cerebellum gulę blandimentum, antiquis in primis commendatum: scapus enim propè radicem ventriosior protuberat, crûsq; humanum æquat, fistulosus clauditi hanc medullam, qualem estimamus suauis Carduorum gustu: tota minor est, foliis angustioribus, bacis alterius Palmæ crebrioribus, minoribus.

*Enerphabys
Theo. Cephæi-
ni Italicæ.*

H V C etiâ Musa reddenda est, quæ ex Orientali in Occiduas Indicas insulas, adeoque in Portugalliam trāsila iamdiu multis innotuit: & indidem folia portentose magnitudinis, nos hahuimus: eius effigies, fructus, florēque affabrè delineata extant in ditissimis Commentariis famigeratissimi Mathioli.

*Cunophoran.
an nuc Indica.*

I N T E R Palmas præstantia obtinet palmā & famam Nucis Indicę arbor, Calcutiis Indicę fabulectis maritimis vastissima & vilissima: foliis vulgaris Palmæ maioribus: flore Glandis aut Illicis fructu, quem nucem vocat & Auicenna, qualem passim pro soribus Officinarum videmus luculentæ Melonis magnitudinis Serunt hunc & transiuouent indigenæ, quò lætiores exeant arbores: sunt hæ laxiore mollioreque ligno.

Nux Indica.

H A N C admodum fructu variam, fortèque syluestrem esse suadēt nuculæ, quas ex finibus Trogloditicę Guineę habemus: hæ vix magnam æquant Oliuam: Corticose illi nucleo, oleaginoso, sapido, protus Snilis, sed huic testa ossea, duriore, nigra.

Nucula Indica.

N O V I T A T I & utilitate visenda altera ex rei argumento Palmalimum à nobis vocata & ex Percinianis Insulis cum multis rarissimis allata: hasc ferinè procentate recta edit virgulta, digitum & pollicem crassa, altera sui parte seminotunda, polita, colicæ prælongæ effigie: antierius gemino sulco profundo quàm longa est veluti carinata, in quas cauas strias sese induunt & stipant multa densa folia, quadantenus Palma, aut arundinacea, sed angustiora, & in villos canabini corticis planè similes, perquam tenaces & fugaces, totquendis aptissimis diuulsa, ea per exortus summotenus in sinu liliarium velant & occulūt penitus iuncellos complures Sparteos, Elphæ pares: præterquam in summo, vbi comatur scapus, sparsa sobole in thyrsi elegantis effigiem.

*ACATIAE co-
gnata planta.*

L V B V I T etiam permultarum arborum & fruticum peregrinarum aliquot descriptiones & Icones addere, quarum inspectione Philosophiæ verè candidati oblectentur, & quasi specimine vel verbis, vel literis indicare plātas naucleris & mercatoribus queant certius consequi. Quædā earum Acatiz congener est foliis & spinis: furculi tortiles, Iulubę cōcoloribus item per crebra internalla geminis aculeis donatur, cornua Limacis exerta referentibus, interque cirri exiles foliola Acatiz primæ positu & similitudine gerunt.

*Hæc sub finem
operis prælatas
sunt.*

E T alia, quæ non foliolis dissimilis, in viminibus sesquipedalibus, spinulis aduncis donatur concoloribus vix crispis, sed exilioribus.

Qst folio arbor

Huius arboris extrema virgulta lignosa sunt, Cysto cōcoloria & similia; folia itē rugosa, oblōga, Saluig aut Mēthe: sed in sumis ramulis, villosos, exactē sphaericos floccos ostantant, siue lanosa capitula Platani.

PALMACEA, aut Arundinacea pinnata Spinoza.



*Rubi facie
senticosa palma.*

*NARTI FACIE
Arbor*

*VISCUM IN-
dicum*

SUNT huius plantę indidem aduecti rami foliosi, illis affines, nec minüs intuenti effigie peregrina: quippe Sābucini, aut ferulacei sunt, fistulosi, & medullę pleni, recti, rotundi, octonũ aut denũ cubitorum: sed per longitudinem triplici cartilagine, digitũ lata, pinnati, aut alati, instar teli: & oris extremis modicę simbris sinuatę sunt cartilagine, stellulęq; spinosis ornate, solertis opificis sapiētia arguētes.

ALTERVS illic nate arboris truncum aut bacillũ hic proximę exprimendũ curauimus, qualē vnā accepimus. Quod carpi crassitie est, longam hastā æquās, & cortice nigro, dēso vestitur: tuberculis crassis, senticosis, creberrimis, in clauę modum muricato, solido, & graui, prædure ligno.

ET huius plantę operę precium est intueri paucis hæcienus notas siliquas, perquã pulcras. Propēdent hæc de ramis & furculis Sābuci palustris, medullosis, pallidis, pullis, nodosis, sesquipalmum & pedem longis vaginis, cutaceis, vno cohesu septenis aut nouenis, singulis gracilem Lampetrā effigiantibus: intus farciūtur pelliculis cepaceis & tomēto-sis, ad eod exuuium serpentis ementientibus, & quiddam cadaueruli anguini simile innouentibus, vt pueris horron sit & illudat: cōsimili florũ exortu oblōgi exeunt calliculi, herbæ sanctę, aut Strammoniz, quales quã potuimus scitē delineatos ad calcē operis vide.

EX iisdem plagis accepimus hanc, nuspiam nisi in ramis & truncis arborum enasci solitam, ntu Visci, quod, quia multũ adũbrat, Indicũ Viscũ vocauimus: sessili, sed transuersim excurrēte est radice cespitę; gramineis geniculis & Polypodii quadatenus: sed albicantibus: culmis item ex pallido virentibus, à medio lummotenus crassioribus, fungosis, striatis, sesquipedem longis: in quibus folia semper virentia Visci effigie, sed duplō maiora, crassiora, fungosiora, & secundum neruum, medium folium intercurrentem, circulis vtrinque senis, non parum admirationis mouentibus, veluti scalpro impressa. Eisdem cœlo & natalibus ramorum arborum, Indicarum debemus hanc, vnde auulserunt, qui Morgano miserunt, cespitę latiore, sessilis caudicibus iucumbit, fibrillis cepaceis radicata: vnde proximę surgunt folia inuicem conuoluta, tunicea, inferius ferrmē palmum

lata

lata, numerosa, quadatenus Aloes aut Scyllæ: & supernè in ligulas prætenues, mucronatas: definitia: purpureum, striatum, concavum, alis donatum. Scapum Hastæ Regiæ aut Aloes duorum & trium cubitorum ambientia, quæ multis glumosis filiquulis spicatur, Auenæ sita: magnitudine verò, & sericeo tomento candido, Apocinum vel Asclepiadem representant, & semine, sed Coniæ exili, gustu falso ingrato, nitroso: fortè, quia in aura maritima adoleuit, vt Aloes illic in Sabuletis.

Coniecerunt iidem Naucleri in easdem sportulas, surculos effractos arboris, Alno quidem similis, fronde & ligno: sed tamè diuersos, tacemoso, muscoso flore, glomerulos cõflante: forte duntaxat celo & agro variat.

Sed hæc, tametsi Petafitidem adumbret, ortu & ambitu exactè circinatio vegradis, folij ^{Petafitidis} galerum fere æquatis: est nihilominus cespitè radices implexo, multa sobole lateratim repullulante, & caules fundente aut potius foliorum pediculos bicubitales, culmosos, medullosos, singulis singulo folio hærente: nec anfractuoso, lunatum sinum, pediculus fulcit, vt in Bardana. Fungoso, strumoso cespitè, carioso: & supernè densè, circum caules vt Meum, comante, maxinam Osmundam æquante, lorulis vimineis, subtus late fufis, gustu sicco astringente, auulsam hanc ex annosa arbore, ni fallat memoria, dicebant.

C. B. REXVS.

HYVVS penè portentosa elegantia, Naturæ Geniis omnem prouocauit in nostratibus plâtis admiratione: nam mirabilitatis opplet spectantis animum & oculos, huius rarissimæ venustatis plantæ speculaculum. Eam plebecula effigiei argumento, Cereum venaculè vocauit: hastas enim surrigit quaternas & quinas, nouemdecim & viciu cubitorum, virgatis & ad normam directis strijs, canulatis: in externis extantibus striarum angulis obtusis exeruntur stellulæ, corneis stilibus radiatim è suo centro quoquoersum minacibus, vno duntaxat prominulo horsum, eque directo longius: tota quamdam effigiaturam, & concolorem superficiem Echino melocacti præfert, sed brachium æquabili ductu æquante: Columellæ, aut Cerei Funalis prælongi instar. Eius è medio & striarum doctis, anstatim, angustiore ceruice, cucumeris ventre, surriguntur brachia terna, quasi folia teretia crassa eundè, cõmensum proportionis & figuram sortita. Intus torulus ligneus, prædurus, carpi crassitie obductus est, callosa carne, & succo Aloes: gummeo enim turget perquam amaro lentore: flores in fastigio summo promit, referente qui attulit, Digitalis purpureæ: fructus hilari purpura miniata rubet, sicut ferè effigie, gustu non insipido.



Iisdem maris Perulani in sulis, Hispaniola, & alijs, mirificè & cognatæ faciei istud spinosum foliū, ruri, ac sponte, abundè arborefcit perbella foliorum annuorum succretione, NE Ficifera & connexu: sed inde permultis in locis flores Hispaniæ Galliæ & Italiæ fatum nec fructus pro-

promit, quos ideo hic appinximus, quales Massilex, in amoenissimo ad portus littora viroto strenni ducis maritimæ militæ Petri Boni decerpimus, & permaturas esitauimus. In monachorum etiâ Paradis multis & suburbanis ad MonsPELLIUM, non modò elegantes cultæ, sed etiâ neglectæ plantæ multos annos virucrunt: adeo namq; sūt viuaces. vt tū folio semidessosso humi, tum vel seminulo sato proueniat illic: etiâq; in Belgio quibusdam Pharmacopœis foliū peperit. Vnâ mox cum ficuum rudimentis superne in umbilicello emicāt flores calatbi Balaustrij quadatenus effigie, luculentiore magnitudine & luteo colore: fructus maturi ficum magnam equat spinulis ambitu horridæ, cute miniata purpurascente: intus succo cruento, granis, & pulpa ficulneis, sed gustu insuauiore. Esu multo lotium cruentum cieri pleriq; asserunt.



*Indorum ferru-
minatrix.*

Proximè hanc appingendum curauimus arbusculam, inibi etiâ sponte enatam & huic admodum cognatam, vocant Indi ferruminatricem, artuum fracturis & luxationibus peramicum: perpetuò virescit etiâ hæc, & foliorum sobole successu na arboreâ magnitudinem adipiscitur: iisdem planè folijs sed fructu minore & spinosiore, purpureum viscidum succum remittente, adq; imbuedos pannos insecturæ tenacissime.

*Ravida siue solis
ros & Δq: 1010
recentiorum, a-
lia Alchimilla
ab Drosio.
Post capillares
omissa fuit.*

Mirifica hæc herbula & efficacitate neuitquam posthabenda, pleriq; plantis apud antiquos decantatissimis, quibus fortè non nota fuit: ac ne quidem hodie admodum Italix, Norbong, Austrinque plagæ herbarijs. Est quippe vernacula Borealiū, qui Rorè solis vocant siue Son dau vt cuius folia aspergine limpidâ & torulenta ætate madeant, quàm non modo solis feruor non exhaurit, sed etiâ augere & potro fouere videtur. In Franciæ & Brabantix sabulosis acudis sero bibus interdum obuia fit: Angliæ Cantix & Somerseti prefecturæ hæc adeo sca tent, vt non procul illustri Cœnobio & môte Glassembrio vocatis, quantū fat sit Equo onerâdo suppetat, fibrosa radice, senis octonisue in candicellis flexilibus rubellis sesquiunciâ lōgis foli-



ola oblonga, concaua, pusillum cochlear, vel auriscalpium imitatur, hirsutie purpurea pubet: ambitu crenata, subter verò glabra & polita, rotulæ guttulis aspersa, viticulis cauliculis ternos quatuorue digitos longis, rubellis & inflexis, albidis flosculos gerentibus: & rotunda seia in glumis pericarpio Anagallidis quadatenus similia claudunt: torius acris gustus, substringens, nonnihil acidus & acerbus, admodum exsiccans. Ad falsæ pituitæ decubitus in pulmones (quorum vlcera & tabem sanat) nulli secunda: tula vna cum foliis nigri grumis cutè rumpit adnota. Fulvus aureusq; limpidus ros, qui destillatur ex folijs & flosculis, bibitur ad eadem.

Viscum Indicum superius pag. 452.




Peroniana alba & Aloe facie arboribus item umascens pag. eadem.



POPVLVS noni orbis.

441.




NVCVLA Indica. Pag. 451.



NERII *facie arbor.*

452.

Frugrandes folium, Palma filamentis & textura.

DEbemus etiam Occiduis Indijs istud coriaceum foliū, cui simile aut par latitudine aut crassitie nullum nouimus. E Palmæ congeneri arbore euulsum videtur, quin ipsa tota textura asserem bicubitum latum, aut potius tegetem, quaternos aut quinos cubitos longum refert, tegulæ modo fornicatum, & media secundum longitudinem eosta semidigitum crassa carinatum, superna ora quasi præsectum esset, margine digitali tenuiore duriores, clauditur. Vniuersum folium à summo ad imum in villos, ijs quadatenus similes qui obducunt Nucem Indicam aut capillitiū texendis funibus aptum discerpitur, quemadmodum totū est tectorijs adiū & storsis accommodum.

Sesquipaginae alioqui vacaturæ, spatium explere

visum fuit, aliquot mirabilium Naturæ rarissimis descrip-

tionibus, ex nostris rerum Britannicarum accipi-

sis Naturæ observationibus, quæ sunt o

plures in nostris Stirpium

universalis Illustrati-

gambles d'argent

STANDARD NO. 11

In Angliæ littore meridiano, Insulæ Portlandiæ vocatz, ex aduerso Nortmaniz, inter fluitantes Algas reperimus planiæ quoddam rudimentum, cuius si species & atrectes surculos palmares & sesquipalmeres, pustulos, molles, flexiles, Spongiam prorsus dicas, cui etiam concolor est, & viscidæ putes : sin habitum & ortum ramis brachiatum, Corallini affiniorem dicas, vnde quidam apud Plinium Plocamion Ildos Corallo similem, sine folijs, præciliū mutato colore in nigrum durescere, cum cadat frangi solitum, coniectarunt. Ea tamen videtur Antipathes Diocoridis, cuius etiamnum ramulum habemus & Massiliensium piscationibus.

BRITANNICÆ concha Aquatiferæ creditæ.

Facit specimen istud Naturæ quippiam boni vel è sordibus meditantis, ut iam multa lube-
at credere, quæ alioquin risissemus, si legissemus apud rerum Septentrionalium Historicos,
quamquam paulo secus hi narrant, duntaxat in Scotia aut Orcadibus maris Caledoniæ Archipelago,
olim à Romana classe deivictis, conceptum. Nos verò non solum ex Scotia, sed etiam ad Ta-
mesim amnem, quæ Londinum præterfluit primum, conchas pediculo rugoso cassiore è navis
annosæ carina avulsas habuimus; Deinde Medio-Caltri Matracorum è vetustioribus oneraria-
rum Navium aluiis ex Hispaniis & remotissimis opulentissimè renavigationibus, abundè tra-
silius. Sunt ex pusillis conchæ; foris albidæ, lucidæ, læves, tenuitatemque testè ovaceæ fragi-
lem, biforem, Mutuli modo referentes, nuci Amigdalæ compressæ pares; pendulæ autem e-
rant hæ foris ad mrum ventriosæ navium carinæ, cui musco & limo seniputridæ innati erant
quasi Fungi de dicelli, quos ferè Ouræum vmbilicelli dixisset, cuius extremum fructuum ritu in-
feredatur latiusculæ conchæ basi, quasi vitam alimopiamque inde sugerent auculæ, quarum
rudimenta è summa parte, conchæ huius, conspiciuntur. Pediculos istos ferunt Historici pri-
mum è vemicellis concreta, quod non posuimus scire, neque dū credere; tamen si scimus
has easdem conchulas elegantissimè efformatas in Furculis arborum, quæ maris æstus alluit
temerè procloniam, aut depactorum sobolem esse. Easum autem quæ humi, in sicco labuntur
mori tradunt; quæ verò alluvionibus maris rapiuntur concha excludi, & in Anatem, aut e i
congeniem autem adolefcere. Has volunt esse *Barnacles*, Anglo-Britanni & Gallo Britanni:
Clakis vocat Scuti; vbi abundat & capiuntur dum per brumam concreuerint gelu paludes.
Sanctæ nobis eficitibus Bristolæ anatemur Anserem sylvestrem.

Hanc communem receptam vulgi sententiam merito refutat doctiss. vir fabius Colonna *Aquilegi-*
 dum ait has conchas Anatiseras putatas, nihil aliud esse quam Glandes marinos descriptos à *am pro Iso-*
Rondellio cui ascendiendum videtur: sed de transmutatione huius ausis in Anseris lyuelleri *pro Dosef-*
 minorem speciem aut anatis aut congeneris volueris, exclusit aut emisit è concha, nihil re vera è *aliare-*
 asseretre ausim, donec exactius è diligentius expiscari è perferutari boreas tractus, Deo viæ *spiritus, ut*
 lagipore, liceat, In litore Britanniz Gallicæ feimus huiusmodi alitum genus quoque reperiri è *in Planta-*
Sapinetter, vernaculo idiomate, vocari, quia in nialis, antennis, aut lignis Abiegnis, naufragio *rum Illa-*
 facto, frequentissimus eius ortus. Aptissima siquidem fretis Abies, ex qua Mali è atennæ fa- *ruum Ista-*
 bricantur: Gallis *Sapin* vocatur, vnde *Sapinetter*, Abiegnas alites sonat. Adde quod elapsis *decetur.*
 annis ex Scotia Londinum ad me misit frustificari, effusa nauigulo, partem antennæ Abie-
 gnæ, conchis istis vndique cinctam, amicis. v. I. Cleue, Iacobi. r. Magnæ Britannię Regis Sa-
 pientif. Pharmacopoeus, artis suæ è Materiz Medicæ callentissimus.

LITOXyla, *lignæ lapideæ* BRITANNICA & BELGICA.

Compertum nobis est esse amnes & riuulos, ubi merfi pali lignei, ridicæ, aut conti, aliquot mensibus lapidescunt: imo serè, vt sic dicani, ferrescunt, eadem perstante superficie, situ striarum & fibrarû ductu prillino: vt eminus, quas assulas ligni diceres, atrectando & lapidi illidendo dicas esse lapidem ferri mineræ immixtum, soliditate, grauitate, duritie & duratione lapidea flammis obnoxio: cuiusmodi magna frusta videre est in illo monticello attrabre muluplici lapidum mineralium structura planè visenda, conflatò, ad tubulos & elices transuierendos fontis peramoeni, qui scaturit in horto eximie literaturæ & prudenciæ incomparabilis Cæcilij Angliæ meritisissimi Thesaurarij. Mirificas hæcæ aquas è montibus præfecturæ Bedfordiæ & in Cambria siue Britannia Occidua, quam Walliam vocant, emanare multi asserunt. Huiusmodi palos petrificatos annos 10. post vidimus & habuimus effosos Antuerpiæ inter Imperatoriam siue Georgij Portam & *Middelp* è submoenianis Lacustribus fossis.

Alni palos sub aquis nunquam cariem senectute sentire asserunt, sed in petram conuerdi. Plinius ait in flumine Silari, non virgulta modo immersa, verum & folia lapidescere. Lib. 5. Cap. 103.

FINIS.



LONDINI.

Excudebat prælum Thomæ Purfootij. 1605.

Idibus Aprilis.

I.



R.

Suauissima Concordia dissinationem coniunxit.

MATTHIÆ DE LOBEL

Medicj Insulanj,

SERENISS. & INVICTISS. IACOBI. I. MAG-
NAE BRITANNIAE, FRANCIAE, & HYBERNIAE REGIS
BOTANOGRAPHI,

ADVERSARIORVM ALTERA PARS, cum prioris ILLUSTRATIONIBVS, CASTIGATIONIBVS, AVCTARIIS, &

RARIORVM aliquot STIRPIVM, cum Britanniae indigenarum & inquilinarum, cum
exoticarum delineationibus, & ambigui Simplicis Medicamenti, leuiter & perminium
conciis in Plantarum Adversarijs perstricti aut mutilati, emendationibus;

Cereuisiae siue Bierae Teutonicae & Britannicae omnium suauissimae obseruationibus, & Merlini
Cambria Propheta potus METEGLI Noscati preparationibus varijs;

BALSAMI, OPO-BALSAMI, & XYLO-BALSAMI cum suo cortice.

CINNAMOMI, CASSIAE, XYLO-CASSIAE, eorumque generum, explanationibus,
SVCCIS aliquot MEDICATIS & METALLICIS, Medicinae Thesauris, introdu-
ctionibusque, ad Nobilissimorum Priscorum & Nuperorum Pharmacorum concinnitates, necessarijs;

OPIj, Meconij, OPIATI Antidoti, decantatissimiq; Chymistarum, Germanorumque
LAUDANI OPIATI Formulis, eorumque, vscibus, technis, varijs;

SOLVTIONIBVS AURI, Margaritarum, Coralliorum & congenerum, eorumque
Tincturis & MAGISTERIIS Chymicis,

Nec non

Commentariolis aliquot RONDELLETIANIS nunquam antebac in lucem editis.



De Rondeleto & L'Obelio.

M Ille dedit Medicos ægris mortalibus vnus,
 Dum referat Panaces abdita Rondeletus.
 Culturâ ingenij magno produxit in horto
 Multa Dioscoridum millia L'Obelius.
 Materiam hic Medicis, vltum dedit ille Magistrum,
 Accendens lumen lumine vterque suo:
 Sic animat chalybem innumerum magnetica virtus,
 Ignes sic reliqui Solis ab igne calent.

Rapha. Theorius Med. Doct.



MATT. de L'OBEL.
Rariorum aliquot Stirpium APPENDIX.

Beneuolo lectori.

IN studioforum & Rei Herbaria utilitatem & voluptatem, Rariorum
quorū stirpes, hortorum delicias, herbarum manibus & inquitur
nonnullis, nummi & novitatis avidis expectatissimas, in hac nostra
iamdudum polluta Aversariorum altera parte, siue Stirpium Appendice,
siquidem in commodiorem locum, quia tumultuariè, sine ordine con-
gesta sunt, annexere libuit; ut suo loco posita reponi, aut suæ generi,
siquidem sub vexillo nostris Stirpium, seu Plantarum historia Illustrationibus, methodo
exquisitissimè à notioribus, summissæque classum generibus ad ultimas & sue conveniens, ac
sibi mutuo affines, ut maxime per se ipsas, ita ad Materia Medica cognitionem solidam expe-
ditissima digestis aggregerentur: quænam speciminis ergo, sectionis prima in Elen-
graminis omnis generis appositimus, paucis additis hysque rarioribus & in hunc diem, hysque
inductis reconditisque Graminum descriptionibus & iconibus; dum in uniuersam Planti-
arum Illustrationem nostram innumerarum Iconum solocissimè deformitas, suæ emendantur,
emodulas æque circum proportionales restaurantur, (quam turpe enim est, vnicalem, sesqui-
vntalem, aut palmariis altitudinis verbulam æquare arboribus) quibus item Illu-
strationibus parati in accedens novarum Iconum accurata delineationes, præter illas Tauto-
nica editionis nostræ, ipsæque nudas Plantarum seu Stirpium Icones, his terne præliis Plan-
tinarum proditas: constanti autem labore, perituri diutius itaque gentis nostræ, minime
sumptibus facultate mea paribus parcens, quam præstari potuit, ut eo eodemque tem-
pore tanta Iconum copia è vivis Naturæ typis delinearentur & sculperentur: earum enim
quam plurimarum semina aut flores, etiam per diversas ætates in hysce regionibus non sibi
perosum est: & reveram inmodicè impense memoratè effusa: eoque magis quod totius
superioris editionis sumptus solus sustinere, & novarum Iconum in hysce foro cedentium & ni-
das ebibere compulsi fuerim iam pridem hæc divulgata præmissi in lucem. Omnes tamen
regatos velim quoniam hoc studium inculci, ut si quid præter hæc novarum Plantarum, aut
quidpiam aliud novo Naturæ factu exotum repèrant, nobiscum successoribusque nostris
conferant: cum omnes homines admihi debant, ut Rempublicam literarum pro suis ingenij
facultate & viribus iuvant & exornent. Interim sit impensè gloria: os frandatum in
sibi persuasum sit, ut pro nobis semper sit propositum, ut qui aliquid in hoc no-
biscum communicant, beneficium transmere, laboris pramium impetiri, & ingratum pro-
pieri per quos proficiamus.



PROLOGVS in ELENCCVM &
omne genus GRAMINIS IL

LV. TRACTATIONVM vniuersalis Historia
Botanica L'Obely.



Ramen a gradiendo, quod veluti gradatim progrediendo, seseque propagando vniuersam tellurem sy omne line oculi aut statione peram-
matio virore decorando & amiciendo, oculorum vultusque solamini
& vtilitati, Diuina Prudentia munere, non enim vendicasse vide-
tur. Apparet quati agresilis Græcis scite vocata, vltique quippe in
agris vberius prouentu luxurians. Quod quidem, quia omnium herbarum no-
tissimum & vtilissimum, Triticeoque generi ut cornutum & ferile; sic perinde
varium, immensū vtilitate & nobilitate proximum, a Graminum familia ad Tritici
genera, tanquam a notioribus ad innotiora remotioraque, claudens doctrinae gratia,
exordium explicemus. Differentiæ aut diuersitudo similitudines mutua, Naturæ
luxu & lusu vario solo & cetero, quamplurimæ Præcisi & Nuperis indicæ, præte-
ritæ aut neglectæ: Radice, solo, crasso spicata coma, stiba & panicula; maiori-
bus, minoribus, maioribus, angustioribus, quæ quia varias seculi species æmulantur
idem a simulari, ut aprici & heliæus discernantur & memoriæ iradantur, conlen-
tamen sunt Graminei, Tritices, Millaceis, Loliaceis, Auenaceis, Hordeaceis,
Sorgiatis, Phalarimideis, Alopecuroideis, Typhinis, Secalinis, Cyperoides, Funce-
is, Caryophylleis, Paniceis. & ceteri modo digitatim sparsis exilibus spicatis pro-
paginibus: eisdem aut pratensis, aut satuis planis agris, agressibus: montolis
item, cluosis, nemorosis; palustribus, lacustribus, aquaticis & maritimis, duntaxat
diferetæ: Quas differentias & perspicuæ; paucioribus tamen præcisique profe-
sequendas operæpretium duximus, prolixitatis hostis perennis, loquacitatis fugien-
dæ studio, vel ne res aut apparatus farraginem verborum, lectori inuoluta, studio-
sique noxia: ut quorum spe æs aut crumena nequiquam potis magna plausibilia
volumina ferre possidit, non moueat. in herbis enim vel abiectionis, si quis bene no-
uerit vti, medela nequiquam displicabilis, aut contemnendæ utilitatis etiamque viro
Philosopho digna. Domulus autem creauit ex terra Medicamenta quæ vir prudens
non fastidit. Discreta hominum Medicus, eorumque dolore sunt. Supremus ius-
sus est terra dedit herbis sententias & arbore fructus: quæ Promissio, ho-
minum proinde creata patenti. Ad præparandum tradidit colendas ad alimentum: at omnibus
terre beatis herbarum & ceterarum vtilitatem, omnibusque reptantibus in qui-
busque animalibus vtilitatem. Herbarum vniuersam ad patrum dedit.

GRAMINVM

Gramen
multifari-
um.

Eccles. 38.

GRAMINVM ELENCVS ET DIVISIO.

Sectio prima.

- Vulgatum pratense.* { *Maia,*
Cinny, varietates,
Minus agris inculti aut deserti,
Minus xerampelinum sericeo velere paniculatum,
cinq; varietates.
- Segetum & arborum.* { *Segetum speciosa, comosa, latiore panicula,*
alterum, comosa, speciosa, sed arctiore panicula minusve sparsa,
alterum panicula tenuis, mollis cella latiore, grano minutissima.
Agrorum Ventisprea,
Astilaceum,
Milaceum album,
Paniculatum odoratum C. Bauhini.
Paniculatum molle C. Bauh. & Dalechampij.
Panicula aurea pendula C. Bauh. Dalechampij.
- { *Aquaticum maximum,*
Sulcatum, striatum album.
- Incultum.* { *Longa comosa panicula leni & veluti cassâ multigranum,*
Maximum lata panicula, longissima glumâ,
Spicatum,
Paniculatum, parua Auenacea gluma simile,
Alterum exile pinnatum,
Asterum minus densius granatum,
Ne arca,
Danicum granosariore, nemorense,
Danicum alterum lueridum, xerampelinum nemorale,
Exile Anglicum Danico simile, aut idem,
Tenui copiosa villosa, luvia,
Lanuginosum montanum Clusij.
Montanum non lanuginosum C. Bauhini.
Cuspidata latiore panicula, proxima Ph. iorde,
- Florentissimum Segetaleuc.* { *Secalinum,*
Triticum, sive Triticea spica C. Bauhini.
Sorghum effigie sive Sorgiatum,
- Arundinaceum.* { *Calamagrostis* { *nostras,*
Neuegica,
Angl. Britanica,
Torosis & acerosus paniculis
Alterum C. Bauhini,
Spicatum C. Bauh.
Montanum C. Bauhini, Saurp. Tragif.
- { *Acerosum tomentosum,*
Acerosum alterum, Schoeno-graustis,
Geniculatum sive nodosum utrumque Taberna-Montani.

- Durini*,
Longiusculum, rari spicatum aenaceatenni gluma & geniculatum,
Maritimum Anglicum etiamque Belgicum aqua radice,
Nortuedicum aut *Danicum* densius spicatum,
Aenacea aculeata gluma,
Malicellus folijs,
Minimum *Dalechampi*,
- Exile durini*,
- Phalaroides*,
Paniculosum, amabile
Paniculosum alterum,
Longioribus angustius spicatis torulis paniculosum,
Alterum angustissimis spicatis & squarosis aenaceis glumis,
Exile superius *Danicum*,
Alterum *Aenaceae* cognatum.
- Alopecuroides*,
Alopecurinum, siue *Alopecuroides*,
Minus,
Minus alterum siue tertium mucronatum,
Aenaceum cuspidatum } maius,
} minus,
Aster spica C. Baub. & *Gramen echinatum* *Dalechampia*.
- Cristatum* C. Bauhini,
Longifolium C. Baub.,
Longifolium nemorense *Danicum*,
- GRAMEN
Typinum,
Medium siue vulgare, passim obuium,
Maini,
Minni,
Danicum,
Alterum, nodosum *Gramen* alterum spica parva C. Baub.,
Spicae multiplici,
- Cyperoides*,
Spicatum *Cyperoides* folijs *Uetonica* *Caryophyllata*, *Latifolium* C. Bauhini,
Rabimoon,
Cyperoides folijs *Uetonica* *Caryophyllata*,
Cyperoides folijs *Uetonica* *Caryophyllata* glabrum *Danicum*,
Echinatum palustre,
Exile hirsutum *Cyperoides*.
- Pratense*, longiusculum iuxta exilem caulem in a
foliorum basi *Nortuedicum*.
- Cyperoides*,
Pratense *Nortuedicum* alterum triangulari caule,
Cyperoides minimum panicula subina C. Baub.
Cyperoides minimum nigricante panicula,
Cyperoides spicarum,
Palustre maius caule triangulari,
Palustre - sperum,
Palustre paruum,
Palustre vulgatum,

Hirsutum, { *Nemorosum utrumq;*
Hirsutum minus Angustifolium C. Bauh.
Hirsutum paniculis albis C. Bauh. cum *Leucanthemo Gramine* Da-
lebachum : idem

Spicatum, { *Stictatum maritimum*,
Maritimum alterum,
Marit. alterum Clusj.

Inscutum, { *Maritimum dense Stictatum*,
Maritimum,
Aquaticum, *lanceis sparsis paniculis*,
Alterum duplex { *Bufois Gramen Flandrum*, &
Holosticum Martioli.

Natatile, { *Aquis innatans, siue Natatile*,
Aquaticum album, aquis fluitans, dulce;

Panici effigie, { *Simplici spica*,
Villosa spica,
Tertium.

Caninum Me- { *Canarium Medicatum*, *Canaria* Plinij, eiusque è latiore panicula
dicatum, { *varietates duæ*
Canar : *marinum*
Superum,
Geniculatum maritimum subuliferumque aggerum Zelaudia,
Maritimum alterum aggerum longius radicatum.
Oxyagrostis maritima Dalebach. y,
Marinum spica echinata C. Bauh.
Nodosum,
Ischaemi paniculis.

{ *Ischaemum vulgare siue Dactylon*,
Dactylum tertium spicis villosis C. Bauh.
Dactylon Aegyptium,
Manna esulentum,
Scoparium Ischaemi paniculis.


Omnis, 130. numero, & complurum Graminis generis elenchum, divisionem et descrip-
 tionem in Plantarum Illustrationibus nostris damus, quibus in promptu vnicuique Stirpium præ-
 scriptiones & protocola continentur. In hoc opere ingenuus et liberalis ather Planentius nobis
 deest. Omnia hodie in detritum ruunt, et ad occalum aut exitum vergunt infelicem, infinitabili
 nummi sordidi auditate.

De Lolio, Phœnice, Phalaride, Melampyro & nonnullis alijs inser Cereales
fruges, & earum degeneraciones.
Plura dabo, si D. opti: Mæxi vitam largire dignetur.

AVINACEA GRAMINA.

Non diversigenis, hâc pratenfibus locis, denexisque collibus, segetibus, sinis, erice-
 tis & glareosis varia Avenacea Gramina, quemadmodum pleraque alia, caule, flore &
 radicibus vix discernenda, proveniunt; sed Avenacea acerosius tunicis evanido semine fere
 castis, comosa Sterilis Avena; longioribus, brevioribus, acutis, obtusis; maioribus, minoribus;
 densioribus, rarioribus; staminibus, piculisq; exilioribus crassioribusque, dissimilibus.

GRAMEN



GRAMEN Aëneum, rari-
ore grano, nemor. nse,
Danicum.

Fagineis siluis montosis, non
procul a Cronenburgo munitissi-
mo et magnificentissimo castro Re-
gio Sclanar Danorum vuido solo
hæc elegantissima Gramina, dum
Nobilissimum Batronē Eduardum
Zouche, potentissimi Magnæ Bri-
tanniar Regis Jacobi primi à sancto-
ribus consilijs & totius principatus
Canibrix summum pæfide, in sua
ad Regem Daniar Christianū Fiede-
rici filii legatione, comitaret, colle-
gi. Sesquipedali & bipedali, gracili,
nitido, lucido & tremulo culmo, su-
perne brevior, rarioreque Avena-
cea gluma ornato. Radix summo
cespite, Graninis Canini quadan-
tenus, sparsa; sed villis longioribus
annexis: folijs superioris S. marum
Auenacej Graninis descipiti in Scir-
pium Illustrationibus nostris, exilio-
ribus, vti tora planta.



GRAMEN nemorale Auenaceum
alterum, ex fusco xerampelinum
& lucidum Danicum.

Idem syluigeris Daniar collibus
& montibus perelegans exileque
Gramen oriundum foliolis cieherri-
nis, rigidis eiratisq; vncialis & binum
vnciarū altitudinis radiis. Pedales
& sesquipedales exiles, lucidi & nitidi
aspectu iucundi culmi ex fusco xeram-
pelini, in quibus è longiusculis panicu-
lis auenacea semina.

Varietata loco.

Hoc idem Gramen aridis collibus
heriotrophis Regis Gronovii
Anglo-britanniar vicinis elapsis annis
collegi, Danico foliorum exilitate &
ciratis radiis, quæ Graminis Ca-
nini modo propagantur, pene par, sed
caule minus: à loci macie.

Gramen

GRAMEN exile durius Norwegicum aut Danicum,
Scopario Gramini cognatum.



Saxorum interuenijs leui terrâ Scædis Petreæ Noruegiæ, imisq; marcidis, rimosis caudicibus sylvarum Danicæ hoc Gramen viget, densissimo sparsoque rigidorum, tuncorum, sesqui vncialis altitudinis tenuissimorum foliorum stipatum: sesqui palmariibus numerosis, cirratis, geniculatis, flamineis calamulis, quorum summa folia latiuscula, vaginulæ instar spicatas, vnciales paniculas claudunt aut amplectuntur. Iubata cinnamataque do-drantalæ radix, Buxei pallida coloris, tota que planta prolixior, vti Graniæ Scoparij, cuius cognata videtur.

GRAMEN Phalaroides exile supinum humi
parsum, Danicum.



Sic videas prope Croneburgum aream Regiam munitissimam Selandiæ Danorum, è regione equilis & horti Regij, sabuloso solo ad laus maritimâ, pone rusticas lares Gramen pusillum, humile humique sparsum, innumeris duarum ternum vnciarum culmis, torulis spicatis effusè fastigiatis, exhibitque apiculis præditis. Foliolis vncialis longitudinis & latiusculis, crassioribusque culmis pro plantulæ magnitudine. Radix fusca, cirrosa. Tota albicat herba per scenscieri-um.

Gramen

Gramen Cristatum Ch. Bauhini.

Cristatarum radicum, foliorum, sub-
ciliatum, blebucitatum aut sesquipeda-
lium culmorum à cristatis palmaribus,
dum curuantur, spicis cristam Gallinæ
æmulantibus hoc cristatum Gramen scitè
à clarissimo *C. Bauhino* vocatum, Alo-
pecuroides Graminibus in Stirpium Il-
lustrationibus nostris annectere libuit;
quo nihil frequentius varijs editis pratis
Londinensibus agri, iuxta Hackneum (alibi-
que multis in locis transmarinis) vbi à ru-
sticijs, vti nonnulla Gramina, floreis, per-
gulis, transfennis, toplarijs, coronarijsque
operibus arte manuque factis, elegantissimè
in vicem annexis, concinnandis, æstiuo
tempore aulis & caminis ornandis ap-
tum, *Vernaculè* etiam *Bent* vocatur.

*GRAMEN Canarium longius Gr.**GRAMEN Canarium longius ;
radicatum latiore panicula.*

Huius Canini Graminis huius à
vulgato Gramine medicato dif-
par natura, quod eruitur ex amenissi-
mis glareosis fabulosisque ambulatorijs
vicinisque locis iuxta nouum Medi-
cum hortum nobilissimi Baronis *Edu-
ardi Zorche*: habitioribus corpulen-
tioribusque dulcioribus radicibus; la-
tioribus sparsisque; acerosis paniculis:
cetera haud abfimilia.

*Gramen Canarium latiore
paniculâ minus.*

Latior item paniculâ glareosis, ob-
soleto & inculto agro hoc Canari-
um Gramen minus quandoque occur-
rit; reptantibus, citratis, geniculatis,
prætenubus radicibus, Graminis Can-
arij vulgaris gustu non dissimilibus
& efficacitate paribus; coloris ex fusco
albidis; folijs verò sesquiuincialibus,
iuxta radicem pluribus, paruis & an-
gustis: in spithamzibus autem tenuibus
causculis iuxta genicula tribus, raro
pluribus.

Gramen.

GRAMEN Scoparium Ischæmi paniculæ Gallicum.



Speciosus istud, Ischæmo Gramini cognatum videtur; è cuius prælongis prætenuibus rigidisque cubitalibus & longioribus radicum cævis concinnantur scopulæ illæ vulgarissimæ nitentis comæ conciliatrices, fritionibus capitis accommodatissimæ & vtiatissimæ. Figura ei graminea, licheni vulgaris, gracilis culmus, rigidus, geniculatus, cubitalis; in quaternas, quinque, ut plurimum senas & plures elegantissimas lucidas spicatas caudicellas Ischæmo Gramini similes fastigiatus. Folijs item non dissimilibus, gustu Graminis, dulcioribus. Copiose provenit in Gallia, sabulosis vicinis Castri Insulari locis vocati, (vulgò *Château de L'Isle*) propè Aurelian., ubi collegit amicissimus vir *Georgius le Seigneur*, Pharmaceutices, & Rej herbariæ callentissimus, quo Gramine me donavit Londini, Anno. 1602. quicquæ quotannis Angliam novis & rarissimis dicat Plantis.

Sedulis herbarum, Naturæq; divitiarum investigatoribus variis gramina, vario solo & celo occurrent, quæ suo quolibet loco, aggregari & reponi poterunt.

Graminis Canini medicati Vires ex Dioscoride, Galeo, Plinio, Priscis & Neotericiis.

Diosc.] Graminis radix *a.* trita, illitu vulnera glutinat. Decoctum eius in potu totmentibus *b.* medetur & urinæ difficultatibus. Calculosa etiam Vesicæ excrementa comminuit, & ab inflammationibus placat. *c.* Decocto adijcitur Vinum, ac Mel ab aliquibus, & Thuris & Myrrhæ & Piperis tertix portiones; rursusque coquitur in æreo vase ad dentium dolores & epiphoras. Semen vehementius urinam impellit; alium vomitionesque sistit.

a. Galenus eadem. *b.* Et vulneribus Vesicæ decocta in vino Plinius addit. *c.* Gramini Parnaso hæc tribuntur Pliniqui plura lib. 24. capite ultimo, quorum usus exolevit.

Gal.] Radix modicè frigida & sicca; mordacitatem quandam exiguam & partium tennitatem obtinens. At herba ipsa primo quidem excessu refrigerat; in humiditate verò & siccitate moderata. Porro semen alibi quidem excessu refrigerat; in humiditate verò desiccatorium & tenuium partium & subacerbum.

Rt 1

Canarij

Canarij Graminis radix dulcis est & subacerva; moderaq; tenuis & exigue incidentis substantia, quâ citra calfactionem fâctus viscerum reserat, colluuium propellit & deterget. Radix vulnera glutinat Apuleio.

Nodosum bulbosum Gramen iisdem temperamento & viribus, quibus Caninum Officinatum pollet.

Notissimi & vulgatissimi pratensis Graminis folia armenta & iumenta depascunt, vti Graminis Dioscoridej radice dulci articulis præcincta, viridique prato senescunt. Iumentis gratissimam herbam dixit Plinius, siue viridem, siue in Forno siccaram.

Radices dulces articulis præcinctas & facultates ascriptas Dioscorideo Gramini; melius & felicitius cum Gramine medicato Officinatum conuenire certissimum; vulgatissimi namque Pratensis Graminis radices admodum exiles sunt enodes. Graminis autem Canini medicati radices articulis distinctæ etiam asinis & mulis in agro Mouspeliensi gratissimæ; visibus medicis ubique expetitur & gustanti dulces, & à Medicis Pratensis Graminis radicibus longè præferuntur, quamuis non adeo infælici euentu Pratensis Graminis facultates cum medicato Gramine confundantur ab istis sciolis rapsodis trivialis & popularibus herbarum collectoribus, vernaculis Doctoribus, laborum alienorum & nostrorum transcriptoribus putidulis rizotoniis, quorum mentinimus in Balsam & Opobalsami explanatione.

Graminis autem Pratensis semine, quamuis Canini ignauiore viribus & ignobiliore, vulgus Medicorum hodie vitur ad viscerum obstructions, imitatione Apulej; qui herba Gramen decoquit, & cum ea florem terit, & in panno lenit, & imposita splenis dolores finit.

Veterinæ saginandæ & lactis copiæ longè præcellit dulce: improbatum contra acidum, vulgò *Sant & agra*.

Fœni, siue Graminis dum aruit, decocto vtili, infessu probatoque balneo pudenda fouent, suffireque iubent ad nephriticorum vrinas eliciendas hodierni Medici. Seminis & radices decoctum ad eadem potandum ægris suis, & ad vesicæ calculos comminuendos, & eliciendos, longo vsu sreti, felicitique successu, ministrant: efficacius tamen Graminis Canini decoctum, siue radices, seu seminis.

Alopecurus altera maxima Anglica paludosa.

Sine Gramen Alopecuroides maximum.

GRamineo generi cognata hæc paludosa maritima Alopecurus: Rigulis herbis Comitatus Gout-hamptonæ proximè salinas & antiquas ædes Drayton vocatas D. Richards Garib perpiz memoriz, in Diplomatica Curia Angliæ Clerico seniore, Historiæ Plantarum, cum Indicarum, tum inquilinarum studiofissimi, cis mare, duobus miliaribus Anglicis à Portmouthe, ex aduerso vectis Insulæ plurima. Radix, culmus cubitalis, sesquicubitalis, bipedalis & quandoque procerior geniculatus, & folia illi Graminis aut Tritici; sed quinque vncialis sæpe speciosissima, habuior, sericea, spicata caudatæque panicula; Mouspeliensium Pseudo-Schizanthi. Hanc quoque Vdls fossis lacustribusq; Essexiensis comitatus legi, iuxta Thamelis amœnissima fluente; sed paulo minorem, cum tenderemus ad ædes Clarissimi & pijsissimi generosi viri D. J. Cœs huius amœnissimi studij amantissimi & vti quis alius Anglo-britanorum peritissimi, herbidos campos perlustratur.

HORDEVM, Græcis *Critheon*.

Germanis	} <i>Gberste</i>	Gallis. <i>Orge</i> .
Oslandis		Hisp. <i>Cenada</i> .
& Belgis		Ital. <i>Orzo</i> .
		Anglo-Britannis, <i>Barly</i> .

HORDEVM *Polystichon autumnale*.

Germanis & Belgis, *Grosse* siue *Groote Gberste*.

Gallobelgis, Aethesijs & Picatdis, *Souchrien*.

Anglo-Britannis *Winter Barly*. Bortalibus Britannis Scotis. *Bier*.

Reddenda hæc sunt Hordej familiz Aduersariorum pag. 7. Effigies Iconum nostrarum, pag. 29. & Teutonicæ editionis pag. 33.

HORDEI differentia

Geminum Hordeum Septentrioni notissimum Picardis, Artesijs, cæterisque Gallobelgis polystichon *Seurion* vernaculè, Germanis *Grosse gerst* dicitur & Britannis borealibus *Bter*. Autumno ad Malti siue *Spalt* Bricannorum, & Germanorum *Spauth* & *Bjemaath* confectionem scitur. Radice fibrosa, exili, folijs gramineis, stipulâ binum cubitorum, spica in pterocem versus aristis rigidis & scabris vallata, æstate matura.

Distichon Gallobelgis *Pamelle*, Germ. *kleyn gerst*. id est, minus Hordeum, siue Britannis borealibus *common barley* Martio, Aprili, & initio Maij duntaxat scitur, hyemis quippe & frigoris impatientissimum: vniuersa sui parte gracilior, cubitum & sesqui cubitum raro superat aristis exilioribus, delicatioribus, mollicellis, minusque tigidis gemino siue spicatum.

Polystichon item

Diuiditur in $\left\{ \begin{array}{l} \text{Autumnale} \\ \text{Vernum.} \end{array} \right.$

Verni spica mollioribus aristis vallata est, vti Distichi.

Hordeum spica durica, borealibus Britannis *Barly* simpliciter vocatum, nondum vidi.

Vniuersa Britannia ad Hordei præparationem quam *Spauth* siue *Spalt* vocant, hoc solo ferè hordeo vtitur, idque polysticho ad Ceruisias Britannicas suauissimas & optimas præfert, quæ qualibet septentrionales bonitate longè superant.

Spauth autem inibi paratur, hoc qui sequitur modo. Hordeum maceratur aqua biduo & tribus noctibus: deinde effusa aqua in horreum acervatur loco ventis minus peruiro, quoad germen, perpusilloque radicum citros & pulsationes (quæ hyeme tardius, vere et æstate biduo aut triduo emiseric. Mox priusquam incalescat sulcatim dispersum, sesquipalmari densitate, et quateruè die & nocte subuertitur aperto aere: octo vel nouem dies continuos iterando, perficitur. Tandem in tabulato pertuso, igne subdito vel aptato fornaci vinico textu calathò acuminato, & superstrato hordeo; igne lento è palea, crenijs vel arido ligno admotò fornacis ostioso, sesquipalmari intervallo ab imo inreposito, exiccatur, quoad molis frangi queat; sicque extotum *Spauth* in fornacis capacitate deijcitur: quod ex qualibet hordei mensura ad quartam partem accrescit; & antiquum bonitate, in Zytho componendo, nouum præcellit.

Biera siue Cerensis compositio.

Northmannis & Gallobelgis Bierre & Cernoise. Anglo-Britannis & Germanis & Belgis Bier.

Rec. Malti mollis leuiter contriti modios Britannicos octo; cui superfunde aquæ fluuialis limpidioris feruentis, in qua aliquot manipuli fursuris Tritici incocti fuerint, quantum satis sit implendo dolio Aureliano aut Aquitanico & semisse. Exactè mixta, infusa calidè persilent tres horas: deinde foraminulo palea aut duplicato fundo apto subterfluant. Id quod transmissum est (Belgis & Anglo-Brit. *wort* vocatum) recoquitur sem horam, sesquihoram vel aliquot horas vt melius conseruetur, adiectis vnc. 1 2. florum Lupuli salictarij: mox longo latoque lacu vel depressis labris vix pedem altis perfrigerantur. Et huius decocti frigidati libris octo vel decem, fermenti siue sacis Bieræ vel Alæ potentioris libra aut sesquilibra adduntur, exactè agitando, loco tepèdiore permiscuntur, stragulis operiendo, sensimque reliquum liquoris vt commodius fermentescant, affundendo. Quibus absolutis transcolantur: vasa adimplentur: demumque fermentatione absoluta, exactissimè ocluduntur.

Eidem Malto nouam affundunt seruidam, transcolant, eoque Cereuisiam tenuem concinnant.

Varijs è frugibus, vitico, hordeo, zea, auena fit Maltum, quod ratione conficiendi Bieræ colores immutat. Triticum & polystichum, supra coctum & excoctum potissimum, rubicundat & subsuscum cereuisiam efficit. Hordeo disticho, auena, zea, tritico, commixtis quinis vel senis libris farinæ subceæ, albida & limpida redditur. Malti hordacei partes duæ aut tres; auenæ & tritici ana. pars vna, sumuntur: farinæ fabarum quantum tritici quarta pars; aquæ quantum satis, pro tenuitate, & efficacia Bieræ futuræ.

Cereuisia, à Cerevo dicta, siue Bier. Tentonica & Anglo-Britannica omnium suauissima & saluberrima, calidioribus regionibus utilissima & conuenientissima, in parandis ratione exactissima & largissima obseruationes, Anglo-Britanno vernaculo, à C.D.I. Coys Plantarum peritissimo accepta.

Rec. a. Aquæ fluuiialis b. Galones 40. seruescuat, sine tamen ebullitione, c. pars eius tertia, d. in qua infunde & macea modium vnum optimi Malthe, molis vtut tritici: siue conseruescere per horam integri in cupa aut paulo plus: tempore hoc exacto, liquor, *wozt*, Britannicè & Belgicè vocatus, percoletur in vas commodum, foraminis Cype fundi orbe, vt mox dicetur, referatur. Ex inter colandum, seruesfac alteram tertiam aquæ partem, modo supradicto, & percolato liquore horæ spatio, affundatur. Si autem maiorem Cereuisiæ quantitatem parare velis, eamque potentioiorem; primam colatam seruesfac (assusa Malthe percolato secunda feruida aqua) additis vncijs quatuor florum Lupi salicarij, per totum tempus iteratæ infusionis secundæ Malthe, hoc est, horæ aut sesquihoræ spatio. Colantur deinde per setaceum & in lacu refrigerantur. *wozt* non excedat pedis altitudinem in lacu æstate potissimum; hyemæ sperare licet quo refrigerato æstiuo tempore, (hyeme tepidulo) sume huius colati *wozt* sufficiens bonam quantitatem in vas conueniens, prædictæ pedalis aut sesquipedalis altitudinis exceptam, cui lib. s. aut vnc. 8. optimæ Spumæ, siue fermenti Cereuisiæ, Britannicè *paast*, Belgicè *Opst*, & Gallicè *Gy*, diluti & permixti in alio vase siue vreo, triplici aut quadruplici mensura prædictæ colaturæ *wozt*: fermentescere finito, donec ebullitione & effluentia vreo superet, effundatur; in vas colati *wozt* vocati liquoris. Post Spumarum fermenti in vreo permixtæ effusionem in prædictum colatum liquorem, in quo viceus conditus est, ebullitione & fermentatione totum colamen spumis vndantibus operiens, affunde sensim, ne ebullitio interpellatur, reliquum colatum liquorem & permisceantur. His peractis, siue iterum conseruescere, donec sublimè plus satis effervantur spumæ, (elevantur siquidem pedali sæpe mensura) & potus saporis similem colati liquoris acquirat; nullo tamen modo acrem, quia Cereuisia citius acrem saperet. Vasis demum impleus & post sublimationem oclusus, conseruetur Cereuisia.

Cereuisia tenuis.

Si reuem cupis Cereuisiam, (quæ vulgò æstiuo tempore delectamur) vtrumque, primum & vltimum conmiscce colatum liquorem siue liquamentum: seruesfac, addita s. q. florum Lupi salicarij, ex arbitrio: & omnia perage, vt dictum prius.

Tertiam & vltimam aquæ feruentis partem superfundito Malthe, ad omnium tenuissimam Cereuisiam: maceretur per duas horas: & eadem vt prius præsta.

Obseruationes.

a. *Aquæ fluuialis.* Deniores, pinguiore stagnantes aut puteales aquæ ex terræ argillose venis manantes; limpidis putealibus scaturiginosisque ad pinguiore concinnandas Cereuisias longè vulgi opinione, præferuntur. Fontanas tamen ex scatebris emicantes, & fluuiales fluentes mihi cligerem, sanitati tuendæ, auctâ frugum dosi.

b. *Seruesfac sine ebullitione tamen* In quibusdam regionibus ebulliunt aquam ante Malthe infusionem & macerationem; superassusa Galloni mensura vnâ aut altera frigida, ne illico Malthum excoquatut aut supra modum conseruescat, excandescat, crustulæque retortidas contrahat.

c. Hæc obseruantur quoties Malthum retortescit. Conuenientissima est alioqui feruidior aqua, Maltho minus arido, aut humidior.

d. *In qua infundit & macera.* Experientiâ constat Malthum commodius immitti aquæ, quâ aquam Maltho affundere.

e. Doliare vas in quo Malthum infunditur, capacitatis sit dolij Aureliani, plus minus, pro ratione quantitatis Bieræ suræ, duplici fundo donatum, vtroque mascululo foramine petroso. Longior & validior fustis stramine aut Feno tottili circumuallatus foramina permeet; sed immum fundi foramen æctus, obicis vicem supplens, reserans & claudens, ad liquamentum (*wozt* vocatum) percolandum & in alia vasa traiciendum. Superior autem fundus sit multis foraminibus peruius.

Vimineis cistis longioribus, cilicij loco Malthe liquamen separant Belgæ.

CEREVISIA MARTIA *vegetans, maximè alens, perditurina,
in annum & diutius perdurans.*

Rec. Malchi recentis molis; vt diximus ante, triti Modios 12.
Auenæ Modium scitissimè, Pisorum aut fabarum & Tritici tritorum, ana, tantum-
dem, Aquæ q̃si. implendis tribus dolijs Aquitanicis aut Burdegalensibus: duobus vegetante
Cereuisia, & vno viribus tenuiore:

Feruescæ tertiam Aquæ partem modo supradictò: infundantur donec aquæ pars secundæ ter-
tia efferbuerit, & infusioni sit parata. Tum primo Malthi liquamento percolato, & in aliud vas
& refrigeratorio lacu traictò, exactè sicut percoctis sine defecatione ex lib. 4. Lupi Salicetarij:
optimèque tandem per semihoram despumando percoctis & in refrigeratorio lacu traictis,
iterum affundatur Maltho secundus liquor siue Liquamen *wojt* vocatum; quodæ tertiam altera
pars Aquæ efferbuerit, quod hœret aut circiter spatio perficitur. Hac ratione æquè efficax erit
illud secundum *wojt* ac primum: Deniq; vltimæ aquæ tertiam partem feruescæ; detractio liquore,
affundatur Maltho tertiam & vltima vice ad ignauioris Cerevisiæ præparationem. Martia effica-
cissima Cereuisia ante sex menses non est potionibus apta.

Perfrigerato primo liquamine *wojt*, pernasceatur lib. duabus Spumæ Cerevisiæ, & vici. 1.
pul. Caryophyllorum: Etæcullinaq; hæc fermentatio citato modo:

Prima nobilitatis Anglorum A. L. a suauis & vinet saporis potio.

Rec. Liquamentū Malti (vernaculè *wojt*) libras ducentas, florum Lupi salicetarij M. 2.
quò Malti dulcem & insipidum saporem emant. Percoctis & transinissis sensum com-
misteantur (vt suprà monuimus) scis Bieræ vel Alz libræ tres, & Graut Anglorū. (Belgæ
Paertbier vocat) libræ sex vel octo.

Graut enim sit hoc qui sequitur modò.

Rec. Farnæ Malti lib. 6. vel octo: aquæ feruescæ lib. 12. vel 13. quæ agitata & probe
sesties die remixta tepente camino, stragulis operto & palca condito nitido vase tan-
diu macerantur, donec Serapij lentoretm assequantur. Tunc igne, sedulo versando ne vranq̃r,
ad pulvis solidioris crassitiem percoquantur. Reconditur etiam hodie, per ebullitionem siue
fermentationem adhuc spumans in lapideis Phyalis, oris angustioris, Suberino operculo ex-
actissimè oclulsi, & decussatim funiculo, ne exiliet, vt saepe fit arduissimè ligatis. Sapore admo-
dum vinoso, gratissimoque, palatum & nares feriente: Non desunt qui Cerevisiam, eadem,
lege & ratione vini instar asseruant.

Zythi & Curni Dioscori.

DIOSCOR. *Ex hordeis potus fit, cui Zytho nomen est: is vrinam cit, renes & nervos tentat,
membranis præsertim cerebrum vestientibus, efficit: inflationem parit, vitiosum succum creat, elap-
phantiasm gignit.*

CVRMI.

*Fit & ex hordeis potus quem Curni nominant; eaq; sæpè pro potu vtuntur. Verùm capitis dolorem
mouet, malum succum gignit, nervus nocet. Consimilia etiam potus gænera ex tritico fieri solent in
Iberia quæ Occidentem spectat, & Britannia:*

Zythum & Cereuisia Plin.

EX frugibus sunt & potus, Zythum in Ægypto; Cælia & Cærea, in Hispania: Cereuisia & Antè Vinū 2
lura genera in Gallia, alijsque provincijs; quorum omnium spuma cutem facinarum in
tatie notit.

Quantum ex præfatis Plinio & Dioscoride coniecturam facimus de Zytho & Curni, potiones
Cercuisijs nostris proximæ, nec bubij designasse videntur: præsertim Alam, quæ vini vicem
antiquitus supplebat Britannis; quorum ipse Dioscorides meminit, referens malum succum
gignere & nervos tentare: quibus idem, quod nobis, euenisse potuit, potissimam plebi & An-
glo-Britanniæ rusticæ turbæ, cui ad gulæ delectamenta potentiorum Alam è cauponarijs ex-
petenti, inexasurabilis questus gratia illæ ex Maltho lixiuio aquæ vicè macerato, imponitur, sic
enim magis compositam & grano potientem emittitur; caput ferit, lœramque opulionibus, eoa-
lonis & naucleris stultitiani conciliat. Nec desunt nonnulli quæ in inexplebilibus nummorum vafri
homines qui Bieræ pro lupuli floribus carmini fuliginem substatuant, aqua salsa Maltum mace-
rantes,

rantes, ut eo plus ficiantur biere, quo plus sint potæ. Harum potionum & consilium assidue usu incommoda Diocoridi memorata percipiuntur: quæ non possunt sine hepatis & viscerum summo dispendio assumi. Cerebro & ueris inde affectis & sanguine exulso, sit tuberculorū infacie & naso, uti elephantico ium, eruptio, inde apud Anglo-Britannos in hunc usque diem locus proterito elogio, Acciuit sibi faciem & nasum rubrum, tuberosum, commendatoris Alæ. Maxima igitur in Cereuisia varietas; pro ratione, quantitate frugum, mixtione, compositione varias qualitates sortita. Germanis & Belgis Gentiana, Bacæ Lauri, Zeduaræ, Sagghel, Helenium, Lauendula, Salvia, Hormini flores, Cuculus siue Cucubalus Indianus, (quem infantum seu furiosum Solanum faciunt) Chamæpitys, Coriandrum & consilia vnâ cum Lupulo incoquantur.

Lupulidior vegetior, bene defæcata Biere, cuius quidem faciendæ ratione docuimus, ut calidioribus innotescat regionibus, & penuriâ vini, eius vicem supplere possit; suavis & salubris est potio, alimentum bonum præbet; modo brobè & ex optimis frugibus paritur & percoquatur.

Tenuis autem quæ grani minus, plus aquæ, recipit; humectando refrigerat, minusque atir.

Acuida malum succum gignit: tenes, nervos & caput tenet: tormina, inflationes intestinorum, quemadmodum & recentior epota, stillicidium vrinæ, crassum succum, calculum reum & vesicæ parit. Luteriana crassa, dum recens, pessima.

Additur Lupulus Biere vel Alæ duplici ratione: cum ob saporem & conseruationem, tum quia crassum succum Zythum procreare literis prodatur, cuius errata & noxia emendaret, appetiendo abstingeret, per venas crassa pituitosaque excrementa, venarum, renum, vesicæ, citra magnam calfactionem educeret: docemur enim à Mesueo in Syrupo de succo Lupuli & Byzantino, aliisque neotericorum compositionibus Lupulum, non secus ac Fumariam, sanguinem purgare & defæcare, eiusque ebullitiones compescere: iccoris intemperiem calidam, interposciturque ieuores, febresque biliosas & pituitosas arcere: Quem eundem effectum præstant tuiiones siue Asparagi verè erumpentes, cibo & acetarijs.

Floribus tamen, quia temperatè calidi, secus euenit, uti de Coriandro monuimus Adversariorum pagina 314. Quod caput seriat, de Cereuisia non reiiciendū; neque illis causa rheumatismarum & artium ulorum destitutionum, ut nonnullis doctis Anglo-Britannis per placet, attribuenta: sed potius ingluuici, crapulæ, mollitijs & gulæ oblectamentis, quibus sunt dediti, ascenbere debent: quia Alæ ipsa potentior, sine eis, aut Lupulo pauxillo concinna: a, non secus ac vinum, abditissimas permeat cerebri membranas, eademque infert incommoda. Lupuli flores non nocent qualitate, sed quantitate, quemadmodum vinum & optima quæuis remeta.

M E T E G L I N

Cambri potus illius celebris & saluberrimi, M E T E G L I N patrio nomine, aut Merlini Cambriæ Prophetæ potio-
nis vocatæ, vini Passi gratiam ementitæ, parandi rationes

& formulæ, acceptæ à generosa & honestissima matrona Ioanna Busher, vidua C. V. D. Richardi Garthi confuso ordine Anglo-Britannico sermone conscripæ, quas Latine in aliarum regionum gratiam, hoc qui sequitur modo restitui.

Meteglin potum siliurum siue siluestrum Herbarum quidam interpretantur, Cambice tamen siue Vernaculo, veterique Britanico Englen dulcem sonat.

Ann. Glouc. hic potus Meteglin Adversariorum pag. 25. & 23.

Rec. Radicum Saxifragiæ, }
Selin, } ana. lb. ʒ. ʒ.
Fameli, }

*Herbarum Agrimonie,
Urticę Buglossi,
Beronice,
Scabiosę,
Hyssopi,
Origanı,
Thymi,*

} ana. fasciculus quatuor.

Herbarum proportio, aque quantitati respondeat.

Simul efferveant quoad vini Passi siue Maluatici eorum decoctum assequatur colorem.

Colamen linteo panno cooperiatur : mane sequenti repenti adhuc liquori, Mel ea proportione commisceo, donec ovum recens supernatet eminentiā latitudinis assis Gallici, aut tertię partis solidi Anglici, (vulgò à *Crato*.) Deinde lento igne despumantur, & à cerę sine cerea excrementis mündetur substantia : postea leuiter coquantur parum quietant.

Prædictus decoctus liquornicido, suavi vasi, vino aut alio liquore imburo indatur, vt fermentescat : quiescat tamen viginti quatuor horis priusquam affundatur & permisceatur spumę siue fermenti Cereuisi, vel potius Anglo-Britannię potentioris Ale castillus medicoris. Copioso excresecit & rarefacto liquore, supernatantes omnes sordes & spumę nitidā allatā pennā despumentur : sed fermentum album haud quamquam demendum.

*Potionis Meteglin suauissima doli impletio, conseruatio, & nouissima
ultimaque purificatio.*

Satis superque iam defæcatā Meteglin, impletisque vasis eorumque osculis argillā figlinā aut massa panis obductis iterum desiccanda, affuso aliquoties nouo liquore, repletis, vt fieri solet in Omphacii, à facis spumose purgatione vltima. Occludantur denique vasa vt decet & cellis vinarijs reponantur. Maturę tandem, & exactę clarificato liquore antevsum, suauissima erit potio.

*METEGLIN hac formula apud equitem D. Andream Corbeth in præfectura Shropshere
Cambria componitur.*

Paraturus Meteglin, modum & demensum seruare debet Cereuisi concinnandæ.

Decocti præparatio.

*Rec. Radicum Funiculi, } ana. quantitatem magnam sufficientem.
 & Petroselinı, }
Glycyrrhizę munda lib. f.
Radicum Mei, } ana. M. 1.
Rad. Caryophyllatę,
Saxifragę, Phu,*

Rad. Helenij, M. f.

Serpilli,

Maianarę,

Hyssopi,

Mentha,

Saluę,

} ana. gramiale sine ventrale
 plenum.

Fl. Chamęmeli tantandem,

Fl. Centaurei minoris,

Marrubij,

Seminis Anisi,

Plantaginis,

} ana. M. 1.

} ana. lib. f.

Ebulliant ad radicum molliem ex artis præceptis. Omnia indantur postea aut transfundantur in dolum siue vas in quo Meteglin denique cõditutus. Colentur, defæcentur, & clarificentur.

Deinde è suis Mel recens ea proportione, vt ovum eminentiā bona excrementa supernatet : diu multum agitando versandoque commisceantur. Simul deinde in hoc vase persistent priusquam

in cados condituræ futuræ idoneos diffundantur, addendo ad fermentationem commodiorem, fermenti panis cibarij quantitatem mediocriis mali Punici, & fermenti recentis Bleræ, aut Alæ fortis, si non satis fermentatur.

Doliolo cupacitatis cadi, id est, Centum & octo librarum medicarum, siue circiter decem Gallonum Anglorum, quæ continent 106. lib. & f. & vnci. 2. hæc aromata sequentia contusa, nodulo excepta mergantur, appenso lapillo; nec tamen fæces aut fundum attingant.

Nuces Myristicas duodecim aut sexdecim,

Cinnamomi duas aut tres fistulas,

Caryophylorum, vnci. 4.

Zingiberis, M. 1.

Quidam sumunt Galangam, Spicam Nardi, Phu, Helenium siccum, Caryophyllos, Nuces moschatas & semen feniculi contusa & suspensa, vt dictum est. Nullus esto cadorum obturamentis vsus ante exactam deficcationem, fermentationem, & ebullitionem. Et occlusis tandem cadis, noli recentem Meteglin bibere ante septimanas decem, cuius condituræ primas tenet vinaris cadus.

Alia Meteglin parandi ratio, a D. Throckmorton, accepta.
cuius descriptionem ordine sequenti redintegrare libuit.

IN primis collige radices & herbas sequentes à prima die Augusti ad Michaelis diem.

<i>Rec. Radicum Imperatoria,</i>	} ana. M. 2. (Primo vere, potius legendas censerem.)
<i>Fanuli,</i>	
<i>Consolida minoris sive</i>	
<i>Bellidis,</i>	
<i>Tormentilla,</i>	} ana. M. 1.
<i>Helenij,</i>	
<i>Radic. Petrosel.</i>	
<i>Caryophyllata,</i>	
<i>Angelica,</i>	
<i>Saxifragia,</i>	
<i>Valeriana bortenfis,</i>	
<i>Galanga tenuis,</i>	} ana. M. 4.
<i>Foliorum Lauri,</i>	
<i>Graminis Leucanthemi Dodo:</i>	
<i>Rose syl. odorata,</i>	
<i>Fumaria,</i>	} ana. M. 2.
<i>Fl. Anchos,</i>	
<i>Salvia agrestis,</i>	
<i>Hyssopi,</i>	
<i>Mentha fusca,</i>	
<i>Agrimonia,</i>	
<i>Thymi,</i>	
<i>Fl. Hyperici,</i>	
<i>Borraginis,</i>	
<i>Scabiosa,</i>	
<i>Betonica,</i>	} ana. M. 1.
<i>Lingua. Bubula Anglor.</i>	
<i>Auricula muris,</i>	
<i>Eruca marialis (sylvestrem potius)</i>	
<i>Plantaginis Quinquenaria,</i>	} ana. M. 1.
<i>Phyllitidis,</i>	
<i>Salvia,</i>	
<i>Florum Chamameli,</i>	
<i>Calendula,</i>	
<i>Allioto,</i>	
	} ana. M. 1.
<i>Florum Caprifoli,</i>	
<i>Maiorana,</i>	
	} ana. M. 1.
<i>Origani,</i>	
<i>Cardui Benedicti,</i>	
<i>Veronica,</i>	} ana. M. 1.
<i>Scordij,</i>	
<i>Abfinibj, M. f.</i>	

Radices

Radices, herbæ, flores bulliant m. l. q. aquæ tres horas.

Tribus iterum horis maceratis, & deinde expressis, Mel congruâ proportionē addatur, exempligratia,

Duobus congijs aut Gallonibus Anglicis & quartarijs tribus liquoris, adde Congium aut Gallonem Mellis. Iterum simul efferveant assiduò despumando. Conditio postea dolijs liquore per duos dies aut plures persistent. Cætera vt supra diximus, faciendâ.

Meteglin Theriacale, Cephaticum, Bechicum, Hepaticum, Splenaticum, & Diureticum, descrip. nostra: febricitantibus interdictum.

Rec. Rad. Helmi, recent. succo prugnantium, Graminis Canarij ana. lib. 1. f. Glycyrrhiza rasa, lib. 1.

Rad. Rusci, Asperagi, Petroselin, Ononidis, ana. vnc. 10.

Rad. Filipendula, Pæonia maris, ana. vnc. 5.

Erysim flore & semine prugnantis, Bistortæ herba, Betonica sicca cum flore, Melisso-
phylli, Agrimonia, Eupatori, Cannabini, Chamædry, Chamæpites, Herniaria, Tussila-
ginis recentis cum rad. ana. M. 6.

Cardus Sancti, Scabiosa, Marrubij, ana. M. 4.

Anisi, vnc. 6.

Corni vnc. 2.

Passul. mund. vel Corymbiarum, vnc. 12.

Salvia. & Maiorana nobilis cum floribus, Florum Anthis, Geniste, vel Sambuci, Thama-
risifici cum floribus, Thymi, Serpilli, Hyssopi, Adiantum vel Polyttrici, ana. M. 5.

Decoquantur omnia ex arte: Radices prius, deinde herba: Postremo flores & odorata aro-
matica ex f. q. Aqua.

Dem Mel eandem demensum paritate supradicta addatur. & idem modus faciendi in
religione observetur.

Alqui Soli exponunt per Canicula astus, nodulo exceptis sequentibus aromaticis & in
casis demissis additis silicibus aut lapillis vt detrauant pondusculo nodulus fidat: fundum
tamen no tangat.

Rec. Macis, Caryophyl. Nucis Myristica, ana. drach. 6.

Cinnamomi, vnc. 1. drach. 2.

Seminis Synapi albi vnc. 2.

Rad. Acori, & f. Coriandri preparati, ana. drach. 2. excipiantur nodulo.

Potus Merlini, siue Meda minus composita, Cambricis magnatibus
visitata borealibus Anglo-Britannis.

Rec. Aqua mensuras tres,
Mellis mensuram unam.

Efferveant igne lento, assiduò defecando, ad tertias. Singulis Gallonibus Anglicis assidu-
de spumantis fermenti Alæ commendatissimæ vnc. 30. vel 32.

Subsequenti die transfundatur liquor in aliud vas, omissis in fundo fecibus; nouoq; affuso
Alæ fermento, iterum residueant. Annum aut duos perdurat. Potabilis futura octauo aut deci-
mo die à fermentatione exactissima, vsus necessitate vtgente.

Meda Mosconiarum parandi ratio in Russia.

Proportio Mellis respondeat aquæ quantitati, & fermenti, vt supra monuimus. Rusci ad-
dunt Cerasa & Rubi Idæi fructus.

Addunturque libræ duodecim florum Lupi salictarij, pari portione vt fit in concinnanda Ce-
reuisia, ex modijs duobus Malti & conuenienti aqua maceratis.

Observatio.

Observatio.

ET si herbz flores, semina & radices contra leges artis, vti in Aduersarijs diximus diutissimè, vt laporis & heribacci viroris fastidium exuant, vtq̃ue magis alant, diutiusq̃ue perennent, percoctæ & excoctæ fuerint, suaderem tamen, odorantes & aromaticas sub huius ebullitionis addendas, aut saltem mediam earum alteram quantitatem, vt earum pars suauior, potior & efficacior conferretur.

Quotidiano potui senio & annis obstitis vtilissimam hanc potionem diximus: nec adeo temulentiam vertiginosam gignere, aptiorem multò & vtiliorem cerebro nervosq̃ue generi futuram, minimè nocuam, vniq̃ue vicem suppleturam, si periti Medici instituto & industrijs operarij aut Pharmacarij operâ, artis legibus inuolatis, cuius naturæ accommodè præpararetur.

Omibus & egregijs, quibus Mel, pollet auxilijs: etiam hepate calidioribus ministris nocitura Meleglin, si Cichorio, Soncho, Scandisq̃ue speciebus, Lichene & similibus herbis talor retundatur, & moderetur; & vt paucis dicam varijs affectibus, magno mortalium auxilio, ad capitis, pectoris, carnis, cutis et cuticulæ, viscerum, intestinorum, dyenteriarum, adstrictoriarum alvorum, vterinorum morborum, iustorum & vulforum, venarum obstructions, fluxuum humorum putrilæginum, omnium inflammationum, febrium, calidorum, frigidorum, humidorum et siccorum affectuum, quamplurimorum ceterorum, ex quamplurimis diuersis aromaticis, odoramentis, plantis et herbis, radicibusq̃ue Dioscoridis exemplo, de Aromaticæ vino, Cestrite, Strachadiæ, Hyssopie, Absinthii, Rhæte, Rhodite, Myrtite, Cydonite & alijs innumeris factijs vini et chylis matibus, quorum diuturnus et longus vsus varios et immediabiles creditos morbos mirabiliter sanabit.

Paucum V.
num Diosc. Pa-
naceum. ite-
tum foramen
in m. moris. i.
nocat.

Ex Panace item vinum commendatur à Dioscoride. Felicitas autem sine furo et dolo morbos profligabunt huiusmodi medicamentosa potiones quam illa *Aurea clementia* Circulatorum et inopellorum Genianorum aliorumq̃ue *Pannacea* ex *Antimonio* parata, etsi inficiantur, soloq̃ue auro constare aiunt (*Auri* quidem sacra fames mondanos ad Avernales aquas proritat.) Basim verò illius decantatissimæ *Panacea Stribum* esse certò assererem, persancto etiam testimonio optimorum, doctissimorum fideissimorumq̃; Philosophorum in hoc studio excellentium *D. Petri Senerini* Regis Danicæ Medicæ clarissimi, et aliorum Chymicæ artis peritissimorum virorum, qui horum technas, callentissimis verbosis mellitissq̃ue lenocinijs ornatas *Aurum* captantium congeronũ, dulcemelos modulantiũ, instar dulcè sonantis auspicijs filitæ voluerè decipiens, nobis releserunt. Fallacijs quibus mundus immundus falli vult et fallitur, describendis, quamplurimæ pagine non sufficerent.

Calamus odoratus Libani. Calamus myrsipicus Hippocratis.

Calamus Odoratus.] Odorato Iunco Calamum Odoratum, quod cum eodem in loco nascantur, tum corporaturatur, crasis, consimilitq̃ue efficaciz, & materij inspissandorum vnguentorum sint, subiunxit Dioscorides. Calamus vocatur, quia vt fistula vacuus est, & internodijs Arundinum modo geniculatus. Aromaticus verò, ad differentiam aliarum Arundinum, quæ odoratz non sunt. Calamorum autem siue Cannarum vel Arundinum multifarie differunt. Quod Calamus aromaticus sit ex Arundinum familia, testis est Plinius, qui inter Harundines Calamum aromaticum enumerat; verumq̃; in India nasci tradit, odoribus vnguentisq̃ue inspissandis vtilem dixit Plinius, qui Calamo odorato easdem vires tribuit quas Dioscorides. Plinii autem verba subdite clarioris doctrinæ & authoritatis gratia visum fuit. *Unguentum, inquit, generat plurimum, illa que in India Syriaq̃; nascitur odorum vnguentorumq̃; eam si, vniq̃ue monet cum Gramine aut Aij semine decocta. Cui mensura admodum: Medetur convulsis, duobus obolis pota, locinæ, reuibus, hydropi, tussi etiam suffum, magisq̃; cum Resina. Eius feribis viceramq̃; manantibus, cum Myrrha decocta: excipitur & succus eius, siq̃; Elærio similis: Efficacissima autem in omni Harundine qua proxima radici, efficaciz & genicula.*

Dioscorides.) Calamus odoratus in India nascitur.

Memini me vidisse Venetijs ad Angeli symbolum Calamum aromaticum, quem Alep-
Syriæ Sequinus Martinellus doctus & industrius Pharmacopœus, fortè delatum ex lacu
inter

inter Libanum & illum ignobilem montem Plinio lib. 12. cap. 22, inmemoratum miserat. Arundo erat geniculata, nitida, crassitudine paruum digitum æquans, color fulvus, ni labat memoria, fatuior: odoratus, parum lentus in mandendo, subacris & amarus.

Jacobus Vdenhouius generosus Gandauensis, stirpium & artis medicæ peritissimus, Calami aromatici dodrantalis longitudinis cannularum frustula araneæ um telis plena, fulua, geniculata, digiti minimi crassitudine, gustu planè aromatico, amaricante, Schoenantho præstantiore, Balneolis vulgo *Baignolz* Gallicè Narbonensis nactus est inter Schoenanthi testucas, quæ Massiliam aduicta ex lacu Plinio memorato asserbant.

Multò maiora habuit præclarus vir augerius D. de Bousbeke Flandet Insulanus, Cæsareæ maiestatis Constantinopoli legatus, Stirpium exoticarum peritissimus.

Dioscorid.] *b Melior est fulvus, dense geniculatus, & qui assulosi è frangitur, plena araneorum fistula, d albicans, lentus in mandendo, & austriusque, ac e cum quadam acrimonia amarus. f Urinam potu ciet, quare cum Graminis aut apij semine collis, in aqua subter eadem fusa morbo renum vitis, stilicidii urina, ruptisque commode bibitur. g Menses & potu & appositu pellit. h Tussi sufficit medetur per se, aut ex resina i Terebinthina, hausto per arundinem fumo: ad k mulieres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. l Saffionibus, malegratisque odoris gratia commiscetur.*

b Melior est fulvus.] Colorem valdè tuffum vel fuluum *χελios* Græci dicere. Hic color, & lentor in mandendo Calamo, non eius radici assignandus, vt Cornarius opinatus est; araneas & genicula ad Calamum referens. Calamum re vera intellexit Dioscorides, non radicem, dum ait, plenam araneorum fistulam.

c Et qui assulosi frangitur.] id est, in multis assulas, siue in multa segmenta, quod Arundinibus proprium est, distinguatur autem assulosè, siue secundum longitudinem diuiduntur. Eodem modo plerumque ossa franguntur. Plinius dixit; melior qui minus fragilis est, & qui assulosè potius, quam Raphani modo frangitur.

d Albicans,] quia tulum prius dixit Diosc., videtur referendum ad araneosam illam substantiam, qualem in alijs arundinibus cernere est, nisi velit ex tuluo albicantem significare: alij radici tribuunt.

e Cum quadam acrimonia amarus.] Gustanti subacris & subamarus percipitur, eoque subamarum legendum: solus Orbasius amarum dixit: ceteri nullam amaroris fecere mentionem.

f Urinam potu ciet, quare cum Graminis, aut Apij semine collis.] Semina diuretica addit, vt medicamenti actio inueter, & sit magis destinatum hydropicis & nephriticis: quando lotium ob affectos renes vel vesicam supprimitur, stilicidii quæ sit quod stranguriam appellant.

g Menses & potu & appositu.] quia aliqua sunt quæ potu menses, non apposita mouent: vel quia nonnulla impotita utentes elicere possunt; quæ non intro assuntur; quæ ichores absorbendo menses retinent, potius quam mouent; aut quæ sunt anara, aut odore ingrata imponuntur, nec nisi vigenti & maximo affectu propinquantur: Cuiusmodi sunt Lachrymæ scordæ, Sabina, Bitumen, Allia scetida, Galbænum & consimilia attractentia medicamenta simplicia vel composita; quæ intro sumpta ventrem laxant: pess uij autem modo subdita sanguinem attrahunt, quem etiam medicamenti acrimonia expultrix facultas irritata expellere cogitur.

h Tussi medetur per se, aut ex Resina Terebinthina hausto per arundinem fumo.] Fumus aceni inficit, quem quia pulmões hauriunt, siccando, humores absorbendo & defluxiones sistendo egregie curat: quod commodius vt fiat: citè Dioscorides Terebinthina Resinam addit, quo plus vaporosæ fuliginis reddat, quæ potentissimè catarthos & pulmōnum vlcera siccet: Farctis tamen pulmōnibus difficilimè spirantibus, affarim per fistulam aut infundibulū hi vapores non intro mittendi; nisi prius medicamento purgante imminuta excrementorum copia, in cubiculo vel lectica cadures oculis, fumum sensim hauriant, & assuescant.

i Tussi medetur.] Tussi medi Calamum Aromaticum ait Dioscorides quasi suffitu aut hausto per Arundinem fumo. Quædam namque medicamenta Eclegmaz modo sumpta, qualia dulcia sunt, tussi medentur: Alia verò vncta, vt olea & axungie pectori illita; Nonnulla sensum partis obrundendo & materiam incrassando; vt pilulæ è Cynoglossio, Diacodium & similia. Tabaci fumus haustus membranas Cerebri hilari quadam volupate & suauitiam, quo quidam minimè carere possunt, opplet & reficere videtur, vt Hyoscyanus & Opium Turchias vini vitæ supples; hebetat tamen & stupefacit & tandem noxius; vt Zythi siue Bieræ præstantioris spina, quæ opilones & rusticos Flandæ naturâ frigidis & graues ad tempus expetrefacit, spiritus

** Vti Tabaci.*

spiritus calfacit, alacres & cardaces reddit; tandemq; facultates minuit & officit vt in Zytho dictum fuit.

¶ *Ad muliebris incesus decoquitur & Clysteribus imponitur.*] Rebus decoqui ad muliebris incesus & collutiones quæ per mettachytê injici solent. *parturitionis* instrumentum est matricis à *partu*, id est, matrice dictum, vt fistula qua medicamenta & collutiones in uterum immittuntur.

¶ *Suffusionibus, Malagmasisq; odoris gratia.*] Malagmatis, medicamentis & suffumigijs commiscetur non sola odoris gratiâ, nam & tussi medetur suffita. Mucis etiamq; eximij egregijsq; dotibus & viribus pollet ad ventriculi, hepatis, ventris, vteri & viscerum varios affectus: Verum in partium externarum quibusdam remedijs sola odoris gratia Odoratus Calamus miscetur; vt in vnguinibus quibus mollicelli & splendide mulieres; necessitatis vel voluptatus gratia, vel ad oris infectum halitum, vel alarum tædia, vel pedum hircinum tetrumque odorem, vtuntur. Sed cum ad nos Verus Calamus aetheri desijt, optimum substitutum Schœnanthum erit, vtriusque et Calami et Schœnanthi perperis est Dioscoride facultatibus.

Galenus.] Leuisculam quadam adstictionem ac minimam actinoniam possidet. Siquidem magna ex parte essentia eius terrena est & aerea; temperies autem callida et sicca: quomobrem moderate urinam mouet, ac facultatibus que Iecori stomachoque imponuntur, nec non ijs fomentis quæ inflammatio vicro, aut mouendis mensuris adiuuuantur, commodissime potest misceri. Ponatur habeturq; secundi ordinis eorû quæ excalfaciunt & desiccant: valentius tamen desiccant, quam excalfaciunt. Inest quoq; ei quædam partium tenuitas velut omnibus odoratis. Cæterum eorum compluribus tenuium partium pluitimum: Calamo verò non multum adest. Aginet ex secundo calfacientium et arefacientium à temperatis excessu, subtilioris nonnihil, et altringentis est potententiz, urinam ergo promat.

Iridis omne genus Aduersariorum pag. 30, 31, 32. Observationum, 32, 33, 34, 35. & in uicis excudendis Stirpium Illustrationibus.

Iris candidis floribus angustifolia, Iridis Clusij vocata, siue Iridis angustifolia Clusij secunda similis.



Hanc in pensilibus Adonidisq; horis sedulo alebat Medio-castri Matiacorum amicissimus et humanissimus vir D. *Cornelius Coorne* huius peramari studij amantissimus: sesquipedalibus aut pede longioribus folijs, paruum digitum latis, in sesquipedali aut bipedali, caule floribus albis aspectu suauissimis donato, quorum terma repanda folia latiora venis siue nervis suauè rubentibus iucundè insignita sunt, nec non ovis perpolitè breuioribus lineis concoloribus striata: alijs verò incumbensibus ternis, et totidem angustioribus surrectis folijs penitus candidis. Radice Iridis Clusij vocatæ, siue angustifoliz secundæ non ab simili multis fibris donata. Franco-valle, vulgò *Frankedel* à Nicolao *van Brabant* in Belgium primum missa.

Iridum delectus, & facultates ex Dioscoride, Plinio, Galeno.

Dioscor.] *Melior est Illyrica, & Macedonica, & inter has laudatissima quæ vnde dicitur, id est, quæ decorata, brevis, vel pumila mutila ferè (sic omnes vertunt; Cornarius tamen obtusam aliquantulum dicit; sed parum refert, si quis mutilatam aut decoratam, duxerit; nam quæ decorata sunt, videntur sua natura longiora fuisse, sed abbreviata) & densa constat radice; fragrantem contumax, subruffo colore; gustu amaro (Ruel. *αμυρνα*) id est, fermentiore ventis; odore perquam sincero, ita ut nullum profusus situm redeat; quæ dum tunditur, sternutamentum mouet. Secundum locum habet Africana, candicans, gustuque amara. d Terebines in vetustate sentium: tunc tamen odoratores reddi solent.*

a *Melior est Illyrica.*] Idem Plinius. Ab omnibus authoribus Iris Illyrica celebrata est & primum locum sortita. Florentina passim hodie nobis pro Illyrica obtudetur, & pluris fit à mercatoibus quam Veneta, quia candidior & fragrantior: attamen ex Illyrica, hodie Sclauonia dicta, Iris Venetias deferri solet; quare Veneta, Illyrica legitima omnibus vno ore celescur; subruffi coloris, non candidi, etiam Plinij & Dioscoridis iussu, omnibus præferenda. Non multum à Lusitanica biflora folijs differre literis prodidit filiosius scriptor Clusius ooster: pedali caule, raro ampliore, & flore Itidis Lusitanicæ formâ, colore & odore persimili, paulò maiore: tamen radice nodosa, & geniculata, odoris dum recens est, ingrati, at sitcata satis grati, insipidi initio gustus, postea tamen feruidi, sanesque ventis.

b *Macedonica.*] Secundum locum sibi vendicat Macedonica Plinio, longissima radice, tenui & albidâ, Plinius à Dioscoride dissentire videtur, qui mutilam & subruffam commendat. Plinius fortè per Macedonicam longissimam exleni & albidam, aliam ignobilem Macedonicam indicare aut indigitare voluit: at densam, mutilam siue diminutam, breuem ac veluti decusatam pumilam, fragrantem contumacem, subruffi coloris, præfert Dioscorides: attamen Plinianæ lectioni hæc non videntur aduersari, qui duplicem Illyricam facit: & Raphanicam à Raphani similitudine longiorem, minusque crassam quæ melior est, Rhizotomiam subruffam, quam tamen idem Plinius Raphaniri præfert libri 21. cap. 20. Cur Rhizotomoni dicta ignorem, cum Rhizotomus nomen sit cuiusdam Botanici, vt Craucæ apud Dioscoridem & Hippocratem. Raphanitis porius ad figuram refertur Raphani, quam ad eolorem: Astragalitis dicitur à Galeno & Aetio, quia Aitalagus radice est rotunda, Raphani modo grandi.

Densior, breuior, callior & habitior radix; diutius, aptius & perfectius vires suas integras conseruare censetur.

c *Secundum locum habet Africana, candicans Diose.* (qualis est nostra Florentina) *gustû amara.*] Hæc fortè quod loco sicciore nascatur, magis amaro sapore est quam Illyrica, quæ à feruidiore sapore *αμυρνα*, id est feruentiore gustu à Ruelio dicta est.

d *Terebines in vetustate sentium.*] Terebines sentire dicuntur radices quæ à paruis vermibus arroduntur: Illa facili arroduntur quæ substantia sunt laxa & molli, vt Zingiber: generantur enim ab humiditate, verum hæc cum densa sit & amara radix, instiganda huius rei causa. Terebinem sentit, non cum recens est, sed fortè, quod oimium sit amara, cum veterascit, & io vetustate, quo tempore sapor ille digestus est: et hoc in oimibus ferè commune, vt io vetustate potius alterentur à vermibus, quam cum recentes sunt: Putrescit tota materia; sed hæc animalcula, insecta, tunc aut terebines non ex omni humiditate generantur, sed ex succo radicato viuo; quare in senecta humor ille insitus putrescit, et in illa putredine vermes generantur.

e *Tunc tamen odoratores reddi solent.*] Si odor vt Gal. vult, effumario sit calida et sicca; tunc magis olere debent cum magis effumant; effumant cum calidiora sunt, calidiora enim euadunt humiditate aquosâ nec derante calorem absumpta: Minimè igitur mirû, si odoratores vetustate reddantur: grauis enim huius radices odor cum è terra eruitur, superfluo et excrementicio humido obrupta est, quo absumpto, odorator et fragrantior euadit. Fumida enim et odorata fragrantiora magisque redolentia sunt dum tundeodo et terendo effundunt odores: Quæcunque etiam à terebinibus, aut tuncis vermibusque eroduntur in puluerem abeunt, magisque fumos emittunt et odoratoria euadunt: vetulæ igitur vetustate radices, nouellis recens erutis, odoratores.

Dioscorid.] a *Vis omnibus excaesalatoria, b extenuans, contra c tussim efficax: humorum qui- grè reijciuntur, crassitiem digerunt vel attenuant: bilem, d crassam, e pumilam ex hydra- melito*

melle drachmis septem & epota purgant: g Somnum conciliant, h lachrymas i ciunt, torminibus medentur. Ex eam h pota ex acetol serpentium in istibus auxilantur, leuosi conuulsi, perfricti tonibus, n horribilibus, & quibus gentura o effluit. Menses ex vino pota pellunt. Decoctum eorum facinororum febribus vtiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaq, in eis venarum spiracula p. Ischiadici q infunditur. Fistulas ac sinus carne explet t. Radices ex melle glandis s. modo subdita partus extrahunt, quoniam celi & illis strumas veteresq, duritias emollunt t. Sicca quoque viscerat, lent, & cum melle purgant. u. Nudata offacarne operiunt. Doloribus capitis cum aceto & rasaceo magis cum catibitate diluuntur. Amomi & cui albo veratro, & duabus Mellis partibus, lentiginis & vitra cuius infacie i sole contracta emaculat. Pessis malogustatis & acopis inferantur. In vniuersum, magni ad omnia vsus.

a Et caput purgat Plin. b crassa et choleram. c et araneorum, scorpionum, in pane vel aqua, addit Plin. d genituram absorbit, Plin. e et lumbis cum resina illinitur Plinio, f sarcotica est. g Glans modo, sicut cellary modo vertunt. h Succo duritias omnes emollit. Plin.

i capitis praecipue supputationes veteres. Aegineta eadem asserit.

Adair Plin. Infantibus eam circumligari salutare est. Dentientibus praecipua est, tunc tumuē vido laborantibus instillari. Contra canum morsus ex oleo imponitur, et contra perfrictiones, sic et nervorum doloribus. Dolori capitis cum cotoneis malis aut struthis illinitur. Crapulas quoque et orthopneas discutit. Vomitiones cit duobus obolis sumpta. Olla fracta extrahit imposita cum melle. Ad paronychias farina eius vtuntur. Halitus oris commanducata abolet, alarumque vicia. Sedis rimas & condylomata, omniaque in corpore excrecentia sanat.

M E V B. Radix est calida sicca ordine tertio, acris: terget, coquit, resoluit, lenit, aperit obstruē, sedat dolores, pituitam crassam, et nistam illi bilem purgat, ac praeter hanc aquas scroliās, idque elementes. Muciam crassam, lentam, harentem in thorace, ac pulmone, coquit, tenuat, ac prompē educt, visceraque omnia expurgat. Hepatis quoque ac lienis, et vicinarum partium tollit obstruē: affectus ab ea excitatos, hydropem, dolorem, tumorem, duritiem, et siuiles sanat aut lenit. Omnes quoque tumores etiam duos, et strumas digerit, praesertim nervorum et iuncturarum: maxime cum betae vel brassicae succo vel vino, et in melle, et oleo chamemelino. Cephalalgiam veterem sanat: praesertim cataplasmae imposita, et succo eius in nares attracto. Hic enim sternutamentum mouet, et per nares detrahit vini maximam excrementorum in paries alias, per neatus occultos alioqui defluxurorum. Succus autem ex ea vt abstergit extrahitur. Cum sapa autem tussim veterem ab humore crasso, lento factam, multum iuuat, et ab eodem spirandi difficultatem. Vterum praeterea expurgat. Pesslo quoque supposita vel emplastro admota, vteri dolores sedat, menses euocat, abortum facit. Vlcera antiqua, sordida, putrida purgat, terget, carne proba implet, quale etiam ossa nuda vestit. Ischiadi salubriter aut clistere iniicitur, aut emplastro imponitur. Os si collucit aceto cui incocta fuerit, dentium dolorem sanat, & theumatismum sistit: supposita item haemorrhoides aperit. Inuitam seminis vacuationem sumpta cohibet. Succus eius cum farina fabarum & cinerum illius, faciem expurgat, eiusque maculas deterget. Oleum denique Irinum nervos & iuncturas firmat, spasmus ex repletione, cephalalgiam, dolorem hepatis, splenis, renum, vteri, iuncturarum, thoracis & podagrar, pleuriidem, peripneumoniam oblitum iuuat, catarrhum coquit, somnum conciliat temporibus inuictum: aurium dolorem instillatum auri, narium graueolentiam ipsis iniectum contigit. * Fit autem ex floribus Iridis, & rasilum diuidio, vt rosatum oleum & violatum. Ne ventriculum laedat, sumatur ex mulsa & pauca spica, vel cum sero lactis melle, Mafliche: ad affectus autem thoracis, & pulmonis, cum sapa, vt dixi, propinatur.

a Vis omnis ex calfacitoria] Omnes vi calfaciendi pollere ait: quod Aegineta sine aliqua gradus limitatione docet: ait enim abunde calefacere, abstergere & concoquere siue niacurate. Intellexit forte ad secundum gradum, vt coniectura fert, quia sarcoticis annumeratur: quae talia esse solent, & ultra secundum gradum calfacere et siccare non debent: ne materiam generantem & canis aptam et necessariam absumant: nisi supertua caro addit. Alij ad secundum conplerum vel iniū ferri excessus: minime quartum, quod tamē doctissimus Dodonaeus, credidit recens potissimum: cuius purgandi facultas in calore minime consistit: sed succo abstergente, attenuante, nitroso, crudo, statulento, ventriculo & visceribus molesto, nisi probē castigato.

b Extenuant] Dioscorides addidit facultates secundas & tertias. Est enim medicamentum non solum calidum: sed etiam teuium partium, quemadmodum succus Limonum, oxalidis, berbetis, agrestis siue Omphacij, reliquorumque acidorum, quae extenuant crassos & lentos humores citra calfactionem.

* Oleum Irinum.

Calfacit 2.
& calfacit 3.
In b.
Calida & si. ca
et de 2.
Aduersariarum
calit. a.

c. Contrassum efficitur.] Cum tussis à diversis causis fiat, in qua tussis efficitur, distinguere oportet pretium est. Nam tussim ex collectionibus & tumoribus sub sepe transitorio nimè curare manifestum; quæ à sepi compressione fit, non secus ac illa quæ ab hepatis inflammatione deprehenditur. Tussis enim ab acerbis humoribus irritatio est in iunctis & organis respiratori servientibus facta, ut expellat infella excrementa; sicut steinutamentum, capitis, & nausea ventriculi.

Neque convenit in defluxione pulmonum vel arteriæ à tenui materia; cum sit attenuans medicamentum; densare enim opus est: si calida materia frigidis condensantibus, papaveri, opio, vel lentis, spissis, Gummi Arabico, tragacantho: si frigida, tenuis, luteis, Scabellis, & alijs moderatè calidis, Penidijs, lenine lini, scintigaci, radice altheæ, malix & similibus: aut medicamentis, compositis Syrius Zithophorum & de Hyslopo, qui conspissantia lenta recipiunt. Tussis à sanie evadente ab inflammationis pulmonibus, colicis, trachea arteria vel eius ramis, quæ si tenuis, inersanda; si crassa, extenuanda, ut in empirum ar. Quæ duntaxat à refrigeratis pulmonibus fit, solo halitu retento, qui calsi n, cum lino, & levis sit. A tussis crassilique, vel illuturniore mora densatis, pulmonibusq; insa; & seducendis his efficacissima. Minus convenit tussis post materix educationem, ob facultatem tantam ex utero, cui nartonia ad sensum minuendum vel leniendum, potiora sunt.

d. Humorum qui agere efficiuntur attenuant.] Cur ad tussim & in qua tussis valeat, Duse. indicat: quæ diffidit à thorace ex. ruitur, attenuat, quia in extenuatis facili reserantur. Fortè aliquid vherius significare voluit his verbis, qui agere efficiuntur, sunt à thorace, ventis, rebus educenda sine excrementa. Extenuant & incidunt. Ides omni s. vicia trachea & partium tenuitate: quare paulo post subdit, menses, urinas, fardus hepatis & splenis.

e. Crassa & cholera purgat.] Crassa extenuando ad supra dicta referuntur, vel ad ea quæ resiciuntur; duo significare volens; humores purgare & eisdem potestate in maiore quantitate. His enim cholagogum medicamentum est, quæ cum hydromelle bilem crassam vel pituitam ex tergerendo & attenuando, evacuat. Hydromel enim medicamentis purgantibus accedit, ut educationem faciliorem reddat: eadem qua ratione Ales bilem purgantibus, extenuantibus & incidentibus commixtis in Hierapiera Gal. pituitam crassam evacuat.

f. Epora.] quasi dicat, non impositæ: quod de recenti intelligendum; sicca enim purgat. Drachmis septem epore.] Drachmis septem legendum, quia crassa, euullis difficilis, Plinio libro 1. cap. 2. o. alium soluit drachmis duabus cum melle; tussim, tormia, infestationes porta, lenes ex aceto, contra serpentes & araneorum morsus ex po ea valet; contra scorpiones duarum drachmarum pondere in pane. Cholicum medicamentum docent Plinij verba, qui alium duabus drachmis purgare dicit, & drachmas duas sufficere ad scorpiones. Sed adversus venena oportet maiorem quantitatem exhibere, ut ris medicamentis venenum superet.

Mesuco laxat aquam citrinam, humiditates viscosas & melancholicas aperit opilationes; ventum masculium insert, sed quando miscetur alijs medicinis opilationes referantibus, iecur & viscera roborantibus noxa manuit. Aqua & melle cocto cathigatur. Dosis in decocto ab aureis duobus, ad tres vel quatuor; & sicca confusa à drach. tria drach. 2. ex melle cocto.

Nostris prædictis hodie succi recentis hydrophis propinatur ab vnc. 1. ad vnc. 2. cum tantillo cinnamomo, asaro, nardo, ea yophyllis aut Syrupus à eichorio Nicol. Igne evocati succi aut densati à drachmis duabus & semelle ad drach. 3. & quatuor, recens tamen citius potius agit.

g. Sannum conciliat.] Olore suavi caput replet, & cerebrum ventriculos vapidis fumis imbuat, non secus ac vini, ciborum repletio, labor & alia multa: non siccitate & calore, quæ potius vigilias inducunt. Neque in morbis acutis, aut calidis & siccis corporibus, sed in humidis, vel in dissolvendo humiditatem, vel capiti vapores ossuandendo; ut et cocus, myrrha, anethum, ocyrimum & huiusmodi nonnulla, quorum maximus est rhus, in quibus valde humida & naregica stupefactoria dare non licet, ut in pleuritide, peripneumonia & alijs affectibus in quibus expectorandum. Sympus à papaveri albo vel nigro, lputum & omnem pectoris excretionem compescit: quareo patendum, vel illi his addenda, quæ & sonum conciliabit, & humorum eum inerrationem impedit, tum expulsiorem & excretionem iudabit. Num intro sumi vel imponi debeat, nihil Dissar. Dicemus & intro assumptam vel temporibus impositam, ut vult Mesueus, prodelle.

h. Lachrymas conciliat.] Lachrymas sunt quæ cerebrum comprimunt, vel acrimonia feriunt vel dolore afficiunt. His quia acris, lachrymas est, ut cepe & acris collyria dolorifica: et risus, comprimendo oculos: et splendor nimis, violentia quadam.

unt ex frequenti conu: & aliquid seminis in canalem retudat: irritaturque ex illa, seminis profluvium. Proinde à quacunque causa genitura effluxit; succando, partes instaurandæ & consolidandæ vi sua sarcotica utilissima hâbitutura. Ig. rur legendum videtur ad fœtus, profluvium auxilium efficax; Nam & Mesenius id ipsum confirmat, inquit, *Conferat usus eius ei qui semen summi involuntariè effundit.* Hæc autem verissima esse, experientia docebit.

1. Huic affectui cruditates materiam suppeditant; & status & in dosum decubitus; impedita, diuturna, aut remorata ventriculi concoctione ob labores, vigiliæ, comotationes suasve causas. In viciata concoctione, & alimenti prava distributione, minimè profunt illa simplicia & victus ratio & quæcunq; seminis copiam minuire possunt, & sua siccitate & siliquitate semen extinguere nata sunt; vi Nymphaea, Solanum, Semen Lactucæ, Cannabis & similibus vinum item aquosum; semen viticis, Salix, Mentha quæ autophiam summamque totius corporis imbecillitatem inducent; sed alia victus ratio instituenda, & pro vino inibecillo aquosus vinum primum nox sue generosum stomachum bibendum: eis quæ sunt boni succi sine, utique & nullo negotio concoquuntur in parvâ quantitate utendum, corroborato ventriculo assumptis & appositis. Friktiones partium à concoctione imperandæ: his ex postea propinanda: parastatz & vasa spermatica Lycio aut eius succedaneo ex Rhoe, Hypocistide, Omphacio, Omphacomele, Cydonite & similibus ex convenienti decocto diluïs & infusis.

Menses ex vino parantur. Si menses ob venarum vetri vel totius substantiæ densationem obstructionem a lentis & viscidis humoribus sanguini crassiori permixtis supprimantur. Ex *Pau.* ob suavitatem vini: sed hic notare oportet, quod non ex Aceto, sed ex vino dixerit *Diese*: quia Acetum a. vuluz aduersatur. Vinum enim ut Acetum partium tenuitate, ad partem affectam deducit, modò sit album vel flavum aut rubrum & tenuium partium. Iris calidæst & tenuium partium, & quæ agrè educuntur attenuat: sanguinis læculenti crassamentum incidendo, obstructiones reseriat, & vi sua vasorum extensa observata aperit: quare non potest non convenire in illa causa, si obstructiones sint & sanguinis copia ob retentionem. Nam si per nares aut hemorrhoides aut aliam regionem sanguis evacuetur, aut absorbptus sit, sine utilitate ista imperatur, ut quotidiana experientia docet. Aperiis laxatque venarum officijs aut spiraculis, sanguinem per *arachnoas* id est venarum apertionem fluere dicimus, & per *ductum* id est corrosionem vel fracturam, ex se aliqua parte, sanguinem expui.

Ischia diu infunditur. Clystère infunditur, quia intestina per periconi cum parte affecta contentum habent. Iberis, Cardamine, Nasturium & eiusmodi, consimili modo infunduntur, quia calfaciunt, attenuant & impadam materiam frigidam a qua Ischia fieri solet, digerunt.

Zerumbet Serapionis & Zeduaris eiusdem radices partes. Adversariorum pag. 35.

R *Est innoxia Advers. pag. 35. linea 25.* & utraque ut nominis, sic eiusdem radices partes meruò dixerim, nec secus inuicem differre, quam Cyperus rotundus, vel longus a suis coherentibus radicibus astrachibus spectantur; cuiusmodi videndi & habendi copia fuit Antwerpæ in myropolio sing. liciam Macetizæ Medicæ distillino amabilium viri D. *Francis Petini*: Eoque Serapio &c.

Item pag. 36 linea 13. lege & huius pariem Zerumbet. (& deme speciem.

Et paulo post linea 19. lege veritas esse cum sibi inuicem eoriam: & deme, per omnia similitores; ut Castani bulbi cum cæteris Oenanthis exemplique alij. &c.

Alphodelus minimus Nortægiens luteus, palustris. Scotticus & Lancasteriens videtur conuenire cum Pseulo-alphodelo 2. Clusi.

R *Oridæ Solis. & Gægel Belgarum, vdis paludosisque rarioribus minisque densis syluulis, frutetis aut Sahælis, conalliani steillis & petrex Nortægiæ conuiciet & aluminus v. herrimo prouentus; foliolis graminæis, rigidis sequevncialibus, triuncialibus, palmaribus, etiamque amphioribus longioribusque, è breuibz fibrosis rarioribusque radicibus, fungoso roque solo, quæ est illud quo cespites flagrandi flammisque vtilissimas Barbas patant. Vobgo vena vocant: palmaris cauliculis, sequepalmaris aut Spithamatus summo spicatis floribus stellaris luteis amcenus, minoribus, vel tota Planta, Alphodeli lutei palustris Baræorum & Brugæsum; quibus floribus lixiuo maceratis puellæ crinem flamm inficiunt, uti Lacatienfes*

*Laicastrigis
Asphodelus
luteus.*

Anglo-Britanniz mulieres, apud quas frequens oritur hic aut perululis Asphodelus; quem à tingendis capillis (*Wapden haire*, id est, Virgineum Venerisue capillum vocitarunt; Capillus enim Veneris Anglis, *Wapden haire* dicitur. Non videtur diuersum à secundo Pseudo-Alphodelo Clusij; sed variare paruitate & magnitudine ratione natalis soli.

Aliquot mensibus elapsis Noruegico luteo Alphodelo parem & similem ex Scotia huc Londinum ad me misit peritissimus vir *Jacobus Cargillus*, Doct. Medicus, philosophus, anatomicus & Botanicus insignis.

Æque Rhizotomi quidam, florum insitiores & vernacula lingua transcriptores, mirà metamorphosi literarum & linguarum inscitia, alienarum lucubrationum interceptores & persicæ frontis depopulatores falluntur, ac Tabernæmont: cum suis allectis & Typographo suo, qui cæte nostris scriptis & iconibus tanquam suis abusi sunt, dum Lancastrienien Britannicum palustrem Asphodelum luteum, cum Zatauo aut Flandrico Asphodelo palustri Doconej, vt alia pleraque adumbrant & confundunt. Nonne Tabernæmont: planas subreptitias se vidisse varijs Belgi, locis, vbi nunquam fuit, vt a Germanis accepi, viris fide dignis, finxit. Mirabilia quidem præstitit, mulietulas docendo, vernaculo idiomate tegimendas clysteres, Officinarum aculus notissimas, cum alijs trivialibus medicaminibus, ægrotantium & medicorum læpe interruptæ curationis incommodo; medicastrosum verò & quorundam typographorum sordidorum applausus. Leges quidem debereut in huiusmodi homines, qui pios labores Reipublicæ vitiles perdunt, animaduertere, & nullo modo manifestissima agnoscere furtiua scripta, neque ea in Scholis, Vniuersitatibusue Medicis inter classicos auctores admittere.

*De Iridis bulbose & satiore elegantissimæ versicoloribus v.rietatibus,
in Plantarum Illustrationibus dæcetur.*

*Varietates.
Saturi coloris
eobris reperiri
feritur.
Hyac: Byzan-
tinus præ æs.
Hyacinthus
Byzantinus
Someri.*

HYACINTHO Germanico stellari congener Hyacinthus serotinus albicans è Cantabriz mon-

ibus delatus, cuius effig. Iconum pag. 100, exprimitur. Septenis & pluribus aspectu iucundissimus in hortis D. *Iob. Someri*, & D. *Iob. Knibii* amœnissimis & rarioribus plantis diuissimis, albis floribus variare memini, & luxuriare cum Hyacintho stellato Byzantino a D. *Clusio* descripto, radice foris nigra, flore præcoci; & altero Byzantino siue exotico Someri Hyacintho, lata depressa spicata florum cinerej coloris fastigiat, fastigiato: de quibus & alijs plura in nostris Plantarum Illustrationibus. Subdemus alium Hyac: serotinum elegantissimum.

Hyacinthus Stellaris maior D. Io: Someri.

STELLATUS Hyacinthus omni sui parte duplo maior Hyacintho Stellari Germanico Mattiacis Medioburgensibus botanicis Belgis innotuit operâ D. Someri, eius quondam vrbis Metropolitanæ Zelandiæ Prætoris, piæ memoriæ filijs, huius perameni studij coryphæis, quem in horto splendidissimo & exoticoarum plantarum diuissimo Magni Ducis Hetruriz natus est. Flores intensioris purpuræ: Radicis bulbus albet.

Hyacinthus stellaris albicans botanicarum, Effig. Iconum pagina 100.

ASTELLÆ instar radiatis floribus ab herbarum cultoribus sedulis vocatus Stellaris aut Stellatus Hyacinthus, floribus albis, amœnissimis septenis & pluribus in horto prælati Someri variat.

Hyacinthus Stellatus Byzantinus vel exoticus Someri, lata depressa spica fastigiatus.

Hyac: Stellaris Cinereæ coloris apud Clusium: Effig. Rario: Plant: pag. 184.

IAM septenis & pluribus annis elapsis, altera Stellati Hyacinthi exotici noua species nobis Medioburgi innotuit operâ eiusdem D. de Somer, qui primus bulbum eius in Belgium attulit. Facie totâ, sparsis folijs & cauliculo spithameo quadantenus Hyacinthum Belgicum vel Britannicum æmulatur; sed umbellæ instar initio stipatim stellati subærulej pallidi flores, Plantaginis Rosæ modo in latam compressam aut aliquantulum depressam spicam, & tandem

in longam fastigiati. Apud Britannos hortenſis hodie, & bulbo propagatur operâ D. de Francque ville in horto Medico Nobiliſſimi Baronis *Eduardi Zouch* magni Præſidis Canbriæ ſive Walliæ.

Parvulus Hyacinthus Stellaris Vernus.

Parvulus Hyacinthus Stellaris Vernus.



Perſimilis etiamque Hyacinthis ſtellatis congener eſt hic Pumilio novus & indiſtus Hyacinthus, Londini hoc menſe Aprilis 1605. in ameniſſimo & exoticarum Stirpium diſtiſſimo horto C. V. D. *J. Coys*, cuius æpe meminimus, flores laxavit ternos aut quaterternos, ſtellatos, ex cæruleo cinereis; enis ſoliolis, totidemque ſtaminibus & apiculis cæruleis obſcuris conſtatos; pitillo in medio cum umbone aut apice ex cinereo cæruleo. Vix palmaris planula eſt, ſoliis anguſtis, ut cærulei æmni ſtatis parvuli. Hyacinthi Botryoidis, ſurrectis, minoribus tamen gracilioribusque, quaterternis aut quinis, è quorum medio cauliculus prodeit. Radix parva, alba, oblonga, parum fibrata, quâ, ut plerique Balis novis Plantis ex Gallis delatus *Georgius le Seigneur* Britanniam ditavit.

Hyacinthus Stellaris Byzantinus tenuifolius præcox: effig: Cluſ. rarior. plantar: pag. 184.

Affinis Scellati Hyacinthi Germanico, tenuifolius Hyacinthus Byzantinus ſoliolis & effigie; ſed minore vnciam longo, parvum digitorum craſſo bulbo foris fulco: flores iudem ſtellatos, obſoleſcè cæruleos tenui ſuperiore caule fuſos, Martio & Aprilis Londini laxat in hortis cultioribus botanicis.

Hyacinthus Stellaris Binantiinus alſer elegantiff. ſerotinus bullatus.



Pæcox deflorefcente Hyacintho ſtellato, ſerotinus, hic hilarioribus ſupradictio longè, nitidis ſtellatis cæruleis æmniſis ſecundum ſequipalmares ſpithameos, lucidos, planos, rubentes cauliculos, floribus prodeit: Stellati Germanici Hyacinthi latioribus ſolijs: femine in pericarpijs rotundo, albo, lucido, Synapi albi ſerè. Radix Leucoio bulboſo par, intus alba, foris rubens, quæ nucleis adnatis propagatur. Hoc Conſtantinopoli delatus quinquennio floruit Hackneſ Londinenſis agri in horto exoticarum Stirpium diſtiſſimo Nobiliſſimi Baronis *D. Eduardi Zouch*, Cambriæ magni Præſidis, unde quidam alij poſtea habuerunt, & divulgavit.

Hyacinthus Stellatus Perennis.

rex subeminet, quem Pictor in altera iconē, cum caulis crassitie neglexit, superne, medio & imo, crassioribus fibris præditus. Hanc nouam effigiem debeo *D. J. N. Fonti* *JACOBI* *Magnæ Britannicæ Regis Chirurgo peritissimo & Botanico*, quæ in mei gratiam cum exactissima *Narcissi Incisi* floris ruberrimi iconē deliniari curauit, operâ *G. le Seigneur*, è viuis naturæ typis præfati Regis Gallicæ, qui hodie rarissimis Plantis & floribus æstat; hyeme iconibus delectatur.

H *Hyacinthus Stellaris cinereus* acceptus à *N. le Quelt*, rhizotoma *Lutetiano*, ubi nondum floruit. *Promouit iuxta Fonteyn Gallicæ.*

Hyacinthus totus albus; Campanilla.

C Origenes fortè hic aut idem cum superjore, qui flores summo caule vno versu aut ordine vtri Gladiolus proferet: Radix alba, *Hyacinthi Stellaris*. Oritur iuxta *D. One* *Lusitanicæ*; *Gallis S. Vniuersi*: nobis nondum floruit, neque sequens.

Hyacinthus flore rubro.

O Ritur hic elegans *Hyacinthus* in *Lusitania* prope *Cogni* Flores siccatos vidi operâ *Nicolas* *Quelt* botanici.

Tipicæ lutei varietas, sine Muscarilutem præcox.

M Ediocastri Martiacorum in Stirpium exoticarum dirissimo viridario *D. Cornelius Corne* alebat, Martio flores laxans, initio subæruleos; Aprili verò aut eos, Folia minime sparsa aut procumbentia, vti alterius flauo *Muscari*, sed *Tipicæ* floris cærulej modo erecta, Cætera eadem.

Hyacinthus

Hyacinthus Indicus tuberosus Clusij.

Peregrinum verò tarum & eximium *Hyacinthi* genus ab Illustris. Comite Arenbergio & C. viro Paludano floribus albis missum, descripsit *Clusus* folijs longis humi spatis, triphori foliorum instar carina:is; sed angustioribus, longioribus, mucronatis, invicem latis latissimè modo amplexis. Radice tuberosa Ari-Egyptij, adnatis sese propagante, nonnulli fibriata, &c. Contule *Clusii* horti plant: pag. 176.

Hyacinthus obsoletior Hispanicus, semine compresso Pancratij Montpellieraci maritimi. Clusij effig. pag. 171. rariorum Planti:

Hyacinthis quidam Belgici *Hyacinthi* similitudine etiam hoc sociandum; quina aut sena ciliens folia ex cinereo virescentia, Muscari lutei angustiora, candida venâ striata, ingrati saporis. E foliorum medio caulis pedalis, vel amplior, nudus, firmus, denus, duodenos, etiamque vicinos flores nutantes ex purpureo pallido languentes & obsoletos, *Hyacintho* Belgico aut Anglieo quodammodo similes: semen fert in capitulis planum (inquit *Clusus*) nigrum Scillæ siue *Pancratij* *Montpelici* simile. Radice bulbosa *Narcissi*. Belgio inquilina facta, ex Hispania delato semine. Serius germinat & floret cum *Lilijs*: folijs ante autumnum non spoliatur.

Hyacinthus Mauritanius Clusij. Append: pag. 157.

Ariz regiones varias plantas gignunt. Valde similis est hic *Hyacinthus* *Hyacintho* superiori Hispanico serotino folijs & floribus: sed omnia paulo maiora: flores in pedali caule crassiore virenti aut plures majas oblecti & fusci coloris. Progenit inter Fezam & Marocum Mauritaniæ vrbes, vnde D. Iohannes Semerus Prætoris filius Medioburgensis Martiacorum habuit.

De alijs *Hyacinthis* exoticis in Plantarum Historia vniuersalis Illustrationibus dicitur.

Narcissus Indicus rubro flore

Narcissus Indicus rubro flore Clusij, Arundinis Indicæ Canina-ori vocati quadam: eius simili, &c. Narcissus Iacobani D. de Tomar. descriptus Rariorum plant: pag. 157. effig. ibidæ.

*R*arum & exoticum *Narcissum*, Posteritati primus præfecit *Clusus* a. C. V. Bernardo Paludano vtiusque nostri amicissimo acceptum: *Narcissi* vulgaris folijs, & quorum latere lævis & enodis caulis vacuus emergit, & ex imbraneo involucro sese exerit flos singularis splendens, & intente ruber, senis angustis longis folijs effigiat: Radice bulbosa, Cypæeo similis rotundo bulbo rubro, sed supernâ tunica pullo, folijs crassis *Narcissi* majini quorundam, siue *Pancratij* *Rondelletij*, *Astati*, & *Montpelienſium*, *Henierocallidæ* *Valentinæ* *Clusij*: Caule pedali, nudo: & imbraneo rubro involucro flos intente ruber. Floruit, ipsa



Cluso

Narcissus Cyprius luteus polyanthes, flore pleno.

Debetur hoc admodum elegantis Narcissi exotitum genus egregio viro Londinensi, D. *Leete* negotiatori Constantino-politano; qui eius bulbos cum pluribus alijs à Cypro Insula delatos, amicis suis comunicauit, & hoc mense Decembri 1604. folia pedalia, imò sede vnciam lata, superius angustiora, & flores vno caule folijs altiore plures, luteos multiplicisque laxauit in horto præfati D. *de Franqueville*, è bulbo Narcissi crassiore, coloris Castaneæ inuolucro tecto.

Hunc Narcissum esse ex natura quorundam exotiorum bulbosum, valde suspicor, quibus à natura incisum est, vt non nisi Anno primo à quo in Septentrionales regiones algidiores decessi sunt, soli & coeli natui succo adhuc pregnantes, flores laxent. Huius cum Cyprij Narcissi folia autumnò germinare inceperunt D. *Leete*, D. *Coy*s & alijs quorum sæpe mentionem fecimus, sed nusquam floruit brumà aut vere elapso, præterquam in prædicto horto *de Franqueville* medià admodum transueta hyeme, vbi flores illic leuissimà sæua superueniente aura marcescunt. Huius familiæ est Narcissus Polyanthos Byzantinus, & Lilium Alexandinum Italicum, nec non aliæ Plantæ.



Narcissus mediocrens tenuifolius.



Londinensi suburbano hortulo honestissimi viri *Henrici Cafabri* egregij, florum & fructuum rariorum studiosissimi, cursorum vni, Anno 1602. hunc inditum Narcissum in Belgio ductum, obseruauit palmaribus & quinque vncialibus tenuibus, Hyacinthi autumnalis foliis, viridibus: Bulbo cæteroque caule dodrantali & flore præcoci mediocroceo Narcisso non dissimili, minore tamen.

Narcissus

Narcissus parvus stellatus albus medio suauerbente vertice.

Nondum hic exoticus parvus Narcissus nouus nobis floruit; acceptus à *N. le Quelt* botanico Lutetiano, cum infrascriptis alijs Lusitanicis Narcissinis bulbis.

Narcissus d'Argiers aut Egyptius vocatus.

Narcissus verò d'Argiers, ab alijs Aegyptius nuncupatus, erutus ab eodem *N. le Quelt* in Lusitania, prope *D. Vae*, bulo Narcissi mediolutei Narbõensis pari & simili, sed externis inuolutis nigrioribus. Flores, caulis & folia, Narcisso Pisano similia, sed flores variant, quæ admodum vere elapso annotauimus Londini in horto nobilissimi Baronis *Zouche*; alijs uinoribus, rotundioribus & veluti decurtatis; alijs verò vnâ pluribus & longioribus.

Narcissi Mediocrej pleni floris de generatione,

Has expendere licebit in Plantarum generatis Historiæ nostræ Illustrationibus, quarum & multarum exoticarum Plantarum & Seminum copiam fecerunt amicissimi viri *Nicolaus Pelsterius*, *Thomas de la Fosse* & *Isaac Dujyn* Mediocræenses Zelandiæ Pharmacopolæ peritissimi.

De Narcisso cæruleo.

Solo flore cæruleo diuersum à Mediocreo Narcisso me monuit se colligisse hunc Narcissum *D. Quintus* in quodam botanico horto amicorum suauissimus, clarissimus & eruditissimus vir, Doctor *Malachias Bernarius*, Medicinæ quondam Professor Regius in alma Biturigensi Academia; hodie apud Rhétomagenses Medicus celebris, huius studij, medicatricis artis, cæterarumq; Medicinæ partium callentissimus & in praxi felicissimus.

Leuco-Narcisso-Lirion s: multifolium autumnale:

Leucorum bulbosum autumnale Clusij:

*Hyacinthus tenuifolius autumnalis
albus perperam creditur.*



A Folorum quadam similitudine & exilitate, Leucoij autumnalis genus istud ab egregio amicissimo viro *D. Theodorico Clusio* in Lugdunensi Batauorum Academia horti Medici primo instructore in hortorum delicijs cultum, Hyacinthi autumnalis peregrinum & elegans genus creditum fuit; cuius delineationem *Petro Clusio* fratri suo debemus. Flores albi, nutantes, senis foliolis constantes, staminibus pallidis præditi, & gracilibus rufescentibus, palmaribus cauliculis: exilia item foliola atrovirentia. Bulbus oblongus, albus. Nares nobis ignoti erant vti planta, (solent enim ob soli & cæli temperiem sæpè mutari), nisi pro veteri & synœra auiciu *D. Clusio* idem esse cum Leucoio bulboso suo tenuifolio autumnale monuisset.

Leucoium bulbosum præcox Byzantium Clusij Effig: Rarior: Plant. pag. 169,

Leuco-Narcisso-Lyrtion siue tertium bulbosum Leucoion præcox posteritati oratione & icona patefecit Clusius noster; secundo simile; latiore tamen folio: crassiusculum caule, & flore pendulo, nutante, duplo maiore, niueo, foris iuxta vngues vitidi, &c. apud Clusium.

Leucoium tryphillum flore caruleo Someti

Violam albam Theophrastus D. Fuchs, & botanicis vocatam siue Leucolon, flore caeruleo amaranthissimam, in Albania, iuxta Fritillariam albam purpureo-phaeo tessulatam, Constantinopoli rediens eruit prædictus D. J. Sowerus, huius studij iucundi apud Mattiacos coryphæus.

De Tulipa rubra angustifolia facie Bononiensis aut Apennina Tulipa & alijs Tuliparum variatibus & differentijs in Historia Plantarum Illustrationibus plura.

Narcissus Iuncifolius minor Clusij. Appendix pag. 257. & Venerij.

Congener cum Narcissis Iuncifolijs montanis Hispanicis videtur hic Iuncifolius Narcissus, erutus à Gallia præfectura Rouergue Vernaculè vocata, & missus Burdegalo à D. Ioaquimo le venier siue Venerio, qui tanto huius studij amantissimi flagrat amore, vt nullos tractus Pyrenæum montium vicinarumque regionum singulis annis sedulo non perclustraret, quantum ex literis suis asequi possum. Bulbo pusillo Narcissi Iuncifolij; folijs item iunceis, dodrantalibus, parum compressis, viridibus, sparsis; & caliculis gracilibus, pedalis; floribus Narcisso Iuncifolio similibus, minoribus, senis folijs pallidioribus confatis; calycibus flauis, maioribus vulgaris Narcissi Iuncifolij.

Narcissus albus montanus, calyce magno Luteo.

Narcissus Iuncifolius albus calyce magno D. Cor. Coorne.

Hinc item Botanico Lutetiano nostro N. Quelc debemus, qui eius bulbos, vncias duas longos; & vnam, plus minus crassitudine æquantes, in Pyrenæum montium, Senton, iuxta Banniery de Lussou monte vocato, eruit. Nobis nondum floruit; studiosè tamè colitur vt delineari possit, cum nonnullis alijs iudicatis Patis, & Iuncifolio Narcisso albo tortilibus foliolis floris donato, calyce magno & longo nutante prominulo pistillo tenui, qui hoc Anno 1604. floruit Media-Castri Walacriz apud D. C. Coorne & floris iconem Londinum ad me misit. Idem esse reor cum Narcisso Iuncifolio omnino albo, calyce amplo, prope Betam Gallæcie oriundo, empto à præfato Nic. le Quelc Rhizotomo Parisiensi anno 1603. cum altero Iuncifolio Narcisso amplo calyce, flore Luteo. siue primo Clusij è montibus D. Iacobo Gallæcie vicinis ab eodem N. Quelc ad nos deucto: de quibus & alijs plura in vniuersæ Plantarum Historiæ Illustrationibus nostris. Cum Iuncifolij Narcissis magno calyce, luteis, & totis albis floribus alijsque elegantissimis plantis bulbosis & Ciclamine Verno flore albo ad me missis a C. F. D. D. Ric: Belenel professore anatomico, & Simplicium medicamentorum, Hortique Medici, præfecto, & primo instructore, in alma Monipeliensis schola: sed sordide vt fieri solet intercepti suere à botanico Britanno auido.



Clus. Rariorum
pl. Historia
142.

Aduersariorum altera pars,

Narcissus Luteus vernus D. Late, facie Narcissi autumnalis lutei sine Colchico-Narcissi Botanicorum.



Sed nouus hic Byzantinus Narcissus folia cum floribus luteis vere laxat, atrouirentia, situ initio bina, deinde utrinque plura, binum & ternum vnciarum, quæ postea excrescunt longiora, Colchici autumnalis lutei quadrantenus: minora tamen paulo, & breuiora: cauliculus compressus ternas & quaternas vncias longus, floribus & staminibus luteis fastigiatus, prædicti Colchici lutei similibus, sed minoribus. Bubus Narcisso autumnali huius speciei similis, satis magnus pro Plantæ tatione. Hunc debemus D. Leet insigni Londinensi negotiatori; Constantinopoli a suis mercatoribus cum alijs rarissimis bubis transmissum, quibus summè delectatur.

Tulipa pumilio angustifolia, alba.



Flos senum foliorum albus; internis tribus candidis, latoribus; angustioribus verò tribus exterioribus internè item albis; externè ex fusco rubentibus, Croci floris lutei ferè paribus & similibus. Tragopogi instar folia angusta, quæna aut sena, humi procumbentia caulis palmo altior. Radix Tulipæ Monspeliensis maior. Bolonienfis ferè par, subfusca foris. Maximo in præcio habetur & sedulo colitur in horto amenissimo D. Johannis de Longhe Mesopoli Martiacorum concionatoris, huius studij calientissimi.

Tulipa pumilio alba altera Lusitanica.

VNcialis aut sesquivncialis hæc plantula hoc anno 1603. à N. Quelt botanico Lutetiano egregio accepta, exilioribus breuioribusque angustifoliæ Tulipæ superioris folijs; flore albo, exili breuique pediculo, florem siccam vidi, album senis foliolis donatum, staminulisque totidem: Bulbus valde parvus effigie aliarum Tuliparum, duriore inuolucro, externe pullo, squamoso obductus; interiore autem rubens, quem studiosè in horto alere incepimus, vt eius delineationem pressius cum multis alijs exhibere nobis liceat: sponte in monte iuxta D. One (Gal. S. Onat) ad maris litora.



Lillo-Narcissus purpureo-violaceus tessellatus niger, saturant, diluta aut obsoleta purpurea præcoccissimus præcox & serotinus, eorumque varietates.

Fritillaria, à fritilla similitudine Botanorum & Meleagris flos Dodo: Effig. Iconum. pag. 136.

E Lilio-Narcissi genere praeinsibus Aurelianis oriunda Fritillaria iam diu omnium prima in Belgium delata fuit; deinde Xantonico, Pictauensi & alijs Galliae pratis in Britanniam, aliasque boreales plagas ab amicis missa. E parua, siue squamis, aut inuolucris rotunda, utrinque compressa, veluti bipartita albâ radice, Fumaricæ Plantæ radicem vt plurimum, & nonnunquam mediocrem luforiam pilam æquante, exilioribus curvis subtus fibrata; tenuis caulibus pedalis, sesquipedalis & quandoque bipedalis purpurascens exeritur; quatuor, quinque pluribusuè angustis fusè folijs Montepeliacæ Tulpæ aut Allij siluestris sepris. Summo vnico caule flos, vt plurimum, singularis; quandoque gemellus cohærens; etiamque ternus. Præcox floreni Februariæ sepe laxat, obsoletioris purpuræ, nonnunquam dilucioris. Media, mense Martio cum præcoccissimis Tulipis floret, cui flos colore hilarior paulo, pronus propendensuè nolæ campanulæuè instat, Tulipæ minor, Naturæ admirando opificio variegatus, quodam quasi emblamate, subalbi, purpureo-violacæ saturioris variorumque colorum, pictus, tessellatus, segmentatusque.

Serotiæ Xantonicæ flos pulcherrimus est & satutiore & nitidiore purpureo-violaceo nigro colore gratissimus. Hæc nobis Antuerpiæ iam multis annis elapsis in delicijs fuit, Omnibus scilicet, Tulipæ minus, clauditur oblongo triquetro utrinque supernè & infernè compresso membraneo pericarpio.

Fritillaria
Xantonica flos
rotunda. Effig.
Iconum.
pag. 136.

Fritillaria lutea I. Someri.

NOuij quidam huius ætatis florum deliri, auidissimique negotiatores & cultores, à Dea Flora meretricie nobili, Florista vocati, aut potius hortorum sordidissimi prædones, & florum rapaces sagacissimi emungendis nummis mangones, hortulaniuè insitiores, de nouis repperitis Fritillarijs albis, luteis & nigris suauitè gloriantur & plus occupati, aut magis lucro intenti, quam gratiarum actioni accepti a præfato Somero beneficij. Dissert autem hæc Fritillaria ab alijs floribus colore luteo, rubris niaculis segmentato. A Somero Medioburgi studiosè cum Hyacintho stellari alijsque non paucis rarioribus orientalibus plantis colitur.

Iconem Londini iam biennio elapso accepi, sed minus affabre delineatam, vti D. Clafius me monuit postremis gratissimis literis.

Propter istos Plantarum insitiores & nugivendos mangones, C. V. D. I. Brancion: D. Boissotus: D. Petrus Coudenbergius, Georgius Ryensis & plerique alij primarij liberales Scirpium amantes cultores sibi & doctis syncerisque hominibus asseruare Plantarum incrementa quantum satis solebant; & superfluitates sepelire, né venum exponerentur, & profano ignobili vulgo, ranquam porcis margaritæ, prostermerentur.

Huius Fritillariæ luteæ geminos bulbos Lutetiâ Londinum, annis elapsis ad me misit Scirpium cognitione.

Fritillaria lures.



Cognitione preclarus vir *Iohannes Robinus* Botanicus Regius, ex Pyreneis montibus delatos; vna cum *Hemerocallidis* floribus luteis, alijsque rarioribus bulbis. Fritillaria alba & lures proueniunt in Pyreneorum *Causaure*.

Fritillaria Aquitanica *Clusij & Boissoti, serotina, Videtur quadrare cum varietatibus Fritill. nigra.*

Aliam descripsit *Clusius* à *D. Iohanne Boissoto* acceptam, quam olim mihi communicauit *Alexandrus Boissotus* cum *Bruxellis* versaret: flore alterius præcocis Fritillariæ, sex extremis foliorum floris oris aliquantulum reflexis, externè obsoletè purpureis, internè verò, ex viridi flauentibus nitentibusque, instar viridis sericej panni, subtegminis flauis, amœnis: ampliorem fuscipis, descriptionem, requirit *Clusium* pag. 153. libri. 2. historiz Plantarum.

Fritillaria varietates.

Floribus albis, notulis item fortuitis aspersis, apud *Pictones Galliz Aquitanicæ* reperiri mihi retulit *Petrus Naudin* Salmurij Pharmacopæus egregius, Fritillariam; non procul ab arduis saxosis vjs, *Passelopardin* vocatis & flumine, iuxta *S. Benedicti* vicum, miliare à Metropoli *Pictauio* distans, vbi viperæ commendabiles ad Theriacem, exili collo & caudâ, captantur.

Fritillaria alba elegantissima ex phœo-purpureo tessellata.

Collecta hæc in *Albania* à *Somero* Constantinopoli in patriam redeunte; flos internè rubicundior est, vnguibus albis prædictis.

Fritillaria

Fritillaria alba altera.

Fritillaria nigra.



Fritillaria alba altera.

Albam autem etiam in Lusitaniz monte oriundam iuxta urbem *Parte* vocatam, Anno 1603. florentem memini in horto D. Matthiz Craen Mediocastrensi Martiacorum aqua mariuè æstorum scriba. Anno 1604. Huius copiam emi Londini I. de franqueuille à quodam botanico Gallo inopstore qui quidem manipulum floribus præditum albis, nullis nia- culis distinctis aut tessularis vendidit; sed in reliquis sefellie.

Fritillaria nigra, Pyrenæa.

Nigra foliis est latioribus & brevioribus, quibus aut senis in caule pedall, altioreque. No- bis & C. V. D. L. Coys & D. I. Nafnith Chyrurgo & Botanico Regio, quorum sæpe me- numimus, florebat hoc Aprilis mense Londini 1605. D. Clusius elegantissime hanc descripsit in Rariorum Plantarum Appendice pa. cclvij. accepit Burdegali à D. *le Venier*, huius studij peritissimo, cuius subditas varietates annotauimus.

Fritillaria nigra.

Qux nigra aut obscurior vocatur, internè ex luteo viridescit cum testatis otis, viridibus lincis striatis; à medio ad centrum subsusca purpurà tessulata est, flos vernalis longitudinis, vil alio, um congenerum.

Tessulis à medio interno similibus prædita est, cuius flos hilarior purpurascens.

Obsoletioris coloris, ex luteo magis viridi, parum subsusca; intus minus tessulata, quem- admodum

Fritillaria ex fusco & luteo sublutida, cuius flos longitudine sesquivnciam æquat: omnibus per floris maturitatem, sena folia reflexa sunt.

Varietates.

De Croco satius accendo cultura & Croci sylvestris autumnalis & verni varietatibus in Adversariis diximus: sed longe plura in Plantarum Historia uniuersalis Illustrationibus: de quibus egregie & fuse Clusius Rariorū Plant. Historia à pag. 203. 204. ad 209.

Crocus vernus latifolius flauo vario flore, Constantinopolitanus sine sepius
Clusij; an sit Croci; syl. Vernus versicolor, antecornuta panus
cuncolor, botanicorum, Tentenice Gaud Laken,
& Galice Diap do't d' Effig. Clm: rar.
Plant. Hist. pag. 200.

Clusij.

Folijs describitur tenuibus, Croco vulgari vesco similibus; floribus serè auri rutili coloris, tribus crassiusculis radijs ex atto purpurantibus, ab atto ad summum stratis, multisque interdum venis ad latera sparsis; ternis interioribus folijs latioribus, vnguibus foris ex atto purpurantibus donatis: pediculus totidem stijis, quot sunt in flore folia purpureis saturi coloris radiatur; terna flauent stamina; & Stylus extrema parte aureus est: Tripona seminis rufi peti- carpia, cuiusmodi habuimus a D. Clusio nostro, & satum in horto Nobiliss. Barronis Zouche, nobis elegantes iamdiu plantas dedit. Bulbacea radix reticulato elegantissimo cortice inuoluitur. Huic iamdiu descripseram hoc qui sequitur modo, & eiusdem familiz opinabar cum Croco Verno Mesico Clusio descripto Panonicarum pag. 227. & Croco Verno latifolio eiusdem flore flauo Histor. Rarior. Plantarum pag. 205.

Crocus Vernus latifolius duplici flauo vario flore sine secundis Constantinopolitanus
Clusij. Effig. Rar. Plant. pag. 206.

Alteram congenere simillimam speciem delineauit Clusius, radijs tamen dissidentem, qui adeo latè seic effundunt, vt præter oras totum foliorum exterimorum dorsum inficiant, & floribus pediculus etiam totus purpurâ cæruleâ splendat. Vtrâque species D. Clusio aliquoties genuinam foliorum floris seriem protulit: senis internis auri coloris, & sex externis folijs, purpureis radijs striatis. Sexagonis peti-carpiis euanque gemellis semen clauditur, Pleraque serè Croci sylvestris Varietates Anglobritanniz & Belgio inquilinz.

Crocus Vernus flore luteo, coronâ Phæniceâ,

PEnes D. l. Somerum quotannis Aptili floret, delato & eruto bulbo ex horto magni Ducis Fletruniz.

Autumnalis Crocus sylvestris.

Hic sine folijs vt Colchicum vulgare flores laxat. N. Quelt.

Croci lutei varietates.

Ortu totaque facie non differre videntur Croci lutei flauī & fului coloris, senisque itidem floris foliolis conflatis à Crocis sylvestribus vernis, albi aut purpurei floris: eteclisque ternis aut quaternis, binis venis albis striatis folijs: cuiusmodi Belgæ Stiprium politiones cultores, iam quindecim aut circiter annis in deliciis habuerunt, etiamque hodie Londini eius tres differentias alunt Ioannes de Franqueville senior & iunior, mercatores Cameracenses huius amantissimi studij cultores esse.

Vnum quippe flore flauo siue fuluo, nitido; radice alijs non dissimili,

Alterum rarotem multo, præcocius flore saturo colore fulgente, *aurei splendoris foris elegantissimis violaceis nigris lineis striato, auro texto Serico panno ænulo, vnde. * Croci concoloris Aureo panno nonien, Gaud Laken vulgò Brabantorum & Drap d'r Gallorum. Staminibus intus luteis; folijs tenuibus erectis; Bulbo subtus aliquantulum fibrato, reticulo obte-

cto

* An Crocus Vernus latifolius Clusij flauo vario colore Constantinopol.

** Crocus aureo panno concolor.

cto, instar nucis Myristicæ inuoluti, Macis vocati. Hoc alui Hacknei figulino vase.

Tertium flore pallido ab aliis diuersum: cætera vt vt satis respondent.

Varietas.] Crocus vernus aureo flore Clusij, variat flore intese magisq; luteo aut rutilo & aperto. Sed tota planta minor, aliqui omnino terè similis.

Crocus auri varietates tres.

IN horto præfati D. Ioannis Someri tres annotauit varietates: vna folio nigriore, stiliis nigra prædita, aliis ternis foliis omnino intese luteis. Altera flore est prius latiore & maiore. Tertia minor est & flore pallidior.

Crocus syl. Byzantinus serotinus candidus, santillum subvernalis, an varietas Croci montani tertij Clusij?



DEbetur hoc perlegans Croci siluestris Autumnalis serotinum genus D. Ioanni Parkinsoni Londinensi Pharmacopolæ egregio & Rei Herbariæ amantissimo, qui eius bulbos Byzantio delatos sedulis doctioribus amicis Herbarum cultoribus Britannicæ ingenue impetratus est; vt Domino Ioan. Nafmich botanico primario & chirurgo Regio præstantissimo, generoso item viro D. L. Coys harum peritissimo, & D. I. de Franqueville. Vniuersa planta quinas & septas uncias altitudine æquat. In palmarum delicatiori cauliculo, vaginula prædita, flores laxat candidos, aliquantulum dilutè & rutilà vmbra mixtos, ampliusculos, Colchici paulò minores, senis foliis conflatos; tribus staminibus inferioribus, Croci Verni syl. similibus, totidemq; ternis sese extenuibus calioribus concoloribus staminibus aut filis. Horum in hortis prædictorum quorundam botanicorum per mensem Nouembrè in sextum aut octauum Decembris, vna cum foliis dilutioris viriditatis (obscurè vident Croci syl. montani folia) sparsis, ternum vnciarum, lineis albis m. dio exaratis, quæ paulatim matrescente flore ad palmarem altitudinè & uncias quatuor excresecunt. Radix adulta Nuccem Myristicam æquat, etiamque superat, rotundior tamen, Gladioli similis, intus alba, cortice obducta subfusco. Accedere videtur ad Crocum montanum tertium Clusij.

CROCVM cultum.

Diosc.] *Theophrastus ipsum tantum odoratum esse voluit, alii exitiosum tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim concoquendi, emolliendi atq; substringendi habet: urinam est, elegantem colorem præstat: qui ex Passio hiberint, crapulam non sentiunt. Oculorum fluxiones alitum cum humano lacte cohibet. Adulter in potiones que interancorum causa temperantur: ad vulnus etiam sedisq; cataplasmata, vtiliter inditur. Venerem stimulat. vergentes ad ignem sacrum inflammations mulces, auricularijs collectionibus vtile. Urinam mouet ex Passio pota.*

Diosc.] *Tribus drachmis ex aqua potum exitiosum.* Calore aut frigore, vt Euphorbium, Cicuta aut Hyoscyamus non est lethale. Serapio copiosè sumpsum ad tertium gradum calfacere & in secundo siccare ait. Drachmis tribus epotù adeo exhilarat, vt homines risu nimio & gaudio exoluat: Quæcunque autem adeo exhilarant risumque mouent inmoderatum, auocatis a corde spiritibus, lipotimiam & mortem inducunt.

Diosc.] *Qui ex Passio hiberint, crapulam non sentiunt.* Ex vino tamen immoderate potum mlium in modum inebriat, & homines adeo hilares reddit vt mentis inopes sint, eadem quæ dixi ratione in explanatione nostra Balsami, de Nuce Myristica agens. Galenus lib. secundum loca,

caput afficere dixit, eoque drachmas quinque in Hiera sua picra sufficere.

Passum, & Vna Passa.

Vinum passum à patiendo, etiamque vna Passa à Patientia dista Plinio lib. 14. Hist. naturalis, *Trapa* Græcis dicitur vna calore solis siccata: Vercres autē, melioris acini, dulcis & lucidi vuarum pediculos in ipsa vite quibus pendent intorquebant, vt sponte inarescerent, deinde sublata in vmbra suspendebant; tandem in vasis confectis loco succo recondebant. Frontigona Nitobrigum agri, vbi illud optimum & celebre Moschatelinum vinum paratur, vuz decerpit, binz Iunco utrinque pedicellis alligata, merguntur lixiuo soni feruentissimo ex Samentorum cineribus parato; quæ postea in innumeris petiolis, tanquam Tapetis aspectu iucundis, solis feruoribus contugantur, & inarescunt, emanente solida & lucida catne: Tandem in capitulis recunduntur, & per vniuersam Galliam distrahuntur, *Passa del Sol*, & *Passerillus* vocantur, plurisque sunt quam ex Malaga Hispaniz delata.

Passa del Sol.

Pruna Passa Ficus & alij fructus, vt Pyra, Persica &c.

Quidam non modo vvas passas dici volunt, sed & pruna Passa, Ficus aliosque fructus in rugas contractos. Ob lixiuium melius conseruatur, densaturque vuarum caro; sed quicquid inuicem contraxerunt vuz, in agrotapium vñus semper præcepit *Rox de Betius* imperabat vt abluerentur.

Vinum Passum.

Sapa.

Vinum Creticum Maluaticum.

EX Passis vis olim, vti hodie, fiebat vinum, quod Passum vocarunt. Passum, inquit Dioscotides, quod vis sole siccatis, aut in area aut in sarmiento totrefactus exptimitur, Creticum cognomine aut Piaminum, aut Protropion: & Sapa, quæ fit Musto igni decocto, Græci Sition aut hepsina appellarunt. &c. Pro vino passio hodie substituitur poenis illud petcelebre vinum Creticum, Maluaticum vocatum, aut Maderinum dulce, aut illud Hispanicum in Malaga paratum vulgò *Bassard*, quia à Creticis fide dignis vitis, aut Hispanis nobis relatum est, quod huiusmodi vina hodie parantur ex dulcissimis vis matunis, Solis æstu prius flaccescentibus, contortis Vuarum pediculis in sarmenis pendentibus. Hoc Passum, Sapiditate deducta à Sapa, quæ ex Musto igni decocto fit, vulgò Hispanis *Coccio*, id est vino cocto, à Columella Desitutum à defertuendo, vocato, siue Musto dulcissimo ad tertias decocto, non ad medias, vt Plinius inquit, excocto; Arabibus *Rob* vocato, differt. Arabes enim, vtinque *Rob* absolute vocant. Cum verò alios succos innuere volunt, plantæ noimen coniungunt, vt *Rob Betberis* & *Rob Ribes*, *Rob cerasorum*, Prunorum, Agrestis &c. de quibus alibi.

Diosc.] *Addit in potiones qua interaneorum causa temperantur &c.* Præctici hodierni etiam in potionibus ad tussim, cordis & pulmonum affectus, etiamque Pleuritidem mediocri quantitate relictus vtuntur. Soluit enim obstructions, cor recreat viresque instaurat.

Gal.] *Crocus* in calfaciendo secundum in exiccando primuū sortitus ordinem, astrigendū & concoquendi virtute pollet: proinde vim coneoquendi quandam habet, adiuuante scilicet in hoc & pauca astrictione. Quippe quibus medicamentis, cū non admodū calfaciāt, pauca adest astrictio, ea parem habens facultatem essentis emplasticis noninatis, quas cum iunctas caliditati non vehementi contigerit, concoquentes esse constant.

Ægin. Gal. Paulum quid astrigens obinet Gal. quod stritumque.

Colchicum polyanthes siue multiflorum.

Nihil à vulgatissimo Colchico differt videtur, præterquam florum abundantia; denos enim, diuodenos & plures purpureos dilutiores Septembri profert flores, quemadmodum Colchicum Pannonicum polyanthes candidos eodem tempore. In Cameracensi ducento agro, militari patuo ab vbe in villa Nietui vocata, quo loci D. I. Franqueville collegit, Petyerain pseudobotanici nuperi nugnendi Colchicum purpureum Austriacum dixerat.

Colchicum pleno flore.

Primæ & notissimæ speciei annis elapsis bulbosum huius Colchici radicem floris multiplici Antuerpiâ Londinum nubi, veteris amicitiæ memor, misit Clarissimus vir D. Alnatus Nunnus,

nuius, summus Philosophus & Medicus, parum à vulgari Colchico, nec nisi concoloris floris
multiplicauit incremento dissideat. Debetur hoc genus Illustrissimo Coniti Arembergio,
qui diligentia, uti pleraque alia rarissima & exotica simplicia, quorum studiosissimus est, ex
Germania adeptus est. Quod malè mihi celsitac præfato Donino Arembergio & Clusio:
surreptus enim fuit eius bulbus cum alijs plantis ex horto Nobiliss. Baronis Zouche.

*Colchicum biflorum, vulgari simile, flore saturiore Clusii & Camerarii, icon, Ra-
riet: pl. pag. 20. 2.*

Posteritatis diligentia & pertinaci disquisitione Colchicum biflorum à vulgari non dissimile
reperitum, ut ait Clusius, quodam montano prato prope Heidelbergam; cuius etiam me-
minuit G. V. Ioachim Camerarius.

*Colchicum Polyanthes candidum elegan-
ti rubore varium, D. J. Fran-
queville,*

*Colchicum minimum tenui-
solum Gallacium.*



*Colchicum Polyanthes candidum eleganti rubore varium, D. J.
de Franqueville.*

IN delicijs est istud perlegans Colchici genus in Belgio, etianque Londini in horto-planearum
exoticarum dilissimo D. J. de Franqueville ob floris amœnitatem quinque ut plurimum foliis
latiusculis præditi, nonnullis candidis omnino, alijs verò rubore diluto prorsus tinctis, alijs
itaque candore & rubore hilari secundum folii longitudinem dimidiatim distinctis, alijs deni-
que medio lincis albis striatis. Quos flores edidit congessos, quorum vnus quatuor tantum
foliis constabat, quam aliorum latioribus: totidem item staminibus luteis præditus: ac careri
omnes quibus donati fuere. Folia latiora verè erumpunt, cubitalis longitudinis altiorisque,
hactenus neque semen, neque folliculos, iam octauo anno edidit. Bulbus Colchico Pannonicæ
albo maior.

Colchicum minimum tenuifolium Gallacium,

Nouum Colchici pumili genus alimus in horto operâ Nicolai le Quet rhizotoni Lutetiani
ex Hispaniæ regione Gallaciæ delatum, foliis Croci motani minoribus, humi sparsis, bi-
nis,

nis, ternis, quaternis aut quinis, carinatis, vncias binas, aut sesquiuunciam longis (mibi folia duo solum dedit.) Radice Colchici, Auellanz paruz nucleum æquante : flore vna cuni foliis prodeunte senis constante foliolis angustioribus purpurantibus, totidemque staminibus aut apiculis luteis prædictis, è breui pediculo parui è terra emergente. Floruit nobis & amico viro Iacobo Taminear Chururgo practico apud Medio-Burgenses Anno 1403. Hoc etiam alicui in hortis Londinensibus, exoticis plantis ditissimis amicis minorum virorum generosi D. Coys, & D. I. Nafsmis Botanici Regij primazij & Chirurgi. De alijs Colchici speciebus in Historiz generalis Sürpiua Illustrationibus, nec non descriptabitur.

Allium siluestre perpusillum, Luncifolium Moschatum.

ARidis Nitiobrigum agri Monspelio vicinis collibus hic exiguus bulbus conuictor & alumnus parili bulbo Hyacintho autumnali. Cauliculo palmari, recto, rigidiusculo, exili; è cuius summo sex circiter erumpunt propagines, & quibus thosculi veluti in umbellam dispositi prodeunt, quibus aut senis foliolis constantes; paruis angustis & ablongis, Ornithogali floribus similibus, acuminatis, lineis fuscis in medio per longitudinem intertinctis, Asphodeli albi instar: coloris albi obscurioris, staminibusque in medio, Moschi planè odorem suauissimum spirantibus, prædictis quibus succedunt capitula rotunda in quibus tria vel quatuor triquetra, oblonga nigraque semina continentur. Bulbi subsunt parul, albi, oblongiusculi, Alij Syl: similes, ingratique odoris. Folia emittit lunceæ, exiliora, tenuissima; quaterna aut quina numero, vix vnciam longa. Cum D. *Guil: Coys bulbos alinus in horto, munere D.D. Leisteri Medici clariss. è Monspelio in Britaniam reducis.

*Legi ubi-
que Guil.

*Moly Luteum Botanicorum, Rhizotomis
perperam Ornithogalum luteum
latifolium.*

*Panctatum Indicum: aut Narcissus Indicus maxi-
mus autumnalis quorundam.*



Moly Luteum Botanicorum; Rhizotomis perperam Orinthogalum luteum latifolium.

Exoticum elegans istud *Moly luteum*, Botanographis iudicatum, à N. le Quelt Rhizotomo emptum & in Pyrenæis montibus, ni labat memoria, erutum; floribus est luteis senis folijs, pluribulque staminibus concoloribus donatis Orinthogali Arabici floris lactei similibus minoribus tamen, vno exortu è pediculis quam pluribus in spithamæo cauliculo, binis folijs latiusculis, Tulipæ Bonemensis siue Apenninæ vocatz similibus prædito, vno latiore, altero ut plurimum angustiore. Radice serè pari, sed breviori. Hoc anno 1604. nobis floruit Londini in horto Nobiliss. V. D. Baronis Zouche, & Franqueville. Tota planta Alij fragrat odorem, eoque *Moly* propior quam Orinthogalo luteo; Orinthogali autem lutei nomenclaturâ quo carissas distrahatur, à rhizotomis, perperam donatur.

Pancretium Indicum; aut Narcissus Indicus maximus autumnalis quorundam.

In memoriam reuocat Narcissus Clusij Indicus nouum Pancretij Monspelienfis facie Narcissi Indici maximum genus; radice spithamum longa, brachialis crassitudinis, multis Cæpæis subalbidis tunicis squamosa extimisque cuticulis ex rufis subfuscis, aut Castaneæ diluti coloris; sessili parte maiore, mediocrem pugnum æquantis; numerosis carnosis habitioribus fibris, Pancretij aut Scillæ instar, quasi truncato aut nodo collectis & appendis tulta. Opinabar Pancretij aut Scillæ speciem, sed nequitiam sapor amarus refragatur. Septembris & Octobri oclonis aut denis stellatis floribus Colchici albi Anglici paribus, sed longioribus, sub luteis ex albo luridis senis longioribus staminibus albis præditis; latioribus è membranis tunicis, *Moly* Dioscoridei modo pendulis brevioribus, sine caule penurâ fortè alimentu inhærentibus. Inter plures vnicus bulbis mihi floruit; sed quia diu naui terrâ destituti, folijs vidui erant; tamen rudimenta conspicua in minore bulbo retusa apparuerunt, Pancretij Monspeliaci similia, duas vncias lata, breviora tamen, fortè nondum profus enata aut perfectam longitudinem assecuta. Omnes hi bulbi hyemis sæuiores iniuriâ Anno salutis 1600. Londini, Antwerpiz & alibi amicis communicari perierit, quos mihi dederat amicus singularis D. Ioannes Loeus Germanus apud Londinenses Chirurgus egregius, à naucleris reducis ex Alta Hispaniola Occiduz Indiz, *Teborum Capo* siue portu vocata.

Pancretium Indicum alterum verum, siue Narcissus Indicus alter, facie Pancretij Monspeliaci, Libo-Narcissus Hemerocallidis facie Clusij aut congener.



Narcissis associanda hæc Pancretij Monspeliaci facie bulbacea Indica planta, cuius bulbo me donauit C.V. D. Ioannes Hussenius consiliarius Ordinum & societatis præfectorum rei maritinæ Zelandiz Belgarum, in cuius horto quotannis floruit & floret, è duplici caule dodrantali & pedali, quatuordecim floribus liliaceis, candidis, vno ab eodem, ut prædicti Pancretij, exortu prodeuntibus quatuordecim; altero verò duodecim, senis foliolis longis albis conflatis, internè tantillum subfluentibus & calyce medio lacinistis, totidemque staminibus longis, medioque stilo præditis. Mihi hoc anno Londini in horto Nobiliss. Baronis Eduardi Zouche & D. Iacobo Gareto Myropolæ rei herbariæ studiocissimo, senos aut septenos

tenos tantum laxauit, cui caulis & bulbi latere prodiit. Foliorum & bulbi fusci similitudo & parilitas quodammodo Pancratii Monspeliaci.

E floris colore Varietates.

A Nnis elapsis floris fusci Caryophyllo aromatico concoloris varium alebat Medio-Castri Zelendorum in horto honestissimus vir & mercator Michaelus de Lanney affinis meus. Varias aliorum colorum differentias repetiri audio.

*Narcissus Aphricanus, sine
Narc: exoticus.*

*Narcissus Aphricanus folio
rotundiore.*



Narcissus Aphricanus bifolius, sine Narc: exoticus.

E Crassa lataque, utrinque compressa squamosa, veluti nucleis compacta radice, bina tantum edit folia, vncias duas lata, latioraque; & vncias quinque longa, viridia laeuiorque; sub tellure tamen alijs duobus foliorum rudimentis praeditus, hic peregrinus bulbus, paruum pugnum magnitudine aequans: cuius mihi copiam fecit praclarus vir D. Iacobus de Keyser Melopoli Martiacorum negotiator, huius peramantni studij amantiissimus. Fratet eius Gomarus de Keyser bulbos eruit locis vicinis Porti siue Capae bonae Spei & primus in Belgium detulit, Anno alapso 1603. eandem rarissimae elegantiae plantam, inter exoticas delicias Hortuli D. I. Knibij Mediocastri Zelandiae conspexi, quae postea hyemis siccitate perijt. Flos amantissimus Anemones floris plenis, sed colore Phaeiceus: etiamque suauerrubens: cauliculus egregie variis coloribus, caeruleis, & rubris amantissimis punctulis, variegatus ornatusque. Narcissum exoticum appellauimus, cui propior esse videtur, quoad nomen magis conueniens nobis innotescat. Praefatus D. de Keyser nobis exactiorem iconem pollicetur.

Varietas.

F Olio torundiore & complicato, apud eundem D. de Keyser variat.

Lilium sylvestre siue Hemerocallis moschata Polyanthes, &c.

A Nno salutis 1596. in Angliam reuersus exoticarum plantarum expiscandi gratia, nostrisque botanicis lucubrationibus Illustrandis; illico in cultissimis botanicorum hortis hoc

Lilij

Lilium sylvestre sine Hemerocallis moschata
Polyanthes Martagon Imperiale
hemerocallis.

Insulanis nostris Gallo-Belgis, Martagon
à l'espiguette.

Hemerocallis Macedonica, tenuifolia, miniati coloris.

Lilium sylvestre montanum Macedonicum & Mar-
tagon Pamponeum splendissimum miniati
coloris D. J. Sameri.

Martagon Pamponeum Sameri.

Lilium rubrum præcox Clusij.



Lilii montani novum genus, à florum coronata sætura, *Martagonis Imperialis* nomine insigni-
tum aut vocitatum, conspexi. Peregrinæ elegantiz planta gavisus sum. Elapsis aliquot annis
missi huius bulbos nonnullos munere dedit D. *Joannes de Franquerville*, Stirpium & florum ra-
riorem callentissimus qui annis plus decem illos *Insulis* à quodam botanico nactus est & aluit
siquitque studiosè in horti delitis; ubi rara transplantatione florum pyramidalium acervum,
centum viginti & plurium, suavissimo spectaculo, incandissimæ *Rosæ Moschatæ* odoris æmuli,
densissimæ bicubitalem ex purpureo-fuscum caulem fastigiantem. Flores pares, similes *He-*
merocallis secundæ nobis modo descriptæ; dilutiores tamen, pallidiores & lucidiores, per ex-
terioris quinque aut sex variè & fuscè caulem ornant, fortuitis ex fusco purpureis maculis latiori-
bus diffusi, circumstantunt & coronant. Semen in vasculis compressum, alis ferè par & simile.
Hoc primum ante omnes botanici *Insulani Gallo-Belgæ* nacti sunt: sed vnde delatum, nescio.

Hemerocallis Macedonica tenuifolia, &c.

Eximio ornameto decorat botanicorum paradisos huius *Hemerocallis* luculentus flos,
intaminalè fulgens miniati coloris. Dissidet cum aliis *Hemerocallis* minati varietatibus
innumeratorum foliorum, instar Graminis exilium, ternum solum digitorum longitudinis, incre-
mento: quæ caulem sesquicubitalem & ampliolem, nonnunquam item compressum laticuscu-
lum,

lum, floribus quadraginta octo, per ameno spectaculo ornatum, sepiunt; cuiusmodi meminisse iuvat apud Dom. *Joan. Knibium* ciuem honestiss. Mediodurgentem. Debetur hæc planta præfaro Domino Somero, qui primus eius bulbum è Macedoniæ nōtibus effosum in Belgium detulit, & amicis communicauit, cum multis nouis raræ elegantiz plantis exoticis. Hanc quodæ aliquot annis ob florum decus Nobilissimus Comes Arembergius studiose coluit, nec non alii Mediodurgenses D. *Iohannes Junior Ecclesiastes*, & D. *Petrus L' Aoust* aromacopola cum amica vxore, quæ tanto florum elegantissimorum studio & desiderio flagrat, & capta est, ut Floræ nomen sortita apud Botanicos.

Lilium Montanum flauo flore.



Non dissimilem vultum, ortum & natales habet montium nempe Pyrenæorum Lilio Bizantino iniuncto aut syluestri montano Lilio. Bicutitalis caulis, foliis longis, angustis, tribus nervis præditis; floribus pallentibus initio, deinde flatis, sevis reflexis ad pediculum folius constantibus, à medio ad centrum punctis elegantiss. atropurpureis notatis, totidemque staminibus virentibus, apicibus pulcherrimis suauissimisque elegantissimi lucidissimisque miniati coloris fastigiati, cuiusmodi summi triquetri pistilli ex luteo virentes è medio flore exerti. Huius semine compresso, Coronæ Imperialis aut Hemerocallidis simili, me primus donauit, Burdegalo misso, in labat memoria, amicissimus vir D. *Clusius*. Paulo post bulbos à D. *J. Robino* Christianiss. Regis Botanico Lilio similes Lutetiâ accepi, deinde magna copia Mediocastri Selantorum à botanicis aut risotomis Gallis *Guisl. Davidson & Nicolle Quets* habuimus, è Pyrenæis montibus erutos.

Lilij montani lutei tres in flore varietates.

Tres conspicuas differentias floris obseruauimus in hortis D. *Thoma de la Fosse* Mediocrastri, & D. *J. Franqueville* Londini.

Flore pallidæ ex viridi luteo, sine notis aut punctis; pistillo, staminibus, apicibus miniatis. Hic præcocior est.

Tertia varietas floris intensè lutei, rutili, notulis maiusculis insigniti, inter præcoccæ & setoninum mediæ.

Bulbo Eriophoro similis bulbos in Bataniis est Chama Orchidis nouum genus ægerum Zelandia.

Oreæ & facie, compactillique squamarum serie similimus Eriophoro Bulbo, fibrillis impatiens solo; emineutibus bulbis subuirdibus. In palmati cauliculo flores non annotati sunt

Orchis Liliifolia minor sabuletorum Zelandia & Batania.

Bulbo Eriophoro similis bulbis.



id est, facelli orientalis à me ultimum collecta.

Plantago umbilicata, latifolia & conuoluta unifolia. Reddenda Aduersar. pag. 127.

Umbilicus montanus herbariorum.



ere à *Guilhelmo N. mercatore* Batauo, qui hanc descriptionem dedit tontonicè & prouenire ait iuxta maritimos sabulosos appeter Hardemo proximis, in silua Terrea, vulgo *Eerd en Bosch*. Idem sanè reor cum nostri nouo *Satyrio Zelandico* infra scripto; in herbacione olim reperto etiamq; elapsa ætate 1603 iuxta aggeres Sabulosos *Walachrix* inter *Pyrolam* nascente, quæ omnes quadam foliorum similitudine ducti, nec non flosculorum herbaceorum (in labat memoria) & longiusculi seminis fuliginosi inuolucris, *Orchis Litoralis* frisiz, *Orchin sabuletorum maritimarum* diximus. Radix illi gemina, quandoque terna sed raro, alteræ alteri innata foliaceis albis inuolucris tecta, intus viridis gustu suavis. Infima fibrillis impacta sabuletis, arida, inuillis & flaccida. Cauliculi binum, tertium & quaternum vneiarum: folia bina Liliacea duas vncias longa. E regione pagi *Ostf. Capel*

INTER quamplurima rarissima & exotica semina *Monipelio* nobis Londinum missa à charissimò & doctissimo viro D. *Chasparo Pelliccio* Middelburgensi è celeberrima *Monpeliensi* Schola D. Medico, facta in herbario D. *J. N. Smyth* sereniss. Regis Magnæ Britanniz Chirurgi penitissimi & archibotanicis miræ & raræ elegantiz hæc orta planta; cui radix Plantaginis vulgaris simillima, spithamum longa, creberrimè fibrata; è cuius nodulo siue basi, digitalis crassitudinis, Plantagineum latum, vnicum, admirabili Naturæ opificio, expansum folium, paulatim propagando in latum gyrum umbilicatum excresecens & *Cochlidis* instar per circuitum ascendens in spiras duas tantum, aut semi-ernas conuolurum, ac veluti ex pluibus coniuictis in vnum contiguisque Plantaginis maioris vulgaris folijs, confutum, spithamæ altitudinis aut pedalis fere, cuius summum folium Plantaginis latifoliz seruat figuram, sinuosam tamen & rugosiorè, sapor illi prorsus plantagineus. E medio conuolutò siue umbilicato imò centro, foliorum minorum quædam rudimenta conspiciuntur,

conspiciuntur, & quibus caulem erumpere verisimile; sed quia autumnus nectz propinquior, caulem & florem hoc anno videre non licebit. Hyeme folium perijt: A: Vere nouo hoc sequenti 1605. folia plura & media radicis ceruiciz, non vno annu exuunt, aut in vnu folium redacta, laxantur; sed duo aut tria simul in vnum iuncta, fimbriata, laciniola aut sinuosa: Caulem & semen nec dum edidit.

Nona gloriose elata & opinata YVCA. Manyca, Manubos, Aracidue.
reddenda Aduersariorum, pag. 161.

Opinionibus varijs & insularum quorundam Barbarorum, aliorumque minus accuratis occularibus inspectionibus, prolixisque paginis, confusis, suspectis & ambiguis relationum accumalatis aceruis, acquirere non audentius: quibus adaniussum perijt ensis; neglectis & valere iussis Tueti, Lugdunensis aliorumque nonnullorum iudicijs de *Tuca, Manyca, Papas, Sannahma, Baratas, Manubos, Theoph. & Plinij Aracidue*; Indis Barbaris Panis vicem supplentibus; Glandis instar veteribus alendis, & Castanearum hodie plebi in Iberiz, Narbonensis & alijs Galliz quibusdam tractibus, vt agrestibus hominibus anachoretis fidei religionis & pietatis mancipijs, radicibus & herbis victitantibus:

Ita namque planiz disparibus folijs praeclat sunt; quae quidem à Cannabinis folijs, aut Elebori nigri floris albi, vel Castaneae Equinae modo diuisis, quibus ab Indicarum plantarum scriptoribus reuera assimilantur, dissociantur: qua de causa non modo D. *Clusius* sed etiam nobis illa noua *Tuca* credita suspecta est.

Quae autem de hac noua elegantissima Yuca putata habemus haec sunt.

YVca credita Indica noua & elegantissima Planta virens & florens anno 1596. & 1597. Londini in hortulo suburbano V. I. *Gerardi* Chirurghi & Stirpium strenui indefectiq; laboris studiosi, florum & plantarum aniore flagrantiss, primum visa, & quadantenus nobis vt illi prosum & prodesse velim in sua Plantarum enumeratione, his penè verbis descripta. *Tuca* Indiz Occidentalis Planta, quae alia species à *Tuca Indica*, ex qua Panis communis fit, videtur: Nani quamuis folijs sit perpetuo virentibus, iisque minimè laciniatis; sed ambitu, foliorum Dracosis arboris ex atro rubentibus, vtrinque cultri aciei instar acutis, longitundine cubitum & sesquicubitem exquantibus, mucronatis & peracutis, aliquantulum sulcatis, quodammodo Sedum aquaticum Belgarum praeferebantibus. Flos ex leui pediculo albus Nymphaeae albae, sed multò minor. Radix subest subsusca foris, intus alba, Peconiae feminae concolor, tuberosa, brachiatata aut diuicariata & crassa. Neque caulem neque florem proferre asserēbat D. *Gerardus*; paulo post tamen quam descripsit, in suo horto enatum florem Nymphaeae albae similem sed minorem collegit charissimus egregius vir Doct: *Iacobus Cargillius* Scortus Medicus, anatomicus & botanicus doctissimus. Hanc I. *Gerardus* superioris immemor descriptionis latine in sua plantarum enumeratione collata; postea vernaculo idiomate, sic expressit, cuius verba praecise latine vertimus, vt sequitur.

Planta est cuius radice Indicus panis, *Cassana* vocatus, constat, humilis herba est, solum ex radicibus & folijs constans: Caule flore & fructu caret, quantum ex alijs aut ex ipsius plantae experientia, quae quatuor annis continuis viruit & adhuc luxuriat in meo viroto, assequi possum; sine tamen caule flore & fructu, vt supra dictum est. Radicem habet valde magnam, crassam, tuberosam, succulentam, aliquantum dulcem, sed qualitatis perniciosae (inquit meus author) cuius radice immediate assurgunt quamplurima folia, radicis ceruici rotundo circuitu connexa, sesquicubitali longitudinis, supernè & infernè arduiora, medio latiora, sulcata, leuia admodum, viuidia, Glasto concoloria, vtrinque acie, cultri instar, acuta, atrovirentia, mucronibus acis modo peracutis, fastigiata; pungendo quae maximè inconsultis transeuntibus infesta, & crura lacerantia. Foliū diligenti inuenti simile est paruulz Cymbae, aut consimilis Cymbulae, frangenti etiam atq; etiā contumax, durū & scindendi difficile, nisi cultri acies peracuta fuerit. haecenus *Ger.* A peritioribus quaeritur, cur haec descriptio constata sit ex plantis maximè dissidentibus: videtur autē natales describere ex Lugdunensi, & Lugdunensi ex Tuetio: & plantā suam acceptam referre à famulo *Thoma Eduardo* perito Excestrienfis occiduae Anglo-Britanniz Pharmacopoeo. Indis quibuldam (inquit) *Manubos* vocatur, sed generaliter *Tuca* aut *Ineca*.

creditur

Creditur Theophrasti Arachidua & Plinij Aracina: detorsisse creditur suam Yucam vteain incertis Teueti & aliorum aptaret descriptionibus, nudâ Yuca suæ inspectione minime contentus. Malthodie conatur Apros siluis appingere.

Novæ glorioseolata & opinata YVCA.



Anno reparatz salutis 1604. Julio, quo Nymphaea florer mente, in eodem suburbano hortulo, flores annotavi cum calycibus & gemmulis suis ante florem, quamplurimos, septuaginta numero, plus minus, alternatum prodeuntes, in brachiatis inæqualis situs, copiosis alijs, tricubitalis subrotundi, atro rubentis, digiri medioctis crassitudinis, Liliaceo Constantinopolitano concoloris & simili caulis, inslar nolæ aut tintinnabuli ex vncialibus pediculis pendulos, foliis ligularum modo ad basim donatis. Flos senis constat albidis folijs; externis tribus mucronatis, maioribus lateribusque, candidioribus; inrennè à medio folio, ad summum vsque variis venis, vt Fritillariæ flos quodammodo tessulatis; externè fulcatis, lhiatis & rugosis. Tribus verò interioribus angustioribus & infernè pinnatis. Nullo odore prædictus flos, magnitudinis floris Hellebori nigri suaverubentis & Nymphaeæ albae minoris medius, ex luteo luridus, triquetro vix vicianti longo pistillo prædictus, extremis tubis albo, senis itaminibus albis fastigiato. Folia sesquivnciam lata, acuta, sesquicubitalia vt supra diximus. Cui elegantiâ & raritate & inspectione huius peregrinæ plantæ maxime gauisr esse-

mus, statim Clarissimus & piissimus V. D. Guil. Coys, Plantarum omnis generis hodie inter Britannos coryphæus eam ex viuis Naturæ typis delineari procurauit, vt inter rariiores plantas Appendicis nostræ infereretur, & transmarinis innoresceret:

Audio etiam floruisse Lutetia in horto D. I. Robini Botanici Regij; cui Londino missa planta fuit.

Bellis spinosa elatior & fructifera Herbariorum, bullatis aureis floribus.

Reddenda pag. 200. Aduersariorum.

A Peritoribus quibusdam Botanicis Londinensibus hodiernis huic nouæ exoticæ Plantæ, Bellidis spinosæ nomen iudicatum est; cuius semen ex horto Pisano Magni Ducis Hetruræ nactus est D. I. Parkinson perbonus & honestiss. Pharmacopæus Londinensis, Stirpium materiarumque Medicarum audiosissim, qui D. de Franqueville & C. & generos. V. D. Guil. Coys bulus amantissimâ & vtilissimâ studijs doctissimum hulus semine impertiuit, quo enata est bicubitalis & amplior ramosa & fructuosa planta, folijs prædicta Bellidis maioris breuioribus, minoribusque, Telephij purpurei aut Rhodiz Radicis medijs & ferè paribus; sed magis sinuatis & spinulis acutis, inslar llicis humilis Cocciferæ, vnde Bellidis spinosæ nominis occasio. Flores summis virgis bullati, aurei, aliquantum compressi & medio deprelsi, nullis folijs radiatum cincti, maiores quam Abrotani sæminæ aut Absynthij Scriphij Dioscoridis, facie Abrotani sæminæ de-

Bellis spinosa elatior & fructuosior Herbariorum, bullatis aureis floribus.

Lauri Alexandrinæ legitima & exaltior effigies. reddenda Aduersariorum pag. 283.



scripti in Aduersarijs, pag. 336. Radix multum fibrata, Matricariz. Sapor iniucundus subamarus; odor grauiusculus Cotulæ fetidæ quadantenus, ad cuius naturam accedere videtur.

Laurus Alexandrina.

L Item dirimens de veræ Lauri Alexandrinæ elegantissima planta ingenuè proferam quæ vidi operâ amicissimi viri *Ioannis Parkinson* Pharmacopœj Londinensis, Rej herbaræ periti & anantissimi, qui ramulum eius non dissimilem Bislinguæ mihi communicauit, delatum ex instructissimo & variarum plantarum exoticarum ditissimo horto Medico Pisano. Hæc ramiuli pars non excedebat longitudinem vnciarum quinque, septenis folijs alterno situ, non ex aduerso, vt habet effigies Matthioli & Lugdunensis prædita; nervosis utrinque, rigidis vt Hippoglossi: inferioribus ternis aut quaternis, vncias duas longis, & plus vnâ latis, in mucronem, Ruscini modo, fastigiatis; medio auerso folij crassiore nervo, specimine flosculi pallidi gemmato, sine pediculo & ligulato bilinguiuè foliolo (fructus enim medijs folijs amplectitur Theophrasto auctore) vbi semen Bonifaciz siue Hippoglossi minus proferre dicitur, donatis; ternis verò superioribus minoribus vnciam latis, & sesquiuinciam longis, mucronatis, utrinque item nervosis, sine flosculorum rudimentis. Effigiem exhibeo in studiosorum gratiam, eiusdem cum ramiuli, tum foliorum parilitatis.

Appendix.

Paginis vacaturis explendis, cum hac lente peracta & procrastinata fuerint i raras aliquos ad huius secunda partis nostra Auiuersi. appendicis calcem tumultuariè submittere licuit, cū velim, nolimpro sesquimenſe ad ſenos & ſeptenos, ſanguenti operarū & chakographi officio detentus; parciatatis ſphalmatum ſpe fretus; maximeque cupiens, ut ferretur, vitare Charybdim, incidi in Scyllam, & in eundem, in quem verebar, non ſecus ac pleriq; alij, ſordidi quandoque Chalcanti ratione, nec non prapoſtera ſape elementorum perverſione, impegi lapidem: Sphalmata tamen minus ſerenda in Indice diluuntur. Si hac quidem noſtra Commentariola, non eſſent rerum, poſteritati vtilium, ſolertiores explarationes, qua ſenſibus concipiuntur; ſed verborum acernus & apparatus; huius ſanè editionis nos penit:ret. Non enim delectamur, graſſa Minerva, quotidianis Medicina voluminibus, quibus periclitatur, perditur & fallitur fatuus mundus, vernaculè uerſis & peruerſis, Typographorum & Bibliopolarum operà, ſenore & applanſu, qui huiusmodi operum aucthores & ſanctores ſunt, & fuerunt. Hac interdicere, boni eſt principis. Quare doctos lectores impendio oramus, ut hos noſtros labores nobiſcum inueniunt & reſtaurent, a quorūque ſerans animo.

Hyacinthus minimus ſerotinus elegans, Floſculus Hyacinthi Orientalis.

Hic Hyac: minimus facie Orientalis Hyacinthi, ſeſqui palmiars & ſpithamzoz tenuiſſimos cauliculos edit, tribus floſculis è gracilibus pctiolis, ex caruleo dilutis, ſenis caruleis venis ſtriatis, Hyacinthi Orientalis ſimilibus, ſed longè graciilioſioribus minoribuſque, ſex partitis otis, ſub ſinem Mai, præditos. Foliola anguſta, ſparia, ſpithamum longa, Hyacinthi autumnalis maioris quadamtenus. Paruulus item bulbus, albidus. Alitur in ſicillibus à D. de Franqueville, ex Gallia delatus, & acceptus ab honeſtiſſ. matrona, vxore D. P. L' Aouſſi, tanto ſorum amore capta, ut ſibi merito Floz nonien vendicaret.

Irides Bulboſa è ſatione Verſicoloreſ varietates.

Florum itidem delitit, miro colorum incremento, bulboſæ Irides, ſatu non ſecus ac Tulipæ præcoces ſaiz, ſemineque oitæ, albæ potiſſimum variant, quæ inſigni metamorphoſi Dedatæ Naturæ opificio & luſu, experimento quotidiano, colorum varias ubeunt differentias; quas pleraſque ſigillatim excutere ſupernacaneum duximus; eanum tamen nonnullas, prolixitatis hoſtis, titulo tenuis recenſcere, huius ſtudij commodò, conſilium fuit: In bulbo alioquin folio, caule, cæterisque plantæ partibus, diſcriminis per exiguum.

Iris Bulboſa latea varia.

Tria reflexa folia lutea & nitida ſunt, ſed medio, ante & ſecundum carinæ longitudinem ad baſim vſq; rutilo colore diſtincta & virentibus veuulis ſecundum longiſudinem ad labrum vſque repandum ſtriata; Tria verò pinnata folia intus forſitque glauca, Internà dilutiorè lutea carinà: ſurrecta autem reliqua tria carulo-pallida, venis inenſiore carula ſtriata; ſtamine intus luteo, albidâ tantillum medio carinato ſtria. Caulis ſeſquicubitalis.

Iris bulboſa intenſe lutea tota.

Tribus inferioribus, ternisque pinnatis folijs impenſè lingulaque luteis; ſurrectis autem alijs tribus bifurcis folijs albidis angulioribus. Caulis cubitalis.

Varietas.

Tribus erectis luridis pallidioribuſq; folijs; pinnatiſq; alijs tribus & ligula itidem luteis variat.

Iris

Iris bulbosa lutea tertia.

Altera clarior lutea tota, stylo, senisque folijs; tribus tamen erectis leuioribus cæruleis venis ornata & striata.

Iris bulbosa lutea quarta.

Hic tria labra, medio folio tenus, lutea sunt, quæ admodum rugosa & striata, purpura violacea perfusa ad basin vsque; cætera cærulea.

Iris bulbosa alba.

Sesquicubitali caule, sparsæ flore, angustioribus floris folijs, labrisque repandis, cuius pro-minulum dorsum luteum & nitidum est virentibus strijs per luteum discurrentibus in glaucas argenteasue lineas binas & retinas per oras albas definens. Bifidum in ligulas reflexas totum luridum ex glauco argenteum, finium; pinnatam ligulam luteam, medio candida linea insignens, styloq; albo inhzrentem occultens: erecta verò tria folia alba, angustiora, summisq; mutantia & reflexa. Has differentias alunt culuora D. Ioannis de Franqueville nostraque viscra.

Iris bulbosa violacea Pyrenaica.

Prouenit in *Santon* monte, Anglo-Britannicâ vocatâ minor; forte eadem.

Gladiolus Minimus.

Minor quam vulgaris *Narbonensis* Gladiolus; floribus concoloribus, minoribus, vno vertu digestis in pedali gracili caule; folijs item duplo minoribus. Radix *Silystrichij* aut Gladioli parui. Floret in hortis D. *Gust. Ceyr*, & D. de *Franqueville* Maio mense.

Gladiolus flore albo.

Floris omnino albi Gladioli radices & semen annò. 1601. à D. *I. Robino* botanico Regio accepimus. Sæta Londini in orto D. de *Franqueville* biennicum viguere, sed tandem perierit. Florem videre non contigit.

Lilij Chalcedonici miniati sive Hemerocallidis Varietates.

Admodum elegans hoc Lilij genus, ob floris decus, colorisque flammei nitorem, vtriusque *Cinnabaris* natui & sicutij, intensi aut diluti coloris, miniati, eintillatione splendidiorum, ab hortensis elegantiz cultoribus, indefessi laboris lenocinijs, nouisque artibus (vt pleraque alia) adeo auctum hoc Lilij genus, vt quam plurimos hortos Iulio & Augusto, Tulipæ speciebus, Lilio-Persico, Coronæ Imperialis varietatibus, Lilij, Liliaceti, huiusmodique versicolorum spectabilium florum quam plurimis hortorum ornamentis petislonariis, præliis tapetis similibus, effatis aut marcidis, desolatisq; floribusque destitutis, amantate decoret. Eius duas varietates aut plures obseruare licebit.

Pæcox, quinos, senos, denosque vt plurimum profert flores; & nonnunquam eius radix adeo excreuit & luxuriat, vt caulem edat duorum communæ digitorum latitudinis qui n illa anticiq; sæpe triginta & plures flores protulerunt, non secus ac Anno 1600. reparatæ salutis duo Lilia candida inter plura eius speciei, quæ Constantinopolitani sive Byzantini Mariagonis nomine insignita, Hacknei Londinensis ruris in orto medico illustris, Baronis Eduardi Zouche, quæ in palmaris latitudinis, humanæq; proceritatis caule singulatum pedali longitudine, summa circumquaque latiore caulis parte, cumulatè ducentos & plures aspectu & admiratione dignos candidissimos suauissimosque flores laxarunt; quod nunquam conspexi in nostratibus Lilij candidis. Anno subsequente, ad naturam suam rediere.

Lilium

Lilium Chalcedonicum serotinum, eiusq; varietas.

Serotinum quandoq; diu multisque annis vnicum florem edit; at temporis consequentia, plures, sed serius, superioris Martagonis floribus elapsis, erumpunt flores; quemadmodum sinici nosque iamdiu obseruauimus. Caulis cubitalis, cætera non dissimilia.

Lilium Persicum Botanicorum.

Lilium Susitanum Clusii, quod è Susi Constantinopolim allatum.

Italiæ, Pennachio Persiano.

IN Belgio & Germania rarè admodum fuit; solum Machliniæ apud D. Ioannem Brancion, deinde Liex Brabantorum apud D. Ioannem Vander Delf in figulinis vasis videndi copiam fecere horti exoticarum & indigenarum plantarum distissimi & ananissimi. Caulem binum & quandoque tertium cubitorum fuscè solia cæruleo-viridita aut prassinæ, Lilaceis minora & delicatiora ambiunt; floribus sex loliolis obsoletæ purpuræ conflatis, numero sis, vixen sis, tuncen sis, plus minus, nutantibus, nolas siue tintinabula effigiantibus. Radice bulbosa, minus odora, crassa tæteri, oblonga, crassiss adeo squamis compacta, vt squamæ sæpe vix percipiantur: sessili parte fibris porrectis obscurè flauentibus. Angliæ hodie alienigenarum opera, vt pleraque alia rara inquilinum: vbi longè ætalius quam in Belgio, aura gaudens mitiore, melius conseruatur & propagatur.

Lilium, siue Corona Imperialis Herbariorum.

Lilium Persicum Clusii, siue Tufai.

Nec multum à Lilijs familia abest hoc Lilijs genus, quod iisdem Belgicis hortis D. Brancionis D. Dilij, & illustris heroinæ Mariæ de Brimeur, de re herbaria benemeritis, iam multis annis, opera Clusij, proveniebant, Sesquipedem & duos cubitos alto caule: solijs longioribus Lilijs montani. Flores ex phæniceo rubentes, nutantes Lilijs siue Susiani ritu nolas effigiantes scnis solijs conflatis, equorum vnguibus internè sex crystallinz pellucidæ vniones extuberant, quemadmodum expimitur in floris patuli icone, Visci grano ferè pares, dulcem aquam Lacrymantes, quibus succedit compressum, rufum semen, Tulipæ manus in membranceis maiusculis anphioribus angulosis pinnatisque capitibus. Radix Cepacea concretionem, tetri & virosi Colchici aut Hirci, vt tota planta odoris. In Belgium missa, Tufai, Tursani, Lale & Coronæ Imperialis nonnisi,

Coronæ Imperialis varietates.

Peramprè iidè, perquæ speciosæ Belgio & Anglo-Britanniz iam nostra ætate inquilinz, oblectationi oculis magis, hortorumque ornavento, quàm naribus, tætrum namq; Hircinum halant odorem Imperiales Coronæ, quarum varietates in caule flore & folio perspicuæ.

Corona præcocior.

Præcocior quæ statim Martiore filgore necdum lapsa floret: folio lato est, diluione vtidi, & flore non dissimili, sed pallidiore, à frigore fortè.

Corona mediæ.

Quæ mediæ, est elacior, folio item pallidiore sed angustiore; & flore item diluione.

Corona Platicaulis, siue laticaulis.

Platicaulis, vt Lilium album & Matragon siue Hei emocallis Byzantinæ interdum euentu fortuito fit Imperialis Corona, numero so lotum incremento: solijs angustioribus, & Minij

nij coloris saturioribus floribus aspectu iucundis, quales florere Londini in horto D. *Joannis de Franqueville* Anno. 1600. & Hacknei in horto Nobiliss. *Batonis Eduardi Zouche*, 1603.

Corona serotina.

Serotina latioribus folijs atrouirentibus : flore autem ex saturoraphnico colore.

Corona Polyphyllis sine foliosa.

Multis numerosisque latioribus folijs constat, stipatim bicubitalem caulem ab imò amicientibus, florum elegantissimorum saturorum duplici serie coronaue, nonnullisque floribus, caulis comosum fastigium internascens, aspectu iucundissimo. Hæc etiam altitur & in honore habetur in cultissimo & exoticarum plantarum dilectissimo horto D. *Joan. de Franqueville*.

Corona polyphyllis & polyanthes altera.

Similimam aut eandem cum superiore alebant Antuerpiz Doct. *Joannes à Hoboke* quondam S.P. Antuerpiani Grammareus & D. *Jacobus Duym* generosus Louaniensis harum studiosissimi peritissimiq; : sed flos dilutior, etædiôr, minusq; propendens ob florum densamglomerationem aut acerrum caulem ambientem.

Anemones omne genus.

Qum Anemones omnes species ca teris diligentius, minutatim, totumq; ad longum, vt vulgò fertur, ordine pulchro descripserit, D. *Clusius*, visum fuit summa tantum perstringere, ne huius operis moles & verborum copia lectori inuisa, molesta sit, maioris & carioris præcij, relegando lectorem ad Clusij historiam, tanquam ad fontem, ne accuratissimi eius labores irriti forent.

*Anemone syl.
prima Clusij.*

Illius igitur *Anemone sylvestris* prima (agria enim satius aut eultris ptiora) eadem est quæ Matthioli tertia, nobis etiam breuiter descripta & icone exhibita, minus tamen etiam bene à pictore expressa ; melius apud Clusium cum radicis propagine ; etfi flos caducus, fugaxq; aut desflorescens nimis expansus videatur. Belgicis hortis importuno prouentu vbi semel fata luxuriat, eoq; notissima.

Anemone syl. 2. Clusij. Pulsatilla alba Belgarum.

Hanc Pulsatillam albam cum C. V. D. I. Brancione & D. I. Dilsio, D. I. Boissot primarijs & senioribus Belgij Botaniciis diximus, maioribus aliquantum latioribusque folijs, commendatiorisque elegantiz floris albi & amari. Pictor villosum caput radicis omisit Mei aut Pulsatillæ radicis simile a Clusio descriptum & obseruatum, multa proferens folia duriora in teris foliorum alas diuisa, supernè viridia, pronâ parte candidiora & villosa ; ingrati & acris admodum saporis. Caulis palmaris, hirsutus, ternis folijs versus summum, minutim lacinjatis cinctus : flores senis foliolis constant, internè lacteis, externè quandoque tantillum purpurascens, & villosis, Pulsatillæ minoribus, sed non paucioribus staminibus lucis præditiq; tandem in semen plumosum, vt Pulsatillæ species, abeunt. Radix nigra, minimum digitem crassa, parum fibratâ, cortice nigro tecta. Clusius ait prouenire in celsioribus Styrix iugis, inter scopulos, & difficulter eicurari ; vel mitiorem aerem ferre posse, vt pleixque aliz elegantes plantæ in summis illarum Alpium iugis natæ, quas cum suo cespice in hortos translatos conseruare non potuit, vt *Lunaria racemosa*, *Ophyoglossum* & similes variz plantæ. Lierz *Brabantorum* & *Machliniz* apud D. Brancionem, semine enatas solùm obseruari.

Anemones hortensis species & varietates.

Solo, satione, & transplantatione, florum & foliorum coloribus & dissimilitudinibus, non secus ac Tuliparum, Iridum, Vriinarum Auricularum, & nonnullarum plantarum Anemonum familiam variare certum, quarum peculiaries minutias & quisquilas prosequi, vt paulò ante diximus, prolixum foret ; eoq; elencho aut breui tabula comprehendere ea quæ D. Clusio, & nobis apparere, sat erit : ex vna enim specie, altera dignosci sæpe poterit : adeo autem similia tuberosa radix, fusca, folia lata Geranij aut Saniculæ vulgaris modo diuisa : cauliculi & pediculi ternis folijs altioribus diuisuris septi, sunt. A. D. Clusio siquidem, dilucidè, acuratius, diligentius & plus satis proxè descripse, ad quem sedulum lectorem relegamus, cuius ordinis seriem sequi elencho consentiatæcum fuit.

Latioribus

Latoribus folijs, simplicibusque floribus, hortensium Anemonum Elenchus.

- P**rima Clusij simplici flore luteo externe, aureo interne.
 2. Duplici sitis flore, sine foliorum stiris gemina serie & fin.
 3. & 4. Simplicis stellato flore, Purpurea rubedine nitida, & Purpurea albicante.
 5. Fl. simpl. ex rubro diluto carneo, unguibus albidis.
 6. Fl. simpl. Byzantina, purpurei ferè coloris, non carnei. ad 3. accedens.
 7. Quinta similis floribus externe ex purpureo saturè rubinibus, interne verò, ad unguis usque saturè purpurei à rubedine mixta veluti coccinea nitenti; coccinei item oris, radijs purpurascensibus aspersis: unguibus albis magnisque.
 8. Flore saturè purpureo, externe splendente, interne minime: unguibus magnis, albis, infima parte purpureis: Appendicis Spina stirum odoris.
 9. Flore externe sub purpureo; interne ex purpureo violaceo, unguibus rubescentibus, orbe albicante cinctis, Appendicis Spina odorè flore rem ferentibus.
 10. Flore violaceo, albis maculis insignito.
 11. Flore violaceo satiore, unguibus maioribus, candidioribusq.
 12. Flore externo dilutè purpurascente: interne violaceo, unguibus magnis argenteisq.; exigui nullius odoris.
 13. Flore duodenarium foliorum, quam superiorum ampliore, foris ex purpureo albedo & splendente: interne ex violaceo purpureo fulgente, unguibus albis, sed minoribus.
 14. Flore purpureo dilutiore multo, veluti carneo.
 15. Flore externe carneo, unguibus saturè purpurascensibus; interne verò carneo valde diluto. Variat caule, folio, sine magis diluto, & omnibus partibus minoribus.
 16. Facie latifolia stiris plenis; flore simplici, nitido coccinea amano, eiusq. vinctis longitudo folijs, quandoq. brevioribus aut longioribus, ut Panonis Anemones vocata: unguibus palliescente orbe cinctis.
 17. Coccineo amano simplici flore, interne splendente, nullis conspicuis unguibus: externe dilutiore, & ut superior 16. lanuginoso.
 Anemones latifolia unguibus orbata simplici flore, sine 17. Clusij tres differentias observari in hortu D. de Franqueville. Anemone 2. coccinea unguibus vincta.
 Flore omnino rubre foris & intus, octo foliis conflato, pulcherrimo: umbra nigro, subsuscis cirris, subcinereisq. apiculis donato: foliorum & radicum atq. formà adeo similes, ut vix dignosceri una ab altera, nisi stiris varietate, possit.
 3. Floris omnino similis, sine unguibus, angustioris tamen minarissq. & stellatis,
 4. Flore omnino acuto differt.
 Varias item solo stiris colore suaverbente.
 18. Flore simplici ex coccineo Phoeniceo, Papaveri Rhæad. concolori.
 Flore coccineo, paulo, octo item folijs constante, unguibus ex luteo virentibus, ut antibusq. strigis, donatis, in hortu Franqueville variat.

Angustioribus folijs, simplicibus floribus, hortensium Anemonum elenchus.

- P**rima flore simplici caruleo, aut albo aut utroq. id est, externe subcaruleo, interne albo, mixte.
 2. Flore simplici purpureo subviolaceo, externe l. unguinosa.
 Variat in nostris hortis flore ex purpureo dilutè rubente.
 3. Flore simplici coccineo amano & splendido, unguibus suis magnis, ex pallido, fusco & albo mixtis.
 4. Flore simplici, interne coccineo amano; unguibus albis, externo coccinis, tenui lanugine pubescentibus & splendens.
 5. Flore simplici, magno, interne coccineo suavissimo, externe lanuginoso Anemone violacæ pene pari: unguibus albis.
 6. Flore simplici sanguineo elegantissimo, omnium eius generis maximo, magnis unguibus albis prædito.
 7. Flore simp. alij minore, coccinei nonnihil ad sanguineum colorem vergentis, & splendentis, unguibus magnis, albidis donato, & purpureis vinctis strigis.

8. Flore

Multifaria
hortensis
Anemone
latifolia.

Varietates.

Floris colore ex coccineo sub phœniceo minime splendēdo variat.

8. Fl. simp. superiore maiore, æternē lanugine quadam ebdūto, sanguinei saturioris splendidiq; coloris; internā vero parte sanguinei coccineo permixti; vnguib; eiusdem fere coloris, sed aliquantulum splendētis, quaque pediculo adhaerent quodammodo pallentis.
9. Fls quatuordecim & pluribus constat folijs similibus fere tenuifolia Anemonidis pleno flore, interioribus floris parvis, dilutiorē admodū purpureo colore & quasi carneo, vnguib; viduis.
10. Flore simp. amplo, Violaceo pari, ex albedo virefcente initio, deinde nonnihil carni coloris, & circa vngues externē virefcentis, internē vero albo.
11. Flore magno, superiore breuiore, externē carnet coloris, internē verō prorsus fere albi, vnguib; & venis ex albo paulatim virefcentibus.
12. Flo. simpl. magno candido, vnguib; externē virefcentibus.
13. Flore prorsus mino, vnguib; carneo colore permixtis, multifido tenni Bulbo-castani folio.

Variat pleno sanguineo flore.

Simplici item coccineo splendēte flore habet hortus Nobiliss. Baronis Eduardi Louche, folijs vix discernendis à Bulbocastani tenuissimis folijs. Totā planta pulchella & exilis. flore amplo, pro planta magnitudine, vnguib; albis donato: medio intus capite nigricante villosis rubris coccineis staminibus, apiculis donatis subsuscis, stipato.

14. Folius item Bulbocastani, flore carni coloris, albicantibus oris, interne verō albedo, venis carni coloris ab imo vngue ad medium usque folium sparsis.
15. Flore simplici candidiore, non valde decima tertia tenuifolia Anemonidis dissimili. Radice diuersa longē, à prioris radicē nullis spargens in latera exfractis sed coacta & inberosa.
16. Simpl. fls. sanguineo saturato & eleganti, vnguib; magis saturis, albicantibus tamen venis distinctis.
17. Pedalibus caulibus; multifidis item folijs; flore multum amplo secunda Anemonis Tenuifoliae pari, ex atro sanguineo rubente, sericei panis villosi coccini amulo, & totā parte iuxta vngues splendēte.
18. Fl. simp. externē breui lanugine pubescente, dilutē rubescente; internē vero coccineo valde diluto; vnguib; albis & amplis.
19. Flo. simp. sex vncialibus folijs extimā parte orbiculatis confisato, ex sanguineo & coccineo amano dilute rubente; vnguib; albis, veluti argenteis, amplis.
20. Variat à superiore folijs & caulibus dilutioris viriditatis: fls item maior, simplex, sanguinei coloris, infellus Coccineo & sanguineo medio colore: albicantibus vnguib; minoribus quam in superiore.

De hisce differentiis plura in Plantarum Illustrationibus.

FINIS.

Londini, typis Purfootij, 1605. impensis authoris.





MATTHIÆ DE LOBEL

BALSAMI, OPOBALSAMI, CARPOBALSAMI, & XYLOBAL-

SAMI cum suo CORTICE EXPLANATIO-
NES & COLLECTANEA.

*Clariss. & amicissimo V. D. C. Clusio, Botanographo pernobili,
Beneuolisque lectoribus:*




Vanius complures Medicamentorum compositiones, cum Priscorum, tum Nuperorum Posteritati, beneuoli lectores, scriptis mandarunt; multas tamen degeneres, legitimæ Materiæ Medicæ Simpliciumque Medicamentorum longâ & crassâ ignorantia deperditas, & magno mortalium detrimento deprauatas, comperimus: Quapropter Medicos & Medicamentarios amice monuimus, ut diligenter in Componendorum Medicamentorum ratione & Simplicium cognitione se exercent; & huius senten-

tia * Dioscoridis recordentur: *Quæ autem (inquit) necessaria sit Medicamentorum ratio, nemo est ferme qui ignoret; quod ea & toti arti conuincta sit, vniuersisq; eius partibus efficax administret auxilium: Quare per Medicamentorum Compositiones atque misturas, & salta in morbis pericula extendi, & experimentum capessere potest, quam plurimum conferente singulorum Medicamentorum cognitione.* * In Prefat. 102.

Verum imprimis curam impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur & recondantur: certè pro horum ratione aut valent viribus, aut enanido, nulloque munere funguntur. Serena igitur cæli constitutione demetenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si vel squalores vel imbres infestsunt: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cliuosa & ventis exposita sint, & perfleta, frigidaque & aquis carentia, in his locis vires longè validiores: Contra, quæ in campestribus, riguri & opacis, &c. Proinde rationi consentaneum, Reipub. utilitate, fore duximus, dilucidas succinctasque Simplicium Medicamentorum explicationes STIRPIVM QVÆ ADVERSARIA & eorum alteram partem, ad solidam Materiæ Medicæ cognitionem MEDICAMENTORVM COMPOSITIONIBVS annexere.

Perge tu quoque (Clusi amicissime) pensum laboris senilis peragere, feliciter Medicam Materiam pertrahendo, qui, si quis alius, istud ipsum vtilissimum & amoenissimum studium promouisti, deperditamque Mortalium dispendio, Sapientissimi Salomonis vniuersam Plantarum Historiam, suo nitore cum plenisque alijs doctissimis V. restituere connixus es. Quod si plures huius artis peritiores & politiores nobis præfidio essent, & unusquisque Simplicia Regionum suarum annotaret, longè plura assequeretur posteritas. Vterque sanè Bauhinus fratres delectissimi Botanographi & D. Medici Clarissimi, bonam operam collocarunt & benemeriti sunt. Si autem acerbior cum

Rondelletio præceptore in carpendo huius nostri seculi absurdissimas fallacias, ineptias & portenta fuerim; ignosce mihi & boni consule, cum integro viro permolestum sit hæc perpeti: non possum, enim non, cum Hippocratis Priscorumque, tum huius nostri seculi calamitates pijs lachrymis deplorare cum videmus in nostris Septentrionalibus & gentis sociæ regionibus hodie nobilissimam Diuinamque artem Medicam, cum omnibus partibus suis; iniquis, impijs delictis & Arcadicæ alinina perfrictæ frontis ignorantia, maximâ mortalium & funestissimâ clade pessundatam & deperditam, quantemque Medicaltrorum, sceleratorumque empyricorum famelicam & histricam hodiernam turbam. Prædixit autem ante obitum bonus ille Rondelletius cum primum ciuile bellum diris deformitatis exemplis, per Gallias grassaretur, omnia ad improbam summamque barbariem peruentura, cum Academicarum, Artium, sincero- rumque hominum, perhumanorum, officiosorumque studiosorum vastitate.




In libellum Matthiæ L'Obelij de Balsamo,

Cinnamomo, Cassia.

Euge! Palestina rursum de stirpe triumphat
L'Obelius Medica lux noua familia.
 Ensisbus creptum fruticem in Capitolia Victor
 Transiulerat quondam Dux Titus, Orbis Amor:
 Noster at Aurora spoliato Ductor ab Orbe,
 Quo tulerat rapidi seruida vis animi,
 Balsama, Cinnameos, regalia munera, furculos,
 Atque alia antiquâ nocte sepulta refert.
 Pugnatum pro stirpe fuit: de stirpibus illis
 Confligunt Medici, victor at unus ouas.
 Inuide parce truci violare hac dente trophæa;
 Vulnora sanabit, qui fluct inde, cruor.

Rapha. Thorius Doct. Medicus.



Hexastichon

In laudem & honorem Cl. & celeberrimi viri D. D.

MATTHIÆ de L'OBEL.

Balsama quæ quondam solus videt accola Nili,
 Vnde Britanne tuo sunt patefacta solo?
 An Natura vices mutauit, & inde recedens
 Contulit ad sedes dona benigna tuas?
 Erras. Lobelia debetur gloria, qui quod
 Externum fueras, nunc facis indigenum.

Hen: Ellenberger, Chatus. F.

Tricarum Balsamum Judaicum, Aegyptium; Officinarumque Carpo-Balsamum & Xylo-Balsamum.

*Molle arboris frondes nullis incisionibus dissi: Fren-
da item peritissae, et faciemus h-lla & ramos cini
magnitudine, nec non Flosculorum delictatione.*

Balsamum Græcis & Latinis vocatum, arbusculam odoratissimam, vni terrarum Iudææ (in valle Hiericonis & Aegypti Memphi civitate, quam Cayrum vocant) oriundam Theophrastus, Dioscorides, Plinius, & nonnulli antiqui affirmant: Hodie tamen liquidò constat, neque Iudæâ neque Aegyptum esse Balsami arbusculæ spontaneum, nativumq; solum, siue Iudææ & Aegypti indigenam, sed inquilinam factam, cuius quippe olim multæ plantæ à Mecha, Arabiæ foelicis oppido in Aegyptiù translatæ. Quamvis multi hodiè Græcorum Balsamù nuppiam in naturæ ditione extare suspicari sint; quod mutile & variè literis à Græcis prodatur, Dioscoridem monuimus in nostris stirpem aduersi vires melius quàm stirpem notam habuisse; eoque ab Aegyptijs potiùs & Arabibus, quàm à Græcis Balsami arboris cognitionem petendam, quibus auditione, non inspectione agnitam fuisse verisimile est, ut ex varia à varijs scriptoribus historia colligere quisque potest; de qua hic aliquid differere operæ-premium duximus; quia eius partes *Opobalsamum, Carpobalsamum & Xylobalsamum* cum suo *Corrice* in nobilissima antidota recipiuntur, quæ tam pretiosa olim & rara fuere, ut pondus duplo rependeretur argento, Theophrasto, Dioscoride & Plinio testibus. Non inter eos qui de materia Medica & Cosmographia scripserunt satis convenit de Balsamo, alij arbori medicæ, alij Viti, alij Myrto, alij Terebintho, alij Piceæ humilij, alij Lycio, alij Cytho, alij Leucio, alij Punice malo assimularunt: quid certi statuere possemus in tanta rerum ambigua diuersitate arduum est: non verebimur tamen quæ ex melioribus classicis authoribus, præceptore Rondellio in Monspelienis schola alijsque peritissimis nostris æui viris olim collegimus, in medium adferre.

Balsamum omnes in Iudæa provenire ñno ore affirmant. Plinius vni terrarum Iudææ Balsamum concessum prodit, qui eius descriptionem ex Theophrasto & Dioscoride quadantenus mutatus videtur: *Quondam* (inquit) *in duobus tantum hortu, utroq; regio; altero in ærernum viginti, non amplius; altero pauciorum.* Strabo id asserit dum ait, Hiericus est campus à montana quadam regione circumdatus, qui in theatri speciem ad ipsum declinat. Hoc in loco est Palmetum Palmis abundans, spatia centum stadiorum, & totum irriguum & habitationibus plenum, ubi & regia est, & Balsami viridarium. Arbor est odorata siue aromatica & fruticosa, Cytho & Terebintho præsimilis. Eius corticem fendentes aut vulnerantes, succum in vasis suscipiunt, penacis lacti per similem; susceptus autem in conchijs coagulatur. Is capitis dolores & suffusiones oculorum incipientes & hebetudinem mirifice soluit; quare pretiosus li-



*Molle intercol
Flosculi.*

*Molle novella
trimestre plena
aut quadrime-
stris, folijs ser-
vata efficit.*

quor est, &c. Alibi etiam nasci tradit Balsamum, cum scribit: *Et apud Sabaei, Thui, & Myrrha, & Cinnamonum nascitur: ut ora etiam Balsamum, & quaedam alia planta odorata.*

Ex Dioscoridis lectione, an Balsamum arbor sit, aut frutex ambigitur. *Balsamum* (inquit) *arbor est magnitudinis Leucei sive violae albae, vel Licij, vel Pyracanthae.* Non videtur legendum *Auazae*, nam quis herbam vix cubitum vel plurimum superantem Lycio conferret? Lyeium spinosus frutex est, tricubitalibus ramis aut longioribus; igitur non comparandum Balsamum cum Leucoio: ad haec Theophrastus Malo Punicae æqualem facit; (alius Piccae humilis.) Plinius proceritas intra binos cubitos subsistit; proinde hæc particula Leucoij expungenda videbitur, vel pro *Auazae* *arboris* legendum; nam Cytiso comparat Strabo, cum dicit: *Ibi est regia & Balsami viridarum: arbor est aromatica & fruticosa Cytiso & Terebinthae similis; cuius corticem sistentes succum suscipiunt in vasis.* Quod si quærat aliquis, quomodo Cytiso & Terebintho æquale esse poterit? Respondemus, Balsamum magnitudine æquale Cytiso; fructum Terebintho, vel si maius Terebintho similem; non magnæ sed parvæ æquari poterit: multæ enim sunt Terebinthi species. Locus integer erit, si quis legat Cytiso, aut Lycio, aut Pyracanthæ, non Pyracanthæ, cuius nulla mentio apud antiquos. In Auicenna *Visci* legitur pro *Auan*, ut forsitan apud Plinium pro *Vitis* legendum *Lycij*, ubi ait, *Quippe viti similis quam Myrris*, quod merito legendum videtur, quia Lycio similior quam Viti: quanquam possit sic interpretari, si dicamus Balsamum cultu præferre Vincæ: Balsameta enim siue Balsami arboris hylæ amputantur ut Vites, & earum more coluntur, ut Iustinus annotat Trogi Pompzii historia fretus, qui eas *Piceæ arbori* (quod mendum eodictis merito multi docti suspiciantur, quia Picea non est Viti similis, neque Vincæ modo colitur) comparauit: dicit autem,

* Alii legunt
muscum sed
perperam.

Quantum ut Vites rastro muscant; multas vites mutant quas tertio aut quinto anno amputant. Quanquam viti familiorem quam Myrto dicit Plinius, & ab alijs male descripiam monet; non tamen Viti folio similem facit, quia paulo post folio Rutæ esse asserit. Illud idem Theophrastus literis prodidit; *Filium* (inquit) *Rutæ simile: candidum tamen perpetuo virens: folia enim Rutæ similia sunt, præsertim extrema tria.* Pausanias folia habere *Sampsuchi* ait; id quod Balsamo minime reclamatur, quia folium Sampsuchi aut Amarici satis tenue & paruum est, instat Rutæ, sed candidius, quem ob candorem Sampsuchi folio comparauit. Ex supraddictis satis patet Balsamum Aegyptium folijs Rutacis esse, præsertim ternis extremis foliolis. Ex recenterioribus viri de dignis, reique herbariarum peritissimus, Mathioliomathæ Melchior Guilandinus piz memotiz, horri-Medici in schola Patavina præfector, Anno salutifero à partu B. Virginis 1563. & 1564. nobis illic commemorantibus, hæc sita bundis & suspensis in tanta opinioquin de Balsamo ambiguitate, assertionem ferupulose tamen soluit, Balsamum se vidisse inquit in Syria & Aegypto, *folijs & facie lasmii, sed aspectu deforme: quale iamdiu in nostriis Ruspium Aduersarijs præcise dedimus: quæ cum supra traditis, tum mox dicendis ex Petri Bellonij de Balsamo observationibus minime pugnant;* qui *Balsamum folijs viridibus Lentisciorum foliorum modo formatis, vtiq; in neruo natus esse ait, ut in Rosarum vel fraxum, vel Iuglandis folijs videre est: Ciceris tamen magni melleum foliorum non excedebant: extremum autem foliolum reliquis maius est, scilicet etenim ab illo progressu: reliqua scissimè montiore sunt, ut in Rutæ folijs; quæ degulata, facultati nonnulli adstrictioris esse comperimus; pinguisq; aliquantulum saporis atque aromatici: ramulorum autem cortex hic odoratior est. Germo cortice præditi sunt ramuli, extrema feris subnabente, qui ut membrana, intus viridem operit. Si gustus inter Thui & Terebinthi folium sapit, Satureiæ sive Iestri sapore simili, admodum grato, atque digno tritum Cardemomum olet: ipsius lignum candet, odorisq; & saporis experti est, non secus atque aliud inutile lignum. Ipsius virgæ rectæ sunt & graciles, varisq; foliorum alis sparsim & confuso ordine nascentibus obiectæ, quæ ternis, quinquæ aut septenis folijs constant. Apprimè etiã quadrat eum Bellonij animaduersionibus Balsami Aegyptij à Clatis. D. Prospero Alpino histona graphicè delineata, quam hic præcise oratione subdam, ne verborum acuerus & apparatus lectori tædiosis, maior sit quam res ipsa.*

Hæc sunt id est,
Lupulorum ac
Elyptii.
Hæc sunt & huius
Arabid. Cicer
interpretatur
Mathioli
Lentisciorum emula.
R. Ramuli odorati sunt,
gummosi, diguissq; conuicti
cui tenaciter adherentes. Flores
feri paruos albos Acacie
proximos; ternos singulos
alio appendis, quasi in
umbellæ formam; summe
odorati, à quibus semina
promanant flava, folliculis
nigris subabescentibus
contenta, valde odorata
amaraq; humorem
fluuum mellis persimilem
habentia: sapore
subamara parumq; acri,
linguam ferentia, Opobalsamumq;
redolentia; Terebinthi
frullum puzra & magnitudinis
amule, extrema aculeata, & medium
crassum

crassum obinemia. Horum quilibet trium neotericonum qui nostro ævo Iudæam, Syriam & Aegyptum peragrarunt liberè vno ore, tanquam oculati testes, Balsamum arbusculam esse folijs Rutæ, aut Lentisci, aut lasmini profitentur; quod minimè Theophrasto, Dioscoridi & Plinio repugnat, aut refragatur.

Quinetiam cum à fructibus arborem cognoscere contingat, Balsami fructum, Carpobalsamum vocatum, quale fit sedulò inuestigandum, cum eo frequenter vtamur, tum etiam sæpè adulteratum ad nos deuchatur, quod nullo pacto dignosci poterit, nisi legitimi exactissima cognitione habità; cuius fidelissimus testis est Theophrastus lib. 9. cap. 6. de historia plantarum; qui fructum Balsami Terebinthi fructui, tam colore & odore, quam magnitudine æquar. Nec fast est Carpobalsamum nosse, sed etiam operæ precium duximus examinandas & dilucidè diluendas siue declarandas omnes Balsami partes, vt legitimæ à spurjijs secerantur, & earundem facultates & energiz exactissimè comprobentur. Dioscorides Opobalsamum probat recens, odore firmo aut valido. *synce-*
rum, non ad acorem vergens, dulci facile, leni, astringens, ac modicè mordens gustu; læne vestis infusum, ^{is Opobalsami}
macula vestigium non relinquit; lactis immixtionem, ipsum coagulat; aqua aut lactis immixtum celerrimè li- ^{is diluatur.}
quatur, & lactis modo albescit. Frustulum verò medicosierit Opobalsamum spirantem, flammam, plenum, ^{is Carpobalsami}
grandem, ponderosum, gustu mordentem, & feruentem in ore. ^{is delitescit.}

Opobalsamici parandi rationem docet Dioscorides his verbis: *Æstivis sub ortu canis ferrioribus, arbor vnguibz ferreis inciditur, manatq; è ploga succus, quem Opobalsamum vocant.* Antiquius vulnerabat Balsami arbuscula ferreis instrumentis ad vnguium similitudinem paratis, Theophrasto & Dioscoride testibus: sed quia visum est plantam ferro lædi, iam Plinij temporibus cœperunt vti vitro, lapide, vel ossis cultellis ad corticis incisionem. Sed cur ferro lædatur inuestigandum, ne superstitionis à Plinio scriptum id videatur. In ferro later venenum aliquod, quod si edueatur de potentia ad actum; certè vires suas manifestat, & in eas res quas secando tangit, venenum immittit. Hoc evenit rebus quæ insignem acrimoniam, vel tenuitatem partium habent, quæ per abditissimas siue altiores gladij aut cultri partes permeat, vt in Scilla videmus, quam non cultro ferreo, sed arundinaceo vel ligneo diuidendam præcepit Nicolaus Propositus, quia corruptum vel veneniferum magis nocuæ siue nocentior euadit ferreo cultello secta: simile quid Xylobalsamo euenire potest. Panis & alia minus aëria in quibus Scilla coqui solet, huiusmodi incommoda è profundis educendo, inferre nequeunt. *Thus atque Myrrham etiam sub Canicula sy-* ^{is Theophrastus}
dus estuosisis diebus incidi referunt, sic & Balsamum quod in Syria nascitur. Quo tempore partes ^{is Radici et ari}
arborum magis trahunt, & minus aqueæ substantiæ continent; plus autem resinosa aut oleosa, ^{is Perma com-}
quæ facilius fluit è vulnere ob aëris ambientis trahentisq; robur. ^{is sistentia}
^{is tempus.}

Plinio lacryma in musto, id est, recenti ploratu, candida est; rubescit deinde simulq; durefcit è transudido. Loquitur de gutta Balsami recenter collecta, quæ mustum vt vinum nuper ex Vitis expressum, per quandam similitudinem dicitur, quo tempore succus Balsami candet, & vestes læneas non inficit.

Diose. Valido odoris siue firmi.] Illa dicuntur odore firmo, quorum odores perseverant, & diu in suo odore perdurant; nonnulla namque est odor rem fundant; non tamen durant, flaccescuntq; eorum odores, & citò euanescent.

Diose. Dilui facili.] Græcis in exemplaribus varia est hæc lectio. Alij *iudicant*; cum Ruellio & Marcello legunt, qui citissimè penetrat, facile diluitur quæ lectio rei ipsæ minimè quadrare videtur; cum Balsami succus vt oleum pinguis, & tenaci lacti, Strabone auctore, similis sit. Oleum pingue difficile diluitur ob lentorem viscidum, neque facile miscetur, quia dilui non potest. Alij autem vi rei meliusculè conueniat *iudicant*, quod facile scissilis, penetrabilis, pellucidus, & facile diuiditur, vertunt. Vetus interpres serenum interpretatur, qui *iudicant* legisse videtur, Serapionem sequutus, quem *iudicant*, id est, facile solubilem legisse autumant, nam ipse interpretatur velocis resolutionis. Marcelli verò versio recipienda videtur, quia maximè cum Balsamo partium tenuitate conuenit: Quod etiam à Plinio tenue dictum est; multoq; magis etiam ab ipso Galeno, lib. 7. Simplicium, qui Dioscoridem tacitè reprehendit, cum dicit, *Balsamum descicare & calcificare secundo excessu: est autem tenuium partium adeo vt oderatum sit; sed liquor eius subtiliorum etiam partium est quoniam planta non tamen adeo calidus, quam quidam existimant, tenuitate partium, falsi.*

Diose. Lene est.] Leue dicitur ob partium æqualitatem, & similitudinem quadam, vt puri & sedemini levis & æqualis.

Diose. Astringens & modicè mordens gustu.] Aliqua vi astringentæ cum sua partium tenuitate & modica acrimonia præditum est, quæ modicè linguam mordet & vellicat. Plin. lib. 12. cap. 25.

Lachryma probatio, ut sit pinguis, tenuis, modicè ruffa, & in fricando odorata. Et paulò post eodem Plinio. Lenis esse debet, non subacida, odore tantum austerâ.

Sed varie videtur.] Adulteratur multifariè siue multis modis, vt vertit Marcellus: siquidem aliqui *unguentum miscent*. Hic *χρῆμα* unguentum vocat: quod de oleis odoribus leuiter inspicatis intelligendum; quale etiam est illud *Oleum sanctum* *Christina*, *Sacramentum* ab ipsis Romanis Catholicis Sacerdotibus vocatum & concinnatum, quo in hunc fere diem vtuntur in celebri extremaq; illa pedum vñctione hoc orbe in patriam caelestem inigrando properantium, vt monuimus in nostris Teutonicis Stirpium obseruationibus. Quare hic per *χρῆμα* intelligere est, quod vnguenti modo corpori illini potest.

Terebinthina
Cypria.

10 *Visitur ab aliquibus mixto Terebintini, Cyperi, Lemiscii, Balani vnguento, item Sufino, Metopio,*
11 *melle, aut Cyprina cera liquida.] Videatur legendum Cyprio aut Cyprino Terebenthino, quia Tere-*
12 *benthinum etiam in Cypro ptouenire ait Dioscorides & hodie adhuc Terebenthina Cypria omnium*
13 *præstantissima vbertim in vsus medicos Venetias deferunt. Ergo adulteratur Opobalsamū legiti-*
14 *mo Terebintachi Cyprij liquore, cuius in nostris stirpibus aduersarij meminimus; vel oleo ex fructu*
15 *Lentiscino expresso, cuiusmodi etiam hodie Montispeflussi & in Hispania ad fucum & alios vsus*
16 *varios paratur. Variè etiam adulterabatur apud Plinium; vt suo semine, oleo Rosæ, Cyperino, Len-*
17 *tiscino, Balanino, Terebenthino, Myrteæ, resina, galbano, Cera Cypria & maxime Gummi. Has viciat*
18 *Opobalsami notas varij variè legunt & interpretantur: alij autem sic habent; myrrum & ex Myr-*
19 *te Ligustrone Ceram liquidam subigunt: Cornarius Ceratum Myrteum, aut Cyprinum liquidum &*
20 *lene legit; Hermolaus verò Ceram Myrteam, aut Cyprinum liquidum bene iubetam. Sed cum*
21 *nulla sit Cera Myrteæ, aut Cyptia; cum Cornario & Marcello Ceratum Myrteum & Cyprinum*
22 *liquidum, & bene leuigatum vel subactum legendum videtur. Serapionis interpres sic vertit: si ad-*
23 *miscant Mel & Ceram, aut oleum Myrti, aut Alcanne donec subtilis et mollius, & æquæ forti-*
24 *ter miscentes, quousque non appareat Cera. Ad molem augendam Ceram & alia commiscebam;*
25 *Plinius Ceram Cypriam habet, & fortè quia cum pinguis sit, facili miscetur, & induit olei pinguis*
26 *sive Balsami speciem. Hunc liquorem quia in pretio est, etiam nostri xui mangones, odoratis libul-*
27 *latisq; densis, collectisq; oleis adulterare solent, vt pluris vendant. Quidam oleum ex Hyper-*
28 *ico inspissato gummi Eleagni & Seyrace vendunt, quod ex colore & odore deprehenditur. Alij*
29 *puriorum Sytracis liquide latorem, alij Craniam, alij Copam-Iuam Indotum & consemiles leuicè*
30 *obtrudunt & supponunt liquores, alij succum Myrtis hæ arte paratum pretio distrahunt pro ve-*
31 *ro Balsamo, cum eiusdem sit facultatis, partium tenuitate excepta: sed venditio hæ clementia*
32 *plus pecunie ab harum rerum imperitis emungit, quam res ipsa valet. Huiusmodi varia Pseudo-*
33 *Balsami genera sinceri antiquorum Opobalsami varias dotes & pollicitationes omni sui parte*
34 *(ne aliqua dicam interna) neuiquam explere videntur.*

Орбис/сфера
(исходный).

Myrrhæ succus siue Myrrha Stacte Opobalsami succedaneum est, vt alibi diximus.

Diſc. Quod maleficium facile deprehenditur; namque merus in lancem veſtem ſuſus, neque maculam facit, neque ſi eluatur notam relinquit. Non aduſterati Opoballami eſt, neque maculam facere, neque ſi eluatur notam relinquare, ſive veſtigium vllum, quod vitium facere ſolet, vt poſtea mox ſubſidit, *Vitiuſi in heret.* Cur non in hz reſtiſcat Picis aut refinæ modo, facit tenuitas partium: craſſities autem remanet, & maculam ſive veſtigium relinquit.

Dioſc. Si eluatur novum ſine veſtigium non reliquit. Quod de ſimplici ablutione intelligendum videtur, in qua Oleum & Refina & Lacryma veſtigium relinquunt, niſi bubulo felle, vel argilla ex aceto, vitello oui & butyro, vel Saponaria herba aut Struto antiquorum, quo delentur maculae omnes, additis, ſed non ſimplici ablutione aquae aut lixiui.

Diſc. Lac inſuſſum congelat, quod ad ſuſterat ſu non efficit. Alia ſucci probatio eſt, quod ſi lacti inſulletur & agitur, ipſum congelat & inſpiſſat vt Gallium, ſlos Chamelcontis Monſpeliaci vocati; fortè ob horridas ſpinas, & coagulum ipſum; hoc autem pteſtat calore proprio aut aliqua natura propria, qua caſei congregat ſubſtantiam & aqueam ſeparat.

Diagn. *Adulteratus non efficit.* Id efficere non potest, nisi quis adulterare velit illis rebus lac coagulantibus; ut succo Gallij aut lacte Ficulnez arboris. Lac Ficus perciperetur minus, quia lentescit etiam in aquam missum.

Diosc. *Quercetum syncerum* in aqua, aut lacte celerrime liquatur, coloreq[ue] lactisfit. Syncerum Opobalsamum ob tenuitatem partium facile permiscetur toti substantiæ lactis aut aquæ, quod adulterato aut Peruviano compacto negatum est, quæ immixta in aqua subsidunt.

Lactescere dicuntur, quæ lactis colorem referunt, ut lac Tithymali, Scammonij, Ficus, Mori, & confimilium.

Dieſe.

Dioſc. *Viſatus verò olei modo innat, ſe conuoluent, aut in ſtella modum diffundens.* Quod adulteratum oleo antiquo, innatat olei in modum; oleum ob æream leuem ſubſtantiam aquæ innatat. *Se conuoluent* ſiue vt alij volunt *in orbem contrahens* aut denſans: nihil aliud designare videtur, niſi quod gutta rotunda perſiſtat, hoc eſt non diluitur neque diſtrahitur vel miſceatur aut confunditur, vt ſyncerus qui citò liquatur laſceſcit; aut in ſtella modum diſfunditur. Marcello ſtella modo radiatur, ſplendeſcit; à verbo *σπῆλαιν*, quod tamen diſfundere, diſſipare, ſpargere, & reſolvere ſignificat.

Dioſc. *Syncerus tempore ſenſcens craſſeſcit deteriorq; redditur;* id eſt. Qui ſyncerus & purus eſt (vt Græcè ſonat) tempore craſſeſcit, abſumpſis quippe tenuibus partibus, areſcunt ſolida, & humida craſſeſcunt, vt mel & oleum; ſiue igne aut temporis curſu, longæue mora, ære ſemper & continuo in ea agente. Huiusmodi craſſum Opobalſamum, legitimè Terebinthinæ Cypriz veteris ſiue viæ aut refinaceorum liquorum inſtar denſatum ſeruamus in muſarum theſauris, glebæ Benzoini ferè concreione, ſapore acri & colore fuluo, maſticanti, vt Maſtiche, lenſeſcente. Sed quæritur cur Opobalſamum antiquitate deterius reddatur? in cauſa eſt, vires cum tenui ſubſtantia reſolui, còque minùs efficaci; quam ob cauſam recens præſertur antiquis: quare in hoc maximè vulgus hallucinatur, qui quò antiquius eſt, eò melius opinatur.

Dioſc. *Hallucinatur qui aqua concretum peſſum ire, & ad ima ſedere arbitrantur, poſtea diſſipationem ſuperuenerat.* Vulgi probationem improbat, qui optimum Opobalſamum ex eo iudicat, quod concretum deorſum tendat & in aqua ſubſidat: quod ſi baculo diſtrahatur aquis innatat, ruriſ imo perens. Sidit illud Peruvianum quod Hiſpani ad nos deferre ſolent, ſed ruriſ non innatat.

De Xylobalſamo & eius delectu.

E *Liſi genere, quod Xylobalſamum vocant, probatur recens ſarmento tenui, ſuluum, odoratum, quædantenus Opobalſamum ſpirans.*] Hic de ſummitatibus & ſurculis ſucculentis, vegetis & viribus efficaciſſimis, quas pro ſucco ſubſtituere ſolent Pharmacopæorum officinæ, tradit; non de caudicis ligno, quod manifeſtè nota illa ſarmenti tenuis explicatur.

Illud ligno comprobat Plinius, qui & ſarmenta (inquit) quaque in mercede ſunt D. C. C. C. amputato ipſa ſurculuſq; denis intra quinti à demum annum, Xylobalſamum vocatur & coquitur in virgulentis. Pro ſucco ipſum ſubſtituere officine, Tenuia ſarmenta ſunt, quia quanto quoque anno demetebatur coma, in qua, prima bonitas non nouiſſima, vt perperam in Plinio legitur.

Oleratum quædam eius Opobalſamum ſpirans. Non contentus Dioſcorides odoratum dixiſſe Xylobalſamum, ſed addit parum tantum ſpirare Opobalſamum debere, ob ſubſtantia craſſiorem.

De Carpobalſamo.

N *Ecceſſarius etiam ſemini erumpit vſus.*] Quia vſum Carpobalſami neceſſarium eſſe ait, eius Dioſcorides delectus faciendus, vel tale quale deſcribit Carpobalſamum eligendum, cuius vſus, ſucci ſiue Opobalſamum penuria, neceſſarius eſt, ſicuti titè in Theriaca, fruſtu, ligno & ſucco, ob efficaciam medicamenti acheruſ venena, vt oportuit: tanta eſt eius viſ vt odor ſolus Viperaſ enecet. Viperaſ illæ quæ in Balſametiſ aut Balſami ſyluiſ vitam degunt, innocuaſ ſunt. Nemini igitur mirum, ſi omneſ Balſami parteſ hodiè & antiquiſ in frequenti vſu fuerint; ſed mirandum & dolendum pletoque cæcipientes medicos & pharmacarioſ neſcire quid ſit, aut qualia eſſe debeant Balſamum eiufque parteſ Opobalſamum, Carpobalſamum, Xylobalſamum, cum ſuo cortice, Cinnamonum, Caſſia, Ammomum, & perquam multa alia, quibus indie vtiuntur & aburuntur; quos hæc doceri ſerò pudet, & ſedulo ad amuſſim diſcere oderunt, arduique laboriſ tæde; qui maledicium oſ potiùs comprimere deberent, quam hanc utiliſſimam & neceſſariam Medicinæ partem diſcendi cupidis æqui & veri amantiſſimiſ, diſſuadere, & tanquam inutilem proferre. Præſcribunt enim ſinguliſ momentis Hyeram Galeni; ſed nunquam quidem viderunt aut norunt ex quibus probè ſine an maliſ ſimplicibus medicamentiſ patari aut confici debet. Illi hæc commiſſa etiam cæco & aucto pharmacatio, quò vterque incidat in foueam, ſufficit. Simileſ ſunt eiſ, qui decalogum & fidei articuloſ ad diſcere nolunt, ſufficerèque aiunt, modò illorum bonus paſtor ſeruet ouile. Proh dolor! facinuſ indignum! quàm mera impoſtura, Carpobalſamum, Xylobalſamum, & conſimilia multa in quotidianiſ compoſitionibuſ Medicamentorum, nobiliſſimaq; illa Hyera picra, ſiue ſacca amara, omittere & negligere?

Sed de his satis, aliàs latius: redeamus vnde digressi sumus, quia notissimum huius procacis & inuidiosæ ætatis malos probis insensibilissimos hostes; ignauos & ignatos, sedulis & doctis insidians & xmulari, veritatēque odium parere.

Diosc. Quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderosum, Flauum colore laudatur dum recens est: fuluum euadit præ nimia maturitate.

Plenum præfertur, quia illud quod inane est, Terebinthi fructui immaturo assimilatur, & fortè idem vt multis doctis persuasum est, quo adulterabatur olim, & hodiè adhuc vitianus fallaci sophismate.

Ponderosum. Hæc nota necessariò præcedentia sequitur; quæcunque enim plena sunt, grauiora siue ponderosiora & meliora sunt, quis magis sancta medulla: semina vtrò inania, leuia sunt.

Diosc. Mordens gustu, feruens in ore. Masticatum linguam mordet & calfacit, quod non præstat Terebinthi semen, quia minus aere & inefficacius. Si feruens est Carpobalsamum, cur dicit cognosci aut coargui adulteratum Hyperico Petro, virium ignauia, sapore Piperis. Sapor Piperis virium ignauiam non refert; quare videtur non sufficere illos fructus esse feruido sapore vt Piperis, sed Opobalsamum odore imitari debere, vt sequitur.

Diosc. Modicè Opobalsamum olens. Hoc etiam de Xylobalsamo dictum est, quod parum Balsamum oleat; nunc quoque dicit semen moderatè, magis quàm lignum, non tamen insigniter Opobalsamum olens. Hic locus ex diametro pugnat cum Theophrasto, qui de fructu agens dicit: *is admodum odoratus est & magis quàm lacryma.* Possumus hæc pugnantia hoc modo conciliare, si dicamus aliud magis redolere & moderatè Balsamum spirare: fieri enim potest, vt semen odoratus sit lacryma ipsa, sed alio odore quàm succus, tamen aliqua ex parte Balsami odorem referre. Si loquamur de odore Opobalsani, dicemus semen moderatè succum odorari, quemadmodum Xylobalsamum, Ruellio interprete, *odoratum est, & quoad tenuis Opobalsamum spirat.*

Diosc. cap. de Vngue odorato Vnguis odoratus & Carpobalsamum, Dioscoride teste, suffiuntur, cum dicit, *ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquatenus Castoreum olens.* Huiusmodi quamplurima odore duplici donata sunt, quare Carpobalsamum ipsa lacryma odoratus est. Verùm lacryma mediocriter ispirat odorem; alterius suauioris, potioris siue melioris ratione odoris.

Si quis aliam meliorem conciliatur rationem exhibeat, illi lubens cedam.

Diosc. Adulteratur semine Hyperici similis quod è Petra oppido defertur. Minimè semine Hyperici similis, quod à Petra defertur, aut Petro Hyperico, vt Plinius ait, lege ndum videtur: nam quis non videt Hyperici semen, et si resinofum sit, & resinam oleat, toto cælo à Carpobalsamo differre, cuius dissimilitudo magna cum Hyperici pericarpio aut semine est? Igitur pro Carpobalsamo Hyperici semen rejiciendum, tanquam inane, nulla medulla præditum; continet enim in se semina minutissima; Balsami fructus maior est, & Terebinthi semini similis tam magnitudine quàm colore (vt Theophrastus annotauit): sunt enim colore fuluo ante maturitatem, nam matura cærulea, ob id qui Carpobalsamum Terebinthi semine admixto vitiant, quæstionem & rem faciunt, Terebinthi semen pro Carpobalsamo distrahentes. Locus Plinij integer erit; si dicamus, *Petro Terebintho adulterari.* Vtriusque dissimilitudo hæsitandi suspensionem auget, eo quod Terebinthi potius, quàm Hyperici censeri esse legendum; nam quæ supponuntur oportet speciem & formam vel similem vim earum rerum habere pro quibus substituuntur: ob similitudinis vicinitatem aut proximitatem parum exercitatos sæpe fallunt huiusmodi infinita. Oportebat enim olim & nunc quadam re magis persimili Carpobalsamum adulterari, ac similiore quàm Terebinthi semine non posset, quod vt diximus, tam magnitudine quàm colore simile est medulla præditum est, dum maturuit præscriptum, vt Carpobalsamum: resinam oleat, & iucundissimo fragrat odore. Opinionem etiam maximè fomet Petri Terebinthi, cum Dioscorides capite de Terebintho, de eius resina differens ex Arabia Petrea deserti assueuerit: Prouenit etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Africa & Cycladibus insulis. Hinc omnibus apparet Carpobalsamum Terebinthi fructu adulterari posse, quemadmodum euenit hodiè, sed in hoc solum differunt, quod Terebinthi fructus immaturus inanis sit, minusque rotundus, & vtraq; parte magis acutus, Carpobalsamum verò medulla fæctum, & quatuor angulis siue lineis præditum.

Diosc. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, virium ignauia, sapore Piperis. Hæc pars pugnat cum sequenti videtur: Quod si sit sapore Piperis, non potest ignaue viribus esse, sed efficax; quare fortè legendum *à roeque*, id est, sine odore, vt Plinius legis videtur dicit enim *odoris ignauia, & sapore Piperis*: cum ait esse sapore Piperis; adulterato semini conuenire nequit: Nam huc sapor potius

potius Carobalsami esse videtur, quia superius dixit, mordens guttu, feruens in ore,

Efficacissima vis inest succo & quam maximè calfaciens. Dioscorides primum & ante omnia suum Balsamum commendat, quòd efficacissimam agendi facultatem habeat, ob innatam partium tenuitatem, ipso fructu aut ligno multò potiore in aut efficacior. Subdit, *quam maximè calfaciens*; quasi velit illius summa efficaciz rationem reddere, & calidissimum tribuere feruorem.

Dicit quispiam cauillatote Balsamum calidum & siccum esse excessu secundo Galeno; quomodo igitur guttu feruens & mordens erit? Dioscorides credidit Balsamum præsentissimas & primarias ad calfaciendum habere facultates, deceptus partium tenuitate, vt euidenter Galenus his verbis testatur.

Balsamum ex calfacit & desiccatur secundo excessu: est autem tenuium partium adeò vt odoratum sit: sed liquor eius etiam subtiliorum partium est quam ipsa plantæ: non tamen adeò calidus vt quidem existimant, tenuitate partium falsi. Porro fructus eius per similes genere facultatis est, ceterum longè in subtilitate partium inferior.

Igitur ex Galeni sententia Balsamum quàm maximè non calfacit; sed manifestè tantum calfacit, non vehementer, idque in secundo gradu, nam quæ ordine primo calida dicuntur, obscurè calfaciunt, id est, non manifestè: quæ autem vehementer sine aduisione calfaciunt, tertij ordinis proferuntur; & quæ adurunt, quarti ordinis denuntiantur. Sed si effectuum gradus metiamur, id quod calfacit vel refrigerat in secundo; refrigerabit vel calfaciet tantum in primo, ob vires hebetescentes, labelas & in transitu refractas. In Tabaci siue Nicotianæ descriptione diximus calfacientia vel refrigerantia cum partium tenuitate, citius & potentius agere siue suas exercere vires, vt Acetum & Alumen scissile efficacius, & citissimè constringere, ob summam partium tenuitatem.

Calida primo gradu, secundo, Tertio, & Quarta.

Sic Caphura nonnullis interseritur medicamentis, vt integra medicamenti vis in abditissima sua tenuitate citius permeet & perueniat, quæ alioqui à natura longa mora immutaretur & alteraretur. Idem de Opobalsamo & Iride sentiendū. Dioscorides omnes Irides calfacere ait, quod Aegineta sine aliqua gradus limitatione, docet; statim siue abundè, inquit calfacere, extergere & maturare tenui substantia. Intellexisse videtur ad secundum gradum, vt coniectura fert, quia sarcoticis annumeratur; quæ eiusmodi esse debent, & vltra secundum gradum calfaciendo & siccando minime excedere; ne materiam generandæ carnis aptam & necessariam absumerent, nisi superflua caro adit: vt alibi proprio capite diximus. Alij ad secundum compleunt, vel initium tertij excessus, minime quartum, vt D. Dodonæus credidit; quemadmodum de Rorida Solis herba vocata. Iridem sarcoticam cum Plinio dicit Auicenna; fistulas ac sinus carne replere, nudatæque carne ossa operire Dioscorides testatur. Fuchsius calfacit secundo excessu, & desiccatur tertio. Quare Opobalsamum & similia medicamenta, quod celerius ad partem affectam transitum præbent, eò magis viribus suis asseruatis, & serè integris, ad partem affectam perueniunt & quare efficacius vires suas exerunt, efficiendo id quod præstare debent, vt cire vrinas & sudores, mouere menses, calfacere, refrigerare, humectare, siccare, constringere, & alia quæcunque facere nata sunt.

Diose. Abstergit quæ tenebras oculorum pupillis offundant. Præter illam calfaciendi vim quæ pollet, quæ pupillas oculorum obumbrant, abstergit: quod amarore quodam & partium tenuitate, quæ internam corneæ partem penetrat, præstat: non secus ac fel omne. Verum quia vlcera detergere siue expurgare docet Diose. dicemus cum Plinio in succo amarorem quandam inesse, quo exergit, Plinius oculorum claritati plurimum conferre ait, & caliginem discutere. Si pupilla quam *oculus* vocant, quæ diaphana esse debet quia acies est quæ cernitur, crasso aut terro vapore obruitur aut afficitur, speciem rei visæ ingredi non sinit, vel spiritus visoris penetrationem ad ipsius pupillæ illuminationem impedit. Tale symptoma ab aliquibus *enatoma*, siue tenebrosa oculorum obscuritas vocatur.

Diose. Medetur perfrictionibus vulua. Quia calidum est, tenuium partium & odoratum, quo gaudet verus perfrictionibus medetur. Cum Cerato Rosaceo appositum: intra vuluam intelligendū, pessarij modo ex hapso cæpinato positus: sed dicit cum Cerato Rosaceo: quod rationi alienum videtur, quia Rosaceum cerarum tenuitati partium ex opposito repugnat: Dioscorides tamen Rosaceum ceratum cum Schenantho paratur. Serapio cum Cera & Oleo imponebat. Fortè Dioscorides Rosaceo cerato excipi voluit, quia existimabat efficacissimum & calidissimum medicamentum. Serapionis verba suspitionem augent, cum dicit, *Auferit frigidiorem matricis, quando sit nascere cum eo & cera & oleo, repellit, secundum & factum.*

Plinius de hac facultate nihil, verum hoc præstare expertæ sunt vetulæ, sed per se apponunt: quare non dupliciter Serapionis lectis cum *cera & oleo*, id est, ectrato. Quod si querat aliquis: cur Ceratum Rosatum addendum iusserit Dioscorides? In promptu responsum, id ex arte factum esse vel fuisse, quia medicamentum efficacissimum est in parua quantitate: parua quantitas commodè adhiberi non potest, nisi aliqua substantia excipiatur; vt eius efficacia & effraznis vis temperetur, & ne plus iusto incalefaciat pars affecta impositi Opobalsami contactu. Hinc liquidò colligere licebit olei; stillatiuij Chymistarum, & ementis Balsami liquonibus; non nisi alijs probè comixtis & temperatis vtendum esse, quia pleraque feruore & partium tenuitate ledunt, morborumq; symptomata augent. Est enim in rebus omnibus modus optimus.

Horror.

Diosc. Horrores illius discunt. Legendum melius, rigores soluere videtur, quia in Græco *σφοδρῶς* habetur, sed horror *εἰς* pro rigore, & contrà rigot pro horrore supponuntur, quæ secundum magis vel minus differunt. Rigor fit cum maiore concussione in biliosis febribus; Horror cum maiore refrigeratione in quartanis compositis, vel *ἀσπιδίασι*, id est, tertianis febribus imperfectis ad quotidianam accedentibus: Frigus in quotidiana. Horrores, rigores & frigora Opobalsamum non secus ac alia calidiora, vt Rutaceum oleum, Anethinum, Elelisphacites, Abrotonites, è Castoreo, Irinum, ex Euporbio, è Pipetibus, & similia, spinæ doissillitum soluit.

Rigor.

Frigus.

Diosc. Ulcera sordida expurgat & cruda concoquit. Aliquam detergendi vim habere iam diximus, cum pupillas detergere certum; sed sordida vlcera purgat facultate deterforia, & attrahente saniem è poris carnis attrahente.

Diosc. Vrinam potius ciet. Sua tenuitate partiunt.

Diosc. Agre spiritantibus prodest. Cassa & cruda incidendo, & facta referando, concoquendo & discutiendo facilem respirationem reddit.

Diosc. Datur in lacte contra Aconitum haustum. Quia aduersus venena pollet, antiquitatis etiam experientus, miscetur antidotis: lac veneni acrimoniam inhibet & mitius venenum efficit, cum sua antipathia Opobalsamum expugnet venenum, in nobilioribus antidotis miscetur: vt Dioscorides notauit his verbis, *Μίσεται ἀκόπι, μαλγμάτι & ἀντιδότι*. Vt videre est apud Galenum de Compositione Medicamentorum & de Antidotis.

Diosc. In summa, aurihoris succo præcipua, secunda semini, minima ligno. Hæc ferè Plinianæ lectioni conueniunt, nisi quod quatuor partes statuit. *Præcipua* (inquit) *gratia lacryma, secunda semini, tertia cortici, minima ligno*: distinguit corticem à ligno. Vis medicamentorum est in succo, in quo igitur priuaria vis; deinde in fructu: quia fructuum medallæ succulentæ sunt; tertia in cortice magis quàm ligno, quia odoratior & efficacior ligno.

Diosc. Semen commode potius datur doloribus lateris. Semen Græcis *καρπός* vocatur, id est fructus: sed parum refert si quis fructum vel semen dixerit.

Diosc. Pulmonum viuis, tussi, ischiadicis, comitialibus. Pleuriticis, peripneumonics, orthopnoicis, vertiginosis, vrinæ difficultatibus & torminibus mederi ait: quod intelligendum ad mæritz concoctionem, expectorationem & incisionem.

Diosc. Ac serpentium moribus. Hic intelligendum, vt in Theriaces descriptione monuimus, venenosarum bestiarum moribus. Nam *ὄφιοδυνος* venenosorum animalium morsum, aut serpentisicum significat. *ὄφις* Medicis animalia venenata sunt, vt Vipera, Serpens.

Diosc. Ad muliebris suffusum perquam utile est. Quemadmodum Opobalsamum vuluz perfrictionibus conuenit: sic & fructus ad veterinos morbos in sufficibus utilis.

Vuluum aperia in desessibus balnearum decoctum. Non solum in suffitu, sed si decoquatur, & in decoctione sedat mulier.

Humorem irabii. Id est, humiditatem superfluum expurgari necessariam, Græcis *ὕγραιος* vocatam.

Xylabalsami vire.

Diosc. Lignum easdem habet vires, aliquantò minores. Partes eiusdem arboris videntur easdem habere vires, sed minores & succo inferiores, quia minus succi obtinent, plus crassarum partium. Igitur facultates attingentes terreæ substantiæ obtinebit, & cortice ipso inefficaciores.

Diosc. Ex aqua potum cruciatibus, torsionibus ventris, vnijs & venenatorum moribus opulatur. Hoc habere potest commune cum semine, & vrinam pronocare.

Diosc. Ad capitis vnlvera cum succa frido conuenit. Quia potentius siccatur, capitis medetur vlnenibus, quæ siccitate egent summa.

Diosc. Squamas ossium extrahit. Squamas tenuia fragmenta ab ossibus ruptis vel corruptis vocat.

Omnibus legitimi Balsami partibus exactè perpensis, quæ ritur num alicubi adhuc reperiantur, aut nobis supersint Balsamum, Opobalsamum, Carpobalsamum, & Xylobalsamum. Certissimè scimus Opobalsamum Arabicum aut Aegyptium in Europam deserti; sed Imperatoribus, Regibus, & Principibus tantum, & in parva quantitate, quæ penuriam vel caritatem & paucitatem illius, cuiusmodi à priscis, Dioscoride, Theophrasto & Plinio, Guilandino quoque Prospero Alpino & Bellonio neotericis describitur, Indicar; eoque pondus hodiè duplo potius rependitur auro quam argento. Eiusmodi genuini siue natiui Opobalsami quatuor vnciarum lagenulam diu sibi sedulo & preciosè custodiunt Clariss. D. GEORGIUS CARY Baro de Hunsdon, Carissimum & perinde nobilissimum eximie dotis Opobalsamum etiam vidi proximo Londinensi peramoenio suburbano rure Hackne vocato, apud nobiliss. & honorificentiss. Virum, harum & omnium stirpium, simplicium, rariorumque Naturæ miraculorum studiosissimum & parentem benemeritum Dominiuro Baronem Eduardum Zouch, Constantinopoli ex magni Sultani erario delatum in suæ peregrinationis reditu; quod etsi sepienne, tamen diu colore suo diaphano, luteo pallido asseruato, permansit & perualuit; sapore magis amaro.

Legitimo & sincero Opobalsamo in illa sua absolutissima & exquisitissima Theriaces dispensatione, testimonio Veronenis collegij Medici excellentiss. approbata, vsus est D. Ioannes Ponà Veronenis Pharmacopœus pericissimus, cuius mihi copiam fecit, amicitiz Symbolo; vt quondam perpiz & summe memoriz, fecerat anno salutis 1583. heros & heris Guil. à Nassau: Sed quia senescebat, densius reddebatur, & difficilioris solutionis, nisi igni admotum; id quod reliquis lacrymis commune est. Color aureus erat, & exquisitissimi suauitatis odoris, radicis Angelicæ quodamtenus. Veterascens rufescebat, & tandem ex lucido nigrescebat, deteriusque redditur: recens autem lactescebat, & facillè diluatur, vt supra monuimus.

Peruiamum illud Officinatum Opobalsamum minimè syncerum, vt plurimum putamus.

Carpobalsamum siue Balsami fructus vetustate exoleti, qui ad nos deferuntur, miscellanei siue promiscui sunt, ab aliquibus Terebinthi fructibus, quos ex Theophrasto Terebintho similes esse diximus, permixti; sed distinguuntur facillè; nam Carpobalsamum rotundius est, & semper medullâ plenum, & quasi ex quatuor lineis vel angulis rugoso ligno adhaerentibus. Tale sic pingitur à Serapione.

Et græuum quidem ipsius, quod nominatur Carpobalsamum, est græuum rotundum ad longitudinem aliquantulum tendens, ac acuitatem in ambobus capitibus, in medio vero grossius, cuius color tendit ad rubicunditatem, & est plenum, mordens linguam mordicatione aliqua non multa, & quando frangitur, interius habet humiditatem similem mellis, & eius odor bonus est.

Si quis eius generis Carpobalsamum recens non victum nasci queat, eo uti per nos licebit, cum efficacia Carpobalsami dotibus conuenire videatur. Sed quia eiusmodi non diu in virium vigore perdurat; neque ad nos nisi victum & exanimatum asportari solet; sanè longè in alim Carpobalsami speciem eximie odoris fragrantiz, gustus & efficaciz aduersus venenatorum idus eligere; quale etiamnum Londini hoc Anno 1597. in Tablino vel musei thesauro capsam plenam affuebat C. V. præfatus Baro, D. de Hunsdon, ex Indijs orientalibus delatum, Carpobalsami titulo.

MOLLE.

MOLLIS semina complura racematum coherent, glutinosa Lentiscinis serè paria, oleaginosa. suauissimæ sapiditatis, cum partium tenuitate, quorum medulla commanducata in suauissimum, tenuem, facillè dissolubilem, oleaginosum cum leuissimo glycyprico siue dulci amaroque coarrescente, & aliquantulum faucibus inhaerente vaporem abicit. Hic fructus bellè & apprimè quadrare videtur cum Galenico & antiquorum Carpobalsamum; eoque meritò Carpobalsami speciem censendus & cunctis alijs præferendus, modò recens, cuiusmodi habuimus à præfato C. D. de Hunsdon, ad nos peruenient. Eius etiam plantæ facies & delineatio, quantum mihi visa, non reclamare descriptione persuasit; eoque Lentiscinis aut Terebinthi fructibus vel lacteo liquori non modò parem, sed primariam dotem tribuendam censeo.

Flosculi lutei Oenanthes siue Labruscæ, quales Icone in huius Opusculi fronte dedimus Romæ delati & accepti à C. V. D. Iacobo Cargillo, cuius supra meminimus.

Huius

Huius Mollis etiamnum superioribus annis sex plantæ eodem Clarissimi viri D. Batonis de Hunfdon semine satæ, tum areola peramœni & cultissimi vicidarij, tum testaceis fistilibusue vasis clarissimæ heroinæ Dominæ Schesfield, vxoris honorifici Equitis D. Eduardi Stafford, non procul à Regia *Greenwich* creuerunt aspiciamæ etiamque altiore tenui caudice, in quo nouem aut decem nigricantia folia pinnata, profundè crenata, Gelsimini ortu & situ quadantenus (maius tamen, multò longius & angustius, reliquis extremum prominens folium est, cui plerumque ad basim insertitur altera ala, vt iconis lineamenta docent) quibus decerptis ficulneæ frondis modo, lac tenax & fragrantissimum emanat.

Iam viginti & pluribus annis nobis huius ipsius arboris fructus & ramulus sub nomine Indico vel patrio *Molle*, innotuerunt Mechliniæ Belgarum, penes C. V. piz memoriz Iohannem de Brancion, rarioris & selectioris plantarum historiz parentem benemeritum, quos ex Hispania acceperat, non ab Orientibus Indijs, sed ex Peruvianis missos: quod neutiquam mirandum: quamuis Balsami arbutulum vni terrarum Iudææ & Aegypti oriundam affuerant: tamen in Arabia Felici Balsameta spontanea nasci certum; cum etiam Occidentales Indiz longissimo quo post Dioscoridem, Theophrastum, Galenum, & priscos fuerint exploratæ. Si plura vis, amice lector, consule D. Clusium, cui potius fidentum, quam cæteris penè herbariz historiz scriptoribus nuperis, qui vndequeque aliena corrasa scripta pro suis obtudunt & supponunt, authoribus insalutatis, & laboris sui præmio defraudatis, ne laternæ aperiantur aut pateant, ex quibus libris furtiuos flosculos excerperint.

Commune hoc fucatum vitium consequuntur imperiti plerique materno idiomate scriptores idiotæ, aut lucifugæ nocturnæ, in quos quadrare videtur, aut reuocari potest illud commentum in artem paruum Galeni piz & summe memoriz Hieremiz Tiuernij, scholæ quondam Medicæ Louanienfis professoris celeberrimi, eum inquit,

Ambitio condemnanda, sed est intolerabilis illorum gloria, qui hodiè nouas & veras rapsodias scribunt, &c. sed querunt quid agant, ac vt aliquid videantur facere, singula rerum capita perstringunt, quod est tam difficile, ut nemo non possit facere, qui scias legere, Ex hoc est quod tam multi (vitium pauci boni) nobis prædeant Medici.

Si viturum liber, vt fertur, debet habere genium, & nescio quid latentis viuz energiz; quo in honore apud sceros nepotes erunt larvarum rapsodiarum, siue hodierni fallaces quorundam fastu turpidi scriptorum acerui? Hæc obiter; redeamus vnde digressi.

Huius Carpobalsami, id est Mollis fructus vnciz octo tuzæ, 3. septem præstantissimi & vtilissimi laticis, artificioso torcularis pressu, officiosaque opifera manu Ludquici Mirei polioris Medicamentarij artis peritissimi, sului ex atro coloris, crassamenti ouorum olei ferè & Diuinæ fragrantiz similissimi ipsius seminis odoris inter tundendum, & saporis Xyloaloes optimæ notæ, nobis dedere. Hic liquor recens expressus albescit & spumat; in laneam vestem sulus, & simplici ablutione aquæ lotus, notam siue vestigium non reliquit. Qua ratione id fiat, suprà differuimus. Ex magmate seminis iterum tuso & pauca Rosacea asperso, pressu sorti laticis vnguinosis resinacei, instat grani Iuniperini 3. ij. elicui, qui in panno etiam sulus maculam non reliquit, aqua cloto simplici. Quinctiam in aquam insectus et agitatus celerrimè liquatur, diluitur, & lactis modo albescit; quibus notis à Dioscoride syncerus à vitio coarguitur, aut discernitur: Vnde & ex suprà enumeratis dotibus facillè colligere licet, Mollem arborem propositam esse veri Balsami speciem; facie tamen, figurâ, fronde & arbore variam ab Aegypcio et Iudaico Græcorum Balsamo, vt Viti colli & amputari; eoque sortè Salicis humilis siue Amerinz modo frutescere solitam, vt de Cinnamonio & Cassia asseruimus. Plinius autem tres Balsami species statuit, *Enterisiam* id est, *serisiam*; *Trachym*, & tertiam *Eumecem*, proceriorem & maiorem.

Mollis aliquot trimestres ætatu, aut quadrimestres & quinqueimestres plantæ, mihi nuper Londini & vicino commendato tui visæ, fronde tantum ab ima & latiore sui parte non diuiso, sed contiguo, vel potius continuo, siue alio ex alio annexo, colligatue distant & variant à trienni C. D. Iohannis Brancionis Molli apud C. Clusium, folijs pinnatis & ambitu serratis: Sed flegi inter Mollis adulez arboris fructus, ante olei siue liquoris expressiorem nonnulla * folia minimè serrata, qualis asseruimus, & hic iconè dedimus; simillimi cum semine gustus, Lentiscinis longiora multò & angustiora, ad Iasmini prominentia siue propendula folia accedentia. Bellonis tribuie Aegypcio Balsamo etiam folia Lentiscina, vtinque neruo innata, vt in Rosarum vel Fraxini, vel Iuglandis folijs videre est; Cæteris tamen foliorum magnitudinem non excedere: Inter tamen Carpobalsamum & Mollis fructum conspicuam & talem, qualem inter Terebinthi & Lentisci cognatarum plantarum fructus, differentiam agnoscimus.

Carpobal-

Legimus Opo-
balsami notæ.

Mollis adulez
arboris folia
non serrata.

Carpobalsamum Aegyptium & Officinatum utrinque acuminatum & oblongum est, Terebinthi fructui simile, aliquot lineis angulosius præditum, quare prostrare solebat & etiamnum prostrat adhuc, sed rardò in quibusdam tantum officinis; quorum, quia nisi vicia & euania ad nos aduehantur, usus aboleuit. Mollis fructus Lentiscinus similes sunt & fuluo purpurantes, racematim densò stipatu coherentes, intus compressi uti Lentiscinis seminum nucleis.

Alij latice succinive vnguinosiorem eliciunt tritis & contusis lignis, corticibus & fructibus, feruentem aqua elixis, ita ut sit in eliciendo è succida lana Oesypo, a seplasiarij. Hyslopo humida vocata, chrisma supernatans colligendo. Sed cum maxima fiat virium populatio in huiusmodi liquamentorum parandi ratione; malim sanè hæc & similia chylismata nostro more eliquare; quorum etiam leuissima simili arte parata, priscorum imitatione & exemplo, Theophrasto de Causis plantarum & Dioscoridi sæpè memorata, longè pluri facienda, quàm penè omne chaos, cholici, hydropici & delicatioribus nocentissimum, crassa Minerarum siue ignorantie quotidianarum fortidarum (quarum pudet & tædet) putidarum sine arte, delectu & præparatione simplicium, puro ab impuro indistinctis & indiscrētis, compositionum, Salgamatorum potius quàm nictidorum Pharmacopœorum, quæ pleno copia cornu bobus & subulcis, tanquam veterinaria medicamina, potiùs porrigenda & infundenda, tengeri merdisve chysteribus miscenda, quàm hominibus debilitatibus delicatioribusve nostræ ætatis exhibenda. Longè scilicet enim radicibus tantillâ mole, ininnocentiùs; leniter, blandè & strenuè, roborando, occludendos fatiæque recludendo aut referando, pro ratione simplicis medicamenti agunt antiquorum & nostra Chylismata; chonicorumque morborum causas radicibus euellunt & soluant.

Modus efficiendi Oesypum.

Putidula & sordida calgata cōposita sunt.

Huiusmodi Chylismatum Succationumvè salaberrimarum, tam Botanicarum vegetatiuarum viuientiumvè, quàm Lacrymarum & Metallicorum callentissimi sunt politiores, peritiores, industriores, impigriores, indefectique laboris sagacissimi Medicamentarij Germani, quorum selectiora Pharmaca hodie aded increbuerunt; ut non immeritò Germanis multifariè primam laudem in nitidis Metallicis & Botanicis Succationibus Medicatis, mereri dixerim, & Scientiarum Artesq; liberales Athenis oriundas, ex Latio rerum vicissitudine mutata Alpes transiisse.

Huius Carpobalsami vncie octo, nobis vncias duas & 3j. Liquamenti præbuerunt.

Non est quod Succationes huiusmodi Priscis indicatas esse aliqui huius ætatis cimoniles sordidè auri sacræ famis ærascutores insatiabiles autement, qui summè gloriantur de nouo inuento chymico Theophrasti medicamine. Fateor equidem antiquos non perinde blanditiæ, mollietis, & gulæ oblectamentis deditos fuisse, ac huius nostræ ætatis homines, immodicis voluptatibus delitijisque indulgentes; quibus sanè hæc posterior sedula indefectique laboris & difficilis ætas, durioræ & fera tempora excoGITarunt, meditata sunt siue inuenerunt (facillimum enim est Priscorum inuentis addere) molles mollicellis effeminatis corporibus, cuilibet genti suæ ex euporistis & indigenis plantis, aptiores, suauiores & iucundiores medicamentorum conficiendorum siue Remediorum Formulas: haudquaquam attamè Hippocraticis, Galenicis, Aeginetæis Dioscorideis, Priscorumq; summæ eruditionis & vitilitatis longo usu & ratione comprobatis medicaminibus, præferenda fortuita Chymica, ignaua, dubia, gloriôsè & inaniter instituta Theophrastice malè parata remedia; spretis, valereciussis & neglectis artis theorematibus, anatomicis administrationibus, quas perperam & iniquè carnificinas vocant aut statuunt; cum tamen partium visibus doctissimè à Galeno explanatis, tum maximè cognoscendis morbis imprimis necessarijs: siue quibus, ars Medendi re ipsa manca est. Sed turpissima est impioctum & imperitum consuetudo, ut ea (quorum re vera indigni sunt) improbent, quæ ob ingenij ruditatem & socotidiam assequi nequeunt. Consultò itaque propter hos damnosissimos perniciossimè anaros syeophantas, qui Medendi artem nobilissimam perdididerunt, nobis & amicis politiores Medicinas Succationes referuamus, quibus totò diutiusq; usi sumus: in quorum artificiosa parandi ratione vnumquodque Simplex eget legitima, seplasiarijs parè omnibus neglecta & ignota, præparatione & Succatione. Non est quod sibi et ægrois persuadeant sine aqua ardente aut Spiritu vini hæc posse fieri.

Succationes siue Liguamenta

Quia in priscorum præstantissimis antidotis Opobalsami, Carpobalsami & Xylobalsami necessarius usus; tribus eius plantæ partibus, earum inopia, tria succedanea est meditata posteritas, ut fuisse in Aduersarijs diximus. Liquoris namque loco, nullum præstantius Opobalsamum veri Terebinthi latice: verno namque tempore ramulorum pullulanti tenella Terebinthi effusa flagella, ipsoque etiam Narbonensi Nitiobrigum siue Linguagottico aut Monspelienfi agro insister Ficulnæ arboris lac stillant, quod conchis exceptum & asseruatum in limpidissimum, tenacem, resinofum laticem abit, qui dum recens est, id est in multo, ut Plinij verbis utar, in lancem vestem fusus, neque maculam faciens, neque si eluatur vestigijs aut notam relinquens: sed ut dictum

Succedanea Balsami.

præius, senescens tempore crassescit, tenuibus partibus absumptis: non abluitur nisi oui vitello addito, quo etiam ipsa Terebinthina diluitur, & facilis potabilis redditur, admixto vino albo tenui, ut tonforibus politionibus & sagacioribus pharmacarijs notissimum. Qui Garyophyllorum, nucis Myristicæ aut Cinnamomi oleum huic liquori præferunt; suauitatis et sapori plus quam optatus facultatibus defertur; hæc namque iametsi cordi amica, eximiosque fundant liquores, tamen nec Dioscoridi, aut Priscis nota, nec venenis aut Theriacis comparata fuit.

Myristicæ oleū vnguinofum, laxando & inquinando, nec foris vulneribus glutinandis quidquam Balsamo simile habet, nec stomachi vires colligendo idoneum est, quemadmodū nuces vnguinofiores apud Plinij stomacho infensiores. Quamobrem Rondelletius in cordis & ventriculi corroborantibus medicamentis immaturas, siccas, leues, austras, aliquantulū* cariosas, astringentes nuce Moschatas, ponderosis maturis & vnguinosis præferrebat; eoquis, culinarijs blandimentis, gulæ oblectamentis & voluptatibus committens pingues aut præpingues; inieciis autē bonæ tuendæ valetudini ficiore, quia ventriculo iucundiores magisque gratæ. Sed hic mos adeo inoleuit, ut palati studiū ingeniū sæpè fallat, valetudinis dispendio. Exemplum elucidiū est id quod modò subdam.

Iam triginta quinque ferè annis elapsis, cum Bristolæ Angliæ, curati celebri medicarer in Præfectura Somerseti, duabus aut tribus miliaribus à From-seller oppidulo, non procul ab ædibus generosissimorum equitum peripæ memoriz D. Iohannis Thyng, D. Ralf. Hopton, & D. Iohannis Horneri, vocatus ad generosam matronam prægnantem, cuius nomen non occurrit; quæ cum summo desiderio auidè duodecim Nuces Moschatas tanquam panem commanducasset, incidit in delirium, vel potius ebrietatem, non secus ac vini repletionem, ob rapidos vapidosque soposiferos cerebrum ferientes, & replentes vapores; sed post imperatam quietem & somnum copiosum, repellentibus capiti admotis, conuulsiuit.

Montpelienfis schola nos olim docuit cum Rondeletio veram Myrtham liquidam quæ Sæsten vocant, id est, Myrthæ pinguiusculæ Liqueamentū, Opobalsami succedaneum esse: & Xylobalsami Zedoariz radicem, cum eiusdem temperamenti, dotis & facultatis, tum summi utilitatis ad viscerum robur & probatissimi antidoti aduersus vene natam & pestiferam luentis. Plura require in Rondelletij Theriacis explicatione.

Cinnamomum eiusque genera, Xylo-Cinnamomum, & Pseudo-Cinnamomum. Cassia, Xylo-Cassia, Cassia-Fistula utraque eorumque genera, & Cassia Siligæ Indicæ purgatricis nouum genus de quo supra.

IN nostris Stirpium Aduersarijs præcisè de Cinnamomo & Cassia differuimus; sed ob controuersiarum & disceptationum acerum congeriemque inter Medicos & optimos Pharmacarios quos sæpè torset & anxiet, præsertim in Cinnamomi, Cassiæ, Amomi, Cardamomi & Simplicis Medicamentorum examine ad ritè, fideliter dispensanda, couinnandaque Theriaca, Mithridatij aliaque nobilissima quamplurima antidota, selectioribus, recentissimisque vnde quaque Simplicibus conquisitis; quæcunque vidimus, legimus & obseruauimus syncerè in reipublicæ commodum, omisiss Herodoti fabulis, paucis perstringere et enodare aggrediar.

Impræsentiarum igitur rationi consentaneum fore duxi res similes, congeneres, fortè easdem, ordinis & doctrinæ consequentiâ explanare: conueniunt quidem Cinnamomum & Cassia antiquorum, natalibus, facultatibus, & facie ferè, & forsitan si quis ex eadem arbore conficiis ramos dixerit, bonitate tamen differre, uti Xylo-balsami tenuia sarmenta à caudice sua, menti Theophrasti aut Plinij & Galeni non repugnabit: testatur namque Galenus lib. 1. de Antidotis Cassiam & Cinnamomum in eodem ramo se conspexisse, cuius hæc sunt verba. *Cassia namque Cinnamomo adeo proxima est, ut quæ nomenquam ex mutatione ipsa euadat Cinnamomum, ut scilicet quidem veluti arbor exalta Cassia videatur, ferè nonnulli in ea Cinnamomi rami Cassiæ continas repariantur:* quæ res efficit ut ab authoribus aliqua Cassiæ ascribuntur, quæ ab alijs Cinnamomo attribuantur; vnde in hunc vsque diem Cassia apud Anglo-Britannos nō alio nomine quàm *Cinnamom*, et superiores Germanos *Timmet*, innotuit, quæ nomina cū Cinnamo et Cinnamomo Græcè et latine vocato conueniunt, Cassia verò Gallis et Gallo-Belgis *Cannelle*, et Belgis *Canneel* dicitur, à Canna forte, id est Arundine, quæ fistulæ modo caua, tostita, et cortice conuoluta est instar fistulæ. Nobilissimū siquidem et optimum est Medicamentum Cinnamomum, eximio suauitatis odore quem spirat, et sapore, omnia Medicamenta, virus et illorum ædia emendans, putrilaginosus, fædis humorum icho-

Humiditas et immaturitas nux.

Hopton adeo vocatur VVitham.

Ridenda Aduersarij p. 431 & 432. ubi legendū Lencay flores esse Prof. Assmann ait, non Celidony minoris.

Ichoribus resistendo, utraque vi sua digerente & immutante, Galeno auctore libro octavo Catopos.

Cinnamomi & Cassia olim plura genera, ut ex priscaurum verbis & Dioscoridis liquidò constat ait enim,

Cinnamomi genera plura, patrium sibi nomen vendicantia. Praefertur tamen Mosyliticum, quod Cassia, quod Mosylis nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex vino in cinerem vergens, sene, penibus ramulis ac frequentibus nodis cinclum, per quam incensum odoris Xpivius sedè indicat, incensum odoris proprietate constas. Invenitur enim cum optimo, eod, quod peculiare est, odore. Huius aut Cinnamonum prociuo: Insuper acra, mox dens, & cum cassia sunt quaedam enae fasson, quod non cito conficanti asperum, aut fricanti lanuginosum sembris tamen intermixtis appareat. Si vultis fieri vales, velis ab radice succulum facilius est huiusmodi probatio, namque si agnita miscellanea, quaedam esse videntur. Quae aut em velius spirant, suo balni, cum nares primum consulumur, efficiunt expleant, deteriores dignationem impediunt.

Est etiam montanum, crassum, pumilum, fulvescens admodum, Terminus à Dio Galico, perquam sua niter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus gemitibus.

Quartum fungosum, candidum, aspersum tuberosum, vile ac friabile, magnitudinem radicem, quae Cassiam plantae representat.

Quintum genus, odore nares feriens, subnigrum, & cortice subna Cassia similes, tangenti firmum, minus nervosum, densa radice firmatum. In qua Thuri, Cassia, Myrica aut Annamini odorem spirant, minus suavitatis uos. Delictis scabram, album, rugosum: ac lene, & huiusmodi circa radicem, ut in utile recedo.

PLEUDO-CINNAMOMUM, Xylo-CINNAMOMUM.

Est etiam nigrum simile aliud, cui Pseudo-Cinnamomo cognomen est, vile, insipidi odoris, solutrumq, viridum. Vocatur etiam Zuyber cum tamen sit Xylacinnamomum, praeiens quandam Cinnamomi faciem. Est autem lignosum Cinnamomum; fermenta longa robustaq, ferens, odore longè Cinnamomo inferiore. Sunt qui Xylo-Cinnamomum a Cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius abhorreat.

Theophrastus libro nono Historiae Plantarum, capite quinto, sic nobis scriptum reliquit,

De Cinnamomo & Cassia (inquit) illa narrant, fruticem esse vitruque non asplum, sed magnitudine Amerina (* Gallia America) veridem permixtus succulosisq, ramis constare, Cinnamomum decerp-
tum in quinque partes discerni: & esse praecipua bonitatis quod germibus proximis fuerit, idque ad
polum longitudinem cedi, aut paulo maius; secundum quod sequitur, quod etiam, minus casura est: ter-
tium deinde & quartum notatur: ultimum vero quod deterrimum proximumq, pradi. Hoc enim mi-
nimus curis habet, in quo summa gratia est, non in ligno; qui de causa praefertur cacumina solent, quod
corticis plurimum habeant. Quodam sic auctor alij vero Cinnamomum fruticosum errant, cuiusq, ge-
nera duo; alterum nigrum, alterum candidum.

* Delictis
Agri, sine casti
lyti, qui solia
Oleo, producit,
& olea Solici.

Cassiam vero samento crassiori constare, nervosamq, admodum esse volens, nec ulla parte posse de-
corticiari, ac ipsam etiam corticem esse visilem: Cum itaque virgulae secant, longitudine bini digitorum,
aut paulo ampliores abscondere pectusq, bonis coris eas persicere Ann ex eo lignis putrescentibus vertit
culor nates, qui lignum erodant; corticem vero nullatenus tangant ob amandam acrimoniamq,
odoris.

Plinio lib. 12. cap. 19. eadem serè subiicit, Ipse frutex duum cubitorum altitudine amplissimus,
palmit, minimus, quatuor digitorum crassitudinem patum à terra sex digiti succulosis, arido simi-
lis. Cum vites non odoratis, folio Origani, siccitate gaudens, floribus imbre, caduce no-
tata.

Omnibus de Cinnamomo & Cassia, tum quae praecesserunt, tum quae adhuc perstant diligenti-
ssimè perquisitis botis; Cinnamomi et Cassiae omne genus, vārys Salicis humilis generibus, Al-
merijs à Plinio, à Theophrasto autem & alijs Ameria vocatis, assimile fecisse Prisci videntur.
Cinnamomi & Cassiae fruticeta nō sunt a quē humilia hodie (quia non cedua, vi Salicis amerina)
ut antiquis prodita, quemadmodum Cassiae crassiores cortices & succuli aperte fidem faciunt.
Qui peregrè proficiuntur oleam parum nāsi demerantur singulis aut alterius annis, Balsami sar-
mentorum ipsar, quae itera quintum annam imputari solent, & quare aiunt.

Quid inter Cinnamomum & Cassiam discriminis sit ambigitur, quia hodiernum Cinnamomum
quod habemus, non esse idem cum Cassia multi certant; perum tamen inter se differre verissimum;
nam si utriusque notas à Dioscoride memoratis et ascripseris exactissimè perpendas viribus et vi-
litaribus parum differre comperies. Alterū ab altero discipere faciliè discernetur, si curiosè, cum
institores Baybari Cinnamomū & Cassiam ad nos transvehunt, utriusq; discriminem investigaverint.

Barbari siquidem vtrumque promiscuè miscent, vnum & idem hæc duo aromata opiuantes; quia odore, sapore & dote simillima & Theophrasto & Plinio authoribus eodem, in monte oriunda. Hanc nostram quoque fuscis sententiam Plinius, dum ait, *frutex & Cassia est, utriusque Cinnamomi campus nascitur, sed in montibus, crassiore sarmento, tenui cute variis quam cortice, quem comita acum Cinnamo lenari & eximari pretium est. Ampliando fruticis trium cubitorum, Colos triplex: Cum primum emicat, candidior, pedalis mensura, deinde rubescit addito semper de, ultra nigricans. Hæc pars maxime laudatur, ac deinde proxima: damatur verò candida.* Hactenus Plinius, & plura ex Theophr. decrepta.

Ramuli nouelli, bino non excedente cubitos præscorum ævo ad nos deferri solebant; qui proinde tenues, tenellique remanebant, qua ratione & dote selectissimus delectus primæ bonitatis, ramuli tenuiores frequentibus nodis stipati. Nodi siquidem frequentia ratione sapienti tenuis in ramulis nouellis existit. Igitur si summis tenuibus sarmentis pro Cinnamomo præci vti sint; hos ramulos tenellos & nodosos oportebat esse. At cum huiusmodi ramuli ad nos hodie non deferantur, sed duntaxat arborum cortices & mediocres rami, tenui antiquis deferri soluo Cinnamomo, vt plurimum ferè destituimur. Transvehabatur quandoque cum sua radice & ligno, vt ex Galeno de Anodotis & Plinio liquidd constat.

Quid somnariit Dodoneus, nescio, qui brachiatis Caryophylloz pediculos, Cinnamomum esse crediderit: Carpesium fortè intellexit.

Legitimum Cinnamomum, Cassia & Saccharum olim carissima & rarissima fuere: quapropter hodie Cinnamomo & Cassiæ accidere potest, quod Saccharo euenit. Dioscorides autem Saccharum suo tempore aliud concreti aut solidi Mellis genus dixit, quod Sacchar vocat; *In India, quæ, & Arabiæ subici in Arundinibus inuenitur Salu modo coactum, densibus, in Sal fragile, alio idem, & stomacho vtile, si aqua dilutum bibatur: vexat a Vesica, renibusque aueratur: alitum ea dicitur quæ tenebras populi effundunt.* Sed postquam insatiabilis habendi indultia & avara cupiditas attem eliciendi copiam Saccharati succi ex Arundinibus incisus, contusus aut molâ effractus, aqua elixis, expressis, tandemque ad soliditatem percoctis, homines edocuit; perlicudum illud sponaneum Sacchar & calamis deflucensibus, succo turgidis, Gummi instar defluens (ab antiquis *Sal Indum* vocatum) adferri desinit. Simili ferè & ratione & modo cortices crassiores ex annosis caudicibus & ramis Cassiæ, copiæ & questus ergò, posthabito Cinnamomo vero, id est, neglectis, ignaris, ignotisque & valere iussis tenellis nodosis furculis euulso & ex corticando difficilibus, delicatissimis, odore & sapore suauissimis, antiquorum medicaminibus premissis summæque expetitæ, qui re vera Cassiæ flagellis siue succulentis furculis præscorum Dioscoridis, et Galli Cinnamomi speciebus respondent. Infitiores qui Cinnamomi fruticem deglubunt, has delicias, quia nesciunt, negligunt: Similes enim sunt Stupidis & insulsis hominibus peregrè proficiscentibus, qui de Nature munifico lusu, luxu & miraculis in peregrinationibus suis nihil obseruauerunt. Quod si quærat aliquis, cum hodie Cassiæ siue Cannella copiose ad nos deferatur; cur non tale Cinnamomum, quale desideratur, vllum ad nos adfertur, odore Rutaceo, tenuibus flagellis, nodosis, crebrò geniculatis? Rerponsum: Infitiores Barbari Cassiam ad nos aduehant lucri faciliæ propriæ causâ potius, quàm difficili laboriosæ Reipublicæ commodo; promiscuè enim distrahunt sine delectu Cassiam & Cinnamomum; non ex gracilibus summis nodosis ramulis decerptum; sed ex ramis, etiamque crassioribus, deglubitum. Quare si quis in Dioscorideâ & Theophrasteâ aut Galienicâ lectione peritus, in Indiam hæc obseruando & discernendo proficisceretur, legitimum huiusmodi Cinnamomum antiquorum descriptionibus conueniens, summe expetitur, facile nobis transmitteret.

Diosc.] *Inuenitur enim cum optimo, cui, quod peculiare est, odore Rutæ aut Cardamomi proximo.* Neutiquam mirandum ataus & Nuperos adeo anxios fuisse in multis erroneis ambiguitatibus, opinolium differentijs, & hallucinationibus de Cassiâ & Cinnamomo: Verissimè legitimi Cinnamomi nota propriè in suauissimâ & eximiâ odoris suauitate existit: Prisci attamen Dioscorides & Galenus odoribus contrarijs assimilauerunt: optimi autem Cinnamomi, aut cum optimo reperiti Cinnamomum odore Rutæ aut Cardamomi proximo dixeret; quæ quidem ex diametro pugnant, & minime quadrant: Ruta siquidem tetræ & fortis odoris est; Cardamomi verò odor gratus, minime insuauis est, medicatus tamen, Cardamomum à Persico verbo deriuatur; nam Carda, fortem, animosum, niagnanimumuè aut magnûm Amomum significat, cuius odor Origano à Dioscoride comparatur, & in emendationibus exemplaribus *Cyprianus* pro *origanum* legitur. Idè de Cinnamomo sentiendum videtur quod si sagacissimè olfecerimus, dentibusque extenuauerimus, verum Origanum odorem recensemus & agnoscimus: castigandus igitur hoc loco Galieni & Dioscoridis

scoridis textus: notatio vnius aut alterius literæ in voce græca huius errato locum cessit: quod hodie sæpe inserti Typographo euenit. Hanc opinionem nostram iam pridem Plinius in Xylo-cinnamomo fultit, vbi ait, *Ob acrimoniam Origano cognatum*: Omne tamen Cinnamomum, Amomi, Cardamomi aut Origani odore præditum esse non sanxit Dioscorides: sed cum optimo aut inter optimum Cinnamomum speciem Cinnamomi odore Origano aut Cardamomo proximam, inueniri ait. Serapio non Amomi aut Cardamomi inermiuit, sed Cassiæ simile fecit.

Diosc. Insuper acre, mordens & cum calfactione quadantenus salsum. Hæc omnia gustu explorantur, nempe acre, mordens & cum calore quadantenus salsum fere eadem. Illud apud Venetos, Patavinos & Antuerpianos ex fusco rubens Cinnamum, cuius elapsis annis copiam habebat D. Thomas è Fossa apud Mediocrastenses pharmacarius peritis, pro omeum præstantissimo vsurpantur in Nobilissima Theriaces Andromachi antidoto: Belgij officinæ Cassiam veram dixere, ad Cinnamomum propius accedit; quamvis ab aliquibus inconfutè rejiciatur, spernaturque, quia sæpè penitro, dum recens est aliquantulum subsalsum est: arbitrantur enim ex quodam naufragio saluginem contraxisse: sed reuera est hæc ex optimæ notæ Cinnamomi speciebus, bonitate Moslytico Cinnamomo (sic vocato à portu ad quem deferitur à naucleris, vt Plinius & alij literis prodidere, non à natali solo) proximum, nempe subsalsum, corticis tenuis, acre, aromaticum, odoris fragrantissima modò recens sit, calidum & sapore subsalsum, quam saluginem quoque requirit Galenus.

Non est quod cinereum color desideratus in Cinnamomi delectu nos adeo torqueat, qui ex albo & nigro ex Aristotelis doctrinis constat: lacti similem ex atro mixto dicit. Etiam pictoribus notissimum, album nigro colori permixtum, ex cerulo cinereum colorem efficere.

Optima Dioscoridis Versio est *Ex Vano colore cinerescens*, quæ sanè conueniunt. Aliud dubium, *confricanti lenius inofensem* à Ruellio male Versum Marcellus patefecit, inquit, *dum franguntur puluerulentum*.

Omniibus apud classicos authores optimi Cinnamomi notis examissimè perpendis, legitimo Cinnamomo nos minime carere audeamus dicere; Moslyticumque Cinnamomum inter Cassiæ copiam quandoque reperiri posse: sunt enim frutilla, crassiora corticis, frequens geniculata, eximij cum saporis tum suauitatis odoris: quæ quia tenella, tenuia, frequentibusque nodis cincta, fragilia sunt, aut citissimè franguntur: quæ vicia nota difficilè adeo optimæ notæ odoratisimum Cinnamomum reperit apud nos: et si hodierni quidam tyrones saltu turgidi & inexperi præ cocis ingenij, inuidi, blaces & blaterones scioli, qui videri malunt quam esse, & nullum Cinnamomum in naturæ ditione exare, mordicis tenent. Quid sanè sit aut quale esse debeat Cinnamomum nesciunt. Pharmacarios pios & probos, veri, & qui & artis Pharmaceutices medicatriciq; amatissimos monitos velim, ut summo studio in seligendo Cinnamomo delectum faciant, vel saltem eius penuriâ, tenuem, aromaticam, odoratissimamque mordentem Cassiam in medicos vsus varios seligant, pro scopo eruditi Medici in hac palæstra versati, ad nobilissimam, laudatissimamque Priscorum & nuperorum medicamenta composita paranda. Neque vt fieri solet duplici pondere Canellæ siue Cassiæ opus est, quo Medicamenti moles permolesta delicatis hominibus augetur, & vis eius imminuitur. Vbi magis attenuandum erit, addi potest guttulâ Stillatitij olei Cinnamomi.

Diosc. In qua Thuria, Cassia, Ahyri aut Amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Hic Dioscorides videtur voluisse præstantiorem suauitatis odorem selectissimi Cinnamomi; nam si generatim dissentiat, dixeritque Cinnamomi generibus, quæ Thus, Cassiam, Myrtum, aut Amomum redolent, minus suauitatis odoris inesse, igitur hæc & consimilia aromata, minus suasus fragrant odores, & Origani aut Amomi odor non erit optima suauitatis odoris nota: quandoquidè Amomum, Origani odore, & Origano Amomi produntur, Dioscorides hic Apomo, non Cardamomo comparauit, dixitque minus suauiter redolere: non intellexit tamen omnes differentias aut omne Cinnamomum Amomi aut Origani odorem fundere; sed ait cum optimo Cinnamomo speciem quandam reperiri, cuius odor Amomo aut Origano, vt antea diximus, proximus est.

Cassia, Xylo-Cassia, Pseudo-Cinnamomum, Xylo-Cinnamomum, Xylo-Cassia & Cassia lignosa.

Cassiz item complura genera apud Dioscoridem, quæ iuxta odoriferam Arabiam gignuntur, & à negotiatoribus cum Cinnamomi partibus & varietatibus confunduntur. Colore item, sapore & bonitate differunt vt Cinnamomum: *Sarmento crassiore, tenui aut vtriusque cortice,*

* Theophrastus inquit cortices quam plurima habent lacumias.

inquit Plin., *Amplius de fruticis trium cubitorum, &c.* Quia frutices cædæ erant, ideo longè minores, tenuioresque. Proculdubio non differunt genere aut specie, vt in Aduersarijs diximus, pag. 425, sed varietatibus. Hæc missa faciamus, quia tanquam inutiles rejiciendæ.

Pseudo-Cinnamomum siue Xylo-Cinnamomum & falsum ligneum est Cinnamomum aut ignobilior Xylo-Cassia vilis, sapore, odore, viribusque effictis, copiosè hodie venalis reperitur pro legitima Cassia Antuerpiæ, Mediocastri Zelandorum & alibi. Et si egregiè conuoluta fistulosaque sit: adeo tamen infirmi saporis exoleta aut euania, solutatumque vinum, & veluti decennium in naui aut horreis repositiorisvè inueterata, vt incendio quam medicamentis vilior videatur. Eoq; meritò Priscis Pseudo-Cinnamomum, quia illegitimum & Xylo-Cinnamomum vocatum, à cortice verius lignei & inertis saporis, quàm ab interno fragili, albo insulso & insipido ligno, quale habuimus & sæpe degustasse meminimus Antuerpiæ, quadraginta iam elapsis annis: Quare sanè illud Plin: anum de ignobili Xylo-Cinnamomo, quod nullus est honoris ob eius acrimoniam, Origano persimilem; de cortice non de ligno id intelligendum: Hoc ipsum agnoscit Dioscorides. Optimà tamen lege mihi persuasus est à periculoso & indutrio piz memoriz viro Theodoro Clutio, Barauo Delphensi Pharnacopoeo, apud Indos Cassiz siue Cannellæ egregias & integras fistulas fraudulentè ad illorum potiones macerari, & euanidas ad nos à nostris sordidè avaris negotiatoribus in arundinaceis textis sportulis. Idem mihi retulit quidam Antuerpianus materialista, siue Materiz Medicæ mercator.

Eadem de Xylo-Cassia, Lignosavè Cassia & Pseudo-Cassia, quæ Xylo-Cinnamomo nobis obijciuntur, percensere oportet: non de interno ligno albo tenello huius flagellorum Alni, aut Salicis Americæ; sed de cortice aut fistulosis conuolutis vulgaris crassiorisque Cassiz corticibus, omnibus notissimis, alstringentibus magis quàm referantibus.

Falsum istud siue ligneum Cinnamomum, aut Xylo-Cassia ignobilior vilisque, sapore, odore, viribusque effictis, copiosè hodie pro optima Cassia Antuerpiæ, Mediocastri Mattiacorum & alibi, venalis reperitur: quæ etsi egregiè conuoluta, fistulosaque sit; adeo tamen infirmi saporis, exoleta aut euania, solutatumque vinum, & veluti per decennium in naui aut horreis repositiorisvè inueterata est, vt incendio quam medicamentis vilior censetur: Priscis còque meritò Pseudo-Cinnamomum & Xylo-Cinnamomum à cortice lignoso, & inertis saporis potius quàm ab interno fragili albo insulso, insipidoque ligno, quale habuimus & nos sæpe degustasse meminimus Antuerpiæ quadraginta iam annis elapsis. Quare sanè illud de ignobili Xylo-Cinnamomo Pliniano, quod nullus honoris ob eius acrimoniam, Origano persimilem, intelligendum de cortice non de interno ligno. Id ipsum agnoscit Dioscorides.

Cassiz crassior cortex, non est fruticis cædæ, sed annosæ incædæ arboris eusdem speciei, qui ob densitatem difficilior implicatur & in canalèm conuoluitur, qualis in Aduersarijs crassissimè corticis Xylo-Cassiz; annorù crassioris varietate, plicatilis, crassior, tenuior, delicatior & odorator, & vti Salicis virgulinis variat, pro ratione diuturnitatis, temporibus, intercapedinis annorù crassioris, loci, soli & cæli natura. Pro vtustior, eo magis alstringens crassarumque partium, etiam mulcicularum & vulgi Anglorum consensu, experimentisque quæ crassioris, Cannelle corticibus vñ asuetæ sunt. Sed Cassiz, Cinnamomi & Xylo-Cassiz pro ratione morborum & medicamentorum delectus faciendus. Quando attenuandum, Srilatitia, aut exiguum olei ad penetrationem, pro remedij sonula, addi poterit, vt loco ponderis dupl: Cassiz tenuis, pro Cinnamomi parte via; & quale pondus Cassiz selectissimæ, addita guttâ stellatiz olei Cassiz venius. Iat erit. Virumque siquidem Cinnamomum & Cassia, vt facultatibus conueniunt; ita vtriusque capitis consequentiâ annexa à Dioscoride, qui semper similita coniunxit: eusdemque enim naturæ esse & eosdem effectus præbere dixit.

Diosc. Cinnamomum omne (inquit) exalfacit, emollit, & concoquit, urinam ciat; tam menses quàm partu potum, aut ex Myrrha impositum pellit, contra bestias, quæ virum eiulantur, venenarq; conuenit: calicem pupillæ oculorum obuersantem discutit, crassiem extenuat, leniunt, & vitia catta in facie ex melle illorum detergit: contra tussis, defluxiones, aquam subter cutem susam per vna vicia, & vrinæ difficultatem efficax est; vnguentis pretiosis inferi solet. Trium vino excipitur, vmbra q; siccatum, quò diutius eduret, reconditur.

(Est & quoddam Cinnamomum, quod aliqui Pseudo-Cinnamomum appellant, perquam densè atque crasso sarmeto, longè tamen inualidum Cinnamomo, & odore & gustu.)

CASSIA Dioscoridi.] Vm obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi & leniter alstringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstanda claritatis gratiâ concinuntur, & ad malagmatum. Leniuntque totum cum Melle illita, menses trahit, contra viperarum siliu pota auxiliatur, aduersus intestina

in: effluas inflammationes omnes & renum vitia pota proficiti. Feminis in folio desidentibus aut suffimentis, prodest ad dulcationem vniue. Ea duplo pondere Medicamentis mixta, Cinnamomi vicem supplet siaspsum desit: nam eosdem effectum prebet, ad plurima perquam vtilis.

Cassia uicem complura gentra (inquit) iuxta odoriferam Arabiam, crassi corticis sarmento, folijs Piperis. Elegenda subulescent, pulchri coloris, Corally emula, perquam angusta, longa, crassa & fistulosa, gustu mordenti, & cum aliquanto seriore astringens, aromatica, vniuso odore cuiusmodi est, que ab incolis, Achi appellatur, ab Alexandria negotiatoribus Daphniti. Huic presertim crassa, purpurea & nigricans, Zieyr cognomine, que Rosam odore imitatur, precipui in Medicina usus. Secundum locum tenet Ruell. antedicta. Tertia, cui Masfetrice blatta, id est, Germiui cognomen est. Reliqua viles & que Apbennum dicuntur, nigra, insuauis, &c.

Dr. Celsus.
Cum multa in
Græca legis
Ruell.

Similior huic est Pseudo-Cassia, quam ut explicari possit, que gustu coarctatur, cum nec acris, nec odorata sit, &c.

* Sole magis
extollitur, &
arbitratur.

A natalibus Theophrasto, Dioscoridi, & antiquis memoratis hodie deserti ad nos delijt; delectus item, usus & parandi ratio longe alia est, negotiatorum lucro inhiantium commendatissima; ut ex D. Gartiz descriptione & Linscoti Batavi noua ad Indos orientales peregrinatione, liquidò constat. Hæc impræsentiarum sufficiant, quoad plura posteris elucidari D. Cluius noster, auctoritate & rei veritatis ex Orientalibus Indis inuestigatione, & noua Belgica reduce Battauorum classe, armis, virisque giganteis maximæ que statutz & ouantium nauatarum, potentissima & splendidissima, Ichthyomastige sæuissimo Lusitaniz, Iberijs maximè inuisio.

Myrreru.] Serapium sive Chylarium è Cinnamomo cor ex hilarans, resocians & reficiens, incundissimè saporis.

Recipe Cinnamomi selectissimi, lb. i. vel q. s. Infundatur in Aquarum Boraginis, violarum, ana. q. s. Vini Maluatici ℥. 8. Aquæ Melissophylli ℥. 5. Infundatur per diem naturalem in Balneo occluso molissimo igne. Colentur per manicam Hippocraticam, & addita Sacchari albi. q. s. in puluerem redacti fiat hoc Serapium Volacenum commendatissimum.

Myrreru.] Gelatina Cydoniis laxatima, delicatis & morsu suauissima. R. succi Cydoniorum ℥. 10. Sacchari ℥. 12. decoquantur serè ad mediâ: postea adde mucaginis cornuæ seminum Cydoniorum ℥. 10. rursus coquantur ad consistentiam, & inter coquendum sequentem affunde liquoris.

Re Turbis selectiss. optime contusi, & Scammonij prima nota, ana. ℥. i. b. Succi acidi Cydoniorum, hoc est, parum decocti donec acefeat, spiritus vini optimi, ana. ℥. 5. aut sex. Infundentur igne lento, optime in Vetro vase occlusa. Deinde colentur per chartam bibulam ut artus est, affundendo Aquæ Cinnamomi ℥. 4. Aquæ Rosarum & Galangæ tenuis stillatitiæ ana. ℥. 2. fiat Gelatina limpida. Dosis à ℥. i. b. ad ℥. 2. & 3.

Ex alijs simplicibus Medicamentis, pro scopo Medici etiam parari possit.

SVCCATIONES aliquot MEDICATÆ, AC PRIMVM DE LAVDANO OPIATO.

Opiate vel Narcotica Confectiones, quæ torporem & soporem inducunt.

Cause à Diagre
dian Opiatis
nouissimè ite
bissantibus,
Medicamentis,
adaculis ger
ruitatis quo
randam medi
camentum tyro
clips, cum sim
plicium, tum
compeserunt
medicamentor
rum ignari.
Nec non ut a
dixio val rati
fimo fertur à
Pharmacopo
ratorum Quid
pro Quo: &
Cætera No
tariorum,

Quantæ sollicitudinis anxietatis Priscis effrenatis Catharticonum Medicamentorum usus fuerit, scitè nuperum decantatissima & celeberrima methodi corum Practicantium Medicorum sententia hæc, *Cause sibi à Diagrediatu & Opiatis, testatur* Insistentur siquidem à Scammonio, Diagredio, Colocynthide, utroque Helleboro (quibus nisi corpore, ex Hypocratis de creto, prius agitato & commoto, non utendum) Turbith, Tithymalis, Efula, Meseleo, Chamælea, Thymelæa, Opio, Meconio, & similibus. Si autem Scammonij aut Diagredij, à habitu virolo suo castigati usus verendus; quid censendum erit de periculatoribus circumforancis euficatoribus se Philosophos ostentantibus & tonforibus, qui quotidie supinè auidaci sine periculi metu, Scammonio crudo, hoc est non parato aut correcto, Colocynthide, Euphorbio, Lau-reola, Helleboro utroque, Pseudo-Elaterio, Helleborastro, Aconito, Opio, Meconio, Mercurio

precipitatio, Stibio à Chymistis parato, Panacea, Sublimato ad fucum, & huiusmodi nullius delectus, quæ suâ malignitate & acrimoniâ Auripigmenti aut Arsenici modo, vellicando vel intestina aut ventriculum ulcerando & corrodingo, humores quos recipiunt, euacuant, abutuntur. Magistratus sanè indigni sunt, ut Syllius inquit, qui in hos carnifices scutica dignos, non animaduertunt; sed cum mundus immundus sordidoribus ferculis, tumultuaria temeritate inescatus, magis infelici Lolio & sterili Avena delectetur, quam peroptimis frugum generibus, salisque velit, necessariè decipiat oportet. Ignobiles tamen isti soporiferæ & medicatrici, ad capiendos hominum animos i suis hisce medicamentis sæpe obijciunt impunè rudes præpinguis Mineræ naucletos, opiliones, vaccinulos, vulgi sæcem, maximique rusticam vilem Borealium trachuum turbam, viles & abusus, quæ renti causam, cur non lædantur, in promptu responsum, huiusmodi homines larido rancido Butyro uti, Oleo, casco musleo, sero lactis, butyro & caseosa parte separato, & pinguis esse illuvie, immundis suum ferculis viticare, & confimiles genij indulgentias illis in delicijs & volupe esse: quotidiano etenim horum eduliorum esu infarsa, aut sarcinæ iustar referta, curgidula, laceffa, longaque die ventriculi & intestina assuefacta. confimilique blennoso aut pituitoso chyllo illita, tinnita, obruta stupefacta, fluida & laxè latèque diffusa, non repente philtis, medicaminibus acrioribus, corrodentibus, virosis aut virulentis offenduntur, afficiuntur: vè induruerunt siquidem adeo vsu & consuetudine heluonum & gulosorum ventriculus & intestina, ut spreis vellicantibus aut ulcerantibus medicamentis, non magis lædantur quam rusticorum manus, crura & pedes à ferocissimis spinis, aut bos à stimulis. His verò ferculis, sordidæque victus ratione, & hioribus, spatiosissimisque, obtusioribus hebetioribusvè factis intestinis; acria, delecteria & Opiata antidota, quasi intactis, illarisque per ea permeando illabuntur & excernuntur; quæ neque ponderis aut quantitate maiore, aut mole molestiora sunt, quam vnica faba operosis effervescentes ebullitionibus maximo in lebetæ aut cortina (Brabantorum vernaculo adagio, *En boone in eenen B; au-tetel*) agitata; aut pisciculus minutulus in immensa, profunda valla que maris voragine aut gurgite.

Si verò mollicellus, languidus, delicijs deditus aut Biliosus, hisce rudioribus, indomatis, immittioribusque turbulentis medicaminibus utatur; proculdubio sæpe periclitabitur vita & perpetuis symptomatibus infestabitur. Sed frustra conqueror, & surdis cano: Hæc autem deplo-rata periclitabunda, & mille periculis obnoxia, salutis prodiga gens & ætas, tanquam duobus corporibus donata videtur; vno pericitationibus, sorti & fortuna: exposito; altero in archa asseruato & custodito.

Quid verò censendum de Meconio, vsu & abusu quotidiano vbiq; terrarum pro vero Optio distracho? ambo, scilicet Meconium & Opium, non modo externis, verumcatiam internis remedijs stuporem, soporémque etiam læthalem, non secus ac Hyosciamus, si quis abutatur, facillimè repente inducit, calore nativo & facultatibus extinctis, stupefactis, perpetuo doloribus vindicatis & perlanatis, in sempiternum ab omni malo liberatis.

Opij & Meconij abusus, funestissima, mestissimaque memorabilia plura meminimus exempla facinorosa. Inter cætera spectaculi miseri testes fuere doctissimi quondam collegæ suauissimi, apud Medioburgensæ Selandorum doctores Medici D. Adrianus Petri & D. Gulielmus Hendrickess. exhibita à pagano medicastro templi custode Flandro inter obstetricis sagaces, stolidas inquam, coryphæo & Asello Arcadico, parturientumque lethifero amico, men Meconij potuiculæ vxori honestissimi ciuis Iohannis Bins vocati, coxendico dolore affectæ; alioqui robustæ naturæ, insonnos solidum noctes agentis, quæ illico, paulò post calaniitose miseræque obdormiuit, necdum expetrella, somno sempiterno confopita, Quamplurima exempla in medium adferre liceret, sed breuitatis studiosus supersedendum duxi.

Inter antiquissimas Opiatas & ante Galeni tempora præstantior nobiliôrque habita Phitonis Antidotus carmine descripta, quam Galenus, Aegyneta & Mesueus sequuti sunt: conuenitque cum Philonio Romano Nicolai ad frigidis, cholicos, nephriticos, podagricosque affectus sopiendos, eorundemque symptomatum causas delendas.

Quantum ad *Requiem Magnam Nicolai* atinet, quæ efficacior vtiliôrque est acrioribus vaporibus capitis somnos interrumpentibus & leniendis, soporandisque, non est æquiparabilis aut æquivalens in expugnandis frigidis cholici affectibus, similibusque cruciatibus eorumque causis & symptomatibus; quia pauciora calidiora simplicia recipit ad reprimendam & castigandam Opij & feminis Hyosciami frigiditatem, altius penetrando ad dissolutionem materiæ cronicorum frigidorum morborum, remotioribus locis collectæ & contentæ. Philonium recipit Piper, Castoreum, Euphorbium & Pyrethrum, quæ narcoticam vim noxiarumque & virosam Hyosciami

Quidam vero
saculo An-
monium, alio
Opium gis-
sue una mem-
ignem, altera
verò aquam,
anodinem: v-
troq; autem
ignem.

& Opii refringant, noxiæque virosæque qualitatē refragantur aut resistunt; altius penetrando, ut modo diximus, digerunt, crassa incidunt, & flatus discutiunt. Spica & Crocus humorum superfluitates & vitia concoquunt, discutiunt & resoluunt, quemadmodum Xylo-aloes & Myrrha, ut abunde in nostris stirpium illustrationibus distinximus.

Egetea siue Zazena Mesur, non multum à Philonio differt, ideo non opus est dispensare. Dialibano raro etiam vitumur.

Hodie parantur suauiiores, mīdiiores, elegantiores & temperatura moderatiores Opiatæ Confectiones, aut earundem Succationes; cum ad capitis, tum ad pectoris Pleuritidem, tenum & viscetum affectus, Gonorrhæam & sanguinis eruptiones, ex Succino extellique.

In morbis febre complicatis, Lachrymæ, Euphorbium & Castoreum, quæ quia in hisce compositionibus recipiuntur, plus iusto calfaciunt, suspensa sunt, & periculo non carent.

Laudanum Opiatum Th. Paracelsi & Germanorum.

Peritiores Chymicæ artis professores maximo in honore habent, magnificeque extollunt, & ob eximias dotes pro secreto non reuelando, celant hoc liquamenti siue antidoti genus. Quidam ne detegatur, mystico verbo Tliebaicum absolutè vocant, à loco aut regione commendatissimi Opii. Varix huius nostræ ætatis Medicamenti sunt descriptiones; vniuscuique sua præsert. Iam viginti annis elapsis conuictor olim suauissimus Montispestuli & veteri amicitia coniunctus Doct. Carolus Battus Belga, mihi hoc Opiatum Theoph. communicauit & descriptione donauit, accepta à fratre seniore Doctore Medico & practico apud Orientales Germaniæ principes. Satis conuenit cum descriptione Theop. Paracelsi ab Andernaco exhibita, sed 3. b. succationis radicis Alterci albi habet & Mumæ gr. iij; ille verò cochlear medium præscribit & Mumæ 3. i. vterque habent 3. i. b. specierum Diambaru pro 3. 3. Opii. Conueniunt in Succini & Coralliorum Magisterijs. Andernacus Croci Orientalis 3. i. Battus 3. b. tantum & Moschi gr. 4. Andernachus Moschi aut Ambræ, siue Olei ex Moscho aut Ambaro grana tria; ædellique vnicornu quatuor grana. Alij tantundem lapidis Bezar addunt, quæ quantitas incepta est.

Huius celebratissimi & gloriosi Medicamenti aliquot præstantiores verioresque descriptiones, quia celant isti nummis inhiantes, postulat patefacere libuit, præteritis aliquot Laudani præparationibus, pro arbitrio quorundam Pharmacopolarum & Chirurgorum leuiter, neque satis tanta in re cruditorum, compositis: quandoquidem nullas compositiones magis verendas Antiquitas & nostri temporis experientia docent. Quidam pondera Narcoticorum augent, alij subtrahunt; alij Hyoscyami duplo & nimio pondere ad Opium addi volunt; id quòque sequutus est Paracelsus & eius affectu, imitatorum partim Philonii, partim Reiqui Nicolai Myrepsici, febricitantibus Philonio minus noxiæ, quia moderatur & castigatur Narcoticorum noxa Opii, Hyoscyami, Mandragoræ & Papaueis, sine calidissimis Opii in morbis frigidis, antiquorum legitimis emendatoribus Euphorbio, Piperi, Castoreo, Pyrethro, & similibus; sed sola Nuce Moschata, Cinnamomo & Zingibere, feminibus frigidis, lenientibus Santalis & Tragacanthæ reclusis.

Hæc periculosissima pernicialia antidota, optima ratione perpèdere valetudini indulgentibus operæ precium; neque facile cedendum periculatoribus audaculis, fordide avaris, qui narcoticis non fermentatis & contra leges artis paratis, stuporem inducunt; & perennem lommum conciliant; quibus abunde in prologo non esse vitendum ante fermentationem sex mensium diximus.

Non minus accuratam diligentiam requirunt & merentur Cathartica Medicamina, quæ negligeenter hodie parantur.

Laudani Opiati descriptio D. Car. Battii non contemnenda.

Recipe Opii minutim incisi, 3. 2. Mumæ 3. 1. Succariini radicis Alterci albi cochlear medium. Hæc simul in uno immixto vitro angustij orificij. In alio induto vitro specierum Diambaru, 3. i. b. affundendo spiritus vini quantitatem sufficientem: Digerantur solis sereno vitro occluso, vel Balneo per dies quatuor: deinde supersundito spiritum hunc per inclinationem colatum in phiala vitrea composita, ut hoc spiritum vini imbuta fiat quasi pilmentum: exponatur soli tribus diebus & affundendo iterum eisdem vini spiritum, persistent, infra: & hac lege aut formula hic labor ter repetendus, novem diurnum inter capedens. Denique excutietur, & denno imbutus vino stillatio ut prius addendo Magister-

resina. Cerales rubri, & Succini flavi, ana ℥. i. Moschi gr. 4. Cerei Orientalis ℥. 5. Fiat massa catapotijs formandis idonea. Dosis à granis 8. ad 10. 12. 15. & plura pro ratione morbi & corporis.

Observatio G. Andernaci in Laudanum Opiatum Theophr.

Hoc advertendum est, eiusmodi casapotius vitandū non esse, nisi minima necessitas urgeat, & corpus antea probe purgatum fuerit: sunt enim illa ex vehementissimis medicamentis & stomacho alieni parata, quod pauci obtemperare videntur: eāq; minimam ipsorum pondus denotare satis est: alius saepe egrum cum morbo & medio tolles.

L'Obel. Apollitè dixit Andernacus Laudanum fieri ex vehementibus medicamentis, &c.] Hic tamen animadvertere oportet virus Opii & Hyofcyami, Apollinaris herbe vocatæ, exci-
dari infusione copix specierum Diamburæ, Croco, Cordialibus & vini spiritu. Hyofcyamum forte
Apollinarem herbam dixere, quædam ad Apolliniis nomen allusione, quia infernalis telis et acu-
noxius Deus item indicatur, aut contra quia salutem morbos abigendo, tuetur. Hyofcyamus au-
tem cerebro, cordi, ventriculo, et visceribus noxius est. Hoc sanè Laudano maxima cum cautela ut-
endum, probos quod tamen præceptum non audiunt quamplurimi aromatarij, Medicastrorumq;
cohors, qui auso potiuntur.

Inter LAYD ANE genera à D. doctiff. Libano in collectaneis Alchemiz suz, præferendum illud mihi videtur à Iohanne Hartz. Beyro missum, quod non multum differt à superioribus, seu pro 3.3. succi Alterci totius floris albi inspiissati, balis Marmæ uræ gr. 24. ex spiritui vini extracti, Infusionis specierum Diambry sequentiuriam, sequentiuriam extracti Opij od. quadruplum succationis Alterci, additis essentia Cerialium ruborum, Succini albi, ana. 3 b. Essentia Margaritarum, Aurigaudens granis. Croci, Castores, Uincorum vel Lapidis Bezar, ana. granis sedens: quæ quantitas longè minor videtur. Ambra grisea sine cinerea, Moschi aqua Cinnamonis solutorum, ana. granis septuaginta. Huius Lendani inuenerit producarum Paracelsi. Hec Libanus.

Nuperarum commendatior Laudani descriptio apud Londinenses usitatissima

D. Iosepho gloriose, sed perpetuo ascriptu.

Tant qui huius
loco sumunt a-
lei Caryophyl-
lorum 3. B.

Recepti Caryophyllorum confusum inferum in s. q. mensrm Boitrijii 3. 6. fiat ex arte Succarum Specierum Diambarn. Succaquis radicis Apollinarij, Opj preparati an. 3. 3. Coci 3. 1. B. Mume 3. 2. Mensrm Boitrijii q. s. Digerantur iuxta artis leges & chymice, & fiat Succatio secunda, prior permissa, addendo Tinclura Margaritarum 3. 9. Tinct. Coraliorum & Magisterij Carabii, an. 3. 6. Cernu Monocrotis 3. 1. B. Ambra camere 3. 1. Melscha 3. 1.

L'Obel. In hoc Laudano Caryophylli, pari sex vnciarum pondere, vtriusque Opii & succi Hyoscyami, singulorum nempe trium vnciarum, id est, sex diuiduntur.

Opiatis Crocum addidit, præcipi, cuius tamen pondus in hac Laudant descriptione longè superat omnium descriptionum Croci doses: & nisi admodum paucæ quantitate exhiberetur, caput magis grauaret quam leuaret, et cor auocatis spiritibus laxaret. eadem qua capite de Croco in Dioscotidem diximus ratione in nostris stirpium illustrationibus.

Laudatum Godfridij ad pectoris vitia.

Istis Laudanum subiunximus piz memoriae D. Godefridij à Bremen, Pharmaceutices & Chirurgices callentissimi ad Pulmonum affectus.

Recepit radicem Heluij recentium ʒ. 3. Rad. Iridis Florentinae ʒ. 1. Thebaici ʒ. 6. Baccarum In-
miperi, Succationis formæ Papaveris Rhæad. an. ʒ. ʒ. B. Seminis Alteri alii leuissimæ confusi ʒ. 3. Cin-
namomi ʒ. 2. Caryophyllorum ʒ. 1. Croci orientalis ʒ. ʒ. Candianis in seq. vini rubelli ex arte fiat Chy-
lsma.

Aliud Thebaicum eiusdem ad Nephriticos.

Re Radicis Angelicae ꝑ. 1. Glycyrrhizae rafa tantudem. Granorum Iuniperi ꝑ. 6. seminis Davil,
Feniculi an. ꝑ. 6. Caryophyllorum, Cinnamon, an. ꝑ. 2. Macis ꝑ. 3. Croci ꝑ. 1. Infundantur in f. q.
aqua Cinnamon biduo, caturo Balnei. Colatura adde succi Thebaici ꝑ. 1. Succationis radcis Hyofcy-
ami albi ꝑ. 1. Succationis Papaveris Rhodii, ꝑ. 3. fiat Chylisma secundum artem praeparata.

Landani

Laudani Opiati praestantior formula vsus frequentis apud plerofq. Germania celebres Medicos à D. Io. Wolffio, & L. Myrreo Societatis Pharmacopolij Regina accepta.

Re specierum Diambarni ʒ. 2. Opii spiritum vini optimè preparatū & defacatū, ʒ. 1 ʒ. Succationis Radicis Alterci eodem modo preparatā, ʒ. 1. Castorei optima nota ʒ. ʒ. Essentia Croci, ʒ. 2. Alcohol vini q. s. Infundantur loco calido per dies oīle, coentur & exprimantur. Rursus infundantur, addito nouo Alcohol & exprimantur, hoc iter repetito labore. Postea omnes colaturae distilla in Balneo Mariae ad Melius consistentiam: Tum recte dissolutionis Margaritarum, Coralliorum rub. Magisterij Succini, an. ʒ. 2. Misceantur supradditis & persistant in digestione ut loquimur per 12, dies; & redigantur in formam massae puluatis, cui in fine adde Moschi ʒ. 2. Ambari cinerei, olei Caryophylli, olei Cinnamomi, an. ʒ. 1. Olei Macis, ʒ. ʒ. fiat Opium.

Catapotia Anodina Rondelletij.

Vario scopo diuersimodè à Medicamentariæ artis peritis medicis, Catapotia Anodina, eorumdemque Chylismata præscribi possent.

Rondelletius ad cholicos affectus huiusmodi catapotia parabat: Re specierum Diagalangae, ʒ. 2. spec. Aromaticæ Rosæ, ʒ. 1. Castorei, Opii, ana. ʒ. ʒ. Piperis, Croci, Myrrhæ, ana. ʒ. ʒ. Euphorbiæ, gr. 10.

In Nephritico dolore addebat singulis dragmis, Succini præp. ʒ. 1.

In coniuncta inflammatione, Euphorbium, Piper & Myrrham demebat. Opium in vino passo sive Maluatico dissoluitur, pistillo callido & pillula minutissime formantur. Dosis duz aut tres.

Laudanum duplex descriptionis nostræ.

Omnibus Laudanis, Opiatisque antidosis exactè perpenſis, duo moderatiora mihi elegi, quibus non vtor, nisi magnâ symptomatum seuerissimorum vigente necessitate.

Recipiunt Opii Thebaici ʒ. 10. dissoluti in parua quantitate aquæ papaueris Rhæadis aut Laudæ, & mollissimo igne despumati.

Succationis corticis radicis, seminum recentium, foliorum & florum Apollinaris herbæ floris albi quadam Dioscoridis imitatione extrahit, & codem, quo diximus, Opii modo despumata, ʒ. 5.

Spumæ autem Opii & Hyoscyami diligenter auferendæ, quia perniciosissimæ, in remedijs intercin præsertim. Vbiq. passim cum externis, tum internis Hyoscyamo nigro abutuntur Medici, Chirurgi & Pharmacopœi, animo non aduertentes, tanquam abdicatum à Dioscoride & antiquis damnoaribus ut quod mississimum esset Medici recipere Dioscoride auctore.

Caryophyllorum, Cinnamomi, spec. Dambari, ana. ʒ. 2. Specierum Aromaticæ Rosæ, Diamargaris frig. ana. ʒ. 6. Spec. Diatrachacanthi frigidi, Croci, ana. ʒ. ʒ. Spec. Diagalangæ, Piperis, Castorei, Myrrhæ, an. ʒ. 1 ʒ. Bitumini Iudaici, Indici, aut Gallici, ʒ. 2. Euphorbiæ ʒ. 1.

Infundantur omnia secundum artis leges, varijs vitreis organis ut supra monuimus: circulentur chymicè & fiat omnium vnita mixtura & Succatio ex sufficienti q. mentrui Botryitis. Quibus peractis, commissceto dissolutionis Margaritarum ex succo stillatitio Berberis aut acidorum Granatorum paratæ, ʒ. 4.

Tincturæ Coralliorum, Magisterij Succini flauī an. ʒ. 1 ʒ. 2. Sigilli Lemnij, ʒ. 2. Cornu Monoceros aut lap. Bezæ, ʒ. 1 ʒ. Ambra cinerea, ʒ. 2. Moschi ʒ. 1. Fiat omnium absolutissima vnitas mixturæ.

Laudanum Opiatum nostrum in morbu calidis.

Recipit Laudani præscripti mediam partem, ablatis Pypere, Myrrhæ, Castoreo & Euphorbio: Horum vicem supplent Scordij, Melissophylli, an. M. 3. DiRhamni Creatici aut pulegij Cernui M. 1 ʒ. Seminis Curi, Cardui Benedicti, Acetosæ, Portulacæ, Aquilegiæ, Lællucæ aut Intybi, ana. ʒ. ʒ. Infusionis florum Violarum & Borraginis singulorum sesquialteræ paratæ in f. q. succorum Borraginis & Scabiosæ limpidissimè defæcatorum. Fiat omnium conditura ex prædictis succis & f. q. vini Maluatici siue passij & tandem liquauerunt, omnibus transcolatis & probè mixtis secundum artis leges.

Cinnamomum Opii alexipharmacum & veneficij amolendis est, Dioscoride auctore, libr. 6. Bitumen Indicum præterit Dioscoridi, Officinæ Iudaicum commendant. Reperit etiam hodie optimum Bitumen liquidum, validi adeo odoris, ut vicina loca eo inficiantur, in Galli tractu

Anuergne

Anuergne vocato, prope *Clermont*, Picis modo fonti innatans, qui vernaculè *fonte de la Pège*, Picis fons dicitur, cuius in *Diarnaru* meminimus. *Lugdunenses* *Myropolz* hoc lucris causa per Germaniam, Belgium & Italiam distrahunt; quo feliciter ad vteri strangularius, procidencias, muliebresque purgationes, vt *Dioscoridis* zuo, cum *Castoreo* & vino, potu eliciendas vtuntur. Commendatur etiam *Dioscoridi* & serpentium moribus & celiacis in catapotijs auxiliari proditur, & cum *Aceto* potum discutere sanguinem concretum.

Rondelletium præceptorem meminimus, rationem abusus in hunc vsque diè *Atabum Mumie*, siue *Pissasphaltum Dioscoridis* & *Græcorum* docuisse. Asserebat enim Medicantium vulgus, in præcipiti lapsu & læsione interna solum ad sanguinem concretum discutendum, incredibili celeritate ad sepulchretorum monumeta gradum præcipitare, indeque *Asphaltum* vel *Pissasphaltum* promiscuè, quo vulgi & pauperum corpora mortua condiri, vt hodie etiam Principum, Regum, magnatum & illustrium virorum corpora *Myrtha*, *Aloe*, *Nardino*, *Opobalsamo* & *Aromatibus* solent deferri: vndeque factum vt sæpe conditam & aridam carnem, totumque cadaver pro conditura & conditorio attulerint, affectisque corporibus pro legimento *Bitumine* aut *Pissasphalto* exhibuerint; eodem adhuc in hoc tempore putiduo, Christianis horrendo, vulgi Medicorum, Medicamentorumve turba, Chirurgorum & Pharmacantium errore & inscitia: qui *Sperma Ceti* cum *Pice*, & *Erythrodani puluerem* ad concretum sanguinem præscribunt, minime peccant.

Pissasphaltum tantà copiam Venetias deferri solet, vt onerarijs ætuumrisque muiibus & lembis picandis, Picis naualis vicem suppleat; cuius penuria Veneti Pharmacopœi hoc *Pissasphalto* in puluerem redactò (quia facillimè in glebas concrefcit) vt coguntur in vnguento *Basilico*. Arabes, Chymistæ, barbari et præstigiatores delectantur *Mumia* ista facilià impostorum, & superstitiosis mortuorum phantasmatis siue spectris & saruatis inferorum vmbis, bestiarum semiuulorum, sepulchrorumque terrorem incutientibus formidinibus, vt admirationi sint hominibus idiotis, & pluri fiant illorum pharmaca in sterquilinio parata, addito sale aut nitro ex cadauerum cineribus, aut carne putrefacta, fume, laqueo, suspensioe defunctorum sepulchrorumque composito, & meram incomparabilem *Panaceam* credito.

Huius *Laudani* vsus, non magis verendus quàm *Theriaces*, *Mithridaticos*, aut *Dioscordij* antidoti, modo fideliter & optimè paretur, & exhibeatur ijs quibus conuenit, iuxta Hippocratis exemplum & decretum. *Quos quando & qualia purgare oportet*. Eadem tamen cautione & circumspectione, crudæ, coctæ, humidæ & siccæ materiæ opus est, quæ in *Theriacæ* aut *Mithridaticæ* antidoto, ne ex simplici febre, duplicem faciamus, cruda impacta materiâ, chronicorum morborum sobole & fomite: Quapropter horum et similium promiscuus quotidianus vulgi, populariumque medicamentorum vsus et abusus sæpissimè improbandus.

Lemnia virulenta pharmaca domat, & illorum ad corp penetrationem inhibet, *Castoreorum* liquefacit pituitam tenacem.

Auri dissolutio.

Dissoluitur aurum, & potabile, vt loquuntur, redditur præparatum ex optimo spiritu vini & *Tartari* cum sale suo & lapillis, in frigido chymicè distillati, per *Antimonium* prius, vt solent aurifabri, exactissimè purgatum, Deinde 3.℔. eius solati siue in solia redacti spiritum *Aceti* mordacissimi soluta, iterum purificetur, & tandem 3.℔. prædicti spiritus vini alcoholisati digeratur 30 diebus; & denique in eximium liquorem artificiosè redigantur, Balnei calore gradatim aucto. Postea aqua communis distillata affunditur & toties distillatur per inclinationem, donec sal & plegma illi immixtum deduxerit.

Coralliorum & Margaritarum solutio & tinctura.

Non minori artificis solertia dissoluntur *Margaritæ* et *Corallia*, addito Nitro præparato & defæcato, menstrisque magisterio conuenientibus; eliciunturque tincturæ, calcinatis lento igne, ne tincturæ euolent.

Alia solutionis optima ratio.

Rx Fz acerrimæ q.℥. *Aceti*, distillati calcinetur, & affusa q.℥. *Aceti* distillati, distillentur de nouo,
Rz *Laminas*

R^r Laminas Auri per stibium repurgari q. s. Soluuntur facillè ex supradicto Aceto : abstrahitur per destillationem : pulvis remanens abluatur à salsedine & aciditate, Hic pulvis reuerberetur, & spiritu vini in digestionem, vt loquuntur, extrahitur tinctura. Vel hic pulvis soluitur aut extrahatur in digestionem per aquam Salis artificialis.

Aqua Salis distillatur per lateres in puluerem redactos.

Loco Aceti, aqua soluens talis esse potest.

R^r Aquæ Fortis ex Nitro, Vitriolo, & Alumine, quæ abstrahatur à sale exiccato : Hæc enim aqua supplet vicem aquæ Regiæ pro solutione Auri. Tandem, vt supra, extrahatur Spiritu Vini tartarifato ; vel aqua Salis.

Aqua Salis alia.

R^r Salis torrefacti, pulueris Carbonum Quercinorum, ana. Misceantur, destillentur vt aqua Fortis ; erit aqua Salis.

Acetum illud optimum est ad Tincturam Coralliorum

& Margaritarum, hoc modo.

IN puluerem soluuntur supradicta, indunturque in phyalam longo collo, quantitate parua, Aceti præparati bonâ copîa affusâ. Stent in loco calido super cineres donec Acetum rubescat ; per inclinationem separentur : Residuo affundatur aliud Acetum : Hic labor repetendus donec tota substantia sit resoluta. Tandem Acetum ab hoc abstrahatur ; pulvis à salsedine aquâ abluitur calidâ, cui vinum Alcoholisatum affundatur ; tandem Tinctura in digestionem extrahatur. Illa est Tinctura & Medicina.

Sed Magisteria ita fiunt ex omnibus etiam Gemmis.

R^r Corall. Salis Nitri, ana. Comburentur aliquoties repetito Sale Nitro : Abluta à Sale Nitro resoluuntur Aceto prædicto. Tota substantia resoluta & coagulata vna cum Tinctura Magisterium dicitur.

Catapotia Antea ad luen Veneream, accepta beneuolentia & humanitate amiciff.

V. D. D. Malach. Bernard apud Rotomagenses

Medici clariss.

R^r Auri purissimi limati subtilissimè Drach. 4. Hydragryi preparati cum vrina, Aceto, Sale, & Oleo communis q. s. ad parandum amalgama ; cui affundes aquæ Fortis Regiæ q. s. ad calcinationem. Quod si non sit curo fiat, impones igni lento donec enanuerit hydrargyrum. Postmodum toties lavabis aqua Rosarum, quoad nulla amplius adsit salsedo aut acrimonia in vitro calcinato, quod deinde tertio super porphyrio aut marmoreo lapide, addendo paululum ol. Caryophyllorum. Tunc recipe pil. & Aggregatinarum 3. 1. B. Theriaci & Andromachi antiquæ selesiff. 3. 1. B. Bol. Armeni & Corallyrub. preparati, ana. 3. 2. confer. Rosar. 3. 3. fiat massa pil. quæ fermentetur in ol. prædicto, & fermentur pil. 4. ex scrupulis duobus ; quarum sumas duas, horis manutinis ieiuno ventriculo ; alteras duas, horis duabus à leni cena, prius purgato corpore.

Pul. Albus sine Mercurio laxativus (mihi suspectus, vt huiusmodi pleraque quæ sequuntur, præterquam in lue venerea) fucus niveus præstantissimus, tanquam arcænum incomparabile & sublime, non reuelandum, absconditus à Chymistis.

Recipe Mercurij Sublimati 3. 6. Mercurij crudi 3. 3. (alij 3. 1. tantum addunt.) Triturantur diu pistillo & mortario ligneo nudissimo ad summum candorem vsque : Aliqui addunt salis chymicè

micē albiſſimē depurati q. l. Tum ad delendam acrimoniam Sublimati & ſalis limpidiſſimam aquam pluuialem vel fluuialem colatam affundunt, macerant per 12. horas. Triecnis vicibus & pluribus hic labor repetendus. Poſtea exiccabitur ſubſidens niuei candoris puluis, effuſa aquā vltimā, igne lento, vel cineribus, aut arena calidis. Quidam ꝑ. 1. pro doſi exhibent. Quouis modo eūm cautela vtendum, etiāque ad Fucum, quia dentes & os afficit, vti omnia medicamenta ex Hydrargyro parata ad affectus Venereos.

A nobis plus ſatis inculcatum; Lippis item & tonſoribus noſtiſſimum eſt, Empyricos hodie regnare, & optimos Medicos frigare. Hodie namque Medicatſtri, Medicamentarij & Tonſores vbique paſſim in aquilonicis plagis, etiāque alibi ad ægros vocantur, & boni Medici, vt plurimum excluduntur, ne vulgi ineptiæ aſininx detegantur, nec non niſi omnibus conclamatis accerſuntur, & poſt bellum auxilium expoſtulantur. Vulgi ſiquidem Medicatſtrorum experimenta, Scammonium purum non correctum, Puluis Perſipitati, Antimonium, Puluis Sanctus Maledictus, Puluis Paſſauantijs & huiuſmodi nullius delectus Medicamenta dubia, fallacia, malē ꝑꝑꝑ parata, anſipitijs & pernicioſis facultatis, nobilēque malum, quia abutuntur, cum ſint; aliquot, inter indigeſtæ molis quam plurima, ſelectiora, præſtantiora & emendatiora à Ludouico Myrreo Pharmacario Regineo accepta enarrare libuit.

*Lud. Myrrens. Præſtantior Turbiſh Mineralis
deſcriptio.*

Recipit Mercurij crudij, Fugitiui ſenioribus præſticiſ Monſpeliſenſibus, quia male audis apud plebeos, vocari ꝑ. 4. Sublimeſtur ex ſaluſ Hispanici deſacati & preparati, & Vitræoli, ana. ꝑ. 1. lb. vel q. ſ. Poſtea inſundantur per diem naturalem in ſ. q. Mordacis vini ſive Aceti acerrimi (non Biera) & ſalis Hiſpanici aut Gallici purificati, & eadem murtia ſepe mouendo, exaltiffimē abluatur, & Mercurius ad præſtimum ſtatum redent ſine iterum reuiuſcat. Deinde mortificetur ex ꝑ. 4. Olei ſelectiſſimi Vitræoli: Inſuſa perſtent per oſto dies, occluſa exaltiffimē vaſo vitrea fortiori dupliciſ, lato fundo, anguſti oriſciq, quātū vtuntur aurifices, Hic labor ter repetendus, nouatis oleo Calchantis & Aceto, addendo auri puriſſimi ſolutā aquā Regiā ꝑ. 2. His peractiſ abſtrahatur oleum per tertiiū gradū, & in tenuiſſimum puluerem redigetur Mercurius. Dein aquā ſtutaniā ſexies, ſepties & plurimum abluatur. Tum demum ſimiliter Roſacea colluatur, qua in Balneo enaporando exhalet ad exallam Turbiſh Mineraliſ ſiccitatem: Cuius pars impurius ad externos Chyrurgicos vſus ſeparatur: purior autem, qua auri coloris eſt, recomdatur. Doſis à gr. 4. ad 6.

*Pul. Vomitorius albus, quo in tertiana vtuntur. Pul. Benedictus
Chymicis. Myrrens.*

Re Stibij crudij lb. 2. Mercurij ſublimati lb. 1. puluerizentur per ſe in porphyreo lapide. Miſceantur indanturq, Retorta Vitrea: diſtillentur lento igne (adbarebit vitro fuligine inſtar) aptato amplo recipiente vitreo vaſe. Deinde vas apertum aeri exponit, vt exhalet ſator. Sicq, oſto dierum ſpatio in oleum reſoluitur, quod capiti mortuo vocato, ſine ſacibus affunditur, additus ꝑ. 4. ſaluſ Alkali. Iterum diſtillentur vt ſupra. Reſoluetur in oleum ad deplorata maligna vlcera penna contacta. Ficus aui exedit.

Huius olei qu. ſuff. effundetur in vas vitreum aqua plenum (ſtatim in puluerem album abit) per oſtium aquam iterando. Siccetur puluis. Doſis à gr. duobus ad ſex ex ꝑ. 1. Rhodofacchari. Blande moueo vomitum. & ſecceſſum.

Pul. Vomitorius alter inter Mineraleſ miſior & potior. Myrrens.

Re Vitri Antimonij tenuiſſimē in puluerem reſoluti ꝑ. 1. cui affunde ſpiritus Chalcantib. ꝑ. 2. Permixtiā exaltiffimē ſpatula in fuſorio idoneo quo aurifices vtuntur induo, furnaci accommodatum ad exſiccandam hanc materiam, qua exſiccata affundatur nouus ſpiritus. Is labor quinq, aut ſexies repetitur. Tandem præſum exſiccata & in cinerem colorem redacta materia perſundatur aqua viā Maſſicubinata optima lb. 1. & digeratur per horar duas (aqua anti lb. 1. recipit Maſſicubet ꝑ. 3.) Tandem aquā vitā per incendium accenſo papyrō abſumatur pulueriſetur materia & ſeruetur in vſum. Doſis in ſubſtantiā à gr. trib. ad 4. & 5. in infuſo ex vino albo à gr. 5. ad 8. 9. Fabricianibus ex aqua Roſar. Barrag. & ſimilium.

Myrrens.

Atyrans. Vitriolum Veneris.

Re Laminæ Cupri tenues aut batturam Cupri vocatam pondere libra unius. Sulphuris in puluerem triti ℞℞. In naui ferream stratum super stratum videtur: utatur simul. Post refrigerationem terantur, & iterum in illud vas aut laminam ferream ponantur, calcinentur lento igne, vndicula Cuprea semper gitando ad rubedinem. Paruū enim quantitate ferro superposita ad refrigerandum & explorandum nūm Calcinati peracta, ex fusco ruberrimi coloris fuerit, saporis acris vitrioli, alioqui calcinatio continenda aut repetenda. His peractis & refrigeratis aquā limpida imbuatur, & per manicam Hippocraticam co-detur. Deinde Cupreo vase liquor in auræ euolet, ad liquoris in lapillos, Cyprii & Calcanthi concretionem sacchari candi modo.

Falluntur quæ vulgare Vitrioli oleum conantur reddere dulce: Vitriolum namque Veneris suapte na-turā admodum dulce est: Itaque Vitrioli dulce oleum ex Vitriolo Veneris parandum.

*Aqua Mercurialis, Chymicis Philosophica vocata, tanquam abditissimum archanum
non reuellandum, uti illorum & Arabum pleraque nominibus bar-
baris abscondita medicamenta.*

Re Mercurij sublimati & Arsenici, ana. ʒ. i. Aquarum Rosar. & Plantag. ana ℞. i. Ebulliant se-mihoræ spatio, addita sub finem Schænanthi contusi, ʒ. i. Illinatur locus affectus leniter penna: Cutis ampulas & eruptiones contrahit, quemadmodum ex vſu Cataplasmatis à Lepidio Aegine-tæ, ad dolores podagricos, coxendicos & omoplastæ, & vitimas luis Veneræ vñctiones, sed caute agendum. Aduersar. capite de Lepidio. pag. 133.

Aqua Philosophica altera ad Cancrum oris efficaciſ.

Re Sublimati, Auripigmenti, ana. Aquæ Plantaginis q.ſ. fac vt supra.

Aliter ſc.

Re Fugitiui Sublimati, ʒ. i. Arsenici, ʒ. ℞. Schænanthi contusi. ʒ. a. Euphorbij, ʒ. i. aquæ vltæ optimæ, ℞. i. Circulentur chymicè addendo Scillatitz Rosar. ℞℞. coeantur, seruentur vſui.



G. RONDELLETII TRACTATVS DE HYDROPE NVNQVAM ANTE- HAC IN LVCEM EDITVS.



Ydrops ab aqua nomen accepit, nam in omni specie tandem aqua colligitur, etiam in illa quæ ab Hip-pocrate sicca dicitur, quam Tympanitem alio nomine vocant Medici, in quo status multi sub perito-riæ recollecti sunt, sed tandem aqua è ventris in spaciū ventris veluti per diapetētem exoritur, sed plerū-que in Ascite, quàm in alia specie: plura verò æquosè putant in Hypocharæ vel Leucophlegmatæ. Sumi qui illam distinguunt ab Anasarca, sed specie non differunt.

Est autem Hydrops siue aqua intercas symptomata in actiōe lesæ sanguifi- cationis hepatis primario vel per consensum: Sanguificatio hepatis est actiō, ad quæ carnem refertur tanquam ad præcipuum il- lius actiōis partem intrinsecam, vt docet Gal. de dogmatibus Hippocræ. & Platonis ex insufficienti enumeratione partium.

Est aliquando affectus in ipſo Hepate, vt interperies omnis immoderata, calida, frigida, humida, secca, obstructio, abscessus, scirrhus.

Per consensum omnium partium quæ ad facultatem nutritoriam referuntur, vt ventriculi, intestinorum, splenis, me-senterij & renum consensu: sed citius ob affectum illarum partium, quæ vel magis excrementis suscipiendis seruant, vel ob vicinitatem, vt splenis, quia sanguinem ex consensum recipere debet, & maiorem sanguinem desecare: si frustretur illa utilitate incurrit, tandem refrigeratur, læduntque sanguificatio. Item si renes non trahant sanguinem replentur venæ loci o & sic aqua intercas: sic etiam ob longos affectus mesenterij, ob vicinitatem læduntur venæ mesentericæ, & per consensum hepatis deinde intestinorum consensu & ventriculi: vt si ob calorem imbecillum, chyli vel cibum crudum miant, vel status generant vel putant: & sic fit Tympanites & Anasarca. Læduntur vel refrigerantur hepatis à contactu chyli frigidiore, vt omne Tympanitis & Anasarca cau-

Aquam intercutem laqueo pulmonum facit, nam Phisici & Hæstici magna ex parte Hydrofici sunt, nisi fluxus venis compiantur, & ob fluxum more preoccupentur. Huc fieri puto, propter ea quod in illis ab intemperie illa a quali scilicet caltas concoctur siue languificatur laeta est.

Allumaci item Hydrofici tandem sunt, vel quia aliqui, ut per anastomen cognovimus, aquam in spatio thoracis habent, quam cum corpus mouent concitatus siue celerius agitant & pulmonum & expirationem impediunt.

Alij Hydrofici sunt propterea quod cor per arterias conuulsam habet cum hepate, quod si cor non probe diffundit, iterum tandem concipit calorem præter naturam, qui actionem lætens hepatis Hydriopem facit.

Iij & ob immoderatum fluxum sanguinis & aliorum humorum. Vidimus ob immoderatum fluxum hæmorrhoidum veni, nasi, vel interpectuum sanguinis fluxionem, ob spumatum sanguinem, ob dysenteriam sanguinolentiam diarrhæiam & alium longum fluxum humorum.

A potione item aque frigidissimæ post immodicum corporis exercitium.

Ob morbum acutum hydrofis fit ut Hippocrates docet Hydriopem semper præcedit Cachectia, & nunquam tepente fit, sed post aliquod tempus: non enim cum repente fieri potest, ut ad tantam inuicem hepatis veniat, quæ hydropem generet, neque tanta vel fluxus vel feri sit collectio, ut hydropem generare possit, nisi ex retentione vrinæ aliqui speciem hydropis statuunt sed non est verus hydrops nisi perseueret: nam collectio feri est, quæ sequitur actionem lætam, neque à feri copia constituitur sed à languificatione læti: ut si ob calculos in vetricibus retentis aqua non descendat in vesicem retro cedit & habuit corporis implet iterum, ut corpus prætinuum appareat sine hepatis læsione; nam si calculus deturbetur deorsum, & fluxus vrinæ, statim prouocato sudore, redibit ad suam naturam corpus, & ut cito fit, cito curatur.

Facile dignoscitur hæc affectio postquam ad aliquam magnitudinem venit. & tum difficulter curatur: melius est venientem agnoscere, vel cum incipit, quo tempore omnia sunt mitiora & vires fortiores, quæ omne genus reme di ferre possunt.

Temporales.

Temporales agnoscitur ex morbis vel causis moribificis præcedentibus, ut si præcesserint multæ cruditates, multæ rugitæ in ventre sine aliqua euacuatione per sedem vel rictum: si venæ magis distente apparent quam potatione plenitudinis; nam post longos affectus ventriculi aut hepatis, aut aliarum partium plenitudo esse potest, etiam si paulo cibo repleti, difficile respirant ob fluxum qui tam distendunt partes internas. Quod si circa vmbilicum dolores sunt qui non soluantur, neque medicamentis, neque alio aliquo modo, quia sub mesenterio vel inter tunicas mesenterij congregati sunt, ceruicem spectare debemus aquam siccam, ut Hippocrates scriptum reliquit. Circa vmbilicum dolores, &c.

Alites vera signa.

Alites verò deprehenditur primum quod multum vrinæ in nobis generatur & redditur, sed paulo post supprimatur, & in vena remanet & gravitatem & pondus facit. Cum corpus voluitur, sentitur aqua fluxus veluti per canaliculos stans, corpus contabescit indies & venter intumescit.

Anasarca.

Anasarca cognoscitur cum partes externæ frigidiore tactu deprehenduntur, & in ea frigidiore perseuerant, Facies & partes corporis quæ longo morbo emaciatae erant tumidiores apparent, & palpebræ, pediculi et ceteros & canaliculos habent. Quod si præcesserint fluxus sanguinis immodicus vel aquæ potio frigidiore Anasarcam expectare oportet & ne decipiamur, diligenter interrogare oportet, si ad euenierit ob longas vigilas, vel quia laborans noctu diu steterit reclusus: solent enim tibie aut pedes intumescere, vel ob impregnationem aut vigilas, aut stationem longam. Quod si præmentis cedat caro & remaneat veluti fouea quedam: est vel parva edema, vel intumescit Anasarca.

Hydrops qui à causa calida ortum habet, difficulter curatur quam qui à refrigeratione in causâ est quod Medicamenta interius vel exterius apponenda, calida sunt: quæ dum aquam euacuant, vel siccant, vel dispergunt, vel fluxus abstinent, intemperiem augent, quæ hoc symptoma attulit. Si à frigida, & easdem & symptoma auferunt.

Hydrops à causa calida.

Hydrops qui ob scirrhum hepatis vel splenis fit non curatur, neque si ab scirrbo Pancreatis fiat, si scirrhus & equisus sit & antiquus. Morbus nullus curatur, cuius causa tolli non potest. Adde quod scirrbus hepatis difficilis est curatur, & medicamenta emollientia aduertuntur parti, quæ astringenda seipsum expellunt ad quæ corroborantem præterea quod partes emollientia relaxant, quæ relaxant magno statu vel aqua impletur.

Pancratis cum alijs glandulis mesenterij in scirrhum vertuntur, quæ difficile deprehenduntur ob ventris inflationem, & quia nullus antiquorum quod sciam obseruauit, neque scirrhus hepatis in magna distensione vel inflatione reprimendi potest.

CURATIO.

Curaus Hydrops ad curationem morbi qui illius causa est: Quare danda est opera ut deprehendatur qualis & quæ causa præcesserit, quæ intemperies aut timor, intemperies calida vel frigida. Calida intemperies vel à febre acuta relicta est, vel à longo tempore in hepate facta, & prius victus ratione iusta. Quare illa tandem perseuerasse sequitur, sine magna bilis & feri generatione: quæ imprimis euacuari oportet dolem & emaciat apertos renuere ut illa descendat per intestina: quod fiet commodissime remedijs extinguentibus fluxum bilem & euacuandis rebores circa magnam inflationem vel caliditatem. Catholicon, syr. R. olus cum aqua Endiuiz, vel Graminis, aut Alperagi dani potest, interea à duri tyropus sequens parabitur.

R. Endiuiz, Cichorii, Scariolæ, Fumariz, Scabiarum Capillarium, Agrimoniz, Rostri porcini, ana. M. l. Mercenaria & Abstinij, ana. M. ss. Palli mund. Prunorum, Sebesten, ana. N. 10. Thymus Indorum, ʒ. i. Anisi, ʒ. ʒ. fiat decoctio. In ʒ. i. ss. dissoluat Vinici Rosarium, & Mercurialis, ana. ʒ. ʒ. Sacchari q. s. fiat syr. longus. Aromatizetur spec. Diarhod Abb. drachmis duabus. Vltimæ dosi adde effusionem duarum drachmarum R. habar. electissimæ. Deinde deus conditum sequens ad vnum naturalium corroborantem & castigationem intemperaturæ.

R. Confusio florum Cichorii, Capill. Veneris, ana. vnc. vnam, pulpæ Pallularum infusarum in aq. Endiuiz, ʒ. i. ss. spec. Diarhod Abb. & Triafanal ana. drach. ʒ. i. Ciners intestinalium Lupi lani in aqua Endiuiz & Abstinij, ʒ. ʒ. cum syr. Capill. Veneris vel de Byzasij fiat conditum, Capiat singulis maximis, superbibendo ex aqua sequentibus.

R. Aquarum Endiuiz, Cichorii, Graminis & Abstinij ana. qrt. i. dulcoratur & capiat vnc. ʒ. assumptis conditum. Vtatur.

Vitatus rufo-mento sequenti supra hep. ar.

Rx Olei Abinthini & Rosani ana ℥ss. 3. β. Olei Cithonorum ʒss. Santali albi & rub. Corallij rub. ana ʒss. i. Sem. Eadniae, Portulacae Berberis ana ʒss. ʒss. Ceræ albae q. l. fiant lennimentum pro hepate, si morbus procedat, inflatio & aquæ collectio appareat, oportet non solum intertemperare expurgantia, sed & quod genium est & congregant est aquar. val. fluminis extrahere Serum illud rannem caute habet, arguet intemperiem, finit facit: quare influentibus tales Symplos quales in formulis remediis doctorum ad aquæ ebulitionem superscripsimus Symplo, vel Symplo de Endemia compositus, vel de By-
zantijs. vel de Eupatorio addere licet decoctionem sequens, vel ex illo decocto Symplo parare.

Radicum Ferulas, Graminis & Alparagi, ana. $\frac{3}{4}$, foliorum Brasice maris, $\frac{3}{4}$, 4. Corymborum sive vix Hederae arborescens, vix vnam. Alari vix β . Anisi drach. $\frac{1}{2}$. Fiat decoctio, quae datur cum fyr, suprascriptis. Vel addendo Sacchari q. s. fiat fyr, qui exhibeatur alternis diebus. Vel fiat sequens vbi non reperiantur herbae maris, ut Chamæla, Thymelæa, vel Brasica marina.

R^o Rad Indus recens, vnc Mercurialis, Sicle, Ochoryz cum radice Endiuiz & Sonchi, ana M. ss. Symp Orientalis $\frac{3}{4}$ s. vel q. Radix Aspi Diofcor $\frac{3}{4}$ s. Afari & Corymborum Hederæ arboris (per ejusdem F. xianque) ana voc. i. B. Apici. Petro-
linia drach j. fiat decoctio in aqua Enduiuz addendo passili munde $\frac{3}{4}$ s. in lb. s. dissolu syrupo Refa lax, me 4 Sacchari
quant. suff. fiat syrupus. Capiat vac. s. mane, duobus vel tribus diebus continuis. Aromatizetur cum drachj .sspec. Diarho-
gum Abbat.

Cythereæ et quæ cunctis vrisqueque admota faciat ad edificationem aque. Aqua enim et in vena cava et abijci continetur, quare cum vris cunctis, profunde, quod opus requiritur et antecedens materiam educant. Sympia autem sunt parva et Radicibus vel facies barbarum aperientium et acutum, et (sympia de Byzantia, de Eupatorio, et quinquae radicibus. In forma Opastæ Trochisci dantur, vel in forma pulueris, admixta quæ leuiores substantiam reborant et aliquibus quæ insemper calidam tollunt vel minuunt) vel attritione leui, vel similitudine substantiæ. Pareunt ergo et conferunt. Capilli Veneris, Radicibus codditis Apij, Eriugij, capie Palladium, capie hepatis Lupi, vel iohannis Iohannis Lupi, et Gallicani, pulueribus Diarhodeni, Triantafoli, et similibus. Trochisci Diarhodeni, Alkekenig, ex Eupatorio et Rhabarbaro.

Laudant praetici Dialsecam & Diacircama, sed has compositiones rejicio, nisi in Anasarca, quia calidiores sunt & tam intractabiles vix assumi possunt. Fiat ergo tale conditum.

Re Conferu. Radica Paludis, vnc. i. Conferuſionum Cichorij & Capill. Vener. ana. vnc. ſſ. ſpec. Diarhod. Abb. ʒ. ſſ. ſpec. Trifol. drach. i. ciner. lumboricorum præpar. & inteſtinorum Lupi ana. ʒ. i. cum ſynp. ex Endimia compoſito fiat coctidram: capiat mane & ſero, ſuperbibendo aquam Cichorij & graminis, an. ʒ. i. id penetrationem rules, & calorem temperant.

Cylleres vero aqum trahit & vasis mercurialis, i quibus est mixtis in omnem & intra peritonem refudit aqua. Vnde
 ac illa se ipsa quincies iterum continet, quæ vnde raris, peritonem tantum vellet, ibi facile in spatum ab
 arthriticis refudit ferre, quod sua tenuitate mercuria conseruare non possunt. Cylleres autem est detegentibus & aquam
 thymebus. Sciri debent, non & collationibus ignis ex Mercurialis, Braccia marina, Sella, Parietaria, radice
 Indis, Cactuus Afinitis, & Cydarium vel eorum succis, cum vino hominis vel cum fero Caprino. Injundia ferre oleo
 redolante. R. Mercurialis, Betæ, Parietaria, ana. M. S. Braccia marinis, vel Thymelæz, vel Chamaelis, ana. M. β. vel senæ
 Orientalis, ꝓ. a. Aorur Hyperici, Gentianæ, ana. p. r. Anisi, Aprii, Petrof. ana. drach. i. seminis Carthami, ꝓ. i. s. i. s. decoctio.
 to. M. r. seminis Aulicæ, Benæ & C. x. m. c. i. fiat diaph. Vel sic.

RD Rad. Concomera fyl vel Aplos Dnsic vel Cyclindrum recent, vel Afari, me-3. contusantur & decoquantur in sero lactis vel in vino & inijciat vel extrahantur succi ex herbis vel radicibus & cura vinis fiat elyctis, inijciantur frequenter. Sunt qui femurum aere dissolvunt, quo trahit. Pinitofa omnia medicamenta, vel Tumbul, Agaricus, Colocythos, & alia

Postquam illa feri copia valorem evacuati est magna ex parte, tunc tentare oportet evacuationem vel absumptionem feri coelliculi per penionem, non ante per plus trahant, quam à parte evacuati. Evacuatio vero vel punctura ma facta in rene ad interna vique quibus Graeci per acetentia, id est punctum vocant, vel scilicet circa totius ventris ad aponeuroses musculorum vique. Si cutis et membrata illa quae cooperit rectos musculos parvis scissuris domandae, lenim per venorem relinquit, quod si paucum sit totum evacuat, et postea lenim à parte interiore circa fornicem valorum spermaticorum. Sed multo curatius aponeurosis digredientibus et epiploicis supra ventrem de quibus postea dicemus.

Scitandum hic minus periculosa est quæ paracentesis illa antiquorum, quæ non oîi viribus valentibus fieri debet & in quibuslibet scirrhis velletur in aliquo viscerum. Rationem facienda in nostra Chirurgia docebimus.

Sopra ventrem excisantis, et abscisatur reliquum aquae pomodinae & alii retinenda. Ponitur etiam in parte inferiore ventris quae digeratur & ciet vinus. Fiume Amplexu vel Capataplina, quae excipitur melle vel mico. Cochlearum, quae intra oleum parari possunt. Preparatur habetur in Officiis: et Baccas Lauri, quod conuenit, sed magis in Tympanum, sed et addatur cinis Cochlearum marinarum, vel terrestrium, vel Parparae, vel Buccinae, vel Sironborum, & supra ventrem applicetur. addita etiam Spica Celica vel Spica Nardi hoc modo.

Re Cochlearum terrestris vivarium No. centum, conservantur diligenter, quibus adde Spicae Nardi, Schamantii, A. 6
farina, 3. i. β. f. cataplasma. Vel ad eucaucianem aique quae in ipse & venit melerata & lub peritoneo con-
mentur, ad eris inquam aq. abstruptionem, applicentur succi herbarum vel vnguemum de Arthrica f.ue Cyclamine. f.
Vel f.ue f.ue

Re Succo Thymelaeae, Cucurbitaria agrestis & Brastice maritae, ana. ss. 3. Succo Rad. Aristolochiae vel Afiae, $\frac{3}{4}$ 2. Spi-
 Nar di Scammanthi, ana. drach. 3. Excipiuntur farina Oroboli, vel Luppini & applicatur supra vimbiles tegmentis di-
 Alij supra reficantur ex oleo Rutace, vrina puri & succo pedis Columbini purati, mouet vitam, quare illud debet
 fieri cum sapidiore remedia vrinam prouocantia exhibeantur, vt supradicta purgantia post euacuationem.

In hac specie ludoris provocatio non multum prodest, quia pauca aqua est in habita corporis. Quod si quis velit su-
lorum provocare, hoc debet fieri etiam cum aqua in venis colligitur ut in fine in Anasarca.

Craffa picta
inciditur &
purgatur Zin-
gibere addita.

अथर्ववेदः

peritours per
quas vasa
spermatica
properantia
deficiunt: cir-
culatoria vero
ascendunt. Itaque
huc, ut in hydro-
cele, pons maxi-
mus fit: non per-
forant elutriam
tunc, si huc daretur

& ante carnem 3. aut 4. continuando per 12. dies. Nutriatur interea bonis alimentis & potissimum iuiculis pullorum; quibus incoquantur herbe refrigerantes & humectantes, vt Violæ, Borrage, & Buglossum. Quod si non possit ferre tantam euacuationem sex diebus, nutriatur optimis alimentis multum nutritibus ad virum reuersionem. Alimenta autem erunt Præfane sorbitio ex Alica, Trinio, Oriza, cum lacte Ovis & Capræ. Carnibus vtiat pect affinis & elixis, vt capris, pullis & gallinis; piscibus autem dulcis elixis, non fixis aut torrefactis; enim plurimum humectant & humorum acrimoniam exungunt: huiusmodi autem & bilem augent: conuolentes sanis & pueris. Landanum & cōtenduntur Anguilla; in iure carnis vel cum bordeo decoctæ. Vtiatur vino mulci aquâ diluto. Ad maiorem humectationem & virum corroboracionem vtile erit scorium sequens.

Ri confusa Rad. Buglossi, sut florum Borrage, Violæ, ana. vnc. 1. confer flor. Cichorii, vnc. 1. pul. (pe. Diatriagæ frig. sine Caphura nouiter dispensati, 3. 1. spec. Trium Santalorum & Diarrhod. Abbatis, ana 3. 1. condumatur ex lypso & pomis. Dosis nucis quantitate, superbibendo aquæ Borrage, vnc. 6. His medicamentis & alimentis repleta vena; & viribus infusuratur, vt sanguis vitiosus partium exterarum euacuetur, & nouus purior succedat; aperiantur vena omnes externæ; quæque horis à prandio. Primo die venæ Maleolæ siue tali vtriusque pedis: deinde ea quæ est inter paruum dignum & annularem, vel inter medium & indicem; idque sequenti die: Tertio vero die aperiantur venæ frontis, & quilibet vice extrahatur sanguis ad 3. 1. tantum vel tres si opus fuerit, & corpus plenum sit. Falsa sanguinis missione vt alimentum ad externa membra strahatur, vtiq; ea iam resiccata aliquantulum humectentur & resiciantur, cutis præsertim, in qua est præcipua affectio, natet in balneo aquæ tepidæ quinque horis à prandio, vt alimentum in secunda concoctione elaboratum ad externa strahatur, continuando per aliquot dies. In primo & secundo balneo poterit lemter iudare ad aliquam euacuationem illorum excrementorum quæ adhuc in habitu corporis continentur. In reliquis nullo modo sudandum, ne ad partem affectam deducantur excrementa. Balneum tepidum ingredi poterunt, quod iussu aqua frigida fontana, fluuiâ vel puelle refrigerandum & temperandum: natet diu in frigido, vt alimentum ad eas partes attractum retineri & consimilari possit, & quæque humectare & resiccare. In aqua prius & secunda balnei ad cutis detersionem poterant sequentia decoqui.

Ri hordei integri leniter confusi, lb. 3. foliorum Borrage, Maluarum, Parietaræ, Morfus Gallinæ, Lactucæ, Ciculæ Cichorii, ana. fasciculis vnum. Florum Nempuram M. 1. lb. flor. Viol. M. 1. fiat decoctio per primo & secundo balneo. Præceptum illud de balneo pitum tepido, idem frigido, non solum in hoc affectione seruandum, sed etiam in hæcâ attenuata & ips quos resicere volumus. Tepiditate balnei aperiantur & relaxantur venæ; alimentum facilius attrahatur, & si quid sit excrementorum in carne & cute educitur: attractum autem alimentum, frigidity balnei retinetur.

Si tumores diu sunt, aseruantur prius, vel post balneorum vsum. Quod si non possint medicamento, sequenti poterunt. Ri Sublimati, vnc. 5. Vitrioli, Cantharidarum, ana. 2. 1. Aquæ fortis, 3. 1. Aquæ Plantaginis & Solani, ana. vnc. 1. ut trita. Bulliant simul & postea tangantur partes affectæ donec incendant & immescentur. Prouocentur calui cicharæ; deinde dealberentur locus solutione aquarum sequentium.

Ri Ceræ Papaueris thezardis lb. 1. abluatur pars.

Ri Succo temporui maioris lb. 1. pulueris sulphuris viui, vnc. 1. abluatur partes affectæ.

Ri Cerasæ, Lythargii, ana. vnc. 1. Turbæ 3. 3. succi Asplenij, Solani & Plantaginis, ana. vnc. 3. olei Rosæ 3. 1. fiat unguentum, quo partes viceruz frequenter illinenda: Et cum cicatrices inducunt adde singulis vnguenti vncip, 3. 1. sulphuris. Vere & autumno curetur hoc modo, per totam autem æstatem vtiat sequenti condito laxante; etiâque luper scripto cordiali medicamento, balneo item aquæ tepidæ & frigidæ, vt dictum est, vel ledeat in flumine quotidie à prandio, per aliquot horas in vmbra, ne vtiatur à sole, vel noctu tribus aut quatuor horis à cena, absoluta ventriculi & hepatis concoctione prima. Conditum laxans huiusmodi fit, Ri Floris Cassiæ extractæ ex vapore decocti Maluarum & Borrage, 3. 3. cum mucaginis feminis Pilyli extractæ ex suprascripto decocto. Pulpe Prunorum acidiorum, Passulari, Thumari Indori, ana. 3. 1. Senæ, Medullæ ferrius, Cassiæ, ana. 3. 1. Scammonij 2. 1. Anisi, Glycyrrhæ, ana. 3. 1. syr. Violæ q. l. fiat conditum, capiat in iure capi ab vnc. 16. ad 16. capiat ter in mense. Bene: nutriatur, multum dormiat, quiescat: vitet omnem corporis exercicionem, quæ sit aut ita, cogitatione morbi, aut cura multis, exercitacione immodica, aut venere, aqua tamen non abstinentum. Videndum igitur diligenter vt corpus mundum sit à recrementis: cauetudinem ad cutem villo modo seuerat morbus, cum hic affectus sit partium exterarum, & potissimum cutis: huiusmodi excrementa in tota retrahantur & per venentem frequenter resicere deducantur & expurgentur. Balneorum aquæ frigidæ vius expellat à partibus æternis ad internas, affectus autem cum sit cutaneus & carnis, arceda sunt excrementa, & earum partium reuocacionem retardare oportet, quia essentia morbi in siccitate existit, & sanguis salus est & serosus, quo ad partes assimilare non possunt, neque outrin, quia sine nutrionis est assimilatio, maleres ob id pueri & euecha raro hoc morbo infestantur, sunt enim humidiores: humiditas illa exsicacioni resistit: multi vtrefert ætate hæ ab eo morbo extrahente vindicantur. Hæ rarior hoc anno nuncem liberauimus, qui incipiebat & vltra propicium erat progressus: Quare si in totum morbus curari non possit quæ iam in habitu sit, laudabimur illa morbi retardatio (superioribus remedijs parata. Aliquos curatos fuisse vti viperarum in vino suffocatarum Galenus refert, quod etiam carne in Theriaca vtiatur, & eam assument, quod à me non probatur, ob summam siccandam vim quam habet: neque Troscifcos etiam probò; magis laudo ius earum visum, non quod efficacius quod Galenus scripsit, solum quod valenter per cutem digerat: dedimus tamen, sed obseruati ventrem illarum medicamentis laxantibus ducere, & eam ob causam magis mihi probatur, quare si excrementa ad cutem deducantur: regio id non patitur: adde quod excrementa sua natura crassa & terrena ad habum corporis medicamentis vi ducta, non possunt per eam partem & per tam angustias vias commodè expurgari: ea siquidem quæ in carne & cute siue in habitu recepta sunt per poros cutis euacuari debent, tanquam per propriam regionem. Quod si tantum à Viperis expectat auxilium, oportet eas incute æstate capere aut autumno, his enim temporibus pingues & obelæ esse solent: æstate autem sicciores & calidiores, quare illis duobus temporibus venandæ ad Theriacum & Troscifcos parandæ. Sed interea ne deficiamus hoc æstatis tempore aliquo remedio, vtiatur carne Erinacei terrestris, potest in locum viperarum substitui. Seruentur igitur carnes Erinacei terrestris, quæ si multum haberi possunt, ad formam plesteæ reducantur: velutur mane ante ortum alia: vel veli elixet cum Selmio vel Borrage, de ea comedat & ius forbeat. Eadem ratione parari poterit Viperina caro.

Hic sublimissimum aliud consilium à nobis item & amicis, collegis diligenter exscriptum & collectum. A senis p[er]suis superflue Rondelleij preceptore, ad precautionem Elephantiasis cuiusdam nobilis matrona, quod huius convenit cum superiore; immutatis tamen aliquot Medicamentorum formulis, pro ratione differentie & implicationis morbi, constitutionis & naturae temperies.

Utrumq[ue], sexus hac artu lege & methodo huiusmodi affectus selectioribus Medicamentorum succai-ombus, simpliciter Autuerpia & metuburgi curant, cum illis locis medendi artem exerceant.

Abstinendum inprimis alimentis effluvis, terrenis, viscidis, crassius, lentum & melancholicum sanguinem gignentibus. Cauendum praeterea ne tales humores ad habitum corporis deducantur; sed à cute & carne repellendi diligenter multo & frequenti balnearum frigidorum opportunissimum visum. Aethate loco balnei ingreditur lapius flumen frigidum, in quo natus dies, vel sibi curet aquam frigidam adferri domi, in qua diu sedeat, nempe per dies aut tres horas aote prandium & cenam: atque per duobus diebus in hebdomada, aethate per septimam; humores enim eo tempore accumant, & ad cutem cum proprio motu, tam solis vi feruntur, quos frigidus repellere oportet: priusquam tamen balneo utatur, sumat Scapum laxativum per tres dies continuos.

Praeter supradictos Symplici medicamenta, hic Sympus recipit corticis radices mediana Fraxini, Populi nigri & Sambuci, ana. vocat. Rad. Lapathi acuti, Fumariae, Iupulorum, ana. M. r. si. Cassia, vne. r. Herbarum Capillarium (Aplenum comprehendit) an. M. s. Succo pomorum dulcium, vne. 4. succo praxidatam herbarum humanae, Iupul. & Mercurialis, ana. vne. 1. Rhubarb. ad vocat. & sp. Truon Samal. ad 24. Alimenta refrigerantia & humectantia sunt ex via, et cunctis uniorum animalium, pollorum, Gallinaceorum, Columbarum, & aliarum animarum: Hec odorum, & Vinularum. Herbae recentes refrigerantes & humectantes in acetis, vel in sulculis, ut Lactuca, Endivia, Rughollum virgine, Portulaca, Cochorium. Erunt etiam ex via Pepones, Meloepones. Ex fructibus elige Cerasa, Poma, Pyra, Pruna, Vna, Mala Persica. Inter pisces, aquae conveniunt omnes, exceptis ipsi qui crassius gignant succum, ut Tunus, & similes. Aethate erunt decoquenda in aqua & oleo, vel Butyro dulci, ipsi qui procul à mari degunt commendantur Percha, Lopus, Aftacus, Trutta & similes. Abstineat omnino à salis, piperatis, tritu, massa panis incrustatis, herbis aut fructibus calefacientibus, & praesertim Amygdalis. Nucibus, nucleis Pinearum, Castaneis, Calco, & pinguibus. Utatur aq[ue] potu pro vino. Fugiat nimis animi perturbationes & corporis monones, & ea omnia quae humores calfacere, exagitare, & ad cutem movere possunt. Vestes pellibus suffilate manus continere. Eligat sibi lectum aut culcitram Bombace aut tomento plantarum interstitam, quae plantae plus nullo calefaciant. Contincat se in loco & aere frigido. Abluat faciem singulis diebus aqua Peporum distillata, & simulibus pro instructo docto medici medicamentarijque experti.

Elephantiasis hereditaria, e Arthritis & complures morbi.

Elephantiasis morbus est hereditarius, ut si quis alius; nam in universam prolem porpenso derivatur; tamen nonnulli optimi & medicata victus ratione, & utraq[ue] temperaturae selesuolae nepotes vindicant, in quorum tamen nonnullis reuertit, non perinde bonis victus ratione visis.

Compleures enim sunt morbi, quos in infolent parentes, quasi rivos & radices transfundunt: verum si sanguinis insidet atque feritum labe illa, qui fit ut per aq[ue] omnes morbi non deriuant in natos, neque perinde nimios afficiantur, cum nimio non vultis non appareant; alij tunc quàm in lacem edim fructum, etiamque in vtero.

Diutius tenet, est sententia, Sami Sano, filius p[er] aq[ue] contra minus valentibus morbidis: in claudis, claudum natam, anthriscis anthriscu, in citharosis, citharotomum natis, manacum melancholicis, melancholicum, lue venerea affectus, eadem labe infectum, calcolosis, calcolosum. Asthenicus, Asthenicum: Phthisicus, Phthisicum. Huiusmodi morbi insignes qui parentum viscera, spiritus humorq[ue] labe infecerunt, aut iam dum nperam dant liberis, verumvis exercent, vel dum gestatione vtero tenet, vel lactantur; sanguine materno, aut semine corrupto coquantur corpulenta, huiusmodi affectus procreant, aut saltem inferunt, inferuntq[ue] affectionem quandam & aptitudinem. Quod etiam non omnibus se prodit, nihilominus tamē minus delinquit, coeterea medicamentorum sed potissimum proba alimentorum visum, quia temperamento affectioni adaequantur, aut utitur contra ano temperamento est, quo obdunditur, cuius rei indicio erit, quod quibus antequam eruperat, labent canent filij dum morbus affectu. Cum itaque puero haud dum adulto haec contingunt, coeuctantem ea illi à parentum colluic, promittitque corpori primordia labe fieri cepta esse Ergo mox quàm in lacem emerit, occurrendum ei causa morbosae & contagioni perimenda: quoniam vero diutius ab ortu cunctatur affectus, se nodat, poque diffidius auellitur: si diutius iniquum, quippe in habitum iam cessit, factusq[ue] est, id est inplexus, cum carnis, cum spiritus matris paribus & impulsus, qui non secus ac surpes, quae alae: siterunt radices, magno nullo conui euellunt. Sic sunt inuicti affectus, Lepra, Conuulsio, Scirrhus, Marasmus, nodola Arthritis, quae potius per initia quàm adulta eruenta victu pharmaco, & Chirurgia. Difficilis autem expellitur hostis, quàm admittitur. Plea aq[ue] hae aptitudines ac proclitantes sunt: intertemperis aut vino lenitum frigidum, aut labe affectu à principis effluente, aut viceribus: interdum à matris intertemperie induta & aucta: ut si dum puer in vtero conformatur, multa colluic lenium corruptat temperiem spiritum, caloremq[ue] obduendo: aut articeis ipso vtero imbecellem materie modum, texturamq[ue] fortuitur. Si corruptio vniatque concurrant, conclamantem est, aet plenamque etiam animi via haurient.

Continuus vari & potissimum hereditarij morborum causae, temperationes constitutio estq[ue] membrorum vniat sunt. Quibus itaque amolendis omni pede studendum, accaratissimè temporis, aetis, regionis & educamur habita ratione. Vel materia, Vel simplex vel composita est intertemperis, cuiusq[ue] lyziatis, verum humida & sicca an vsum possit coherere, nuper vel sine materia, negant, ut in sena.

Itaque vel aere hausto, in ipso aq[ue] puriore, vel nutricia lacte contrario, praecedat temperamentum, & à cibis quos vestit ip[s]a. Incolet igitur eam regionem, quae eligenda puero venit iam ablactum. Calidior itaque temperamento, & re- Temperamentum & ouit in tepide naturae sit, & pueros alia alendaq[ue] altitudo. Deliculus puer frequens inuaret aq[ue] tepide dulci: non calidum egrellum affunditur frigida fluuialia.

Adalior iam laetur balneo ex decocto florum Nymphaeae & Violarum. Minatur unguento refrigerante
 Galeni, sero vel diluculo, bis, terte hebdomada. Aestate pectori apicitur pannulus linens tritus in epidermate
 cordiali humectante & refrigerante, istis multis à cibo intercedit. Contra, eodem loco & ratione uno & de-
 mensu respondeant, in morbo frigidi, humidis, sicis, ex indolenti debilibus & exheretis. Medus praescripto, &c.
 Temperam. Hoc obiter ex collectione & fragmento Rondelletij, alias opportunam & praesentem natus, plura scholastica delo
 frigidius, hu- de Arcebutis, & alij morbo, contra vulgi Medicorum & argentum traditam praesentem: Qui autem hodierno
 mius, sicis. nostro ingratis seculo scribit seris, alij illucendo peris, & facit in his abstergetur, cunctis laboribus ab
 insais perfidie frontis transcripserunt famelicis
 subripuntur.

FINIS.













